





3 2044 106 312 127

BOT DIC  
H51











Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
BHL-SIL-FEDLINK







11  
**Nomenclator botanicus  
hortensis...**

oder

alphabetische und synonymische

**A u f z ä h l u n g**

der

**in den Gärten Europa's cultivir-  
ten Gewächse,**

nebst Angabe

**ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer**

**Dauer und Cultur,**

bearbeitet

von

**Gustav Heynhold,**

nebst

**einer Vorrede**

von

**Dr. Ludwig Reichenbach,**

Königl. Sächs. Hofrathe, Ritter des K. S. Civilverdienst-  
ordens, Director des mineralogischen und zoologischen Mu-  
seums, sowie des botanischen Gartens zu Dresden, Mitglieder  
mehrer gelehrten Gesellschaften, etc. etc.

---

**Dresden und Leipzig,**

in der Arnoldischen Buchhandlung.

1840.

S.

AA

Bot. Dict

H 51

1840



Ein botanischer Nomenclator für Gärtner wird mit jedem Tage dringenderes Bedürfnis. Alljährlich tritt für dieselben die Nothwendigkeit ein, neue Verzeichnisse ihrer Vorräthe drucken zu lassen, sie finden aber keinen Anhaltungspunkt in der Literatur, diese, ihre Verzeichnisse den Anforderungen der schnellen Fortschritte in der Pflanzenkenntnis, gemäß zu entwerfen. *DeCandolle's* für den wissenschaftlichen Botaniker unentbehrlicher *prodromus* ist erst zur Hälfte erschienen, und in seinen ersten Bänden schon wieder höchst unvollständig geworden; von *Steudel's* schätzbarem *Nomenclator botanicus*, welcher einen ganz verschiedenen Zweck hat, ist wenig über ein Zehnthel des Ganzen erschienen, und beide Werke dürften wegen ihres hohen Preises nur von wenigen Gärtnern in Deutschland angeschafft werden, *Sweet's* und *Lou-don's Hortus britannicus* sind theils viel zu theuer, theils sehr unzweckmäsig eingerichtet und deshalb für die Benutzung zu zeitraubend.

Unter diesen Umständen dürfte der Vorsatz des Verfassers, einen für Gärtner bestimmten Nomenclator zu bearbeiten, nur ein den Anforderungen der Zeit sehr entsprechender genannt werden können, da er denselben hierdurch das Mittel in die Hand giebt, die Kataloge ihrer Vorräthe wissenschaftlich richtig abzufassen, oder von schon vorhandenen Irrthümern und Synonymen reinigen zu können. Der Verfasser hat sich nämlich bemüht, diejenigen Gewächse, welche man bis jetzt in Europa's Gärten cultivirt, nach ihrem lateinischen und deutschen Namen, ihrem Autor, ihrer Dauer, ihrem Vaterlande und ihrer Culturweise, auch

mit Angabe der natürlichen Familie und Linnéischen Classe und Ordnung, in welche die Gattung gehört, **alphabetisch** möglichst vollständig zu ordnen, dabei hat er nach dem Vorgange der Engländer, welche in dergleichen Kataloge auch die Flora Britanniens aufnehmen, auch den Gewächsen der Flora Deutschlands ihr Plätzchen vergönnt. Nöthige Synonymen endlich verweisen auf die angenommenen Hauptnamen, und deren Kenntniss schützt vor dem Uebelstande, dem so viele Nichtkenner ausgesetzt sind, eine und dieselbe Pflanze unter verschiedenen Namen anzukaufen oder Anderen anzubieten.

In Hinsicht auf Vollständigkeit wie auf Kritik kann ein dergleichen Werk niemals vollkommen sein, und so fühlt auch der Verfasser die Nothwendigkeit, durch schnell beizufügende Nachträge seinem Werke noch höheren Werth und noch grössere Brauchbarkeit verleihen zu müssen, indessen giebt er sich doch der angenehmen Hoffnung hin, daß das vollständig ihm vorliegende Manuscript, schon zur Michaelismesse complet gedruckt in die Hände Derer gelangend, welche des Werkes bedürfen, den Fleiß und die Mühe bewähren soll, die er auf dasselbe verwendet hat.

Diese wenigen Bemerkungen erlaube ich mir auf den Wunsch des Herrn Verlegers diesem wohlfeilen und, wie ich glaube, für praktische und gebildete Gärtner wirklich nützlichen und unentbehrlichen Gartenbuche vor auszusen- den, und ich wünsche, daß der Erfolg unserer Hoff- nung entsprechen möge.

Dresden, im August 1840.

**Dr. Ludwig Reichenbach.**

## Autoren und citirte Bücher.

- A. B.*, Arboretum et fruticetum Britannicum von Loudon.  
*Abb.*, Abbott, engl. Gartenfreund und Botaniker.  
*A. P. Th. s. Thouars.*  
*A. P.*, Alexander Pope, engl. Handelsgärtner.  
*Abel*, engl. Arzt, bereiste China.  
*Adams*, M. F., bereiste Sibirien.  
*Adans.*, Mich. Adanson, französ. Akademiker, Botaniker und Reisender. † 1806.  
*A. DC.*, Alphons de Candolle, Prof. der Botanik zu Genf.  
*Afzel.*, Adam Afzelius, Prof. d. Botan. zu Upsala. † 1837.  
*Ag.*, C. A. Agardh, Prof. der Botanik zu Lund, dann Bischof von Wermland.  
*Ag. fil.*, J. G. Agardh, Prof. der Botan. zu Lund, des Vor. Sohn.  
*Ait.*, W. Aiton, Vorsteher des kön. Gartens zu Kew. † 1793.  
*Ait. fil.*, G. T. Aiton, des Vorigen Sohn und Nachfolger.  
*All.*, C. Allioni, Prof. der Bot. zu Turin. † 1804.  
*Alp.*, Prosper Alpini, Prof. der Medicin zu Padua. † 1617.  
*Alsch.*, A. Alschinger, Professor am Lyceum zu Zara.  
*Amm.*, J. Amman, Akademiker in Petersburg. † 1741.  
*S. Amand*, französ. Botaniker.  
*Anders.*, Georg Anderson, Vorsteher des Gartens zu Chelsea.  
*Wilhelm Anderson*, engl. Arzt und Botaniker.  
*Andr.*, H. Andrews, berühmter Pflanzenmaler in London.  
*Andrz.*, A. Andrzejowski, russischer Botaniker.  
*Anguill.*, L. Anguillara, Prof. der Botanik zu Padua und Ferrara. † 1570.  
*Arbr.*, A. de l'Arbre, französischer Botaniker.  
*Arduin.*, P. Arduino, Prof. der Botanik und Landwirthschaft zu Padua. †  
*Arnott*, G. A. Walker Arnott, schottländischer Botaniker.  
*Arrabid.*, Don Antonio da Arrabida, Bischof von Anemuria in Brasilien, Herausgeb. einer Flora von Rio de Janeiro.  
*Ass.*, J. de Asso, spanischer Botaniker. †  
*Aub.*, d. P. Th. s. Thouars.  
*Aubl.*, Fusée Aublet, französ. Botaniker und Reisender. †  
*Audib.*, Audibert, französischer Gärtner und Botaniker.  
*Balb.*, J. B. Balbis, Prof. der Botanik zu Turin und Lyon. † 1831.  
*Bab.*, Babington, engl. Botan.  
*Baldw*, G. Baldwyn, Arzt zu Savannah in Nordamerika.  
— G. Baldwin, Botaniker in Philadelphia.  
*Banc.*, J. Bancroft, Arzt und Botaniker auf Jamaika.  
*Banks*, J. Banks, Präsident d. k. Societät der Wissenschaften zu London. † 1820.  
*P. Barker Webb*, s. Webb.  
*Barnades*, spanischer Botaniker.  
*Barrel.*, J. Barrelier, französ. Botan. u. Reisender. † 1673.  
*Barth.*, F. G. Bartling, Prof. der Botanik zu Göttingen.  
— et *Wendl.*, Wendland, Gartenmstr. zu Herrenhausen.  
*Bast.*, Bastard oder Bâtard, französischer Botaniker.  
*Bart.*, B. C. Barton, Prof. der Botanik zu Philadelphia.  
*Bartr.*, J. et W. Bartram, Vater und Sohn, Gutsbesitzer in Nordamerika, welche dasselbe in botanischer Hinsicht bereisten. †  
*Batem.*, J. Bateman, engl. Botaniker, Herausgeber eines Prachtwerkes über mexicanische etc. Orchideen.  
*Bau.*, Franz und Ferdinand († 1826) Bauer, berühmte Pflanzenmaler.  
*Bauh.*, C. Bauhin, Prof. der Medicin und Botanik zu Basel. † 1624.  
— J. Bauhin, † 1613 als Leibarzt des Herzogs von Württemberg.  
*Baumg.*, J. C. G. Baumgarten, Arzt zu Schäsburg in Siebenbürgen und Bearbeiter der Flora dieses Landes.  
*Baxt.*, W. Baxter, engl. Botaniker und Reisender.  
*Beaup.*, Beupret, französischer Botaniker.  
*Beck*, L. C., nordamerikanischer Botaniker  
*Beck.*, O. Becker, Botaniker zu Frankfurt a. M. † 1833.  
*Beauv.*, Palisot de Beauvois, franz. Akademiker, Botaniker u. Reisender. Vgl. auch *P. B.*  
*Bedf.*, Herzog von Bedford in England, großer Beförderer der Botanik.  
*Belang*, C. Belanger, französ. Botaniker und Reisender.



- Bellard.*, L. Bellardi, Vorsteher des botan. Gartens zu Turin. †.
- Benth.*, G. Bentham, Secretair der Gartenbaugesellschaft zu London, ein ausgezeichnete Botaniker.
- Berg.*, P. J. Bergius, Prof. zu Stockholm. † 1790.
- C. H. Bergius, Pharmaceut und Botaniker aus Cüstrin, bereiste das Vorgebirge d. g. Hoffn. † 1817.
- Berger.*, J. Bergeret, französ. Botaniker.
- Berhh.*, J. le Francq v. Berhhey, holländ. Botaniker. †.
- Berk.*, M. J. Berkeley, engl. Botaniker.
- Berl.*, Berlandier, französischer Botaniker.
- Bernh.*, J. J. Bernhardt, Prof. der Botanik zu Erfurt. † 1839.
- Berter.*, C. J. Bertero, piemontesischer Botan. u. Reisender.
- Berthel.*, Sabin. Berthelot, Director des botan. Gartens zu Orotavas auf Teneriffa.
- Bertol.*, A. Bertolone, Prof. der Botanik zu Bologna.
- Befs.*, S. J. G. Besser, Prof. der Botanik zu Kiew.
- Bevis* s. J. B.
- Biasolet.*, B. Biasoletto, Apotheker u. Botaniker zu Triest.
- Bichen.*, Bicheno, schottischer Botaniker.
- Bigel.*, J. Bigelow, Prof. der Botanik zu Boston.
- Bir.*, J. A. J. Biria, französ. Botaniker.
- Birol.*, G. Birolì, Prof. der Botanik zu Turin.
- Bishop*, Vorsteher des botan. Gartens zu Belfast in Irland.
- Bivon.*, A. Bivone Bernardi, L. B. de Alta turre, Botaniker zu Palermo. † 1837.
- Blan.*, G. Blane, Arzt zu London.
- Bluff*, et *Fingerh.*, Bluff und Fingerhuth, Verfasser einer deutschen Flora.
- Blum.*, K. L. Blume, Prof. der Botanik zu Leyden, bereiste Java.
- Bocc.*, S. P. Boccone, sicilian. Botaniker. † 1704.
- Boeb.*, J. v. Boeber, Director des adeligen Erziehungsinstituts zu Petersburg. † 1820.
- Böhm.*, G. R. Böhmer, Prof. d. Medic. zu Wittenberg. † 1803.
- Bönningh.*, C. M. F. v. Bönninghausen, Regierungsrath und Botaniker in Münster.
- Boerh.*, Hermann Boerhaave, Prof. der Medicin und Botanik zu Leyden. † 1738.
- Boj.*, Rojer, Prof. der Botan. auf der Insel Mauritius.
- Boisduv.*, Boisduval, französ. Botaniker.
- Boiss.*, C. V. de Boissieu, französischer Botaniker.
- Bolt.*, J. Bolton, engl. Botan. †.
- Bonam.*, F. Bonamy, französ. Botaniker. †.
- Bong.*, H. G. v. Bongard, k. russ. Staatsrath, Bearbeiter der russischen Flora.
- Bonpl.*, A. Bonpland, französ. Botaniker und Reisender, Begleiter des A. v. Humboldt.
- Booth*, William Beatti, hat die Camellien beschrieben, welche Chandler abgebildet.
- C., Handelsgärtner zu Flotbeck bei Hamburg.
- Borkh.*, M. B. Borkhausen, Botaniker zu Darmstadt.
- Borrer*, W., engl. Handelsgärtner.
- Bory*, J. B. Bory de St. Vincent, französ. Oberst, Akademiker, Naturforscher und Reisender.
- Bosc.*, L., Vorsteher des kön. Gartens zu Paris, bereiste Spanien und Carolina.
- Bot. Cab.*, Botanical Cabinet.
- Bot. Mag.*, Botanical Magazine.
- Bot. Reg.*, Botanical Register.
- Bot. Repos.*, Botanical Repository.
- Bouch.*, J. A. G. Boucher, französischer Botaniker.
- Bouch.*, Bouché, Gärtner und Botaniker zu Berlin.
- Boul.*, G. E. Merlet de la Boulaye, französ. Botaniker.
- Bowd.*, Edward Bowdich, engl. Naturforscher und Reisender.
- Bow.*, J. Bowie, engl. Gärtner, Botaniker und Reisender.
- Bradl.*, Rich. Bradley, Prof. der Naturgeschichte zu Cambridge. † 1732.
- Braun.*, F. a. v. Braune, Botaniker in Salzburg. †.
- Brébiss.*, A. de Brébisson, französischer Botaniker.
- Breda*, J. G. S. van, Prof. u. Director des bot. Gartens zu Gent.
- Bree*, W. T., engl. Botaniker.
- Breyn*, J., Kaufmann und Botaniker zu Danzig. † 1697.
- Brigant.*, Briganti, sicilian. Botaniker.
- Bridg.*, Bridges, engl. Botaniker und Reisender.
- Brignol.*, J. Brignole, Prof. der Naturgeschichte zu Urbino, dann zu Verona.
- Brong.*, Ad. Brongniart, Prof. der Naturgeschichte zu Paris.
- Brondeau*, Louis de, französ. Botaniker.
- Brot.*, F. A. Brotero, Prof. der Botanik zu Coimbra, später Vorsteher des kön. Gartens zu Lissabon. † 1829.
- Brouss.*, P. M. A. Broussonet, Prof. der Botanik zu Montpellier, bereiste die canarischen Inseln. † 1807.
- P. Br.*, Patrick Browne, ein Irländer, bereiste als Arzt

- und Botaniker Jamaika. † 1790.
- R. Br.*, Robert Brown, Custos des Banksischen Museums, berühmt als Botaniker und Reisender.
- Buchanan s. Hamilton.*
- Bull.*, P. Bulliard, Demonstrator der Botanik zu Paris. † 1793.
- Bung.*, Alexander v. Bunge, Prof. und Director des botan. Gartens zu Dorpat, bereiste das Altai-Gebirge, die Mongolei etc.
- Burch.*, W. J. Burchell, engl. Naturforscher und Reisender.
- Burgsd.*, F. A. L. v. Burgsdorf, k. preuss. Oberforstmeister, Bearbeiter d. Forstbotanik. †
- Burm.*, J. Burmann, † 1780, und N. L. Burmann, dessen Sohn, † 1793, Professoren der Botanik zu Amsterdam.
- Burnet*, G. T., Prof. der Botanik zu London.
- Burb.*, J. C. Buxbaum, Botaniker und Arzt aus Merseburg, bereiste Kleinasien etc. † 1730.
- Caes.*, A. Caesalpin, Prof. der Botanik zu Pisa. † 1603.
- Caley*, G., engl. Botaniker und Reisender, Vorsteher des botan. Gartens zu St. Vincent.
- Cambess.*, J. Cambessèdes, französischer Botaniker.
- Camer.*, J. Camerarius, Arzt zu Nürnberg. † 1598.
- Cameron*, David, Vorsteher des botanischen Gartens zu Birmingham.
- Camp.*, A. Campana, Gärtner und Botaniker zu Ferrara.
- Campd.*, F. Campdera, spanischer Botaniker.
- Carey*, W., Arzt und Botaniker zu Serampore in Ostindien.
- Carmich.*, D. Carmichael, engl. Schiffscapitain.
- Cass.*, H. Cassini, Akademiker und Botan. zu Paris. † 1832.
- Castag.*, (C. et R.) Castagne et Robillard, franz. Botaniker.
- Castigl.*, L. Graf Castiglione, ein Mailänder, welcher Nordamerika bereiste.
- Catesb.*, M. Catesby, ein engl. Naturforscher, welcher Nordamerika bereiste. † 1744.
- Catros*, Handelsgärtner zu Bordeaux.
- Cav.*, A. J. Casanilles, Prof. der Botanik zu Madrid. † 1804.
- Cels.*, J. M., Besitzer eines reichen Pflanzengartens zu Paris. H. Cels. Hort. Celsianus.
- Cesat.*, V. de Cesati, Botaniker zu Mailand.
- Cervant.*, V. Cervantes, Prof. der Botanik zu Mexico.
- Chair*, französischer Botaniker und Geistlicher. †
- Cham.*, A. v. Chamisso, Inspector des botan. Museums zu Berlin, begleitete Kotzebue auf seiner Reise um die Welt. † 1838.
- Chand.*, A. Chandler, engl. Gartencultivateur, Herausgeber eines Werkes über Camellien.
- Chaub.*, Chaubard, franz. Botaniker und Mitarbeiter des Bory de St. Vincent.
- Cherl.*, J. H. Cherler, Mitarbeiter und Schwiegersohn des J. Bauhin. † 16?
- Cheval.*, F. F. Chevallier, franz. Botaniker.
- Chois.*, J. D. Choisy, Botaniker zu Genf, ein Schüler De-Candolle's.
- Clarion*, franz. Botaniker.
- Clairv.*, Clairville, schweizer Botaniker.
- Clark*, Daniel Clark, General, Begleiter von Lewis (Statthalter von Louisiana) durch das westl. Nordamerika.
- E. D. Clarke*, engl. Geistlicher und Reisender.
- Clayt.*, J. Clayton, ein engl. Arzt, der in Virginien Pflanzen sammelte. †
- Clement.*, Clemente, Prof. der ökonom. Botanik zu Madrid.
- Clus.*, C. Clusius (Charles de l'Ecluse), † 1609 als Prof. der Botanik zu Leyden.
- Colebr.*, H. Th. Colebrooke, Präsident der bengalischen Societät, bereiste in botan. Hinsicht Ostindien.
- Coll.*, Aloys Colla, Besitzer eines reichen Gartens zu Rivoli bei Turin.
- Collad.*, T. F. Colladon, Genfer Botaniker.
- Collv.*, C. Collville's Catalog.
- Commel.*, J. Commelin, Senator und Vorsteher des botan. Gartens zu Amsterdam, † 1698. Desgl. dessen Neffe Caspar Commelin († 1731).
- Commers.*, P. Commerson, franz. Botan. u. Reisender († 1773.).
- Cornut.*, J. P. Cornutus, ein Arzt u. Botaniker zu Paris. †
- Corr.*, J. F. Correa de Serra, portugiesischer Staatsmann und Botaniker. † 1823.
- Coult.*, Th. Coulter, Genfer Botaniker.
- Court.*, R. J. Courtois, Prof. und zweiter Director des botanischen Gartens zu Lüttich. † 1835.
- Cr.*, H. J. N. v. Crantz, Prof. der Medicin zu Wien. † 1799.
- Cunn.*, Allan Cunningham und Richard Cunningham (letzterer wurde vor einigen Jahren im Innern Neuhollands von den Eingeborenen ermordet), engl. Reisende und Botaniker.
- Curt.*, W. Curtis, engl. Botaniker und Apotheker, Grün-



- der des Botanical Magazine's, † 1799.
- Cuss.*, P. Cusson, Prof. zu Montpellier. † 1783.
- Cust.*, Custor, schweiz. Botaniker.
- Cyrrill.*, D. Cyrrillo, Prof. der Botanik zu Neapel, ermordet daselbst 1799.
- Dahl*, Andreas, Demonstrator der Botanik zu Abo. † 1789.
- Dalech.*, J. Dalechamp, Arzt und Botaniker zu Caen und Lyon. † 1588.
- Dalm.*, Dalman, schwedischer Botaniker.
- Danth.*, Danthoine, französ. Botaniker.
- Darlingt.*, W. Darlington, engl. Botaniker.
- Dav.*, H. Davies, engl. Botaniker.
- Decaisn.*, J. Decaisne, Adjunct beim naturhistorischen Museum zu Paris.
- DC.*, Aug. Pyr. de Candolle, Prof. der Botanik zu Montpellier, Genf etc., einer der berühmtesten Botaniker unserer Zeit.
- — Alph. de Candolle, dessen Sohn, Prof. zu Genf.
- Degl.*, Degland, französ. Botaniker.
- Delany*, engl. Pflanzenmaler.
- Delaun.*, Mordant de Launay's, franz. Botaniker.
- Delil.*, A. R. Delile, Prof. zu Montpellier, welcher Aegypten in botanischer Hinsicht bereiste.
- Dens.*, J. Denson, engl. Gärtner und Botaniker.
- Depp.*, F. Deppe, Botaniker aus Berlin, bereiste Mexico.
- Descourt.*, E. Descourtilz, lebte als Arzt auf St. Domingo und lieferte ein Werk über die Pflanzen der Antillen.
- Desf.*, R. Desfontaines, Prof. der Botanik zu Paris, bereiste das nördliche Afrika. †.
- Desmaz.*, Desmazières, belgischer Botaniker.
- Desport.*, Desportes, französ. Botaniker.
- Desrouss.*, Desrousseaux, franz. Botaniker. †.
- Desv.*, N. A. Desvaux, französ. Botaniker.
- Dethard.*, Detharding, Arzt u. Botaniker zu Rostock.
- Dew.*, C. Dewey, nordamerik. Botaniker.
- Dicks.*, J. Dickson, schottländischer Botaniker. † 1822.
- Dierb.*, J. H. Dierbach, Prof. der Medicin zu Heidelberg.
- Dietr.*, F. G. Dietrich, Hofgärtner zu Eisenach, Verfasser des Lexicons für Gärtnerei und Botanik. A. Dietrich, Botaniker in Berlin.
- Dill.*, J. J. Dillen, aus Darmstadt, starb als Prof. der Botanik zu Oxford 1747.
- Domb.*, J. Dombey, französ. Botaniker, welcher Peru, Chili etc. bereiste, † 1795.
- Don.*, David Don und George Don, berühmte engl. Botaniker.
- Don F.*, Don v. Forfar, schottischer Botaniker.
- Donn*, J. Vorsteher des botan. Gartens zu Cambridge.
- Dorthes*, französ. Botaniker.
- Dougl.*, D. Douglas, ein Schottländer, eifriger Botaniker u. Reisender, kam vor einigen Jahren auf den Sandwichinseln um.
- Drege*, J. F. aus Königsberg, bereiste in neuester Zeit als Bot. das Vorgeb. der guten Hoffnung und machte daselbst zahlreiche Entdeckungen.
- Drev.*, F. Dreves s. Hayne.
- Drumm.*, J. Drummond, eifriger engl. Botaniker und Reisender, † 1835 auf Cuba.
- Dryand.*, J. Dryander, ein Schwede, Bibliothekar des berühmten Banks. † 1811.
- Dubois*, französ. Botaniker.
- Dub.*, J. E. Duby, französ. Botaniker.
- Duchesn.*, A. N. Duchesne, französ. Botaniker, gab eine Monographie d. Erdbeeren. †.
- Dufour*, franz. Arzt u. Botaniker.
- Dufr.*, P. Dufresne, französ. Botaniker, gab eine Monographie der Valerianeen.
- Duham.*, H. L. Duhamel du Monceau, Oberaufseher des Seewesens in Frankreich und Akademiker, berühmt als Dendrolog, Pomolog etc. † 1782.
- Dum. Cours.*, Dumont-Courset, Bearbeiter der Gartenbotanik.
- d'Urvill.*, J. Dumont d'Urville, franz. Seefahrer u. Botaniker.
- Dumort.*, B. C. Dumortier, Mitglied der belgischen Ständekammer und eifriger Botaniker.
- Dun.*, M. F. Dunal, Prof. der Botanik zu Montpellier.
- Dur.*, P. Durand, französ. Botaniker. †.
- Durb.*, Durborough, ? engl. Gärtner.
- Du Roi*, J. P., Arzt und Botaniker zu Braunschweig. † 1785.
- Duv.*, J. Duval, Professor zu Regensburg. †.
- — F. Duval, belg. Botan.
- E. B.*, English Botany von Sowerby und Smith.
- Eaton*, A., nordamerikanischer Botaniker, Verf. einer Flora von Nordamerika.
- Eckl. et Zeyh.*, C. F. Ecklon et C. Zeyher, zwei deutsche



Botan., welche das Vorgeb.  
d. g. H. fleißig durchsuchten.  
*Eddy*, ein engl. Gärtner (Hort.  
Elginensis 1816).  
*Edw.*, Sydenham Edwards, Grün-  
der des Botanical Register.  
*E. F.*, English Flora v. Smith.  
*Ehrbg.*, C. G. Ehrenberg, Prof.  
etc. zu Berlin, berühmt als  
Reisender u. Naturforscher;  
Karl Ehrenberg, dessen Bru-  
der, sammelte in Westindien  
Pflanzen.  
*Ehrh.*, F. Ehrhart, † 1795 als  
kön. Botanicus zu Hannover.  
*Ell.*, Steph. Elliot, Prof. der  
Botanik zu Charlestown in  
Nordamerika.  
*Ellis*, J., Kaufmann u. Natur-  
forscher zu London. † 1776.  
*Endl.*, Steph. Endlicher, Prof.  
und Director des botanischen  
Gartens zu Wien.  
*Eschsch.*, J. F. Eschscholtz, be-  
gleitete Otto von Kotzebue  
als Naturforscher auf seiner  
zweiten Reise um die Welt.  
*Etl.*, A. E. Etlinger, ein deut-  
scher Botan., welcher über  
die Gattung *Salvia* schrieb. †.  
*Fabric.*, P. K. Fabricius, Prof.  
der Medic. zu Helmstaedt. †.  
*Fenzl*, E., Custos am k. k. bot-  
anischen Museum zu Wien.  
*Feuill.*, L. Feuillée, k. französ.  
Astronom, Botaniker u. Rei-  
sender. † 1732.  
*Fic. et Heynh.*, Ficinus et Heyn-  
hold, Bearbeiter der Flora  
von Dresden.  
*Fingerhuth* s. Bluff.  
*Fisch.*, E. E. Ferd. v. Fischer,  
kais. russischer Staatsrath,  
Director des kaiserl. botan.  
Gartens zu Petersburg.  
*F. et M.*, Fischer und C. A.  
Meyer s. diese.  
*Fl. Wetter.*, Flora d. Wetteran  
v. Gärtner, Meyer et Scherbius.  
— *Brit.*, Flora Britannica von  
J. E. Smith.  
— *Dan.*, Flora Danica von  
Oeder Hornemann etc.  
— *Graec.*, Flora Graeca von  
Sibthorp et Smith.  
— *Lond.*, Flora Londinensis  
von Curtis und Hooker.  
— *Peruv.*, Flora Peruviana von  
Ruiz und Pavon.  
*Flörk.*, H. G. Flörke, Prof. d.  
Botanik zu Rostock. † 1835.  
*Flügg.*, J. Flügge, Verfass. einer  
Monographie über Gräser. †.  
*Forbes*, J., Gärtner des Herzogs  
von Bedford.  
*Forsk.*, Pet. Forskol, schwed.  
Botaniker, welcher Aegypten  
u. Arabien bereiste. † 1763.  
*Forst.*, J. R. Forster († 1798  
als Prof. d. Naturgeschichte  
zu Halle) und G. Forster,  
dessen Sohn († 1794 als Geh.  
Rath und Prof. zu Mainz),  
begleiteten als Naturforscher

Capitain Cook auf seiner Reise  
um die Welt.  
*Fras.*, C. Fraser, engl. Gärt-  
ner und Reisender. †.  
*Fres.*, G. Fresenius, Director  
des botanischen Gartens zu  
Frankfurt am Main.  
*Fr.*, E. M. Fries, Professor der  
Botanik zu Upsala.  
*Friw.*, E. Friwaldsky von Fri-  
wald, ungarisch. Naturforsch.  
*Fröl.*, J. A. v. Frölich, Arzt  
und Botaniker zu Ellwangen  
in Württemberg.  
*F. S.*, F. W. Smith, englischer  
Pflanzencultivateur.  
*Fuchs*, Leonh., Profess. zu Tü-  
bingen. † 1565.  
*Funck*, H. C., Apotheker und  
Bot. zu Gefrees in Franken.  
*G. et A.*, Greville et Arnott,  
schottische Botaniker.  
*G.*, J. Gärtner, Arzt u. Bot. zu  
Calw im Würtemb. † 1791.  
*G. fil.*, C. F. Gärtner, des Vor.  
Sohn.  
*G. et H.*, Gillies und Hooker.  
*G. M.*, Garten-Magazin von  
London.  
*G. B. K.*, G. B. Knowles, eng-  
lischer Gärtner u. Botaniker.  
*Gal.*, Galliotti, Bearbeiter der  
Cacteen.  
*Gaudich.*, Gaudichaud, französ.  
Botaniker und Reisender.  
*Gaud.*, J. Gaudin, † 1833 als  
Pastor zu Nyon im Canton  
Waadt, bearbeitete die Flora  
der Schweiz.  
*Gaw.*, J. Bellenden Gawler s.  
Ker.  
*Gay*, J., französischer Bota-  
niker und Reisender.  
*Ger.*, L. Gerard, französischer  
Arzt und Botaniker.  
*Gesn.*, C. Gesner, Arzt und Na-  
turforscher zu Zürich † 1565.  
*Gilib.*, J. E. Gilibert, Professor  
zu Wilna. †.  
*Gill.*, Gillies, schottischer Bot.  
*Ging.*, Baron F. de Gingins-  
Lalsaraz, französ. Botaniker.  
*Gled.*, J. G. Gleditsch, Profes-  
sor der Botanik und Akade-  
miker zu Berlin. † 1786.  
*Glox.*, P. B. Gloxin, Botaniker  
zu Straßburg. †.  
*Gmel.*, C. C. Gmelin, Prof. u.  
Director des botanischen Gar-  
tens zu Karlsruhe. † 1837.  
— — J. G. Gmelin, Akademi-  
ker zu Petersburg, welcher  
Sibirien bereiste. † 1755.  
— — J. F. Gmelin. † 1804 als  
Professor zu Göttingen.  
— — S. G. Gmelin, Akademik.  
zu Petersburg, welcher die  
südl. Gegenden des russischen  
Asiens bereiste. † 1774.  
*Gochn.*, F. C. Gochnat, Bota-  
niker zu Straßburg.  
*God.*, Godefroy, französischer  
Handelsgärtner.

- Goldb.*, C. L. Goldbach, † 1824 als Professor zu Moskau.
- Gold.*, Goldie, ein schott. Gärtner, welcher Canada bereiste.
- Good.*, S. Goodenough, Bischof zu Carlisle in England, bearbeitete die Gattung *Carex*.
- Goua.*, A. Gouan, Prof. u. Vorsteher des botanisch. Gartens zu Montpellier. † ? 1816.
- Gow.*, J. R. Gowen, englischer Gärtner, welcher mehrere interessante Hybriden von Azaleen und Rhododendron erzogen hat.
- Govan*, Vorsteher des botanisch. Gartens zu Saharumpur.
- Grab.*, H. Grabowski, Apothek. und Botaniker zu Oppeln, vergl. Wimmer et Grabowski.
- Grah.*, Graham, Prof. u. Dir. des bot. Gart. zu Edinburgh.
- Grev.*, R. K. Greville, schott. Botaniker.
- Griff.*, Griffiths, engl. Handelsgärtner und Botaniker.
- Gron.*, J. F. Gronovius, Senator u. Botan. zu Leyden. † 1762.
- Güldenst.*, J. A. Güldenstädt, † 1781 als russischer Akadem., bereiste die caucasischen Geb.
- Günth.*, J. C. Günther, Apoth. u. Medicinalassessor zu Breslau, bearbeitete die schlesische Flora. † 1833.
- Guers.*, L. B. Guersent, französischer Botaniker.
- Gunn.*, J. E. Gunner, † 1773 als Bischof zu Drontheim in Norwegen, Bearbeiter der norwegischen Flora.
- Guss.*, G. Gussone, Vorsteher des königl. Gartens in Bocca-difalco bei Palermo.
- H. et A.*, Hooker und Arnott.
- H. B. K.*, Humboldt, Bonpland und Kunth.
- H. et G.*, Hooker u. Greville.
- H. S.*, Gartenbau-Gesellschafts-Garten zu Chiswick.
- H. et T.*, Hooker und Taylor.
- Haage jun.*, F. A., Handelsgärtner in Erfurt.
- Haberl*, Prof. zu Pesth. † 1831.
- Habliz.*, C. L. Hablizl, Aufseher der Landwirthschaft in Taurien, bereiste das nördliche Persien. †.
- Hacq.*, B. Hacquet, † 1814 als Professor zu Lemberg, bereiste die krainerischen Alpen.
- Hänk.*, Thadd. Hänke, ein böhmischer Botaniker, bereiste Südamer. u. † 1817 daselbst.
- Hagen*, C. G., † 1829 als Professor zu Königsberg, Bearbeiter der preussischen Flora.
- Hagenb.*, Hagenbach, Professor der Botanik zu Basel.
- Hall.*, A. v. Haller, berühmter schweiz. Botan. etc. † 1777.
- Hall. fil.*, des Vorigen Sohn, † 1823 als Senator zu Bern.
- Hamilt.*, F. Hamilton, früher Buchanan, ein schottländisch. Arzt und Botaniker, welcher Ostindien und Nepal bereiste.
- — W. Hamilton, Bearbeiter der Flora Westindiens.
- Hartm.*, K. L. Hartmann, Provinzialarzt in Südermanland, bearbeitete die scandinavische Flora.
- Harv.*, Harvey, engl. Botaniker.
- Hasselq.*, F. Hasselquist, ein Schwede, welcher Syrien, Kleinasien etc. ber. † 1752.
- Hayne*, F. G., Hayne, † 1832 als Professor der Botanik zu Berlin. Gab auch früher mit F. Dreves (Drev. et Hayn.) getreue Abbildungen u. Zergliederungen deutscher Gewächse heraus.
- Hedw.*, J. Hedwig, † 1799 als Prof. der Botanik zu Leipzig.
- — R. Hedwig, dessen Sohn. † 1806.
- Hegetsch.*, J. Hegetschweiler, Arzt, Regierungsrath, Botan. etc. zu Zürich. † 1839.
- Heist.*, L. Heister, Professor zu Helmstädt. † 1758.
- Hell.*, F. Heller, Professor der Botanik zu Würzburg.
- Hellen.*, C. N. Hellenius, Professor zu Abo.
- Henck.*, Graf Henkel v. Donnersmark, preuss. Regierungsrath zu Merseburg, auch Bot.
- Hensl.*, Henslow, Professor der Botanik zu Cambridge.
- Herb.*, W. Herbert, Geistlicher und Botaniker zu Spofforth in England. † 1825.
- Herbich*, F., österreichischer Militärarzt und Botaniker.
- Herit.* s. *L'Heritier*.
- Herm.*, P. Hermann, † 1695 als Professor der Botanik zu Leyden, bereiste Ceylon.
- Heuffel*, J., ungarischer Botan.
- Heyn.*, Benj. Heyne, ein deutsch. Botan. † 1819 in Ostindien.
- Hil.*, Aug. St.-Hilaire, Akademiker zu Paris, welcher Südamerika in botanischer Hinsicht bereiste.
- — Jaume St.-Hilaire, Akademiker und Bot. zu Paris.
- Hill*, John, Arzt und Botaniker zu London. † 1775.
- Hilsenb.*, Hilsenberg, deutscher Gärtner, Botaniker u. Reisender. † 1824 in Madagascar.
- Hladn.*, Hladnik, Prof. z. Laibach.
- Hochst.*, Ch. F. Hochstetter, Professor u. Stadtpfarrer zu Esslingen. †.
- Hökert*, Bot. zu Abo in Finnland.
- Hoffm.*, G. F. Hoffmann, † 1826 als Prof. d. Bot. zu Moskau.
- Hffmsg.*, J. C. Graf von Hoffmannsegg, Botanik. zu Dresden, bereiste Portugal.
- Hodg.*, Hodgins, engl. Handelsgärtner.



- Höfs*, Franz v., österr. Forstmann.  
*Hohenack.*, R. F. Hohenacker, ein Würtemberger, Arzt zu Elisabethpol, bereiste als Bot. d. caucasisch-georgische Flor.  
*Holl.*, Hollwell, engl. Botaniker.  
*Hook.*, G. J. Hooker, Professor der Botanik zu Glasgow, einer der berühmtesten Botaniker.  
*Hopp.*, D. H. Hoppe, Professor und Director der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.  
*Hornem.*, J. W. Hornemann, Prof. u. Direct. d. botanischen Gartens zu Kopenhagen.  
*Hornsch.*, F. Hornschuch, Prof. der Botanik zu Greifswalde.  
*Hort.*, Hortorum, der Gärten.  
*Hortul.*, Hortulanorum, der Gärtner.  
*Hort. s. H. Berol.*, H. Berolinensis. *H. Dresd.*, H. Dresdensis. *H. Kew.*, H. Kewensis. *H. Monac.*, H. Monacensis. *H. Par.*, H. Parisensis. *H. Taur.*, H. Taurinensis. *H. Vindob.*, H. Vindobonensis etc.  
*H. Tr.*, Transactions of the London Horticultural Society.  
*Host*, N. Th., k. k. österreich. Leibarzt, Bearbeiter der österreichischen Flora. + 1834.  
*Houst.*, G. Houston, engl. Bot. + 1733 in Neuspanien.  
*Houtt.*, Mart. Houttuyn, Arzt u. Naturforsch. z. Amsterdam. +.  
*Huds.*, W. Hudson, Apotheker und Bot. zu London. + 1793.  
*Hüg.*, C. Baron v. Hügel, Director der botanischen Anstalten zu Wien, bereiste Neuholland und Ostindien.  
*Humb.*, A. Baron v. Humboldt, k. preufs. Kammerherr etc., berühmt als Naturforscher und Reisender.  
*Hunt.*, W. Hunter, Arzt und Botaniker in Ostindien.  
*J. B.*, J. Bevis, engl. Gärtner.  
*J. C.*, J. Cree, engl. Handelsgärtner.  
*J. Sm.*, J. Smith, Gehülfe am k. botanischen Garten zu Kew.  
*Jack*, Wilhelm, engl. Botaniker, welcher Sumatra etc. untersuchte.  
*Jacks.*, G. Jackson, engl. Bot.  
*Jacq.*, N. J. Baron v. Jacquin, Prof. u. Direct. d. botanischen Gartens zu Wien. + 1820.  
— *fil.*, J. F. Baron v. Jacquin, dessen Sohn u. Nachfolg. + 1839.  
*James.*, W. Jameson, englischer Botaniker und Reisender.  
*Jan*, Georg, Prof. der Botanik zu Parma.  
*John.*, Dr. Johnstone, englischer Botaniker.  
*Jon.*, W. Jones, Obrichter in Bengalen, durchforschte in botanischer Hinsicht dieses Land. + 1794.  
*Isert*, Paul Erdm., ein Däne, bereiste Guinea und sammelte daselbst Pflanzen. +.  
*Isn.*, An. Dauty d'Isnard, Prof. der Botanik zu Paris. + 1724.  
*Juss.*, A. L. v. Jussieu, + 1836 als Akademiker und Professor der Botanik zu Paris.  
*Ad. Juss.*, Adrian von Jussieu, des Vor. Sohn u. Nachfolger.  
*K.*, W. D. J. Koch, Hofrath, Profess. u. Direct. des botan. Gartens zu Erlangen.  
*K. et W.*, Knowles und Westcott, engl. Gärtner und Bot.  
*Kämpf.*, E. Kämpfer, aus Lemgo, Arzt und Botaniker, auch berühmt als Reisender. + 1716.  
*Kalm*, Peter, Prof. der Bot. zu Abo, bereiste Nordam. + 1779.  
*Karw.*, Baron v. Karwinski, ein Baier, bereiste in neuester Zeit Brasilien und Mexico.  
*K. et Z.*, Karwinski u. Zuccarini.  
*Kaulf.*, G. F. Kaulfufs, + 1830 als Professor zu Halle.  
*Ker*, J. Bellender Ker, früher Gawler, englisch. Botaniker.  
*Kit.*, Kitaibel, + 1817 als Prof. u. Vorsteher des bot. Gartens zu Pesth, vergl. auch W. K.  
*Kl.*, M. Klotzsch, Custos am k. botanisch. Museum zu Berlin.  
*Knight s. Salisbury.*  
*Köl.*, G. L. Köler, Professor d. Naturgeschichte zu Mainz.  
*Köll.*, J. L. Kölle, Verfasser von Beobachtungen über die Gattung Aconitum. +.  
*Kön.*, J. G. König, ein Däne, + 1785 als Missionsarzt in Tranquebar, war eifriger Botaniker.  
*Kört.*, Franz Körte, bearbeitete mit Schweigger die Phanerogamen der Gegend von Erlangen.  
*Kon.*, C. König, gab mit Sims die Annales of Botany heraus.  
*Krock.*, A. J. Krock, Verfasser einer Flora von Schlesien.  
*Kütz.*, F. T. Kützing, Lehrer d. Naturgesch. zu Nordhausen.  
*Kth.*, K. S. Kunth, Professor der Botanik zu Berlin, Mitbearb. der v. Humboldt'schen und Bonpland'schen botanischen Schätze, daher H. B. K.  
*Kunz.*, G. Kunze, Professor u. Director des botanisch. Gartens zu Leipzig.  
*L.*, Carl von Linné, der berühmte schwed. Naturforscher, + 1778 als Professor zu Upsala.  
*L. fil.*, dessen Sohn und Nachfolger. + 1783.  
*La Bill.*, J. L. La Billardière, französ. Akademiker und Botaniker, bereiste Syrien und Neuholland. + 1834.  
*Lallem.*, Avé Lallemand, Mitdirector oder Adjunct am k. botan. Garten zu Petersburg.  
*Laestad.*, L. L. Laestadius, ein schwed. Geistlicher, welcher Lappland in bot. Hins. bereiste.



- Lagasc.*, M. Lagasca, Prof. u. Vorsteher des botan. Gartens zu Madrid, wurde durch die politischen Unruhen 1823 aus seinem Vaterlande vertrieben.
- Lam.*, J. B. Monet de Lamarck, französischer Akademiker u. Naturforscher. † 1836.
- Lamb.*, Aylmer Bourke Lambert, Vicepräsident der Linné'schen Societät zu London.
- Lang*, Apotheker und Botaniker zu Neutra in Ungarn.
- Langsd.*, G. v. Langsdorf, kais. russ. Consul in Brasilien, begleitete als Naturforscher den Capitain Krusenstern auf seiner Reise um die Welt.
- Lapeyr.*, P. Picot-Lapeyrouse, Praefect etc. zu Toulouse, Bearb. der Pyrenäen Flor. †.
- La Roch.*, F. La Roche, französischer Botaniker.
- Lauth*, Th., Verf. einer Monographie der Gattung Acer.
- Lawrence*, engl. Pflanzenmaler.
- Laws.*, Ch. Lawson, Verfasser des *Agriculturist's Manual*.
- Laxars.*, J. Laxarsa, s. *Lexarza*.
- Laxm.*, Erik Laxmann, ein Schwede, Pastor zu Kolywan in Sibirien, lieferte Beiträge zur dasigen Flora. † 1796.
- Leandr.*, P. Leandro do Sacramento, Präfect des botanisch. Gartens zu Rio Janeiro.
- Lechen* s. *Leschen*.
- Lec.*, Leconte, amerik. Botan.
- Ledeb.*, K. F. v. Ledebour, k. russ. Staatsrath, früher Professor zu Dorpat.
- Lee et Kenned.*, Lee u. Kennedy, berühmte engl. Handelsgärtn. zu Hammersmith bei London.
- Leers*, J. D., Apotheker zu Herborn, Verfasser der dasigen Flora. † 1774.
- Lehm.*, J. C. G. Lehmann, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Hamburg.
- Lejeun.*, A. L. S. Lejeune, Arzt zu Verviers, Bearbeiter der belgischen Flora.
- Lem.*, Lemaire, Bearbeiter der Cacteen.
- Lem.*, Leman. franz. Botaniker.
- Lepech.*, Ivan Lepechin, Akademiker zu Petersburg, bereiste das nördliche Rußland.
- Leprieur* vergl. *Perrotet*.
- Lepellet.*, Lepelletier, französischer Botaniker.
- Lesch.*, Leschenault, de la Tour, französ. Naturforscher und Reisender. † 1826.
- Less.*, C. F. Lessing, deutscher Botaniker u. Reisender, vorzügl. Bearbeiter der Synanthereen.
- Lestib.*, Lestiboudois, J. B. † 1805, F. J. † 1815 et T., Großvater, Sohn und Enkel, Botaniker und Professoren zu Lille; letzterer Bearbeiter einer Monographie der Cyperaceen.
- Lewis*, Viceconsul in Louisiana, bereiste auch in botanischer Hinsicht Nordamerika.
- Lexarza*, gab mit P. de la Llave ein Werk über mexicanische Pflanzen heraus.
- Lex. et Lalav.*, Lexarza et de la Llave.
- Leyss.*, F. W. v. Leyfser, Kriegs- und Domainentath zu Halle, Bearbeiter der dasigen Flora. † 1825.
- L'Her.*, C. L. L'Heritier de Bruttelle, Botaniker zu Paris, ermordet daselbst 1800.
- Lib.*, M. A. Libert, Botanikerin zu Malmedy.
- Libosch.*, J. Liboschitz, Bearbeiter der russischen Flora.
- Lichtenst.*, H. Lichtenstein, Prof. und Director des zoologischen Museums zu Berlin etc., bereiste das Vorgebirge der guten Hoffnung.
- Liebig*, Handelsgärtner zu Dresden.
- Ligthf.*, J. Lightfoot, Pfarrer zu Gothham, gab eine schottische Flora heraus. † 1788.
- Liljebl.*, S. Liljeblad, Prof. zu Upsala. † 1815.
- Lindb.*, A. E. Lindblom, Botaniker und akademischer Docent zu Lund.
- Lindl.*, J. Lindley, Professor der Botanik zu London.
- Lk.*, H. F. Lk., Geheim. Rath, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Berlin etc.
- Lk. et Otto*, vergl. *Otto*.
- Llav.*, P. de la Llave, mexicanischer Botaniker, vergl. *Lexarza*.
- Lobel.*, M. Lobelius, ein Belgier, † 1616 als kön. engl. Botanikus.
- Lock.*, Lockhart, Intendant des botanischen Gartens auf Trinidad.
- Lodd.*, K. Loddiges, berühmter Handelsgärtner zu London, Herausgeber des *Botanical Cabinet*.
- Löfl.*, P. Löffling, ein Schwede, bereiste Spanien und Südamerika. † 1756.
- Loes.*, J. Loesel, Prof. zu Königsberg, † 1656. Bearbeiter der preussischen Flora.
- Lois.*, J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps, französ. Arzt und Botaniker.
- Lotterm.*, T. Lottermoser, preussischer Botaniker.
- Loud.*, J. C. Loudon, Verfasser der *Encyclop. of Gardening*, of plants, des *Hortus britannicus*, des *arboret. britann.* Vergl. auch A. B.
- L. Tr.*, Linnean Society's Transactions.

- Lour.*, J. de Loureiro, ein portugiesischer Missionär, welcher Cochinchina bereiste und eine Flora dieses Landes herausgab. †.
- Low*, Hugh, engl. Handelsgärtner zu Clapton.
- Lowe*, R. T., engl. Naturforscher, welcher Madeira und Porto Santo bereiste. †.
- Lumn.*, St. Lumnitzer, bearbeit. die Flora von Preßburg.
- Lunan*, John, bearbeitete die Flora von Jamaika.
- Lyon*, J., nordamerik. Botaniker.
- Macb.*, J. Macbride, Arzt in Carolina.
- Ma. C.*, Mackays Catalogue, Handelsgärtner zu Clapton.
- Mack.*, J. T. Mackay, Verfasser einer Flora von Irland.
- Mak.*, J. Makoi, Handelsgärtner zu Lüttich.
- M. B.*, F. M. v. Bieberstein, kais. russ. Staatsrath, Bearbeiter der taurisch-caucasischen Flora. †. 1826.
- M. et S.*, Mocino und Sessé, mexicanische Botaniker.
- Mal.*, W. Malcolm, Handelsgärtner zu Kensington.
- Marcgr.*, G. Marcgrav, ein deutscher Naturforscher und Maler, welcher Brasilien bereiste. † 1644.
- Marn.*, R. Marnock, Vorsteh. des botan. Gartens zu Sheffield.
- Marsh.*, Humphry Marshall, ein Besitzer nordamer. Ländereien, welcher über die daselbst einheimischen Bäume und Sträucher schrieb. †.
- Mart.*, K. F. P. von Martins, Hofrath, Professor und Director des botan. Gartens zu München; bereiste Brasilien.
- Mass.*, F. Masson, ein englisch. Gärtner, Botaniker und Reisender. † 1805 in Canada.
- Mast.*, W. Masters, Inspector des Museums zu Canterbury.
- Maton*, G. G., englischer Arzt und Botaniker.
- Matth.*, Patrick Matthew, englischer Botaniker.
- Maund*, B., englischer Gärtner und Botaniker.
- Maur.*, E. Mauri, italienischer Bot., vergl. auch Sebastiani.
- Mayc.*, J. D. Maycock, Bearb. einer Flora Barbadiens.
- May.*, J. Mayer, ein Arzt und Botaniker zu Prag. †.
- Medic.*, F. K. Medicus, Vorsteh. d. Gartens zu Schwetzingen. † 1809.
- Meerb.*, N. Meerburg, Inspector des botan. Gart. zu Leyden.
- Meisn.*, V. F. Meisner, Profess. der Botanik zu Basel.
- Menouv.*, Menonville, französischer Botaniker.
- Menz.*, A. Menzies, ein Schottländer, Begleiter Vancouver's auf der Reise nach den nordwestlichen Küsten Amerikas.
- Mérat*, X. V., Bearbeiter einer Flora von Paris.
- Mert.*, F. C. Mertens, Vorsteher der Handelsschule zu Bremen, Mitarbeiter des Hofraths Koch an der großen deutschen Flora. † 1831.
- Meyen*, J. F., deutscher Naturforscher, begleitete den Capitain Wendt (1830 — 1832) auf seiner Reise um die Erde.
- Mey.*, E. H. F. Meyer, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Königsberg.
- — G. F. W. Meyer, Professor zu Göttingen.
- — C. A. Meyer, Mitdirector oder Adjunct am kais. botanischen Garten zu Petersburg.
- Metzg.*, J. Metzger, Garteninspector zu Heidelberg.
- Mchx.*, A. Michaux, franz. Bot. und Reisender. † 1803.
- Michel.*, P. A. Micheli, Vorsteher des botanischen Gartens zu Florenz. † 1737.
- Mielichh.*, Mielichhofer, Bergbeamter u. Bot. in Salzburg.
- Mik.*, J. C. Mikan, Prof. d. Bot. zu Prag, bereiste Brasilien. †.
- Mill.*, Philipp Miller, Vorsteher des Gartens zu Chelsea, berühmt durch sein Gärtner-Lexicon. † 1771.
- Miq*, F. A. Miquel, holländischer Botaniker.
- Mirb.*, F. F. Brisseau-Mirbel, Akademiker u. Prof. zu Paris.
- Mitch.*, J. Mitchell, Arzt und Botaniker in Virginien. †.
- Moc*, Mocino, † 1819, s. M. et S.
- Möhr.*, P. H. Möhring, Arzt u. Botaniker zu Jever. † 1792.
- Mch.*, C. Mönch, Professor und Director des botanischen Gartens zu Marburg. † 1805.
- Mohr*, D. M. H., Prof. zu Kiel. †.
- Molin.*, J. J. Molina, Missionair und Botaniker in Chili. †.
- Monn.*, J. P. Monnard, Vorsteh. des Collegs zu Nyon, Mitarbeiter an Gaudin's Schweizer-Flora.
- Monni.*, A. Monnier, Botaniker in Nancy, gab eine Monographie der Hieracien heraus.
- Montbr.*, G. Coquebert de Montbret, französischer Botaniker, bereiste mit Aucher-Eloy den Orient. † 1834.
- Mont.*, Lars Montin, schwedischer Arzt und Bot. † 1785.
- Moon.*, Cat., Moon's (englischer Handelsgärtner) Catalog.
- Mord.*, Mordant de Launay, französ. Botaniker s. Delaun.
- Morett.*, G. Moretti, Professor der Botanik zu Pavia.
- Moq. Tand.*, Moquin-Tandon, französischer Botaniker.
- Moric.*, St. Moricand, Botaniker zu Genf.



- Moris**, G. H., Professor und Vorsteher des botanischen Gartens zu Turin.
- Moris.**, R. Morison, † 1683 als Professor und Vorsteher des botanisch. Gartens zu Oxford.
- Morren**, Ch., Professor der Botanik zu Lüttich.
- Mout.**, J. P. Mouton-Fontenille de la Clotte, französ. Botan.
- Mühlbg.**, H. Mühlenberg, Prediger und Botaniker zu Lancaster in Pensylvanien. † 1815.
- Müll.**, A. F. Müller, Professor der Naturgeschichte zu Copenhagen. † 1784.
- Münch.**, O. v. Münchhausen, hanöverscher Oekonom, Gartenfreund u. Naturforscher. †
- Murr.**, J. A. Murray, Professor und Director des botanischen Gartens zu Göttingen. † 1791.
- Muss.**, A. Graf Mussin-Puschkin, bereiste den Caucasus. † 1805.
- Mutel**, A., französ. Botaniker.
- Mut.**, J. B. Mutis, durchforschte 40 Jahre Südamerika als Botaniker. † 1809.
- Neck**, N. J. von, † 1793 als churpfälzischer Botaniker zu Manheim.
- Nect.**, H. Nectoux, begleitete Napoleon Buonaparte als Botaniker nach Aegypten.
- Née**, Louis, französischer Botaniker und Reisender, welcher Malaspina auf seiner Reise um die Erde begleitete. †
- N. E.**, B. G. Nees v. Esenbeck, Präsident der kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher, Professor und Director des botanischen Gartens zu Breslau.
- — T. F. L. Nees von Esenbeck, dessen Bruder, Profess. u. Mitdirect. des botanischen Gartens zu Bonn. † 1837.
- Neill**, Dr., engl. Botaniker und Gartenfreund.
- Nestl.**, B. G. Nestler, Professor zu Straßburg.
- Neuw.**, Maximilian Fürst von Wied Neuwied, rühmlichst bekannt als Naturforscher, bereiste Brasilien.
- Niss.**, F. Nissolle, franz. Bot. †
- Niv.**, Niven, englischer Botaniker und Reisender.
- Nocc.**, Domenico Nocca, Professor und Vorsteher des botanischen Gartens zu Pavia.
- Nois.**, L. Noisette, berühmter französisch. Handelsgärtner.
- Nolt.**, E. F. Nolte, Professor der Botanik zu Kiel.
- Noronna** (Noronha), Ferdinand de, ein spanischer Naturforscher und Reisender. † 1787 auf Isle de France.
- Nutt.**, Th. Nuttall, Professor der Botanik zu Philadelphia.
- Oed.**, G. B. von Oeder, Präfect des Oldenburger Kreises in Holstein, Begründer der Flora Danica. † 1791.
- Oliv.**, G. A. Olivier, französ. Arzt und Naturforscher, bereiste das türkische Reich, Persien u. Aegypten. † 1814.
- Opitz**, Botaniker etc. zu Prag.
- Orteg.**, B. G. de Ortega, Professor u. Direct. des botanischen Gartens zu Madrid. †
- Os.**, P. Osbek, schwedischer Schiffsprediger, bereiste als Naturforscher China und die ostindischen Inseln. † 1805.
- Ott.**, F. Otto, Inspector des botanischen Gartens zu Berlin.
- Lk. et Otto**, Link und Otto, vergl. Lk.
- Othh**, französischer Botaniker und Mitarbeiter an De Candolle's Prodrömus.
- P. B.**, A. M. F. J. Palisot de Beauvois, franz. Akademiker, Bot. und Reisender. † 1820.
- Pall.**, P. S. Pallas, Akademiker zu Petersburg, berühmt als Reisender und Naturforscher. † 1811.
- Panz.**, G. W. Panzer, Arzt, Botaniker und Entomolog zu Hersbruck b. Nürnberg. † 1829.
- P.**, C. H. Persoon, † 1836 als Botaniker zu Paris.
- Park.**, C. Parker, Botaniker in Demerara.
- Parm.**, Parmentier, berühmter Pflanzencultivateur zu Engghien in Belgien.
- Patrin**, E. L. M., bereiste das Imausgebirge. †
- Pav.**, J. Pavon, vergl. R. et P.
- Paxt.**, J. Paxton, Gärtner und Botaniker des Herzogs von Devonshire zu Chatsworth.
- Penny**, George, englischer Botaniker und Gärtner.
- Perpent.**, Helena Perpent, Botanikerin zu Como.
- Perrot.**, S. Perrotet, französ. Botaniker, bereiste mit Leprieux Senegambien.
- Petagn.**, V. Petagna, Botaniker zu Neapel. †
- Petiv.**, J. Petiver, englischer Botaniker. † 1718.
- Pett.**, F. Petter, Bearbeiter der dalmatischen Flora.
- Pfr.**, L. Pfeiffer, Medic. Doctor zu Cassel, Bearbeiter der Cacteen.
- Pill. et Mitterp.**, M. Piller et L. Mitterpacher von Mitterburg, bereisten die slavonische Provinz Posega.
- Pio**, ein piemontesischer Botaniker, gab eine Monographie der Gattung Viola heraus.
- Piso**, G., Arzt u. Naturforsch., welcher Brasilien bereiste. †
- Pluk.**, L. Pluknet, Vorsteher der königl. Gärten bei London. † 1706.
- Plum.**, C. Plumier, königl. fran-

- zösischer Botaniker, bereiste Westindien und Südamerika. † 1704.
- Pöpp.*, Ed. Pöppig, Prof. der Naturgeschichte zu Leipzig, bereiste Pensylvanien, Cuba, Chili, Peru etc.
- Pohl*, J. J., Prof. und Custos des brasilianischen Museums zu Wien, bereiste Brasilien. † 1834.
- Poir.*, J. L. M., Poiret, franz. Botaniker, bereiste das nördliche Afrika.
- Poit.*, A. Poiteau, franz. Botaniker, bereiste St. Domingo.
- Poit. et Turp.* vergl. *Turpin*.
- Poll.*, J. A. Pollich, Arzt etc. † 1780 zu Kaiserslautern.
- Pollin.*, C. Pollini, Prof. und Vorsteher des botanischen Gartens zu Verona. † 1833.
- Portensch.*, F. v. Portenschlag-Ledermeyer, österreichischer Botaniker. † 1821.
- Pour.*, A. Pourret, franz. Botaniker.
- Pr. C.*, Prince's (Handelsgärtzu Neu-York) Catalog.
- Presl*, J. S., Custos am naturhistor. Museum zu Prag.
- — K. B., Prof. an der Universität zu Prag.
- Puer.*, Puerari, Prof. zu Copenhagen.
- Pursh*, Friedr. Pursh (Pursch), ein Gärtner u. Botaniker aus Sachsen, bereiste Nordamerika und gab eine Flora dieses Landes heraus. † 1820.
- Pyl.*, Bachelot de la Pylaie, franz. Botaniker u. Reisender.
- Quer Josef y Martinez*, Prof. zu Madrid. † 1764.
- R. (H.B.)*, Rupp aus Gießen, Bearbeiter der Flora von Jena. † 1719.
- R. et P.*, Ruiz et Pavon; *R. et S.*, Römer et Schultes.
- Raddi*, G., früher Aufseher des Naturaliencabinet's zu Florenz, bereiste als Botaniker Brasilien, Madeira u. Aegypten, wo er 1829 starb.
- Rafn.*, C. F. Rafinesque-Schmalz, bearbeitete früher die Naturgeschichte Siciliens, später Nordamerikas, wo er als Prof. der Naturgesch. zu Lexington lebt.
- Ram.*, L. F. E. Ramond de Carbonnières, Préfect des Departements du Puy-de-Dome, Bearbeiter d. Pyrenäen-Flora.
- Rasp.*, Raspail, französ. Botaniker.
- Rau*, Ambr., Prof. zu Würzburg, † 1830.
- Ray*, John (Rajus), engl. Naturforscher. † 1705.
- Rebent.*, J. F. Rebentisch, Verfasser einer Flora der Neumark.
- Redout.*, P. J. Redouté, berühmter Pflanzenmaler zu Paris.
- Redows.*, Redowsky, russischer Botaniker. †.
- Reich.*, J. J. Reichard, Arzt und Botaniker zu Frankfurt am Main. † 1789.
- Rehb. (Rchbch.)*, H. G. L. Reichenbach, Hofrath, Professor und Director des botan. Gartens u. naturhistorischen Museums etc. zu Dresden.
- Reboul*, franz. Botaniker.
- Reinw.*, H. G. C. Reinwardt, Professor und Director des botan. Gartens zu Leyden, bereiste Java.
- Relh.*, Rich. Relhan, ein Geistlicher, Bearbeiter der Flora von Cambridge.
- Renault.*, P. A., Verfasser einer Flora der Normandie.
- Req.*, Requien, franz. Botaniker.
- Retz.*, A. J. Retzius, Prof. der Naturgesch. zu Lund. † 1821.
- Reyn.*, L. Reynier, Arzt und Botaniker zu Lausanne. † 1824.
- Rheed.*, H. van Rhee de tot Drakenstein, Statthalter der holländisch-ostindischen Compagnie auf Malabar, Verfasser des Hortus malabaricus. † 1691.
- Rich.*, L. C. Richard, Akademiker und Prof. der Botanik an der medicinischen Schule zu Paris. † 1821.
- Achill. Richard*, dessen Sohn und Nachfolger.
- Richards.*, J. Richardson, Chirurg und Botaniker, Begleiter des Capitain Franklin nach den Polarländern.
- Richt.*, H. E. Richter, Prof. der Medicin zu Dresden, bearbeitete mit Th. Klett († 1827) eine Flora von Leipzig, und veranstaltete eine neue Ausgabe der Linnéischen Werke.
- Ridd.*, J. L. Riddel, bearbeitete eine Flora der westlich-nordamerik. Staaten.
- Ried.*, Riedel, bereiste mit G. v. Langsdorf als Botaniker, im Auftrage der russischen Regierung, Brasilien.
- Riss.*, A. Risso, aus Nizza, (mit Poiteau) Verfasser einer Naturgeschichte der Orangenbäume etc.
- Rivin.*, A. Q. Rivinus, Prof. d. Botanik zu Leipzig. † 1725.
- Robill et Cast.* vergl. *Castag.* et *Rob.*
- Robs.*, Robson, ein engl. Botaniker.
- Roch.*, A. Rochel, Gartenmeister am Universitätsgarten zu Pesth, durchforschte die ungarische Flora.
- Rodrig.*, Rodriguez, spanischer Botaniker. †.
- Röhl*, J. C. Röhling, Inspector zu Massenheim, Verfasser



- einer deutshen Flora, deren neue Auflage von Koch und Mertens bearbeitet wird. †.
- Röm.*, J. J. Römer, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Zürich. † 1819.
- Röm. v. L.*, Rudph. v. Römer auf Löthhain und Neumark in Sachsen, ausgezeichnete Botaniker und Besitzer eines reichen Herbariums etc.
- Ron.*, Ronalds, Handelsgärtner zu Brentfort.
- Röp.*, J. Röper, Prof. der Botanik zu Rostock (früher zu Basel).
- Röpert*, Freih. v., Botaniker zu Coburg.
- Rohd.*, M. Rhode, Arzt und Botaniker aus Bremen, bereiste das südl. Frankreich. †.
- Rol.*, D. Rolander, ein Schüler des Linné, bereiste Surinam etc. †.
- Rosc.*, W. Roscoe, Botaniker zu Liverpool, gab ein Prachtwerk über Scitamineen heraus.
- Rostk.*, F. G. T. Rostkovius, Arzt und Botaniker in Stettin.
- Roth*, A. W., Arzt und Botaniker zu Vegesack in Niedersachsen, Herausgeber einer deutschen Flora. †.
- Rottb.*, C. F. Rottböll, Prof. zu Kopenhagen. † 1797.
- Rottl.*, Rottler, evangel. Missionair in Ostindien. †.
- Rorb.*, G. Roxburgh, Arzt der engl.-ostindischen Compagnie und Vorsteher des botanischen Gartens zu Madras. †.
- Roy.*, A. van Royen, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Leyden. † 1779.
- Royle*, J. Forbes Royle, Arzt der ostindischen Compagnie und Director des botanischen Gartens zu Saharumpore.
- Ruch.*, J. Ruchinger, Gärtner am botan. Garten zu Venedig.
- Rudg.*, L. Rudge, englischer Botaniker.
- Rud.*, J. F. Rudolph, Akademiker und Botaniker zu Petersburg. † 1809.
- Rudolph.*, C. A. Rudolphi, Geheime Rath und Prof. der Anatomie zu Berlin. †.
- Ruiz (R. et P.)*, Hippol. Ruiz et J. Pavon, zwei spanische Botaniker, bereisten Peru u. Chili. †.
- Rumpf (Rumphius)* G. E., aus Hanau, Oberkaufmann und Mitglied der holländischen Rathversammlung zu Amboina, berühmt als Naturforscher. † 1706.
- Ruthe.* J. F., Oberlehrer in Berlin, bearbeitete eine Flora der Mark Brandenburg und Niederlausitz.
- Russ.*, A. Russel, Arzt u. Naturforscher zu Aleppo. † 1768.
- S. et W.*, Schrader et Wendland.
- Sabin.*, J. Sabine, engl. Botaniker.
- Sadl.*, J. Sadler, Prof. der Botanik zu Pest.
- Salisb.*, R. A. Salisbury, engl. Botaniker.
- Salm.*, J., Fürst von Salm-Reifferscheidt - Dyck, Besitzer eines schönen Gartens zu Dyck bei Düsseldorf; berühmt als Kenner der Saftpflanzen.
- Salzm.*, P. Salzmann, Botaniker zu Montpellier.
- Sanguin.*, P. Sanguinetti, ital. Botaniker.
- Santi*, G., Naturforscher zu Pisa.
- Sauv.*, F. Boissier de Sauvages, Prof. in Montpellier. †.
- Sav.*, G. Savi, Prof. der Botanik zu Pisa.
- Savign.*, Savigny, franz. Botaniker.
- Schang.*, P., Schangin, Insp. der Bergwerke zu Barnaul in Sibirien, sammelte auch daselbst Pflanzen. † 1816.
- Schauer*, Dr., Assistent am botanischen Garten zu Breslau.
- Scheidw.*, Scheidweiler, Bearbeiter der Cacteen.
- Schelh.*, Schelhase, Handelsgärtner zu Cassel.
- Scheuch.*, J. Scheuchzer, † 1737, et J. J. Scheuchzer, † 1753, Professoren zu Zürich.
- Schied.*, C. J. W. Schiede, Botaniker aus Hessencassel, bereiste mit F. Deppe aus Berlin Mexico und † 1836 daselbst als praktischer Arzt.
- S. et D.*, Schiede und Deppe.
- Schimp.*, C. Schimper, Botaniker zu Heidelberg. W. Schimper, Botaniker u. Reisender für den württemberg. Reiseverein.
- Schk.*, C. Schkuhr, Universitätsmechanikus u. Botaniker zu Wittenberg. † 1811.
- Schltld.*, D. F. L. v. Schlechtendal, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Halle. S. et C., Schlechtendal und Chamisso.
- Schlchr.*, J. C. Schleicher, Botaniker zu Bex in der Schweiz.
- Schmid.*, C. C. Schmidel, Prof. zu Erlangen. † 1793.
- Schm.*, F. W. Schmidt, Prof. zu Prag. † 1796.
- Schneev.*, G. Vorhelm Schneevooft, Gärtner zu Harlem.
- Schomb.*, Rob. Schomburgk, bereiste als Naturforscher in neuester Zeit Surinam.
- Schott*, H., Inspector des botanischen Gartens zu Wien, † 1819, und H. Schott, dessen Sohn, Garteninspector zu



- Schönbrunn bei Wien, bereiste Brasilien. S. et E., Schott und Endlicher.
- Schousb., P. K. A. Schousboe, dänischer Consul in Marokko.
- Schrad., H. A. Schrader, Hofrath, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Göttingen. † 1836.
- Schrk., F. v. Paula Schrank, Akademiker und Director des botan. Gartens zu München. †.
- Schreb., J. C. D. v. Schreber, Hofrath und Prof. der Naturgesch. zu Erlangen. † 1810.
- Schübl., G. Schübler, Prof. zu Tübingen. † 1834.
- Schult., J. A. Schultes, Director der chirurgischen Schule zu Landshut. † 1831.
- — fil., J. H., dessen Sohn, † 1840 als praktischer Arzt zu München.
- Schultz., K. F., Arzt u. Botanik. zu Neubrandenburg. † 1837.
- Schultz, F. W., Arzt und Botaniker zu Zweibrücken.
- Schumach., C. F. Schumacher, Prof. der Anatomie zu Kopenhagen. † 1830.
- Schwägr., F. Schwägrichen, Prof. der Naturgeschichte zu Leipzig.
- Schweig., A. F. Schweigger, Prof. der Naturgeschichte u. Director des botan. Gartens zu Königsberg, wurde 1821 in Sicilien ermordet.
- Schwein., L. D. v. Schweiniz, Missionair und Botaniker zu Bethlehem in Pensylvanien.
- Scop., J. A. Scopoli, † 1788 als Prof. der Naturgeschichte zu Pavia.
- Sebast., A. Sebastiani, Prof. zu Rom.
- Seg., J. F. Seguiet, aus Nismes, lebte als Botaniker zu Verona. † 1784.
- Seidel, Traug. Jacob, Handeldsgärtner in Dresden, vorzüglich berühmt durch seine Camellienculturen und deren Verbreitung.
- Sellow., Fr., aus Potsdam, bereiste als Botaniker Brasilien und starb daselbst 1831.
- Sering, N. C. Seringe, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Lyon.
- Sessé, mexicanischer Botaniker, a. Mocino.
- Sibth., J. Sibthorp, Prof. der Botanik zu Oxford, bereiste Griechenland und Kleinasien. † 1796.
- Sieb., F. W. Sieber, Botaniker aus Prag, berühmt als Reisender und fleißiger Pflanzensammler.
- Siebold., P. F. v., holländischer Stabsarzt, durchforschte in naturhistorischer Hinsicht in neuester Zeit Japan.
- Siegesb., J. G. Siegesbeck, Akademiker und Vorsteher des botanischen Gartens zu Petersburg. †.
- Sims., Jac., engl. Botaniker, setzte das Botanical Magazine von 1784—1826 fort. — John Sims bearbeitete mit Karl König die Annals of Botany.
- Sin., Sinclair, engl. Handeldsgärtner.
- Sinning, Inspector des botan. Gartens in Bonn.
- Sloan., H. Sloane, k. Leibarzt, Präsident der kön. Societät zu London, bereiste Westindien in naturhistorischer Hinsicht. † 1753.
- Sm., J. E. Smith, Präsident der Linnéischen Gesellschaft zu London, einer der ausgezeichnetsten Botaniker. † 1828. G. E. Smith, engl. Botaniker.
- Christ. Smith, Professor zu Christiania, bereiste die canarischen Inseln und das südwestl. Afrika. † 1816.
- Sm. Ayr., Smith, Handeldsgärtner zu Ayr.
- Soland., D. C. Solander, Begleiter des Sir. Joseph Banks auf einer Reise mit Capit. Cook. † 1786.
- Sonner., P. Sonnerat, französ. Reisender und Naturforscher. † 1781.
- Sowerb., J. Sowerby, ausgezeich. Pflanzenmaler. † 1822.
- Soy. Willem., H. F. Soyer Willemet, Botaniker zu Nancy.
- Spach., E., Adjunct am kön. naturhistorischen Museum zu Paris.
- Sparrm., A. Sparrman, schwedischer Naturforscher und Reisender. † 1820.
- Spenn., F. C. L. Spenner, Prof. der Botanik zu Freiburg im Breisgau.
- Spin., M., sardinischer Oberst und Garten-Botaniker.
- Spgl., C. Sprengel, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Halle. † 1833. Ant. Sprengel, dessen Sohn.
- Stechm., J. P. Stechmann, gab eine Monographie der Gattung Artemisia. †.
- Steph., F. Stephan, Prof. zu Moskau. † 1817.
- Stbg., K. Graf v. Sternberg, böhmischer Botaniker, gab eine Monographie der Steinbrecharten. † 1838.
- Steud., E. Steudel, Amtsphysikus zu Eßlingen, Verfasser des großen Nomenclator botanicus und Vorsteher des württemberg Reisevereins.
- Stev., C. v. Steven, k. russ. Staatsrath und eifriger Pflanzenforscher.

- Str.**, W. F. Strangways, engl. Botaniker.
- Sturm.**, J., Maler und Kupferstecher zu Nürnberg, Herausgeber einer deutsch. Flora.
- Sut.**, J. R. Suter, Prof. zu Bern, Herausgeber einer Schweizer-Flora. † 1827.
- Sutt.**, C. Sutton, engl. Botaniker.
- Sw.**, Ol. Swartz, Prof. und Botaniker zu Stockholm, bereiste Westindien. † 1818.
- Sweet**, Rob., Gärtner und Botaniker zu London. † 1839.
- Sym.**, M. Symes, engl. Gesandter in Ava.
- Szov.**, J. Szovits, ein Pharmaceut, bereiste als Botaniker Ungarn, Galicien, Cherson, Taurien, Persien. † 1831.
- T.**, J. Pitton de Tournefort, Prof. d. Botan. z. Paris. † 1708.
- Tabern.**, J. T. Tabernaemontanus (Jacob Theod. v. Bergzabern), † 1590 als Medicus und pfalzgräfl. Leibarzt zu Heidelberg.
- Targion.**, O. Targioni-Tozzetti, Prof. u. Director des botanischen und ökonom. Gartens zu Florenz. † 1829.
- Tausch**, J. F., Prof. und Botaniker zu Prag.
- Tenor.**, M. Tenore, Prof. und Vorsteher des botanischen Gartens zu Neapel.
- Thib.**, Thibaud de Chanvalon, französ. Botaniker.
- Thom.**, L. († 1823 zu Neapel) und E. Thomas, schweiz. Botaniker.
- Thor.**, J. Thore, Arzt u. Botan. zu Dax in Gascogne. † 1823.
- Thory**, C. A., franz. Botanik., Bearbeiter des Textes zu Réduit's Rosen.
- Thoua.**, (A. P. Th.) Aubert du Petit Thouars, franz. Akademiker, Botan. u. Reisender.
- Thoui.**, A. Thouin, Intendant des botanischen Gartens zu Paris. † 1824.
- Thuill.**, J. L. Thuillier, Prof. zu Paris und Herausgeber einer Flora dieser Gegend. † 1822.
- Thbg.**, C. P. Thunberg, Prof. der Botanik zu Upsala, bereiste Südafrika, Japan, Ceylon, Java etc. † 1828.
- Till.**, M. A. Tilli, Vorsteher des botan. Gartens zu Pisa. †
- Tin.**, V. Tineo, Prof. der Botanik zu Palermo.
- Tongue**, R., engl. Botaniker und Gärtner.
- Torr.**, J. Torrey, Arzt u. Prof. der Botanik zu New-York.
- Towns.**, R. Townson, bereiste Ungarn.
- Tratt**, L. Trattinik, Custos d. bot. Museums zu Wien. †
- Trautv.**, E. R. v. Trautvetter, Directorgehilfe am kais. botan. Garten zu Petersburg.
- Trevir.**, L. C. Trevianus, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Bonn.
- Trin.**, K. B. v. Trinius, kais. russ. Staatsrath und Akademiker zu Petersburg, einer der gründlichsten Graskenner unserer Zeit.
- Turcz.**, Nik. v. Turczaninow, k. russ. Botanik. u. Reisender.
- Turn.**, Dawson Turner, engl. Botaniker.
- Turp.**, P. J. F. Turpin, franz. Botaniker und Pflanzenmaler, gab mit Poiteau eine Flora von Paris heraus.
- Turr.**, A. Turra, Prof. zu Vicenza.
- Tuss.**, F. R. de Tussac, franz. Botaniker, Verfasser einer Flora der Antillen.
- Twed.**, Tweedie, engl. Botaniker und Reisender.
- Uc.**, Ucria, Demonstrator der Botanik zu Palermo.
- Urv.** s. d'Urville.
- V.** (Vaill.), S. Vaillant, Prof. der Botanik zu Paris. † 1721.
- Vahl**, Martin, Prof. der Botanik zu Kopenhagen. † 1804.
- Vand.**, D. Vandelli, Prof. der Botanik zu Coimbra, bereiste Brasilien. †
- Van Eeden**, Madam, Pflanzencultivateur in Harlem.
- Vent.**, S. P. Ventenat, Prof. zu Paris. † 1808.
- Vest.**, L. v., Prof. und Proto-medicus zu Grätz in Steyermark. †
- Vib.**, E. Viborg, oder Wiborg, Prof. zu Kopenhagen. † 1822.
- Vigu.**, L. G. A. Vignier, Verfasser einer Naturgeschichte der Mohne und Argemonen.
- Vill.**, D. Villars, Arzt u. Prof. zu Grenoble, später zu Straßburg. † 1814.
- Vitm.**, F. Vitmann, Prof. zu Pavia. †
- Vis.**, R. v. Visiani, ital. Arzt und Botaniker, Bearbeiter der Flora von Dalmatien.
- Viv.**, R. v. Viviani, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Genua.
- Volckam.** J. G. Volckamer, Arzt u. Botan. zu Nürnberg. † 1693.
- W.** (Willd.), L. Willdenow, Prof. und Director des botan. Gartens zu Berlin. † 1812.
- Wahlb.**, P. F. Wahlberg, Prof. der Botanik zu Stockholm.
- Wahlenb.**, G. Wahlenberg, Prof. der Botanik zu Upsala.
- Walk.** Arn., G. A. Walker-Arnott, schottländ. Botaniker.
- W. K.**, Graf F. A. v. Waldstein-Wartenberg und Prof. Kitabel, sieh. *Kit.*, Herausgeber der Flora von Ungarn. †
- Wall.**, N. Wallich, Oberintendant des botan. Gartens zu



- Calcutta. *Wall. et Royle*,  
Wallich et Royle.
- Wallr.*, W. Wallroth, Kreis-  
physikus und Botaniker zu  
Nordhausen.
- Walt.*, Th. Walter, Herausge-  
ber einer Flora v. Carolina. †
- Wangenh.*, F. A. J. v. Wangen-  
heim, preuss. Oberforstmei-  
ster, verweilte längere Zeit  
in Nordamerika und gab ein  
Werk über die dasigen Holz-  
arten heraus. †
- Wats.*, H. C. Watson, engl.  
Botaniker.
- Webb*, P. Barker, engl. Bota-  
niker, bereiste die canarischen  
Inseln.
- Web.*, G. H. Weber, Prof. zu  
Kiel. † Vergl. *Wigg.* F.  
Weber, dessen Sohn, Prof.  
der Naturgeschichte zu Kiel  
† 1823.
- Weig.*, C. E. v. Weigel, Prof.  
zu Greifswalde. †
- W. H. B.*, Baxter jun., am bo-  
tanischen Garten zu Oxford.
- Weih.*, Aug. Weihe, Arzt zu  
Herfort in Westphalen, gab  
mit C. G. Nees v. Esenbeck  
ein Werk über die deutschen  
Brombeersträucher heraus.  
† 1834.
- Weinm.*, J. A. Weinmann, kais.  
Garteninspector zu Pawlowsk.
- Weis.*, F. W., Herausgeber ei-  
ner kryptogamischen Flora  
von Göttingen (1770). †
- Weld.*, Baron von Welden,  
k. k. österreichischer General,  
durchforschte die Flora von  
Dalmatien.
- Welw.*, Welwitsch, österreich.  
Arzt, Botaniker u. Reisender.
- Wender*, G. W. F. Wenderoth,  
Prof. und Vorsteher des botan.  
Gartens zu Marburg.
- Wendl.*, J. C. Wendland, In-  
specteur des Gartens zu Her-  
renhausen, Herausgeber mehr-  
erer schätzbarer botanischen  
Werke. †
- Wendl.*, H. L., dessen Sohn  
und Nachfolger, gab mit  
Bartling Beiträge zur Bota-  
nik heraus.
- Westcott*, engl. Gärtner und  
Botaniker.
- Wib.*, A. G. E. C. Wibel, Arzt  
und Botaniker zu Wertheim.  
† 1814.
- Wight.*, Rich., Wundarzt und  
Director des botan. Gartens  
zu Madras.
- — Rob., Oberfeldarzt in  
Diensten d. ostind. Compagnie.
- Wigg. et Web.*, Wiggers gab  
mit G. H. Weber eine Flora  
von Holstein heraus. †
- Wikst.*, J. E. Wikstroem, Cu-  
stos am akademischen Mu-  
seum zu Stockholm.
- Willem.*, Remig. Willemet,  
Arzt und Botaniker zu Nan-  
cy. † 1807.
- — P. R. Willemet, dessen  
Sohn, bereiste als Botaniker  
Isle de France und † 1790  
in Ostindien.
- Will.*, C. L. Willich, Arzt u.  
Botan. zu Clausthal. † 1776.
- Wils.*, Wilson, engl. Botaniker.
- Wimm. et Grab.*, F. Wimmer  
(Oberlehrer in Breslau) und  
H. Grabowski (Apotheker  
in Oppeln) bearbeiteten in  
neuester Zeit die Flora von  
Schlesien.
- Wint.*, J. J. Winterl, Prof.  
zu Pesth. † 1789.
- With.*, G. Withering, Arzt u.  
Botaniker zu Birmingham,  
Herausgeber einer engl. Flo-  
ra. † 1799.
- Wolff*, bairischer Botaniker.
- Wohlleb.*, J. F. Wohlleben,  
Mitarbeiter an der Flora von  
Halle. †
- Woods*, F., engl. Botaniker.
- Woodw.*, T. J. Woodward,  
engl. Botaniker.
- Wormsk.*, M. Wormskiold, be-  
gleitete als Naturforscher  
1815 Kotzebue auf seiner Rei-  
se um die Erde.
- Wrang.*, Baron v. Wrangel,  
durchforschte in neuester Zeit  
als Botaniker Neukalifornien.
- Wray*, Dr., Consul zu Augusta  
in Georgia (Nordamerika).
- Wred.*, J. C. L. Wredow, ein  
Prediger, Verfasser einer  
mecklenburg. Flora. † 1823.
- Wright.*, G., engl. Arzt und  
Botaniker.
- Wulf.*, F. X. v. Wulfen, Abt  
zu Klagenfurt, ein verdienst-  
voller Botaniker. † 1804.
- Wydl.*, Wydler, Prof. zu Bern.
- Youell*, Handelsgärtner zu Yar-  
mouth.
- Young*, engl. Botaniker.
- Zahlbr.*, J. Zahlbruckner,  
österreichischer Botaniker.
- Zannich.*, G. J. Zannichelli,  
Apotheker und Botaniker in  
Venedig. † 1729.
- Zan*, J. Zanoni, Prof. zu Bo-  
logna. † 1682.
- Zawad.*, A. Zawadzki, Prof.  
zu Lemberg.
- Zeyh.*, Karl Zeyher, vergl.  
*Ecklon*.
- Zollick.*, Zollikofer, Arzt und  
Botaniker in St. Gallen.
- Zuccag.*, A. Zuccagni, Vor-  
steher des botanischen Gar-  
tens zu Florenz. †
- Zuccar.*, J. G. Zuccarini, Prof.  
der Botanik. zu München.
- Baum.*, Gebrüder Baumann,  
Handelsgärtner zu Bollwyl-  
ler im Elsass.
- Soul.*, Soulangue Bodin, Be-  
sitzer einer Gärtnerei bei  
Fromont, unweit Paris.

## Erklärung der gebräuchlichen Zeichen und Abkürzungen.

- h. Bäume und Sträucher.
  - h. Kleine Sträucher.
  - 4. Ausdauernde (Stauden-) Gewächse.
  - ♂. Zweijährige Gewächse.
  - ⊙. Jährige Gewächse.
  - Kn. Knollengewächse.
  - Sch. Schlingende, windende oder kletternde Gewächse.
  - Wa. Wassergewächse.
  - Zw. Zwiebelgewächse.
  - f. Gewächse, die im freien Lande ausdauern.
  - f. b. Dergl., die aber im Winter bedeckt werden müssen.
  - m. Dergl., die im Mistbeete gezogen werden.
  - m. f. Dergl., die anfänglich im Mistbeete gezogen, dann  
aber in's Freie gepflanzt werden.
  - k. Dergl., die im kalten oder Orangerie überwintert  
werden.
  - t. Dergl. des temperirten oder Caphauses.
  - w. Dergl. des warmen Hauses.
-

- Abama anthericoides* DC. vid. *Narthecium ossifragum*.
- Abelia** RB., (Clarke Abel, engl. Botaniker und Arzt),  
XIV. I. Caprifoliaceae.  
chinensis RB., chinesische, f. k. China.
- Abelmoschus* Medic. v. *Hibiscus*.
- Abies* T., vid. *Pinus*.
- Abildgaardia** Vahl (Abildgaard, Prof. zu Copenha-  
gen), III. I. Cyperaceae.  
monostachya Vahl, einährige, 4. k. Ostindien, Neuholl.  
schoenoides RB., knopfgrasähnliche, 4. k. Neuholland.  
tristachys Vahl, dreiährige, 4. k. Ostindien, Neuholl.
- Abroma** Jacq., Cacaomalve, XVIII. I. Malvaceae — Bütt-  
nerieae.  
augustum L., suppl. (*fastuosum* Jacq.), herrliche, f. w.  
Ostindien.  
fastuosum Salisb., prächtige, f. w. Molucken, Neuholl.
- Abronia* Juss. Lam. vid. *Tricratus* L'Her.
- Abrus** L., Paternosterbohne, XVII. IV. Leguminosae —  
Papilionaceae.  
precatorius L., f. Sch. w. Moluck., Ostindien, Arabien.
- Abuta** Aubl. (guianischer Name), XXII. X. Menispermaceae.  
rufescens Aubl., fuchsrothe, f. Sch. w. Guiana.
- Abutilon* Dill. vid. *Sida*.
- Acacia** Tournef., Neck. Acacie, Schotendorn, XVI. VII.  
(XXIII. I.) Leguminosae — Mimosaceae.  
acanthocarpa W., stachelfrüchtige, f. t. Neuspanien.  
acantholoba W., stachelappige, f. w. Südamerika.  
acapulcensis, Kunth, Acapulco, f. t. Neuspanien.  
acicularis W., nadelstachelige, f. w. Südamerika.  
affinis Swt., ähnliche, f. t. Neuholland.  
amara W., bittere, f. w. Ostindien.  
amoena Wendl., liebliche, f. t. Neuholland.  
anceps DC., zweikantige, f. t. Neuholland.  
angulata Desv., kantige, f. t. Neuholland.  
angustifolia Wendl., schmalblättrige, f. t. Neuholl.  
arabica W., arabische, f. w. Arabien, Ostindien.  
arborea W., baumartige, f. w. Jamaica, Caraib. Inseln.  
arceuthos Speg., Wachholder, f. t. Neuholland.  
arcuata La Bill., bogenförmige, f. t. Neuholland.  
armata RB., bewaffnete, f. t. Südl. Neuholland.  
asparagoides Cun., spargelähnliche, f. t. Neuholland.  
aspera Ma. C., rauhe, f. t. Neuholland.  
aspidioides Meyer, schildfarrenblättrige, f. w. Guiana.  
Bancroftiana Berter., Bancroft's, f. w. Jamaica.  
Baxteri H. Angl., Baxter's, f. t. Neuholland.  
biflora RB., zweiblumige, f. t. Neuholland.  
binervata DC., zweinervige, f. t. Neuholland.  
bivenosa DC., zweiaderige, f. t. Neuholland.  
brachyacantha W., kurzdornige, f. w. Südamerika.  
brasiliensis Speg., brasilianische, f. w. Brasilien.  
brevifolia Lodd., kurzblättrige, f. w. Neuholland.



## Acacia

- Brownii* Steud., Brown's, f. t. Neuholland.  
*buxifolia* Cun., buchsbaumblättrige, f. t. Neuholland.  
*caesia* W., hechtblaue, f. w. Ostindien.  
*caffra* W., caffer'sche, f. t. Südafrika.  
*calamifolia* Lindl., rohrblättrige, f. t. Neuholland.  
*canaliculata* Swt., rinnenblättrige, f. t. Neuholland.  
*caracasana* W., Caracas, f. w. Caracas.  
*cassioides* W., cassiaähnliche, f. w. ?  
*Catechu* W., Catechu, f. w. Ostindien.  
*centrophylla* DC., spornblättrige, f. w. Jamaica.  
*Ceratonia* W., johannisbrotähnliche, f. w. Westindien.  
*chrysostachys* Swt., goldährige, f. w. t. Mauritius.  
*ciliata* W., gefranzte, f. w. Südamerika.  
*cinerascens* Sbr., graublättrige, f. t. Neuholland.  
*cochlearis* Wendl. ?, schneckenfrüchtige, f. t. Nördl. Neuholland.  
*concinna* DC., nette, f. w. Ostindien.  
*conferta* Cun., gedrängte, f. t. Neuholland.  
*contorta* DC., gedrehte, f. w. Brasilien.  
*copallina* Lodd. Copal, f. w. ?  
*coriacea* DC., lederblättrige, f. t. Neuholland.  
*cornigera* W., horntragende, f. w. Cuba, Mexico.  
*coronillaefolia* DC., kronenwickenblättrige, f. w. t. Afrika.  
*crassaecarpa* Cun., dickfrüchtige, f. t. Neuholland.  
*crassiuscula* Wendl., dickblättrige, f. t. Neuholland.  
*cultriformis*, Ma. C., messerförmige, f. t. Neuholland.  
*cuneata* Hügl., keilförmige, f. t. Neuholland.  
*Cunninghamii* H. Anglor., Cunningham's, f. t. Neuholl.  
*Courrantiana* DC., Courrant's, f. t. Canar. Inseln.  
*Cyclopis* Ma. C., cirkelförmige, f. t. Neuholland.  
*cymiphylla* Bts. C., sprossenblättrige, f. t. Neuholland.  
*daviesiaefolia* Cun., daviesienblättrige, f. t. Neuholl.  
*dealbata* Lk., weißbestäubte, f. t. Neuholland.  
*decipiens* RB., täuschende, f. t. Westl. Neuholland.  
*decora* Rchb., zierliche, f. t. Neuholland.  
*decurrens* W., herablaufende, f. t. Neuholland.  
*detinens* Burch., aufhaltende, f. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*diffusa* Ker., ausgebreitete, f. t. Neuholland.  
*dillwyniaefolia* Cun., dillwynienblättrige, f. t. Neuholl.  
*diptera* Humb., zweiflügelige, f. w. Südamerika.  
*discolor* W., ungleichfarbige, f. t. Neusüdwallis.  
*divaricata* W., ausgespernte, f. w. Westindien.  
*divergens* \*, ausgebreitete, f. t. Neuholland.  
*doratoxylon* Cun., Lanzenholz, f. t. Neuholland.  
*dumosa* Roxb., Hecken, f. w. Ostindien.  
*eburnea* W., elfenbeinweiß, f. w. Ostindien.  
*echinula* DC., igelborstige, f. t. Neuholland.  
*eglandulosa* DC., drüsenlose, f. t. Neuholland.  
*elongata* Sbr., verlängerte, f. t. Neuholland.  
*emarginata* Wendl., ausgerandete, f. t. Neuholland.  
*esculenta* DC., eßbare, f. t. w. Mexico.  
*exarata* Rchb., ausgefurchte, f. t. Neuholland.  
*falcata* W., sichelblättrige, f. t. Neusüdwallis.  
*falciformis* DC., sichelförmige, f. t. Neuholland.  
*Farnesiana* W., farnesische, f. w. Westindien.  
*ferruginea* DC., rostfarbige, f. w. Ostindien.  
*flexuosa* W., vielbeugige, f. w. Südamerika.  
*floribunda* W., blüthenreiche, f. t. Neusüdwallis.  
 a) *brachyphylla*, kurzblättrige.

# Acacia

β) leptophylla, schlankblättrige.

γ) pendula, herabhängende.

foliosa Bs. C., blätterreiche, f. t. Neuholland.

formosa Kunth, wohlgestaltete, f. t. w. Mexico.

frondosa W., belaubte, f. w. Ostindien.

fruticosa Roxb., strauchige, f. w. Ostindien.

fulgens La Bill., leuchtende, f. t. Neucaledonia.

fuscata Lodd., bräunliche, f. w. ?

genistaefolia Lk., ginsterblättrige, f. t. Neuholland.

Giraffae W., Giraffen-A., f. t. w. Südafrika.

glauca W., blaugrüne, f. w. Brasilien, Westindien.

β) biceps. W.

glaucescens W., blaugrünliche, f. t. Neuholland.

grandiflora W., großblumige, f. w. Ostindien.

grata W., angenehme, f. w. Brasilien.

graveolens Cun., starkkriechende, f. t. Neuholland.

guianensis W., guianische, f. w. Guiana.

Guilandina DC., guilandinaähnliche, f. Sch. w. Cayenne.

gummifera W., gummigebende, f. t. w. Mauritanien.

Habbas Del., Habbas, f. w. Aegypten.

Haematoxylon W., Blutholz, f. w. t. Südafrika.

hastulata Sm., spontonförmige, f. t. Neuholland.

hebecephala Cun., stumpfköpfige, f. t. Neuholland.

hebeclada DC., sprossenästige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

heteracantha Burch., verschiedenstachelige, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.

heteromalla Swt., verschiedenwendige, f. t. Neuholl.

heterophylla W., verschiedenblättrige, f. t. Mascarenische Inseln.

β) latifolia Hort., (wird auch mit A. Melanoxy-  
lon verwechselt).

hispidissima DC., steifhaarige, f. w. Jamaica.

hispidula W., kurzsteifhaarige, f. t. Neusüdwallis.

Hoffmannseggii DC., Hoffmannsegg's, f. w. Brasilien.

homomalla Wendl., gleichwendige, f. t. Neuholland.

horrida W., großdornige, f. t. Ostindien, Arabien.

Hügelii Benth., Hügel's, f. t. Neuholland.

hybrida Swt., Bastard-A., f. t. Neuholland.

hypacantha Hffsgg., unterstachelige, f. t. Südafrika.

incana Spgl., weißlichgraue, f. w. Brasilien.

Instia W., Instia, f. w. Ostindien.

intertexta Sbr., verwebte, f. t. Neuholland.

irrorata Sbr., bethaute, f. t. Neuholland.

Jacaranda Lodd., jacarandaähnliche, f. w. Südamerika.

Julibrissin W., morgenländische, f. k. t. Levante.

juniperina W., wachholderähnliche, f. t. Neuholland.

Kalkora Roxb., Kalkora, f. w. Ostindien.

kermesina H. Berol., kermesinrothe, f. w. t. Brasilien.

Lambertiana Ker., Lambert's, f. t. Mexico.

lanigera Cun., wollige, f. t. Neuholland.

lasiocarpa Hüg., wollfrüchtige, f. t. Neuholland.

latisiliqua W., breitschotige, f. w. Caraimische Inseln.

latronum W., Diebes-Inseln-A., f. w. Ostindischer Archipelagus.

laurifolia W., lorbeerblättrige, f. t. Südseeinseln, Neuholland.

laxa W., lockere, f. w. Caracas.

Lebbek W., Lebbek, f. w. Aegypten.

lentiscifolia Dsf., mastixblättrige, f. t. Mexico.

## Acacia

- leprosa* Sbr., schorfblättrige, f. t. Neuholland.  
*leucocephala* Berter, weisköpfige, f. w. Portorico.  
*leucophloea* W., weisse, f. w. Ostindien.  
*leucophylla* Swt., weisblättrige, f. t. Neuholland.  
*linearis* Ker., linienblättrige, f. t. Neuholland.  
*lineata* Cun., linierte, f. t. Neuholland.  
*linifolia* W., leinblättrige, f. t. Neuholland.  
*lomatocarpa* DC., saumfrüchtige, f. w. Ostindien.  
*longifolia* W., langblättrige, f. t. Neusüdwallis.  
      $\beta$ ) *florida* (serotina), vielblumige.  
      $\gamma$ ) *stenophylla* (angustifolia plur. Hortul. non Wendl., floribunda Hort.).  
*longissima* Wendl., sehr langblättrige, f. t. Neusüdwallis.  
*lophantha* W., büschelblüthige, f. t. Neuholland.  
      $\alpha$ ) *coarctata*, dichtästige.  
      $\beta$ ) *speciosa*, schöne.  
*lophanthoides* DC., lophanthaähnliche, f. w. Jamaica.  
*lucida* Roxb., starkglänzende, f. w. Ostindien.  
*lunata* Lodd., mondförmige, f. t. Neuholland.  
*macracantha* W., großstachelige, f. w. Südamerika.  
*macracanthoides* Berter., ähnlichgroßstachelige, f. w. Jamaica.  
*Mangium* W., moluckische, f. w. Molucken.  
*marginata* RB., geränderte, f. t. Westl. Neuholland.  
*mauroceana* DC., mauritanische, f. t. Mauritaniën.  
*Melanoxylon* RB., schwarzholzige, f. t. Van Diem. Land.  
*microphylla* W., kleinblättrige, f. w. Caracas.  
*mollissima* W., weichblättrige (? pubescens var.), f. t. Neuholland.  
*monacantha* W., einstachelige, f. w. Brasilien.  
*mucronata* W., weichspitzige, f. t. Neuholland.  
*mucronulata* Ma. C., kleinspitzige, f. t. Neuholland.  
*muricata* W., weichstachelige, f. t. w. Antillen, Neucaledonia.  
*myrtifolia* W., myrtenblättrige; f. t. Neuholland.  
*Nemu* W., japanische, f. t. Japan.  
*nervosa* DC., nervigblättrige, f. t. Neuholland.  
*nigricans* RB., schwärzliche, f. t. Neuholland.  
*obovata* H. Angl., verkehrt-eiförmige, f. t. Neuholland.  
*obtusata* Sbr., stumpfblättrige, f. t. Neuholland.  
*odoratissima* W., sehr wohlriechende, f. w. Ostindien.  
*oleifolia* Cun., ölbaumblättrige, f. t. Neuholland.  
*ornithophora* Swt., vogelklauenfrüchtige, f. t. Neuholl.  
*Oxycedrus* Sbr., oxycedrusblättrige, f. t. Neuholland.  
*paniculata* W., rispenblumige, f. w. Brasilien.  
*papuliformis* Cun., blätterige, f. t. Neuholland.  
*paradoxa* DC., wunderbare (? hybrida), f. t. Neuholl.  
*patula* W., abstehende, f. w. Südamerika.  
*pedunculata* W., gestielte, f. w. t. Java.  
*pendula* Cun., hängende, f. t. Neuholland. ]  
*pennata* W., fiederige, f. w. Ceylon.  
*penninervis* Sbr., fiedernervige, f. t. Neuholland.  
*pentadenia* Lindl., fünfzählige, f. t. Neuholland.  
*peregrina* W., fremdartige, f. w. Südamerika.  
*Persoonii* \*, Persoon's, f. w. Peru.  
*peruviana* W., peruanische, f. w. Peru.  
*pilosa* Spgl., behaarte, f. w. Jamaica.  
*pilosiuscula* H. Hüg., wenighaarige, f. t. Neuholland.



## Acacia

- plagiophylla* Speg., schiefblättrige, f. t. Neuholland.  
*planisiliqua* H. Hoffg., blattschotige, f. t. w. Java.  
*platyphylla* Swt., breitblättrige, f. t. Neuholland.  
*plectrocarpa* Cun., spornfrüchtige, f. t. Neuholland.  
*podalyriaefolia* Cun., podalyrienblättrige, f. t. Neuholl.  
*polyacantha* W., vielstachelige, f. w. Ostindien.  
*polygalaefolia* Cun., kreuzblumenblättrige, f. t. Neuholland.  
*polyphylla* DC., vielblättrige, f. w. Westindien.  
*portoricensis*, Portorico, f. w. Portorico.  
*prismatica* Hoffg., prismatische, f. w. t. ?  
*procera* W., hohe, f. w. Ostindien.  
*prominens* Cun., hervorragende, f. t. Neuholland.  
*pubescens* RB., weichhaarige, f. t. Neuholland.  
*pugioniformis* Wendl., dolchblättrige, f. t. Neuholland.  
*pulchella* RB., hübsche, f. t. Neuholland.  
     β) *gracilis*.  
     γ) *speciosa*.  
*pulcherrima* W., schönste, f. w. Brasilien.  
*punctata* W., punktirtästige, f. w. Südamerika.  
*pungens* Speg., stechende, f. t. Neuholland.  
*pyrifolia* DC., birnblättrige, f. t. Neuholland.  
*reticulata* W., netzförmige, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.  
*revoluta* Kunth, zurückgerollte, f. w. Peru.  
*rhodacantha* DC., rothstachelige, f. w. ?  
*Richardsonii* Swt., Richardson's, f. t. Neuholland.  
*rigens* Cun., starre, f. t. Neuholland.  
*robusta* Burch., starke, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.  
*Rohriana* DC., Rohr's, f. w. Südamerika.  
*Rossii* Lodd., Ross's, f. w. ?  
*rubida* Cun. (? *rubicunda* Hort.), röthliche, f. t. Neuholland.  
*ruscifolia* Cun., mäusedornblättrige, f. t. Neuholland.  
*saligna* Wendl., weidenblättrige, f. t. Nördl. Neuholl.  
*sapindoides* Cun., seifenbaumartige, f. t. Neuholland.  
*sarmentosa* Desv., wurzelrankende, f. Sch. w. ?  
*scandens* W., kletternde, f. Sch. w. Brasilien.  
*scleroxyla* Tuss., hartholzige, f. w. Westindien.  
*semicordata* Roxb., halbherzförmige, f. w. Ostindien.  
*Senegal* W., Senegal, f. w. Aegypt. Afrika. (Zweifelhaft, zumal für deutsche Gärten, wo sie wohl nie gezogen worden).  
*Seyal* Delil., Seyal, f. w. t. Oberaegypten.  
*Smithiana* Roxb., Smith's, f. w. Ostindien.  
*Sophora* RB., sophorafrüchtige, f. t. Van Diem. Land.  
*speciosa* W., prächtige, f. w. Ostindien.  
*spectabilis* H. Hüg., ansehnliche, f. t. Neuholland.  
*Spini* Balb., Spinis, f. w. ?  
*spiralis* H. Hüg., spiralförmige, f. t. Neuholland.  
*spirorbis* La Bill., schraubenfrüchtige, f. t. Neucaledon.  
*stipulata* DC., zwischenblättrige, f. w. Bengalen.  
*striata* W., gestreifte, f. w. Südamerika.  
*stricta* W., steife, f. t. Neusüdwallis.  
*strigosa* Lk., striegelige, f. t. Neuholland.  
*strombulifera* W., gedrehtfrüchtige, f. w. Peru.  
*suaveolens* W., lieblichriechende, f. t. Neusüdwallis.  
*subcoerulea* H. Angl., bläulichblättrige, f. t. Neuholl.  
*subulata* Bonpl., pfriemenblättrige, f. t. Neuholland.  
*sulcata* RB., gefurchtblättrige, f. t. Neuholland.



## Acacia

Sundra Spgl., Sundra-A., f. w. Ostindien.  
 tamarindifolia W., tamarindenblättrige, f. w. Westind.  
 taxifolia W., taxusblättrige, f. t. China, Cochinchina.  
 (Wird schwerlich in deutschen Gärten kultivirt).

tenuiflora W., dünnblüthige, f. w. Caracas.  
 tetragona W., vierkantige, f. w. Caracas.  
 Thibaudiana DC., Thibaud's, f. w. Südamerika.  
 tomentosa W., filzige, f. w. Ostindien.  
 tortuosa W., gedrehte, f. w. Jamaica, Guadalupe.  
 trichodes W., haarige, f. w. Caracas.  
 trigonocarpa Cun., dreikantigfrüchtige, f. t. Neuholl.  
 trinervata Sbr., dreinervige, f. t. Neuholland.  
 umbrosa Cun., schattenliebende, f. t. Neuholland.  
 uncinata Lodd., hakigblättrige, f. t. Neusüdwallis.  
 undulaefolia Cun., wellenblättrige, f. t. Neuholland.  
 undulata W., wellenförmige, f. t. Neuholland.  
 vaga W., vielwendige, f. w. Brasilien.  
 venusta W., schöne, f. w. Südamerika.  
 vestita Ker., bekleidete, f. t. Neuholland.  
 vera J. Bauh., wahre, f. w. Aegypten.  
 verniciflua Cun., firnisgebende, f. t. Neuholland.  
 verticillata W., wirtelblättrige, f. t. Van Diem. Land.

β) angusta.

γ) latifolia (robusta Hortul.).

virgata Lodd., ruthenförmige, f. t. Neuholland.  
 viridiflora Kunth, grünblüthige, f. c. Südamerika.  
 viridiramis Burch., grünästige, f. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 viscosa Wendl., schmierige, f. t. Neuholland.  
 Wallichiana DC., Wallich's, f. c. Ostindien.  
 xylocarpa W., holzfrüchtige, f. c. Ostindien.

*abietina* Hort. vid. *linifolia*. *acicularis* RB. vid. A.  
 Brownii. *ambigua* Salisb. v. *suaveolens*. *ampelisopia*  
 Hortul. v. *floribunda* a. *australis* Hort. vid. *lunata*.  
*brachyoloba* W. v. *Darlingtonia brachyoloba*. *caffra*  
 Zeyh. v. *hypacantha*. *ciliata* RB. v. *strigosa*. *coerules-*  
*cens* Hort. v. *glaucescens*. *conspicua* Hort. v. *vestita*.  
*contortuplicata* Hort. v. *Darlingtonia glandulosa*. *cor-*  
*data* s. *cordifolia* Hort. v. *biflora*. *cumanensis* W. v.  
*Prosopis cuman*. *decurrens speciosa* v. *angulata*. *di-*  
*varicata* Cun. v. *divergens*. *dodonaefolia* W. v. *vi-*  
*scosa*. *dolabriformis* Wendl. v. *decipiens*. *edulis* W.  
 v. *Prosopis dulcis*. *elephantorrhiza* Burch. v. *Proso-*  
*pis eleph*. *Esterhazyana* Hort. v. *angulata*. *falcata*  
 Sbr. v. *plagiophylla*. *floribunda* Sbr. et plur. Hort.  
 v. *longifolia*. *glandulosa* W. v. *Darlingtonia glandu-*  
*losa*. *granulosa* La Bill. v. *muricata*. *Houstoni* W.  
 v. *Inga Houstoni*. *impressa* Cun. v. *penninervis*. *ju-*  
*liflora* W. v. *Prosopis juliflora*. *juniperina* Sbr. v. *Ar-*  
*ceuthos*. *juniperoides* Sbr. v. *juniperina*. *leptophylla*  
 DC. v. *acicularis* W. *linearis* Lodd. v. *longissima*.  
*linifolia* plur. Hort. v. *mucronata*. *mollis* B.R. v.  
*molliissima*. *pallida* W. v. *Prosopis pallida*. *pectinata*  
 Hffg. v. *Hoffmannseggii*. *pinifolia* Hort. v. *linifolia*.  
*prostrata* Lodd. v. *diffusa*. *quadrangularis* Lk. v. *te-*  
*tragona*. *robusta* Hortul. v. *verticillata*. *rutaeifolia*  
 Lk. v. *nigricans*. *speciosa* Hort. v. *lophantha*. *ste-*  
*noptila* Hffgg. v. *angulata*. *strigosa* Spgl. vid. *Per-*  
*soonii*. *sulcipes* Sbr. v. *angulata*. *tamariscina* W. v.  
*Gagnebina tamar*. *taxifolia* H. Angl. v. *Oxycedrus*.

**Acacia**

*trapezoides* DC. vid. *decipiens*. *truncata* Hort. vid. *pendula*. *ulicifolia* Wendl. v. *juniperina*. *virescens* DC. v. *peruviana*.

**Acaena** Vahl, Stachelnüsschen. II. 1. Rosaceae-Sanguisorbeae.

*adscendens* Vahl, aufsteigendes, 4. k. f. Patagonien.  
*agrimonoides* Kunth, odernennigähnliches, 4 k. Mexico.  
*argentea* R.P., silberfarbiges, 4. k. Chili.  
*Eupatoria* Schlecht., brasilianisches, 4. t. Brasilien.  
*laevigata* Ait., glattes, 4. k. Patagonien.  
*latebrosa* Ait., schattiges, 4. k. Cap d. gut. Hoffnung.  
*lucida* Vahl, starkglänzendes, 4. k. Falklandsinseln.  
*magellanica* Vahl, magellanisches, 4. k. Patagonien.  
*myriophylla* Lindl., vielblättriges, 4. k. Mendoza.  
*ovalifolia* R. et P., eiblättriges, 4. k. Peru.  
*pinnatifida* R. et P., fiederspaltiges, 4. k. Chili.  
*sanguisorbae* Vahl, Wiesenknopf, 4. k. Neuseeland.  
*sericea* Jacq., seidenhaarige, 4. k. ?

**Acalypha** L., Brennkraut. XXI. x. Tricoccae-Euphorbiaceae.

*alopecuroides* Jacq., fuchsschwanzähnliches, ☉. m. Venezuela, Caracas.  
*brachystachya* Hornem., kurzähriges, ☉. m. China.  
*caroliniana* Walt., carolinianisches, ☉. f. Carol., Florida.  
*ciliata* Forster, gefranztes, ☉. m. Arabien, Ostindien, Guinea.  
*cuspidata* Jacq., zugespitztes, ♀. w. Caracas, Portorico.  
*diversifolia* Jacq., verschiedenblättriges, ♀. w. Caracas.  
*hispida* W., steifhaariges, ☉. m. Ostindien, China, Cochinchina.  
*indica* L., indisches, ☉. m. Ostindien.  
*integrifolia* W., ganzblättriges, ♀. w. Mauritius.  
*laevigata* Sw., glattes, ♀. w. Jamaica.  
*macrostachya* Jacq., großähriges, ♀. w. Caracas.  
*mollis* Kunth, weichblättriges, ☉. m. Mexico.  
*pauciflora*, Hornem., wenigblumiges, ☉. m. f. China.  
*polystachya* Jacq., vielähriges, ☉. m. Hispaniola.  
*prunifolia* Kunth., pflaumenblättriges, ☉. m. f. Mexico.  
*pruriens* Nees, juckendes, ☉. m. Brasilien.  
*reptans* Sw., kriechendes, ♀. w. Jamaica, Hispaniola.  
*rubra* W., rothes, 4. w. ?  
*scabrosa* Sw., scharfes, ♀. w. Jamaica.  
*virgata* L., ruthenförmiges, ♀. w. Jamaica.  
*virginica* L., virginisches, ☉. f. Nordamerika.  
*cucullata* Poir. vid. *macrostachya*. *pastoris* DC. vid. *rubra*.

**Acanthus** L., Bärenklau. XIV. II. Labiatae-Acanthaceae.

*carduifolius* Thbg., distelblättriger, 4. k. Cap d. g. H.  
*mollis* L., unbewehrter, 4. k. — f. b. Ital., Griechenl.  
*niger* Mill., schwärzlicher, 4. k. — f. b. Portugal.  
*spinosus* L., dorniger, 4. k. — f. b. Italien.  
*capensis* Thbg. v. *Blepharis capens*. *ebracteatus* Vahl.  
v. *Dilivaria ebracteata*. *edulis* Forsk. v. *Bleph. edulis*.  
*furcatus* Thbg. v. *Blepharis furcata*. *glomeratus* Lam.  
v. *Blepharis procumbens*. *ilicifolius* L. v. *Dilivaria ilicifolia*.  
*integrifolius* Thbg. vid. *Blepharis saturejaefolia*.  
*maderaspatensis* v. *Blepharis boerhaaviaefolia*.  
*procumbens* Thbg. v. *Blepharis procumbens*.  
*repens* Vahl v. *Blepharis molluginifolia*.

**Acarna W., Zwergdistel. XIX. 1. Compositae-Cynarocephalae.**

caespitosa W., rasenartige,  $\frac{1}{2}$  k. Numidien.

cancellata W., gitterhüllige,  $\odot$ . f. m. Südeuropa, Barbarei.

gummifera W., v. *Carlina gummifera. macrocephala* W., *Carlina Fontanesii*.

**Acer Tourn., Ahorn. XXIII. 1. (VIII. 1.) Sapindacei-Acerineae.**

acuminatum Don., zugespitzter,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.

barbatum Mchx., bärtiger,  $\frac{1}{2}$  f. Carolina.

campestre L., Feld-A., Mafsholder,  $\frac{1}{2}$  f. Europa, Taurien.

$\alpha$ ) austriacum Tratt.

$\beta$ ) macrocarpum Opitz.

$\gamma$ ) molle Opitz (hebecarpum).

$\delta$ ) nanum.

$\epsilon$ ) variegatum.

circinatum Pursh., kreisförmiger,  $\frac{1}{2}$  f. Westlich. Nordamerika.

creticum L., cretischer,  $\frac{1}{2}$  k. Griechenland.

dasycarpon Ehrh., wollfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

heterophyllum W.,  $\frac{1}{2}$  k., verschiedenblättriger. Kleinas.

ibericum M.B., georgischer,  $\frac{1}{2}$  f. Caucasus.

lobatum Fischer, gelappter,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien.

macrophyllum Pursh., großblättriger,  $\frac{1}{2}$  f. Westlich. Nordamerika.

• monspessulanum L., südeuropäischer,  $\frac{1}{2}$  f. Südeuropa.

montanum Ait., Berg-A.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

nigrum, Mchx., schwarzer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

oblongum, Wall., langblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.

obtusatum Kit., stumpflappiger,  $\frac{1}{2}$  f. Ungarn, Italien.

(var. von *A. opalifolium*).

obtusifolium Sm., stumpfblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Creta.

opulifolium Vill., wasserholderblättriger,  $\frac{1}{2}$  f. Frankreich, Italien, südliche Schweiz.

palmatum Thbg., handförmiger,  $\frac{1}{2}$  k. — f. b. Japan.

pensylvanicum L., pensylvanischer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

platanoides L., Spitz-A. (Lenne),  $\frac{1}{2}$  f. Europa.

$\beta$ ) lacinosum (crispum).

$\gamma$ ) Lobelii. Tenore.

$\delta$ ) pubescens.

$\epsilon$ ) variegatum (fol. aur. et argent. varieg.).

Pseudoplatanus L., gemeiner,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.

$\alpha$ ) longifolium.

$\beta$ ) lutescens.

$\gamma$ ) macropterum.

$\delta$ ) micropterum.

$\epsilon$ ) purpureum.

$\zeta$ ) stenopterum.

$\eta$ ) variegatum (fol. aur. et argent. varieg.).

$\theta$ ) lutescens.

rubrum L., Ehrh., rother,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) coccineum Hortul.

saccharinum L., Zucker-A.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

tataricum L., tatarischer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordasien, Galizien u. Ungarn.

Folgende weniger bekannte Arten sind zum Theil noch nicht eingeführt:



**Acer**

- A. caudatum Wall.
- cultratum Wall.
- laevigatum Wall.
- sterculiaceum Wall.
- villosum Wall.
- glabrum Torrey. Nordamerika.
- dissectum Thbg.
- japonicum Thbg.
- pictum Thbg.
- septemlobum Thbg.
- trifidum Thbg.
- truncatum Bunge. Südliches Rußland.
- recurvatum Bs. C.

Nepal.

Japan.

*sempervirens* L. v. *heterophyllum*. *spicatum* Lam.  
v. *montanum*. *striatum* du Roi v. *pensylvanicum*.

**Aceras** RB., Ohnhorn, XX. 1. Orchideae.

*anthropophora*, wunderbarblühendes, 4. f. England,  
Mittel- und Südeuropa.

**Acerates longifolia** Ell. vid. *Gomphocarpus longifolius*.**Achania** Sw., Schampappel, XVI. VIII., Malvaceae.

*cordata* Mart., herzblättrige, 5. w. Brasilien.

*Malvaviscus* Sw., gemeine, 5. w. Jamaica.

*mollis* Ait., weichblättrige, 5. w. t. Mexico.

*pilosa* Sw., behaarte, 5. w. t. Westindien, Mexico.

**Achillea** Garbe, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*abrotanifolia* L., stabwurzelblättrige, 4. f. Kleinasien.

*acuminata* Ledeb., spitzblättrige, 4. f. Rußland.

*aegyptiaca* L., ägyptische, 4. 5. — k. Aegypten, Levante.

*Ageratum* L., gewürzhafte, 4. f. Südfrankreich, Italien.

*albicaulis* C. A. Mey, weißstängelige, 4. f. Caucasus.

*albida* W., weißliche, 4. f. ?

*alpina* L., Alpen-G., 4. f. Europäische Alpen, Sibirien.

*anglica*, G. Don., englische, 4. f. England.

*anthemoides* W., chamillenähnliche, 4. f. ?

*asplenifolia* Vent., strichfarnblättrige, 4. f. Nordamerika.

*atrata* L., schwärzliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*aurea* Lam., goldfarbige, 4. f. k. Kleinasien.

*auriculata* W., geöhrt, 4. f. k. Kleinasien.

*banatica* Kit., banatische, 4. f. Banat.

*biserrata* MB., doppeltsägezähne, 4. f. Georgien.

*cartilaginea* Ledeb., knorpelige, 4. f. Rußland.

*chamaemelifolia* Pourr., chamillenblättrige, 4. f. Pyrenäen.

*Clavennae* L., bittere, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *glabrata*.

*Clusiana* Tausch., *Clusiu's*, 4. f. Oestereich., steyermarkische etc. Alpen.

*clypeolata* Sm., schildförmige, 4. f. k. Macedonien.

*compacta* W., dichtblühende, 4. f. Bannat. Bessarabien.

*coronopifolia* W., krähenfußblättrige, 4. f. Kleinasien.

*cretica* L., cretische, 4. k. f. Creta.

*cristata* Retz, kammlättrige, 4. f. Italien.

*crithunifolia* Kit., meerfenchelblättrige, 4. f. Ungarn.

*crustata* Roch., krustirte, 4. f. Ungarn.

*cuneifolia* Lam., keilblättrige, 4. f. Südfrankr., Oberitalien.

*decolorans* Schrad., entfärbte, 4. f. ?

**Achillea**

*decumbens* Lam., niederliegende, 4. f. Kamtschatka.  
*dubia* Fisch., zweifelhafte, 4. f. Sibirien.  
*falcata* L., sichelförmige, 4. k. Aegypt., Kleinasien.  
*filipendulina* Lam., farnkrautblättrige, 4. f. Caucasus.  
*Gerberi* W., Gerber's, 4. f. Caucasus, Sibirien.  
*grandiflora* MB., großblumige, 4. f. Caucasus.  
*Haenkeana* Tausch, Hänke's, 4. f. Voralpen Deutschlands, Schweiz.

β) *flore albo.*

*holosericea* Sm., sammethaarige, 4. k. Parnassus.  
*imbricata* Vent., dachziegelförmige, k. f. Persien.  
*Impatiens* L., sibirische, 4. k. Sibirien.  
*lanata* Spgl., wollige, 4. f. Ungarn, Oesterreich, Litorale.  
*leptophylla* MB., dünnblättrige, 4. f. Podol., Taurien.  
*ligustica* All., ligurische, 4. f. Italien, Griechenland.  
*lingulata* Kit., zungenförmige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.  
*macrophylla* L., großblättrige, 4. f. Schweizeralpen.  
*microphylla* W., kleinblättrige, 4. f. Spanien.  
*Millefolium* L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) *collina* Beck.

γ) *purpurea* Hort.

δ) *sordida* (polyphylla) Schlchr.

ε) *sylvatica* Becker.

*mongolica* Fisch., mongolische, 4. f. Sibirien.  
*moschata* Wulf., moschusduftende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*myriophylla* W., vielblättrige, 4. f. ?  
*nana* L., Zwerg-G., 4. f., Oberitalien, Schweiz, Tyroler Alpen.

*nobilis* L., edle, 4. f., Mittel- u. Süddeutschl., Schweiz.

β) *ochroleuca* Auctor non Ehrh.

*ochroleuca* Ehrh., Kit., gelblichweisse, 4. f. (Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.

*odorata* L., wohlriechende, 4. f. Ungarn, Süddeutschl.  
*pauciflora* Lam., wenigblumige, 4. f. Spanien, Kleinasien.

*pilosa* W., behaarte, 4. f. ?

*Ptarmica* L., Sumpf-G., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

β) *flore pleno.*

*pubescens* L., feinhaarige, 4. f. Caucasus.  
*recurvifolia* Lapeyr., gekrümmtblättrige, 4. f. Pyrenäen.  
*Santolina* L., santolinablättrige, 4. f. Kleinasien.  
*santolinoides* Lagasc., santolinaähnliche, 4. k. Süds Spanien.

*serrata* Retz., sägeblättrige, 4. f. Schweiz.

*setacea* Kit., borstenblättrige, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Ungarn, Siebenbürgen, Podolien etc.

β) *brevifolia* Roch.

*speciosa* Henckel, schöne, 4. f. ? Sibirien.

*squarrosa* Ait., sparrige, 4. f. ?

*tanacetifolia* All., reinfarnblättrige, 4. f. Krain, Ungarn, Schweiz, Piemont etc.

α) *dentifera.*

β) *purpurea.*

γ) *stricta.*

δ) *angustifolia* (gehört kaum hierher).

**Achillea**

*taurica* MB., taurische, 4. f. Taurien.  
*tenuifolia* Lam., feinblättrige, 4. k. f. Kleinasien.  
*Thomasiana* Hall. fil., Thomas's, 4. f. Canton Waadt.  
*tomentosa* L., filzige, 4. f. Südeuropa, Tartarei.  
*vallesiaca* Sut., Walliser, 4. f. Wallis.

*abrotanifolia* Hort. v. *myriophylla*. *ambigua* Poll.  
 v. *tanacetifolia*. *banatica* H. bot. v. *lanata*. *bi-*  
*pinnata* L. v. *Tanacetum myriophyllum*. *capillaris*  
 Poir v. *setacea*. *capillata* Lapeyr. v. *chamaemeli-*  
*folia*. *coarctata* Poir. v. *compacta*. *compacta* Lam.  
 v. ? *tanacetifolia*  $\delta$ . *crassifolia* Hortul. v. *crustata*.  
*cylindrica* Poir v. *nobilis* var.  $\beta$ . *dentifera* Rchb.  
 v. *Haenkeana*. *dentifera* DC. v. *tanacetifol.* var.  $\alpha$ .  
*distans* Kit. v. *tanacetifol.* *Eupatorium* MB. vid.  
*filipendulina*. *falcata* Lapeyr. v. *recurvifolia*. *fili-*  
*folia* MB. v. *filipendulina*. *glomerata* MB. v. *com-*  
*pacta*. *Herbarota* All. v. *cuneifolia*. *incisa* Clairv.  
 v. *vallesiaca*. *leucanthema* P. v. *grandiflora*. *livia*  
 Scop. v. *moschata*. *macrophylla* Pill. et Mitt. vid.  
*Pyrethrum macrophyllum*. *magna* All. et L. v. *ta-*  
*nanacetifolia*.  $\alpha$ . *magna* Haenk. v. *Haenkeana*. *ma-*  
*gna* Roch. v. *tanacetifolia*.  $\beta$ . *magna* W. v. *lanata*  
 var. *magna* plur. auctor. v. *Millefolium* var. *mi-*  
*crantha* W. v. *pubescens*. *montana* Schlchr. vid.  
*Thomasiana*. *pectinata* W. v. *ochroleuca*. *pecti-*  
*nata* Lois. v. *chamaemelifolia*. *polyphylla* Schlchr.  
 v. *Millefolium* var.  $\delta$ . *punctata* Tenore v. *nobi-*  
*lis*.  $\beta$ . *rosea* Poir. vid. *asplenifolia*. *sambucifolia*  
 Dsf. v. *Pyrethrum macrophyllum*. *scabra* Host. v.  
*crustata*. *Schkuhrii* Spgl. vid. *nobilis*.  $\beta$ . *Seidlii*  
 Presl. v. *Haenkeana*.  $\beta$ . *serrata* Sm. v. *anglica*.  
*sicula* Rafin. v. *microphylla*. *stricta* Schlchr. v. *tana-*  
*cetifolia* var.  $\gamma$ . *sudetica* Opiz. v. *Haenkeana*.

*Achimenes coccinea* Pers. v. *Trevirania coccinea*.

**Achlys** DC., Achlys. XIII. 1., Papaveraceae-Podophylleae.  
*triphylla* DC., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

*Achnatherum Calamagrostis* P.B. v. *Lasiagrostis Calam.*

- - *lanceolatum* P.B. v. *Calamagrostis lanceol.*

*Achnodon* (*Achnodonton*) *arenarius* Lk., v. *Phleum arenar.*

- - *Bellardi* P.B. v. *Phleum tenue*.

**Achras** L., Breiäpfel, VI. 1., Sapotaceae.

*Sapota* L., gemeiner,  $\frac{1}{2}$ . w. Westindien.

**Achyranthes** L., Spreublume, V. 1., Aizoideae-Ama-  
 rantheae.

*argentea* Lam., silberfarbige, 4.  $\frac{1}{2}$ . t. Sicilien.

*aspera* L., rauhe,  $\frac{1}{2}$ . w. Aegypten, Ostindien, Cap, Ja-  
 maica, Sardinien.

*australis* RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

*brachiata* L., armförmige,  $\odot$ . m. Ostindien.

*crispa* Poir, krause,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.

*fruticosa* Lam., strauchige,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*porrigens* Jacq., sperrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Peru.

*pubescens* Roth, feinhaarige,  $\frac{1}{2}$ . w. ?

*alopecuroides* Lam. v. *Aerva javanica*. *alternifolia*  
 L. v. *Cladostachys alternifolia* Swt. *altissima* L.  
 v. *Chamissoa altissima* Humb. et Bonpl. *amaran-*  
*thoides* Lam. v. *Gomphrena amaranthoides* Roth.  
*axillaris* W. v. *Alternanthera spinosa*. *bengalensis*



**Achyranthes**

Lam. v. *Paronychia* bengal. *corymbosa* W. v. *Polycarpaea corymbosa*. *echinata* Retz v. *Desmochaeta flavescens*. *ficoidea* Lam. v. *Alternanthera ficoidea*. *halimifolia* Lam. v. *Alternanthera frutescens*. *lappacea* L. v. *Desmochaeta atropurpurea*. *mucronata* Lam. vid. *Alternanthera Achyrantha*. *nivea* Ait. vid. *Polycarpaea memphit*. *patula* L. vid. *Desmochaeta flavescens*. *polygonoides* Lam. v. *Alternanthera polygon*. *prostrata* v. *Desmochaeta prostrata*. *radicans* Cav. v. *Alternanthera Achyrantha*. *repens* L. v. *Alternanthera Achyrantha*. *spinosa* Hornem. v. *Alternanthera spinosa*.

**Achyronia** Wendl., Spreuling, XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.

*villosa* Wendl., zottiger, ♀. t. Neuholland.

*arborea* Spgl. v. *Carmichaelia australis*.

**Achyropappus** Kunth, Spreukelch, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

*anthemoides*, chamillenähnlicher, ☉. f. Neuspanien.

**Achyrophorus maculatus** Scop., *minimus* Hornem. et *radicatus* Scop. v. Hypochoeris.**Acianthus** R.B., Spitzblume, XX. i., Orchideae.

*caudatus* R.B., geschwänzte, ♀. t. Neuholland.

*exsertus* R.B., hervorstehende, ♀. t. Neuholland.

*fornicatus* R.B., gewölbte, ♀. t. Neuholland.

**Acicarpa** Juss., Spitzkelch, XIX. iv., Compositae-Calycereae.

*spatulata* RB., spatelblättriger, ♀. w. Brasilien.

*tribuloides* Juss., stachelfrüchtiger, ♂. w. Südamerika.

**Acidoton** Sw., Spitzhaar, XXI. ix., Euphorbiaceae.

*urens* Sw., brennendes, ♀. w. Jamaica.

**Acilepis** Don., Spitzschuppe, XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

*squarrosa* Don., sparrige, ♀. t. China, Nepal.

**Aciotis** D. Don., Spitzblatt, X. i., Lythriariae-Melastomeae.

*aquatica* D. Don., Wasser-Sp., ♀. w. Südamerika.

*discolor* D. Don., verschiedenfarbiges, ♀. w. Trinidad.

**Acis** Salisb., Acis VI. i., Narcisseae-Amaryllideae.

*grandiflorus* Swt., großblumige, ♀. Zw. k. f. Numidien.

*roseus* Swt., rosenfarbene, ♀. Zw. k. f. Corsica.

*trichophyllus* Swt., haarblättrige, ♀. Zw. k. f. Portugal, Spanien, Sardinien, Corsica.

**Acisanthera** Juss., Spitzbeutel, X. i., Lythriariae-Melastomeae.

*quadrata* P., vierkantige, ♀. w. Jamaica.

**Acmadenia** Bartl. et Wendl., Spitzdrüse, V. i., Rutaceae-Diosmeae.

*juniperina* B. et W., wachholderblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

*laevigata* B. et W., glatte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

*obtusata* B. et W., stumpfblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

*tetragona* B. et W., vierseitige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

**Acmella** Rich., Spitzling, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

*biflora* Spgl., zweiblumiger, ☉. m. Ostindien.

*brasiliensis* Spgl., brasilianischer, ☉. m. Brasilien.

*globosa* Spgl., kugelblüthiger, ☉. f. Mexico.

**Acme**

*mauritiana* Pers., St. Moriz, ☉. m. Mascarenische Inseln.

*repens* Pers., kriechender, ☉. f. Carolina.

*buphthalmoides* P. v. *Heliopsis buphthalmoides*. *in-*

*termedia* Rich. v. *Heliopsis dubia*. *lanceolata* Lk.

v. *Spilanthes Pseudacmella*. *occidentalis* P. v. *He-*

*liopsis dubia*. *trilobata* Spgl. v. *Zaluzania triloba*.

**Acmena** DC., *Acmena*, XII. 1., Myrtaceae.

*floribunda* DC., blüthenreiche, ☿. t. Neuholland.

**Acnida** L., virginianischer Hanf, XXII. v., Aizoideae-Oleraceae (Chenopodeae).

*cannabina* L., gemeiner, ☉. f. Wa. Virginien.

**Aconitum** T., Sturmhut (Eisenhut), XIII. III., Ranunculaceae.

*acuminatum* Rchb., zugespitzter, 4. f. Südl. Schweiz.

*acutum* Rchb., spitziger, 4. f. Tyroler, steyermärker und ungarische Alpen.

*angustifolium* Bernh., schmalblättriger, 4. f. Wocheiner Alpen.

*Anthora* L., feinblättriger, 4. f. Oestliche, mittlere u. südeuropäische Alpen, Sibirien.

β) *tenuifolium*.

*autumnale* Clus., Herbst-St., 4. f. Belgien.

*barbatum* Patr., härtiger. 4. f. Oestl. Sibirien.

*Bernhardianum* Rchb., Bernhards, 4. f. Oestereich u. steyermärkische Alpen.

β) *albidum*.

*biflorum* Fisch., zweiblumiger, 4. f. Sibirien.

*camtschaticum* Rchb., camtschatischer, 4. f. Oestl. Sibirien, Camtschatca.

*cernuum* Wulf., übergebogener, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*Chamissoi* Rchb., Chamisso's, 4. f. Aleutische Inseln.

*delphinifolium* DC., ritterspornblättriger, 4. f. Nördliche Polargegenden Asiens und Amerikas.

*dissectum* Rchb., schlitzblättriger, 4. f. Rußland.

*eminens* Koch, stattlicher, 4. f. Eiffel (Rheingegend).

*exaltatum* Bernh., sehr hoher, 4. f. Riesengebirge.

*excelsum* Rchb., hoher, 4. f. Rußland.

*formosum* Rchb., schöner, 4. f. Salzburg.

*Funkianum* Rchb., Funk's 4. f. Salzburg.

β) *pubescens* Mch.

*Gmelini*, Rchb., Gmelin's, 4. f. Oestl. Sibirien.

*hians* Rchb., klaffender, 4. f. Riesengebirge.

*Hoppeanum* Rchb., Hoppe's, 4. f. Tyroler u. kärnthner Alpen.

*Koelleianum* Rchb., Kölle's, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen.

*laetum* Rchb., schöngrüner, 4. f. Sudeten.

*Lamarckii* Rchb., Lamarck's, 4. f. Pyrenäen.

*lasiospermum* Rchb., wolligblumiger, 4. f. Mittelrußland, Podolien.

*laxum* Rchb., lockerer, 4. f. Steyermark. Alpen.

*leptanthum* Rchb., schlankhelmiger, 4. f. Davurien.

*Lubarscii* Rchb., Lubarsci's, 4. f. Camtschatca.

*Lycotomonum* L. flor. suec., Wolf's, 4. f. Norwegen, Rußland, Lappland.

*macrophyllum* H. Angl., großblättriger, 4. f. ?

*maximum* Pall., größter, 4. f. Camtschatca.

*molle* Rchb., weichhaariger, 4. f. Schweiz.

**Aconitum**

*multifidum* Koch, vieltheiliger, 4. f. Sudeten, Mähren, südliche Schweiz.

β) *calibotryon*.

*Myoctonum* Rchb., Mäuse-St., 4. f. Mitteldeutschland.

*Napellus* Dod., wahrer, 4. f. Steyermärker, Tyroler, Schweizer Alpen.

β) *album*.

γ) *rubellum*.

*Neubergense* Clus., Neubergischer, 4. f. Alpen von Steyermark, Krain, Kärnthen, Baiern, am Harz, in Hessen, bis Schweden.

*Nuttallii* Swt., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

*orientale* Mill., morgenländisch, 4. f. Pers., Caucasus.

*Pallasii* Rchb., Pallas's, 4. f. Caucasus, Sibirien.

*pallidum* Rchb., bleicher, 4. f. Mittelrussland.

*palmatifidum* Rchb., handspaltiger, 4. f. Carpathen, Sudeten.

*paniculatum* Lam., rispiger, 4. f. Schweiz, südliches Frankreich.

*productum* Rchb., verlängerter, 4. f. Sibirien, Camtschatka.

*pyramidale* Mill., pyramidal, 4. f. Mittel- bis Norddeutschland.

*pyrenaicum* L., pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen, Sibirien, Oberitalien.

*semigaleatum* Pall., niedrighelmiger, 4. f. Camtschatka, West- und Nordamerika, Polargegend,

*Sieboldii* Hort., Siebold's, 4. k. Japan. China (sinense Hort.).

*Störkianum* Rchb., Störk's, officineller, 4. f. Mitteleuropa, Bergwälder und Alpen.

β) *bicolor*, zweifarbiger.

*strictum*, Bernh., steifer, 4. f. Wocheiner Alpen, Sudeten.

*tauricum* Wulf., tauer'scher, 4. f. Salzburger Tauern.

*Thelyphonum* Rchb., hoher Wolfs-St., 4. f. Vom Harz bis Oberitalien in Gebirgswäldern.

β) *altissimum* Mill.

*tortuosum* W., gewundener, 4. f. Sibirien.

*Toxicum* Rchb., siebenbürgischer, 4. f. Siebenbürgen.

*uncinatum*, hakenförmiger, 4. f. Nordamerika, Japan.

*variegatum* L., bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Thäler.

b) *leucanthum*.

c) *rhynchanthum* Rchb.

β) *rostratum* Bernh.

b) *album* Ait.

γ) *Cammarum* Jacq. (*altigaleatum* Hayne).

a) *gracile* Rchb. (*nasutum* Fisch. *Bernhardianum* Wallr.).

b) *Judenbergense* Clus.

c) *macranthum* Rchb.

*villosum* Rchb., zottiger, 4. f. Sibirien.

*volubile* Pall., windender, 4. k. Sibirien, Imaus.

*Vulparia* Rchb., Fuchs-St., 4. f. Oestl. Europa bis Salzburg und Tyrol auf Kalkgebirgen.

a) *Phthora* Rchb.

b) *rubicundum* Fisch.

β) *Cynoctonum* Rchb.



## Aconitum

b) lilacinum (triste Fisch.).

c) purpureum (moldavicum, septentrionale).

γ) Tragoctonum Rchb.

δ) Galoctonum Rchb.

*albidum* Bernh. vid. *Bernhardianum* var. β. *album* Ait. vid. variegatum β. *altigaleatum* Hayne v. variegatum γ. *altissimum* Mill. v. *Thelyphonum* β. *amoenum* Rchb. v. multifidum. *angustifolium* W. E. spl. v. *Funkianum*. *anthoroideum* Rchb. v. *Anthora*. *australe* Rchb. v. *Thelyphonum* flor. purp. *Bernhardianum* Wallr. vid. variegatum γ. *Braunii* Rchb. v. *neubergense*. *bulbiferum* Rchb. v. variegatum var. *callibotryon* Rchb. vid. multifidum β. *Cammarum* Jacq. et M.B. v. variegatum γ. *Cammarum* L. Fries v. *Stoerkianum*. *Candollei* Rchb. v. *Anthora*. *canescens* Schlchr. v. multifidum. var. *ciliare* DC. v. *villosum* Rchb. *Clusianum* Rchb. v. *hians*. *commutatum* Rchb. v. *tauricum*. *Cynoctonum* Rchb. v. *Vulparia* β. *decorum* Rchb. v. *exaltatum*. *delphinifolium* et *sibiricum* DC. v. *productum*. *elatum* Salisb. vid. *pyramidale*. *eulophum* Rchb. v. *Anthora*. *eustachyum* Rchb. v. *Napellus*. *Fischeri* Rchb. v. variegat. γ. *firmum* Rchb. vid. *acutum*. *flaccidum* Rchb. vid. *villosum*. *flexicaule* Hoppe v. *cernuum*. *Galoctonum* Rchb. v. *Vulparia* var. *grandiflorum* Pall. vid. *productum*. *hamatum* Rchb. v. *exaltatum*. var. β. *hebegynum* DC. v. *paniculatum*. *humile* de l'Arbré v. *cernuum*. *intermedium* DC. v. *Störkianum*. *intermedium* Hoppe v. *Myoctonum*. *intermedium* Host. vid. *Thelyphonum*. *inunctum* Koch v. *strictum*. *Jacquini* Rchb. v. *Anthora*. *Jacquinianum* Host v. *Vulparia*. *japonicum* Thbg. v. *uncinatum*. *Judenburgense* Clus. v. variegat. γ. *Kochleri* Rchb. v. *laetum*. *laxiflorum* Schlchr. v. multifidum. *Luparia* Rchb. v. *Thelyphonum*. *Lycoctonum* Jacq. v. *Vulparia*. *macranthum* Rchb. vid. variegat. γ. *medium* Schrad. vid. *Stoerkianum*. *microphyllum* Gaud. vid. multifidum. *Mielichhoferi* Rchb. vid. *Hoppeanum*. *moldavicum* Bess. v. *Vulparia* β. fl. purp. *Napellus* L. suec. v. *neubergense*. *Napellus* Mill. vid. *Stoerkianum*. *Napellus* Wulf. Koell. vid. *Koelleanum*. *nasutum* Fisch. v. variegatum γ. *nemorosum* MB. vid. *Anthora*. *neomontanum* Baumg. v. *Toxicum*. *neomontanum* Willd. v. *Stoerkianum*. *neomontanum* Wulf. v. *Neubergense*. *nitidum* Fisch. v. *Gmelini*. *nutans* Hortul. vid. *pyramidale*. *ochotense* Rchb. vid. *camtschaticum*. *ochroleucum* W. v. *orientale*. *oligocarpum* Rchb. vid. *angustifolium*. *pallidum* Nutt. v. *Nuttalii*. *pauciflorum* Host. vid. *Thelyphonum*. *Phthora* Rchb. v. *Vulparia* α. *plicatum* Koehl. v. *laetum*. *pubescens* Mönch v. *Funkianum* β. *rectum* Bernh. v. *Thelyphonum* β. *rhynchanthum* Rchb. v. variegatum L. *rostratum* Bernh. v. variegatum β. *rubicundum* Fisch. v. A. *Vulparia* α. *septentrionale* Baumg. vid. *Vulparia* β. *septentrionale* Koell. vid. *Lycoctonum*. *Schleicheri* Rchb. v. *Napellus*. *squarrosus* DC. v. *pyrenaicum*. *tauricum* W. v. *pyramidale*. *Theriophonum* Rchb. v. *Thelyphonum*. *Tra-*

**Aconitum**

*goctonum* Rehb. v. *Vulparia* γ. *triste* Fisch. v. *Vulparia* β. florib. pallide lilacinis. *variegatum* Hort. v. *Stoerkianum* bicolor *venustum* Rehb. vid. multifidum.

**Acorus** Tourn, Calmus, VI. 1., Aroideae-Orontiaceae.

*Calamus* L., gemeiner, 4. f. Wa. Europa, Asien.

*gramineus* Ait., grasartiger, 4. k. China.

**Acratherum** Lk., III. 11., Gramineae.

*miliaceum* Lk., hirsegrasähnliches, 4. w. Nepal.

**Acrocephalus** Benth., Kopfbasilicum, XIV. 1., Labiatae.

*capitatus* Benth., chinesischer, ♂. f. China.

**Acrocomia** Mart., Schopfpalme, XXI. VI., Palmae.

*aculeata* Lod., stachelige, 5. w. Westindien.

*fusiformis* Swt., spindelförmige, 5. w. Trinidad.

*globosa* Lod., kugelfrüchtige, 5. w. St. Vincent.

*guianensis* Lod., guianische, 5. w. Demerara.

*horrida* Lod., starkstachelige, 5. w. Trinidad.

*minor* Lod., kleine, 5. w. Trinidad.

*sclerocarpa* Mart., knorpelfrüchtige, 5. w. Südamerika.

*tenuifolia* Lod., feinblättrige, 5. w. Brasilien.

**Acroglochin** Schrad., Spitzamaranth, XXI. v. (V. 11.), Aizoideae-Amaranthaceae.

*chenopodioides* Schrad., gänsefußähnlicher, ♂. f. Nepal.

**Acrostichum** L., Vollfarn, XXIV. 1., Pteridoideae.

*alcicorne* Sw., elendshornwedeliger, 4. w. Tropisches Afrika, Java, Neuholland.

*aureum* L., goldfarbiger, 4. w. Südamerika, tropisches Afrika.

*bifurcatum* Sw., zweigabeliges, 4. w. St. Helena.

*crinitum* Sw., langhaariger, 4. w. Martinique.

*fimbriatum* H. Liverp. an Cav.? gefranzter, 4. w. Brasil.

*glandulosum* Hook., drüsiger, 4. w. Jamaica.

*longifolium* Jacq., langblättriger, 4. w. Westindien.

*simplex* Sw., einfacher, 4. w. Jamaica.

*viviparum* Hamilt., lebiggebärender, 4. w. Ostind.

*albidulum* W. vid. *Nothochlaena nivea*. *alpinum*

Bolt. vid. *Woodsia hyperborea*. *appendiculatum*

Hook v. *viviparum*. *bifurcatum* Cavan. v. *alcicorne*.

*bonariense* W. vid. *Nothochlaena rufa*. *Calo-*

*melanos* L. v. *Gymnogramma Calomelanos*. *cana-*

*riense* W. vid. *Nothochlaena Marantae*. *cervinum*

Sw. vid. *Polybotrya cervina*. *chrysophyllum* Sw. v.

*Gymnogramme chrysophylla*. *cordatum* L. v. *Gym-*

*nogramme cordata*. *dichotomum* Cav. v. *Schizaea*

*bifida*. *dichotomum* L. v. *Schizaea dichotoma*. *he-*

*terophyllum* L. v. *Nothochlaena piloselloides*. *hy-*

*perboreum* Liljebl. v. *Woodsia hyperborea*. *ilvense*

L. v. *Woodsia ilvensis*. *lanuginosum* Desf. v. *No-*

*thochlaena lanuginosa*. *Lingua* Thbg. v. *Niphobol-*

*us Lingua*. *Marantae* L. v. *Nothochlaena Maran-*

*tae*. *rufum* L. v. *Gymnogramme rufa*. *septentrio-*

*nale* L. vid. *Asplenium septentrionale*. *Stemaria*

P.B. v. *alcicorne*. *sulfureum* Sw. v. *Gymnogram-*

*me sulfurea*. *tartareum* Sw. v. *Gymnogramme tar-*

*tarea*. *thalictroides* L. v. *Ceratopteris thalictroides*.

*Thelypteris* L. v. *Aspidium Thelypteris*. *trifoliatum*

L. vid. *Gymnogramme trifoliata*. *velleum* Ait. vid.

*Nothochlaena lanuginosa*.

**Acrotriche** RB., (Spitzhaar), Acrotriche, V. I., Ericaceae-Epacrideae.

*cordata* RB., herzblättrige, ⚥ t. Neuholland.

*divaricata* RB., ausgespernte, ⚥ t. Neuholland.

*ovalifolia* RB., eiblättrige, ⚥ t. Neuholland.

*patula* RB., ausgebreitete, ⚥ t. Neuholland.

*ramiflora* RB., astblühende, ⚥ t. Neuholland.

*serrulata* RB., sägezähnige, ⚥ t. Neuholland.

**Actaea** L., Christophskraut, XIII. I., Ranunculaceae.

*alba* Mill., weißbeeriges, 4. f. Nordamerika.

*rubra* W., rothbeeriges, 4. f. Nordamerika.

*spicata* L., ähriges (schwarzbeeriges), 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.

*americana* Pursh v. *rubra*. *brachypetala* a DC. v.

*alba*. *brachypetala* β. DC. vid. *rubra*. *podocarpa*

DC. v. *Cimicifuga americana*. *racemosa* L. v. *Ci-*

*micifuga* *Serpentaria*.

**Actinella** *lanata* Pursh v. *Eriophyllum caespitosum*.

**Actinocarpus** RB., Strahlenfrucht, VI. IV., Alismaceae.

*Damasonium* RB., sternförmige, 4. f. Wa. England, Frankreich.

*minor* RB., kleinere, 4. t. Wa. Neusüdwallis.

**Actinochloa** *procumbens* R. et S., *prostrata* R. et S. etc., v. *Chondrosium tenue*, *prostratum* etc.

**Actinomeris** Nutt., Actinomeris, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

*alata* Swt., flügel förmiges, 4. f. Nordamerika.

*helianthoides* Nutt., sonnenrosenähnliches, 4. f. Nordamerika.

*oppositifolia* Fres., gegenblättriges, 4. f. Nordamerika.

*procera* Nutt., hohes, 4. f. Nordamerika.

*squarrosa* Nutt., sparriges, 4. f. Nordamerika.

**Actinophyllum** *conicum* R. et P. et *digitatum* Wall. vid. *Sciodaphyllum conicum* et *digitatum*.

**Actinotus** *Helianthi* La Bill. vid. *Eriocalia major*.

**Acynos** *alpinus* Mch., *canus* Rehb., *graveolens* Lk., *grandiflorus* G. Don, *herba barona* G. Don, *heterophyllus* G. Don (*Thym. acinoides* Tenor.), *patavinus* P. *purpurascens* P., *rotundifolius* P., *suaveolens* G. Don. *villosus* P., *vulgaris* P. (*thymoides* Mönch), vid. *Calamintha*.

**Adambea** *glabra* Lam. v. *Lagerstroemia Reginae*. *Adambea hirsuta* Lam. v. *Lagerstroemia hirsuta*.

**Adamia** Wall. (J. Adam M. D. zu Calcutta), X. v., Saxifrageae-Cunonieae.

*cyanea* Wall., kornblumenblaue, ⚥ t. Nepal.

**Adamsia** *scilloides* W. v. *Puschkinia scilloides*. *Adamsia* Fisch. v. *Sieversia*.

**Adanson** L. (Mich. Adanson, franz. Botaniker), Affenbrothbaum. XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

*digitata* L., fingerförmiger, ⚥ w. Guinea.

**Adelia** L., Kleinblüthler, XXII. XIII. (XVI. VIII.), Trioccae-Euphorbiaceae.

*Acidoton* L., spitzästiger, ⚥ w. Jamaica, Hispaniola.

*Bernardia* L., Bernard v. Jussieu's, ⚥ w. Jamaica.

*myrtifolia* Vent., myrtenblättriger, ⚥ w. ?

*ovata* Dsf., eiförmiger, ⚥ w. ?

*Ricinella* L., ricinusähnlicher, ⚥ w. Jamaica, Hispan.



**Adenandra W.**, Drüsenmännlein, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*acuminata* Lodd., zugespitztes, ♀. f. Cap. d. g. Hoffn.  
*amoena* Bartl. et Wendl., liebliches, ♀. t. Cap. d. g. H.  
*biseriata* G. F. W. Meyer, zweireihigpunktirtes, ♀. t. C.  
 d. gut. Hoffn.

*coriacea* Lichtenst., lederblättriges, ♀. t. C. d. gut. H.  
*cuspidata* G. F. W. Meyer, langspitziges, ♀. t. Cap. d.  
 gut. Hoffn.

*fragrans* R. et S., wohlriechendes, ♀. t. Cap. d. g. Hoffn.  
*linearis* Hil., gleichbreitblättriges, ♀. t. C. d. g. Hoffn.  
*marginata* R. et S., randblättriges, ♀. t. C. d. g. Hoffn.

*umbellata* W., doldiges, ♀. t. Cap. d. gut. Hoffn.

α) *speciosa*. β) *glandulosa*.

*villosa* Lichtenst., zottiges, ♀. t. Cap. d. gut. Hoffn.

*alba* R. et S. vid. *Coleonema album*. *amoena* Lk.

v. *fragrans*. *cordata* Lk. v. *Barosma serratifolia* β.

*crenata* W. v. *umbellata* β. *glandulosa*. *ovata* Lk.

v. *amoena*. *serratifolia* Lk. v. *Barosma serratifolia*.

*speciosa* Lk. v. *umbellata* α.

**Adenanthera L.**, Drüsenstaubbeutel, X. 1., Leguminosae - Mimosaceae.

*falcata* L., sichelförmiger, ♀. w. Ostindien.

*pavonina* L., Pfauen-D. ♀. w. Ostindien.

**Adenanthos** La Bill., Drüsenblume, IV. 1., Proteaceae.

*cuneata* La Bill., keilförmige, ♀. t. Neuholland.

*obovata* La Bill., verkehrteiförmige, ♀. t. Neuholland.

*sericea* La Bill., seidenhaarige, ♀. t. Neuholland.

*terminalis* RB., endständige, ♀. t. Neuholland.

*Adenocalyx racemosus* Bert. v. *Coulteria mollis*.

**Adenocarpus DC.**, Drüsenfrucht, XVII. 1v. (vi.) (Xvi. vi.).

*foliolosus* DC., dichtblättrige, ♀. k. Canar. Inseln.

*frankenoides* Choi., frankenienblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

*hispanicus* DC., spanische, ♀. k. Spanien, Portugal.

*intermedius* DC., mittlere, ♀. k. Portugal.

*parvifolius* DC., kleinblättrige, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.

*telonensis* DC., toulonische, ♀. k. Südfrankr., Italien.

*anagyris* Spgl. v. *frankenoides*. *volgensis* Spgl. v. *Calophaca wolgarica*.

**Adenogramma** Rchb., Drüsenfruchtknoten, V. v., Portulacaceae - Paronychieae.

*Mollugo* Rchb., wirtelblättriger, ☉. f. Cap. d. g. Hoffn.

**Adenophora** Fisch., Drüsenträger, V. 1., Campanulaceae.

*coronopifolia* Fisch., krähensfußblättriger, 4. f. Dahuria, Altai.

β) *angustifolia*. γ) *latifolia*.

*Gmelini* Fisch., Gmelin's, 4. f. Dahuria.

*Lamarckii* Fisch., Lamarck's, 4. f. Altai.

β) *angustifolia*.

*latifolia* Fisch., breitblättriger, 4. f. Dahuria.

*lilifolia* Ledeb., lilienblättriger, 4. f. Sibirien, Ost-Europa.

β) *infundibuliformis* A. DC. (*suaveolens* Schrad.).

γ) *spretia* A. DC.

*marsupiflora* Fisch., beutelblumiger, 4. f. Dahuria, Sibirien.

**Adenophora**

*periplocifolia* Fisch., A. DC., periplocablätteriger, 4. f. Sibirien.

*reticulata* Fisch., netzförmiger, 4. f. Sibirien.

*sinensis* A. DC., chinesischer, 4. k. China.

*tricuspidata* Fisch., dreispitziger, 4. f. Dahuria.

*verticillata* Fisch., wirtelblätteriger, 4. f. Sibirien.

*communis* Fisch. v. *lilifolia*. *coronata* A. DC. vid.

*marsupiiiflora*. *denticulata* Ledeb. v. *tricuspidata*.

*Fischeri* G. Don v. *lilifolia*. *intermedia* Swt. vid.

*latifolia*. *pereskiaefolia* Fisch. vid. *lilifolia*. *pom-*

*poniifolia* Fisch. v. Gmelini. *Rabelaisiana* G. Don

v. Gmelini. *suaveolens* Schrad. v. *lilifolia* β.

*Adenophyllum* *coccineum* P. v. *Schlechtendalia glandulosa*.

**Adenostemma** Forst., Drüsengranne, XIX. I., Compositae-Eupatorieae.

*decumbens* Don, niederliegende, ☉. w. Jamaica, Hispaniola.

*viscosa* Forst., schmierige, ☉. w. Ostind., Societ. Inseln.

**Adenotrichia** Lindl., Drüsenhaar, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*amplexicaulis* Lindl., stengelumfassendes, ♂. 4. k. f., Chili.

**Adesmia** DC., Freifaden, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*glutinosa* Gill. et Hook, klebriger, ♂. k. Chili.

*microphylla* Hook, kleinblätteriger, ♂. k. t. Valparaiso.

*muricata* DC., weichstacheliger, ♂. 4. k. Patagonien.

*papposa* DC., fruchtkroniger, 4. k. Chili.

*pendula* DC., herabhängender, ☉. f. Buenos Ayres.

**Adiantum** L., Frauenhaar, XXIV. I., Pterioideae (Polypodiaceae).

*assimile* Sw., ähnliches, 4. t. w. Neuholland.

*Capillus veneris* L., gemeines, 4. f. k. t. Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Westindien, Mascarenas.

*cuneatum* Langsd. et Fisch., keilförmiges, 4. w. Brasil.

*deltoides* Sw., deltablätteriges, 4. w. Jamaica.

*formosum* RB., schönes, 4. t. w. Neuholland.

*hispidulum* Sw., RB., steifhaariges, 4. t. w. Neuholl.

*lunulatum* N. L. Burm., (lunatum Cav.), mondförmiges, 4. t. w. Ostindien, Philippinen, Mexico.

*macrophyllum* Sw., großblätteriges, 4. w. Westindien, Südamerika.

*pedatum* L., fußförmiges, 4. f. Nordamerika.

*pubescens* Schrk., weichhaariges, 4. t. w. Neuholland.

*pulverulentum* L., bestäubtes, 4. w. Westindien.

*radiatum* L., strahliges, 4. t. w. Westindien.

*reniforme* L., nierenförmiges, 4. t. Canarische, Mascarenasinseln.

*rhomboideum* Kunth, rautenförmiges, 4. w. Südamer.

*serrulatum* L., sägezahniges, 4. w. Jamaica.

*tenerum* Sw., zartes, 4. w. Jamaica, Chili.

*ternatum* Humb., dreizähliges, 4. w. Südamerika.

*trapeziforme* L., trapezenförmiges, 4. w. Westindien.

*varium* Humb., ungleichblätteriges, 4. w. Südamerika.

*villosum* L., zottiges, 4. w. Westindien, Brasilien.

**Adina** Salisb., Kopfblüthler, IV. I., Rubiaceae.

*globifera* Salisb., kugelblumiger, ♂. t. w. China.

**Adlumia** Rafin. (*Adlum*, amerikanischer Weinbauer), XVII. II. (IV.).

**Adlumia**

*cirrhus* Rafin., wickelrankige, ♂. Sch. f. Nordamerika.

**Adonis** Rupp. Dill., Adonisröschen, XIII. vi., Ranunculaceae genuinae.

*aestivalis* L., Sommer-A., ☉. f. Mitteleuropa, Nordasien, Afrika.

β) *pallida*.

*apennina* L., Apenninen-A., 4. f. Apenninen.

*autumnalis* L., Herbst-A., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *micrantha* DC.

*davurica* Rchb., dahurisches, 4. f. Sibirien.

*flammea* Jacq., feuerfarbiges, ☉. f. Mitteleuropa.

β) *pallida*.

*microcarpa* DC., kleinfrüchtiges, ☉. f. Spanien.

*pyrenaica* DC., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

*sibirica* Patrin., sibirisches, 4. f. Sibirien.

*vernalis* L., Frühlings-A., 4. f. Europa, Sibirien.

*villosa* Ledeb., zottiges, 4. f. Tatarei.

*volgensis* Steven, russisches, 4. f. Rußland.

*aethiopica* Thbg. v. *Knowltonia daucifolia*. *ambigua* Gaud. v. *aestivalis*. *anomala* Wallr. v. *flammea*.

*capensis* L. v. *Knowltonia rigida*. *capensis* Lam. v. *Knowltonia vesicatoria*. *capensis* Thbg. v.

*Knowltonia gracilis*. *citrina* Hoffm. v. *aestivalis* β.

*daucifolia* Lam. v. *Knowltonia daucifolia*. *filia* L.

suppl. v. *Knowltonia daucifol.* *flava* Vill. DC. vid.

*aestivalis* β. *gracilis* Poir. v. *Knowltonia gracilis*.

*hirsuta* Poir. v. *Knowltonia hirsuta*. *laserpitiifolia*

Poir. v. *Knowltonia vesicatoria*. *maculata* Wallr.

v. *aestivalis*. *miniata* Jcq. v. *aestivalis*. *parviflora*

Fisch. v. *autumnalis* β. *vernalis* β. *Menzelii* DC.

v. *apennina*.

**Adoxa** L., Bisamkraut, VIII. iv., Viniferae-Araliaceae. (Saxifrageae).

*Moschatellina* L., gemeines, 4. f. Europa, Caucasus.

*Adysetum calycinum* Scop. etc. v. *Alyssum calycinum* etc.

*Adysetum edentulum* Lk. etc. v. *Koniga*.

**Aegilops** L., Hartgras, III. ii. (XXIII. i.), Gramineae.

*caudata* L., geschwänztes, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

*ovata* L., eiförmiges, ☉. f. Südeuropa.

*squarrosa* L., sparriges, ☉. ♂. f. Kleinasien.

*triaristata* W., dreigranniges, ☉. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *triticoides*.

*cylindrica* Host v. *caudata*. *echinata* Presl. v. *truncialis*.

*incurvata* L. v. *Lepturus incurvatus*.

*Aeginetia capitata* Grah. vid. *Lipostoma campanuliflora* D.

Don. *Aeginetia longiflora* Cavan. v. *Bouvardia longiflora*.

**Aegiphila** L., Geißstrauch, IV. i., Labiatae-Verbenaceae.

*arborescens* W., baumartiger, ♀. w. Guiana, Trinidad.

*diffusa* Andr., weitschweifiger, ♀. w. Westindien.

*elata* Sw., erhabener, ♀. w. Jamaica.

*foetida* Sw., stinkender, ♀. w., Jamaica.

*martinicensis* L., martiniquischer, ♀. w. Martinique.

*obovata* Andr., verkehrt-eiförmigblättriger, ♀. w. Westindien.

*trifida* Sw., dreiblütthiger, ♀. w. Jamaica.

**Aegle** Coreia, Orangenbeere, XIII. i., Hesperideae-Aurantaceae.



**Aegle**

Marmelos Corr., unbewehrte, ♀. w. Ostindien.  
 sepriaria DC., dornige, ♀. t. w. Japan.

**Aegopodium** L., Giersch., V. II., Umbelliferae.

Podagraria L., Zipperlein-G., 4. f. Europa, Sibirien.  
 β) variegata Dens.

**Aegopogon** Humb., Geißbart, III. II., Gramineae.

pusillus P. B., kleiner, ☉. f. Neugranada.  
 trisetus R. et S., dreiganniger, ☉. f. Mexico.

**Aeollanthus** Mart., Irrblume, XIV. II., Labiatae-Verbenaceae.

suaveolens Mart., wohlriechende, ☉. m. f. Brasilien.

**Aëranthus** Lindl., Luftblume, XX. I., Orchideae.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Madagascar.  
 sesquipedalis Lindl., höhere, 4. w. Madagascar.

**Aërides** Sw., Luftstendel, XX. I., Orchideae.

archnites Sw., spinnenblumiger, 4. w. Japan.  
 cornutum Roxb., gehörnter, 4. w. Ostindien.  
 odoratum Lour., wohlriechender, 4. w. China, Cochinchina.

**Aërobium maculatum** Spgl. v. Angraecum maculatum.**Aërva**-Forsk., (arabischer Name), V. I., Aizoideae-Amaranthaeae.

javanica Jufs., javanische, ♀. w. Ostindien, Aegypten.  
 lanata Jufs., wollige, ☉. ♂. w. Ostindien.

**Aeschynomene** L., Schampflanze, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

americana L., amerikanische, ☉. w. Jamaica.  
 arborea L., baumartige, ♀. w. Ostindien.  
 aspera L., rauhe, ☉. w. Ostindien.  
 crepitans Jcq., knarrende, ♀. w. Caracas.  
 hispida W., steifhaarige, ☉. f. Nordamerika.  
 indica L., indische, ☉. ♂. w. Ostindien.  
 patula Poir., ausgebreitete, ♀. w. Mascarenas.  
 pendula Boj., herabhängende, ♀. w. Mascarenas.  
 pumila L., niedrige, ☉. w. Ostindien.  
 Roxburghii Spgl., Roxburgh's, ☉. w. Ostindien.  
 sensitiva Sw., empfindliche, ♀. w. Westindien, Brasilien, Guinea.

viscidula Mchx., schmierige, ☉. m. f. Florida.

aristata Jcq. v. Pictetia aristata. bispinosa Jcq. v. Sesbania aculeata. cannabina Retz. vid. Sesbania cannabina. coccinea L. suppl. vid. Agati coccinea. grandiflora L. v. Agati grandifl. longifolia Cav. v. Daubentonia longifol. miniata Orteg. vid. Daubentonia punicea. papposa Lag. vid. Adesmia papposa. picta Cav. v. Sesbania picta. platycarpa Mchx. v. Glottidium floridanum. prostrata Poir. v. viscidula. Sesban v. Sesbania aegyptiaca. subviscosa Roxb. v. Roxburghii. triflora Poir. v. Desmodium triflorum. viscidula W. v. Roxburghii.

**Aesculus** L., Rosskastanie, VII. I., Sapindaceae-Hippocastaneae.

glabra W., glatte, ♀. f. Nordamerika.

Hippocastanum L., gemeine, ♀. f. Tibet.

α) flore pleno. β) foliis variegatis. γ) incisum.

δ) nigrum. ε) praecox. ζ) tortuosum.

Lyoni Hort., Lyons, ♀. f. Nordamerika.

ohioënsis Mchx., Ohio, ♀. f. Nordamerika.

**Aesculus**

*pallida* W., bleiche, ♀. f. Nordamerika.

*rubicunda* Lois. DC., hochrothe, ♀. f. Nordamerika.

*carnea* Wats. et *coccinea* Hortul. et *rosea* Hortul. et *Whitleys fine scarlet* vid. *rubicunda*. *discolor* Pursh. vid. *Pavia hybrida*. *flava* Ait. (*lutea* Wangerh.). *macrostachya* Mchx. (*parviflora* Walt.). *neglecta* Lindl. v. *Pavia flava*, *macrostachya* etc. *Aescul.* *Pavia* L. v. *Pavia rubra*.

*Aetheilema imbricatum* RB. *longifolium* Spgl. *parviflorum* Spgl. v. *Phaylopsis imbricata* etc.

**Aethionema** RB., Steintäschel, XV. II., Cruciferae.

*Buxbaumii* DC., Buxbaum's, ☉. f. Kleinasien, Caucasus.

*coridifolium* DC., corisblättriges, ♂. f. k. Libanus.

*cristatum* DC., kammiges, ☉. f. Syrien, Persien.

*membranaceum* DC., häutiges, ♂. f. k. Persien.

*monospermum* RB., einsamiges, ☉. ♂. f. Spanien.

*parviflorum* Swt., kleinblumiges, ☉. f. k. Persien.

*polygaloides* DC., kreuzblumenähnliches, ♂. f. k. Insel Chios.

*saxatile* DC., gemeines, ☉. ♂. f. Mittel- u. Südeuropa.  
β) *gracile* DC.

*stylosum* DC., langgriffeliges, ♂. f. k. Syrien.

*cappadocicum* Spgl. v. *Buxbaumii*. *Aethonia fruticosa* D. Don vid. *Polychaetia fruticosa* etc.

**Aethusa** L., Gleifse, V. II., Umbelliferae.

*cynapioides* M.B., östliche, ☉. f. Osteuropa.

*Cynapium* L., gemeine Garten-Gl., ☉. f. Europa.

α) *elata* Hoffm. β) *pygmaea* Koch (agrest. Wallr.).

γ) *segetalis* v. Boenningh.

*Bunius* L. vid. *Ptychotis heterophylla*. *divaricata* Nutt. v. *Sison divaricatus*. *fatua* Ait. v. *Sium verticillatum*. *leptophylla* Nutt. v. *Sison capillaceum*. *Meum* Ait. v. *Meum athamanticum*. *montana* Lam. v. *Ptychotis heterophylla*.

**Afzelia** Sm., (Afzelius, schwedischer Botaniker), X. I., Leguminosae - Caesalpinieae.

*africana* Sm., afrikanische, ♀. w. Westafrika.

*cassioides* J. G. Gmelin vid. *Seymeria tenuifolia*.

*grandis* Hort. v. *Erythrophleum guineense*. *splendens* Hort. v. *Carapa guianensis*.

**Agapanthus** L'Her., Schmucklilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae (Hemerocallideae).

*minor* Lodd., kleine, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

*praecox* W., frühe, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

*umbellatus* L'Her., doldenblüthige, 4. k. f. b. C. d. g. H.

α) *albiflorus*. β) *multiflorus*. γ) *foliis variegatis*.

**Agastachys** RB., Wunderähre, IV. I., Proteaceae.

*odorata* RB., wohlriechende, ♀. t. Van Diemens Land.

**Agathaea** Cass., Bläuling, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

*coelestis* Cass., amellusblüthiger, ♀. k. C. d. g. Hoffn.

*linifolia* G. Don, linienblättriger, ♀. k. C. d. g. Hoffn.

*tenella* \*, zarter, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.

**Agathis australis** Lindl. et **loranthifolia** Salisb. (*Agathis Dammara* Rich.) v. *Dammara australis* et *orientalis*.**Agathophyllum** Juss., Gewürzblatt, XI. I., ? Laurineae.

*aromaticum* W., madagascarisches, ♀. w. Madagascar.

**Agathosma** W., Wohlgeruch, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*acuminata* W., zugespitzter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *cordata*.

*apiculata* G. F. W. Meyer, kurzspitziger, ♂. t. C. d. g. H.

*bifida* Bartl. et Wendl., zweispaltiger, ♂. t. C. d. g. H.

*bisulca* Bartl. et Wendl., zweifurchiger, ♂. t. C. d. g. H.

*Cerefolium* Bartl. et Wendl., Kerbel-W., ♂. t. C. d. g. H.

*ciliata* Lk., gefranzter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*concinna* Hoffm. gg., netter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*cuspidata* Bartl. et Wendl., langspitziger, ♂. t. C. d. g. H.

β) *bruniades*.

*erecta* Bartl. et Wendl., aufrechter, ♂. t. C. d. gut. H.

*glabrata* Bartl. et Wendl., glatter, ♂. t. Cap d. gut. H.

*hirta* Bartl. et Wendl., kurzhaariger, ♂. t. C. d. gut. H.

*hispida* Bartl. et Wendl., steifhaariger, ♂. t. C. d. gut. H.

*hybrida* Bartl. et Wendl., Bastard W., ♂. t. C. d. g. H.

*imbricata* W., ziegeldachförmiger, ♂. t. C. d. gut. H.

β) *virgata* Spgl. γ) *obtusata* Wendl.

*laxa* Bartl. et Wendl., lockerer, ♂. t. Cap d. gut. H.

*linifolia* Lichtnst., gleichbreitblättriger, ♂. t. C. d. g. H.

*lycopodioides* Bartl. et Wendl., bärlappartiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*microphylla* G. F. W. Meyer, kleinblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*mollis* Bartl. et Wendl., weicher, ♂. t. Cap d. gut. H.

*obtusata* Bartl. et Wendl., stumpfblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

α) *pubescens* W. β) *oblonga* Wendl.

*orbicularis* Bartl. et Wendl., kreisblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*parviflora* Bartl. et Wendl., kleinblumiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*patula* G. F. W. Meyer, ausgebreiteter, ♂. t. C. d. g. H.

*prolifera* Bartl. et Wendl., sprossender, ♂. t. C. d. g. H.

? *reflexa* Lk., zurückgebogener, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*rubra* W. et Lichtnst., röthlicher, ♂. t. Cap d. g. H.

*rugosa* Lk., runzeliger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*serpyllacea* Lichtnst., quendelblättriger, ♂. t. C. d. g. H.

*squamosa* Bartl. et Wendl., schuppiger, ♂. t. C. d. g. H.

*tenuissima* Otto, zarter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*Thunbergiana* Bartl. et Wendl., Thunberg's, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*Ventenatiana* Bartl. et Wendl., Ventenat's, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*vestita* W., bekleideter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*villosa* W., zottiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*virgata* Bartl. et Wendl., ruthenförmiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

*barbatum* Spgl. v. *Macrostylis lanceolata*. *foetidissima* Hortul. v. *Barosma foetidissima*. *hirta* Bot.

reg. H. Kew. v. *villosa*. *lanceolatum* Spgl. v. *ciliata* Lk.

*patens* Hortul. v. *Cerefolium*. *pubescens* W. v. *obtusata* α.

*pulchellum* Lk. v. *Barosma pulchella*. *subcordatum* Hoffm. gg. vid. *acuminata* β.

*virgata* Spgl. v. *imbricata* β.

*Agathyrus*, *alpinus* D. Don. *sibiricus* D. Don etc. vid. *Mulgedium alpinum* etc.

**Agati** Rheed. (ostindischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae,



**Agati**

*coccinea* Desv. DC., scharlachfarbige, f. w. Ostindien.

*grandiflora* Desv. DC., großblumige, f. w. Ostindien.

**Agave** L., amerikanische (Wunder-) Aloe, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Bromeliaceae alior.).

I. *Agave* L.

*americana* L., amerikanische, 4. k. Südamerika.

β) *foliis variegat.*

*angustifolia* Haw., schmalblättrige, 4. t. ?

*atrovirens* H. Berol., schwarzgrüne, 4. t. Mexico.

*brachystachys* H. Berol., kurzährige, 4. t. Mexico.

*elegans* Hort., nette, 4. w. ?

*flaccida* Haw., schlaffe, 4. t. Südamerika.

*flavescens* H. Berol., gelbliche, 4. t. Südamerika.

*glauescens* H. Berol., graugrüne, 4. t. Südamerika.

*Keratto* Haw., Keratto, 4. t. Südamerika.

*latifolia* H. Berol., breitblättrige, 4. t. Mexico.

*laxa* H. Berol., schlaffblättrige, 4. t. Mexico.

*lophantha* H. Berol., büschelblumige, 4. t. Mexico.

*lurida* Jcq., schmuziggelbe, 4. k. Veracruz.

*macracantha* H. Berol., großstachelige, 4. t. k. Mexico.

*mexicana* Haw., mexicanische, 4. t. k. Mexico.

*Milleri* Haw., Miller's, 4. k. Nordcarolina.

*polyacantha* Haw., vielstachelige, 4. t. ?

*polyacanthoides* H. Berol., vielstacheligähnl., 4. t. Mexico.

*potatorum* H. Berol., Trinker-A., 4. t. k. Mexico.

*Saponaria* Lindl., Seifen-A., 4. w. Peru.

*tehuacanensis* H. Berol., Tehuacana, 4. t. k. Mexico.

*univittata* Haw., einstreifige, 4. t. k. Mexico.

*virginica* L., virginische, 4. k. Virginien, Nordcarolina.

*vivipara* L., lebendiggebärende, 4. t. Südamerika.

*yuccaefolia* W., yuccablättrige, 4. t. Neuspanien.

II. *Littaea* Brign, Tagliab.

*geminiflora* Ker., doppeltblüthige, 4. w. t. Südamerika.

? *gracilis* Hoffinsegg., schlanke, 4. w. t. Südamerika.

*spicata* DC., ährenblüthige, 4. w. t. Südamerika.

*Cantala* Wall. *cubensis* Jcq. *foedita* L. (*gigantea*).

*madagascariensis*, *rigida* Mill. *tuberosa* Mill. vid.

*Fourcroya Cantala* etc.

**Ageratum** L., Leberbalsam, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*conyzoides* L., dürrwurzähnlicher, ☉. f. m. Ostindien, Afrika, Südamerika, Westindien.

β) *coeruleum* Pers. (*obtusifolium* Lam.). γ) *lati-*

*folium* Hort. non Cav. δ) *mexicanum* Sims.

*strictum* Sims., steifer, ☉. f. Nepal.

*angustifolium* Spgl. v. *Eriophyllum angustifolium*.

*coelestinum* B. mag. v. *Coelestina micrantha*. *co-*

*rymbosum* Zuccagn. v. *Coelestina ageratoides*. *li-*

*neare* Cav. v. *Palafoxia linearis*. *obtusifolium* Lam.

v. *conyzoides* β. *pedatum* Orteg. v. *Hymenopap-*

*pap-pus pedatus*. *punctatum* Orteg. v. *Stevia hyssopi-*

*folia*. *viscosum* Orteg. v. *Stevia salicifolia*.

**Aglaja** Lour., Glanzbaum, XVI. 11. (111.), Hesperideae-Aurantiaceae.

*odorata* Lour., wohlriechender, f. w. China, Cochinchina.

**Agnostus** Cun., (Provinzialname) ? IV. 1., Proteaceae.

*sinuata* Cun., buchtigblättrige, f. t. Neuholland.

**Agraulis** *alpinus* P. B. *caninus* P. B. etc. vid. *Agrostis alpina* etc

**Agrimonia** L., Odernennig, XI. II., Rosaceae.

Eupatoria L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) dahurica (daurica).

nepalensis D. Don, nepalischer, 4 f. Nepal.

odorata, Camer. Ait., wohlriechender, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

parviflora, Ait., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

pilosa, Ledeb., weichhaariger, 4. f. Sibirien.

repens L., kriechender, 4. f. Armenien.

striata, Mchx., gestreifter, 4. f. Nordamerika.

suaveolens, Pursh, wohlriechender, 4. f. Nordamerika.

agrimonoides L. vid. Aremonia agrimonoides Neck.

decumbens L. v. Acaena latebrosa.

**Agropyrum acutum** R. et. S. caesium Presl. etc. v. Triticum acutum etc.**Agrostemma** L., Rade, X. IV., Caryophyllaceae-Sileneae.

Githago L., gemeine (Korn-R.), ☉. f. Europa.

β) nicaeensis W.

Coelirosa L. coronaria L. decumbens Dens. (perennans Haw.). flos jovis L. vid. Lychnis Coeli rosa etc.

**Agrostis** L., Straußgras, III. II., Gramineae.

aemula RB., liebliches, 4. k. Neuholland.

alba L., Schrad., weißliches, 4 f. Europa.

β) gigantea Roth. (sylvatica W.). γ) maritim. Lam.

δ) stolonifera L. (diffusa Host. decumbens Auctor).

alpina Scop., Alpen-St., 4. k. Europäische Alpen.

anomala W., abweichendes, ♂. 4. f. Nordamerika.

canina L., Hunds-St., 4. f. Europa.

β) diffusa Lk.

capillaris L., haarförmiges, ♂. f. Portugal, Caucasus.

elegans Thore, nettes, ☉. f. Frankreich.

hygrometrica Nees, hygrometrisches, ☉. f. Brasilien.

lachnantha Nees, wollblüthiges, ☉. ♂. f. ?

laxa Schrb., lockerblüthiges, ♂. f. Nordamerika.

monandra Hornem., einmänniges, ☉. f. ? Nordamerika.

nitens Guss., glänzendes, ☉. ♂. f. Sicilien.

rubra L., rothes, 4. f. Lappland.

rupestris All., Felsen-St., 4. f. Europäische Alpen.

setacea Curt., borstiges, 4. f. England.

tenuifolia MB., feinblättriges, 4. f. Caucasus.

verticillata Vill., wirtelblüthiges, 4. f. Frankreich.

vulgaris Wither., gemeines, 4. f. Europa.

frondosa Tenore v. alba γ. interrupta W. vid. aemula. Die übrigen, als Agrost. algida Wahlenb., Spica venti L., tenacissima L. suppl. etc. vid. die Gattungen: Apera, Cinna, Colpodium, Echinopogon, Mühlenbergia, Phippsia et Sporobolus etc.

**Agyneja** L., Ohnnarbe, XXI. x. (XVI. I.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

impubes L., unbehaarte, ☉. f. China.

pubera L., behaarte, ♀. t. China.

**Aidelus micranthus** Spgl. v. Veronica micrantha.**Ailanthus** Dsf., Stinksumach (Götterbaum), V. III., (XXIII. I.), Amyrideae-Terebinthaceae.

excelsa Roxb., hoher, ♀. w. Ostindien.

glandulosa Dsf., drüsiger, ♀. f. China.

**Aira** L., Schmiele, III. II., Gramineae.

I. muticae.



## Aira

arundinacea L., rohrartige, 4. f. Mittelasien.

semineutra Kit., halbzwittrliche, 4. f. Ungarn.

II. aristatae (Deschampsia P. Beauv., Campella Lnk.).

alpina L., Alpen-Schm., 4. f. Lappland, Schottland.

ambigua Mchx., zweifelhafte, 4. f. Nordamerika.

bottnica Wahlenb., bottnische, 4. f. Schweden.

brevifolia MB., kurzblättrige, 4. f. Caucasus.

caespitosa L., Rasen-Sch. (gemeine), 4. f. Europa.

β) pallida (altissima Lam., parviflora Thuill.).

γ) vivipara.

\* grandis Bess., große, 4. f. Podolien.

media, Gouan., mittlere, 4. f. Südfrankreich.

discolor Thuill. v. media. laevigata Sm. v. alpina.

montana? L. v. bottnica. agrostidea Lois. v. Airopsis

Candollii. brevifolia Pursh. globosa Thore.

minuta L. v. Airopsis brevifol. globosa etc. atropurpurea

Wahlb. capillaris Host., (elegans W.).

caryophyllea L. paludosa Roth. praecox L. pulchella W. etc. vid. Avenaira (Avena) atropurpurea

etc. articulata Dsf. canescens L. v. Corynephorus

articulatus etc. obtusata Mchx. (truncata Mühlbg.)

v. Eriachne obtusa. aquatica L. v. Glyceria aquatica.

cristata L. glauca Spgl. hirsuta Hall. fil.

pensylvanica Spgl., (mollis Mühlb.). vallesiaca All.

etc. v. Koeleria cristata etc. coerulea L. v. Molinia coerulea.

involucrata Cav. v. Periballia hispanica.

subspicata L. v. Trisetum subspicatum.

Airochloa, albescens, Lk. cristata Lk. v. Koeleria albes-

scens etc.

Airopsis Desv., Zwergschmiele, III. II., Gramineae.

brevifolia R. et S., kurzblättrige, 4. f. Nordamerika.

Candollei Desv., Candolle's, 4. f. Spanien, Westfrank-

reich, Sicilien.

globosa Desv., kugelförmige, ☉. ♂. f. Westfrankreich.

minuta Desv., kleinste, ☉. f. Aegypten, Spanien.

involucrata R. et S. v. Periballia hispanica. pulchella

Hort. v. Avena pulchella.

Aitonia L. fil. (W. Aiton, engl. Botaniker u. Gärtner),

XVI. v., ?Hesperideae-Meliaceae.

capensis, capische, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

Aizoon L., Zaserling (Immergrün), XII. II., Aizoideae-

Ficoideae.

canariense L., canarischer, ☉. f. Canarische Inseln,

Nordafrika.

fruticosum L., stranchiger, ♂. k. Cap d. gut. Hoffn.

glinoides L., glinusähnlicher, ☉. ♂. f. k. Cap d. gut.

Hoffn.

hispanicum L., spanischer, ☉. f. Spanien.

paniculatum L., rispiger, ☉. ♂. f. k. Cap d. g. Hoffn.

perfoliatum L., durchwachsener, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

lanceolatum Murray v. paniculatum.

Ajuga L., Günsel, XIV. I., Labiatae.

australis RB., neuholländischer, 4. f. k. Neuholland.

Chamaepitys Schreb., Acker-G., ☉. f. Mittel- u. Süd-

europa, Kleinasien, Nordafrika.

chia Schreb., griechischer, ☉. f. Insel Chios, Klein-

asien.

genevensis L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) rubra. γ) alba. δ) foliosa Tratt.



**Ajuga**

*integrifolia* Don, ganzblättriger, 4. f. Nepal.

*Iva* Schreb., moschusduftender, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*oblongata* MB., langblättriger, 4. f. Caucasus.

*orientalis* L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

*pyramidalis* L., pyramidal, 4. f. Europa.

*reptans* L., kriechender, 4. f. Europa.

α) *alba*. β) *rubra*. γ) *alpina* Vill. δ) *variegata*.  
*salicifolia* Schrbr., weidenblättriger, 4. f. Kleinasien, Caucasus.

*Tenorii* Presl., Tenorischer, 4. f. Neapel, Sicilien.

*alpina* L. v. *genevensis*. *furcata* Lk. v. *Craniotome versicolor*. *italica* Hort. v. *Tenorii*. *montana* Rchb. v. *genevensis*. *moschata* Schrb. v. *Iva*. *rugosa* Host v. *genevensis*. *rupestris* Schlchr. v. *pyramidalis*.

**Alangium** Juss. (Alangi, malabarischer Name), XII. 1.,  
Onagrariae-Granateae (Alangieae).

*decapetalum* Lam., zehnblättriges, ♀. w. Ostindien.

*hexapetalum* Lam., sechsblättriges, ♀. w. Ostindien.

*tomentosum* Lam., filziges, ♀. w. Ostindien.

**Albua** L., Weisblume (Stiftblume), VI. 1., Coronariae-  
Asphodeleae.

*abyssinica* Jacq., abyssinische, 4. Zw. t. Mittel- und Südafrika.

*altissima* Jacq., hohe, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*aurea* Jacq., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*caudata* Jacq., geschwänzte, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

*coarctata* Dryand., gedrungene, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*exuviata* Ker, nachenblättrige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*fastigiata* Dryand., gipfelständige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

*filifolia* Ker, fadenblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

*flaccida* Ker, schlaffe, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*fragrans* Jacq., wohlriechende, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*fugax* Ker., vergängliche, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*major* Dryand., grössere, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*minor* L., kleinere, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*physodes* B. Mag., aufgeblasene, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*setosa* Jacq., borstige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*spiralis* L., spiralförmige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*viridiflora* Jacq., grünblumige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

*viscosa* L., schmierige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*vittata* Ker, gestreifte, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Alcea ficifolia** L., *rosea* L. v. *Althaea ficifolia* etc.

**Alchemilla** T. L., Löwenfuß, Frauenmantel, IV. 1.,  
Rosaceae-Sanguisorbeae.

*alpina* L., Alpen-L., 4. f. Europ. Alpen, Nordamerika.

*Aphanes* L., Acker-L., ☉. f. Europa, Amerika.

*capensis* Thbg., capischer, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

*cornucopioides* Lagasc., spanischer, ☉. f. Spanien.

*fissa* Schum., spaltblättriger, 4. f. Sudeten, mittelpäpische Alpen.

**Alchemilla**

*pentaphylla* L., fünfblätteriger, 4. f. Schweizer- u. Tyroler-Alpen.

*pubescens* MB., feinhaariger, 4. f. Caucasus, Kärnten und Tyrol.

*sericea* W., seidenhaariger, 4. f. Caucasus.

*sibbaldiaefolia* Kunth, *sibbaldiablätteriger*, 4. k. Mexico.

*vulgaris* L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) *montana* W. (hybrida W.). γ) *variegata*.

*alpina* MB. v. *sericea*. *arvensis* Scop. v. *Aphanes pyrenaica* Duf. v. *fissa*.

*Alcina ovatifolia* Lagasc. v. *Melampodium paludosum*. *Al-*

*cina perfoliatu* Cav. v. *Melampodium perfoliatum*.

*Aldeaea circinnata* v. *Phacelia circinnata*.

**Aldrovanda** Monti (Aldrovandus, italien, Naturforscher), V. v., Cistineae-Droseraceae.

*vesiculosa* L., blasige, 4. Wa. f. Ital., Südfrankreich.

**Alectorolophus** Hall., M. B., Klaffer, Klappertopf, XIV. II., Personatae-Rhinantheae (Pediculareae).

*alpinus* \* (Rhinanth. Baumg.), Alpen-K., ☉. f. Sudenten, Karpaten.

*angustifolius* \* (Rhinanth. Gmel.), schmalblätteriger, ☉. f., Berge, Subalpinen, Deutschland.

*hirsutus* All., rauchhaariger, ☉. f. Felder Mittel-, Ost- und Südeuropa's.

*major* Rchb., größer, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*minor* Rchb., kleiner, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*Crista galli* M.B. v. *major* etc. *grandiflorus* Wallr.

v. *major*. *parviflorus* Wallr. vid. *minor*. *Trixago*

M.B. v. *Trixago rhinanthina*.

**Aletris** L., Hyacinthaloe, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*aurea* Mchx., goldfarbige, 4. k. f. b. Nordamerika.

*alba* Mchx. v. *farinosa*. *arborea* W. vid. *Dracaena*

*arborea*. *capensis* L. v. *Veltheimia viridifolia*. *co-*

*chinchinensis* Lour. v. *Sansevieria laete-virens*. *fra-*

*grans* Jacq. v. *Dracaena fragrans*. *glauc* Ait. vid.

*Veltheimia glauca*. *hyacinthoides* L. v. *Sansevieria*

*zeylanica*. *pumila* Ait. vid. *Tritomanthe pumila*.

*punicea* La Bill. vid. *Blandfordia grandiflora* RB.

*sarmentosa* Andr. v. *Tritomanthe media*.

**Aleurites** Forst., Mehlbaum, XXI. V. (XVI. VIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*triloba* Forst., dreilappiger, 5. w. Molucken, Soc. Inseln.

**Alhagi** Tour., Mannapflanze, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*camelorum* Fisch., Camels-M., 4. k. Caucasus, Mittelasien.

*maurorum* T., maurische, 5. k. Asien, Griechenland, Arabien, Persien.

**Alisma** Dill., Froschlöffel, Wasserwegerich, VI. IV. Alismaceae.

*cordifolium* L., herzblätteriger, 4. Wa. w. Südamerika.

*natans* L., schwimmender, 4. Wa. f. Europa, Nordamer.

*parnassifolium* L., parnassienblätteriger, 4. Wa. f. Brandenburg, Mecklenburg, Italien.

*Plantago* L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

αβ) *graminifolium* Ehrh. γ) *lanceolatum* With.

δ) *parviflorum* Pursh.

*ranunculoides* L., ranunkelähnlicher, 4. Wa. f. Europa.



**Alisma**

reniforme Don, nierenförmiger, 4. Wa. k. Nepal.  
repens Cav., kriechender, 4. Wa. f. Spanien, Barbarei,  
England.

sagittifolium W., pfeilblättriger, 4. Wa. w. Guinea.

*Damasonium* L. v. *Actinocarpus Damasonium*. *flava*  
L. v. *Limnocharis Plumieri*.

**Allamanda** L. (Allamand, Professor zu Leyden), V. 1.,  
Contortae-Apocynae.

cathartica L., purgirende, 4. w. Guiana.

verticillata Dsf., wirtelblättrige, 4. w. ? Ostindien.

**Allantodia** RB., Hautfarn, XXIV. 1., Pterioideae  
(Polypodiaceae).

australis RB., südlicher, 4. I. Vandiemensland.

axillaris Kaulf., winkelständiger, 4. I. Madeira.

tenera RB., zarter, 4. t. Neuholland.

umbrosa RB., schattenliebender, 4. t. Madeira.

**Alliaria** Adans., Lauchkraut, XV. III., Cruciferae.

brachycarpa Andrz., kurzschotiges, ♂. f. Caucasus.

officinalis Andrz., gebräuchliches, ♂. f. Europa, Mittel-  
asien.

**Allionia** L. (C. Allioni, Prof. der Botanik zu Turin),  
IV. 1., Nyctagineae.

aggregata Spgl., angehäuften, 4. k. Neuspanien, Süd-  
carolina.

decumbens Spgl., niederliegende, 4. f. Nordamerika.

hirsuta Pursh, rauhhaarige, 4. f. Nordamerika.

incarnata L., fleischfarbige, ♂. f. Peru.

linearis Pursh, linienblättrige, 4. f. Nordamerika.

nyctaginea Mchx., wunderblumenähnliche, 4. f. Nord-  
amerika.

ovata Pursh., eiförmige, 4. f. Nordamerika.

violacea L., violette, ♂. f. Cumana.

*albida* Walt. v. *aggregata*.

**Allium** T. L., Lauch, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

acutangulum Schrad., spitzkantiger, 4. Zw. f. Europa,  
Mittelasien.

acutiflorum Loisel., spitzblumiger, 4. Zw. f. Süd-  
frankreich.

albidum Fisch., weißlicher, 4. Zw. f. Taurien, Caucasus.

album Savi., weißer, 4. Zw. f. Italien, Griechenland.

Ampeloprasum L., breitblättriger, 4. Zw. f. England,  
Italien, Rheingegend.

Andersonii G. Don, Anderson's, 4. Zw. f. Sibirien.

angulosum L., kantiger, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.

ascalonicum L., Schalotten-L, 4. Zw. f. Syrien, Kleinasien.

β) majus.

asperum G. Don, rauher, 4. Zw. f. Südeuropa.

atropurpureum Kit., dunkelpurpurfarbiger, 4. Zw. f.  
Ungarn.

azureum Fisch., himmelblauer, 4. Zw. f. Sibirien.

bisulcum Red., zweifurchiger, 4. Zw. f. ?

brachystemon DC., kurzfadiger, 4. Zw. f. Südeuropa.

canadense L., canadischer, 4. Zw. f. Nordamerika.

carinatum L. Sm., rinnenblättriger, 4. Zw. f. Europa.

carneum W., fleischfarbiger, 4. Zw. f. ?

carolinianum DC., carolinianischer, 4. Zw. Carolina.

caspium MB., caspischer, 4. Zw. Asiatisch Rußland.



## Allium

- Cepa* L., Bollen (gemeine Zwiebel), ♂. Zw. ?  
     β) *aggregatum* G. D. γ) *hispanicum* (album et rubrum). δ) *parsum* Jcq. ε) *pauciflorum* Trevir.  
*cepaeforme* G. Don, bollenähnlicher, 4. Zw. f. ?  
*ceratophyllum* Bess., hornblättriger, 4. Zw. f. Rußland.  
*cernuum* Roth, übergebogener, 4. Zw. f. Nordamerika.  
*Chamaemoly* L., Zwerg-L., 4. Zw. f. Südeuropa, Nordafrika.  
*cinereum* Lehm., aschgrauer, 4. Zw. f. Sibirien.  
*congestum*, G. Don, gedrängtblättriger, 4. Zw. f. Sibirien.  
*controversum* Schrad., streitiger, 4. Zw. f. Osteuropa.  
*Cowanii* Ker., Cowans-L., 4. Zw. f. Chili.  
*descendens* L., herabsteigender, 4. Zw. f. Schlesien, Oberitalien, Schweiz.  
*erectum* G. Don, aufrechter, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*evosmon* Lk. et Otto, gutriechender, 4. Zw. f. ?  
*exsertum* G. Don, hervorstehender, 4. Zw. f. Rußland.  
*Fischeri* Swt., Fischer's, 4. Zw. f. Rußland.  
*fistulosum* L., röhriger, 4. Zw. f. Sibirien.  
*flavescens* Bess., gelblicher, 4. Zw. f. Podolien, Taurien.  
*flavum* L., gelber, 4. Zw. f. Oestreich, Tyrol, Siebenbürgen, Taurien.  
*flexum* Kit., gebogener, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, Ungarn.  
     β) *capsuliferum* Koch.  
*foliosum* DC., vielblättriger, 4. Zw. f. Frankreich.  
*fragrans* Vent., wohlriechender, 4. Zw. f. Nordamerika.  
*fuscum* Kit., braunblumiger, 4. Zw. f. Bannat.  
*glandulosum* Lk. et Otto, drüsiger, 4. Zw. f. ?  
*globosum* MB., kugeldoldiger, 4. Zw. f. Caucasus.  
*graecum* Urvill., griechischer, 4. Zw. f. Griechenland.  
*guttatum* Steven, getüpfelter, 4. Zw. f. Podolien, Taurien, Griechenland.  
*Halleri* G. Don, Haller's, 4. Zw. f. Südeuropa.  
*hymenorrhizum* Ledeb., hautwurzelliger, 4. Zw. f. Rußl.  
*incarnatum* Hornem., fleischfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa.  
*intermedium* Lam. DC., mittlerer, 4. Zw. f. Südfrankreich, Oberitalien, Podolien.  
*juncifolium* G. Don, simsensblättriger, 4. Z. f. Chili.  
*laxum* G. Don, lockerer, 4. Zw. f. Sibirien.  
*lineare* L., linienblättriger, 4. Zw. f. Mittelasien.  
*litoreum* Bertol., Ufer-L., 4. Zw. f. Südfrankreich, Italien.  
*longifolium* Humb. Knth., langblättriger, t. 4. Zw. k. Mexico.  
*magicum* L., Zauber-L., 4. Zw. f. Südeuropa.  
*majale* Tenor., Mai-L., 4. Zw. f. Neapel.  
*medium* G. Don, mittlerer, 4. Zw. f. Ungarn.  
*Moly* L., goldfarbener, 4. Zw. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika.  
*montanum* Sm., Berg-L., 4. Zw. f. Griechenland.  
*moschatum* L., moschusduftender, 4. Zw. f. Süd- und Osteuropa, Taurien.  
*multiflorum*, Dsf., vielblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich, Nordafrika.  
*mutabile* Mchx., veränderlicher, 4. Zw. f. Carolina.  
*narcissiflorum* Vill., narcissenblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich.  
*neapolitanum* Cyrill., neapolitanischer, 4. Zw. f. Neapel.  
*nudicaule* Lehm., nacktschaftiger, 4. Zw. f. ?

**Allium**

nutans L., nickender, 4. Zw. f. Sibirien.  
 obliquum L., schieflätteriger, 4. Zw. f. Sibirien.  
 ochroleucum Kit., weißgelber, 4. Zw. f. Krain, Croatien, Siebenbürgen, Italien, Frankreich.  
 odoratissimum Dsf., riechender, 4. Zw. f. Nordafrika.  
 odorum L., wohlriechender, 4. Zw. f. Sibirien, Südeuropa.  
 β) acuminatum.

oleraceum L., Gemüse-L., 4. Zw. f. Europa.  
 Ophioscorodon J. Bauh., Perl-L., 4. Zw. f. Griechenl.  
 oxypetalum G. Don, schmalblüthiger, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 Pallasii Murray, Pallas's, 4. Zw. f. Sibirien.  
 pallens L., bleicher, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 paniculatum L., rispiger, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 paradoxum G. Don, wunderbarer, 4. Zw. f. Caucasus.  
 parviflorum L., kleinblumiger, 4. Zw. f. Nordafrika.  
 pendulinum Tenore, herabhängender, 4. Zw. f. Neapel.  
 pedemontanum W., piemontesischer, 4. f. Zw. Piemont.  
 Porrum L., Porree, ♂. Zw. f. ?  
 proliferum Schrad., sprossender, 4. Zw. f. ?  
 prostratum Trev., gestreckter, 4. Zw. f. Sibirien.  
 pruinatum Lk., bereifter, 4. Zw. f. Portugal.  
 pulchellum G. Don, schöner, 4. Zw. f. Taurien.  
 Purshii G. Don, Pursh's, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 pusillum Cyril., niedriger, 4. Zw. f. Sicilien.  
 ramosum G. Don, ästiger, 4. Zw. f. Sibirien.  
 reticulatum Fras., netzförmiger, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 roseum L., rosafarbiger, 4. Zw. f. Illyrien, Dalmatien, Italien.

## β) bulbiferum.

rotundum L., runder, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.  
 rubellum MB., röthlicher, 4. Zw. f. Caucasus.  
 rubicundum Niv., rothwerdender, 4. Zw. f. k. Cap d. g. H.  
 rupestre MB., Felsen-L., 4. Zw. f. Caucasus.  
 sativum L., gebauter (Knoblauch), 4. Zw. f. Sicilien.  
 saxatile MB., Stein-L., 4. Zw. f. Caucasus, Taurien, Illyrien.  
 Schoenoprasum L., Schnitt-L., 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, England, Sibirien.

b) albiflorum. c) carneum.

## β) alpinum Gaud. (sibiricum L.)

Scorodoprasum L., Rocambollen-L., 4. Zw. f. Europa.  
 scorzoneraefolium DC., haferwurzblätteriger, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 senescens, L., alternder, 4. Zw. f. Sibirien.  
 β) spirale W.

sphaerocephalum L., rundköpfiger, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz.  
 spurium G. Don, unächter, 4. Zw. f. Sibirien.  
 stellatum Sims., sternförmiger, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 striatellum Lindl., schmalstreifiger, 4. Zw. f. Chili.  
 striatum Jacq., gestreifter, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 strictum Schrad., steifer, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, Volhynien, Mittelasien.  
 suaveolens Jacq., feinriechender, 4. Zw. f. Süddeutschland, Italien, Frankreich.  
 subhirsutum L., wenighaariger, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 Synnotii G. Don, Synnot's, 4. Zw. f. Cap. d. g. H.  
 tricoccum Ait., dreiknöpfiger, 4. Zw. f. Nordamerika.



**Allium**

*triquetrum* L., dreikantiger, 4. Zw. f. Italien, Südfrankreich, Spanien.

*uliginosum* Ledeb., Sumpf-L., 4. Zw. f. Rußland.

*ursinum* L., Bären-L., 4. Zw. f. Europa.

*verrucosum* G. Don, warziger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*Victorialis* L., Schlangen-L. (Allermanns-Harnisch), 4. Zw. f. Deutschland, Schweizer Alpenwiesen.

β) *angustifolium*.

*vineale* L., Weinbergs-L. (Acker-L.), 4. Zw. f. Mitteleuropa.

*Waldsteinii* G. Don, Waldstein's, 4. Zw. f. Ungarn.

*acutum* Spgl. vid. *foliosum*. *ambiguum* DC. vid.

*ochroleucum*. *ambiguum* Sm. v. *incarnatum*. *amoenum* G. Don v. *roseum* β. *angulosum* Pursh vid.

*reticulatum*. *appendiculatum* Ram. v. *ochroleucum*.

*arenarium* L. v. *vineale*. *arenarium* Sm. v. *Scorodoprasum*.

*baicalense* W. v. *senescens*. *capillare* Cav. v. *moschatum*.

*carneum* Bertol. v. *roseum* β.

*caucasicum* Sims. v. *globosum*. *ciliatum* Cyril. v.

*subhirsutum*. *Clusianum* Retz v. *subhirsutum*. *compactum* Thuill. v. *vineale*.

*danubiale* Spgl. v. *acutangulum*. *deflexum* W. v. *strictum*.

*ericetorum* Thor. v. *ochroleucum*. *fallax* Don v. *angulosum*.

*flexuosum* Host. v. *flexum*. *foetidum* W. v. *oleraceum*.

*glaucum* Schrad. v. *senescens*. *gracile* Ait v. *fragrans*.

*graminifolium* P. v. *ochroleucum*. *grandiflorum* Lam. v. *narcissiflorum*.

*illyricum* Jcq. v. *roseum*. *inodorum* Ait v. *fragrans*.

*lacteum* Sm. v. *album*. *longispathum* Red. v. *paniculatum*.

*microcephalum* Tausch vid. *strictum*. *monspessulanum* Gouan v. *magicum*.

*monspessulanum* W. v. *litorum*. *montanum* Schmidt v. *angulosum*.

*multibulbosum* Jcq. v. *magicum*. *nigrum* All. v. *pedemontanum*.

*nigrum* L. v. *magicum*. *Ophioscorodon* Lk. v. *controversum*.

*ornithogaloides* Bosc. v. *striatum*. *paniculatum* Vill. v. *intermedium*.

*ramosum* Jcq. v. *obliquum*. *reticulatum* Presl. v. *strictum*.

? *rubens* Schrad. v. *bisulcum*. *setaceum* Kit. v. *moschatum*.

*siculum* Uc. v. *Nectaroscordum siculum*. *speciosum* Cyrill. v. *magicum*.

*stellatum album* Sims v. *reticulatum*. *tataricum* L. Sppl. v. *odorum*.

*tricorne* Poir v. *cernuum*. *umbellatum* Hall. v. *odorum*.

*veronense* Poll. v. *sphaerocephalum*. *violaceum* W. v. *flexum*.

*volhynicum* Bess. v. *strictum*.

*Allocatheros lepturoides* Ell. v. *Gymnopogon racemosus*.

**Allosorus** Bernh., Krausfarn, XXXIV. 1. Pterioideae (Polypodiaceae).

*crispus* Bernh., Alpen-K., 4. f. Europäische Alpen.

**Alnus** Tourn., Erle, XXI. iv., Amentaceae.

*barbata* Mey., bärtige, 5. f. Rußland.

*cordifolia* Tenore, herzblättrige, 5. f. Neapel, Corsica.

*glauca* Mchx., graugrüne, 5. f. Nordamerika.

*glutinosa* Gärtn., gemeine, 5. f. Europa, Nordasien,

Afrika und Amerika.

β) *emarginata*. γ) *foliis variegatis*. δ) *laciniata*

(*incisa*). ε) *macrocarpa*. ζ) *oxyacanthaefolia*.

η) *quercifolia*. θ) *rubra*. ι) *subrotunda*.

*incana* W., weißlichgraue, 5. f. Nord- und Osteuropa,

Japan, Nordamerika.

β) *pinnatifida* (*laciniata*). γ) *angulata*.



**Alnus**

*nepalensis* Don, nepalische, 5. k. Nepal.

*oblongata* W., langblättrige, 5. f. Südeuropa.

β) *pumila*.

*obtusifolia* Royle, stumpfblättrige, 5. k. Nepal.

*rugosa* Spgl., runzelige, 5. f. Nordamerika.

*serrulata* W., sägezahnige, 5. f. Nordamerika.

*subcordata* Meyer, fast herzblättrige, 5. f. Rußland.

*undulata* W., wellenblättrige, 5. f. Canada.

*viridis* DC., grüne, 5. f. Frankreich, Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Galicien.

*americana* Mill. v. *glauca*. *canadensis* Hort. v. *rugosa*. *crispa* Mchx. v. *undulata*. *macrophylla* Dsf. v. *oblongata*. ? *plicata* Hortul. v. *undulata*.

**Aloë** (arabischer Name), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae-

I. *Apicra* W. (*Haworthia* Duval. Haw.), Bilabiatae.

*albicans* Haw., weißliche, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *laevis* Haw.

*altilinea* Haw., starklinirte, 4. k. t. Cap d. g. H.

*angustifolia* Haw., schmalblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*anomala* Haw., abweichende, 4. k. t. Cap d. g. H.

*arachnoides* Thbg., spinnewebenartige, 4. k. t. C. d. g. H.

β) *minor*.

*aspera* Haw., rauhe, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

*atrovirens* DC., schwarzgrüne, 4. k. t. Cap d. g. H.

*attenuata* Haw., verdünnte, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *clariperla* Haw.

*chloracantha* Haw., grünstachelige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*coarctata* Haw., gedrängte, 4. k. t. Cap d. g. H.

*cordifolia* Haw., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*curta* Haw., kurze, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

*cymbaeformis* Curt., cymbelblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*fasciata* Salm, querbändrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*Haworthii* Hortul. Haworth's, 4. k. t. Cap d. g. H.

*hybrida* Salm, Bastard-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

*indurata* Haw., verhärtete, 4. k. t. Cap d. g. H.

*laetevirens* Haw., freudiggrüne, 4. k. t. Cap d. g. H.

*margaritifera* Mill., Perl-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

α) *major*. β) *minor*. γ) *minor*. δ) *brevis* Haw.

*mirabilis* Haw., wunderbare, 4. k. t. Cap d. g. H.

*multifaria* Haw., vielreihige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*mutica* Haw., unbespitzte, 4. k. t. Cap d. g. H.

*obtusa* Haw., stumpfe, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*papillosa* Salm, weichwarzige, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *semipapillosa*.

*pseudotortuosa* Salm, unächtgewundene, 4. k. t. C. d. g. H.

*Radula* Jacq., Raspel-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *asperior* Haw. γ) *pluriperlata*.

*ramifera* Haw., ästige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*recurva* Haw., zurückgekrümmte, 4. k. t. Cap d. g. H.

*Reinwardti* Salm, Reinwardt's, 4. k. t. Cap d. g. H.

*reticulata* Haw. (*Pumilio* Jacq.), netzförmige, 4. k. t.

Cap. der guten Hoffnung.

*retusa* L., eingedrückte, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*rigida* DC., starre, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *expansa* W.

*semimargaritifera* Salm, Haw., halbgeperlte, 4. k. t. Cap d. g. H.

α) *maxima*. β) *major*. γ) *minima*.

*sordida* Haw., schmutzige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*torquata* Haw., gedrehte, 4. k. t. Cap d. g. H.

## Aloë

*tortuosa* Haw. (*rigida* W.), gewundene, 4. k. t. Cap d. g. H.  
 β) *tortella* Haw.  
*translucens* Haw., durchscheinende, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*venosa* Lam., aderige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.  
*viscosa* L., schmierige, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

β) *concinna* Haw.  
*virescens* Haw., grünliche, 4. k. t. Cap d. g. H.  
 β) *minor*.

*granata* W. v. *margaritifera*. *patula* W. v. *rigida*.  
*pseudorigida* Salm v. *tortuosa*. *pumila* Haw. vid.  
*atrovirens*. *semiglabrata* Haw. v. *hybrida*.

II. *Haworthia* Salm (*Apicra* Haw.) (Parviflorae).  
*bicarinata* Haw., zweikielige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*bullulata* Jcq., bauschige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*foliolosa* Haw., blätterreiche, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*imbricata* Haw. (*spiralis* DC.), dachziegelförmige, 4. k.  
 t. Cap der guten Hoffnung.  
*nigra* Haw., schwarze, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.  
*spiralis* L., spiralförmige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.  
 β) *spirella* Haw.

*pentagona* Jacq. v. *spiralis*.

III. *Gasteria* Haw. (Curviflorae Salm).  
*acinacifolia* Jcq., säbelblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
 β) *minor*.

*angulata* W., kantige, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.  
 β) *minor*.

*bicolor* Haw., zweifarbig, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.  
*candicans* Haw., weißsschimmernde, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*carinata* Ait., gekielte, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.  
*conspurcata* Haw. Salm, befleckte, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*crassifolia* Haw., dickblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*disticha* Haw., zweizeilige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.  
 β) *major*.

*ensifolia* Haw., schwertblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*excavata* W., ausgehöhlte, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*formosa* Haw., wohlgestaltete, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*glabra* Haw. Salm., kahle, 4. k. t. Cap der g. H.  
*intermedia* Haw., mittlere, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
 β) *asperima* Haw.

*laetipunctata* Haw., freudig-punctirte, 4. k. t. Cap d. g. H.  
 β) *denticulata*.

*laevis* Haw. Salm., glatte, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.  
*Lingua* Thbg., Zungen-A., 4. k. t. Cap der g. H.  
 β) *major*.

*linita* Hw. (*latifolia*), beschmierte, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*nigricans* Haw., schwärzliche, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *fasciata*. γ) *laxa* Haw. δ) *marmorata* Haw.  
*nitida* Haw. Salm., glänzende, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*obliqua* Salm., schiefblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
 β) *fallax* Haw. ? γ) *picta* Haw.

*obscura* W., dunkelfarbige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*obtusifolia* Haw., stumpfblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*parva* Haw., kleine, 4. k. t. Cap d. guten Hoffn.  
*perviridis* Haw. (*brevifolia* Haw.), dunkelgrüne, 4. k. t.  
 Cap der guten Hoffnung.

β) *magnipunctata* Haw.  
*pseudo-angulata* Salm., unächt-kantige, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*pseudo-nigricans* Salm., unächt-schwärzliche, 4. k. t.  
 Cap der guten Hoffnung,

## Aloë

β) glabrior.

pulchra Jacq. (*obliqua* DC.), schöne, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

repens Haw., kriechende, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

retata Haw., genetzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

subcarinata Haw., Salm, weniggekielte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) viridior.

subverrucosa Haw., Salm, wenigwarzige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) parvipunctata.

sulcata Haw., gefurchte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

trigona Haw., dreiseitige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

undata Haw., wogenförmige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

venusta Haw., liebliche, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

verrucosa Ait., warzige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*angulata striata* W. v. *pseudo-angulata. angustifolia* (et *longifolia*) Haw. v. *Lingua. decipiens* Haw. v. *nigricans. maculata* (Thbg.) Haw. W. v. *obliqua. nitens* Haw. v. *glabra. subnigricans* Haw., Spgl. v. *pseudonigricans*.

IV. *Bowiea* Haw.

*africana (capensis)* Haw., afrikanische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*myriacantha* Haw., vielstachelige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

V. *Grandiflorae* Salm. (*genuinae*).

*abyssinica* Lam., abyssinische, 4. k. t. Afrika.

*acuminata* Haw. (*humilis* Sims.), zugespitzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*africana* Haw., afrikanische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*albispina* Haw., weißstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*alboincincta* Haw., weißsumgürtete, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*arabica* Lam., arabische, 4. k. t. Arabien.

*arborescens* Mill., DC., baumartige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*aristata* Haw., begrannete, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*brevifolia* Haw., kurzblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*caesia* Salm., hechtblaue, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*chinensis* Haw., chinesische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*ciliaris* Haw., gefranzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*Commelini* W., (*mitraeformis* DC.) Commelin's, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*depressa* Haw. (*serra* W.), niedergedrückte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*dichotoma* L. suppl., gabelästige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*distans* Haw., entferntstehende, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *reflexa* Salm.

*echinata* W., igelborstige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*ferox* DC., starkbewehrte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*flavispina* Haw., gelbstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*frutescens* Salm., strauchige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*glaucia* Mill., blaugrüne, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*gracilis* Haw., schlanke, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*humilis* Thbg., niedrige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*incurva* Haw., einwärtsgekrümmte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.



## Aloë

*latifolia* Haw., breitblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
*lineata* Haw., linirte, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*micracantha* Sims., kleinstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*mitraeformis* Ait., mützenförmige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*nobilis* Haw., edle, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*pallescens* Haw., bleiche, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*paniculata* Jcq., rispenblüthige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*picta* DC., bemalte, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *glauclior* Haw. γ) *magnidens* Haw. (? *grandidentata*).

*plicatilis* Ait., fächerblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*pluridens* Haw., vielzähnlige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*principis* Haw., fürstliche, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*prolifera*, Salm, Haw. (*brevifolia* W.), sprossende, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *major*.

*pseudoafricana* Salm, unächte afrikanische, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *angustior*.

*pseudoferox* Salm, rothstachelige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*rubescens* DC., rothfarbige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*Serra*, DC., sägeblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*serrulata* Sims., feingesägte, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*socotrina* DC., Socotra, f. k. t. Insel Socotra, Arabien.

*spicata* L. suppl., ährige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*spinosior* Haw., starkstachelige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*stenophylla*\*, schmalblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*striatula* Haw., wenigstreifige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*suberecta* Haw., fastaufrechte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *semiguttata* Haw.

*subtuberculata* Haw., wenighöckerige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*supralaevis* Haw., halbglatte, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*tenuifolia* Haw., dünnblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*tenuior* Haw., dünnere, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*tuberculata* Haw., höckerige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*umbellata* DC., doldige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *lutea striata*.

*variegata* L., bunte, 4. f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*virens* Haw., grünliche, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*vulgaris* DC., gemeine, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*xanthacantha* W., gelbstachelige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*angustifolia* Haw. v. *stenophylla*. *barbadensis* Mill. v.

*vulgaris*. *hexapetala* Salm v. *Lomatophyllum* Jacquini.

*hyacinthoides* L. v. *Sansevieria zeylanica*. *macra* Haw.

v. *Lomatophyllum macrum*. *maculosa* Lam. (*maculata*

Hort.) v. *umbellata*. *marginalis* DC. v. *Lomatophyllum*

*borbonicum*. *obscura* Haw. vid. *picta*. ? *purpurascens*

Haw. vid. *rubescens*. *purpurea* Lam. vid. *Lomato-*

*phyllum borbonicum*. *rhodacantha* DC. v. *glauca*.

*rufocincta* Haw. vid. *Lomatophyllum rufocinctum*.

*saponaria* Haw. v. *umbellata*. *Uvaria* L. v. *Tri-*

*tomanthe Uvaria*. *vera* Lam. v. *rubescens*.

**Alomia** Kunth., Ohnling, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

**Alomia**

*ageratoides* Kunth., leberbalsamähnlicher, 4. k. Neu-spanien.

**Alonsoa** R. et P. (Zanoni Alonso, spanischer Beamter zu Santa Fé de Bogota), XIV. II., Personatae-Veroniceae.

*acutifolia* R. et Pav., spitzblättrige, ♂. ♀. t. Neugranada, Peru.

*caulialata* R. et Pav., flügelstängelige, ♂. t. Peru, Caracas.

*incisifolia* R. et Pav., schlitzbilätterige, ♂. ♀. t. Südamerika.

*linearis* H. Kew., linienblättrige, ♀. t. Südamerika.

β) *grandiflora* Hortul. (*hybrida*, *intermedia* Lod.).

**Alopecurus** L., Fuchsschwanz, III. II., Gramineae.

*agrestis* L., Acker-F., ☉. f. Europa, Asien.

*alpinus* Sm., Alpen-F., 4. f. Schottland, Nordamerika.

*angustifolius* Sibth., Sm., schmalblättriger, 4. f. Osteuropa, Taurien, Caucasus.

*brachystachys* MB., kurzähriger, 4. f. Sibirien.

*bulbosus* Gouan, knolliger, 4. f. England, Frankreich.

*colobachnoides* Trin., sibirischer, 4. f. Sibirien.

*creticus* Trin., cretischer, ☉. f. Istrien, Dalmatien, Griechenland.

*echinatus* Thbg., igelborstiger, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.

*fulvus* Sm., fahlgelber, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

*geniculatus* L., geknieter, 4. Wa. f. Europa, Mittel-asien, Nordamerika.

*Gerardi* Vill., Gerard's, 4. f. Südeuropäische Alpen.

*lanatus* Sm., wollblättriger, 4. f. Griechenland, Bithynien.

*lasiostachyus* Lk., wollähriger, 4. f. Spanien.

*macrostachyus* Poir., großähriger, 4. f. Barbarei.

*nigricans* Hornem., schwärzlicher, 4. f. Deutschland, Schweden, Rußland.

*pratensis* L., Wiesen-F., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*ramosus* Poir., ästiger, 4. f. Carolina.

*utriculatus* Pers., schlauchförmiger, ☉. f. Südeuropa.

*arundinaceus* Poir. v. *nigricans*. *capitatus* Lam. v.

*Gerardi*. *foliosus* Clark v. *angustifolius*. *indicus* L.

v. *Penicillaria ciliata*. *monspeliensis* L. v. *Polypogon monspeliensis*.

*Pallasii* Trin. v. *angustifolius*.

*paludosus* P.B. v. *fulvus*. *repens* MB. v. *nigricans*.

*ruthenicus* Weinm. v. *nigricans*. *subaristatus* Mchx.

v. *fulvus*.

**Aloysia** Orteg., Punschpflanze (Maria Louisa, Königin von Spanien), XIV. II., Labiatae-Verb.

*citriodora*, citronenduftende, ♀. k. Chili, Peru.

**Alpinia** Plum. (Prosper Alpini, italien. Naturforscher), I. I., Scitamineae.

*Allughas* Rosc., Allughas, 4. w. Bengalen, Ceylon.

*aromatica* Jcq., gewürzhafte, 4. w. St. Domingo, Guiana.

*auriculata* Rosc., geöhrte, 4. w. Molucken.

*bracteata* Roxb., deckblättrige, 4. w. Bengalen.

*calcarata* Rosc., spornblumige, 4. w. Coromandel, China.

*Cardamomum* Roxb., Kardamomen, 4. w. Malabar.

*cernua* Ker., geneigte, 4. w. Ostindien.

*difissa* Rosc., zweispaltige, 4. w. China.

*Galanga* Sw., Galgand, 4. w. China, Ostind., Sumatra.

## Alpinia

linguaeformis Roxb., zungenförmige, 4. w. Bengalen.  
magnifica Boj., prächtige, 4. w. Mascarenas (St. Mauritius).

malaccensis Rosc., malaccische, 4. w. Malacca, Java.  
media Spgl., mittlere, 4. w. Silhet (Ostindien).

mutica Roxb., ungespornte, 4. w. Ostindien.

nutans Rosc., nickende, 4. w. Ostindien.

occidentalis Sw., westindische, 4. w. Jamaica, Hispaniola.

penicillata Rosc., pinselförmige, 4. w. China.

punicea Roxb., hochrothe, 4. w. Sumatra.

racemosa Sw., traubige, 4. w. Antillen.

Roscoeana R. et S., Roscoes, 4. w. Ostindien.

spicata Roxb., ährige, 4. w. Sumatra.

*alata* Diet. vid. *Roscoeana*. *caribaea* G. vid. *racemosa*. *comosa* Jacq. v. *Costus comosus*. *exaltata* Meyer v. *Renealmia exaltata*. *jamaicensis* G. vid. *occidentalis*. *multicaulis* Aubl. v. *aromatica*. *spiralis* Jacq. vid. *Costus spiralis*. *striata* H. Engl., Lk. v. ? *tubulata* Ker. v. *Renealmia exaltata*.

**Alsine** L., Wahlenb., Miere, X. (v.). III. Caryophyllaceae - Alsineae.

I. *Spergularia* Pers., Presl. (*Stipularia* Haw., *Lepigonum* Fries).

canadensis Pers., canadische, ☉. f. Nordamerika.

glandulosa Jacq., drüsige, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.

glutinosa MB., klebrige, ☉. f. Rußland.

marina Koch, Strand-M., ☉. f. Europa.

α) minor (*salina* Presl.).

β) obesior (*marginata* DC. *marina* Wahlenb.).

molluginea Lagasc., weichlingartige, ☉. f. Neuspanien.

prostrata Forsk., Delil., gestreckte, ☉. f. Aegypten.

purpurea Pers., purpurfarbige, ☉. f. Spanien.

radicans Presl., wurzelnde, ☉. f. Sicilien.

rubra Wahlenb., rothe, ☉. f. Europa, Nordafrika.

segetalis L., Saat-M., ☉. f. Norddeutschland, Belgien, Frankreich.

succulenta Delil., fleischige, ☉. f. Aegypten.

II. *Honckenia* Ehrh. (*Halianthus* Fries., *Adenarium* Rafin.).

peplodes Wahlenb., peplisähnliche. Am Strande, vorzüglich der nordischen Meere.

III. *Sabulina* Rchb. (*Arenaria* m. Sering).

aretoides Koch, aretiaähnliche, 4. f. Obersteyermärker und tyroler Alpen.

austriaca Koch, österreichische, 4. f. Oesterr., tyroler und italien. Alpen.

bannatica Rchb., (Sabul.) bannatische, 4. f. Bannat.

biflora Wahlenb., zweiblumige, 4. f., Lappland.

caespitosa Rchb., (Sabul.), Rasen-M., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen und Voralpen.

β) Gerardi Wahlenb. (*saxatilis* Wahlenb.).

fasciculata Gouan, büschelförmige, ☉. f. Südfrankreich, Griechenland.

glomerata MB., knaulförmige, ☉. f. Taurien.

graminifolia Rchb. (Sabul.), grasblättrige, 4. f. k. Italien, Dalmatien.

hirsuta (*Arenaria* MB.), rauchhaarige, 4. f. Caucasus..



## Alsine

*imbricata* MB., dachziegelförmige, 4. f. Caucasus.

*Jacquini* Koch, Jacquin's, ☉. f. Ost- u. Süddeutschland, die Schweiz und Italien.

*lanceolata* Koch, lanzettblättrige, 4. f. Krainer, tyroler und italien. Alpen.

α) *cherlerioides* Vill. (*condensata* Koch). β) *flacida* Fröl, γ) *rupestris* Scop. (*Stellaria*).

*laricifolia* Wahlenb., lerchenblättrige, 4. f. Mittel- u. osteuropäische Alpen.

β) *glandulosa* Koch.

*macrocarpa* (*Arenaria* Pursh.), großfrüchtige, ♂. f. Nordamerika.

*mucronata* L., weichspitzige, ☉. f. Südeuropa.

*pinifolia* (*Arenaria* MB.), nadelblättrige, 4. f. Caucasus.

*recurva* Wahlenb., zurückgekrümmte, 4. f. Mittel- u. osteuropäische Alpen.

*rostrata* Koch, geschnäbelte, 4. f. England, südliche Schweiz, Frankreich.

*rubella* Wahlenb., röthliche, 4. f. Schweden, Norwegen, Schottland, Grönland.

*sedoides* Fröhl., sedumähnliche, 4. f. Tyrol, England.

*setacea* Koch, borstenblättrige, 4. f. Mittel- u. Ost-Deutschland, Ungarn, Frankreich.

β) *frutescens* Kit.

*stricta* Wahlenb., steife, 4. f. Lappländische, baierische, tyroler und schweizer-Alpen.

*tenuifolia* Wahlenb., feinblättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *viscosa* Schreb.

*verna* Bartl., Frühlings-M., ♂. 4. f. Deutschland, Ungarn, Illyrien.

*Villarsii* Koch, Villar's, 4. f. Kärnthen, südliche Schweiz. Oberitalien, Frankreich.

β) *villosula*.

*villosa* (*Arenaria* Fisch.), zottige, 4. f. Sibirien.

*fasciculata* M. et K. v. *Jacquini*. *fastigiata* Rchb.

v. *Jacquini*. *media* L. v. *Stellaria media*. *mucronata* Lam. v. *Jacquini*.

**Alsodea** A. P. Thou., Laubveilchen, V. 1., Violaceae.

*latifolia* Thou., breitblättriges, ♀. w. Madagascar.

*pauciflora* Thour., wenigblumiges, ♀. w. Madagascar.

**Alsophila** RB., Hainfarn, XXIV. 1., Pteroideae - (Polypodiaceae).

*australis* RB., neuholländischer, 4. t. w. Neuholland. Van Diemes-Land.

*munita* Kaulf., bewaffneter, 4. ♀. w. Brasilien.

**Alstonia** R.B., (C. Alston, Prof. d. Med. zu Edinburgh), V. 1., Contortae-Apocynae.

*neriifolia* Wall., oleanderblättrige, ♀. t. Nepal.

*scholaris* RB., Schüler-A., ♀. w. Ostindien, Molucken.

*oleandraefolia* Lodd. v. *scholaris*.

**Alstonia theaeformis** L. suppl. v. *Symplocos Alstonia*.

**Alstroemeria** L., (C. Alstroemer, schwed. Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Amaryllideae).

*acutifolia* Lk. et Otto, spitzblättrige, 4. Kn. k. f. b. Südamerika.

*aurantiaca*, D. Don. (*versicolor* variet.), orangenfarbige, 4. Kn. k. Chili.

*aurea* H. Berol., goldgelbe, 4. Kn. k. t. Chili.

**Alstroemeria**

- Barclayana Hook, Barclay's, 4. Kn. w. ?  
 Berteroniana Penny., Bertero's, 4. Kn. t. Chili.  
 bicolor Ait., zweifarbige, 4. Kn. w. Chili.  
 chilensis J. C., chilesische, 4. Kn. t. Chili.  
 edulis J., efsbare, C. Kn. Sch., 4. Trinidad.  
 Errebaulti C. Bel., Errebault's, 4. Kn. k. t. Chili.  
 flos Martini, Ker., Martinsblume, 4. Kn. k. t. Chili.  
 haemantha R. et P., blutrother, 4. Kn. k. t. Chili.  
 hirtella Kunth, kurzhaarige, 4. Kn. Sch. k. t. Mexico.  
 Hookeri Swt., Hooker's, 4. Kn. k. t. Chili.

β) pallida J. C. (?pallida Grah.).

- Ligtu L., rachenförmige, 4. Kn. k. t. Lima.  
 lineatiflora R. et P., gestrichelte, 4. Kn. k. t. Peru.  
 Neillii Gill., Neill's, 4. Kn. k. t. Chili (Mendoza).  
 ovata Cavan., eiförmige, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.  
 pallida Grah., bleiche, 4. Kn. Sch. k. t. Chili.  
 pauciflora Kunth, wenigblumige, 4. Kn. Sch. k. t. Neu-  
 granada.

- Pelegriana L., stolze, 4. Kn. k. t. Peru, Chili.

β) alba.

- pilosa Lindl., behaarte, 4. Kn. k. t. Chili.  
 psittacina Lehm., Papageien-A., 4. Kn. k. t. Mexico.  
 purpurea R. et P., purpurfarbige, 4. Kn. Sch. k. t.  
 Peru.

- revoluta R. et P., zurückgerollte, 4. Kn. k. t. Chili.

- rosea R. et P., rösafarbige, 4. Kn. Sch. k. t.  
 Peru.

- Salsilla L., windende, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.

- secundifolia R. et P., einseitsblättrige, 4. Kn. k. t. Peru.

- Simsii Swt., Sim's, 4. Kn. k. t. Peru, Chili.

- tomentosa R. et P., filzige, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.

- tricolor Hook, dreifarbige, 4. Kn. t. Chili.

- versicolor R. et P., verschiedenfarbige, 4. Kn. t. Chili.

Hookeriana Spgl. vid. Simsii. oculata Lodd. vid.

Salsilla. pulchella Sims v. Hookeri. Simsii Spgl.

v. Hookeri. rosea Hook v. Simsii.

**Alternanthera** Forsk., RB., Wechselstaubbeutel, V. I.,  
 Aizoideae-Amaranthaceae.

- axillaris DC., achselblumiger, ☉. m. f. ?

- Achyrantha RB., spreublumiger, 4. w. Westindien, Süd-  
 amerika.

- canescens H. B. K., weißgraulicher, 4. w. Cumana.

- caracasana H. B., Caracas, ♂ w. Südamerika.

- ficoides RB., zaserblumenartiger, ♂. 4. w. Westindien.

- frutescens R. B., strauchiger, ♂. t. Peru, Lima.

- polygonoides RB., knöterichähnlicher, 4. t. Südamerika.

- procumbens R. et P., niederliegender, ♂. 4. w. Brasilien.

- sericea H. B. K., seidenhaariger, 4. w. Quito.

- sessilis RB., stielloser, ☉. m. f. Ostindien.

nodiflora RB. v. ? caracasana. repens Lk. v. Achy-  
 rantha. spinosa R. et S. v. axillaris.

**Althaea** L., Eibisch, Wintermalve (Heilmalve), XVI.  
 VIII. Malvaceae.

I. Althaeastrum.

- cannabina L., hanfblättriger, 4. f. Südfrankreich, Ita-  
 lien, Oesterreich, Ungarn, Dalmatien, Siebenbürgen,  
 Podolien, Taurien.

- hirsuta L., rauhaariger. ☉. f. Südeuropa, England.

- Ludwigii L., Ludwig's, ☉. f. Sicilien, Aegypten.

*narbonensis* Pourr., südfranzösischer, m. f. Südfrankreich, Spanien.

*officinalis* L., gebräuchlicher, 4. f. Deutschland, die Schweiz, Frankreich, England, Caucasus.

*taurinensis* DC., turiner, 4. f. Oberitalien.

## II. Alcea.

*acaulis* Cav., stengelloser, ☉. f. Syrien.

*caribaea* Sims, caribäischer, ♂. w. Westindien.

*ficifolia* Cav., feigenblättriger, ♂. Podolien, Griechenland, Kleinasien, Sibirien.

*flexuosa* Sims, vielbeugiger, 4. w. Ostindien.

*Froloviana* Fisch., Frolov's, ♂. f. Sibirien.

*leucantha* Fisch., weißblumiger, ♂. 4. Sibirien.

*pallida* WK., bleicher, ♂. f. Ungarn.

*rosea* Cav., Stockrosen-E., ♂. f. Syrien, China.

β) *biloba* DC. (*grandiflora* Hortul.).

*Sieberi* H. Berol., Sieber's, ♂. f. Sicilien.

*sinensis* Cav., sinesischer, ☉. ♂. f. China.

*striata* DC., gestreifter, ♂. f. ?

**Altingia** Noron., Rasamalabaum, XXI. x. (XXII. xiii.),  
Amentaceae-Myricaceae.

*excelsa* Nor., hoher, ♀. t. Java, Neuguinea.

**Cunninghami** G. Don. et *excelsa* Loud. v. *Araucaria*.

**Alysicarpus** Neck., Kettenfrucht, XVII. iv. (vi.),  
Leguminosae-Papilionaceae.

*bupleurifolius* DC., durchwachsblättriger, 4. w. Ostindien.

*monilifer* DC., perlschnurförmiger, 4. w. Ostindien.

*nummularifolius* DC., pfennigkrautblättriger, 4. w. Ostindien.

*styracifolius* DC., storaxblättriger, ♀. w. Ostindien.

*vaginalis* W., scheidiger, 4. w. Ostindien.

**Alyssum** T., Steinkraut, XV. i., Cruciferae.

*alpestre* L., Voralpen-St., 4. f. Mittel- und Osteuropa, Taurien.

β) *majus* (*serpyllifolium* MB.). γ) *elatius* (*alpestre*  
β *argenteum* Gaud.).

*argenteum* Vitm., silberfarbiges, 4. f. Oberitalien, Banat, Siebenbürgen, Dalmatien, Taurien, Sibirien.

β) *murale* WK.

*atlanticum* Desf., nordafrikanisches, ♀. 4. f. k. Creta, Atlasgebürge.

*calycinum* L., gekelchtes, ☉. f. Mitteleuropa.

*campestre* L., Feld-St., ☉. f. Süd- und Osteuropa, Caucasus, Taurien.

β) *hirsutum* MB.

*gemonense* Wulff., illyrisches, 4. ♀. f. Oberkärnthen, Krain, Dalmatien.

*Marschallianum* Andr., Marschalls-St., 4. f. Taurien, Caucasus.

*micranthum* C. A. Meyer, kleinblumiges, ☉. f. Rußland.

*micropetalum* Fisch., schmalblumiges, ☉. f. Rußland.

*minimum* W., kleinstes, 4. f. Süd- und Osteuropa.

*montanum* L. Berg-St., 4. f. Mitt-, Süd- u. Osteuropa.

β) *cuneifolium* Tenore. γ) *diffusum* Tenore.

*nebrodense* Tin., sicilianisches, 4. f. Sicilien, Dalmatien.

*orientale* Ard., morgenländisches, 4. ♀. f. k. Griechenl.

β) *variegatum*.

? *procumbens* Hortul., niederliegendes, 4. f. ?



**Alyssum**

rostratum Stev., geschnäbeltes, 4. f. Bessarabien, Taurien.

savranicum Andrv., podolisches, 4. f. Podolien.

saxatile L., Felsen-St., 4. f. Deutschl., Ungarn etc. serpyllifolium Dsf., quendelblättriges, 4. f. k. Nordafrika, Spanien.

sibiricum W., sibirisches, ☉. ♂. f. Sibirien.

β) Fischerianum DC.

spathulatum Steph., spatelblättriges, 4. f. Sibirien.

umbellatum Desv., doldiges, ☉. f. Taurien.

vernale Horn, Frühlings-St., 4. f. ?

Wierzbickii Roch, Wierzbicki's, 4. f. Ungarn.

Wulfenianum Bernh., Wulfen's, 4. f. Kärnthen, Krain, Steyermark, Italien.

alpestre MB. v. Marschallianum. arenarium Lois.

vid. montanum. Bertolonii Desv. vid. argenteum.

brachystachyon MB. vid. umbellatum. campestre

Hoffm. vid. calycinum. clypeatum L. vid. Farsetia

clypeata. cretaceum Adam v. spathulatum. creti-

cum L. v. Vesicaria cretica. dasycarpon Steph. v.

Koniga dasyc. deltoideum L. v. Aubrietia delt. den-

siflorum Desf. v. Koniga densifol. dentatum Nutt.

vid. Drabaincana β. Draba W. vid. campestre β.

edentulum Kitb. v. Kon. edent. halimifolium W. v.

Koniga halimifol. illyricum W. vid. Meniocus lini-

fol. incanum L. vid. Berteroa incana. linifolium

Steph. v. Meniocus linifol. lunarioides W. v. Far-

setia lunarioides. macrocarpon DC. v. Koniga ma-

crocarpa. maritimum Lam. vid. Koniga maritima.

minimum Pall. v. Meniocus linifol. mutabile Vent.

v. Berteroa mutabilis. obliquum Sm. vid. Berteroa

obliq. obtusifolium Stev. v. argenteum. orbicula-

tum Urv. v. Berteroa orbic. paniculatum W. vid.

Neslia paniculata. parviflorum MB. vid. micropeta-

lum. podolicum Bess. vid. Schivereckia podolica.

pyrenaicum Lapeyr. vid. Koniga pyren. rupestre

Tenor. v. Koniga rupest. rupestre W. v. Kerneria

saxatilis. serpyllifolium MB. v. alpestre β. sibili-

cum Trevir. v. Koniga dasycarpa. sinuatum L. v.

Vesicaria sinuata. spathulatum Adam v. argenteum.

spinosum L. v. Koniga spinosa. strictum W. vid.

Koniga densiflora. tortuosum Kit. v. alpestre. utri-

culatum L. vid. Vesicaria utriculata. Vesicaria L.

v. Vesicaria reticulata.

**Alyxia** Banks, Alyxia, V. 1. (II.), Contortae-Apocynae.

buxifolia RB., buchsbaumblättrige, f. t. Neuholland.

daphnoides Cun., seidelbastblättrige, f. t. Norfolk.

Forsteri Cun., Forster's, f. t. Norfolk.

pugioniformis Cun., dolchblättrige, f. t. Neuholland.

ruscifolia RB., mäusedornblättrige, f. t. Neuholland.

spicata RB., ährige, f. t. Neuholland.

Richardsonii Swt. vid. ruscifolia.

**Alzatea** R. et P. (J. A. de Alzate, spanischer Naturfor-

scher), V. 1., Evonymae-Celastrineae.

verticillata, wirtelförmige, f. t. Peru.

**Amaranthus** T., Amaranth (Fuchsschwanz), XXI. v.

(V. II.), Aizoideae - Amaranthaceae.

albus L., weißer, ☉. f. Pennsylvanien. Oberitalien.

angustifolius MB., schmalblättriger, ☉. f. Iberien.

**Amaranthus**

- atropurpureus Roxb., dunkelpurpurfarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- bicolor Nocca, zweifarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- Blitum L., Spinat-A, ☉. f. Europa.
- β) adscendens Loisel.
- bullatus Bess., bauschiger, ☉. f. ?
- campestris W., Feld-A., ☉. f. m. Ostindien.
- caracasanus Kunth, Caraccas-A, ☉. f. m. Südamerika.
- Caracu Zucc., Caracu-A, ☉. f. Südamerika.
- caudatus L., geschwänzter, ☉. f. Mittel- u. Südasien.
- β) maximus.
- celosioides Kunth., hahnekammähnlicher, ☉. f. Südamerika.
- chlorostachys W., grünähriger, ☉. f. ?
- cruentus L., schmutzrother, ☉. f. China.
- curvifolius Spgl., krummblättriger, ☉. f. Caucasus.
- deflexus L., herabgebeugter, ☉. f. ?
- fasciatus Roxb., bandirter, ☉. f. m. Ostindien.
- flavus L., hellgelber, ☉. f., Ostindien.
- frumentaceus Roxb., Getreide-A, ☉. f. m. Ostindien.
- gangeticus L., bengalischer, ☉. f. Ostindien.
- gracilis Poir., schlanker, ☉. f. m. Guinea.
- graecizans L., virginischer, ☉. f. Virginien.
- hybridus L., Bastard, ☉. f. Virginien.
- β) hecticus W.
- hypochondriacus L., düsterer, ☉. f. Virginien.
- inamoenus W., häßlicher, ☉. f. Japan.
- incomtus W., ungeputzter, ☉. f. ?
- interruptus RB., unterbrochenähriger, ☉. f. Neuholland.
- laetus W., freudiger, ☉. f. Italien.
- lanceaefolius Roxb., lanzettblättriger, ☉. f. m. Ostind.
- lineatus RB., linirter, ☉. f. Neuholland.
- lividus L., leichenfarbiger, ☉. f. Virginien.
- mangostanus L., ostindischer, ☉. f. Ostindien.
- melancholicus L., melancholischer, ☉. f. Ostindien.
- morosus Rchb., wunderlicher, ☉. f. Oberitalien.
- oleraceus L., Gemüße-A., ☉. f. Ostindien.
- pachystachys Rchb., dickähriger, ☉. f. ? Südeuropa.
- paniculatus L., rispiger, ☉. f. Nord- u. Südamerika.
- polygamus L., vielehiger, ☉. f. Ostindien.
- polygonoides L., knöterichartiger, ☉. f. Ost- u. Westindien.
- polystachys W., vielähriger, ☉. f. Ostindien.
- prostratus Balb., hingestreckter, ☉. f. Oesterreich, Litorale, Oberitalien, Frankreich.
- pumilus Nutt., niedriger, ☉. f. Nordamerika.
- retroflexus L., zurückgeschlagener, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Nordamerika.
- sanguineus L., blutrother, ☉. f. m. Westindien.
- scandens L., klimmender, ☉. f. Südamerika.
- speciosus Ker, Sims, prächtiger, ☉. f. Nepal.
- spinosus L., stacheliger, ☉. f. m. Westindien.
- strictus W., steifer, ☉. f. ?
- sylvestris Desf., wilder, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
- tenuifolius W., dünnblättriger, ☉. f. m. Ostindien.
- tricolor L., dreifarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- tristis L., trauriger, ☉. f. m. China, Ostindien.
- viridis L., grünlicher, ☉. f. m. Jamaika, Brasilien.

## Amaranthus

*Acroglochin* v. *Acroglochin chenopodioides*. *cauliflorus* Lk. vid. *Acroglochin chenopodioides*. *dianthus* Spgl. vid. *Acroglochin chenopod.* *laxiflorus* Comoll. v. *retroflexus*. *littoralis* Host v. *sylvestris*. Noch werden nachstehende in das System nicht aufgenommene, zum Theil zweifelhafte Arten oder Hybriden in den Gärten kultivirt: *aureus* Dietr., *bahiensis* Bess., *Berchtoldi* Seidel, *canariensis* H. Dorpat, *carneus* Tausch., *capitatus* Hort., *clavatus* Bess., *decorus* Tausch., *giganteus* Dietr., *gongilodes* H. Turin., *incarnatus* Hort., *lucidus* Bess., *mollissimus* H. Gryph., *rigidus* Schulz, *rotundatus* Bess.

## Amaryllis L.; Amaryllenschwertel, VI. 1. Narcisseae-Amaryllideae.

*acuminata* Ker, zugespitzter, 4. Zw. w. Südamerika.

Hybriden und Varietäten: a) *aurantiaca*, b) *inconspans*, c) *longipedunculata*, d) *major*, e) *nobilis*, f) *platypetala*, g) *spuria*, h) *venosa* etc.

*advena* Ker, gefranzter, 4. Zw. w. Chili.

β) *cerina*.

*aulica* Ker, Kronen-A., 4. Zw. w. Brasilien.

Varietäten: α) *nervosa*, β) *platypetala*.

*Belladonna* L., Frauen-A., 4. Zw. t. f. b. Westindien, Cap der gut. Hoffnung.

β) *major*.

*blanda* Ker, lieblicher, 4. Zw. t. f. b. Cap d. g. Hoffn.

*calyptrata* Ker, haubenförmiger (grünblumiger), 4. Zw. w. Brasilien.

*crocata* Ker, safranfarbiger, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid.: b) *ardens*, c) *Brockesii*, d) *Cooperi*, e) *rigida*.

*equestris* Jacq., Ritter-A., 4. Zw. w. Westindien, Südamerika.

β) *major*. γ) *plena*.

*flammea* R. et P., feuerfarbiger, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffnung.

*Forbesii* Lindl., Forbes's, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *purpurea*.

*formosissima* L., wohlgestalteter, 4. Zw. t. Mittägliche Amerika.

*fulgida* Ker, leuchtender, 4. Zw. w. Brasilien.

β) *vittata*.

*Johnsonii* Swt., Johnson's, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. u. Variet.: b) *augusta*, *concinna*, d) *discolor*, e) *praeclara*, f) *Sweetii*, g) *tricolor* (*beata*), h) *tristis*.

*kermesina* Booth, karminrother, 4. Zw. w. Brasilien.

*lineata* Coll., gestrichelter, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn. u. Südamerika.

Hybrid.: *pulchra*, *variabilis*.

*miniata* R. et P., mennigrother, 4. Zw. w. Peru.

*nervosa* Humb., nerviger, 4. Zw. t. Mexico.

*pallida* Herb., bleicher, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

*peruviana* Ker, peruvianischer, 4. Zw. w. Peru.

*Principis* Salm., fürstlicher, 4. Zw. w. Brasilien.

*psittacina* Ker, Papageien-A., 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. und Variet.: b) *campanulata*, c) *canaliculata*, d) *Griffini*, e) *multistriata*, f) *pretiosa*,



## Amaryllis

g) quadricolor, h) recurviflora, i) retiflora, k) retinervia, l) sexmaculata, m) tortuosa.

*pudica* Ker, schamhafter, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*Reginae* L., königlicher, 4. Zw. w. Westindien, Südamerika.

Hybrid. u. Variet.: *brasiliensis* Andr., *Hoodii*, *intermedia*, *pulverulenta*, *vittata* etc.  
*reticulata* Ait., genetzter, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid.: *Colvillii*, *gloriosa*, *pulchra* etc.  
*rutula* Ker., hochrother, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. und Variet.: *attenuata*, *micans*, *punctata*, *sanguinea*, *splendens*, *vittata* etc.

*solandraeflora* Lindl., *solandrablüthiger*, 4. Zw. w. Cayenne.

Hybrid. und Varit.: *Haglockii*, *Herberti*, *purpurascens*, *rubro-sriata*.

*striatifolia* Swt., gestreiftblättriger, 4. Zw. w. Brasilien.  
*stylosa* Sims, langgriffeliger, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. u. Variet.: *Highcleriana*, *lugubris* etc.  
*tatarica* Pall., tatarischer, 4. Zw. k. f. b. Sibirien, Tatarei.

*tubiflora* L'Her., langröhrige, 4. Zw. w. Lima.

*vittata* Ait., bandstreifige, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn. Südamerika.

Hybrid. u. Variet.: *Carnarvoni*, *major*, *maxima*, *sinistra*, *venosa* etc.

Noch werden nachstehende zunächst von *acuminata*, *Reginae*, *reticulata* etc. erzielte Hybriden cultivirt: *accedens*, *anabilis*, *amoena*, *Andersonii*, *Annesleyana*, *atrorubens*, *bracteata*, *breviflora*, *brevifolia*, *Caeciliana*, *carnescens*, *coccinea*, *compacta*, *consanguinea*, *consobrina*, *costata*, *crispiflora*, *cuprea*, *decora*, *delecta*, *dioica*, *expansa*, *fulva*, *glaucescens*, *grandiflora*, *ignescens*, *imbuta*, *imperialis*, *lateritia*, *macrantha*, *mutabilis*, *nervifolia*, *obscura*, *pallascens*, *palliiflora*, *patens*, *patentissima*, *phoenicea*, *princeps*, *recurvata*, *ringens*, *roseo-alba*, *rubescens*, *rubicunda*, *rubro-crocea*, *rugosa*, *spathacea*, *stenantha*, *striatiflora*, *sulcata*, *superba*, *tortuliflora*, *umbellata*, *undulaeflora*, *Valleti*, *variegata*, *versicolor*, *vittifera*, *Wellsiana* etc.

*Atamasco* L. vid. *Zephyranthes Atamasc.* *aurea* Ait. v. *Nerine aur.* *aurea* R. et P. v. *peruviana.* *australasica* Ker (*australis* Spgl.) v. *Crinum flaccidum.* *bifida* Spgl. v. *Habranthus bifidus.* *candida* Ker v. *Zephyranthes cand.* *capensis* L. v. *Hypoxis stellata.* *capensis* Mill. vid. *Crinum capens.* *carinata* Spgl. vid. *Zephyranthes carinata.* *Carolinæ* H. Monac. vid. *striatifolia.* *caspia* W. v. *Allium caspium.* *chloroleuca* Ker. vid. *Zephyr. chlorol.* *ciliaris* L. v. *Brunsvigia cil.* *citrina* Im. vid. *Sternbergia citrina.* *clavata* L'Her. v. *Gastronema clavat.* *Clusiana* Sims v. *Sternbergia Clusian.* *coranica* Burch. vid. *Brunsvig. coran.* *corusca* Ker v. *Nerine corusc.* *crispa* Jacq. vid. *Strumaria crisp.* *curvifolia* Jacq. vid. *Nerine curvifol.* *cyrtanthoides* Sims v. *Phycelia cyrtanth.* *disticha* L. suppl. vid. *Brunsvig. toxicaria.* *elata* Jacq. v. *Vallota purpurea.* *exigua* Schousb. v. *Sternberg. exigua.* *fulca-*

## Amaryllis

*ta* Ait. v. *Brunsvig. falcata*. *flexuosa* Jacq. v. *Nerine flexuosa*. *Fothergillia* Andr. v. *Nerine curvifolia*. *gigantea* Ait. v. *Crinum* gigant. *gracilis* Spgl. vid. *Habranthus gracilifolius*. *humilis* Jacq. vid. *Nerine humil.* *hyacinthina* Ker vid. *Griffinia hyacinthin.* *ignea* Lindl. v. *Phycelia ign.* *insignis* Ker v. *Crinum insign.* *intermedia* Spgl. v. *Griffinia intermed.* *Josephinae* Redout. v. *Brunsvigia* Joseph. *laticoma* Ker. v. *Brunsvig. lucida*. *latifolia* L'Her. v. *Crinum latifol.* *longifolia* Ait. v. *Crinum capense*. *lutea* L. vid. *Sternbergia lutea*. *maranensis* Ker vid. *stylosa*. *marginata* Jcq. v. *Brunsvigia marg.* *minuta* Humb. vid. *Zephyranthes grandiflora*. *moluccana* Ker vid. *Crinum moluccanum*. *montana* La Bill. v. *tatarica*. *orientalis* L. v. *Brunsvigia multiflora*. *ornata* Ait. v. *Crinum distichum*. *pulchella* Spgl. v. *Nerine pulchella*. *pumila* Spin. vid. *Zephyranthes pum.* *Pumilio* Ait. v. *Gastronem. Pumil.* *purpurea* Ait. vid. *Vallota purp.* *radiata* Ait. v. *Nerin. rad.* *Radula* Jcq. vid. *Brunsvigia Radul.* *revoluta* Ait. v. *Crinum Herberti*. *rosea* Spgl. vid. *Zephyranthes rosea*. *sarniensis* L. v. *Nerine sarniensis*. *speciosa* L'Her. v. *Vallota purpurea*. *spectabilis* Andr. vid. *Crinum Broussoneti*. *spectabilis* Lodd. vid. *Johnsonii*. *stellaris* Jacq. vid. *Strumar. stellar.* *striata* Jcq. v. *Brunsv. striata*. *subbarbata* Sims v. *miniata*. *Umbella* L'Her. v. *Cyrtanthus obliquus*. *undulata* Jcq. v. *Nerine undul.* *variabilis* Jcq. v. *Belladonna*. *venusta* Ker vid. *Nerine ven.* *versicolor* Spgl. v. *Habranthus versic.* *zeylanica* L. v. *Crinum zeylan.*

**Amasonia** L. (Thomas Amason, amerikanischer Reisender), XIV. II. Labiatae - Verbenaceae.

*punicea* Vahl, hochrothe, ♀. w. Trinidad.

*erecta* L. v. *Taligalia campestris*.

*Ambinux* Commers. v. *Aleurites triloba*.

*Ambirion camtschatense* H. Berol. v. *Fritillaria camt.*

**Ambrosia** T., Götterspeise (Traubenkraut), XXI. v. Compositae - Ambrosiaceae.

*artemisifolia* L., beifußblättriges, ☉. f. Nordamerika,

*bidentata* Mchx., zweizähmiges, ☉. f. Nordamerika, Portorico.

*cumanensis* Kunth, Cumanisches, ☉. f. Cumana.

*elatio* L., erhabenes, ☉. f. Nordamerika.

*heterophylla* Mühlenb., verschiedenblättriges, ☉. f. Nordamerika.

*integrifolia* Mühlenb., ganzblättriges, ☉. f. Nordamerika.

*maritima* L., Meerstrands-T., ☉. f. Nordamerika,

*paniculata* Mchx., rispiges, ☉. f. Nordamerika,

*tenuifolia* Spgl., feinblättriges, ☉. f. Monte Video.

*trifida* L., dreispaltiges, ☉. f. Nordamerika.

*absynthifolia* Dsf. vid. *heterophylla*. *peruviana* W. v. *heterophylla*.

**Amelanchier** Med., Beermispel, XII. II. Rosaceae - Pomaceae.

*Botryapium* DC., Trauben-B., ♀. f. Nordamerika.

*florida* Lindl., reichlichblühende, ♀. f. Nordamerika.

β) *parvifolia* Loud.

**Amelanchier**

*orbicularis* Bork., kreisblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Salzburg, Tyrol, Griechenland.

*ovalis* DC., eiblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *subcordata* DC.  $\gamma$ ) *semiintegrifolia* Hook.

*sanguinea* DC., blutrothe,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*vulgaris* Mch., gemeine,  $\frac{1}{2}$  f. Mitteleuropa.

**Amellus** L., Sternbläuling, XIX. II. Compositae-Corymbiferae.

*annuus* W., jähriger,  $\odot$  f. Cap der guten Hoffnung.

*Lychnitis* L., Lichtnelken-St.,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der g. H.

*tenuifolius* Burm. Lam., feinblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Cap d. g. H.

*alternifolius* Roth. v. *annuus*. *pedunculatus* Orteg.

v. *Tridax procumbens*. *spinulosus* Pursh v. *Aplopappus spinulos*.

*umbellatus* L. v. *Liabum Brownei*,

*villosus* Pursh v. *Chrysopsis villosa*.

**Amerimum** Br., Blatthülse, XVII. IV, (VI.) (XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae.

*Brownei* Jacq., Brown's B.,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

*strigosum* H. B. K., striegelhaarige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*Ebenus* Sw. v. *Brya Ebenus*, *latifolium* W. v. *Lonchocarpus latifolius*.

**Amethystea**, Amethystkraut. II. I. Labiatae.

*coerulea* L., blaues,  $\odot$  f. Sibirien.

**Amherstia** Wall. (Gräfin Amherst). X. I. Leguminosae-Caesalpinieae.

*nobilis* Wall., edle,  $\frac{1}{2}$  w. Martaban (Ostindien).

**Amicia** H. B. K. (J. B. Anici, berühmter Physiker). XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae,

*Zygomeres* DC., paarblättrige,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. t. Mexico.

*Amirola nitida* P. v. *Llagunoa nitida*.

**Ammannia** Houst. (Paul Ammann, Prof. zu Leipzig und Johann Ammann, dessen Sohn, Akademiker zu St. Petersburg), IV. I. Lythrarieae-Salicariae.

*aegyptiaca* W. ägyptische,  $\odot$  f. Aegypten.

*arenaria* Kunth, Sand-A.,  $\odot$  f. m. Caraccas.

*auriculata* W., geöhrt,  $\odot$  f. Aegypten.

*baccifera* W., beerentragende,  $\odot$  f. m. Ostindien.

*borysthenica* DC., borystenische,  $\odot$  f. Rußland (Kiew).

*caspica*, MB. Ledeb., caspische,  $\odot$  f. Rußland.

*cordata* Wight et Arn., herzförmige,  $\odot$  f. m. Ostindien.

*debilis* Ait, schwache,  $\odot$  f. Ostindien.

*densiflora* Roth, dichtblüthige,  $\odot$  f. Ostindien.

*diffusa* W., weitschweifige,  $\odot$  f. ? Ostindien.

*dodecandra* DC., zwölfmännige,  $\odot$  f. m. Senegal.

*elatinoides* DC., tännelähnliche,  $\odot$  f. m. Senegal.

*filiformis* DC., fadenförmige,  $\odot$  f. m. Senegal.

*glaucia* Wight et Arn., blaugrüne,  $\odot$  f. Ostindien.

*hastata* DC., spontonblättrige,  $\frac{1}{2}$  Wa. t. w. Peru.

*humilis* Mchx., niedrige,  $\odot$  f. Nordamerika.

*indica* Lam., indische,  $\odot$  f. m. Ostindien.

*latifolia* L., breitblättrige,  $\odot$  f. m. Westindien, Carolina.

*microcarpa* DC., kleinfrüchtige,  $\odot$  f. m. Insel Timor.

*multiflora* Roxb., vielblumige,  $\odot$  ♂ f. t. Ostindien.

*nana* Roxb., Zwerg-A.,  $\odot$  ♂ f. t. Ostindien.

*octandra* L., achtmännige,  $\odot$  ♂ f. t. Ostindien.

*pallida* Lehm., bleiche,  $\odot$  f. ?

*parviflora* DC., kleinblumige,  $\odot$  f. Ostindien.

*pentandra* Roxb., fünfmännige,  $\odot$  ♂ f. t. Ostindien.

*peplodes* Spgl., peplisähnliche,  $\odot$  f. Ostindien.



**Ammannia**

- ramosior L., ästige, ☉. f. Virginien, Carolina.  
 rotundifolia Buchan. Roxb., rundblättrige, ☉. f. Nepal,  
 Bengalen.  
 rubra Hamilt., rothe, ☉. f. Nepal.  
 sanguinolenta Sw., blutfarbige, ☉. f. Jamaica.  
 senegalensis Lam., Senegal-A., ☉. f. m. Westafrika.  
 verticillata Lam., wirtelblättrige, ☉. f. Ober- u. Mit-  
 telitalien, Ostindien, China.  
*coccinea* Pers. v. *octandra*. *purpurea* Lam. v. *ra-*  
*mosior*. *racemosa* Roth v. *auriculata*. *ramosior*  
 Torr. vid. *humilis*. *vesicatoria* Roxb. v. *baccifera*.  
*viridis* Hornem. v. *aegyptiaca*.

**Ammi** L., Sanddolde, V. II. Umbelliferae.

- acaule Spgl., stengellose, ♂. f. k. Caucasus.  
 Boeberi Hökert, Böber's, ♂. f. k. Creta.  
 glaucifolium Lapeyr., blaugrünblättrige, ♂. f. k. Süd-  
 frankreich, Griechenland.  
 majus L., grofse, ☉. f. Südeuropa, Orient.  
 Visnaga Lam., Zahnstocher-S., ☉. f. Südeuropa, Klein-  
 asien, Nordafrika, Monte Video.  
*anethifolium* Lam. v. *Torilis crinita*. *capillaceum*  
 Mchx. v. *Sison capillac.* *cicutaeifolium* W. v. *Boe-*  
*beri*. *copticum* L. v. *Trachyspermum copticum*.  
*costatum* Ell. v. *Sison capillaceus*. *ferulaceum* Lk.  
 v. *Ligusticum ferulaceum*.

**Ammobium** RB., Sandimmortelle, XIX. I. Compositae-  
Helichryseae.

- alatum RB., flügelstengeliche, 4. k. f. b. Neuholland.  
 plantagineum G. Don, wegrittblättrige, 4. k. Neuholl.  
*Ammocharis coranica* Herb. et *falcata* Herb. v. *Brun-*  
*vigia coranica et falcata*. *Ammyrsine buxifolia* Pursh  
 v. *Leiophyllum thymifolium*.

**Ammophila arenaria** Host v. *Psamma arenaria*.**Amomum** L., Kardamome, I. I. Scitamineae (Bananeae).

- aculeatum, stachliche, 4. w. Malacka.  
 Afzelii Rosc., Afzelius's-K., 4. w. Sierra Leona.  
 angustifolium Sonner., schmalblättrige, 4. w. Madagascar.  
 aromaticum Roxb., gewürzhafte, 4. w. Bengalen.  
 Cardamomum L., ächte, 4. w. Ostindien, Molucken.  
 ciliatum Blum., gefranzte, 4. w. Java.  
 dealbatum Roxb., weifslliche, 4. w. Bengalen.  
 echinatum W., igelstachelige, 4. w. Ostindien.  
 gracile Blum., schlanke, 4. w. Java.  
 grandiflorum Sm., großblumige, 4. w. Sierra Leona.  
 Grana paradisi L., Paradieskörner-K., 4. w. Guinea,  
 Malaguetta, Madagaskar.  
 heteranthum Blum., verschiedenblumige, 4. w. Java.  
 latifolium Afzel., breitblättrige, 4. w. Sierra Leona.  
 Leonurus König, Löwenschwanz-K., 4. w. Malacka.  
 maximum Roxb., größte, 4. w. Malacka.  
 Melegueta Rosc., Melegueta-K., 4. w. Demerary.  
 parviflorum Presl., kleinblumige, 4. w. Insel Luzon.  
 racenosum R. et P., traubige, 4. w. Peru.  
 scyphiphorum König, bechertragende, 4. w. Malacka.  
 sericeum Roxb., seidenhaarige, 4. w. Bengalen.  
 subulatum Roxb., pfriemenförmige, 4. w. Bengalen.  
 sylvestre Sw., wilde, 4. w. Jamaica.  
 thyrsoideum R. et P., straufsformige, 4. w. Peru.

**Amomum**

*uliginosum* König, Sumpf-K., 4. Wa. w. Ostindien.

*villosum* Lour., zottige, 4. w. Cochinchina.

*exscapum* Sims. v. *Afzelii*. *hirsutum* Lam. v. *Costus*

*speciosus*. *Mioga* Roxb. v. *Zingiber* Miog. *repens*

Sonn. v. *Alpinia* *Cardamomum*. *sylvestre* Lam. v.

*Zingiber* *Zerumbet*. *Zerumbet* König v. *Curcuma*

*Zedoaria*. *Zerumbet* L. v. *Zingiber* *Zerumbet*. *Zin-*

*giber* L. v. *Zerumbet officinale*.

*Amonia agrimonioides* Nestl. v. *Aremonia agrim.*

**Amorpha** L. Uniform, Bastard-Indigo, XVII. IV. (VI.).

(XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae.

*canescens* Nutt., weißgrauliche, ♀. f. b. Louisiana.

*croceo-lanata* Wats., gelbwollige, ♀. f. Nordamerika.

*fragrans* Swt., wohlriechende, ♀. f. Nordamerika.

*fruticosa* L., strauchartige, ♀. f. Nordamerika.

a) *angustifolia* Ph. β) *coerulea* Lodd. γ) *elata*.

δ) *emarginata* Ph. ε) *Lewisii* Lod.

*glabra* Dsf., kahle, ♀. f. Nordamerika.

*herbacea* Walt., krautige, ♀. f. b. Carolina, Florida.

*nana* Nutt., Zwerg-B., ♀. f. b. Nordamerika am Missouri.

*microphylla* Pursh v. *nana*. *pubescens* W. v. her-

*bacea*. *pumila* Mchx. v. *herbacea*.

**Ampelodesmus** Lk., Hügelrohr, III. II., Gramineae

*bicolor* Kunth, zweifarbiges, 4. f. b. k. Nordafrika.

*tenax* L., zähes, 4. f. k. Süditalien, Nordafrika.

**Ampelopsis** Mchx., wilder Wein. V. I., Viniferae.

(*Ampelideae*).

*bipinnata* Mchx., doppeltgefiederter, ♀. k. f. b. Nordamer.

*capreolata* G. Don, astrankiger, ♀. Sch. k. t. Nepal.

*cordata* Mchx., herzblättriger, ♀. f. Nordamerika.

*hederacea* Mchx., epheuähnlicher (gemeiner), ♀. Sch. f.

Nordamerika.

*heterophylla* Blume, verschiedenblättriger, ♀. Sch. w.

Java.

*hirsuta* Don, rauhhaariger, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*quinquefolia* Mchx. v. *hederacea*.

**Ampherephis** H. B. K., Doppelhülle. XIX. I., Com-

positae-Eupatorineae.

*aristata* H. B. K., begrante, ☉. ♂. f. m. w. Neu-Granada.

*intermedia* Lk., mittlere. ☉. ♂. f. m. w. Brasilien.

*mutica* H. B. K., unbewehrte, ☉. ♂. f. m. w. Neu-Granada.

**Amphicarpa** Ell., Erdhülle. XVII. IV. (VI.), Legu-

minosae-Papilionaceae.

*comosa* G. Don, schopfige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*monoica* Ell., einhäusige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*sarmentosa* Ell., wurzelrankige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

**Amphicome** Royle, Rundschof. XIV. II., Bignoniaceae.

*arguta* Royle, feinspitziger, 4. Sch. k. f. b. Himalaja.

**Amphilophium** H. B. K., Saumkelch. XIV. II., Per-

sonatae-Bignoniaceae (Bignoniaceae).

*Mutisii* H. B. K., Mutis's, ♀. Sch. w. Neu-Granada.

*paniculatum* H. B. K., rispighlumiger, ♀. Sch. w. West-

indien, Südamerika.

*pubescens* Spl., weichhaariger, ♀. Sch. w. Brasilien.

**Amphipogon** RB., Hüllbart, III. II., Gramineae.

*laguroides* RB., sammtgrasähnlicher, 4. t. Neuholland.

*strictus* RB., steifer, 4. t. Neuholland.

**Amphodus** Lind., Zahnbohne, XVII. IV. (VI.), Legu-

minosae-Papilionaceae.

**Amphodus**

ovatus Lindl., eiförmige, 4. Sch. w. Trinidad.

**Amsinckia** Lehm., Amsinckie, V. 1., Asperifoliaceae.

angustifolia Lehm., schmalblättrige, ☉. f. Nordamerika.  
 β) parviflora Bernh.

intermedia Fisch. et C. A. Mey., mittlere, ☉. f. Neu-Californien.

lycopsoides Lehm., krummhalsähnliche, ☉. f. Chili.

spectabilis Fisch. et C. A. Meyer, ansehnliche, ☉. f. Neu-Californien.

**Amsonia** Walt. (Charles Amason, amerikanischer Reisender), V. 1., Contortae-Apocynae.

angustifolia Mchx., schmalblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

latifolia Mchx., breitblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

salicifolia Pursh., weidenblättrige, 4. f. Carolina.

**Amygdalus** T. L., Mandel, XII. 1., Amygdalaceae. (*Drupaceae*).I. *Amygdalus* T.

amara Hayne, bittere, f. f. b. Orient.

campestris Bess., Feld-M., f. f. Volhynien.

cochinchinensis Lour., cochinchinesische, f. k. f. b. China, Cochinchina.

communis L., gemeine, f. f. b. Nordafrika, Griechenland, Palästina.

β) flore pleno. γ) foliis varieg.

fragilis Borkh., Krach-M., f. f. b. Orient.

β) macrocarpa.

microphylla Humb., kleinblättrige, f. k. Mexico.

nana L., Zwerg-M., f. f. Ostdeutschland, Ungarn, Rußland.

β) georgica DC. ? γ) sibirica Lodd.

orientalis Mill. Ait., morgenländische, f. f. b. Kleinasien.

pedunculata Ledeb. (Loud. hort.), gestielte, f. f. ? Asiat. Rußland.

Persico-Amygdala (compressa Hortul.), Dalech., Rchl. (Pfersichmandel), Bastard-M. f. f. b. Orient.

II. *Persica* T. Pfirsich.

Nucipersica C. Bauh. (*P. laevis* DC.), Nectarinen, f. f. b. Persien.

α) carne adhaerente. β) carne secedente.

*Persica* L. (*P. vulgaris* Mill.), gemeine P., f. f. b. Persien.

α) carne adhaerente s. duracina (a. leucocarpa.

b. xanthocarpa). β) carne secedente (a. haema-

tocarpa. b. leucocarpa. c. xanthocarpa). γ) flore

pleno. δ) flore albo. ε) foliis varieg.

*argentea* Lam. v. *orientalis*. *communis persicioides*

DC. v. *Persico-Amygdala*. *dulcis* Mill. v. *commu-*

*nis et fragilis*. *incana* Pall. v. *Prunus prostrata*.

*pumila* L. v. *Prunus japonica*.

**Amyris** L., Balsammyrte, VIII. 1., Amyrideae.

acuminata Roxb., zugespitzte, f. w. Ostindien.

brasiliensis Spgl., brasilianische, f. w. Brasilien.

heptaphylla Roxb., siebenblättrige, f. w. Ostindien.

Lunani Spgl., Lunan's, f. w. Jamaica.

maritima L. Jacq., Meerstrand's, f. w. Westindien, Brasilien.

nana Roxb., Zwerg-B., f. w. Ostindien.

? nervosa Zeyh., nervige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

Plumieri DC., Plumier's, f. w. Westindien, Carolina.

sylvatica Jacq., Wald-B., f. w. Carthagera.



**Amyris**

*Tecomaca* DC., *Tecomaca-B.*, ♀. w. Mexico.

*toxifera* L., giftige, ♀. t. Carolina.

*ambrosiaca* L. v. *Icica Tacamahaca*. *Elaphrium* Spgl. v. *Elaphrium glabrum*. *elemifera* Lam. vid. Plumieri. *enneandra* W. v. *Icica enneandra*. *gileadensis* v. *L. Balsamodendron gileadense*. *heterophylla* W. v. *Icica heterophylla* DC. *polygama* Cav. vid. *Duvaua dependens*. *tomentosa* Spgl. v. *Elaphrium tomentosum*. *zeylanica* Retz v. *Balsamodendron zeylanicum*.

**Anabasis** L., Beerensalzkraut, V. II., Aizoideae - Atripliceae (*Chenopodeae*).

*aphylla* L., blattloses, ♀. k. Mittel- und Kleinasien, Spanien, Nordafrika,

*florida* MB., blüthenreiches, ☉. f. Iberia.

*oppositiflora* Schrad., gegenständigblühendes, ☉. f. Kleinasien.

*tamariscifolia* L., tamariskenblättriges, ♀. k. Spanien.

*foliosa* L. vid. *Salsola foliosa*. *tatarica* Pall. vid. *aphylla*.

**Anacampteros** Sims., Fettblatt, XI. I., Portulacaceae.

*angustifolia* Haw., schmalblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

*arachnoides* Sims., Spinnweben-F., ♀. t. Cap d. g. H.

*filamentosa* Sims, fadiges, ♀. t. Cap d. g. H.

*intermedia* Haw., mittleres, ♀. t. Cap d. g. H.

*lanceolata* Haw., lanzettblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

*polyphylla* Haw., vielblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

*rotundifolia* Swt., rundblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

*rubens* Haw., röthliches, ♀. t. Cap d. g. H.

*rufescens* Haw., fuchsröthliches, ♀. t. Cap d. g. H.

*varians* Swt., veränderliches, ♀. t. Cap d. g. H.

*albicans* Haw. v. *Sedum albicans*. *ciliaris* Haw. v.

*Sedum spurium*. *maxima* Haw. v. *Sedum maximum*. *triphylla* Haw. vid. *Sedum Telephium* β.

*vulgaris* Haw. v. *Sedum Fabaria*.

*Anacamptis pyramidalis* Rich. v. *Orchis pyramidalis*.

**Anacardium** L., Nieren - (Acajou-)baum, IX. I. (XXIII. II., Amyrideae-Terebinthaceae (*Cassuvieae*).

*occidentale* L., westindischer, ♀. w. Westindien.

β) *indicum* DC. Ostindien.

**Anacyclus** L., Ringblume, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

*clavatus* P., keulenförmige, ☉. f. Barbarei, Sicilien.

*orientalis* L., morgenländische, ♂. f. Griechenl., Türkei.

*pedunculatus* P., gestielte, ☉. f. Barbarei.

*pulcher* Bess., schöne, ☉. ♂. f. Podolien, Volhynien, Litthauen, Thüringen.

*Pyrethrum* DC., officinelle, ♀. k. f. b. Mittelasien, Nordafrika.

*radiatus* Loisel., strahlige, ☉. f. Südeuropa, Afrika, Barbarei.

β) *purpurascens* P.

*tomentosus* DC., filzige, ☉. f. Südeuropa, Barbarei.

*valentinus* L., spanische, ☉. f. Spanien, Südfrankreich.

*alexandrinus* W. v. *Cyrtolepis alexandrina*. *anthe-*

*moides* Lagasc. v. *Lyonnetia abrotanifolia*. *aureus*

L. v. *Anthemis aurea*. *Barrelieri* Guss. v. *Anthem.*

*Barr. bicolor* P. v. *radiatus*. *creticus* L. v. *Lyon-*

*netia pusilla*. *mucronulatus* Guss. vid. *Anthem.*

**Anacyclus**

mucronul. *officinarum* Hayn. v. *pulcher. pectinatus* Bor. et Chaub. v. *Lyonnetia tenuiloba. pubescens* Rchb. v. *tomentosus*.

**Anadenia** RB., Anadenie, IV. 1. Proteaceae.

*ilicifolia* RB., stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.

*pulchella* RB., schöne, ♀. t. Neuholland.

**Anagallis** T., Gauchheil, V. 1., Primulaceae.

*arvensis* L., Acker-G., ☉. f. Europa, Mittelasiën, Cap d. g. H. Nordamerika.

β) *carnea* Schrk.

*coerulea* Schreb., blauer, ☉. f. Europa, Mittelasiën, Cap der guten Hoffnung.

*collina* Schousb., Hügel-G., ♂. ♀. t. Marocco, Sardinien.

β) *coerulea*.

*crassifolia* Thore, dickblättriger, 4. ♂. f. Westl. Frankr.

*latifolia* L., breitblättriger, ☉. f. Spanien, Ungarn.

*linifolia* L., leinblättriger, ☉. f. Spanien, Portugal.

*Monelli* L., aufrechter, ♂. ♀. t. Italien, Portug., Taurien.

β) *Webbiana* Penny. γ) *lilacina* D. Don. δ)

*Willmoreana* Bot. Mag. (Madeira).

*parviflora* Link, kleinblumiger, ☉. f. Portugal.

*repens* DC., kriechender, 4. ♂. f. Südfrankreich.

*tenella* L., zarter, 4. ♂. f. Süd- und Norddeutschland, England, Frankreich, Schweiz, Italien.

Hybrid. *Maryattae* Swt. ♀. t. *Wellsiana* Penny ♀. t.

*fruticosa* Vent. v. *collina. phoenicea* Lam. vid.

*arvensis. verticillata* All. v. *Monelli*.

**Anagyris** T., Stinkstrauch, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*foetida* L., gemeiner, ♀. k. f. b. Spanien, Italien, Sicilien.

β) *glauca*.

*latifolia* Brouss., breitblättriger, ♀. k. Teneriffa.

*chinensis* Spgl. et *foetida* Lour. v. *Macrotropis foetida. indica* Wal. v. *Piptanthus nepalensis*.

*Anamenia coriacea* Vent. v. *Knowltonia rigida. laser-*

*pitiifolia* Vent. vid. *Knowlton. vesicator. daucifol.*

Vent., *gracilis* Vent. et *hirsuta* Vent. v. *Knowlt. daucifolia* etc.

**Ananassa** Thunb. Lindl., Ananas, VI. 1., Bromeliaceae.

*bracteata* Lindl., deckblättrige, 4. w. Brasilien.

*debilis* Lindl., schwache, 4. w. ? Brasilien.

*lucida* Lindl., starkglänzende, 4. w. Südamerika.

β) *denticulata*. γ) *foliis varieg.*

*sativa* Lindl., gemeine, 4. w. Westindien, Surinam.

β) *fol. argenteo-striatis*. γ) *fol. atrorubent.*

δ) *fol. aureo-striat.* ε) *fol. incarnat. striatis.*

ζ) *fol. nigricant.* η) *fol. rubicund.* θ) *fol. vio-*

*laceo striat.* ι) *fol. viridib.* κ) *fruct. acid.*

λ) *fruct. albido.* μ) *fruct. dulcissim.* ν) *fruct.*

*maximo (new Providence).* ξ) *fruct. ovato.* ο)

*fruct. pyramidal.* π) *fruct. rubro* etc.

*semiserrata* (Bromelia W.), halbsägezähnlige, 4. w. Südamerika.

β) *fol. rubicund.*

**Anandria** Siegesb., Maßliebenlattig, XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.

*Bellidiastrum* DC., sibirischer, 4. f. Sibirien, Nordchina.

α) *vernale* Turcz. β) *autumnale* Turcz.

*Anantherix viridis* Nutt. v. *Gomphocarpus viridis*.

**Anarrhinum** Desf., Lochschlund, XIV. II., Personatae-  
\* Antirrhineae (*Scrophul.*).

*bellidifolium* W., masliebenblättriger, ♂. f. Südeuropa.  
*fruticosum* Desf., strauchiger, ♂. ♀. k. Nordafrika, Palästina.  
*pedatum* Dsf., fufsförmiger, ♂. k. Portugal, Nordafrika.

*crassifolium* W. v. *Linaria origanifolia*. ? *pubescens*  
Hort. v. *pedatum*. *tenellum* W. v. *Linaria tenella*.

**Anastatica** L., Jerichorose, XV. II., Cruciferae.

*hierochuntica* L., gemeine, ☉. f. Aegypten, Palästina.

**Anatherum** P. B., Stumpfspelze III. II. (XXIII. I.),  
Gramineae.

*muricatum* P. B., weichstachlige, 4. w. Ostindien.

**Anaxeton** Gärt. Cass., Silberkelch.

*arborescens* Gärt., baumartiger, ♀. t. Cap d. g. H.

*asperum* DC., rauher, ♀. t. Cap d. g. H.

*Anaxeton crispum* et *foetidum* G. v. *Helichrysum*  
*crispum* etc. *eximium* Schk. vid. *Helipterum* *exi-*  
*mium*. *racemosum* Schk. v. *Helichrysum mucronatum*.

**Anchietea** Hilar. (P. Anchietea, brasilianischer Bota-  
niker), V. I., Violaceae.

*pyrifolia* Hilar., birnblättrige, ♀. w. Brasilien.

**Anchonium** DC., Schnabelschötchen, XV. I., Cruciferae.

*Billardieri* DC., Billardier's, ♀. t. Libanus.

**Anchusa** L., Ochsenzunge, V. I., Asperifoliaceae.

*Agardhii* Lehm., Agardh's, 4. f. ? Sibiriën.

*aggregata* Lehm., dichtblühende, ♂. f. Griechenland.

*angustifolia* Lehm. ? L., schmalblättrige, ♂. f. Süd- u.  
Osteuropa.

*arvalis* Rchb., Acker-O., ♂. f. Europa.

*Barrelieri* Gmel. Bess., Barrelier's, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

*caespitosa* Lam., rasenartige, 4. k. Creta.

*capensis* Thbg., capische, ♂. k. Cap d. g. H.

*crispa* Moris, krause, ☉. Sardinien, Corsica.

*Gmelini* Ledeb., Gmelin's, 4. f. Podolien, Sibirien.

*hispida* Forsk., hackerige, 4. f. b. k. Aegypten.

*latifolia* Lehm., breitblättrige, ♂. f. ?

*leucoifolia* Lehm., levkoiblättrige, 4. f. b. Armenien.

*macrophylla* Desf., großblättrige, ♂. k. Marocco.

*myosotidiflora* Lehm., vergiftsmeinnichtblumige, 4. f.  
Caucasus.

*ochroleuca* MB., weißgelbliche, ♂. f. Siebenbürg., Taurien.

*officinalis* L., officinelle (gemeine), ♂. f. Europa.

β) *incarnata* Schrad. γ) *maculata* Horn.

*paniculata* Ait., rispige, ♂. 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *angustifolia* Rchb. γ) *azurea* Mill. δ) *italica* Retz.

*procera* Bess., hohe, ♂. f. Podolien.

*rupestris* R. B., Felsen-O., ♂. 4. f. Sibirien.

*sericea* R. et S., seidenhaarige, ♂. 4. f. Sibirien.

*strigosa* La Bill., striegelige, 4. f. k. Syrien.

*stylosa* MB., langgriffelige, ♂. f. Taurien.

*tenella* Hornem., zarte, ☉. f. China, Ostindien.

*tinctoria* L., färbende, 4. f. b. Südeuropa, Orient.

*undulata* L., wellenblättrige, 4. f. Südeuropa.

β) *hybrida* Tenore.

*verrucosa* Lam., warzige, ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *perlata* Hort.

*alpestris* Stev. v. *Nonnea alp.* *amoena* Gmel. v.  
*paniculata*. *amplexicaulis* Sm. v. *Omphalodes sem-*  
*pervirens*. *angustifolia* Auctor. v. *arvalis*. *arvensis*



## **Anchusa**

MB. v. *Lycopsis* arv. *arvensis* Tausch. v. *arvalis*.  
*aserrima* Delil. vid. *Dioclea hispidissima*. *dubia*  
*Nocca* vid. *Nonnea lutea*. *echioides* M. B. v. *Ly-*  
*copsis echioid.* *flava* Forsk. vid. *verrucosa*. *his-*  
*pidissima* Sbr. vid. *Dioclea hispidissima*. *italica*  
*Retz* vid. *paniculata*  $\delta$ . *lanata* L. v. *Cynoglossum*  
*cheirifolium*. *laxiflora* DC. vid. *Borrago laxiflora*.  
*leptophylla* R. et S. vid. *angustifolia*. *lutea* MB.  
 vid. *Nonnea lutea*. *lycopsoides* Bess. v. *officinalis*.  
*microcalyx* Vis. vid. *angustifolia*. *Milleri* W. v.  
*verrucosa*. *nigricans* Brot. vid. *Nonnea nigricans*.  
*orientalis* L. vid. *Lithospermum orientale*. *ovata*  
 Lehm. vid. *Lycopsis orientalis*. *parviflora* Sm. v.  
*aggregata*. *picta* MB. vid. *Nonnea picta*. *pulla* MB.  
 vid. *Nonnea pulla*. *rosea* MB. v. *Nonnea rosea*.  
*sempervirens* L. vid. *Omphalodes sempervirens*.  
*variegata* Lehm. vid. *Lycopsis variegata*. *versicolor*  
 Stev. vid. *Nonnea versicol.* *virginica* L. v. *Litho-*  
*spermum sericeum*. *zeylanica* Jacq. v. *tenella*.

*Ancistrocarpus maypurensis* H. B. K. v. *Microtea maypu-*  
*rensis*. *Ancistrum decumbens* Thbg. v. *Acaena la-*  
*tebrosa*. *diandrum* Forst. v. *Acaena Sanguisorbae*.

**Andersonia** RB. (W., A., W. u. G. Anderson), V. 1.,  
 Epacrideae.

*coerulea* RB., blauë,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*depressa* RB., niedergedrückte,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*micrantha* RB., kleinblumige,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*parvifolia* RB., kleinblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*sprengelioides* RB., sprengeliaähnliche,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*squarrosa* RB., sparrige,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Andira** Lam. (brasilianischer Name), XVII. iv. (vi.),  
 Leguminosae-Caesalpinieae.

*inermis* H. B. K., unbewehrte,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
*racemosa* Lam., traubige,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad, Guiana, Bra-  
 silien.

**Andrachne** L., *Andrachne*, XXI. x., *Tricoccae*-Eu-  
 phorbiaceae.

*telephioides* L., telephiumähnliche,  $\odot$ .  $\frac{1}{2}$  f. Süd- und  
 Osteuropa, Arabien.

*Andraspis elongata* Dub. v. *Androsace elongata*.

**Andreoskia** DC. (Ant. Andrzejowski, russischer Botani-  
 ker), XV. iii.

*eglandulosa* DC., drüsenlose,  $\odot$ . f. Sibirien.  
*integrifolia* DC., ganzblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien.  
*pectinata* DC., kammförmige,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien.  
 $\beta$ ) *pinnatifida*.

*Andreusia glabra* Vent. v. *Myoporum ellipticum*.

*Andrewsia autumnalis* Spgl. et *verna* Spgl. vid. *Centau-*  
*rella verna et autumnalis*. *Androcera lobata* Nutt. v.  
*Nycterium heterandrum*.

**Androcymbium** W., Cymbelfaden, VI. 1., Corona-  
 riae-Colchicaceae (*Melanthaceae*).

*eucomoides* W., schopflilienähnlicher, 4. Zw. t. Cap  
 d. gut. Hoffnung.

*leucanthum* W., weifsblühender, 4. Zw. t. Cap der  
 gut. Hoffnung.

*melanthoides* W., melanthiumähnlicher, 4. Zw. ut. Cap d.  
 gut. Hoffnung.

**Andromachia** H. B. K., (Andromachus, Arzt des Nero),

XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*grandiflora* H. W. K., großblumige, 4. w. Quito.

*igniaria*, feuerfangende, 4. w. Quito.

**Andromeda** L., Andromede, X. I., Ericaceae.

*bracteosa* DC., deckblättrige, f. k. f. b. Neucaliforn.

*polifolia* L., poleiblättrige, f. f. Europa, Asien, Nordamerika.

a) *angustifolia*, β) *ericoides*, γ) *grandiflora*, δ) *latifolia*, ε) *media*, ζ) *miniata*, η) *revoluta*, θ) *scotica*, ι) *stricta*.

*rosmarinifolia* Pursh., rosmarinblättrige, f. f. Nordamer. *venulosa* DC., aderige, f. k. f. b. Naucalifornien.

*americana* Hort. et *canadensis* Hort. et *glaucofolia* Wender. et *oleaefolia* Hortul. vid. *polifolia* δ. et *glaucophylla* Lk. v. *rosmarinifolia*. *subulata* v. *polifolia* β.

*acuminata* Ait. vid. *Leucothoe acum.* *anastomosans* L. vid. *Gaultheria anast.* *angustifolia* Pursh vid. *Cassandra ang.* *arborea* L. v. *Oxydendrum arboreum*.

*axillaris* Ait. v. *Leucothoe axillaris*. *baccata* Wangerh. vdi. *Vaccinium resinum*. *bryantha* L. vid. *Bryanthus Gmelini*.

*buxifolia* Sm. vid. *Leucothoe buxifolia*. *calyculata* L. vid. *Cassandra calyculata*.

*capricornia* Hamilt. v. *Pieris ovalifolia*. *cassinefolia* Vent. v. *Zenobia speciosa*. *Catesbaei* Walt. v. *Leucothoe spinulosa*.

*cerea* L. vid. *Vaccinium cereum*. *coerulea* L. vid. *Phyllodoce taxifolia*. *coerulea* β.

*viridifolia* Pall. v. *Phyllodoce Pallasiana*. *coriacea* Ait. v. *Leucothoe coriac.* *coriifolia* Thbg. v. *Leucothoe coriifolia*.

*crispa* Poir. v. *Cassandra angustifolia*. *cupressiformis* Wall. v. *Cassiope fastigiata*.

*Daboecia* L. vid. *Daboecia polifolia*. *dealbata* Lindl. vid. *Zenobia speciosa* β.

*droseroides* Berg. v. *Erica glutinosa*. *ericoides* Pall. v. *Cassiope ericoides*. *eucalyptoides* Schlecht. Cham. vid. *Leucothoe eucalyptoides*.

*fasciculata* Sw. vid. *Lyonia fasciculata*. *fastigiata* Wall. v. *Cassiope fastigiata*. *ferruginea* Walt. v. *Lyonia ferruginea*.

*ferruginea* W. vid. *Lyonia rigida*. *floribunda* Pursh vid. *Zenobia floribunda*.

*formosa* Wall. v. *Pieris formosa*. *formosissima* Bartr. v. *Leucothoe acuminata*. *frondosa* Pursh. v. *Lyonia frondosa*.

*globulifera* Hortul. v. *Lyonia ligustrina*. *glomerata* Cav. vid. *Gaultheria anastomosans*.

*ilicifolia* P. v. *Leucothoe ilicifolia*. *jamaicensis* Sw. v. *Lyonia jamaicensis*. *japonica* Thbg. vid. *Pieris japonica*.

*lanceolata* Dsf. v. ? *Leucothoe spinulosa*. *lanceolata* Don. v. *Pieris lanceolata*.

*ledifolia* Humb. vid. *Arctostaphylos polifolia*. *ligustrina* Mühlbg. v. *Lyonia ligustrina*.

*lucida* Jacq. vid. *Leucothoe coriacea*. *lycopodioides* Pall. v. *Cassiope hypnoides*. *marginata* Veill. vid. *Leucothoe coriacea*.

*Mariana* L. vid. *Leucothoe Mariana*. *Mariana* Jacq. vid. *Leucothoe coriacea*.

*Mertensiana* Bong. v. *Cassiope Mertens.* *myrsinites* Lam. vid. *Pernetia microphylla*. *nitida* Mchx. vid. *Leucothoe ligustrina*.

*nummularia* Schlecht. Cham. v. *Leucothoe nummularia*. *ovalifolia* Wall. v. *Pieris ovalifolia*.

*ovata* Soland. vid. *Zenobia speciosa*. *paniculata* L. v. *Zenobia racemosa*. *pani-*

## Andromachia

*culata* W. v. *Lyonia ligustrina. populifolia* Lam. v. *Leucothoe acuminata. prostrata* Cav. vid. *Pernettya prostrata. pulverulenta* Bartr. vid. *Zenobia speciosa* β. *racemosa* Lam. vid. *Lyonia ligustrina. racemosa* L. v. *Zenobia racemosa. racemosa* Walt. v. *Lyonia frondosa. Redowskii* Cham. vid. *Cassiope Redowskii. reticulata* Walt. v. *Leucothoe acuminata. revoluta* Spgl. v. *Leucothoe revol. rhomboidalis* Veill. v. *Leucothoe coriacea. rigida* Humb. v. *Gaultheria rigida. rigida* Pursh v. *Lyonia rigida. rubiginosa* P. v. *Lyonia rubiginosa. rupestris* Forst. v. *Gaultheria rupestris. salicifolia* Comers. v. *Leucothoe salicifolia. ? secunda* Mch. v. *Leucothoe ? secunda. serratifolia* H. Cels v. *Leucothoe acuminata. sinensis* Lodd. Bot. Cab. vid. ? *speciosa* Mchx. vid. *Zenobia speciosa. spicata* Wats. v. *Zenobia spicata (racemosa nach DC.). squamulosa* D. Don v. *Pieris lanceolata. Stelleriana* Pall. v. *Cassiope Stelleriana. taxifolia* Pall. v. *Phyllodoce taxifolia. tetragona* L. v. *Cassiope tetragona. Walteri* W. v. *Leucothoe spinulosa. Androphylax scandens* Wendl. v. *Cocculus carolinus.*

## Andropogon L., Bartgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

*annulatus* Forsk., beringtes, 4. t. w. Aegypten, Ostindien.  
*argenteus* DC., silberfarbiges, 4. t. w. Mexico, Quito.  
*Bladhii* Retz, Bladh's, 4. t. w. China.

*comosus* Spgl., schopfiges, 4. t. Neuholland.

*furcatus* Mühlbg., gabeliges, 4 f. Südeuropa.

*hirtus* L., steifhaariges, 4. f. Südeuropa.

*Ischaemum* L., fingerförmiges, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

*laguroides* DC., sammetgrasähnliches, 4. k. Neuspanien.  
*provincialis* Lam., südfranzösisches, 4. f. b. Südfrankreich.

*pubescens* Vis., weichhaariges, 4. f. Dalmatien.

*saccharoides* Sw., zuckerrohrähnliches, 4. w. Jamaica.

*serrulatus* Lk., feingesägtes, 4. w. ?

*stenophyllus* R. et S., schmalblättriges, 4. t. Mexico.

*serratus* Thbg., sägezähniges, 4. k. Japan.

*Agardhi* Hort. v. *Bladhii. Allionii* DC. v. *Heteropogon Allon. alopecuroides* L. v. *Erianthus saccharoides. augustifolius* K. B. K. vid. *stenophyllus. angustifolius* Sm. vid. *Ischaemum. arundinaceus* Scop. v. *Sorghum halep. avenaceus* H. B. K. vid. *Sorghum halepens. citratus et citriodorus* Hortul. vid. *Cymbopogon Schoenanth. contortus* L. vid. *Heteropogon. contort. contortus* Allion. vid. *Heteropogon Allionii. distachyos* L. v. *Pollinia distachys. Erianthus* Lk. vid. *Erianthus saccharoides. fasciculatus* L. v. *Chloris radiata. fastigiatus* Sw. v. *Dictomis fastigiata. Gryllus* L. v. *Chrysopogon Gryl. halepensis* Sibth. v. *Sorghum halep. involucratus* Kön. v. *Apluda aristata. Iwarancusa* Blan. v. *Vetiveria Iwaranc. muricatus* Retz v. *Anatherum muricat. polydactylum* L. vid. *Chloris polydactyla. Ravennae* L. v. *Erianthus Ravennae. Schoenanthus* L. vid. *Cymbopogon Schoen. squarrosus* W. vid.



## Andropogon

*Anatherum muricatum. strictus* Host. vid. *Erianthus strictus*.

## Androsace T., Mannschild, V. 1., Primulaceae.

### I. Aretia Hall. L.

*alpina* Lam., Alpen-M., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*caespitosa* Lehm., rasenartiges, ♀. k. Persien.

*dasyphylla* Bunge, behaartes, 4. f. Altai.

*diapensioides* Lapeyr., *diapensia*ähnliches, 4. f. b. Pyrenäen.

*frutescens* Lapeyr., strauchiges, ♀. k. f. b. Pyrenäen.

*helvetica* Gaud., schweizerisches, 4. f. Baierische, Tyroler, Schweizer und französische Alpen.

#### β) Heerii Heg.

*imbricata* Lam., dachziegelförmiges, 4. f. Südschweizer und französische Alpen.

#### β) argentea Gärtn.

*pubescens* DC., feinhaariges, 4. f. Südschweizer und französische Alpen.

*alpina* Gaud. v. *pubescens*. *Aretia* Lapeyr. v. *imbricata*. *bryoides* DC. v. *helvetica*. *cylindrica* DC. v. *frutescens*. *pennina* Gaud. v. *alpina*. *Vitaliana* Lapeyr. v. *Aretia Vitaliana*.

### II. Androsace T. (et Andraspis Dub. et Chamaejasme Koch).

*acaulis* Lk. et Otto, stengelloses, ♂. f. Sibirien.

*albana* Steven, albanisches, 4. f. Caucasus.

*brevifolia* Vill., kurzblättriges, ♂. ♂. f. Südfrankreich.

*carinata* Torr., gekieltes, 4. f. Nordamerika.

*carnea* L., fleischfarbiges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

*Chamaejasme* Host., trügerisches, 4. f. Mitteleurop. Alpen, Sibirien.

*elongata* L., verlängertes, ♂. f. Mitteleuropa.

#### β) nana Hornem.

*filiformis* Retz, fadenförmiges, ♂. f. Sibirien.

*Gmelini* Gärtn., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

*lactea* L., milchweißes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*lactiflora* Fisch., weißlichblühendes, ♂. f. Sibirien.

*linearis* Grah., gleichbreitblättriges, 4. f. Nordamerika.

*macrocarpa* Ledeb., großfrüchtiges, ♂. f. Sibirien.

*maxima* L., größtes, ♂. f. Mitteleuropa, Sibirien.

*obtusifolia* All., stumpfblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*septrionalis* L., nördliches, ♂. f. Europa.

*valerianoides* Lehm., baldrianähnliches, ♂. f. Kleinasien.

*villosa* L., zottiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*alismoides* Hrn. v. *lactiflora*. *Chamaejasme* Wulf.

vid. *obtusifolia*. *coronopifolia* Andr. vid. *lactiflora*.

*Lachenalii* Gmel. vid. *obtusifolia*. *pauciflora* Vill. v. *lactea*.

## Androsacemum T., All., Blutheil, XVIII. II. (XVI. VIII.), Hypericineae.

*officinale* All., officinelles, 4. ♀. England, Frankreich, Italien, Griechenland, Caucasus.

## Andryala L., Wollsalat, XIV. 1., Compositae-Cichoriaceae.

### I. Euandryala DC., Andryala Roth., Schreb.

? *crithmifolia* Ait., meerfenchelblättriger, ♂. k. Madeira.

*dentata* Sibth., gezahnter, ♂. f. k. Griechenland.

*nigricans* Poir., schwärzlicher, ♂. ♂. f. k. Barbarei.

**Andryola**

pinnatifida Ait., fiederspaltiger, ♂. k. Madeira, Teneriffa.

ragusina L., ragusanischer, 4. k. Dalmatien, Griechenland.

β) lyrata Guss., γ) arenaria Boissier.

II. *Rothia* Schreb. (*Voigtia* Roth non Spgl.).

integrifolia L., ganzblättriger, ♂. f. Südeuropa.

α) vulgaris (*lanata* Vill.), β) undulata Pers., γ) angustifolia (*mollis* Asso), δ) diffusa Jan.

laxiflora DC., lockerblumiger, ♂. f. Südspanien, Nordafrika.

*Rothia* P. Roth's, ♂. f. Spanien.

sinuata L., buchtiger, ♂. f. k. Südfrankreich.

β) intermedia.

varia Lowe, veränderlicher, 4. k. Madeira.

α) candidissima Dsf., β) angustifolia (*ragusina* Hort.), γ) subglabrata, δ) aprica, ε) cheiranthifolia L'Her. (*glandulosa* Lam., *tomentosa* Scop.).

*chondrilloides* Scop. v. *Crepis chondrilloides*.

*lanata* L. vid. *Hieracium lanatum*.

*nemausensis* Vill.

*nudicaulis* Lam. v. *Pterotheca nemausensis*.

*pontana* Vill. vid. *Crepis montana*.

*Andrzeiowska Cardamine* Rehb. vid. *Notoceras cardaminaefolium*.

**Aneilema** RB., *Aneilema*, III. 1., Commelinaceae.

acuminata RB., zugespitzte, 4. t. Neuholland.

aequinoctialis Loud., guineische, 4. w. Guinea.

affinis RB., verwandte, 4. t. Neuholland.

ambigua Loud., zweifelhafte, 4. w. Sierre Leona.

biflora RB., zweiblumige, 4. t. Neuholland.

crispata Ait., krausblättrige, 4. t. Neuholland.

hispida Don, steifhaarige, 4. t. Nepal.

longifolia Hook, langblättrige, 4. w. Mozambique.

nudicaulis RB., nacktstengelige, 4. w. Ostindien.

nudiflora Loud., nacktblumige, ♂. t. Ostindien.

radicans Don, wurzelnde, 4. t. Nepal.

serrulata Loud., feingesägte, 4. w. Cayenne, Trinidad.

**Aneimia** Swz., Nacktähre, XXIV. 1. Osmundaceae.

adiantifolia Sw., frauenhaarblättrige, 4. w. Westindien.

asplenifolia Sw., strichfarnblättrige, 4. w. Südamerika.

?coccinea Lk. et Otto, scharlachfarbige, 4. w. Südamerika.

collina Radd., Hügel-St., 4. w. Brasilien.

flexuosa Sw., gebogene, 4. w. Westindien.

hirsuta Sw., rauhhaarige, 4. w. Westindien.

humilis Sw., niedrige, 4. w. Caribische Inseln.

β) repens Radd., kriechende. Brasilien.

?laciniata Lk. et Otto, schlitzblättrige, 4. w. Westindien.

lanceolata Hook, lanzettblättrige, 4. w. Westindien.

longifolia Radd., langblättrige, 4. w. Brasilien.

phyllitidis Sw., hirschezungenblättrige, 4. w. Westind.

β) fraxinifolia Radd., eschenblättrige, 4. w. Brasilien.

radicans Radd., wurzelnde, 4. w. Brasilien.

villosa Humb., zottige, 4. w. Südamerika.

**Anemone** T., Windblume, XIII. VI., Ranunculaceae.

alba Juss., weisse, 4. f. Sibirien.

# Anemone

- apennina L., apenninische, 4. f. England, Italien, Griechenland, Caucasus.
- baldensis L., baldische, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- caroliniana Walt., carolinische, 4. f. Carolina.
- coerulea DC., blaue, 4. f. Sibirien.
- Commersoniana Rich., Commerson's, 4. f. b. Feuerland.
- coronaria L., Kronen- (Garten-) W., 4. f. b. k. Süd-europa, Kleinasien.
- $\beta$ ) flore pleno.
- deltoidea Hook, deltaförmige, 4. f. b. k. Columbia.
- dichotoma L., zweizinkige, 4. f. Sibirien, Canada.
- Fischeriana DC., Fischer's, 4. f. Sibirien.
- formosa Clarke, schöne, 4. f. b. k. Kleinasien.
- hortensis L., Garten-W., 4. f. b. k. Süd- u. Osteuropa.
- $\beta$ ) miniata J. C.,  $\gamma$ ) purpurea Swt.
- Hudsoniana Richards., Hudson's, 4. f. Nordamerika.
- isopyroides Juss., isopyrumähnliche, 4. f. Sibirien.
- multifida Poir., vieltheilige, 4. f. b. Feuerland.
- narcissiflora L., narcissenblumige, 4. f. Europäische, sibirische und nordamerikanische Alpen.
- nemorosa L., Busch-W., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.
- $\beta$ ) flore pleno,  $\gamma$ ) coerulea Hortor.
- obtusiloba Don, stumpflappige, 4. k. Nepal.
- palmata L., handförmige, 4. f. k. Portugal, Spanien, Nordafrika.
- $\beta$ ) flore pleno,  $\gamma$ ) flore albedo.
- parviflora Mchx., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
- pavonina Lam., Pfauen-W., 4. f. b. k. Frankreich.
- $\beta$ ) fulgens Gay (*coccinea*),  $\gamma$ ) lilacina,  $\delta$ ) plena.
- pennsylvanica L., pennsylvanische, 4. f. Nordamerika, Sibirien.
- polyanthes Don, vielblumige, 4. k. Nepal.
- quinquefolia L., fünfblätterige, 4. f. Nordamerika.
- ranunculoides L., ranunkelähnliche, 4. f. Europa, Sibirien.
- reflexa Steph., zurückgebogene, 4. f. Sibirien.
- Richardsonii Hook., Richardson's, 4. f. Nordamerika.
- sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien.
- sylvestris L., Wald-W., 4. f. Mitteleuropa.
- trifolia L., dreiblätterige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen-thäler, Nordamerika.
- $\beta$ ) lancifolia Pursh., lanzettblätterige.
- umbellata L., doldige, 4. f. b. k. Kleinasien.
- virginiana L., virginische, 4. f. Nordamerika.
- $\beta$ ) grandiflora Hort.
- vitifolia Buchan., weinblätterige, 4. f. b. k. Nepal.
- aconitifolia* Mchx. vid. *pennsylvanica*. *borealis* Rich. v. *pennsylvanica*. *cuneifolia* Juss. v. *parviflora*. *fasciculata* Vahl v. *umbellata*. *fragifera* Jacq. v. *baldensis*. *Hepatica* L. v. *Hepatica triloba*. *ochotensis* Fisch. v. *alba*. *stellata* Lam. v. *hortensis*. *tenella* Pursh. v. *caroliniana*. *thalictroides* L. v. *Syn-desmon thalictroides*. *uralensis* Fisch. v. *coerulea*. — *albana* Stev. (*obsoleta* Sims), *alpina* L., *apiifolia* Scop., Wulf. (*grandiflora* Hoppe, *millefoliata* Bertol., *myrrhidifolia* Vill., *sulfurea* L. mant.), *capens.* DC., *cernua* Thbg., *dahuria* Fisch., *Halleri* All., *montana* Hoppe (*intermedia* Hoppe), *Nuttalliana* DC. (*ludoviciana* Nutt.), *patens* L., *pratensis*



**Anemone**

L., *Pulsatilla* L. (*acutipetala* Schlecht. et *tenuifolia* Schlecht.), *tenuifol.* DC., *vernalis* L., *Wolfgangiana* Bess. v. *Pulsatilla alpina* etc.

**Anethum** T., Dill., V. II., Umbelliferae.

*graveolens* L., gemeiner (starkkriechender), ☉. ♂. f. Mittel- und Südeuropa, Westasien, Afrika.

*segetum* L., Saat-D., ☉. f. Südeuropa, Griechenland, Persien.

Sowa Roxb., Sowa-D., ☉. f. Ostindien.

*Foeniculum* L. *piperitum* Ucr., Bertol. vid. *Foeniculum officinale* etc.

**Angelica** L., Angelica, V. II., Umbelliferae.

*flavescens* Bess., gelbliche, 4. f. Galicien.

*lucida* L., starkglänzende, ♂. f. Nordamerika.

*montana* Schlecht., Berg-A., 4. f. Oestliche, mittlere u. südeuropäische Alpen.

*pyrenaea* Spgl., Pyrenäen-A., 4. f. Elsaß, Pyrenäen.

*Razoulii* Gouan, Razoul's, 4. f. Pyrenäen.

*sylvestris* L., Wald-A., 4. f. Europa, Kleinasien.

*triquinata* Mchx., drei- bis fünfzählige, 4. f. Nordamer.

**Anguillaria** Lam. G. *bahamensis* G. v. *Ardisia excelsa*.

*latifolia* Lam. *solanacea* Poir. et *tinifolia* Lam.

v. *Ardisia latifol.* etc. *zeylanica* Lam. vid. *Ardisia humilis*.

**Anguloa** R. et P. (Fran. de Angulo, spanischer Naturforscher), XX. I. Orchideae.

*grandiflora* H. K. B., großblumige, 4. w. Quito.

*lurida* Lk., gelbbraune, 4. w. Brasilien.

*superba* H. K. B., stolze, 4. w. Peru.

**Anguria** L., Birnengurke, XXI. II. (II. I.), Cucurbitaceae.

*pedata* L., fußförmige, 4. Sch. w. Westindien.

*rosea* H. B. K., rosafarbene, 4. Sch. w. Neu-Granada.

*trifoliata* L., dreiblättrige, 4. Sch. w. St. Domingo.

*trilobata* L., dreilappige, 4. Sch. w. Carthagera.

*umbrosa* H. B. K., schattenliebende, 4. Sch. w. Südamerika.

**Anigozanthos** La Bill., Röhrenschwertel, VI. I., Narcisseae-Haemodoraceae.

*coccinea* ? Lindl., scharlachfarbiger, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).

*flavida* RB., gelblichgrüner, 4. t. Neuholland.

β) *bicolor* Lindl.

*Manglesii* D. Don, Mangle's, 4. t. Neuh. (Schwanenfl.).

β) *angustifolia* Lindl. Neuholland?

*rufa* La Bill., fuchsrother, 4. t. Neuholland.

**Anisacantha** RB., Stachelmelde, IV. I., Aizoideae-Atripliceae (*Chenopod.*).

*divaricata* RB., ausgesperrte, ♀. t. Neuholland.

**Anisanthus** Swt., Lippenschwertel, III. I., Irideae.

*Cunonia* Swt., cunonischer, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*quadrangularis* Swt., vierkantiger, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*splendens* Swt., glänzender, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

**Anisochilus** Wall., Ungleichlippe, XIV. I., Labiatae.

*carnosa* Benth., fleischblättrige, ♂. w. Ostindien.

**Anisoderis** rubra H. Cass. v. *Barkhausia rubra*.**Anisodus** Lk., Ungleichzahn, V. I., Solanaceae.

*luridus* Lk., grünlichbräunlicher, 4. f. Nepal.

*stramonifolius* G. Don, stechapfelblättriger, 4. f. Nepal.

**Anisomeles** RB., Ungleichbeutel, XIV. I., Labiatae.

*malabarica* RB., malabarischer, 4. ♀. w. Ostindien.

**Anisomeles**

*moschata* RB., moschusduftender, 4. f. t. Neuholland.

*ovata* RB., eiförmiger, ☉. m. f. Ostindien.

*nepalensis* Spgl. v. *Craniotome versicolor*.

**Anisopetalum** Hook, Ungleichkrone, XX. 1., Orchideae.

*Careyanum* Hook, Carey's, 4. w. Nepal.

**Anisophyllum** *ocymoides* Haw. v. *Euphorbia ocymoides*.**Anneslea** Andr., Stachelnixe, XIII. 1. Nymphaeaceae.

*spinosa* Andr., ostindische, 4. Wa. w. Südchina, Ostind.

**Anneslea** *grandiflora* et *Houstoni* H. Berl. vid. *Inga anomala* et J. *Houstoni*.**Anoda** Cav., Sommermalve, XVI. VIII. Malvaceae.

*acerifolia* DC., ahornblättrige, ☉. m. f. Mexico.

*Dilleniana* Cav., Dillen's, ☉. m. f. Mexico.

*hastata* Cav., spontonblättrige, ☉. ♂. m. f. Mexico, Cuba, Südamerika.

*incarnata* K. H. B., fleischfarbige, ☉. ♂. m. f. Südamer.

*parviflora* Cav., kleinblumige, ☉. m. f. Neuspanien.

*triangularis* DC., dreikantige, ☉. m. f. Neuspanien.

*triloba* Cav., dreilappige, ☉. m. f. Mexico.

*brachyantha* Rehb. v. *incarnata*. *crenatiflora* Orteg.

v. *parviflora*. *punicea* Lagasc. v. *Periptera punicea*.

**Anodonte** *edentula* DC. *obovata* Ledeb. etc. vid. *Koniga edentula obovata* etc.**Anoectochilus** Blume, Offenlippe, XX. 1., Orchideae.

*setaceus* Blume, borstige, 4. w. Java.

**Anomatheca** Ker., Anomatheca, III. 1., Irideae.

*cruenta* Lindl., blutrothe, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*juncea* Ker., simsensblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

**Anona** L., Flaschenbaum, XIII. VI., Anonaceae.

*amplexicaulis* Lam., stengelumfassender. f. w. Mauritius, Madagascar.

*asiatica* L., asiatischer, f. w. Ceylon.

*Cherimolia* Mill. Lam., *Cherimolia-F.*, f. w. Südamer.

*cinerea* Dun., aschgrauer, f. w. Caraib. Inseln, Cumana.

*glabra* L., kahler, f. t. Carolina, Neuspanien.

*grandiflora* Lam., großblumiger, f. w. Mauritius, Madagascar.

*laurifolia* Dun., lorbeerblättriger, f. w. t. Westindien, Florida.

*longifolia* Aubl., langblättriger, f. w. Guiana.

*mexicana* Lodd. Cat., mexicanischer, f. w. Mexico.

*mucosa* Jacq., schleimiger, f. w. Martinique.

*muricata* L., weichstacheliger, f. w. Westindien.

*obtusiflora* Tuss., stumpfblüthiger, f. w. Hispaniola.

*paludosa* Aubl., Sumpf-F., f. w. Guiana.

*palustris* L., sumpfliebender, f. w. Jamaica, Südamer.

*punctata* Aubl., punctirter, f. w. Guiana.

*reticulata* L., netzförmiger, f. w. Westindien.

*senegalensis* Dunal, Senegal-F., f. w. Guinea.

*hexapetala* L., Suppl. et *uncinata* Lam. vid. *Artabotrys*

*odoratissima*. *grandiflora* Bartr. *pygmaea*

Bartr. *triloba* L. v. *Asimina grandifl.* etc. *Myristica*

G. vid. *Monodora Myristica*. *tripetala* Ait. vid.

*Cherimolia*.

**Anonymos** *ciliatus* Walt. *paniculatus* Walt. etc. v. *Liatris pilosa* etc.**Anotis** DC., Anotis, IV. 1., Rubiaceae.

*ciliolosa* G. Don, gefranzte, 4. f. k. Nordamerika.

**Antennaria** G., Fühlhorn (Katzenpfötchen), XIX. II.,  
Compositae-Helichryseae.

- alpina G., Alpen-F., 4. f., lappländische Alpen.  
carpathica RB., carpathisches, 4. f. Carpathen, deutsche  
Alpen, Schweiz, Piemont.  
contorta D. Don, gedrehtes, 4. k. Nepal.  
dioica G., gemeines, 4. f. Europa.  
hyperborea D. Don, nördliches, 4. f. Schottland.  
margaritacea RB., perlartiges, 4. f. Mittel- und Süd-  
deutschland, Schweiz, England, Kamtschatka, Nord-  
amerika.  
plantaginea RB., wegetrittblätteriges, 4. f. Virginien.  
Timmua D. Don, Timmua-F., 4. k. Nepal.  
triplinervis Sims, D. Don, dreinerviges, 4. k. Nepal.

**Anthemis** L., Chamille, XIX. II. Compositae-Corym-  
biferae.

- aetnensis Schouw., Spgl., Aetna-Ch., 4. f. Sicilien.  
alpina L., Alpen-Ch., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
altissima L., hohe, ☉. f. Süd- u. Osteuropa, Persien.  
anglica Spgl., englische, ☉. f. England.  
arvensis L., Acker-Ch., ☉. f. Europa, Orient, Aegypten.  
    β) agrestis Wall.  
aurea DC., goldfarbige, 4. f. Südeuropa, Orient.  
austriaca Jcq., österreichische, ☉. f. Mittel-, Ostdeutsch-  
land, Ungarn, Italien, Griechenland.  
    β) Triumphetti All.  
Barrelieri Tenor., Barrelier's, 4. f. Neapel.  
candidissima W., blendendweiße, ☉. f. Caucasus.  
canescens Brot., weißgrauliche, ☉. f. Portugal.  
Chamomilla W., mutterkrautähnliche, 4. f. b. k. Süd-  
frankreich, Neapel.  
chia L., griechische, ☉. f. Griechenl., Kleinasien, Calabrien.  
erucaefolia Presl., raukenblättrige, 4. f. b. k. Sicilien.  
fruticulosa MB., strauchige, 4. f. Caucasus.  
hyalina DC., durchsichtige, ☉. f. Asiat. Türkei.  
iberica MB., iberische, 4. f. Iberien.  
incrassata Lois., verdickte, ☉. f. Frankreich, Oberitalien.  
Kitaibelii Spgl., Kitaibel's, 4. f. Ungarn.  
maritima L., Meerstrands-Ch., 4. f. Frankreich, Ital.,  
Griechenland, Kleinasien.  
Marshalliana W., Marshall's, 4. f. Caucasus.  
    β) subglabrescens C. A. Mey. γ) Rudolphiana MB.  
Melampodia Delil., ägyptische, ☉. f. Aegypten, Griechenl.  
    β) campestris.  
mucronulata Bertol., stachelspitzige, 4. f. Italien.  
nobilis L., edle, 4. f. England, Südeuropa.  
    β) flore pleno.  
peregrina L., fremde, ☉. f. Unteritalien, Griechenland,  
Arab. Aegypten.  
    β) hirsuta DC.  
petraea Ten., Felsen-Ch., 4. f. Unteritalien.  
pontica W., pontische, 4. f. Levante, Gebiet von Odessa.  
porrigens Hort. Angl., ausgestreckte, f. 4. f. ?  
punctata Vahl, punctirte, 4. f. k. Nordafrika (Atlasgeb.).  
retusa Delil., eingedrückte, ☉. f. Aegypten, Neapel.  
rigescens W., starre, 4. f. Caucasus, Nordpersien.  
ruthenica MB., russische, ☉. f. Taurien, Ukraine, Podolien.  
scariosa DC., trockenhäutige, ☉. f. Orient (Bagdad).  
secundiramea Bivon., einseitigästige, ☉. f. Sicilien.  
    β) Urvilleana DC., Malta. γ) indurata Delil., Aegypt.



**Anthemis**

*sphacelata* Presl., brandige, 4. f. b. Sicilien.  
*tinctoria* L., färbende, ♂. 4. f. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien.

β) *discoidea* W. γ) *monantha* W. δ) *pallida*.  
*tomentosa* L., filzige, 4. f. Calabrien, Levante.

*Wiedemanniana* Fisch. et Mey, Wiedemann's, ☉. f. Natolien.

*apiifolia* RB. v. *Pyrethrum Parthenium* β *arabica* L. vid. *Cladanthus* prolif. *artemisiaefolia* W. vid. *Pyrethrum sinense*. *australis* W. vid. *incrassata*. *biaristata* Bivon. v. *Anacycl. clavatus*. *biaristata* DC. v. *Anacycl. tomentosus*. *buphthalmoides* Jacq. vid. *Heliopsis buphthalmoides*. *carpathica* WK. v. *Kitaibelii*. *caucasica* Adams vid. *Pyrethr. caucasica*. *caucasica* Hornem. v. *rigescens*. *coarctata* Sibth. Sm. vid. *tinctoria* γ. *coronopifolia* W. v. *Ormenis mixta*. *corymbosa* Haenk. v. *Achillea atrata*. *Cotula* L. v. *Maruta Cotula*. *fallax* W. v. *Maruta fuscata*. *foetida* Lam. v. *Maruta Cotula*. *fuscata* Brot. v. *Maruta fuscata*. *globosa* Orteg. v. *Chiliophyllum globosum*. *grandiflora* Ramat. v. *Pyrethrum sinense*. *hispanica* Zucc. v. *Ormenis mixta*. *hungarica* Hornem. v. *austriaca*. *incrassata* Lk. v. *Anacyclus clavatus*. *lithuanica* Bess. v. *Maruta Cotula* β. *millefolia* L. v. *Pyrethrum millefoliatum*. *mysorensis* H. Madrit. v. *Guizotia oleifera*. *nicaeensis* W. vid. *incrassata*. *occidentalis* W. v. *Spilanthes Mutisii*. *odorata* Ait. v. *Sphenogyne odorata*. *oppositifolia* Lam. v. *Spilanthes Mutisii*. *ovatifolia* Orteg. vid. *Heliopsis buphthalmoides*. *parthenioides* Bernh. v. *Pyrethrum Parthenium flore pleno*. *pedunculata* Dsf. v. *Anacyclus peduncul.* *peregrina* MB. vid. *candidissima*. *praecox* Lk. v. *Maruta fuscata*. *prolifera* Mch. v. *Cladanth. prolif.* *psorosperma* Ten. v. *Maruta Cotula*. *ptarmicaefolia* Adams v. *Achillea grandiflora*. *pubescens* W. v. *Anacyclus tomentosus*. *Pyrethrum* L. v. *Anacyclus Pyrethrum*. *ramosa* Lk. v. *Maruta Cotula*. *repanda* L. vid. *Lepidophorum repand.* *repens* Walt. v. *Spilanthes repens*. *saxatilis* W. v. *Kitaibelii*. *sinuata* Lallav. vid. *Zaluzania triloba*. *styriaca* Vest. v. *Kitaibelii*. *tomentosa* Gouan vid. *Anacycl. tomentos.* *tomentosa* W. Ten. v. *peregrina*. *trilobata* Orteg. v. *Zaluzania trilob.* *valentina* L. v. *Anacyclus radiat.*

**Antheophora** Schreb., Blüthenträger, III. II., Gramineae.

*elegans* Schreb., zierlicher, ☉. ♂. t. Westindien, Südamer.  
*villosa* Spgl., zottiger, ☉. ♂. t. Westindien.

**Anthericum** L., Zaunlilie. VI. I., Coronariae-Asphodelae.

*coeruleum* R. et P., blaue, 4. t. Chili.  
*croceum* Mchx., safranfarbige, 4. f. Nordamerika.  
*divaricatum* Jacq., sparrige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.  
*falcatum* Thbg., sichelförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.  
*filiforme* Ait., fadenförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.  
*flexifolium* L., gebogenblättrige, 4. t. k. Cap d. g. H.  
*floribundum* Ait., reichlichblühende, 4. t. k. Cap d. g. H.  
*glaucum* R. et P., blaugrüne, 4. t. w. Peru.  
*graminifolium* W., grasblättrige, k. t. Cap d. g. H.  
*hirsutum* Thunb., rauhhaarige, 4. t. Cap d. g. H.  
*japonicum* Thunb., japanische, 4. t. Japan, China, Java.

**Anthericum**

- Liliago, L., gemeine, 4. f. Europa.  
 longifolium Jacq., langblättrige, 4. t. Cap d. g. H.  
 nepalense Spgl., nepalische, 4. k. Nepal.  
 pomeridianum Ker., nachmittägige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.  
 ramosum L., ästige, 4. f. Europa.  
 revolutum L., zurückgerollte, 4. t. Cap d. g. H.  
 spirale L., spiralförmige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.  
 squameum L., schuppige, 4. Kn. t. Cap d. g. H.  
 sulfureum Kit., schwefelfarbige, 4. Zw. f. Ungarn.  
 triflorum Ait., dreiblumige, 4. t. Cap d. g. H.  
 β) bipedunculatum Jacq.  
 vespertinum Jacq., abendliche, 4. t. Cap d. g. H.  
 villosum Labill., zottige, 4. Zw. k. Kleinasien.

*elongatum* W. v. *filiforme*. *fimbriatum* Thbg. vid.  
*longifolium*. *Lagopus* Thbg. v. *floribundum*. *undulatum* Jacq. v. *graminifolium*. — *exuviatum* Jacq.  
*filifolium* Jacq. et *fragrans* Jacq. v. *Albuca exuiat* etc.  
 — *aloides* L. *annuum* L. *asphodeloides* L. *bulbosum* RB. (*australe*) *canaliculatum* Ait. *caudatum* Thbg. (*Cauda felis* L. suppl.). *ciliatum* Thbg.  
*frutescens* L. *hispidum* L. *latifolium* Thbg. *longiscapum* Jacq. (*favosum* Thbg.). *nutans* Thbg.  
*praemorsum* Jacq. *pugioniforme* Jacq. *rostratum* L. *scabrum* Thbg. *semibarbatum* RB. *triquetrum* Thbg. *undulatum* Thbg. v. *Bulbine aloides* etc. — *albucoides* Ait. v. *Ornithogalum albucoides*. *calyculatum* L. v. *Tofieldia calyculata*. *dendroides* Steven vid. *Asphodelus prolifer*. *elatum* Ait. vid. *Chlorophytum elatum*. *esculentum* Spgl. vid. *Scilla esculenta*. *Liliastrum* L. v. *Czackia Liliastrum*. *marginatum* Thbg. vid. *Caesia physodes*. *milleflorum* Redout. v. *Arthropodium paniculatum*. *ossifragum* L. v. *Narthecium ossifragum*. *paniculatum* Andr. v. *Arthropodium panicul.* *pauciflorum* Thbg. vid. *Caesia pusilla*. *pendulum* Hornem. v. *Arthropodium pendulum*. *physodes* Jacq. vid. *Caesia physodes*. *pilosum* Jacq. v. *Ornithogalum hispidum*. *plumosum* ? R. et P. vid. *Trichopetalum stellatum*. *pusillum* Jacq. v. *Caesia pusilla*. *reflexum* Cav. v. *Conanthera Echeandia*. *serotinum* L. v. *Lloydia serotina*. *subtrigynum* Jacq. v. *Helonias erythrosperma*.

**Antheristeria** Lam. (Anthistiria), Stielgras, III. 11. (XXIII. 1.), Gramineae.

- australis* RB., neuholländisches, 4. t. Philippinen, Neuholland, Vandiemensland.  
*barbata* Desf., härtiges, ☉. ♂. t. m. f. Mascaren-Inseln. Cap d. g. H.  
*ciliata* Retz, gefranztes, ☉. w. m. f. Ostindien.

**Anthocercis**, Strahlenblume, XIV. 1., ? Solanaceae.

- albicans* Cun., weifslische, ♀. t. Neuholland.  
*litorea* La Bill., Meerstrand-St., ♀. t. Neuholland.  
*viscosa* RB., schmierige, ♀. t. Neuholland.

**Anthocleista** Afz., Blütenklaffer, V. 1., Contortae-Loganieae.

- macrophylla* G. Don, großblättriger, ♀. w. Sierra Leone.  
*Anthodendron* Rchb. v. *Azalea* spec.

**Anthodon** R. et P., Blumenzahn, III. 1., Evonymae-Hippocrateaceae.

**Anthodon**

ellipticum Mart., elliptischer, ♀. w. Brasilien.

paniculatum Mart., rispenblumiger, ♀. w. Brasilien.

**Antholoma** La Bill., Haubenblume, XIII. 1., Guttiferae-Marcgraviaceae.

montana La Bill., Berg-H., ♀. t. Neuholland.

**Antholyza** L., Rachenlilie, III. 1., Irideae.

aethiopica L., aethiopische, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

Lucidor L., glänzende, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

montana Ker, Berg-R., 4. Zw. t. Cap d. g. H.

praealta DC., hohe, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

coccinea Spgl. et *Cunonia* Thbg. v. *Anisanthus Cunonia*.

*fulgens* Andr. v. *Watsonia iridifolia*. *Meriana*

Curt. v. *Watsonia* Mer. *Merianella* Curt. v. *Watsonia*

*aletroides*. *plicata* Thbg. v. *Babiana Thunbergii*.

*quadrangularis* Vahl. v. *Gladiol. quadrang.*

*ringens* Andr. v. *aethiopia*. *ringens* L. v. *Babiana*

*ringens*. *spicata* Andr. v. *Watsonia brevifol.* *spi-*

*cata* Mill. v. *Gladiol. Milleri*. *tubulosa* Andr. vid.

*Watsonia aletroides*.

**Anthospermum** L., Ambrastrauch, IV. 1. (XXII. 1v.) Rubiaceae.

aethiopicum L., äthiopischer, ♀. k. Cap d. g. H.

**Anthoxanthum** L., Ruchgras, II. 11. Gramineae.

amarum Brot., bitteres, 4. f. Portugal.

gracile Bivon., schlankes, 4. f. Sicilien.

odoratum L., gemeines, 4. f. Europa.

ovatum Lag., eiförmiges, 4. f. Spanien.

**Anthriscus** P., Klettenkörbel, V. 11. Umbelliferae.

Cerfolium Hoffm., Garten-K., 4. f. Südeuropa.

fumarioides Spgl., erdrauchähnlicher, 4. f. Croatien, Krain, Istrien.

hispida DC., steifhaariger, 4. f. Frankreich.

nemorosa Spgl. MB., Hain-K., 4. Ungarn, Caucasus, Kamschatka, Deutschland.

sylvestris Hoffm., wilder, 4. f. Europa.

taurica Fisch., taurischer, 4. f. Taurien.

trichosperma Schult., haarsamiger, 4. f. Ungarn, Böhmen.

tuberculata R. et S., kleinhöckeriger, 4. f. Syrien.

β) *alpestris* Wimm. γ) *torquata* Dub.

vulgaris P., gemeiner, 4. f. Europa, Taur., Kleinasien.

*Caucalis* M. B. v. *vulgaris*. *humilis* Bess. et *proc-*

*erus* (elatior) Bess. vid. *sylvestris*. *nodosa* P. vid.

*Chaerophyllum nodosum*. *trichosperma* P. v. *Tori-*

*lis trichosperma*.

**Anthurium** Sch. et Endl., Blüthenschwanz, XXI. 1. (IV. 1.), Aroideae.

gracile Lindl., schlankkolbiger, 4. w. Trinid., Demerar.

**Anthyllis** L., Wollblume, XVII. vi. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

Aspalathi DC., witschenblättrige, ♀. t. C. d. g. Hoffn.

aurea Visian., goldfarbige, 4. f. Dalmatien.

Barba Jovis L., Jupiterbart-W., ♀. k. Süd-, West- und Osteuropa, Kleinasien.

β) *splendens* W.

cornicina L., hornhülsige, 4. f. Spanien.

cytisoides L., geißkleeähnliche, ♀. k. Spanien.

erinacea L., stachelige, ♀. k. Südspanien, Nordafrika.

Gerardi L., Gerard's, 4. f. Provence.

hamosa Desf., hackenhülsige, 4. f. Barbarei.



**Anthyllis**

*Hermanniae* L., Herrmann's,  $\frac{1}{2}$ . k. Creta.

*heterophylla* L., verschiedenblättrige,  $\frac{1}{2}$ . k. Portugal, Spanien.

*incisa* W., eingeschnittene, 4. f. b. k. Griechenland.

*linifolia* L., schmalblättrige,  $\frac{1}{2}$ . k. Cap d. g. Hoffn.

*lotoides* L., schotenkleeähnliche,  $\odot$ . f. Portugal, Spanien.

*montana*, Berg-W., 4. f. Oesterreich, Krain, Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich, Spanien.

$\beta$ ) *alba*.

*onobrychioides* Cav., esparsettähnliche, 4.  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Spanien.

*polycephala* Desf., vielköpfige, 4. f. b. k. Nordafrika.

*tetraphylla* L., vierblättrige,  $\odot$ . f. Italien, Sicilien.

*Vulneraria* L., gemeine,  $\frac{1}{2}$ . 4. f. Europa.

$\beta$ ) *alpestris* Rchb.  $\gamma$ ) *Dillenii* Schult. (*rubriflora* DC., *rubra* Hoppe).  $\delta$ ) *albiflora*.  $\epsilon$ ) *maritima* Schwegg.  $\zeta$ ) *polyphylla* Kit (*bicolor* Schlchr.).

*vulnerarioides* Bonj., zottige,  $\frac{1}{2}$ . f. Mont Cenis.

*cretica* Lam. vid. *Ebenus cretica*. *cuneata* Hamilt.

vid. *Lespedezia eriocarpa*. *sericea* W. v. *Ebenus*

*pinnata*. *Tournefortii* Schult. v. *Vulneraria*  $\epsilon$ .

*Webbiana* Penny, Webb's, 4. k. Teneriffa.

**Antidesma**. L., *Antidesma*, V. I. (XXII. v.), *Tricoccae-Euphorbiaceae*.

*alexiterium* L., giftheilendes,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*guineensis* G. Don, guineisches,  $\frac{1}{2}$ . w. Guinea.

*paniculatum* Roxb., rispiges,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*pubescens* Roxb., weichhaariges,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*zeylanicum* Lam., zeylanisches,  $\frac{1}{2}$ . w. Ceylon.

**Antirrhinum** T., Löwenmaul, XIV. II., *Personatae-Antirrhin.* (*Scrophul.*).

*Asarina* L., gundermannblättriges, 4. f. b. Italien, Frankreich.

*calycinum* Vent., Brot., großkelchiges,  $\odot$ , f. Portugal, Spanien.

*glandulosum* Lindl., drüsiges,  $\odot$ . f. Californien.

*latifolium* Mill., breitblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.

*majus* L., großes (Garten-L.),  $\frac{1}{2}$  4. f. Mittel- u. Südeuropa.

$\beta$ ) *angustifolium* Urv.  $\gamma$ ) *bicolor*.  $\delta$ ) *coccineum* (*sanguineum*).  $\epsilon$ ) *montevidense* Lnk.  $\zeta$ ) *flore pleno*.  $\eta$ ) *tortuosum* Bosc,  $\theta$ ) *variegatum* Dens,  $i$ ) *caryophylloides* Hort.

*meonanthum* Lk., schmalblumiges, 4. f. Südeuropa.

*molle* L., weiches, 4. k. Spanien, Portugal.

*ochroleucum* Hort., weißgelbes, 4. f. ?

*Orontium* L., Acker-L.,  $\odot$ . f. Europa.

*sempervirens* Lapeyr., immergrünes, 4. f. b. Pyrenäen.

*siculum* Ucr., sicilianisches,  $\frac{1}{2}$ . 4. f. Sicilien,

*aerugineum* Gouan. v. *Linaria tristis*. *album* Lam.

v. *Linaria chalepensis*. *bicorne* L. v. *Nemesia bi-*

*cornis*. *bipunctatum* Cav. vid. *Linaria amethystina*.

*Broussoneti* Poir. vid. *Linar. multicaulis*. *capitella-*

*tum* Vent. v. *Linar. multicaulis*. *crassifolium* Cav.

v. *Linar. organifolia*. *diffusum* Bernh. vid. *latifo-*

*lium*. *duriminium* Desf. vid. *Anarrhinum pedatum*.

*galioides* Vent. v. *Linaria striata*. *hexandrum* Forst.

v. *Tittmannia ovata*. *lanigerum* Broter. v. *Linaria*

*dealbata*. *linarioides* L. v. *Linar. hians*. *longicor-*

**Antirrhinum**

*ne* Thbg. vid. *Diascia Thunbergiana*. *lusitanicum* Lk. vid. *Linar. transtagana*. *macrocarpon* Ait. vid. *Nemesia chamaedryfolia*. *medium* Hort. vid. *majus* var. *monspessulanum* L. v. *Linaria striata*. *multipunctatum* Broter. vid. *Linaria multicaulis*. *neglectum* Clark v. *Linaria triphylla*. *odorum* MB. v. *Linaria Loeselii*. *Osyris* Cyril. v. *Linar. chalepensis*. *pallidum* Tenor. v. *Lin. pubescens*. *parviflorum* Jacq. v. *Linar. simplex*. *pinifolium* Poir. vid. *Linar. reticulata*. *polygalaefolium* Poir. vid. *Linar. linifolia*. ? *pubescens* Poir. v. *Linaria saxatilis*. *repens* L. v. *Linaria stricta*. *sapphirinum* Broter. v. *Linar. amethystin.* *saxatile* Bonam. v. *Linar. arenaria*. *spurium* Broter. v. *Linar. lanigera*. *Thui-lierii* Merat. v. *Linar. pyrenaic.* *Tournefortii* Poir. v. *Linar. saxatil.* *tricolor* Pourr. vid. *Linar. amethystina*. — *alpinum* L. *amethyst.* Vent. u. übrige v. *Linaria alpina* etc.

**Antrophyum** Kaulf., Höhlenfarn, XXIV. 1., Pteroideae. *lanceolatum* Kaulf., lanzettblättriger, 4. w. Westindien.

**Anychia** Mchx., *Anychia*, V. 1., Portulacae-Paronychieae. *dichotoma* Mchx., gabelästige, ☉. ♂. f. Nordamerika.

**Aotus** Sm., Haarkelch, X. 1., Leguminosae-Papilionac. *gracilis* Ait., schlanker, ♀. t. Neuholland.

*incana* Ma. C., weißgrauer, ♀. t. Neuholland.

α) *ericoides*. β) *ferruginea*.

*virgata* DC., ruthenförmiger, ♀. t. Neuholland.

**Apargia** (Scop.) Less., *Apargie*, XIX. 1., Compositae-Cichoraceae.

*Taraxaci* W., löwenzahnähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *longiscapa*.

*alpina* Jacq. v. *Leontodon squamosum*. *angustifolia* Schlchr. v. *Leont. tenuiflorum*. *arenaria* Mor. v. *Leontod. Berinii*. *aspera* W.K. v. *Leont. asp. aurantiaca* W. et K. v. *Leontod. croceum* β. *aurea* Hoppe v. *Crepis aurea*. *autumnalis* Hoffm. W. v. *Oporinia autumnalis*. *bulbosa* Balb. vid. *Thrincia tuberosa*. *caucasia* MB. v. *Leont. cauc.* *cichoracea* Cyril. vid. *Millina leontodontoides*. *coronopifolia* W. v. *Leont. coronopifoli.* *crispa* Steud. vid. *Leont. crisp.* *crisp. macrorhiza* Tenor. vid. *Leont. biscutellaefol.* *crocea* Haenk. vid. *Leontod. croc. danubialis* Scop. vid. *Leont. hostile*. *dubia* Hoppe v. *Leontod. dubium*. *fasciculata* Biv. vid. *Millina leontodontoid.* *guestfalica* Bönningh. v. *Leont asperum*. *hastilis* Host, W., (*heterophylla* Mch.) v. *Leontod. hastil.* *hirta* Scop. vid. *Thrincia hirta*. *hispanica* W. v. *Asterothrix hispanica*. *hispida* W. v. *Leont. hisp.* *hyoseroides* Sbr. v. *Millina hyoseroid.* *incana* Scop. v. *Leont. incan.* *lyrata* Ten. vid. *Thrincia tuberosa*. *pratensis* Lk. v. *Oporinia autumnal.* β. *saxatilis* Tenor. v. *Leontod. saxatil.* *strigosa* MB. vid. *Asterothrix asperima*. *tenuiflora* Gaud. v. *Leontod. tenuiflor.* *tergestina* Hopp. v. *Leont. saxatil.* *tuberosa* W. v. *Thrincia tuberosa*. *Villarsii* Loisel. v. *Leont. Villars.* *verna* Salzm. v. *Kalbfufsia Salzmanni*.

- Apeiba** Aubl. (guianischer Name), XIII. I., Tiliaceae.  
 aspera Aubl., rauhe, ♀. w. Guiana, Cayenne.  
 glabra Aubl., kahle, ♀. w. Guinea.  
 Petoumo Aubl., Petoumo, ♀. w. Guiana.  
 Tibourbou Aubl., Tibourbou, ♀. w. Westind., Südamer.
- Apera** Adans., Windhalm, III. II., Gramineae.  
 interrupta P. Beauv., unterbrochener, ☉. f. Ost- und Südeuropa.  
 Spica venti P. Beauv., gemeiner, ☉. f. Europa.
- Aphananthe** Lk., Aphananthe, VIII. II., Aizoideae-Atripliceae.  
 celosioides, hahnekammähnliche, ♀. w. Brasilien.  
*Aphanis arvensis* L., v. *Alchemilla Aphanes*.
- Aphanochilus** Benth., Kleinlippe, XIV. I., Labiatae.  
 blandus Benth., liebliche, 4. k. Nepal.  
 incisus Benth., eingeschnittene, 4. k. Nepal.
- Aphelandra** R.B., Aphelandra, XIV. II., Acanthaceae.  
 cristata R.B., kammige, ♀. w. Westindien.  
 β) nitida N. Esenb.  
 marginata N. E., berandete, ♀. w. Brasilien.
- Aphelexis fasciculata** D. Don. *filiformis* D. Don. *humilis* D. Don. *sesamoides* D. Don vid. *Helipterum fascicul.* etc. *Aphel. ericoides* Swt. vid. *Helichrysum ericoides*.
- Aphyllantes** T., Joncinelle (Nelkenlilie), VI. I., Juncaceae-Xyrideae.  
 monspeliensis L., französische, 4. f. b. k. Südfrankreich,
- Apicra** W. v. Aloë.
- Apios** Boerh., Erdnufs, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 tuberosa Pursh., knollige, 4. Sch. f. Nordamerika.  
 chinensis Spgl. *frutescens* Pursh. v. *Wistaria chin.* etc.
- Apium** T. Selleri, V. II., Umbelliferae.  
 fractophyllum Hoffm., gebrochenblättriger, ♂. f. ?  
 graveolens L., gemeiner, ♂. f. Europa.  
 β) dulce Mill. γ) rapaceum Mill. δ) lusitanicum Mill.  
 prostratum La Bill., gestreckter, 4. k. Van Diem. Land.  
 ternatum Pall., dreizähliger, 4. f. Ostsibirien.  
*Petroselinum* L. v. *Petroselinum sativum*.
- Aplectrum** Swt., Winterstendel, XX. I. Orchideae.  
 hyemale Swt., nordamerikanischer, 4. f. Nordamerika.
- Aplopappus** Cass., Borstenfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
 ciliatus DC., gefranztes, ♂. f. Nordamerika.  
 spinulosus DC., feinstacheliges, 4. f. Nordamerika.
- Aplophyllum** Ad. Juss. v. *Haplophyllum*.
- Apluda** L., Hüllgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.  
 aristata L., granniges, 4. w. Ostindien, Südafrika.  
*Gryllus* P. B. v. *Pollinia Gryllus*.
- Apocynum** T., Hundswolle, V. I., Contortae-Apocyneae.  
 androsaemifolium L., fliegenfangende, 4. f. Nordamer.  
 cannabinum L., grünblumige, 4. f. Nordamerika.  
 hypericifolium L., johanniskrautblättrige, 4. f. Nordamerika, Sibirien.  
 pubescens R.B., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.  
 venetum L., venetianische, 4. f. Italien, Dalmatien, Thracien, Caucasus.  
*frutescens* L. vid. *Ichnocarpus frutesc.* *hastatum* Thbg. v. *Eustegia hastata*.



- Aponogeton** Thbg., Wasserährchen, VI. III. (XI. IV.),  
Aroideae-Saurureae.  
angustifolius Ait., schmalblättriges, 4. Wa. t. Cap d.  
gut. Hoffn.  
crispus Thbg., krauses, 4. Wa. w. Ceylon.  
distachys Ait., zweispaltiges, 4. Wa. Cap d. g. Hoffn.  
linearis Vahl, linienblättriges, 4. Wa. w. Ostindien.  
monostachys L., Suppl., einfaches, 4. Wa. w. Ostin-  
dien, Südchina.
- Aporum** Blume, Aporum, XX. I., Orchideae.  
anceps Lindl., zweischneidiges, 4. w. Bengalen.
- Aquartia** Jacq. (B. Aquart., Jacquin's Reisegefährte in  
Amerika), IV. I. Solanaceae.  
aculeata Jacq., stachelige, 5. w. Westindien.  
microphylla Lam., kleinblättrige, 5. w. Westindien.  
tomentosa Lam. v. aculeata.
- Aquilaria** Lam., Adlerholz, X. I., ? Thymelaeaceae-  
Aquilarinae.  
malaccensis Lam., malackisches, 5. w. Malacka.  
ovata Cav. v. malaccensis.
- Aquilegia** T., Akelei, XIII. v., Ranunculaceae.  
alpina L., Alpen-A., 4. f. Schweiz.  
β) grandiflora Pall., Sibirien.  
anemonoides W., anemonenähnliche, 4. f. Altai.  
arctica Hort., nördlichste, 4. f. ? Sibirien.  
atrata Koch, schwarzviolette, 4. f. Baiern, Tyrol, Salz-  
atropurpurea W., dunkelrothe, 4. f. Sibirien.  
β) Fischeriana DC.  
bicolor Ehrh., zweifarbig, 4. f. Sibirien.  
canadensis L., kanadische, 4. f. Canada, Virginien,  
Dahurien.  
β) elata Ledeb. γ) lutea.  
formosa Fisch., wohlgestaltete, 4. f. Camtschatka.  
Gebleri Fisch., Gebler's, 4. f. Sibirien.  
glandulosa Fisch., drusige, 4. f. Sibirien.  
α) concolor. β) discolor.  
leptoceras Fisch. et Mey., leichtspornige, 4. f. Dahuria.  
nigricans Baumg., schwärzliche, 4. f. Sibirien.  
parviflora Ledeb., kleinblumige, 4. f. Sibirien.  
praecox P., frühe, 4. f. ? Sibirien.  
pyrenaica DC., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen, Apenninen,  
Tyrol.  
sibirica Lam., sibirische, 4. f. Sibirien.  
Sternbergii Rchb., Sternberg's, 4. f. Kärnthen, Krain.  
viridiflora Pall., grünblumige, 4. f. Sibirien.  
viscosa Gouan., schmierige, 4. f. Südfrankreich.  
vulgaris L., gemeine, 4. f. Europa.  
β) corniculata. γ) degener. δ) inversa. ε) platy-  
tysepala Rchb. ζ) stellata. η) elegans A.P. etc.  
Hybrid., wozu schon einige der obigen gehören:  
Garnieriana Swt., hybrida Sims, marginata Hort.  
alpina Auctor vid. pyrenaica et Sternbergii. davu-  
rica Patr. v. viridiflora. montana Stbg. v. alpina.  
vulgaris dahurica W. vid. sibirica. vulg. speciosa  
Ait. v. bicolor.
- Aquilicia sambucina** L. v. Leea sambucina.
- Arabis** L., Gänsekraut, XV. III., Cruciferae.  
albida Steven, weißliches, 4. f. Caucasus, Persien.  
β) longiflora DC. γ) variegata Hortul.  
Allionii DC., Allione's, 4. f. Piemont.

## Arabis

*alpina* L., Alpen-G., 4. f. Europäische Alpen, Island, Grönland, Labrador, Nordafrika.

β) *Clusiana*. γ) *nana*. δ) *crispata* W.

*ambigua* DC., zweifelhaftes, ♂. f. Kamtschatka.

*arenosa* Scop., sandiges, ♂. f. Europa.

*auriculata* Lam., geöhrt, ♂. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *puberula* Koch,

*bellidifolia* Jacq., tausendschönblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*brassicaeformis* Wallr., kohlähnliches, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Siebenbürgen.

*canadensis* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

*cevennensis* DC., Cevennen-G., ♂. f. Südfrankreich.

*ciliata* RB, gefranztes, ♂. f. Mittel- u. südeuropäische Voralpen und Alpen.

α) *glabrata* Koch, β) *hirsuta* Koch,

*coerulea* Hænke, blaues, 4. f. Deutsche und Schweizer Alpen, Siebenbürgen.

*collina* Tenor. Hügel-G., 4. f. Neapel.

*dasycarpa* Andr., haarfrüchtiges, ♂. f. Podolien, Siebenbürgen.

*flexuosa* Tenor., gebogenes, ♂. f. Neapel.

*Gerardi* Bess., Gerard's, ♂. f. Galizien, Schlesien, Rheingegend.

*Halleri* L., Haller's, 4. f. Mittel- u. Süddeutschland, Italien, Ungarn, Siebenbürgen.

β) *stolonifera* Hornem, DC. γ) *ovirensis* Wulf.

δ) *diversifolia* Koch. ε) *tenella* Host.

*hirsuta* Scop., rauhhaariges, ♂. 4. Europa, Nordamer.

β) *curtisiliqua* Fr. γ) *glaberrima* Wahlenb. δ) *glastifolia* Rchb.

*laevigata* DC., glattes, 4. f. Nordamerika.

*lasioloba* Lk., haarlappiges, ♂. k. t. Mexico.

*lilacina* Schr., lilablumiges, ♂. f. ?

*longisiliqua* Presl, langschotiges, ♂. f. Sicilien.

β) *purpurascens* Presl.

*lucida* L., starkglänzendes, 4. f. Ungarn.

β) *variegata*.

*lyrata* L., leierförmiges, ♂. f. Nordamerika.

*mollis* Steven, weichblättriges, 4. f. Caucasus.

*muralis* Bertol., Mauer-G. 4. f. Schweiz, Oberitalien.

*oxyota* DC., spitzöhriges, ♂. w. f. m. Ostindien.

*pendula* L., herabhängendes, ♂. f. Sibirien.

β) *Patriniana* DC.

*petraea* Lam., Felsen-G., ♂. 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, England, Dänemark, Schweden.

β) *hastulata*. γ) *hirta* (*hispida*).

*procurrens* W. Kit., auslaufendes, 4. f. Krain, Bannat, Servien.

β) *variegata*.

*pubescens* Poir., weichhaariges, ♂. f. b. Barbarei.

*pumila* Jacq., kleines, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *laxa* Koch.

*retrofracta* Grah., zurückgeknicktes, 4. f. Nordamerika.

*rosea* DC., rosafarbenes, ♂. f. Calabrien.

*saxatilis* All., Gestein-G., ♂. f. Südl. Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich.

*serpyllifolia* Vill., quendelblättriges, ♂. f. Süd. Schweiz. Südfrankreich.

**Arabis**

*spathulata* DC., spatheblättriges, ♂. f. b. k. Monte Video, bonarische Inseln.

*stellulata*, Bertol., sternhaariges, 4. f. Italien.

*stenopetala* DC., schmalblüthiges, ☉. f. ?

*stricta* Huds., steifes, 4. f. England, südl. Schweiz, Frankreich, Italien, Siebenbürgen, Nordamerika.

*toxophylla* M.B., bogenblättriges, ♂. f. Wolgaufer.

*Turrita* L., thurmkrautartiges, ♂. f. Süd- und Osteuropa, England.

β) *umbrosa* Steven.

*undulata* Lk., wellenblättriges, 4. f. Südeuropa.

*verna* R.B., Frühlings-G., ☉. f. Südeuropa, Atlas.

*vochinensis* Spgl., Wocheiner, 4. f. Krain, Oberkärnthen.

*aspera* All. v. *auriculata*. *bursifolia* Lam. vid. *Sisymbrium bursifol.* *caucasica* W. v. *albida*. *ciliaris* W.E. v. *pumila* β. *contracta* Spen. v. *hirsuta*. *Crantziana* Ehrh. v. *petraea* γ. *grandiflora* L. vid. *Neuroloma arabidiflor.* *grandiflora* Pall. vid. *Andreoskia pectinata*. *hirsuta sessilifolia* et *incana* Gaud. v. *ciliata* β. *hirta* Lam. v. *stricta*. *hispida* L. fil. v. *petraea* γ. *hispida* Ait. v. *stricta*. *incana* Roth. v. *auriculata*. *incana* W.E. v. *muralis*. *intermedia* Hoppe v. *pumila* β. *longisiliquosa* Wallr. v. *hirsuta* δ. *nemorensis* Rchb. vid. *hirsuta* δ. *nivalis* Spgl. v. *Macropodium nival.* *nova* Vill. vid. *saxatilis*. *nutans* Mch. vid. *pumila*. *patula* Wallr. v. *auriculata*. *perfoliata* Lam. v. *Turritis glabra*. *pinnatifida* Lam. vid. *Sisymb.* *pinnatifid.* *praeco* W. vid. *proccurrens*. *pumila* Poll. vid. *stellulata*. *recta* Baumg. v. *dasycarpa*. *recta* Vill. vid. *auriculata*. *sagittata* DC. v. *Gerardi* et *hirsuta*. *scabra* Lam. v. *Sisymb.* sup. *tuberosa* P. v. *Cardamine rhomboidea*. *umbrosa* Crantz v. *Turrita*.

**Arachis** L., Erdnuß, XVII. VI. (IV.), Leguminosae-Caesalpinieae.

*hypogaea* L., jährige, ☉. w. m. Südamerika, Asien, Afrika.

*aprica* Walt. v. *Stylosanthes elatior*. *fruticosa* Retz v. *Stylosanthes mucronata*.

**Aralia** L., Aralie, Beerangelika, V. v., Araliaceae.

*aculeata* G. Don, stachelige, ♀. w. t. Nepal.

*arborea* L., baumartige, ♀. w. Jamaica, Portorico.

*capitata* Jacq., kopfblumige, ♀. w. Westindien.

*cochleata* Lam., löffelblättrige, ♀. w. Molucken.

*digitata* Roxb., fingerförmige, ♀. w. Ostindien.

*ferruginea* Humb. Bonpl., rostfarbige, ♀. w. Quito.

*fragrans* G. Don, wohlriechende, ♀. w. t. Nepal.

*hispida* Mchx., steifhaarige, ♀. f. b. Nordamerika.

*japonica* Thbg., japanische, ♀. 1. Japan.

*macrophylla* Cun., großblättrige, ♀. t. Insel Norfolk.

*micans* W., schimmernde, ♀. w. Trinidad.

*Mühlenbergiana* R. et S., Mühlenberg's, ♀. 4. f. b. Nordamerika.

*nudicaulis* L., nacktstengelige, 4. f. Nordamerika.

*pentaphylla* Thbg., fünfblättrige, ♀. t. k. Japan, China.

*pubescens* DC., weichhaarige, ♀. w. Neuspanien.

*racemosa* L., traubige, 4. f. Nordamerika.

*sambucifolia* Cun., fliederblättrige, ♀. t. Neuholland.



**Aralia**

*spinosa* L., dornige, ♂. ♀. f. b. Nordamerika.  
*umbraculifera* Roxb., schirmblättrige, ♂. w. Ostindien.  
*Sciodaphyllum* Sw. v. *Sciodaphyllum* Brownii.

**Araucaria** Juss. (chilesischer Name), Schmucktanne, XXII. XIII., Coniferae.

*brasiliانا* Rich., brasilianische, ♂. t. Brasilien.  
*Cunninghamii* RB., Cunningham's, ♂. t. Neuholland.  
*excelsa* RB., hohe (Norfolktanne), ♂. t. Norfolkinsel, Neu-Caledon.

*imbricata* R. et P., dachziegelförmige, ♂. t. Chili.

**Arbutus** T., Erdbeerbaum. X. I. Ericaceae.

*Andrachne* L., morgenländischer, ♂. k. Levante.  
*canariensis* Lam., canarischer, ♂. t. Canarische Inseln.  
*densiflora* Kunth, dichtblumiger, ♂. t. Mexico.  
*ferruginea* L. Suppl., rostfarbener, ♂. w. Neu-Granada.  
*hybrida* Ker., Bastard-E., ♂. k. ?

β) *Milleri* Swt.

*laurifolia* L. Suppl., lorbeerblättriger, ♂. k. Nordamerika, Mexico.

*longifolia* Loisel. (hybrid. ex *A. Andrachne* et *canariensis*), langblättriger, ♂. k. t. ?

*Menziesii* Pursh, Menzies, ♂. k. f. b. Westl. Nordamer., Neu-Californien, Mexico.

β) *elliptica*. γ) *oblongifolia*.

*nepalensis* H. Engl., nepalischer, ♂. t. Nepal.

*speciosa* H. Engl., prächtiger, ♂. t. ? Mexico.

*Unedo* L., gemeiner, ♂. k. f. b. Südeuropa, Ireland.

β) *crispa*. γ) *integrifolia*. δ) *plena*. ε) *rubra*.

ζ) *salicifolia*. η) *schizopetala*.

*alpina* L. v. *Arctostaphylos* alp. *Andrachne serratifolia* Hort. et *andrachnoides* Lk. v. *hybrida*. *butxifolia* Stockh. v. *Arctostaphyl.* *uva ursi*. *callicarpus* Brouss. vid. *canariensis*. *empetrifolia* Lk. vid.

*Pernettya empetrifolia*, *filiformis* Lam. vid. *Phalerocarpus hispidulus*. *laurifolia* Hamilt. vid. *Gaultheria fragrantissima*. *microphylla* Forst. vid. *Pernettya microphylla*. *mucronata* Forst. v. *Pernettya mucronata*. *phyllireaefolia* P. v. *Pernettya phyllireaefol.* *pilosa* Grah. vid. *Arctostaph.* *pumila* L. fil. v. *Pernettya empetrifol.* *pungens* Hook vid.

*Arctostaphyl.* *Hookeri*. *scrpyllifolia* Lam. v. *Pernet.* *microphyll.* *thymifolia* Ait. vid. *Phalerocarp.* *hispid.* *tomentosa* Pursh v. *Arctostaphyl.* *tomentos.*

*Uva ursi* L. v. *Arctostaphyl.* *uva ursi*. *xalapensis* Andr. v. *Arctostaphyl.* *Oaxacana*.

**Archangelica** Hoffm., Engelwurz, V. II., Umbelliferae.

*atropurpurea* Hoffm., dunkelpurpurfarbige, ♂. 4. f. Canada.

*decurrens* Ledeb., herablaufende, ♂. 4. f. ? Sibirien.

*officinalis* Hoffm., officinelle, ♂. f. Nordeuropa, Süd-

deutschland.

**Arctium** Dalech. Lam. Bärendistel, XIX. I. Compositae-Cynarocephalae.

*lanuginosum* Lam., wollige, 4. f. b. Südfrankr., Piemont.

*Bardana* L. v. *Lappa tomentosa*. *Carduelis* L. v.

*Carduus arctioides*. *Lappa* α) et β) L. v. *Lappa*

*maj.* et *min.* et *tomentosa*. *majus* et *minus* Schk. v.

*Lappa maj.* et *min.* *montanum* Schweig. v. *Lappa*

*minor*. *Personata* L. v. *Carduus Personata*. *tomen-*

*tosum* P. v. *Lappa toment.*

**Arctopus** L., Bärenfuß. V. II. (xxiii. II.) Umbelliferae.  
*echinatus* L., igelstacheliger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

**Arctostaphylos** Adans, Bärentraube, X. I. Ericaceae.  
*alpina* Spgl., Alpen-B., f. f. Nordeuropa, Asien und Amerika, Deutschl. und Schweiz, Alpen.

*cordifolia* Lindl., herzblättrige, f. f. b. Nordamerika.

*glauca* Lindl., blaugrüne, f. f. b. k. Californien.

*Hookeri* G. Don, Hooker's, f. f. b. k. Californien.

*Oaxacana* DC., mexikanische, f. k. Mexico, Oaxacana.

*pilosa*, \* haarige, f. k. Mexico.

*tomentosa* Dougl. Lindl., filzige, f. k. f. b. Westliches Nordamerika, Californ., Mexico.

β) *nuda* H. et A.

*Uva ursi* Spgl. (*officinalis* Wim. et Grab.), gemeine, f. f. Nordeuropa und Nordamerika, deutsche u. Schweiz, Alpen.

**Arctotheca** Wendl., Bärenbüchse, XIX. III. Compositae-Corymbif. (Cynareae).

*grandiflora* Schrad., großblumige, 4. k. Cap d. g. H.

*repens* Wendl., kriechende, 4. k. Cap d. g. H.

*hirta* Schrad. v. ? *grandiflora*.

**Arctotis** L., Bärenohr, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae (Cynareae).

*acaulis* L., stengelloser, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *tricolor* Jacq. γ) *undulata* Jacq. δ) *speciosa* Jacq.

*adpressa* DC., angedrücktes, f. k. t. Cap d. g. H.

*aenea* Jacq., metallfarbiges, f. k. t. Cap d. g. H.

*angustifolia* L., schmalblättriges, f. k. t. Cap d. g. H.

*argentea* Thbg., silberfarbiges, f. k. t. Cap d. g. H.

*aspera* L., rauhes, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

α) *arborescens* Jacq. β) *aureola* Ker. γ) *cichoracea* Berg. δ) *cuprea* Jacq. ε) *scabra* Berg. *maculata* Jacq.).

*auriculata* Jacq., geöhrt, k. t. Cap d. g. H.

β) *melanocyclus* Willd. Enum.

*bellidifolia* Berg., tausendschönblättriges, f. k. t. C. d. g. H.

α) *integrifolia*. β) *incisa*.

*candida* Thbg., reinweißes, 4. k. t. Cap d. g. H.

*Cineraria* Jacq., aschenkrautähnliches, f. k. t. C. d. g. H.

*decurrens* Jacq., herablaufendes, f. 4. k. t. C. d. g. H.

*elatior* Jacq., erhabenes, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*elongata* Thbg., verlängertes, f. k. t. Cap d. g. H.

*fastuosa* Jacq., prächtiges, ♂. k. t. Cap d. g. H.

β) *spinulosa* Jacq.

*flaccida* Jacq., schlaffes, ☉. f. m. Cap d. g. H.

*laevis* Thbg., glattes, f. k. t. Cap d. g. H.

*leucanthemoides* Jacq., weißblumenähnliches, ☉. f. m.

Cap d. g. Hoffn.

*petiolata* Thbg., langstieliges, 4. k. t. C. d. g. H.

*reptans* Jacq., kriechendes, 4. k. t. Cap d. g. H.

*revoluta* Jacq., zurückgerolltes, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *fruticosa*.

*stoechadifolia* Berg., stöchasblättriges, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

α) *grandis* Less. β) *decumbens* Less. (Thbg.).

γ) *Bergii* Less. δ) *rosea* Less.

*virgata* Jacq., ruthenförmiges, ☉. f. m. Cap d. g. H.

β) *obtusifolia*.

## Arctotis

*abrotanifolia* Steud. vid. *Sphenogyne abrotanifol.*  
*acaulis* Jcq. v. *adpressa.* *angustifolia* Jcq. v. *Venidium angustifolium.* *anthemoides* L. v. *Sphenog. anthem.* *bicolor* W. vid. *aspera* γ. *Calendula* L. (*calendulacea* Jacq.) v. *Cryptostemma calend.* *cernua* Thbg. vid. *Sphenogyn. anthem. L.* *crithmoides* Berg. v. *Sphen. crithmifol.* *decumbens* Jacq. vid. *angustifolia.* *dentata* L. vid. *Sphenog. dentata.* *denudata* Thbg. v. *laevis.* *elegans* Thbg. v. *Chrysanthemum indicum.* *foeniculacea* Jacq. vid. *Sphenog. foenicul.* *formosa* Thbg. v. *aspera* γ. *glabrata* Jacq. v. *laevis.* *glaucoophylla* Jacq. v. *candida.* *glutinosa* Sims vid. *Dimorphotheca cuneata.* *grandiflora* Ait. v. *elongata.* *grandiflora* Jacq. v. *laevis.* *grandis* Thbg. v. *stoechadifol. α.* *hispidella* Juss. v. *Hispidella hispanica.* *humilis* Salisb. v. *acaulis.* *hypochondriaca* L. v. *Cryptostema hypochond.* *incisa* Thbg. v. *auriculat.* *lyrata* W. v. *aspera* γ. *maculata* Jcq. vid. *Chrysanthemum nodosum.* *odorata* W. v. *Sphenogyne odorata.* *paniculata* Jcq. v. *bellidifol.* *paradoxa* Ait. v. *Sphenogyne anthemoides.* *paradoxa* L. vid. *Ursinia paradoxa.* *pectinata* Thbg. vid. *Sphenogyne dentata.* *pilifera* Thbg. v. *Sphenog. pilif.* *pinnata* Thbg. v. *Sphenog. anthemoid.* *prostrata* Salisb. v. *Arctotheca repens.* *repens* Jacq. v. *Arctoth. rep.* *rosea* Jcq. v. *stoechadifolia β.* *scapigera* Thbg. v. *acaulis.* *scariosa* Ait. v. *Sphenog. scarios.* *spinulosa* Jacq. v. *fastuosa β.* *squarrosa* Jacq. vid. *laevis.* *staticefolia* Poir. vid. *Gazania subulata.* *superba* L. et *tristis* L. vid. *Cryptost. hypochondr.* *tenuifolia* Poir. vid. *Dimorphotheca graminifol.* — *undulata* Thbg. v. *aspera β.* *unicolor* Hort. vid. ?

**Ardisia Sw., Spitzblume, V. r., Sapotaceae-Myrsineae (Ardisiaceae).**

*acuminata* W., spitzblättrige, ♀. w. Guiana.  
*canaliculata* Lodd., rinnenförmige, ♀. t. ?  
*capensis* Zeyh., capische, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*colorata* Link., farbige, ♀. w. Ostindien.  
*complanata* Wall., verflachte, ♀. w. Malacka.  
*coriacea* Sw., lederblättrige, ♀. w. Antillen.  
*crenulata* Vent., gekerbte, ♀. w. Antillen.  
*elegans* Andr., zierliche, ♀. w. Ostindien.  
*excelsa* Ait., hohe, ♀. t. Bahamische Inseln, Madeira.  
*humilis* Vahl, niedrige, ♀. w. Ostindien.  
*hymenandra* Wall., hautbeutelige, ♀. w. Silhet.  
*lanceolata* Roxb., lanzettblättrige, ♀. w. Ostindien.  
*lateriflora* Sw., seitenblumige, ♀. w. Westindien.  
*latifolia* R. et S., breitblättrige, ♀. w. Antillen.  
*lentiginosa* Ker, scharlachfrüchtige, ♀. w. China.  
*litoralis* Bot. Reg., Meerstrands-Sp., ♀. w. Ostindien.  
*odontophylla* Wall., zahnblättrige, ♀. w. Bengalen.  
*paniculata* Roxb., rispenblumige, ♀. w. Ostindien.  
*pubescens* Lodd., weichhaarige, ♀. w. ?  
*punctata* Lindl., punktirte, ♀. w. China, Nepal.  
*pyramidalis* Cav., pyramidenförmige, ♀. w. Antill., Südamerika.  
*serrulata* Sw., feingesägte, ♀. w. Westindien.  
*solanacea* Roxb., nachtschattenähnliche, ♀. w. Ostindien.



**Ardisia**

*thyrsiflora* D. Don, straufsblumige,  $\frac{1}{2}$  t. Nepal.

*tinifolia* Sw., lorbeerblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaika.

*crenata* Bot. Mag. et Hortul. vid. *lentiginosa*. *ma-*

*crocarpa* Wall. v. *punctata*. *pyramidalis* Roth vid.

*paniculata*. *umbellata* Roth v. *litoralis*.

**Arduina** L. (P. Arduino Botan. zu Padua), V. 1., Con-  
tortae-Apocynaeae.

*bispinosa* L., zweidornige,  $\frac{1}{2}$  t. w. Cap d. g. Hoffn.

**Areca** L., Arecapalme, XXI. x. (VI. III.), Palmae.

*Catechu* L., Catechu,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*crinita* Bory, bemähnte,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas-Inseln.

*exilis* Lodd., dünne,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

*humilis* W., niedrige,  $\frac{1}{2}$  w. Amboina.

*lutescens* Bory, gelbliche,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas-Inseln.

*Manicot* Lodd., Manicot,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*montana* Lodd., Berg-A.,  $\frac{1}{2}$  w., Südamerika.

*rubra* Bory, rothe,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas-Inseln.

*triandra* Roxb., dreimännige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*oleracea* Jacq. v. *Euterpe caribaea*.

**Aremonia** Neck., Steinwurzel, VIII. II., Rosaceae.

*agrionoides* Neck., dreiblättrige, 4. f. Croatien, Krain,  
Italien.

**Arenaria** L., Sandkraut (Sandmiere), X. III., Caryo-  
phyllaceae-Alsineae.

*balearica* L., balearisches, 4. k. f. b. Balearische In-  
seln, Corsica.

*biflora* L., zweiblumiges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

*buxifolia* Poir., buchsbaumblättriges, ①. f. Canada.

*calycantha* Ledeb., kelchblüthiges, ①. f. Oestl. Sibirien.

*calycina* Poir., großkelchiges, ①. ♂. f. Barbarei.

*ciliata* L., gefranztes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen,  
Ireland, Island.

β) *multicaulis* L. (*frigida* Koch).

*cinerea* DC., aschfarbiges, ①. f. Südfrankreich, Sicilien.

*coimbricensis* Brot., coimbrisches, ①. f. Portugal.

*densa* Kit., dichtes, 4. f. Ungarn.

*filifolia* Forsk., fadenblättriges, 4. k. Arabien.

*grandiflora* All., großblumiges, 4. f. Mähren, Krain,  
Schweiz und ital. Alpen.

*Helmii* Fisch., Helms-S., 4. f. Ural.

*juniperina* L., wachholderähnliches, 4. f. Armenien.

*laricina* Schlecht., lerchenblättriges, 4. f. Sibirien.

*marginata* M.B. (secund. Loud.), berandete, 4. f. Caucas.

*montana* L., Berg-S., 4. f. Westfrankreich, Spanien,  
Portugal.

*nemorosa* Kunth, Hain-S., 4. k. Quito, Neugranada.

*pendula* Kit., herabhängendes, 4. f. Ungarn.

*procumbens* Vahl, niederliegendes, 4. k. Aegypten, Bar-  
barei, Südspanien, Sicilien.

*pubescens* Urv., weichhaariges, 4. f. Griechenland.

*rotundifolia* M.B., rundblättriges, 4. f. Caucasus.

*scabra* Poir., scharfes, ? 4. f. Südeuropa.

*serpyllifolia* L., quendelblättriges, ①. f. Europa, Nord-  
amerika.

β) *alpina*. γ) *glutinosa*.

## Arenaria

- stricta* Mchx., steifes, 4. f. Nordamerika.  
*tetraquetra* L., vierkantiges, 4. f. Pyrenäen.  
*triflora* L., dreiblumiges, 4. f. Italien, franz. Alpen.  
*trinerva* L., dreinerviges, ③. f. Europa.  
*verticillata* W., wirtelblättriges, 7. 4. k. Armenien.  
*amabilis* Bory vid. *tetraquetra*. *aretioides* Port.  
v. *Alsine aret.* *austriaca* All. vid. *Alsine Villarsii*.  
*austriaca* Jacq. v. *Alsine austr.* *Bartolotti* Tin. v.  
*cinerea*. *bavarica* L. v. *Möhringia* Ponae. *brevi-*  
*caulis* Stbg. v. *Alsine lanceolata*. *caespitosa* Ehrh.  
v. *Alsine caespitosa*. *canadensis* P. vid. *Alsine can-*  
*ad.* *capillacea* All. v. ? *Alsine caespitosa* β. *ca-*  
*pillaris* Poir. v. *Eremogone longifolia*. *cherlerifo-*  
*lia* G. Don v. *Alsine rubella*. *cherlerioides* Vill. v.  
*Alsine lanceolata* β. *clandestina* Portensch. v. *Al-*  
*sine graminifol.* *cucubaloides* Sm. vid. *Eremogone*  
*cuc.* *dahurica* Fisch. v. *Eremogone juncea*. *dian-*  
*thoides* Sm. vid. *Eremogone dianthoid.* *fasciculata*  
Gouan. v. *Alsine fascicul.* *fasciculata* Jacq. v. *Al-*  
*sine Jacquini.* *fastigiata* Sm. vid. *Alsine rostrata*.  
*filifolia* MB. vid. *Eremogone graminifol.* *formosa*  
Fisch. v. *Eremogone formosa*. *frutescens* Kit. vid.  
*Alsine setacea.* *Gerardi* W. v. *Alsine caespit.* β.  
*glandulosa* Jacq. vid. *Alsin. gland.* *glutinosa* Jacq.  
v. *Alsin. glut.* *graminifolia* Schrad. W. vid. *Ere-*  
*mogone gram.* *herniariaefolia* Desf. v. *procumbens*.  
*heteromalla* P. v. *Alsine setacea.* *hirsuta* M. B. v. *Alsine*  
*hirsuta.* *holostea* M. B. v. *Eremogone holost.* *im-*  
*bricata* M. B. v. *Alsine imbr.* *juncea* M. B. v. *Ere-*  
*mogone junc.* *juniperina* Vill. v. *grandiflora.* *lan-*  
*ceolata* All. v. *Alsine lonceolata.* *lapponica* Spgl.  
v. *Alsine stricta.* *laricifolia* L. v. *Alsine laricifol.*  
*liniflora* Jacq. v. *Alsine caespitosa* β. *liniflora* L. fil. v.  
*Alsine laricifolia* β. *longifolia* M. B. (*sibirica* P.) v. *Ere-*  
*mogone longifol.* *macrocarpa* Hornem. vid. *Alsine*  
*laricifolia.* *macrocarpa* Pursh vid. *Alsine macroc.*  
*marginata* DC. v. *Alinse marina* β. *marina* Roth,  
Sm. v. *Alsin. mar.* *media* L. vid. *Alsin. marina* β.  
*mediterranea* Ledeb. vid. *mucronata.* *molluginea*  
Sering. v. *Alsin. moll.* *mucronata* DC. vid. *Alsine*  
*rostrata.* *mucronata* L. vid. *Alsine m.* *multicaulis*  
L., Wulf. v. *ciliata* β. *nardifolia* Ledeb. v. *Ere-*  
*mogone nard.* *otitoides* Adams v. *Eremogone otit.*  
*peploides* L. v. *Alsin. peploid.* ? *pinifolia* M. B. v.  
*Alsin. pin.* *polygonoides* Wulf. v. *Möhringia polyg.*  
*Ponae* Rchb, v. *Möhringia* Ponae. *propingua* R. B.  
v. *Alsine caespit.* *prostrata* Sering. v. *Alsine pro-*  
*strata.* *pungens* Steph. v. *Eremogon. pung.* *pur-*  
*purea* P. v. *Alsine purp.* *radicans* Spgl. v. *Alsine*  
*radic.* *ramosissima* W. vid. *Alsine verna.* *recurva*  
All. vid. *Alsine recur.* *rigida* M. B. vid. *Eremog.*  
*rigid.* *rosea* Presl. vid. *procumbens.* *rostrata* Kit.  
v. *Alsin. laricifol.* *rostrata* P. v. *Alsine rostr.* *ru-*  
*bella* Hook v. *Alsine sedoides.* *rubra* L. v. *Alsin.*  
*rubr.* *rubra* β. L. v. *Alsine marina.* *saxatilis* L.  
v. *Alsine setacea.* *scandinavica* Spgl. v. *Alsine bi-*  
*flora.* *segetalis* Lam. v. *Alsine seg.* *setacea* Thuill.  
v. *Alsine set.* ? *striata* L. v. *Alsine recurva.* *su-*  
*bulata* Sering. v. *Eremog. pungens.* *tenuifolia* L.

**Arenaria**

v. *Alsin. tenuif. thymifol.* Pursh v. *buxifolia. triandra* Schrk. v. *Alsine mucronata. uliginosa* Schlecht. vid. *Alsine stricta. verna* L. vid. *Alsin. verna. Villarsii* Balb. v. *Alsine Vill. villosa* Wulf. v. *Moehringia villosa. viscida* Hall. fil. v. *serpyllifolia*  $\beta$ . *viscosa* Pers. Thüll. v. *Alsine tenuif. \beta*.

*Areng saccharifera* La Bill. v. *Gomutus saccharifer*.

**Arethusa** L. (Nymphen der Diana), *Arethuse*, XX. 1., Orchideae.

*bulbosa* L., knollige, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

*plicata* Andr., faltige, 4. Kn. w. Ostindien.

*ciliaris* L. Suppl. (*pectinata*) vid. *Bartholina pectinata. ophioglossoides* L. et *pendula* W. v. *Pogonia ophiog.* etc.

**Aretia** Hall. Gaud. (B. Aretius, ehemaliger Professor zu Bern), V. 1., Primulaceae.

*Vitaliana* L., Vital's, 4. f. Südl. Tyroler und Walliser Alpen, Pyrenäen.

Die übrigen siehe Androsace.

**Argania** Schousb., (Argam, einheimischer Name), V. 1., Sapotaceae.

*Sideroxylon* Schousb., Eisenholz-A., 5. k., Marocko.

**Argemone** T., Stachelmohn, XIII. 1., Papaveraceae.

*albiflora* Sims, weißblumiger,  $\odot$ . ♂. f. Mexico.

*Barclayana*, Penny, Barclay's, ♂. ? 4. f. k. Mexico.

*grandiflora* Swt., großblumiger,  $\odot$ . ♂. f. k. Mexico.

*Hunnemanni* H., Berol., Hunnemann's,  $\odot$ . ♂. f. k. Mittelamerika.

*mexicana* L., mexicanischer,  $\odot$ . f. Mexico.

*ochroleuca* Swt., weißgelblicher,  $\odot$ . f. Mexico.

*platyceros* H. Berol., flachhörniger, 4. k. Mittelamerika.

*armeniaca* L. v. *Papaver armeniacum. intermedia*

Swt. v. *Barclayana. pyrenaica* L. v. *Papaver pyren.*

*sulphurea* Swt. v. *ochroleuca*.

**Argolasia plumosa** Juss. v. *Lanaria plumosa*.

**Argyreia** Lour., Silberwinde, V. 1., Convolvulaceae.

*bona nox* Swt., nachtblühende, 5. Sch. w. Ostindien.

*cuneata* Ker., keilblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.

*cymosa* Swt., afterdoldige, 5. Sch. w. Ostindien.

*ornata* Swt., geschmückte, 5. Sch. w. Ostindien.

*pomacea* Swt., äpfelfrüchtige, 5. Sch. w. Ostindien.

*speciosa* Swt., prächtige, 5. Sch. w. Ostindien.

*splendens* Swt., glänzende, 5. Sch. w. Ostindien.

*uniflora* Swt., einblumige, 5. Sch. w. Ostindien.

**Arisarum** Tourn., Kugelwurz, XXI. 1., Aroideae.

*vulgare* Kunth, gemeine, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.

**Aristea** L., Borstenlilie, III. 1., Irideae.

*cyanea* Ait., kornblumenblaue, 4. k. t. Cap d. g. H.

*major* Andr., große, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*melaleuca* Ker., schwarzweiß, 4. k. t. Cap d. g. H.

*pusilla* Ker., kleine, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*spiralis* Vahl, spiralförmige, 4. k. t. Cap d. g. H.

*capitata* Ker et *coerulea* Vahl v. *major*.

**Aristida** L., Haargranne, III. 1., Gramineae.

*Ascensionis* L., Ascensions-H., 4. w. Westindien.

*capensis* Thbg., capische, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*coerulescens* Desf., bläuliche,  $\odot$ . f. Spanien, canarische Inseln, Barbarei, Westindien.

*divaricata* K. B., sparrige, 4. k. t. Mexico, Brasilien.



**Aristida**

*gigantea* L., grofse, ☉. f. Teneriffa.

*Hystrix* L., borstige, 4. w. Malabar.

*plumosa* L., federige, 4. t. Persien, Armenien, Nordamerika, Südafrika.

*stipoides* RB., pfriemengrasähnliche, 4. t. Neuholland.

*vagans* Cav., zerstreutblühende, 4. t. Neuholland.

**Aristolochia** T., Osterluzei. XX. III. (IV.), *Aristolochiae*.

*acuminata* Lam., zugespitzte, ♀. Schl. w. Mascaren. Inseln.

*altissima* Desf., hohe, ♀. Sch. k. Creta, Numidien.

*arborescens* L., baumartige, ♀. k. t. Amerika.

*Arkansa* Lodd., Arkansa-O., ♀. Sch. k. f. Nordamerika.

*baetica* L., spanische, ♀. Sch. k. f. b. Spanien, Sicilien, Creta.

*barbata* Jacq., bärtige, ♀. Sch. w. Caracas.

*bilobata* L., zweilappige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

*bracteata* Retz., deckblättrige, 4. w. Ostindien.

*brasiliensis* Mart., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

*caudata* L., geschwänzte, ♀. Sch. w. Hispaniola.

*chilensis* Lindl., chilesische, ♀. Sch. t. Chili.

*ciliosa* G. B. Know., gefranzte, ♀. Sch. w. N. Patagon.

*Clematitis* L., gemeine, 4. f. Europa.

*cymbifera* Mart., cymbelförmige, ♀. Sch. w. Brasilien.

*foetens* Lindl., übelriechende, ♀. Sch. w. Westindien.

*foetida* Kunth, stinkende, ♀. Sch. w. t. Mexico.

*glauca* Desf., blaugrüne, ♀. Sch. k. Portugal, Nordafrika.

*grandiflora* Sw., grofsblumige, ♀. Sch. w. Jamaica.

*hastata* Kunth, spontonblättrige, ♀. Sch. w. Cuba.

*hirta* L., steifhaarige, 4. k. Griechenland.

*indica* L., indische, ♀. Sch. Ostindien, Neuholland.

*labiosa* Ker., lippige, ♀. Sch. w. Brasilien.

*longa* L., langwurzelige, 4. f. Südeuropa.

*macrura* Gomez, langschwänzige, ♀. Sch. w. Brasilien.

*maxima* L., grösste, ♀. Sch. w. Neuspanien, Westindien.

*odoratissima* L., wohlriechende, ♀. Sch. w. Jamaica, Mexico.

*pallida* W. Kit., bleiche, 4. f. Croatien, Krain, Istrien.

*panduriformis* W., geigenförmige, ♀. Sch. w. Caracas.

*Pistolochia* L., kleine, 4. f. b. k. Südfrankreich.

*ringens* Vahl, rachenförmige, ♀. Sch. w. Westind., Brasil.

*rotunda* L., rundwarzliche, 4. f. Südeuropa.

*saccata* Wall., sackförmige, ♀. Sch. w. Silhet.

*sagittata* Mühlenb., pfeilblättrige, 4. f. Carolina.

*sempervirens* L., immergrüne, ♀. 4. Sch. f. b. k. Creta.

*Serpentaria* L., Schlangengewurz-O., 4. f. Virginien.

*Sipho* L'Her., grofsblättrige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*surinamensis* W., surinamische, ♀. Sch. w. Surinam.

*tomentosa* Sims., filzige, ♀. Sch. f. Südcarolina, Louisiana.

*trifida* Kunth, Lam., dreitheilige, ♀. Sch. w. Caracas.

*trilobata* L., dreilappige, ♀. Sch. w. Westindien.

*caracasana* Spg. vid. *trifida*. *hastata* Nutt. v. *sagittata*.

*hirsuta* Mühlenb. v. *tomentosa*. *macrophylla*

Lam. vid. *Sipho*. *microphylla* W. vid. *bracteata*.

*polyrrhizos* Plukn. Spgl. v. *sagittata*. *subglauca* Lam.

v. *glauca*. *trilobata* Jacq. v. *surinamensis*.

**Aristotelia** L'Her. (Aristoteles, berühmter griechischer Naturforscher und Philosoph), XI. I., *Tiliaceae-Elaeocarpeae*.

**Aristotelia**

Macqui L'Her., chilesische, 5. k. f. b. Chili.

β) variegata Dens., buntblättrige.

*Armeniaca vulgaris* Lam. etc. v. *Prunus Armeniaca*.

**Armeria** W., Grasnelke, V. v., Plumbagineae.

alliacea W., lauchblättrige, 4. f. k. Spanien, Nordafrika.

alpina W., Alpen-G., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

denticulata Bertol., gezähnelte, 4. f. Oberitalien.

dianthoides Hornem., nelkenähnliche, 4. f. Südeuropa.

fasciculata W., büschelförmige, 5. k. Corsica, Portugal.

hirta W., kurzhaarige, 4. f. b. k. Spanien, Nordafrika.

humilis Lk., niedrige, 4. f. b. k. Südl. Portugal.

juniperifolia W., wachholderblättrige, 4. f. b. k. Spanien, Corsica.

latifolia W., breitblättrige, 4. f. b. k. Portugal.

leucocephala Koch, weisköpfige, 4. f. Südeuropa.

litoralis W., Ufer-G., 4. f. Portugal.

maritima W., Meerstrands-G., 4. f. Schweden, England.

montana G., Berg-G., 4. f. Schottland.

pinifolia R. et S., nadelblättrige, 4. f. b. Portugal, Spanien.

plantaginea W., wegrittblättrige, 4. f. Südeuropa.

pungens R. et S., stechende, 4. f. b. Spanien, Portugal.

purpurea Koch, purpurfarbige, w. f. Sumpfwiesen in Baiern.

sardoa Spgl., sardinische, 4. f. Sardinien, Corsica.

scorzoneraefolia W., haferwurzblättrige, 4. f. Südeuropa.

vulgaris W., gemeine, 4. f. Europa.

β) alba. γ) coccinea. δ) pubescens Dethar.

Hybrid: hybrida A. P. Popeana Hort.

arenaria P. v. vulgaris. cephalotes P. v. latifolia.

elongata Hoffm. v. vulgaris.

**Armoracia** Rupp. G. M. S., Meerrettig. XV. II., Cruciferae.

macrocarpa (*Cochlearia* W. K.), großfrüchtiger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

rusticana G. M. S. (*sativa* Bernh.), gemeiner, 4. f. Europa.

**Arnica** L., Wolverley. XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

angustifolia Vahl, schmalblättriger, 4. f. Lappland, Dahurien.

fulgens Pursh, feuerfarbiger, 4. f. Nordamerika am Missouri.

montana L., wahrer, 4. f. Europa.

β) helvetica G. Don.

nudicaulis Ell., nacktstengeliger, 4. f. Virgin., Florida, Carolina.

plantaginea Pursh, wegrittblättriger, 4. f. Labrador.

*Bellidiastrum* Vill. vid. *Bellidiastrum* Michellii. A.

*Clusii* All. v. *Aronicum Doronicum*. cordata Thbg.

v. *Gerbera cordata*. cordata Wulf. v. *Doronicum*

*Columnae*. corsica Lois. vid. *Aronicum corsicum*.

crenata Thbg. v. *Mairia crenata*. crocea L. v. *Gerbera*

*Burmanni*. Doronicum Jacq. v. *Arnica Doronicum*.

floccosa Bertol. v. *Senecio arachnoideus*.

glacialis Jacq. v. *Aronicum scorpioides* γ. incana

P. v. *Trichocline incana*. lanigera Tenor. v. *Senecio*

*arachnoideus*. pyrolaeifolia P. vid. *Gerbera*

*Burmanni*. rotundifolia W. v. *Bellium rotundifolium*.

scorpioides L. v. *Aronicum scorpioides*. sinuata

Less. v. *Gerbera Burmanni*. styriaca Vill.

**Arnica**

v. Aronicum Doronicum. *Wulfeniana* Poll. v. Doronicum Columnae.

*Arnopogon asper* W. *capensis* W. *Dalechampii* W. et *picroides* W. v. *Urospermum Dalechampii* et *picroides* etc.

*Arnoseris* Gärtn., Lämmersalat. XIX. 1., Compositae-Cichoraceae.

*pusilla* G., niederiger, ☉. t. Europa.

*Aromadendron* Blume, Gewürzbaum. XIII. VI., Magnoliaceae.

*elegans* Blum., zierlicher, ♀. w. Java.

*Aronia Botryapium* P. *rotundifolia* P. etc. vid. *Amelanchier Botryapium*, vulgaris etc.

*Aronicum* Neck., Ziegenwurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*altaicum* DC., altaische, 4. f. Sibirien.

*corsicum* DC., corsische, 4. f. Corsica.

*Doronicum* Rchb., behaarte, 4. f. Mittel- u. westeurop. Alpen.

*scorpioides* Rchb., gemeine, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.

α) *latifolium*. β) *medium*. γ) *glaciale*. δ) *Bauhini* Rchb.

*Arpophyllum* La Llave, Sichelblatt. XX. 1., Orchideae.

*spicatum* La Llav., ährenförmiges, 4. w. Mexico.

*Arracacia* Bancroft. (Arracacha, einheimischer Name). V. II., Umbelliferae.

*esculenta* DC., essbare, 4. Kn. w. Südamerika, (Santa Fè).

*Arrhenatherum* P. Beauv., Glatthafer (Franz. Raygras). III. II. (XXIII. 1.), Gramineae.

*elatus* M. et Koch (*avenaceum* P. B.), hoher, 4. f. Europa.

β) *bulbosum* v. Schlecht.

*Artabotrys* RB., Birnentraube. XIII. 6. Anonaceae.

*odoratissima* RB., wohlriechende, ♀. w. China, Ostindien, Madagascar.

*Artanema* D. Don, Zahnfaden. XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

*fimbriatum* D. Don, gefranzter, 4. t. Neuholland.

*Arteria* L. (P. Arteria, schwedischer Naturforscher). V. II., Umbelliferae.

*squamata* L., schuppige, ☉. f. Griechenland, Kleinasien, Syrien.

*Artemisia* T. (et Absinthium T. G.), Beifuß. XIX. II., Compositae-Eupatorineae.

*Abrotanum* L., Stabwurz-B. (Eberraute), ♀. f. Südeuropa, Kleinasien, China.

β) *humile* Hort. γ) *tobolskianum* Hort.

*Absinthium* L., Wermuth-B., 4. f. Europa, Taurien, Sibirien, Mauritan., Nordamerika.

β) *grandiflora* Bess. γ) *insipida* Bess.

*Adamsii* Bess., Adam's, ♀. f. Tatarei, Dahuria, Mongolei.

*afra* Jacq., afrikanischer, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.

*anethifolia* Stechm., dillblättriger, ♂. f. Sibirien.

β) *Stelleriana* Bess. γ) *multicaulis* Bess. Ledeb.

*annua* L., jähriger, ☉. f. Ostsibirien, Eriwan.

*aragonensis* Lam., aragonischer, ♀. k. Spanien.

β) *valentina* Lam.

*arborescens* L., baumartiger, ♀. k. f. b. Süditalien, Corsica, Südfrankreich, Mauritanien.

*arenaria* DC., Sand-B., ♀. f. Südlich. Rußland.

*argentea* L'Her., silberfarbiger, ♀. k. Madeira, Sicilien.

*argyrophylla* Ledeb., silberblättriger, ♀. 4. f. Sibirien.



**Artemisia**

*armeniaca* Lam., armenischer, ꝥ. 4. f. Armenien, Persien, Sibirien.

β) *potentillaefolia* Fisch.

*austriaca* Jacq., österreichischer, ꝥ. 4. f. Osteuropa, Caucasus, Armenien, Sibirien, Dahurien.

α) *Jacquini*ana. β) *nivea* Bess. (Redowski). γ) *repens* Pall. δ) *orientalis* Fisch. (Willd.).

*biennis* W., zweijähriger, ♂. f. Nordamerika, Neuseeland.

*borealis* Pall., nördlicher, 4. f. Nordamerika, Sibirien, Grönland.

β) *Woronskioldii* Bess. γ) *Ledebouri* Bess.

*boschniakiana* DC. (Bess.), boschniakischer, ꝥ. 4. f. Taurien (Odessa).

*camphorata* Vill., kampferduftender, ꝥ. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

β) *canescens*. γ) *garganica*. δ) *humilis*. ε) *saxatilis*.

*campestris* L., Feld-B., ꝥ. 4. f. Europa, Sibirien, südl. Schweiz.

β) *alpina* DC.

*cana* Pursh, weißgrauer, ꝥ. 4. f. Nordamerika.

*canadensis* Mchx., canadischer, 4. ♂. f. Canada.

*canariensis* Less., canarischer, ꝥ. k. Teneriffa.

*capillifolia* Fisch., haarblättriger, ꝥ. 4. f. Dahuria.

*carvifolia* Wall., karbeblättriger, Nepal, Sicilien.

*caudata* Mchx., geschwänzter, 4. f. Nordamerika.

*chamaemelifolia* Vill., kamillenblättriger, ꝥ. f. Dauphiné, Piemont.

β) *iberica* Bess. Caucasus.

*chinensis* L., chinesischer, ꝥ. 4. f. Sibirien, Nordchina.

*coerulescens* L., bläulicher, ꝥ. 4. Ufer des adriatischen und mittelländischen Meeres.

α) *latifolia*. β) *angustifolia*.

*commutata* Bess., verwechselter, 4. f. Sibirien, Persien, Nordamerika.

*crithmifolia*? L., meerfenchelblättriger, ꝥ. 4. f. Westeuropa.

*Deliliana* Bess., Delil's, ꝥ. k. Aegypten.

*desertorum* Spgl., Wüsten-B., 4. f. Sibirien, Persien, Kaschmyre.

α) *Sprengeliana* Bess. β) *Fontanesiana* Bess.

γ) *Willdenowiana* Bess.

*dracunculoides* Pursh, dragonähnlicher, 4. f. Louisiana.

*Dracunculus* L., Dragon-B. (Esdragun), 4. f. Oestl. u. südl. Rußland, Sibirien, Mongolei.

*fasciculata* M. B., büschelförmiger, ꝥ. 4. Caucasus, Armenien.

α) *iberica* Bess. β) *armeniaca* Bess. (*fascicul. tenuiloba* Fisch. et Mey.).

*Fontanesiana* Bess., Desfontain's, ꝥ. f. ?

*fragrans* W., wohlriechender, ꝥ. 4. f. Armenien, Caucasus.

*frigida* W., kalter. ꝥ. 4. f. Sibirien, Dahuria.

β) *Fischeriana* Bess.

*gallica* W., französischer, 4. ꝥ. f. Frankreich, Spanien.

*glacialis* L., Gletscher-B., 4. f. Schweizer, savoyer, piemonteser und französische Alpen.

*glauca* Pall. W., blaugrüner, 4. f. Sibirien, Dahuria, Mongolei.

**Artemisia**

- glomerata Ledeb., knaulförmiger, ⚥. 4. Arctisches Amerika, Kamtschatka.
- glutinosa Gay., kleberiger, ⚥. f. Neapel, Südfrankreich.
- Gmelini Stechm., Gmelin's, ⚥. f. Sibirien.
- gnaphalioides Nutt., ruhrkrautähnlicher, 4. f. Nordamerika.
- grata Wall., angenehmer, ⚥. 4. k. Ostindien.
- herbacea Ehrh., krautiger, 4. f. Sibirien.
- hispanica Lam., spanischer, ⚥. k. Spanien.
- japonica Thbg., japanischer, ⚥. k. Japan.
- inculta Delil., unbebauter, 4. f. Aegypten.
- indica W., indischer. 4. ⚥. k. f. b. Ostindien, Nepal, China, Japan.
- inodora MB., geruchloser, ⚥. f. Rußland.
- a)* Steveniana DC. *β)* incana DC.
- insipida Vill., unschmackhafter, 4. f. Dauphiné.
- integrifolia L., ganzblättriger, ⚥. 4. f. Sibirien.
- judaica L., israelitischer, ⚥. k. Aegypten, Arabien, Palästina, Numidien.
- laciniata W., schlitzbblätteriger, ⚥. 4. f. Sibirien, Thüringen.
- a)* glabriuscula Led. *β)* incana Ledeb. *γ)* Mertensiana Wallr. *δ)* Turczaninowii Bess. (Mongolei).
- lactiflora Wall., milchweißblumiger, ⚥. 4. k. China, Nepal.
- lanata W. DC., wolliger, 4. f. Spanien, Italien, Taurien.
- a)* caucasica. *β)* alpina. *γ)* pedemontana. *δ)* nitida.
- latifolia Ledeb., breitblättriger, ⚥. 4. f. Sibirien, Oeland.
- β)* oelandica Bess.
- lednicensis Roch, lednitzer, ⚥. 4. f. Carpathen.
- Lerchiana Stech., Lerches, ⚥. 4. f. Mittelsibirien, Astrachan etc.
- a)* humilis DC. *β)* Gmeliniana DC.
- longifolia Nutt., langblättriger, ⚥. 4. f. Westl. Nordamer.
- β)* serrata Nutt.
- macrantha Ledeb., großblumiger, ⚥. 4. f. Ural, Altai.
- macrobotrys Ledeb., großstraubiger, ⚥. 4. f. Ostsibirien.
- β)* latifolia Bess. (*tanacetifolia* L.).
- maritima L., Meerstrands-B., ⚥. 4. f. Nordfrankreich, Thüringen, Norddeutschland, England, Schweden, Dänemark.
- β)* salina W. *γ)* suaveolens Lam.
- Messerschmidiana Bess., Messerschmidt's, ⚥. f. Ostsibir.
- a)* viridis Bess. (*sacrorum* Ledeb.). *β)* incana Bess.
- mexicana W., mexicanischer, ⚥. 4. f. k. Mexico.
- mollissima D. Don, weicher, ⚥. 4. f. k. Nepal, Ostindien.
- monogyna W. Kit., einweibiger, 4. f. Ungarn.
- monosperma Delil., einsamiger, ⚥. k. Aegypten.
- montevidensis Spgl., montevidensischer, ⚥. t. Montevideo.
- Moxa Lindl. Bess., Moxa-B., ⚥. k. China.
- Mutellina Vill., kleiner, 4. f. Mittel- u. westeurop. Alpen.
- nana Gaud., Zwerg-B., 4. f. Walliser Alpen.
- β)* Allionii DC. (*parviflora* Bess. *tanacetifolia pedemontana* L.).
- norvegica Vahl, 4. f., norwegischer. Norwegen.
- nutans W., nickender, 4. ⚥. f. Taurien, Ukraine.
- a)* glabriuscula DC. *β)* incana DC. *γ)* ? Hablitziana DC.
- odoratissima Dsf., starkkriechender, ⚥. k. Barbarei.
- palustris L., Sumpf-B., ♂. f. Dahuria, Mongolei.
- parviflora Roxb. Hamilt., kleinblumiger, ♂. f. k. Nepal.
- β)* villosior DC.

## Artemisia

- pauciflora* Stechn., wenigblumiger, 4. f. f. Sibirien.  
*pectinata* Pall., kammförmiger, ☉. f. Dahur., Mongol.  
*pontica* L., pontischer (römischer), f. 4. f. Mittel-, Süd-  
 u. Osteuropa, Mittelasien, Mauritanien.  
 β) *Balsamita* W. γ) *intermedia* Bess.  
*pubescens* Ledeb., weichhaariger, 4. f. Ostsibirien.  
 β) *Siversiana* Ehrh. non Willd.  
*procera* W., hoher, f. f. Italien, Frankreich, Sibirien.  
 α) *Willdenowiana* Bess. β) *Sieberiana* Bess.  
 γ) *Stephaniana* Bess. (*altissima* Ehrh.). δ) *Ledebouriana* Bess. ε) *Steveniana* Bess. ζ) *Fischeriana* Bess. η) *Visianiana* Bess.  
*ramosa* C. Sm., ästiger, f. k. Canarische Inseln.  
*Redowskii* Ledeb., Redowski's, 4. f. Dahuria.  
*reptans* Buch, kriechender, f. k. Canarische Inseln.  
*rupestris* L., Felsen-B., 4. f. Oeland, Thüringen, Sibirien.  
 α) *oelandica*. β) *thuringiaca*. γ) *viridifolia* Ledeb. δ) *viridis* W.  
*salsoloides* L., salzkrautähnlicher, f. f. Ukraine.  
*scoparia* W. Kit., besenartiger, ☉. ♂. f. Osteuropa, Asien (von Sibirien bis Indien).  
*sericea* Stechn., seidenhaariger, 4. f. f. Sibirien.  
*Sieberii* Bess., Sieber's, f. 4. k. Palästina.  
*Siversiana* W. (non Ehrh.), Sievers's, ♂. f. Sibirien, Dahur. Mongol.  
*spicata* Jacq., ährenförmiger, 4. f. Ost-, Mittel-, Süd- und westeuropäische Alpen.  
 β) *eriantha* Tenor.  
*splendens* W., schimmernder, 4. f. Armenien.  
 β) *peduncularis* Bess. MB.  
*tanacetifolia* All., rheinfarnblättriger, 4. f. Dauphiné, Piemont.  
*taurica* MB., taurischer, f. 4. f. Taurien (Odessa), Caucas.  
*Tilesii* Ledeb., Tilesiu's, 4. f. Kamtschatka, Unalaschka.  
 β) *arctica*.  
*Tournefortiana* Rchb., Tournefort's, ☉. f. Armenien.  
*trifurcata* Stephan, dreigabeliger, 4. f. Sibirien.  
*valesiaca* All., Walliser, f. 4. f. k. Mittel- u. Unter-Wallis, Piemont.  
*variabilis* Tenor., veränderlicher, f. f. k. Neapel, Spanien.  
 α) *virescens* Tenor. β) *canescens* Tenor.  
*vestita* Wall., bekleideter, f. k. Ostind., Kaschmyre.  
*vulgaris* L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordafrika, Sibirien bis Ostindien.  
 α) *vulgatissima* Bess. (*communis* Ledeb.). β) *rubriflora* Bess. γ) *parviflora* Bess. δ) *kamtschatica* Bess. (*leucophylla* Turcz.). ε) *tenuifolia* Turcz. (*mongolica* Bess.). ζ) *variegata* Hortul. θ) *coarctata* Bess.  
*abrotanoides* Jacquem. v. *vestita*. *albida* Ledeb. v. *Lercheana* β. *alpina* MB. vid. *lanata* β. *altaica* Dsf. v. *pontica* γ. *altissima* Ehrh. vid. *procera* δ. *ambigua* L. v. *Trichogyne loricifolia*. *ambigua* Thbg. v. *Seriphium vermiculatum*. *anethifolia* Fisch. vid. *procera* β. *anglica* H. Par. v. *maritima*. *annua* β. Lam. v. *biennis*. *aprica* Ledeb. v. *frigida* *atrata* Lam. v. *tanacetifolia*. *australis* Ehrh. v. *biennis*.



## Artemisia

*baicalensis* W. v. *Messerschmidiana*  $\beta$ . *Balsamita* W. v. *pontica*  $\beta$ . *Baumgartenii* Bess. v. *spicata*  $\beta$ . *Biasoletiana* Vis. v. *camphorata*. *canescens* W. v. *armeniaca*. *capillifolia* Lam. v. *Eupatorium foeniculaceum*  $\beta$ . *caucasica* W. v. *lanata*  $\alpha$ . *cernua* Nutt. v. *dracunculoides*. *chinensis* Vahl v. *Crossostephium artemisioides*. *chrysantha* Fisch. v. *frigida*  $\beta$ . *cinerea* H. P. v. *camphorat*. *coarctata*? W. v.? *vulgaris*  $\mathfrak{f}$ . *Columnae* Tenor. v. *camphor*. *Contra*? L. v. *Sieberi*. *controversa* Jan. v. *Sieversiana*. *corymbosa* Lam. v. *camphorat*. *dentata* W. v. *rupestris*  $\alpha$ . *divaricata* Fisch. v. *anethifolia*. *elegans* Roxb. v. *scoparia*. *exilis* Fisch. v. *annua*. *furcata* MB. v. *trifurcata*. *garganica* Ten. v. *camph*.  $\gamma$ . *glacialis* Wulf. v. *Mutellina*. *glomerata* Sbr. v. *Sieberi*. *groenlandica* Wormsk. v. *borealis*  $\beta$ . *helvetica* Schlr. v. *nana*. *Herba alba* Ass. v. *aragonensis*. *hirsuta* Rottl. vid. *Cyathocline lyrata*. *hispanica* Jcq. v. *biennis*. *holosericea* Ledeb. v. *sericea*. *humilis* Wulf. v. *camphorata*  $\delta$ . *humilis* MB. v. *Lercheana*  $\alpha$ . *Jani* Bess. v. *camphorata*  $\beta$ . *incisa* Lk. Loud. v. *indica*. *inculta* Sbr. v. *Deliliana*. *inodora* W. v. *Redowskii*. *Krascheninnikowiana* Bess. vid. *macrobotrys*. *laciniata* Wahlenb. v. *latifolia*  $\beta$ . *lanata* Lam. v. *variabilis*  $\beta$ . *leucanthemifolia* Dsf. v. *desertorum*. *maderaspata* L. v. *Grangea maderasp*. *Marschalliana* Spgl. v. *inodora*. *minima* L. v. *Sphaeropsis centipeda*. *multicaulis* Ledeb. v. *anethifolia*  $\gamma$ . *naronitana* Visian. v. *procera*  $\mathfrak{f}$ . *neapolitana* Ten. v. *variabilis*  $\beta$ . *neglecta* Spgl. v. *desertorum*  $\gamma$ . *nilotica* L. v. *Cotula anthemoides*. *nivea* Redows. v. *austriaca*  $\beta$ . *novae-Zelandiae* Hort. v. *biennis*. *nutans* Fras. v. *dracunculoides*. *orientalis* W. v. *austriaca*  $\delta$ . *palmata* Lam. v. *coerulescens*  $\beta$ . *paniculata* Hort. (? non Lam.) v. *procera*  $\beta$ . *pauciflora* MB. vid. *arenaria*. *pauciflora* Spgl. v. *desertorum*  $\gamma$ . *pedemontana* Balb. v. *lanata*  $\gamma$ . *peduncularis* MB. v. *splendens*  $\beta$ . *petrosa* Jan. vid. *spicata*  $\beta$ . *pinnatifida* Jacquem. v. *Tournefortiana*. *plumosa* Fisch. v. *annua*. *potentillaefolia* Fisch. v. *armeniaca*  $\beta$ . *procumbens* DC. Schrad. v. *frigida*  $\beta$ . *punctata* Bess. v. *macrobotrys*. *repens* Pall. v. *austriaca*  $\gamma$ . *riparia* Hamilt. v. *cervifolia*. *rubella* Mch. v. *coerulesc.*  $\beta$ . *rupestris* All. v. *Mutellina*. *rupestris* Pall. v. *lanata*  $\alpha$ . *rupestris* Scop. v. *camphorata*. *rupestris* Vill. v. *spicata*. *sacrorum* Ledeb. vid. *Messerschmidiana*  $\alpha$ . *sabulosa* Stev. v. *procera*  $\zeta$ . *santonica* Lam. v. *coerulescens*  $\beta$ . *santonica* Woodv. v. *maritima*  $\gamma$ . *saxatilis* Kit. v. *camphorata*  $\epsilon$ . ? *serrata* Nutt. v. *longifolia*. *suaveolens* Fisch. v. *annua*. *suaveolens* Lam. v. *maritima*  $\beta$ . *subcanescens* W. v. *camphorata*. *subviscosa* Turcz. Bess. v. *capillifolia*. *tanacetifolia* L. v. *macrobotrys*  $\beta$ . *tanacetoides* Less. v. *Tanacetum multiflorum*. *tenuifolia* Adams v. *Adamsii*. *tenuifolia* W. v. *Eupator. foeniculaceum*  $\beta$ . *trifurcata* Dsf. v. *Fontanesiana*. *umbelliformis* Lam. v. *Mutellina*. *vermiculata* L. v. *Seriphium vermiculatum*. *violacea* Ledeb. v. *borealis*  $\gamma$ . *violacea* H. Par. v. *vulgaris*  $\delta$ .

**Artemisia**

*viridifolia* Ledeb. v. *rupestris* γ. *viridis* W. v. *rupestris* δ.

**Arthrolobium** Desv. v. *Ornithopus*.

**Arthrolobus** Stev. v. *Sterigma*.

**Arthropodium** RB., Gliederlilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*cirrhatum* RB., rankentragende, 4. t. k. Neu-Zeeland.

*fimbriatum* RB., gefranzte, 4. t. k. Neuholland.

*minus* RB., kleine, 4. t. k. Neuholland.

*paniculatum* RB., rispige, 4. Zw. t. k. Neuholland.

*pendulum* Spgl., hängende, 4. t. k. ? Neuholl., Teneriffa.

*caespitosum* Spl. *glaucum* Spgl. *umbellatum* Spl.  
v. *Stypandra caespitosa* etc.

**Arthrostachya** Lk., Gliederähre, III. II., Gramineae.  
*coarctata* Lk., gedrungene, ♂. f. ?

**Arthrostemma** Pav., Gliederfaden, VIII. I. (X. I.),  
Lythraeae-Melastomaceae.

*nitidum* Grah., glänzender, ♀. t. Buenos Ayres.

*paniculatum* D. Don, rispenblumiger, ♀. t. Nepal.

*versicolor* DC., buntfarbiger, ♀. w. Brasilien.

**Arthrozamia** Rchbch. v. *Zamia*.

**Artocarpus** Forst., Brotfruchtbaum, XXI. I., Urticaeae-Artocarpeae.

*incisa* L. fil., schlitzbblätteriger, ♀. w. Moluck., Südseeins.  
β) *nucifera*.

*integrifolia* L. Suppl. (*Jaca* Lam.), ganzblättriger, ♀.  
w. Ostindien, Molucken,

β) *heterophylla* Lam.

**Arum** T. L., Zehrwurz, Drachenwurz, XXI. IX., Aroideae-Callaceae.

*atrorubens* Ait., schwarzrothe, 4. f. Virginien.

*bulbiferum* Roxb., zwiebeltragende, 4. w. Bengalen.

*campanulatum* Roxb., glockenförmige, 4. w. Ostindien.

*Colocasia* L., ägyptische, 4. Kn. Wa. w. Griechenland,  
Kleinasien, Syrien, Ostindien, Molucken, Aegypten.

*costatum* Wall., gerippte, 4. w. Nepal.

*crinitum* Ait., bemähnte, 4. k. Balearische Inseln, Sardinien.

*divaricatum* L., sparrige, 4. Kn. w. Ostindien.

*Dracontium* L., ächte, 4. f. Nordamerika.

*Dracunculus* L., langscheidige, 4. Kn. f. k. Südeuropa.

*filiforme* Mack. Cat., fadenförmige, 4. w. ? Java.

*flagelliforme* Lodd., peitschenförmige, 4. w. Bengalen.

*gramineum* Lam., grasblättrige, 4. f. ?

*haematophyllum* ? Blum., blutfleckige, 4. w. Java.

*hederaceum* L., epheublättrige, 4. ♀. w. Südamerika.

*indicum* Lour., indische, 4. ♀. w. Cochinchina.

*integrifolium* Lk., ganzblättrige, 4. ♀. w. ?

*italicum* Mill. Lam., italienische, 4. f. k. Süd- u. West-  
europa.

*lingulatum* L., zungenförmige, 4. ♀. w. Westindien.

*macrorrhizon* L., großswurzelige, 4. Kn. w. Ceylon.

*maculatum* L., gemeine, 4. Kn. f. Mittel- u. Südeuropa.  
β) *immaculatum*.

*marginatum* Lod., berandete, 4. w. Ostindien.

*minutum* W., kleine, 4. Kn. w. Ostindien.

*nepenthoides* Wall., wasserschlauchähnliche, ♀. w. Nepal.

*obtusilobum* Lk., stumpflappige, 4. ♀. w. ?

*orientale* MB., morgenländische, 4. f. Taurien, Caucasus.

*orixense* Roxb., orixanische, 4. Kn. w. Ostind., Neuholl.

## Arum

- palmatum* Lod., handförmige, 4. f. ?  
*pedatum* Fisch., fußförmige, 4. w. Südamerika.  
*pentaphyllum* L., fünfblättrige, 4. w. Ostindien.  
*pictum* L. suppl., bemalte, 4. w. k. Balear. Inseln, Corsica.  
*polyphyllum* Lk., vielblättrige, 4. w. Südamerika.  
*proboscideum* L., rüsselförmige, 4. f. Apenninen.  
*ramosum* Lk., ästige, 4. f. w. ?  
*ringens* Thbg., rachenförmige, 4. t. w. Japan.  
*sagittifolium* Lk., pfeilblättrige, 4. w. ?  
*sarmentosum*? Otto, wurzelrankige, 4. w. Brasilien.  
*speciosum* Wall., prächtige, 4. w. Nepal.  
*spirale* Retz, spiralförmige, 4. w. Ostindien.  
*syriacum* Spgl., syrische, 4. w. k. Syrien.  
*tenuifolium* L., feinblättrige, 4. k. f. Südeuropa.  
*ternatum* Thbg., dreizählige, 4. t. k. Japan.  
*trilobatum* L., dreilappige, 4. Kn. Ceylon.

β) *auriculatum*.

- triphyllum* L., dreiblättrige, 4. f. Nord- u. Südamerika.

β) *zebrinum*.

- venosum* Ait., aderige, 4. w. ?

- ventricosum* Hoffmannsegg, bauchige, 4. w. Brasilien.

*Arisarum* L. v. *Arisarum vulgare*. *cannaefolium* L.  
 suppl. vid. *Pothos cannaefolia*. *corsicum* Lois. vid.  
*pictum*. *gramineum* Russ. v. *syriacum*. *muscivorum*  
 L. suppl. v. *crinitum*. — *arborescens* L., *auritum*  
 L., etc. v. *Caladium arborescens* etc.

## Arundina Blume, Rohrstendel, XX. 1., Orchideae.

- bambusifolia* Blum., bambusblättriger, 4. w. Java.

*Arundinaria macrosperma* Mchx. vid. *Ludolfia mac-*  
*rosperma*. *Arundinella Acratherum* N. E. v. *Acrat-*  
*therum miliaceum*.

## Arundo T. L., Wasserrohr, III. 11., Gramineae.

- altissima* Benth., hohes, 4. k. f. b. Südfrankreich.

- bengalensis* Retz, bengalisches, 4. w. Bengalen.

- Donax* L., breitblättriges. (spanisches), 4. k. f. b. Süd- und Osteuropa, Sibirien, Nordafrika.

β) *versicolor* (fol. variegat.). γ) *procerior*.

- mauritanica* Desf., mauritanisches, 4. f. k. f. b. Nordafrika, Italien, Spanien.

*acutiflora* Schrad. v. *Calamagrostis acutiflora*. *ae-*  
*gyptiaca* Delil. v. *Donax* γ. *alpina* Vill. v. *Calam.*  
*Hallerian*. *Ampelodesmos* Cyril. v. *Ampelodesmos*  
*tenax*. *arenaria* L. et *baltica* Flüggé vid. *Psamma*  
*arenar.* et *balt.* *Bambos* L. vid. *Bambusa arundi-*  
*nacea*. *bicolor* Dsf. v. *Ampelod. bicolor*. *Calama-*  
*grostis* Hall. fil. v. *Calam. Halleriana*. *canadensis*  
 Mchx. v. *Calamag. canad.* *canescens* Wigg. v. *Ca-*  
*lamag. lanceolata*. *Clarionis* Loisel. vid. *Calamag.*  
*Hallerian*. *colorata* Ait. vid. *Baldingera arundinac.*  
*collina* Tenor. v. *mauritanica*. *confinis* W. v. *Ca-*  
*lamagrost. conf.* *dioeca* Spgl. v. *Gynerium argen-*  
*teum*. *effusa* Gmel. (*litorea* Schrad.). *Epigejos* L.  
 v. *Calamag. litor.* et *Epig.* *festucea* W. v. *Sco-*  
*lochloa festus*. *festucoides* Dsf. vid. *Ampelodesmos*  
*tenax*. *glauca* MB., *Halleriana* Gaud. v. *Calamag.*  
*glauca.* et *Haller.* *humilis* R. et S. vid. *Calamag.*  
*tenella* β. *isiaca* Delil. v. *Phragmit. isiac.* *Langs-*  
*dorffii* Link, *lapponica* Wahlenb., *litorea* Schrad.  
 et *maritima* Ag. vid. *Calamagrost*, *Langsdorff.* etc.



## Arundo

*mauritanica* Poir. vid. *Ampelod. tenax. micrantha* Lamarck vid. *mauritanica. montana* Gaudin, *neglecta* Ehrh. (*stricta* Timm.) vid. *Calamag. mont. et stricta. Phragmites* L. v. *Phragmites communis. Plinii* Turr. v. *mauritanica. praeformis* La Bill. v. *Poa australis. Pseudophragmites* Hall. fil, *Calamag. litorea. Pseudophragmites* Schrad. vid. *Calamag. Halleriana. purpurea* Trin. v. *Calamagr. purpur. semiannularis* La Bill. v. *Danthonia sem. speciosa* Schrad. v. *Lasiagrostis Calamagrost. stricta* Timm., *strigosa* Wahlenb., *sylvatica* Schrad. vid. *Calamag. stricta* etc. *tenax* Vahl vid. *Ampelodesm. ten. tenella* Schrad. vid. *Calamag. tenella. varia* Schrad. v. *Calamag. montana.*

**Asarum** T., Haselwurz, XI. 1., Aristolochieae (Asarineae).  
*arifolium* Mchx., zehrwurzblätterige, 4. f. k. Carolina.  
*canadense* L., canadische, 4. f. Nordamerika.  
*europaeum* L., europäische (gemeine), 4. f. Europa.  
*grandifolium* Lod., großsblätterige, 4. f. Nordamerika.  
*virginianum* L., virginische, 4. f. k. Nrdamer., China, Japan.  
*carolinianum* Walt. v. *canadense. latifolium* Salish.  
 v. ? *canadense* (? *grandifolium*).

*Ascaricida anthelminthica* Swt. (*indica* Cass.) et *tripliner-*  
*via* G. Don v. *Vernonia anthelminth* et *triplinerv.*

**Asclepias** T. L., Schwalbenwurz (Seidenpflanze) V. II.,  
 Asclepiadeae.

*alexica* Jacq., zaubertreibende, 4. Sch. w. Ceylon.  
*amoena* L., liebliche, 4. f. Nordamerika.  
*amplexicaulis* Mchx., stengelumfassende, 4. f. Carolina.  
*asthmatica* L., brustheilende, 4. Sch. w. Ceylon.  
*citrifolia* Jacq., citronenblätterige, 4. w. Florida.  
*curassavica* L., curassavische, 4. w. Südamerika.

β) *alba.*

*debilis* Mchx., schwache, 4. f. Nordamerika.  
 ? *decumbens* L., niederliegende, 4. Kr. f. Virginien.  
*exaltata* Lk., hohe, 4. f. Nordamerika.  
*Greeniana* Nutt., Green's, 4. w. ?  
*incarnata* L., fleischfarbene, 4. f. Nordamerika.  
*laurifolia* Mchx., lorbeerblätterige, 4. f. Nordamerika.  
*Linaria* Cav., leinkrautblätterige, 4. t. Mexico.  
*linifolia* Lagasc., flachsblätterige, 4. k. Mexico.  
*mexicana* Cavan., mexicanische, 4. k. Mexico.  
*nivea* L., schneeweiße, 4. f. Nordamerika, Hispaniola.  
*obtusifolia* Mchx., stumpfblätterige, 4. f. Carolina.  
*parviflora* Ait., kleinblumige, 4. k. Carolina, Florida.  
*paupercula* Mchx., wenigblumige, 4. f. Nordamerika.  
*phytolaccoides* Pursh, kermesbeerähnliche, 4. f. Carolina.  
 ? *polystachya* Walt., vielährige, 4. k. Carolina.  
*pulchra* Ehrh., schöne, 4. f. Nordamerika.  
*purpurascens* L., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.  
*quadrifolia* Jacq., vierblätterige, 4. f. Nordamerika.  
*rosea*, H. B. K., rosafarbene, 4. t. Mexico.  
*rubra* L., rothe, 4. f. Virginien.

*salicifolia* Lodd., weidenblätterige, 4. t. ? Mexico.  
*syriaca* L., syrische, 4. f. Orient, Nordamerika.

β) *illinoensis* Mchx., P. ? γ) *obovata* Ell.

*tuberosa* L., knollige, 4. k. f. b. Nordamerika.  
*variegata* L., bunte, 4. f. Nordamerika.  
*verticillata* L., wirtelblätterige, 4. f. Nordamerika.

**Asclepias**

*acuminata* Pursh v. *laurifolia*. *angustifolia* W. vid. *linifolia*. *aphylla* Thbg. v. *Sarcostemma aphyll.* *arborescens* L. vid. *Gomphocarpus arboresc.* *carnosa* L. vid. *Hoya carnosa*. *cinerea* Walt. vid. *Enslenia cinerea*. *connivens* Baldw. vid. *exaltata*. *cordata* Walt. v. *laurifolia*. *crispa* L. vid. *Gomphocarpos crispus*. *davurica* W. v. *Cynanchum roseum*. *floridana* Lam. v. *Gomphocarpus longifolius*. *foetida* Cav. vid. *Cynanchum foetidum*. *fruticosa* L. vid. *Gomphocarpus fruticosus*. *fuscata* W. vid. *Cynanchum fuscatum*. *gigantea* L. v. *Calotropis procera*. *grandiflora* L. vid. *Xysmalobium grandiflorum*. *humistrata* Walt. v. *amplexicaulis*. *hybrida* Mchx. v. *purpurascens*. *lactifera* L. v. *Gymnema lactiferum*. *longifolia* Mchx. v. *Gomphocarpus longifolius*. *nigra* L. v. *Cynanchum nigrum*. *?obovata* Ell. vid. *syriaca* γ. *pedicellata* Walt. v. *Podostigma pubescens*. *periplocaefolia* Nutt. v. *laurifolia*. *procera* Ait. v. *Calotropis procera*. *purpurascens* Walt. vid. *obtusifolia*. *sibirica* Murr. vid. *Cynanchum sibiricum*. *tenacissima* Roxb. vid. *Gymnema tenacissimum*. *tingens* Roxb. vid. *Gymnema tingens*. *?to mentosa* Ell. v. *syrica*. *undulata* L. vid. *Xysmalobium undulatum*. *viminalis* Sw. vid. *Sarcostemma vininale*. *Vincetoxicum* L. vid. *Cynanchum Vincetoxicum*. *virgata* Balb. v. *?linifolia*. *viridis* Walt. v. *Gomphocarpus viridis*. *volubilis* L. v. *Hoya viridiflora*.

**Ascyrum** L., Hartheu, XXI. VIII. (XVIII. II.), Hypericineae.

*amplexicaule* Mchx., stengelumfassendes, ♀. k. Florida.  
*Crux Andreae* L., Andreaskreuz - H., ♀. k. Jamaica, Georgia (Nordamerika).

*hypericoides* L., johanniskrautähnliches, ♀. k. Jamaica, Virginien.

*pumilum* Mchx., kleines, 4. k. Georgia (Nordamerika).  
*stans* Mchx., dreiblumiges, ♀. k. Carolina.

*violaceum* Aubl. v. *Norantea guianensis*.

**Asimina** Adans. (canadisch. Name). XIII. VI., Anonaceae. *grandiflora* Dun., großblumige, ♀. f. b. k. Georgia, Florida.

*parviflora* Dun., kleinblumige, ♀. f. b. k. Carol., Georgia.

*pygmaea* Dun., zwergige, ♀. f. b. k. Georgia.

*triloba* Dun., dreilappige, f. b. k. Virginien, Carolina.

**Aspalathus** L., Witschen, XVII. VI. (IV.), (XVI. VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

*affinis* Thunb., ähnlicher, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*albens* L., weißlicher, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*araneosus* L., besponnener, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*argenteus* L., silberfarbiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*asparagoides* Thbg., spargelähnlicher, ♀. t. C. d. g. H.

*astroides* L., sternblättriger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*callosus* L., schwieliger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*capitatus* L., kopfförmiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*carnosus* Berg., fleischiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*Chenopus* Sogl. (*chenopoda* L.), Gänsefuß-W., ♀. t. C. d. g. Hoffn.

*ciliaris* L., gefranzter, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*crassifolius* Andr., dickblättriger, ♀. t. C. d. g. H.

**Aspalathus**

- ericaefolius L., heideblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 galioides Berg., labkrauthblättriger, ♀. t. C. d. g. H.  
 genistoides L., ginsterähnlicher, ♀. t. C. d. g. H.  
 globosus Bot. Rep., kugelblumiger, ♀. t. C. d. g. H.  
 hispidus Thbg., steifhaariger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 Hystrix Thbg., igelstacheliger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 indicus L., indischer, ♀. w. Ostindien.  
 laricinus DC., lerchenähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.  
 mucronatus Thbg., stachelspitziger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 multiflorus Thbg., vielblumiger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 niveus Thbg. (*candicans* Ait.), schneeweißer, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 pedunculatus L'Her., Curt., gestielter, ♀. t. C. d. g. H.  
 quinquefolius L., fünfblättriger, ♀. t. C. d. g. H.  
 sericeus Thbg., seidenhaariger, ♀. t. C. d. g. H.  
 spinosus L., dorniger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 squarrosus Thbg., sparriger, ♀. t. Cap d. g. H.  
 subulatus Thbg., pfriemenblättriger, ♀. t. C. d. g. H.  
 thymifolius Thbg., thymianblättriger, ♀. t. C. d. g. H.  
 uniflorus L., einblumiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*Ebenus* L. v. *Brya Ebenus*.

**Asparagus** T., Spargel, VI. 1., Asparagineae (*Sarmentaceae*).

- acutifolius L., spitzblättriger, ♀. k. f. b. Südeuropa.  
 aethiopicus L., aethiopischer, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
 albus L., weißer, ♀. k. Portugal, Spanien, Barbarei.  
 amarus DC., bitterer, 4. f. Oberitalien, südl. u. westl. Frankreich.  
 aphyllus L., blattloser, ♀. k. Süd- und Westeuropa, Barbarei.  
 asiaticus L., asiatischer, ♀. t. Ostindien.  
 Broussoneti Jacq., Broussonet's, 4. k. t. Canarische Inseln.  
 capensis L., capischer, ♀. t. Cap d. g. H.  
 dahuricus Fisch., dahurischer, 4. f. Dahuria.  
 declinatus L., abwärtsgeneigter, 4. k. t. C. d. g. H.  
 decumbens Jacq., niederliegender, 4. k. t. C. d. g. H.  
 dependens Thbg., herabhängender, ♀. t. C. d. g. H.  
 falcatus L., sichelblättriger, ♀. w. Ceylon.  
 flexuosus Thbg., vielbeugiger, 4. Sch. t. C. d. g. H.  
 horridus L., starkstacheliger, ♀. k. Sicilien, Spanien.  
 longifolius Fisch., langblättriger, 4. f. Sibirien.  
 maritimus Pall., Meerstrands-S., 4. f. Sibirien, am caspischen Meere.  
 officinalis L., gemeiner, 4. f. Europa.  
 plocamoides P. B. Webb., plocamaähnlicher, 4. k. t., Teneriffa.  
 racemosus W., traubiger, ♀. t. w. Ceylon.  
 retrofractus L., zurückgeknickter, ♀. Sch. t. Südafrika.  
 sarmentosus L., wurzelrankiger, ♀. Sch. w. Ceylon.  
 scandens Thbg., kimmender, ♀. Sch. k. t. C. d. g. H.  
 Smithianus P. B. Webb, Smith's, 4. k. t. Teneriffa.  
 stipulaceus Lam., afterblättriger, ♀. k. t. C. d. g. H.  
 subulatus L., pfriemenförmiger, ♀. 4. k. t. C. d. g. H.  
 tenuifolius Lam., feinblättriger, 4. f. Süd- u. Osteuropa.  
 verticillaris L., wirtelblättriger, 4. f. Caucasus.  
*marinus* Rchb. et *scaber* Brign. v. *amarus*. *phyl-lacanthus* Lam. v. *aphyllus*. *sylvaticus* Kit. v. *tenuifolius*.



**Aspasia** Lindl., Aspasie, XX. 1., Orchideae.  
*epidendroides* Lindl., baunstendelähnliche, 4. w. Panama.  
*variegata* Lindl., bunte, 4. w. Südamerika.

**Asperugo** T., Scharfkraut, V. 1., Asperifoliaceae (*Boraginaceae*).  
*procumbens* L., niederliegendes, ☉. f. Europa.

**Asperula** L., Waldmeister, IV. 1., Rubiaceae.  
*alpina* MB., Alpen-W., 4. f. Caucasus.  
*Aparine* Schott, Klebkraut-W., 4. f. Schlesien, Mähren, Osteuropa.

β) *rivalis* Sibth.

- arcadiensis* Ker, arcadischer, 4. f. Griechenland.  
*aristata* L. suppl., gegrannter, 4. f. Südeuropa.  
*arvensis* L., Acker-W., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.  
*brevifolia* Vent., kurzblättriger, 4. k. Kleinasien.  
*crassifolia* L., dickblättriger, 4. k. f. b. Levante.  
*cynanchica* L., Hügel-W., 4. f. Europa.  
*galioides* M.B., labkrautähnlicher, 4. f. Deutschland, Schweden, Taurien.  
*hexaphylla* All., sechsblättriger, 4. f. Oberitalien, Ungarn, Siebenbürgen.  
*hirsuta* Desf., rauhhaariger, 4. k. f. b. Portugal, Nordafrika.  
*hirta* Ram., kurzhaariger, 4. f. k. Pyrenäen.  
*humifusa* Bess., gestreckter, 4. f. Podolien, Caucasus.  
*incana* Sm., weißlichgrauer, 4. f. Süd- u. Osteuropa.  
*laevigata* L., glatter, 4. f. Südeuropa.  
*longiflora* Kit., langblumiger, 4. f. Croatien, Krain, Kärnthen, Italien.  
*longifolia* Sm., langblättriger, 4. f. Griechenland.  
*montana* Kit., Berg-W., 4. f. k. Ungarn.  
*nitida* Sm., glänzender, 4. f. k. Griechenland.  
*odorata* L., wohlriechender, 4. f. Europa.  
*pyrenaica* L., pyrenäischer, 4. f. b. Pyrenäen.  
*rigida* Sm., starrer, 4. f. b. k. Griechenland.  
*rupestris* Rchb. (Visian.), Felsen-W., 4. f. k. Dalmatien.  
*scabra* Link, Presl., scharfer, 4. f. Sicilien.  
*scutellaris* Vis., schüsselförmiger, 4. f. ? Dalmatien, Rußland.  
*supina* MB., niederliegender, 4. f. Podolien, Caucasus.  
*taurina* L., turiner, 4. f. Südl. Ungarn, Schweiz, Oberitalien.  
*tinctoria* L., färbender, 4. f. Europa.  
*tyraica* DC., tyrischer, 4. f. k. Levante.  
*algerica* P. et *repens* Brot. vid. *hirsuta*. *calabrica* L. vid. *Ernodea montana*. *suaveolens* Schrad. vid. *longiflora*. *tomentosa* Tenor. v. *incana*.

**Asphodeline** *liburnica* et *lutea* Rchb. v. *Asphodel*.

**Asphodelus** T., Affodillilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

- aestivus* Broter, Sommer-A., 4. k. f. b. Span., Portugal.  
*albus* W. (*ramosus* β. L.), weißer, 4. f. b. Oberitalien.  
*clavatus* Roxb., keulförmiger, ☉. t. w. Ostindien.  
*creticus* Lam., cretischer, 4. k. Creta.  
*fistulosus* L., röhriger, 4. k. f. b. Südeuropa.  
*intermedius* Hornem., mittlerer, 4. k. f. b. Istrien.  
*liburnicus* Scop., istrianischer, 4. k. f. b. Istrien.  
*luteus* L., gelber, 4. f. Südeuropa, Taurien, Sibirien.  
β) *sibiricus* Lindl.

**Asphodelus**

*microcarpus* Visian., kleinfrüchtiger, 4. Zw. f. b. k. Dalmatien.

*neglectus* Schult., übersehener, 4. f. k. Istrien.

*prolifer* MB., sprossender, 4. f. b. k. Armenien.

*ramosus* L., ästiger, 4. f. b. k. Südeuropa.

*tauricus*, taurischer, 4. f. b. k. Taurien.

*tenuior* MB., dünner, 4. f. b. k. Caucasus.

*altaicus* Pall. v. *Eremurus spectabilis*. ? *capillaris*

*Redout.* v. *liburnicus*.

**Aspicarpa** Rich., Schildfrucht, I. II., Malpighiaceae.

*urens* Lagasc. (*hirtella* Rich.), brennende, 4. Sch. w. Südamerika.

**Aspidistra** Ker, Schildblume, VIII. I., Aroideae.

*elatio* H. Anglor., höhere, 4. w. Japan.

β) *variegata*.

*lurida* Ker, gelbbraune, 4. w. China.

*punctata* Lindl., punktirte, 4. w. China.

**Aspidium** Sw., Schildfarn, XXIV. I., Pteridoideae (*Polypodiaceae*).

*acrostichoides* Schw., vollfarnähnlicher, 4. f. Nordamer.

*aculeatum* Sw., feinstacheliger, 4. f. Europa, Nordafrika.

*angulare* Kit., kantiger, 4. f. Ungarn.

*auriculatum* Sw., geöhrter, 4. w. Ostindien.

*cicutarium* Sw., schierlingblättriger, 4. w. Jamaica.

*cordifolium* Sw., herzblättriger, 4. w. Westindien.

*coriaceum* Sw., lederblättriger, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Mascarenas, Westindien, Brasilien etc.

*crinitum* Boj., bemähter, 4. w. Mauritius-Inseln.

*cristatum* Sw., kammiger, 4. f. Nordeuropa, Nordamer.

*Cunninghamii* J. Sm., Cunningham's, 4. t. w. Neuseeland.

*decompositum* Spgl., vieltheiliger, 4. w. Neuholland.

*dilatatum* Sw., verbreiteter, 4. f. Europa, Nordamerika.

*drepanum*, Sw., sichelblättriger, 4. t. w. Madeira.

*dumetorum* Sm., Hecken-S., 4. f. England.

*exaltatum* Sw., hoher, 4. w. Westindien, Südamerika, Neuholland.

*Filix mas* Sw., gemeiner, 4. f. Europa, Nordasien u. Afrika.

*fragrans* Sw., wohlriechender, 4. f. Sibirien.

*Goldianum* Hook, Goldie's, 4. f. Nordamerika.

*Hippocrepis* Sw. (*apiifolium* Sckk.), sellerieblättriger, 4. w. Westindien.

*intermedium* Mühlenb., mittleres, 4. f. Nordamerika.

*invisum* Sw., dichtkörniger, 4. w. Jamaica, Cuba.

*irriguum* Sm., Bach-S., 4. f. England.

*laetevirens* Bevis, freudiggrüner, 4. t. w. Madeira.

*lobatum* Sw., gelappter, 4. f. England, Deutschland, Frankreich.

*Lonchitis* Sw., buchtenfarnähnlicher, 4. f. Europäische Voralpen.

β) *aspernum* H. Angl. Nordamerika.

*lucens* Boj., starkglänzender, 4. f. Mauritius-Inseln.

*macrophyllum* Sw., großblättriger, 4. w. Westindien.

*marginale* Sw., randkörniger, 4. f. Nordamerika.

*molle* Sw., weichblättriger, 4. w. Westindien, Neuholland, Mascarenas etc.

*mucronatum* Sw., stachelspitziger, 4. w. Jamaica.

*noveboracense* Sw., newyorkischer, 4. f. Nordamerika.

*Oreopteris* Sw., Felsen-S., 4. f. Europäische Haine.

**Aspidium**

- parasiticum* Sw., schmarotzender, 4. w. Ost- u. Westindien, Molucken.  
*patens* Sw., abstehender, 4. w. Westindien.  
*pectinatum* W., kammförmiger, 4. w. Westindien.  
*pennigerum* Sw., fiederiger, 4. w. t. Westindien, Neuseeland.  
*proliferum* RB., sprossender, 4. w. t. Van Diem. Land.  
*propinquum* Kaulf., verwandter, 4. w. Ostindien.  
*pubescens* Sw., weichhaariger, 4. w. Jamaica.  
*pungens* Kaulf., stechender, 4. w. t. Cap d. g. H.  
*rhizophyllum* Sw., wurzelblättriger, 4. w. Westindien.  
*rigidum* Sw., starrer, 4. f. Salzburger u. französische Voralpen.  
*Serra* Sw., sägezähniger, 4. w. Westindien, Marianeninseln, Neuseeland.  
*spinulosum* Sw., borstigblättriger, 4. f. Europa.  
*Thelypteris* Sw., Sumpf-S., 4. f. Wa. Europa, Nordamerika.  
*trapezoides* Sw., trapezenförmiger, 4. w. Jamaica.  
*trifoliatum* Sw., dreiblättriger, 4. w. Westindien, Mascarenas.  
*unitum* Sw., vereinigter, 4. w. Ostindien, Mascarenas, Neuholland, Manila.  
*villosum* Sw., zottiger, 4. w. Jamaica, Hispan., Mexico.  
*violascens* H. Berol., violetter, 4. w. Mexico.  
*aemulum* Sw., *alpinum* Sw., *bulbiferum* Sw., *fragile* Sw. etc. v. *Cystopteris aemula* etc. *angustum* W. v. *Asplen. Michauxii*. *asplenioides* W. v. *Aspl. Athyrium*, *Filix femina* Sw., *fontanum* W. etc. v. *Asplenium* F. fem. etc. *lanosum* Sw. v. *Cheilanthes vestita*.

**Asplenium** L., Strichfarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- acutum* Bory, spitzer, 4. t. f. b. Illyrien, Oberitalien, Spanien, canarische Inseln.  
*Adiantum nigrum* L., schwarzer (schwarzes Frauenhaar), 4. k. f. Mittel- und Südeuropa.  
*alatum* Humb., geflügelter, 4. w. Neu-Granada.  
*angustifolium* Mchx., schmalblättriger, 4. k. f. Nordamerika.  
*Athyrium* Spgl., blasenfarnähnlicher, 4. f. Nordamerika.  
*attenuatum* RB., verdünnter, 4. t. w. Neuholland.  
*auritum* Sw., gehörter, 4. w. Westindien.  
*biauritum* H. Angl., zweiöhriger, 4. w. Westindien.  
*bipartitum* W., zweitheiliger, 4. w. Mascarenas, Westindien.  
*bisectum* Sw., weispaltiger, 4. w. Jamaica.  
*brasiliense* Sw., brasilianischer, 4. w. Brasilien.  
*bulbiferum* Forst., knollentragender, 4. t. w. Neuseeland.  
*cicutarium* Sw., schierlingblättriger, 4. w. Westindien.  
*cultrifolium* L., messerblättriger, 4. w. Martinique, Neugranada.  
*cuneatum* Lam., keilblättriger, 4. w. Westindien, Mascarenas.  
*dentatum* L., gezählter, 4. w. Westindien.  
*depressum* H. angl., niedergedrückter, 4. w. ?  
*difforme* RB., ungleichförmiger, 4. t. w. Neuholland.  
*diversifolium* Cun., verschiedenblättriger, 4. t. w. Neuseeland, Norfolk.



**Asplenium**

*ebeneum* Ait., schwarzstieliger, 4. k. f. Nordamerika.  
*falcatum* Lam., sichelförmiger, 4. w. Ostindien, Neapel, Mascarenas, Neuholland, Jamaika.

*Filix femina*. Bernh., weiblicher, 4. f. Europa.

*fissum*, Kit., gespaltener, 4. f. Croatien, Salzburg, Krain.

*flabellifolium* Cav., fächerblättriger, 4. w. Neuholland, Van-Diemensland.

*fontanum* RB., Quellen-St., 4. f. k. England, Ungarn, Sibirien.

*formosum* W., wohlgestalteter, 4. f. w. Westindien, Neugranada.

*fragrans* Sw., wohlriechender, 4. w. Jamaica, China.

*furcatum* Thbg., gabeliger, 4. w. Südafrika, Mascarenas, Ostindien.

*germanicum* Weis., deutscher, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

*Halleri* RB., Haller's, 4. f. k. Süddeutschl., Schweiz, Frankreich.

*lanceolatum* Huds., lanzettförmiger, 4. f. England, Azoren, Böhmen, Ungarn.

*lepidum* Presl., schilferiger, 4. f. Böhmen.

*lunulatum* Sw., mondförmiger, 4. t. W. Cap d. g. H.

*maderense* Penny, maderensischer, 4. t. Madeira.

*marinum* L., Meerstrands-St., 4. k. t. England, Spanien, Nordafrika, canarische Inseln.

*melanocaulon* W., schwarzstengeliger, 4. f. k. Nordamerika.

*Michauxii* Spreng., Michaux's, 4. f. Nordamerika.

*monanthemum* Sm., einhäufiger, 4. t. w. Cap d. g. H., Südamerika, Philippinen.

*montanum* L., Berg-St., 4. k. f. b. Carolina.

*multicaule* Presl., vielstengeliger, 4. f. Böhmen, Thüring.

*Nidus* L., Vogelnest-St. (dickblättriger), 4. w. Mascarenas, ostind. Inseln d. stillen Meeres, Neuholland.

*obtusatum* Forst., stumpfer, 4. w. Martinique, Cuba.

*palmatum* Lam., handförmiger, 4. t. w. Westl. Europa, Nordafrika, Canarische Inseln, Azoren.

*Petrarchae* DC., Petrarca's, 4. k. f. Südfrankreich.

*praemorsum* Sw., abgebissener, 4. w. Ostindien, Mascarenas, Neuholland, Jamaika.

*pulchrum* Bevis, schöner, 4. w. Jamaica.

*pumilum* Sw., kleiner, 4. w. Westindien, Philippinen.

*rhizophorum* L., wurzeltragender, 4. w. Jamaica.

*rhizophyllum* L., wurzelblättriger, 4. k. f. Nordamerika.

*Ruta muraria* L., Mauer- (Raute)-St. 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *obtusum* Kit.

*salicifolium* L., weidenblättriger, 4. w. Westindien.

*septentrionale* Sw., nördlicher, 4. f. Europa.

*serratum* L., sägezahniger, 4. w. Westindien.

*Shepherdii* Spgl., Shepherd's, 4. w. Jamaica.

*striatum* L., gestreifter, 4. w. Westindien.

*thelypteroides* Mchx., sumpffarnähnlicher, 4. f. Nordamer.

*Trichomanes* L., schwarzrother, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*viride* Huds., grüner, 4. f. England, Mittel- u. Südeuropa.

*viviparum* H. Kew., lebendiggebärender, 4. w. Mauritiusinsel.

*zamiaefolium* W., zamienblättriger, 4. w. Westindien, Südamerika.

## Asplenium

*acrostichoides* Sw. vid. *thelypteroides*. *adiantoides* Lam. v. *furcatum*. *anthriscifolium* Jacq. v. *pumilum*. *crassifolium* Hoffmannsegg v. *Nidus*. *glandulosum* Loisel. v. *Petrarchae*. *obliquum* La Bill. v. *obtusatum*. *Vallisclausae* Req. v. *Petrarchae*. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Caenopteris*, *Ceterach*. *Diplazium*, *Gymnogramme*, *Meniscium*, *Scolopendrium*.

*Asprella Hystrix* Cav. v. *Gymnostichum*. *Asprella* Schreb. Lam. v. *Leersia*.

*Assonia* Cav. (Ignatius v. Asso, spanischer Botaniker), XVI. VII., *Malvaceae-Dombeyaceae*.

*populnea* Cav., pappelblättrige, 5. w. Mascarenas.

*viburnoides* Cav., schneeballähnliche, 5. w. Mascarenas.

*Astartea* DC., *Astartea*, XVIII. II. *Myrtaceae*.

*fascicularis* DC., büschelblättrige, 5. t. Nördl. Neuhol.

*Astelia* RB., *Astelia* VI. I., *Coronariae-Asphodeleae*.

*Banksii* RB., Bank's, 4. t. Neuzeeland.

*Astelma canescens* D. Don. *eximium* RB. etc. v. *Helipterum canescens* etc. *fruticans* RB. vid. *Helichrysum fruticans*.

*Astephanus* RB., Nacktkrone, V. II., *Asclepiadeae*.

*linearis* RB., linienblättrige, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

*triflorus* RB., dreiblumige, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

*Aster* T., Sternblume, XIX. II., *Compositae-Corymbiferae*\*).

I. *Aster* N. E. DC. (*genuinae*).

*abbreviatus* N. E. (*acuminatus* N. E. *Cornuti* Müll.), abgekürzte, 4. f. Nordamerika.

*adulterinus* W., verschwängerte, 4. f. Nordamerika.

*aestivus* Ait., Sommer-St., 4. f. Nordamerika.

*alpinus* L., Alpen-St., 4. f. Mittel- u. westeuropäische. caucasische und sibirische Alpen.

β) *nivalis* Adams. γ) *albiflorus*. δ) *ramosus*.

*amelloides* Bess. Rchb. (*elegans* N. E. *pseudo Amellus* Wend. DC.), unächte, Virgils, 4. f. Osteuropa.

β) *bessarabicus* Bernh.

*Amellus* L., Virgil's, 4. f. Mittel-u. Südeuropa, Taurien. *amplexicaulis* Mühlenb., stengelumfassende, 4. f. Nordamerika.

*amplus* Lindl., herrliche, 4. f. Nordamerika.

*argunensis* DC., argunische, 4. f. Dahuria.

*argutus* N. E., spitzsägezähne, 4. f. Nordamerika.

*asper* N. E., rauhe, 4. f. Nordamerika.

*auritus* Lindl., geöhrt, 4. f. Nordamerika.

*azureus* Lindl., azurblaue, 4. f. Louisiana.

*bellidiflorus* W., maßliebenblumige, 4. f. Nordamerika.

β) *angustus* N. E. γ) *rigidulus* N. E. δ) *salicinus* N. E.

*biflorus* Michx. (*strictus* Pursh), zweiblumige, 4. f. Nordamerika.

*bifrons* Lindl., belaubte, 4. f. Nordamerika.

*blandus* Pursh, liebliche, 4. f. Canada.

\*) Da die größere Zahl der Gärtner die neueren von *Aster* getrennten Gattungen noch als *Aster* in ihren Verzeichnissen aufführen, so sind sie größerer Bequemlichkeit und Raumersparnis wegen hier als Untergattungen aufgeführt.

## Aster

- brumalis N. E., winterliche (*laevigatus* Lam. *serotinus* Nutt.), 4. f. Nordamerika.
- canescens Pursh, weifsgrauliche, ♂. f. Nordamerika.
- carolinianus Walt., carolinische, 4. f. Sch. f. b. k. Carolina.
- ciliolatus Lindl., gefranzte, 4. f. Nordamerika.
- concinus W., nette, 4. f. Nordamerika.
- β) strictior.
- concolor L., einfarbige, 4. f. Nordamerika.
- confertus N. E., gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.
- conspicuus Lindl., augenfällige, 4. f. Nordamerika.
- cordifolius L., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.
- cyaneus Hoffm., kornblumenblaue, 4. f. Nordamerika.
- α) glaucus N. E. (*decorus* Dsf.), β) politus N. E. (*rubricaulis cyaneus* Poir.).
- diffusus Ait., weitschweifige, 4. f. Nordamerika.
- divergens Ait., divergirende, 4. f. Nordamerika.
- diversifolius Mchx., verschiedenblättrige, 4. f. Nordamer.
- Douglassi Lindl., Douglas's, 4. f. Nordamerika.
- Drummondii Lindl., Drummond's, 4. f. Louisiana.
- dumosus L., Hecken-St. (*foliosus* P. *foliolosus* N. E.), 4. f. Nordamerika.
- ericoides L., heideähnliche, 4. f. Nordamerika.
- firmus N. E. (*amoenus* et *punicens* Hort.), feste, 4. f. Nordamerika.
- fragilis W., zerbrechliche, 4. f. Nordamerika.
- β) scoparius N. E.
- glabellus N. E., kahle, 4. f. Nordamerika.
- α) pilosus (*sparsiflorus* W.) β. glaber (*dumosus* N. E. *sparsiflorus* Mchx. *leptophyllus*, *ramosissimus* et *subulatus* Hort.).
- ? gracilis Nutt., schlanke, 4. f. Nordamerika.
- graminifolius Pursh, grasblättrige, 4. f. Nordamerika.
- grandiflorus L., großblumige, 4. f. Nordamerika.
- heterophyllus W., ungleichblättrige, 4. f. Nordamerika.
- β) glabriusculus. γ) scaber N. E..
- hirsuticaulis Lindl., haarstengelige, 4. f. Nordamerika.
- hyemalis N. E. (*salicifolius* N. E.), Winter-St., 4. f. Nordamerika.
- ircutianus DC., (*conspicuus* Turcz.) ircutische, 4. f. Dahuria.
- laevigatus W., geglättete, 4. f. Nordamerika.
- laevis L. (*lucidus* Ait.), glatte, 4. f. Nordamerika.
- Lamarckianus N. E. (*paniculatus* Lam., *Tradescanti* Hrt.), Lamarck's, 4. f. Canada.
- lanceolatus W., lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.
- laxus W., lockere, 4. f. Nordamerika.
- leucanthemus Dsf. (*dracunculoides* W. non Lam.), weifsblumige, 4. f. Nordamerika.
- longifolius Lam., langblättrige, 4. f. Nordamerika.
- β) major. γ) eminens W. N. E. δ) densiflorus. ε) laevigatus. ζ) brevrameus. η) albiflorus.
- lucidus Wender., glänzende, 4. f. Nordamerika.
- luxurians Spgl., üppige, 4. f. Nordamerika.
- marginatus H. B. K., berandete. 4. k. f. b. Neugranada.
- miser L., dürrtge, 4. f. Nordamerika.
- β) myrtifolius W.
- modestus Lindl., bescheidene, 4. f. Nordamerika.
- montanus Nutt., Berg-St., 4. f. Nordamerika.



## Aster

- multiceps Lindl., vielköpfige, 4. f. Louisiana.  
 multiflorus Ait., vielblumige, 4. f. Nordamerika.  
      $\beta$ ) ciliatus W. N. E.  
 mutabilis L. Ait. (*versicolor* Hort.), veränderliche, 4. f. Nordamerika.  
 novae-angliae L., neuenglische, 4. f. Nordamerika.  
      $\alpha$ ) agrestis N. E. (*spurius* W.).  $\beta$ ) hortensis N. E.  $\gamma$ ) roseus (*pudibundus* et *ruber* Hort.).  
 novi Belgii L. N. E., neubelgischer, 4. f. Nordamerika.  
      $\alpha$ ) ampliflorus N. E. (*serotinus* N. E.).  $\beta$ ) squarrosus N. E.  $\gamma$ ) serus N. E.  $\delta$ ) floribundus W. (*minor* N. E.).  
 nudiflorus Nutt., nacktblumige, 4. f. Nordamerika.  
 obliquus N. E., schiefblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 oblongifolius Nutt. (*graveolens* Nutt.), verlängertblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 onustus N. E., überladene, 4. f. Nordamerika.  
      $\beta$ ) squarrosus Lindl. (*Tradescanti* coer. H. Angl.).  
 paniculatus Ait., rispige, 4. f. Nordamerika.  
 parviflorus N. E. (*miser* Ait. non L.), kleinblumige, 4. f. Nordamerika.  
 patens Ait., abstehende, 4. f. Nordamerika.  
 patentissimus Lind., weitabstehende, 4. f. Louisiana.  
 patulus Lam. (*paniculatus* W., *Cornuti* Wendl., *Tradescanti* Hoffm.), ausgebreitete, 4. f. Nordamerika.  
      $\beta$ ) pallens W.  
 pendulus Ait. (*horizontalis* Dsf.), herabhängende, 4. f. Nordamerika.  
 peregrinus Pursh, fremde, 4. f. Westl. Nordamerika.  
 phlogifolius Mühlenb., phloxblättrige, 4. f. Nordamer.  
 pilosus W., behaarte, 4. f. Nordamerika.  
 praealtus Poir. (*virgatus* N. E. non Mönch), hohe, 4. f. Nordamerika.  
 praecox W., frühe, 4. f. Nordamerika.  
 prenanthoides Mhlbg., hasenlattichähnliche, 4. f. Nordamerika.  
 Prescotti Lindl., Prescott's, 4. f. Dahuria.  
 puniceus L. (*amoenus* et *hispidus* Lam.), rothstengelige, 4. f. Nordamerika.  
      $\beta$ ) demissus Lindl.  
 purpuratus N. E., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.  
 pyrenaicus Dsf. (*sibiricus* Hort. non L.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.  
 racemosus Ell., traubige, 4. f. Nordamerika.  
 Radula Ait., raspelige, 4. f. Nordamerika.  
 recurvatus N. E., zurückgekrümmte, 4. f. Nordamerika.  
 retroflexus Lindl., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.  
 rubricaulis Lam., rothstengelige, 4. f. Nordamerika.  
 sagittaeifolius W., pfeilblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 salignus W. (*salicifolius* Scholl.). weidenblättrige, 4. f. Deutschland, Ungarn.  
 salsuginosus Richards, Salinen-A., 4. f. Nordamerika.  
 sericeus Vent., seidenhaariger, 4. f. b. k. Nordamerika.  
      $\beta$ ) microphyllus DC., Texas. k.  
 sibiricus L. (*inuloides* Fisch. non Don, *lacerus* Lindl.), sibirische, 4. f. Sibirien.  
 simplex W., einfache, 4. f. Nordamerika.  
 spathulatus Lindl., spatelblättrige, 4. f. Nordamerika.

## Aster

*spectabilis* Ait., ansehnliche, 4. f. Nordamerika.

β) *bellidifolius*.

*squarrosus* Walt., sparrige, 4. f. Nordamerika.

*stenophyllus* Lindl., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

*strictus* Poir., steife, 4. f. Nordamerika.

*subasper* Lindl., wenigraue, 4. f. Louisiana.

*subspicatus* N. E., wenigährige, 4. f. Westl. Nordamerika.

*surculosus* Mchx., sprossende, 4. f. Nordamerika.

? β) *liatroides* Mühlenb.

*tardiflorus* N. E.?, späthblühende, 4. f. Nordamerika.

β) *caespitosus* Lindl.

*tataricus* L. fil. (*rhomboideus* Lindl.), tatarische, 4. f. Sibirien, Dahuria.

*tenuifolius* L. (*junceus* N. E. Pursh), dünnblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *recurvatus*.

*thyrsiflorus* Hoffm. (*recurvatus* W.), strauchblumige, 4. f. Nordamerika.

β) *squarrosus* Lindl.

*Tradescanti* L. (*vimineus* Lam., *pinifolius* N. E.), *Tradescant's*, 4. f. Nordamerika.

*turbinellus* Lindl., aufgetriebene, 4. f. Louisiana.

*versicolor* W. (*mutabilis* Hort.), buntfarbige, 4. f. Nordamerika.

*vimineus* W., ruthenartige, 4. f. Nordamerika.

β) *glaber* Meyer.

*angustus* N. E. v. *bellidiflorus* β. *argenteus* Mchx.

v. *sericeus*. *biennis* Nutt. vid. *canescens*. *ciliatus*

N. E. v. *multifl.* β. *Cornuti* Wendl. vid. *patulus*.

*elegans* W. v. *spectabilis*. *eminens* W. vid. *longi-*

*fol.* γ. *floribundus* W. v. *novi Belgii* δ. *junceus*

Ait. v. *longifol.* *laxiflorus* Lk. v. *glabellus*. *pau-*

*ciflor.* Lindl. v. *Prescottii*. *polyphyll.* W. v. *tenui-*

*fol.* *pubescens* Hornem. v. *heterophyll.* *pulchellus*

W. v. *alpinus*. *rigidulus* Dsf. v. *obliquus*. *salici-*

*fol.* Ait. v. *praealtus*. *scandens* Mchx. vid. *carolin.*

*scaber* Ell. v. *diversifol.* *scoparius* N. E. v. *fragi-*

*lis*. *secundiflor.* Dsf. v. *diffusus*. *speciosus* Hornem.

v. *spectabilis*. *spurius* W. v. *novae angliae* α. *un-*

*dulatus* L. spec. I. vid. *patens*. *undulatus* L. spec.

II. v. *diversifol.* *villosus* Mchx. v. *pilosus*. *virgi-*

*neus* N. E. v. *longifol.*

II. *Biotia* DC. non Cass.). (*Eurybia* Cass. N. E.

*commixta* (N. E.) (*ornatus* H. Angl.? *Eur. Jussieui* Cass.),

vermischte, 4. f. Nordamerika.

*corymbosa* (Ait.), (*cordifol.* Mchx.), doldentraubige, 4. f. Nordamerika.

β) *alatus* Bartr.

*glomerata* (Bernh.), knaulförmige, 4. f. Pennsylvanien.

*latifolia* (Dsf.), breitblättrige, 4. f. Nordamerika.

*macrophylla* (L.), großblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *divaricata* (L.), (*macroph. carneus* Hort.).

Schreberi (N. E.), (*ambiguus* et *subcymosus* Bernh.), Schreber's, 4. f. Nordamerika.

III. *Calimeris* N. E. (*Kalimeris* Cass.).

*altaica* (W.), altaische, 4. f. Sibirien.

*exilis* Lindl., dünne, 4. f. Sibirien.

*Gebleri* Bess., Gebler's, 4. f. Sibirien.

## Aster

*hispida* Lindl. non N. E., steifhaarige, 4. f. Sibirien.  
*incisa* (Fisch.), eingeschnittene, 4. f. Sibir., Dahuria.  
*rosea* (Steven), rosafarbene, 4. f. Ostcaucasus.  
*tatarica* Lindl., tatarische, 4. f. Dahuria, Mongolei.  
*canescens* N. E. vid. *Gebleri*. *pumilis* Fisch. vid.  
*altaica*.

IV. *Callistephus* Cass. (*Callistemma* Cass.).

*chinensis* (L.), chinesische, ☉. f. China, Japan.

β) *fistulosus*. γ) *multiplex*. δ) *nanus*.

*Heyneanus* DC., (*indicus* Heyne non L.) Heyne's, ☉. f. Ostindien.

V. *Diplopappus* DC. Cass. (*Diplostephium* N. E.).

*asper* Less., rauhe, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*asperimus* (Wall.), sehr rauhe, 4. t. Nepal.

*caucasicus* (W.), caucasische, 4. f. Caucasus.

*extenuatus* (N. E.), schwächte, ♀. t. Cap d. g. H.

*filifolius* (Vent.), fadenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

*fruticulosus* (W.), (*fruticosus* L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *Hookeri*.

*incanus* Lindl., weißlichgraue, 4. f. Californien.

*linariaefolius* (L.), (*rigidus* Mchx.), leinkrautblättrige, 4. f. Nordamerika.

*obtusatus* (W.), stumpfliche, ♀. t. Cap d. g. H.

*rigidus* (L.), (*linarifol.* Mchx.), starre, 4. f. Nordamer.

*chrysanthemifol.* Hort. v. *filifolius*. *coriaceus* Hort.

v. *extenuatus*. *pluriflorus* G. Don vid. *fruticulosus*.

*pulcherrimus* Lodd. v. *rigidus*. *rosmarinifol.* Spgl.

v. *obtusatus*.

VI. *Diplostephium* Cass. (*Doellingeria* N. E.).

*acuminatum* (Mchx.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

*amygdalinum* (Lam.), mandelblättrige, 4. f. Nordamerika, Terra nova.

β) *humilius*.

*cornifolium* (Mühlbg.), hartriegelblättrige, 4. f. Pensylv.

*dichotomum* (Ell.), zweizinkige, 4. f. Nordamerika.

*obovatum* (Ell.), (*boreale* Spgl.), verkehrteblättrige, 4. f. Nordamerika.

*umbellatum* (Ait.), doldenblumige, 4. f. Nordamerika.

*divaricatus* Spgl. et *humilis* W. vid. *amygdal. infirmus* Mchx. v. *cornifol.*

VII. *Eurybia* Cass. (et *Spongotrichum* N. E.).

*aculeata* (La Bill.), stachelige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

*argophylla* (La Bill.), silberblättrige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

*Dampieri* (A. Cunningh. sub *Conyza*), Dampier's, ♀. t. Neuholland.

*erubescens* (Sieb.), röthliche, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

*furfuracea* (Rich. et Less.), kleiige, ♀. t. Neuseeland.

*glandulosa* (La Bill.), drüsige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

*ilicifolia* (Cunn.), stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.

*lepidophylla* (P.), (*microphyll.* LaBill.), schülferigblättrige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

*lirata* (Sims), furchige, ♀. t. Neuholland.

*microphylla* (Vent.), kleinblättrige, ♀. t. Oestl. Neuholl.



## Aster

*myrsinoides* (La Bill.), myrsinenblättrige, ♀. t. Neuhol-  
land, Van Diem. Land.

β) *serrata*.

*pimeleoides* (Cunn.), pimeleaähnliche, ♀. t. Neuholland.  
*ramosissima* DC., starkästige, ♀. t. Neuholland.

*ramulosa* (La Bill.), kleinästige, ♀. t. Neuholland, Van  
Diem. Land.

*viscosa* (La Bill.), schmierige, ♀. t. Neuholland, Van  
Diem. Land.

*australis* Hort. v. *ramulosa*. *exasperatus* Lk. vid.  
*aculeata*. *elaeagnifol.* Cunn. v. *furfurac.* *pulveru-*  
*lentus* Hffinsg. vid. *lirata*. *rutaeodorus* Cunn. vid.  
*glandulos.*

VIII. *Felicia* Cass. (et *Polyarrhena* Cass.).

*angustifolia* (Jacq.), schmalblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
β) *villosa* (Thbg.).

*echinata* (Less.), igelborstige, ♀. t. Cap d. g. H.

*hirsuta* DC., rauhhaarige, ♀. t. Cap d. g. H.

*reflexa* (L.), zurückgebogene, ♀. t. Cap d. g. H.

*comyzoides* Dsf. v. *angustifol.* β. *lanuginosus* Wendl.  
v. *hirsut.* *tenellus* L. v. *Agathaea tenella*.

IX. *Galatella* Cass. (*Galatea* Cass.).

*acris* (L.), scharfe, 4. f. Südfrankreich, Span., Italien.

*cana* (W. et K.), graue, 4. f. Ungarn.

β) *intermedia* Cass.

*dahurica* DC., dahurische, 4. f. Dahuria.

*dracunculoides* (Lam.), dragunblättrige, 4. f. Sibirien,  
Taurien, Caucasus.

β) *discoidea*.

*fastigiata* (Lehm.), gipfelständige, 4. f. Sibirien.

*Hauptii* (Ledeb.), Haupt's, 4. f. Sibirien (Altai).

*hyssopifolia* (L.), isopblättrige, 4. f. Nordamerika.

*linifolia* (L.), (*albiflora* Cass.), leinblättrige, 4. f. Nord-  
amerika.

*nemoralis* (Ait.), Hain-A., 4. f. Nordamerika.

β) *uniflorus* Mchx.

*obtusifolia* Lehm., stumpfblättrige, 4. f. Nordamerika.

*punctata* (W. K.), (*insculpta* N. E.), punktirte, 4. f.  
Sibirien.

*trinervis* (Desf.), (*rigida* Cass.), dreinervige, 4. f. Frankr.

*acris* W. et Hort. vid. *trinervis*. *bifidus* N. E. vid.

*dracunculoid.* *leptophyllus* Fisch. v. *tenuifol.*

X. *Heleastrum* DC.

*album* (W.), weiß, 4. f. Nordamerika.

*paludosum* (Ait.), Sumpf-St. 4. f. Nordamerika.

XI. *Machaeranthera* N. E.

*tanacetifolia* (H. B. K.), (*A. chrysanthemoides* W.), rain-  
farnblättrige, 4. k. Mexico.

XII. *Munychia*. Cass.

*Cymbalariae* (L.), cymbelkrautartige, 4. t. C. d. g. H.

*hirsuta* DC., rauhhaarige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

XIII. *Olearia* Mönch.

*dentata* (Andr.), (*A. ferrugineus* Wendl. et *tomentosus*  
Schräd.), gezähnelte, ♀. t. Neuholland.

*phlogopappa* (La Bill.), röthlichfederige, ♀. t. Neuhol-  
land, Van Diem. Land.

*quercifolia* (Sieb.), eichenblättrige, ♀. t. Neuholland.

*rotundifolia* DC., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Aster**

stellulata (La Bill.), sternhaarige, ♀. t. Neuholl., Van Diem. Land.

*phlochotrichus* Spgl. v. *phlogopapp. sinuatus* Cun. v. *quercifol.*

**XIV. Sericocarpus N. E.**

*concolor* (L.), einfarbige, 4. f. Nordamerika.

*conyzoides* (W.), dürrwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

β) *plantaginifolius* N. E.

*solidagineus* (Mchx.), goldruthenähnliche, 4. f. Nordamerika.

*tortifolius* (Mchx.), gedrehtblättrige, 4. f. Nordamerika.

**XV. Tripolium N. E.**

*angustum* Lindl., schmale, 4. f. Nordamerika.

*flexuosum* (Nutt.), gebogene, 4. f. Nordamerika.

?*pauciflorum* N. E., wenigblumige, 4. f. Nordamerika.

*subulatum* (Mchx.), pfriemenblättrige, ☉. ♂. f. Nordamerika.

*vulgare* N. E., gemeine Salz-St., ♂. f. Europa, Sibirien.

β) *pannonicum* (Jacq.). γ) *diffusum*. δ) *salinum* (Schrad.).

*longifolius* Dsf. vid. *subulat.* *Tripolium* L. vid. *T. vulgare*.

**XVI. Turczaninovia DC.**

*fastigiata* DC., gipfelständige, (*A. fastigiatus* Fisch.), ♂. 4. Sibir. Dahur.

*annuus* L. vid. *Stenactis annua. bonariensis* Spgl.

v. *Erigeron glaucum. capensis* Less. v. *Agathaea*

*amelloides. crenatus* Less. v. *Mairia crenata. crinitus* L. vid. *Athrixia heterophylla. crinitus* Thbg.

v. *Athrixia capensis. heterophylla* Thbg. vid. *Athr.*

*heterop. indicus* L. v. *Asteromaea indica. vernus*

L. v. *Stenactis verna.* Die übrigen s. die Gattungen

*Erigeron, Inula, Pulicaria.*

**Asteracantha** N. E., Stachelklau, XIV. II., Acanthaceae.

*longifolia* N. E., langblättrige, ♂. w. Ostindien.

**Asteranthus** Dsf., Sternstrauch, XIII. I., ?Sapotaceae - Olacineae.

*brasiliensis*, brasilianischer, ♀. w. Brasilien.

**Asterocephalus** Vaill. v. *Scabiosa*.

**Asterolinon** Lk., Sternlein, V. I., Primulaceae - Lysimachieae.

*stellatum* Lk., ästiges ☉. f. Süd- u. Westeuropa, Griechenland.

**Asteromaea** Blum., Kronenaster, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*indica* Blum., indische, ☉. f. m. Ostindien, China.

**Asterothrix** Cass., Sternhaar, XIX. I., Compositae-Cichoraceae.

*asperrima* Cass., rauhes, 4. f. Caucasus, Nordpersien.

*hispanica* DC., spanisches, ☉. f. Spanien.

**Astible** Hamilt., Astible, X. II., Saxifrageae.

*decandra* D. Don, zehn männige, 4. f. Carolina.

**Astragalus** T., Tragant, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*adsurgens* Pall., W., aufgerichteter, 4. f. Sibirien.

β) *prostratus* Fisch.

*aduncus* W., gebogener, 4. f. Armenien, Caucasus.

*Aegiceras* W., ziegenhorniger, ☉. f. ?

*Alopecias* Pall., Fuchs-T., 4. f. Tatarei.

**Astragalus**

- alopecuroides L., (*alopecurus* Pall.), fuchsschwanzähnlicher, 4. f. Mongolei, Kamtschatka.  
 Ammodytes Pall., Sandotter-T., 4. f. Tatarei.  
 ancylotus F. et Mey., gelenkverbundener, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.  
 annularis L., ringförmiger, ☉. f. Aegypten.  
 arenarius L., Sand-T., 4. f. Deutschland, Schweden.  
 argenteus Visian., silberfarbiger, 4. f. Istrien, Dalmatien.  
 aristatus L'Her., begrannter, ☿. f. b. k. Wallis, Piemont, Südfrankreich.  
 asper Jacq., rauher, 4. f. Ungarn, Caucasus.  
 austriacus L., österreichischer, 4. f. Osteuropa, Cauc.  
 baeticus L., spanischer, ☉. f. Spanien, Sicil., Kleinasien.  
 Barba Jovis DC., Jupiters-Bart-T., ☿. k. Armenien.  
 bayonensis Lois., bayonnischer, 4. f. Südfrankreich.  
 brachycarpus MB., kurzfrüchtiger, 4. f. Caucasus.  
 brachyceras Ledeb., kurzhorniger, ☉. f. Taurien.  
 breviflorus DC., kurzblumiger, 4. ☿. k. f. b. Armenien.  
 buchtormensis Pall., buchtormischer, 4. f. Sibirien.  
 calycinus MB., langkelchiger, 4. f. Caucasus.  
 campylorrhynchus Fisch. et Mey., krummschnabeliger, ☉. f. Nordpersien.  
 canadensis L., canadischer, 4. f. Nordamerika.  
 capitatus L., kopfförmiger, 4. k. f. b. Kleinasien.  
 caprinus L., Ziegen-T., 4. k. f. b. Griechenl., Nordafrika.  
 carolinianus L., carolinischer, 4. f. Nordamerika.  
 caryocarpus Ker., nussfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.  
 caspicus MB., caspischer, ☿. f. b. k. Caucasus.  
 caucasicus Pall., caucasischer, ☿. f. b. k. Cauc., Armenien.  
 chinensis L., chinesischer, 4. k. t. China.  
 chlorostachys Lindl., grünähriger, 4. k. f. Nepal.  
 christianus L., christlicher, 4. f. b. k. Armenien.  
 Cicer L., kicherartiger, 4. f. Europa, Caucasus.  
     β) microphyllus Auctor.  
 compactus Lam., dichtblumiger, ☿. f. b. Cauc., Armen.  
 contortuplicatus L., ineinandergefalteter, ☉. f. Kleinasien, Caucasus, Sibirien.  
 creticus Lam., cretischer, ☿. k. Creta.  
 cruciatus Lk., kreuzförmiger, ☉. f. ?  
 cymbaecarpus Brot., cymbelfrüchtiger, ☉. f. Portugal, Spanien.  
 dasyanthus Pall., wollblumiger, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.  
 dasyglottis Fisch., wollzungiger, 4. f. Sibirien.  
 depressus L., niedergedrückter, 4. f. Südeuropa.  
 diffusus W., weitschweifiger, 4. f. Taurien, Mittelasien.  
 Donianus Spgl., Don's, 4. f. b. k. Nepal.  
 emarginatus LaBill., ausgerandeter, 4. f. b. k. Syrien, Kleinasien.  
 epiglottis L., vielzungiger, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.  
 exscapus L., schaftloser, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Ungarn, Kleinasien.  
 falcatus Lam. Pall., sichelfrüchtiger, 4. t. Cauc., Sibir.  
 falciformis DC., sichelförmiger, 4. f. Nordafrika.  
 fragiformis W., Erdbeeren-T., 4. f. Altai.  
 fruticosus Pall., strauchiger, ☿. f. Ostsibirien.  
 galegiformis L., geisrautenähnlicher, 4. f. Armenien, Caucasus.  
 glaucus MB., blaugrüner, 4. f. Taurien, Caucasus.



**Astragalus**

Glaux L., milchkrautartiger, ☉. f. Westeuropa, Kleinasien.

glycyphylloides DC., süßholzähnlicher, 4. f. Taurien.

glycyphyllos L., süßholzblättriger, 4. f. Europa.

gracilis Nutt., schlanker, 4. f. Nordamerika.

halicacabus Lam., schlutenkelchiger, 4. f. Armenien.

hamosus L., hackenförmiger, ☉. f. Südeuropa.

β) Buceras W. γ) macrocarpus.

hispidulus DC., steifhaariger, 4. f. Aegypten.

hypoglottis L. (*microphyllus* W.), stielfrüchtiger, 4. f.

Europa, Mittelasien, Nordafrika und Amerika.

β) albiflorus.

?hymenocarpus Loud., hautfrüchtiger, 4. f. Rußland.

incanus L., weißlichgrauer, 4. f. b. k. Südfrankreich.

inflatus Gill., aufgeblasener, 4. t. Mendoza.

juvenalis Del., jugendlicher, ☉. f. Aegypten.

lactiflorus Ledeb., milchweißblumiger, 4. f. Sibirien.

lanigerus Desf., wolliger, 4. f. b. k. Nordafrika, Griechenl.

Laxmanni Jacq., Laxmann's, 4. f. Sibirien.

leontinus Wulf., Lienzer, 4. f. Krainer, Tyrol, Schweiz.

Alpen.

leucophaeus Sm., weißlichblumiger, 4. f. ?

longiflorus Pall., langblumiger, 4. f. Caucasus, Mittelasien.

lotoides Lam., schotenkleeähnlicher, ☉. f. China.

macrocephalus W., grofsköpfiger, 4. f. Caucasus.

mareoticus Del., mareotischer. ☉. f. Aegypten.

maximus W., grofsjähriger, 4. f. Armenien, Sibirien.

melilotoides Pall., steinkleeähnlicher, 4. f. Ostsibirien.

micranthus Desv., schmalblumiger, 4. f. ?

microphyllus L., kleinblättriger, 4. f. Sibirien.

monspeulanus L., französischer, 4. f. Frankreich,

Schweiz, Istrien und Osteuropa.

β) albus.

narbonensis Gouan, narbonnischer, 4. f. Südfrank., Span.

neglectus Fisch., übersehener, 4. f. Sibirien.

Nuttallianus DC., Nuttall's, ☉. f. Nordamerika.

odoratus Lam., wohlriechender, 4. f. Kleinasien.

onobrychioides MB., süßkleeähnlicher, 4. f. Cauc., Persien.

Onobrychis L., Süßklee.-T., 4., Osteuropa, Caucasus.

ornithopodioides Lam., vogelfußähnlicher, 4. f. Armen.

otopterus DC., gehörter, 4. f. Altai.

oxyglottis Stev., schmalzungiger, ☉. f. Taurien.

Pallasii Fisch., Pallas's, 4. f. Geg. des Caspisch. Meeres.

pallescens MB., bleicher, 4. f. Bessarabien, Podolien.

pentaglottis L., fünfzungiger, ☉. f. Spanien.

physodes L., kugelhülsiger, 4. f. Taurien, Sibirien.

platyphyllus Fisch., breitblättriger, 4. f. Sibirien.

ponticus Pall., pontischer, 4. f. b. k. Taurien.

Poterium Pall., becherblumenähnlicher, ‡. f. b. k. Spanien, Taurien.

procumbens H. et A., niederliegender, 4. k. Chili.

Pseudo-*Tragacantha* Pall., unächter, ‡. f. b. k. Caucasus, Armenien.

purpureus Lam., purpurfarbiger, 4. f. Südfrankreich.

reptans Humb., kriechender, 4. k. Mexico.

resupinatus MB., umgekehrter, 4. f. Caucasus.

reticulatus MB., netzförmiger, ☉. f. Caucasus.

rupifragus Pall., Felsen-T., 4. f. Taurien.

Schanganianus Pall., Schangin's, 4. f. Sibirien.

**Astragalus**

*scorpioides* Pourr., raupenkleeeähnlicher, ☉. f. Spanien.  
*semibilocularis* DC., halbzweifächeriger, 4. f. Sibirien.  
*sesameus* L., sesamähnlicher. ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.  
*Stella* L., Gouan, Stern-T., ☉. f. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

β) *acutifolius* DC.

*stipulatus* D. Don, zwischenblättriger, 4. f. b. k. Nepal.  
*subulatus* Pall., pfriemenförmiger, 4. f. Sibirien.  
*succulentus* Richard's., fleischiger, 4. f. Nördl. Amerika.  
*sulcatus* L., gefurchter, 4. f. Sibirien, Unterösterreich.  
*tanaiticus* Fisch., tanaitischer, 4. f. Sibirien.  
*tauricus* Pall., taurischer, 4. f. Taurien.  
*tenuifolius* L. (*linearifol.* P.), feinblättriger, 4. f. Sibirien.  
*testiculatus* Pall., hodenförmiger, 4. f. Taur., Cauc., Sibir.  
*tomentosus* Lam., filziger, 4. k. Aegypten.  
*Tragacantha* L., gemeiner, ♀. k. Südeuropa.  
*triangularis* DC., dreikantiger, ☉. f. ? Spanien.  
*tribuloides* Del., bürzeldornähnlicher, ☉. f. Aegypten.  
*trimestris* L., Sommer-T., ☉. f. Nordafrika.  
*trimorphus* Viv., veränderlicher, ☉. f. Nordafrika.  
*tumidus* W., aufgeschwollener, ♀. k. Span., Syrien, Aegypt.  
*tunetanus* W., tunesischer, ♀. 4. k. Nordafrika.  
*uliginosus* L., Sumpf-T., 4. f. Sibirien.

β) *ciceriformis* Bernh.

*utriger* Pall., langhälsiger, 4. f. Taurien.  
*vesicarius* L., blasiger, 4. f. Süd- u. Osteuropa.  
*vimineus* Pall., girtenartiger, ♀. f. Bessarab., Cauc., Sibir.  
*virgatus* Pall., ruthenförmiger, ♀. f. Ungarn, Podolien, Nordpersien.  
*vulpinus* W. (*alopecuroides* Pall.), fuchsschwanzähriger, 4. f. Caucasus.

*albidus* Kit. W. v. *vesicarius*. *alpinus* L. v. *Phaca astragalina*. *anthylloides* Pall. v. *fragiformis*. *canaliculatus* W. v. *scorpioides*. *canescens* DC. (et *cephalotes* Pall.) v. *onobrychioides*. *carnosus* Nutt. v. *caryocarpus*. *carnosus* Pursh vid. *Sophora sericea*. *chloranthus* Pall. v. *asper*. *clandestinus* Roth vid. *cymbaecarpus*. *cristatus* Gouan vid. *pentaglottis*. *danicus* Retz vid. *hypoglottis*. *echinatus* Murr. vid. *pentaglottis*. *hians* Jacq. vid. *Oxytropus deflexa*. *inflatus* DC. vid. *fragiformis*. *leptophyllus* Dsf. v. *tunetanus*. *leptostachys* Pall. v. *sulcatus*. *macrorrhizus* D. Don v. *Denianus*. *malacophyllus* Hort. v. *galegiform*. *micranthus* Nutt. v. *Nuttallianus*. ? *Pateronii* Hort. v. *odoratus*. *praecox* Baumg. v. *monsperulanus*. *pycnophyllus* Stev. v. *compactus*. *Rauwolfii* Vahl vid. *tumidus*. *retroflexus* Pall. vid. *Oxytrop. deflexa*. *sempervirens* Lam. vid. *aristatus*. *sinicus* L. v. *lotoides*. *varius* Gmel. v. *virgatus*. *virescens* Ait. v. *falcatus*. Die übrigen s. die Gattungen *Guldenstaedtia*, *Oxytropis* et *Phaca*.

**Astranthus** Lour., Sternbaum, VII. III. (X. v.) *Amygdalaceae-Homalineae*.

*cochinchinensis* Lour., cochinchinesischer, ♀. t. China, Cochinchina.

**Astrantia** T., Sterndolde, V. II., *Umbelliferae*.

*Biebersteinii* Fisch. et Mey. (*major* MB.) *Bieberstein's*, 4. f. Caucasus.

*carniolica* Wulf., krainerische, 4. f. Krain, Baiern.

**Astrantia**

- caucasica W., caucasische. 4. f. Caucasus.  
heterophylla MB., verschiedenblättrige, 4. f. Caucasus.  
major L., große, 4. f. Europ. Thäler u. Voralpen.  
    β) pallida Presl.  
minor L., kleine, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.  
    carinthiaca Hopp. vid. major β. *Epipactis* L. v.  
Hacquetia Ep. *helleborifolia* Salisb. vid. hetero-  
phylla. *intermedia* MB. vid. caucasica. *maxima*  
Bot. mag. v. heterophylla.

**Astrapaea** Lindl., Prachtnalve, XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

- tiliaefolia Swt., lindenblättrige, 5. w. Ins. Bourbon.  
viscosa Swt., schmierige, 5. w. Madagascar.  
Wallichii Lindl., Wallich's, 5. w. Madagascar.

**Astrocaryon** Mey., Sternnuß, VI. I. (XXI. VI.), Palmaceae.

- acaule Mart., stengellose, 4. w. Brasilien.  
aculeatum Mey., stachelige, 5. w. Guiana.  
campestre Mart., Feld-St., 4. w. Brasilien.  
Murumura Mart., Murumura-St., 5. w. Brasilien.  
vulgare Mart., gemeine, 5. w. Brasilien.

**Astrolobium durum** etc. DC. v. *Ornithopus dur.* etc.**Astroloma** R. B., Sternheide, V. I., Epacrideae.

- denticulatum RB., gezähnelte, 5. t. Neuholland.  
humifusum RB., niedergestreckte, 5. t. Neuholland.

**Atalanta serrulata** Nutt. v. *Peritoma serrulata*.**Atalanthus arboreus** D. Don *pinnatus* D. Don et *spinosus* D. Don v. *Sonchus arboreus*, *leptocephalus* et *spinosus*.**Atalantia** Corr. *Atalantia*, X. I., Hesperideae-Aurantiaaceae.

- monophylla DC., einblättrige, 5. w. Ostindien.

**Athamanta** L., Hirschwurz, V. II., Umbelliferae.

- annua L., jährige, ☉. f. Candia.  
cretensis L., cretische, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.  
    β) mutellinoides DC. (*glabra* Gaud. *rupestris* Vill.).  
incana W., graue, 4. f. Sibirien.  
Matthioli Wulf. (*rupestris* Rchb.), Matthioli's, ♂. f. Steyer-  
mark, Krain, Litorale.

- panacifolia Spgl., kraftwurzblättrige, 4. k. Spanien,  
Portugal, Sicilien, Nordafrika.

- sicula L., sicilianische, 4. f. b. k. Sicilien, Nordafrika.  
tortuosa Spgl., gedrehte, 5. k. Aegypten, Nordafrika.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Bubon*, *Cnidium*, *Libanotis*, *Ligusticum*, *Meum*, *Peucedanum*, *Selinum*, *Seseli*.

**Athanasia**, Athanasie, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

- crenata L., gekerbte, 5. t. Cap d. g. Hoffn.  
crithmifolia L., meerfenchelblättrige, 5. t. Cap d. g. H.  
filiformis L. fil., fadenförmige, 5. t. Cap d. g. Hoffn.  
pubescens L. (*canescens* Thbg.), weichhaarige, 5. t. Cap  
d. g. Hoffn.

β) *tricuspis* Poir.

- virgata Jacq., ruthenförmige, 5. t. Cap d. g. Hoffn.

- annua L. v. *Lonas inodora*. *capitata* L., *lanuginosa*  
Cav. et *punctata* Thbg. v. *Holophyllum capitata* etc.  
*genistaefolia* L. v. *Eclopes genistaefol.* *longifolia*  
Lam. *pectinata* L. fil. et *pinnata* L. v. *Morysia*  
*longifolia* etc.



**Atheropogon** Mühlenb., Borstenbart, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

apludoides W., apludaähnlicher, 4. f. Nordamerika.

**Atherosperma** La Bill., Atherosperma, XXI. VII.  
? Calycantheae.

moschatum La Bill., moschusduftende, 5. t. Neuholland.

**Athrixia** Ker., Athrixia, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

capensis Ker, capische, 5. t. Cap der guten Hoffn.

*Athyrium filix femina* Roth v. Asplen. filix f.

**Atractylis** L., Spindelkraut, XIX. I., Compositae-Cyarocephalae.

humilis L., niederiges, ♂. f. Süd- u. Westeuropa.

cancellata L. v. Acarna cancell. gummifera Dsf. et macrocephala Dsf. v. Carlina gummifera etc.

**Atragene** L., Atragene, XIII. VI., Ranunculaceae.

alpina L. (austriaca Scopol.), Alpen-A., 5. Sch. f. Mitteleuropäische Alpen.

americana Sims, amerikanische, 5. Sch. f. Nordamerika.  
β) obliqua Dougl.

macropetala Ledeb., großblumige, 5. Sch. f. Sibirien.

occidentalis Hornem., abendländische, 5. Sch. f. ?

ochotensis Pall., ochotensische, 5. Sch. f. Sibirien.

sibirica L., sibirische, 5. Sch. f. Sibirien.

Wenderothii Schld., Wenderoth's, 5. Sch. f. Schweiz.

capensis L. et tenuifolia L. fil. v. Pulsatilla. Die übrigen v. Clematis et Naravelia.

**Atraphaxis** L., Strauchmelde, VI. II., Portulacaeae-Polygoneae.

spinosa L., stachelige, 5. k. Mittel- u. Nordasien.

undulata L., wellenblättrige, 5. k. Cap d. Hoffn.

**Atriplex** T., Melde, V. II. (XXIII. I.), Aizoideae-Atripliceae.

alba Scop., weisse, ☉. f. Italien.

albicans Ait. (odorata P.), weisliche, 5. k. Cap d. g. H.

canescens Nutt., grauliche, 5. k. f. Nordamerika.

crassifolia Ledeb., dickblättrige, ☉. f. Rußland.

diffusa Tenor., ausgebreitete, ☉. f. Neapel.

erecta Sm., aufrechte, ☉. f. England.

foliolosa Lk., blätterreiche, ☉. f. Spanien, Portugal.

glaucula L., blaugrüne, 5. k. Südfrankreich, Spanien.

Halimus L., Meer-M., 5. k. f. b. Ost- u. Westeuropa, Nordafrika, Neuholland.

hastata L., spontonblättrige, ☉. f. Nordeuropa.

hortensis L., Garten-M., ☉. f. Europa, Tatarei.

β) rubra.

incana R. et S., graugrüne, ☉. f. Spanien.

laciniata L., schlitzblättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.

latifolia Wahlenb., breitblättrige, ☉. f. Europa.

linifolia H. B. K., linienblättrige, 5. t. Neuspanien.

litoralis L., Seestrands-M., ☉. f. Europa, Nordasien.

β) microsperma Kit. (ruderalis Wallr. γ) salina Kch.  
montevidensis Spgl., montevidensische, ☉. f. Monte-Video.  
nitens Schk. (acuminata W. K.), glänzende, ☉. Deutschland, Osteuropa.

oblongifolia W. K. (tatarica Schk.), langblättrige, ☉. f. Deutschland, Ungarn.

obtusula W., stumpfblättrige, ☉. f. Sibirien.

parvifolia Kunth, kleinblättrige, ☉. f. Mexico.

patula L. (virgata Hoffm.), ausgebreitete, ☉. f. Europa.

**Atriplex**

- prostrata Bouch., gestreckte, ☉. f. Nordfrankreich.  
 reniformis R. B., nierenförmige, ☿. t. Neuholland.  
 rosea L., weilsröthliche, ☉. f. Europa.  
 sibirica L., sibirische, ☉. f. Sibirien.  
 sulcata Schrad., gefurchte, ☉. f. ?  
 tataria L., tatarische, ☉. f. Mittelasiën.  
 triangularis W., dreikantige, ☉. f. Am adriat. Meer.  
 veneta W., venetianische, ☉. f. Am adriat. Meer.  
 verticillata Lagas., wirtelförmige, ☉. f. Spanien.  
 virgata Roth, ruthenförmige, ☉. f. Ostindien.  
     *angustifolia* Sm. vid. *patula*. *incisa* MB. v. *rosea*.  
     *oppositifolia* DC. (*Sackii* Rost c.) v. *latifolia* γ. *pedunculata* L. et *portulacoides* L. v. *Halimus peduncul.*  
     et port.

**Atropa L., Tollkirsche, V. 1., Solanaceae.**

- arborescens L. (*solanacea* W.), baumartige, ☿. w. Jamaica.  
 Bella donna L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.  
 Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Mandragora*,  
*Nicandra*, *Physalis* et *Saracha*.

**Attalia Humb., Prachtpalme, XIII. III. (XXI. IX.), Palmae.**

- compta Mart., dickstämmige, ☿. w. Brasilien.  
 excelsa Mart., hohe, ☿. w. Brasilien.  
 funifera Mart., spitzbeerige, ☿. w. Brasilien.  
 humilis Mart., niedrige, ☿. w. Brasilien.  
 Rossii Lod., Ross's, ☿. w. Brasilien.  
 speciosa Mart., prächtige, ☿. w. Brasilien.  
 spectabilis Lod., ansehnliche, ☿. w. Brasilien.

**Aubrietia Adans. (berühmter Pflanzenmaler), XV. II., Cruciferae.**

- Columnae H. Hoffmannsg. 4. f. b. k. ? Neapel.  
 deltoidea DC., deltablätterige, 4. f. b. k. Neapel, Sicilien,  
 Levante.  
 hesperidiflora G. Don., nachtvioleublätterige, 4. f. b.  
 Südeuropa.  
 purpurea DC. (*Arabis* Sm.), purpurfarbige, 4. f. b. k.  
 Griechenland.

**Aucuba L. Thbg. (japan. Name), XXII. IV. ? Corneae.**

- japonica L. Thbg., japanische, ☿. f. b. k. Japan.

**Audibertia Benth. (Audibert, Handelsgärtner), II. I., Labiatae.**

- incana Beuth., weilsgraue, ☿. k. t. Columbia.  
*pusilla* Benth. v. *Muntha* Requieni.

**Audouinia Brong. (Audouin, franz. Entomolog), V. I., Corniculatae-Bruniaceae.**

- capitata Brong., kopfförmige, ☿. t. Cap d. g. H.

**Aulax Berg., Bartnufs, IV. I. (XXII. IV.), Proteaceae.**

- pinifolia, kieferblätterige, ☿. t. Cap d. g. Hoffn.  
 umbellata RB., doldige, ☿. t. Cap d. g. H.

**Aurelia decurrens Cass. v. Grindelia glutinosa.****Avena T., Hafer, III. II., Gramineae.**

- I. *Avena* (genuinae).  
 alba Vahl, weisser, ☉. f. Südfrankreich, Nordafrika.  
 brevis Roth (*atheranta* Presl.), kurzer, ☉. f. Deutsch-  
 land, Italien.  
 fatua L., Wind-H., ☉. f. Europa, Asien.  
 hirsuta Roth (*barbata* Brot.), rauhhaariger, ☉. f. Südeuropa.  
 nuda L., nackter, ☉. f. Südeuropa.  
 orientalis Schreb., morgenländischer, ☉. f. Europa, Asien.  
 sativa L., gemeiner, ☉. f. ? Mittelasiën.

**Avena**

β) chinensis. γ) georgiana. δ) leucosperma.  
 ε) nigra (*melanosperma*), ζ) norwegica. η) podolica. θ) trisperma.

sterilis L., unfruchtbarer, ☉. f. Südeuropa.

strigosa Schreb. (*nervosa* Lam.), striegeliger, ☉. f. Europa.

II. *Avena* *aira* Rchb. (*Aira* Auctor, *Avenella* Blff. et Fght.).

atropurpurea Lk. (Wahlenb.), dunkelrother, 4. f. Lappland.

capillaris M. et K. (Host), haarförmiger, ☉. f. Südeuropa.

caryophyllea Wigg. (L.), nelkenduftender, ☉. f. Europa.

flexuosa M. et K. (L.), biegsamer, 4. f. Europa, Amerika.

β) montana Auctor.

paludosa\* (Roth) (*Aira uliginosa* Weih.), Sumpf-H., 4. f. Norddeutschland.

praecox P. B. (L.), früher, ☉. f. Europa.

pulchella Lk. (W.), schöner, ☉. f. Spanien.

III. *Avena* *astrum* Koch.

alpina Sm. (*praecusta* Rchb.), Alpen-H., 4. f. Schottland, Krain.

carpathica Host., carpathischer, 4. f. Carpathen.

fallax DC., trügerischer, 4. f. Südeuropa.

planiculmis Schrad. (*latifolia* Host), plattthalmiger, 4. f. Schlesien, Ungarn.

pratensis L., Wiesen-H., 4. f. Europa.

pubescens L., weichhaariger, 4. f. Europa.

β) bromoides L.

sempervirens Vill. (*stricta* Lam., *sedanensis* DC.), immergrüner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

setacea Vill., borstiger, 4. f. Frankreich, Spanien.

versicolor Vill., bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*Scheuchzeri* All. v. *versicolor*.

IV. *Trisetum* P.

? *Alopecurus* R. et S., Fuchsschwanz-H., ☉. f. ?

alpestris Host, Voralpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Cavanillesii Koch, Cavanille's, ☉. f. Wallis, Spanien.

condensata Guß., dichtähriger, ☉. f. Sicilien.

distichophylla Vill., zweireihigblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) argentea W.

flavescens L., gelblicher, 4. f. Europa.

Löfflingiana L., Löffling's, ☉. f. Spanien.

micrantha R. et S., kleinblumiger, ☉. f. ?

neglecta Savi., übersehener, ☉. f. Italien.

parviflora Dsf., kleinblumiger, ☉. f. Italien, Nordafrika.

pennsylvanica L., pennsylvanischer, ☉. f. Nordamerika.

pilosa MB., haariger, ☉. f. Iberia.

rigida MB., starrer, 4. f. Caucasus.

subspicata Clairvill. (*airoides* Koel), ähriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

tenuis Mch. (*triaristata* Vill.), dünner, ☉. f. Europa.

*brevifolia* Host. v. *distichophylla*. *sicula* Spgl. v. *condensata*.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Arrhenatherum*, *Danthonia*, *Gaudinia*, *Trichaeta*.

*Averrhoa* L. (*Averrhoes*, arab. Arzt), X. IV., Oxalideae.

Bilimbi L., Bilimbi-A., f. w. Ostindien.

Carambola L., Carambola-A., f. w. Ostindien.

*Avicennia* L., (*Avicenna*, persischer Philosoph u. Physiker), XIV. II., Verbenaceae.

tomentosa L., filzige, f. w. Ost- und Westindien.



**Avicennia**

*Axonopus aureus* P.B., *cimicinus* P.B. et *digitatus* P. B.  
v. *Paspalum*.

**Axyris** L., Amaranthmelde, XXI. III., Aizoideae-Amaranthaceae.

*amaranthoides* L., gewöhnliche, ☉. f. Sibirien.

*hybrida* L., Bastard-A, ☉. f. Sibirien.

*prostrata* L., gestreckte, ☉. f. Sibirien.

*ceratoides* L. v. *Diotis cerat*.

**Ayenia** L. (Herzog D'Ayen von Noailles), V. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

*laevigata* Sw., glatte, ♀. w. Jamaica.

*pusilla* L., kleine, ♂. w. Westindien, Südamerika.

**Azalea** L. (*Rhododendron* D. et G. Don.), Felsenstrauch, V. I., Ericaceae-Rhodoraceae.

*arborescens* Pursh, baumartiger, ♀. f. Nordamerika.

*bicolor* Pursh, zweifarbiger, ♀. f. Nordamerika.

*calendulacea* Mchx., ringelblumenfarbiger, ♀. f. Nordamerika.

Variet. und Hybrid.: a. *chrysolecta*, b. *crocea*, c. *cuprea*, d. *flammea*, e. *fulgida* Hook, *grandiflora*, g. *ignescens*, h. *lepida* Gow, i. *Morterii*. Swt, k. *splendens*, l. *Stapletoniana* Lindl, m. *subcuprea*, n. *triumphans*.

*canescens* Mchx. (? *subnudiflora* Pursh), graublättriger, ♀. f. Nordamerika.

*decumbens* (G. Don), niederliegender, ♀. t. China.

*glauca* Lam., blaugrüner, ♀. f. Nordamerika.

β) *hispida* Pursh.

*macrantha* Bunge, großblumiger, ♀. t. China.

*mollis* Blum., weichblättriger, ♀. t. China.

*nitida* Pursh, glänzender, ♀. f. Nordamerika.

*nudiflora* L., nacktblumiger, ♀. f. Nordamerika.

β) *periclymenoides* Mchx.

Variet. und Hybrid.: a. *alba*, b. *blanda*, c. *carnea*, d. *coccinea*, e. *eximia*, f. *Goweniana*, g. *mixta*, h. *papilionacea*, i. *partita*, k. *polyandra*, l. *rubra*, m. *rutilans*, n. *thyrsiflora*, o. *scintillans* Lindl. etc.

*pontica* L., pontische, ♀. f. Kleinasien, Caucasus.

Variet. und Hybrid.: a. *alba*, b. *ardens*, c. *aurantiaca*, d. *candida*, e. *coronaria*, f. *crocata*, g. *cuprea*, h. *flammea*, i. *fulgens*, k. *glauca*, l. *ignescens*, m. *ochroleuca*, n. *pallida*, o. *quadricolor*, p. *tricolor*, q. *versicolor* Lindl.

*sinensis* Lodd., chinesischer, ♀. t. k. China.

β) *flavescens* Swt.

*speciosa* W., prächtiger, ♀. f. Nordamerika.

b. *acutifolia*, c. *aurantiaca*, d. *ciliata*, e. *coccinea*, f. *crispa*, g. *cucullata*, h. *major*, i. *obliqua*, k. *prunifolia*, l. *revoluta*, m. *tortulifolia*, n. *undulata* etc.

*viscosa* L., schmieriger, ♀. f. Nordamerika.

b. *crispa*, c. *dealbata*, d. *fissa*, e. *odorata*, f. *ornata* DC. (*pontica rubescens* Gow.), g. *penicillata*, h. *rubescens*, i. *variegata*, k. *violae odore*, i. *vittata* etc.

*fragrans* Adams (*multiflor.* Turcz.) vid. *Osmanthus fragrans*. *hybrida enneandra* Lindl. v. *Rhododend. enneandr.* *indica* L. *javanica* Blum. *ledifolia*

**Azalea**

Hook. *retusa* Blum. *rosmarinifol.* Burm. *Seymouri* Lindl. *tubiflora* Blum. v. *Rhodod. indicum* etc. *procumbens* L. v. *Loiseleuria procumbens*.

**Azara** R. et P. (J. N. Azara, spanischer Naturforscher), XIII. 1., Bixaceae.

*dentata* R. et P., gezähnelte, ♀. t. Chili.

*integrifolia* R. et P., ganzblättrige, ♀. t. Chili.

**Babiana** Ker, Babiana, III. 1., Irideae.

*angustifolia* Ker, schmalblättrige, 4. Zw. C. d. g. H.

*disticha* Ker, zweizeilige, 4. Zw. Cap d. g. H.

*mucronata* Ker, stachelspitzige, 4. Zw. Cap d. g. H.

*nana* Spgl., Zwerg-B., 4. Zw. Cap d. g. H.

*obtusifolia* Ker, stumpfblättrige, 4. Zw. C. d. g. H.

*plicata* Ker, gefaltete, 4. Zw. Cap d. g. H.

β) *multiplex* J. C.

*purpurea* Ker, purpurfarbige, 4. Zw. Cap d. g. H.

*ringens* Ker, rachenförmige, 4. Zw. C. d. g. H.

*rubro-cyana* Ker, rothblaue, 4. Zw. C. d. g. H.

*sambucina* Ker, fliederduftende, 4. Zw. C. d. g. H.

*spathacea* Ker, blüthenscheidige, 4. Zw. C. d. g. H.

*stricta* Ker, steife, 4. Zw. Cap d. g. H.

*sulfurea* Ker, schwefelgelbe, 4. Zw. C. d. g. H.

*tenuiflora* Swt., dünnblüthige, 4. Zw. C. d. g. H.

*Thunbergii* Ker, Thunberg's, 4. Zw. C. d. g. H.

*tubata* H. Angl., geröhrte, 4. Zw. C. d. g. H.

*tubiflora* Ker, röhrenblumige, 4. Zw. C. d. g. H.

*villosa* Ker, zottige, 4. Zw. C. d. g. H.

**Bacazia** R. et P. (Georg Bacaz, Prof. d. Bot. zu Carthage), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (*Pordicieae*).

*spinosa* R. et P., dornige, ♀. t. Peru.

**Baccharis** L., Baccharis (Bachuspflanze), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*adnata* Humb., angewachsene, ♀. t. Südamerika.

*alata* Hort., geflügelte, ♀. t. ?

*conferta* Kunth, dichtblumige, ♀. t. Mexico.

*Dioscorides* L., Dioscorides, ♀. k. Syrien, Aegypten.

*glomeruliflora* Mchx., knaulblumige, ♀. k. f. Nordamerika.

*glutinosa* P., klebrige, ♀. t. w. Peru.

*halimifolia* L., meldenblättrige, ♀. k. f. Nordamerika.

*indica* L., indische, ♀. w. Ostindien.

*ivaefolia* L., ivablättrige, ♀. k. Nordamerika, Peru.

*parviflora* P., kleinblumige, ♀. w. Peru.

*scoparia* Sw., besenartige, ♀. w. Jamaica.

*neriifolia* L. v. *Brachylaena neriifol.*

**Bactris** Jacq., Bactris, XXI. VI., Palmae.

*caryotaefolia* Mart., brennpalmenblättrige, ♀. w. Brasil.

*cuspidata* Mart., langspitzige, ♀. w. Brasilien.

*guianensis* Lod., guianische, ♀. w. Guiana.

*macracantha* Mart., grofstachelige, ♀. w. Brasilien.

*major* Jacq., grofse, ♀. w. Brasilien, Neugranada.

*minor* Jacq., kleine, ♀. w. Brasilien, Neugranada.

*pectinata* Mart., kammblättrige, ♀. w. Brasilien.

**Baeria** F. et Mey. (Bär, Prof. zu Königsberg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*chrysostoma* F. et Mey., goldfarbige, ☉. f. Californien.

**Baekia** L. (A. Baek, schwedischer Arzt), VIII. 1., Myrtaceae.

*camphorata* Sm., kampherduftende, ♀. t. Neuholland.

**Baeckia**

- densifolia* Sm., dichtblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*diosmaefolia* Rudge, diosmablättrige, ♀. t. Neuholland.  
*frutescens* L., strauchartige, ♀. t. China.  
*gracilis* Cun., schlanke, ♀. t. Neuholland.  
*linifolia* Rudg., linienblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*ramosissima* Cun., ästige, ♀. t. Neuholland.  
*saxicola* Cun., felsenliebende, ♀. t. Neusüdwallis.  
*virgata* Ker, ruthenförmige, ♀. t. Neucaledonien.

**Baeobotrys** Forst., Traubenmyrte, V. 1., Myrsineae (*Ardisiaceae*).

- argentea* Wall., silberfarbige, ♀. w. Ostindien.  
*indica* Roxb., indische, ♀. w. Ostindien, Madagascar.  
*macrophylla* Wall., großblättrige, ♀. w. Ostindien.  
*pubescens* Lodd., weichhaarige, ♀. w. Westindien.  
*tomentosa* Hamilt., filzige, ♀. w. Nepal.

**Balantium** Kaulf., Beutelfarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- Culcita* Kaulf., Polster-B., 4. f. Madeira.

**Balbisia** Cav. (J. B. Balbis, berühmt. franz. Botaniker), X. v., Oxalideae.

- peduncularis* D. Don, gestielte, ♀. t. Chili.  
*Balbisia elongata* W. v. *Tridax procumbens*. *suffruticosa* Diet. v. *Aster* (*Eurybia*) *viscosa*.

**Ballota** L., Ballote, XIV. 1., Labiatae.

- ? *disticha* L., zweireihige, ☉. w. Ostindien.  
*nigra* L., gemeine (schwärzliche), 4. Europa.  
 a) *foetida* Lam. a. *alba* L. b. *borealis* Schwg.  
 c. *hirta* H. Berol.  
 β) *ruderalis* Fries (*vulgaris* Hoffm. und Lk.)  
 b. *urticaefolia* Ortmann.

- cinerea* D. Don vid. *Roylea elegans*. *lanata* L. v. *Panzeria lanata*. *orientalis* Presl. vid. *Beringeria orient.*

**Balsamina** Riv., Balsamine, V. 1., Balsamineae.

- bifida* DC., zweispaltige, ☉. m. f. Japan.  
*capensis* DC., kapische, ☉. m. f. Cap d. g. H.  
*chinensis* DC., chinesische, ☉. m. f. China.  
*coccinea* DC., scharlachfarbige, ☉. m. f. Ostindien.  
*cornuta* DC., gehörnte, ☉. m. f. Ceylon.  
*hortensis* Desp., Garten-B., ☉. m. f. Ostindien.  
*latifolia* DC., breitblättrige, ☉. m. f. Ostindien.  
*madagascariensis* DC., madagascarische, ☉. m. f. Madagascar.  
*minor* DC., kleine, ☉. m. f. Ostindien.  
*mysorensis* DC., mysorensische, ☉. m. f. Ostindien.  
*setacea* Hook, borstige, ☉. m. f. Ostindien.

**Balsamita** Vaill. Dsf., Frauenmünze, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- ageratifolia* Dsf., leberbalsamblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.  
*annua* Delil. (Lk.), jährige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.  
*flabelliformis* P., fächelförmige, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
*grandiflora* Dsf., großblumige, ♂. f. k. Nordafrika.  
*virgata* Dsf., ruthenförmige, 4. k. f. Italien.  
*vulgaris* W. (*major* Dsf., *suaveolens* P.), gemeine (römische Salbei), 4. f. Südeuropa.

**Balsamodendron** Kunth, Balsambaum, VIII. 1., Amyrideae.

- gileadense* Kunth, arabischer, ♀. w. Arabien.  
*zeylanicum* Kunth, zeylonischer, ♀. w. Ceylon.



**Baltimora** L. (Lord Baltimore, ehemaliger Besitzer von Maryland), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae, recta L., aufrechte, ☉. f. Neuspanien.

β) alba.

**Bambusa** Schreb. P. (*Bambos*. Retz), Bambusrohr, VI. 1., Gramineae.

aristata Lod. C., begranntes, 4. 5. w. Ostindien.

arundinacea W., ächtes, 4. 5. w. Ostindien.

glaucula Lod. C., blaugrünes, 4. 5. w. Ostindien.

nigricans Lod. C. (*nigra*), schwärzliches, 5. 5. w. Ostind.

pubescens Lod. C., weichhaariges, 4. 5. w. Ostindien.

spinosa Hamilt., dorniges, 4. 5. w. Ostindien.

stricta Roxb., steifes, 4. 5. w. Ostindien.

verticillata W., wirtelförmiges, 4. 5. w.

vulgaris Schrad. (*arundinacea* Ait. Kew. *Thouarsii* Kunth.), gemeines, 4. 5. Mascarenas, Madagascar.

*baccifera* Roxb. v. *Melocanna bambusoides. latifolia* Hamb. v. *Nastus latifol.*

**Banffya** Baumg. v. Gypsophila.

**Banisteria** L. (John Banister, engl. Botan.), X. III., Malpighiaceae.

ciliata Lam., gefranzte, 5. Sch. Brasilien.

ferruginea Cav., rostfarbige, 5. Sch. Südamerika.

fulgens L., leuchtende, 5. Sch. Westindien.

Humboldtiana DC., Humboldt's, 5. Sch. Neugranada.

laurifolia L., lorbeerblättrige, 5. Sch. Westindien.

ovata Cav., eiförmige, 5. w. Hispaniola.

periplocaefolia Desf., periplocablättrige, 5. Sch. w. Portorico.

sericea Cav., seidenhaarige, 5. w. Brasilien.

splendens DC., schimmernde, 5. Sch. w. Westindien.

tenuis Lindl., dünne, 5. Sch. t. w. Buenos Ayres.

tomentosa Dsf., filzige, 5. Sch. w. Südamerika.

zanzibarica Boj., zanzibarische, 5. Sch. Zanzibar.

*bengalensis* L. et *unicapsularis* Lam. vid. Hiptage Matablota. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen Heteropteris et Stigmaphyllon.

**Banksia** L. fil., Drahtblume, (Joseph Banks, berühmter engl. Naturforscher), IV. 1., Proteaceae.

aemula RB., tiefgesägte, 5. t. Neuholland.

attenuata RB., verschälerte, 5. t. Neuholland.

australis RB., südlichere, 5. t. Neuholl., Van Diemens L.

Baueri RB., Bauer's, 5. t. Neuholland.

Baxteri RB., Baxter's, 5. t. Neuholland.

Brownii Baxt., Brown's, 5. t. Neuholland.

Caleyi RB., Caley's, 5. t. Neuholland.

coccinea RB., scharlachfarbige, 5. t. Südl. Neuholl.

collina RB., Hügel-D., 5. t. Neuholland.

compar RB., verwandte, 5. t. Neuholland.

Cunninghamii Shr., Cunningham's, 5. t. Neuholland.

dentata L. fil., gezähnelte, 5. t. Neuholland.

depressa RB., niedergedrückte, 5. t. Neuh., Van Diem. L.

dryandroides RB., dryandraähnliche, 5. t. Neuholland.

elatio RB., erhabene, 5. t. Neuholland.

ericaefolia L. fil., heideblättrige, 5. t. Neuholland.

fagifolia Hort., buchenblättrige, 5. t. Neuholl.

Goodii RB., Good's, 5. t. Neuholland.

grandis W., großblumige, 5. t. Neuholland.

Hügelii RB., Hügel's, 5. t. Neu-Südwallis.

ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, 5. t. Neuholland.

**Banksia**

- insularis* RB., Insel-D., f. t. Südseeinseln.  
*integrifolia* Cav., ganzblättrige, f. t. Neuholland.  
*Lamberti* Hort. Berol., Lambert's, f. t. Neuholland.  
*latifolia* RB., breitblättrige, f. t. Neuholland.  
*litoralis* RB., Meerstrands-D., f. t. Südl. Neuholland.  
*marcescens* RB., welkende, f. t. Neuholland.  
*marginata* Cav., berandete, f. t. Neuholland.  
*media* RB., mittlere, f. t. Neuholland.  
*Menziesii* RB., Menzie's, f. t. Neuhol. (Schwanenflufs).  
*nutans* RB., nickende, f. t. Südl. Neuholland.  
*oblongifolia* Cav., langblättrige, f. t. Neuholland.  
*occidentalis* RB., westliche, f. t. Südwestl. Neuhol.  
*paludosa* RB., Sumpf-D., f. t. Neuholland.  
*prostrata* RB., gestreckte, f. t. Neuholland.  
*pulchella* RB., schöne, f. t. Südl. Neuholland.  
*quercifolia* RB., eichenblättrige, f. t. Neuholland.  
*repens* La Bill., kriechende, f. t. Neuholland.  
*serrata* L. fil., gesägte, f. t., Neu-Südwallis.  
*Solandri* RB., Solander's, f. t. Neuholland.  
*speciosa* RB., prächtige, f. t. Neuholland.  
*sphaerocarpa* RB., kugelfrüchtige, f. t. Südl. Neuholland.  
*spinulosa* Sm., stachelspitzige, f. t. Neuholland.  
*verticillata* RB., wirtelblättrige, f. t. Neuholland.  
*ferrea* Vent. vid. *marginata*. *grandidentata* Dum.  
 Cours. v. *speciosa*. *ledifolia* Cunn. v. *Cunninghami*.  
*microstachya* Cav. v. ? *litoralis*. *oleaeifolia* Cav. v.  
 ? *integrifolia*. *praemorsa* Andr. v. *marcescens*. *Robur*  
 Cav. vid. *latifolia*. *spicata* G. v. *integrifolia*.  
 Die übrigen s. *Hakea*.

**Baphia** Afzel, Baphie, X. 1., Leguminosae-Swartzieae.  
*nitida* Lod., glänzende, f. w. Sierra Leone.

**Baptisia** Vent., Baptisie, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- alba* RB., weisse, 4. f. Nordamerika.  
*australis* RB., südlichere, 4. f. Carolina.  
*exaltata* Swt., hohe, 4. f. Nordamerika.  
*minor* Lehm., kleine, 4. f. Nordamerika.  
*mollis* Nutt., weiche, 4. f. Carolina.  
*perfoliata* RB., durchwachsene, 4. k. f. b. Carolina.  
*tinctoria* RB., färbende, 4. f. Nordamerika.  
*uniflora* Nutt., einblumige, 4. f. Nordamerika.  
*versicolor* Lod., buntfarbige, 4. f. Nordamerika.  
*villosa* Ell., zottige, 4. f. Nordamerika.  
*lanceolata* Ell. vid. *uniflora*. *nepalensis* Hook. v.  
*Piptanthus nepalensis*. *nitida* Hort. v. ? *alba*.

**Barbacenia** Vand. (Barbacena, vornehmer Portugiese),  
 VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

*purpurea* Hook., purpurfarbige, 4. w. Brasilien.

**Barbarea** RB., Erdkresse (Barbernkraut), XV. III.,  
 Cruciferae.

*arcuata* RB., bogenschotige, 4. f. Deutschland, Volhynien, Taurien.

β) flore pleno.

*plantaginea* DC., wegrittblättrige, 4. f. Kleinasien.

*praecox* RB., frühe, 4. f. England, nördl. Deutschl.

*stricta* Andr., steifschotige, 4. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.

*vulgaris* RB., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.

β) flore pleno.

**Barbarea**

*iberica* DC. vid. *stricta*. *orthoceras* Lod. et *parviflora* Fr. v. *stricta*. *taurica* DC. v. *arcuata*.

**Barbieria** DC, (J. B. G. Barbier, französischer Botaniker), XVII. IV. (VI.).

*polyphylla* DC., vielblättrige, ♀. w. Westindien.

**Barkeria** K. et W. (G. Barker, engl. Botan.), XX. I. *elegans* K. et W., zierliche, 4. w. Mexico.**Barkhausia** Mch. (Barkhaus, wenig bekannter deutscher Botaniker (*Borkhausia* Lk. Spgl. et *Lagoseris* Lk. non M. B.).

*alpina* Lk., Alpen-B., 4. f. Italien, Sibirien.

*aspera* Lk. (*Nemauchenes asp.* Cass.), rauhe, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Kleinasien.

*bellidifolia* DC., maßliebenblättrige, ☉. f. Corsica.

*bursifolia* Spgl., täschelkrautblättrige, ☉. f. Sicilien.

*Candollei* Spgl., De Candolle's, ☉. f. Sicilien.

*caroliniana* Nutt., carolinische, ☉. f. Carolina.

*cernua* Rchb., übergebogene, ☉. f. Illyrien, Italien.

β) *stricta* Rchb.

*foetida* DC., stinkende, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *graveolens* Lk. γ) *pinguis* Rchb.

*leontodontoides* Spgl., löwenzahnähnliche, ♂. f. Italien.

*macrophylla* Spgl., großblättrige, ☉. f. Nordamerika.

*nicaeensis* Lk., ligurische. ☉. t. Oberitalien.

*purpurea* Bivon., purpurfarbige, ♂. f. Sicilien.

*raphanifolia* Spgl., rettigblättrige, 4. f. ?

*rhoeadifolia* MB., mohnblättrige, ☉. f.

*rubra* Mönch, rothe, 4. f. Osteuropa, Italien.

*senecioides* Spgl., kreuzkrautähnliche, ☉. f. Aegypten.

*setosa* DC. (*hispida* Lk.), borstige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

*Suffreniana* DC., Suffren's, ☉. f. Südfrankreich.

*taraxacifolia* Thuill., löwenzahnblättrige, ♂. f. Süd-deutschland, Italien, Frankreich.

β) *praecox* Rchb. γ) *intybacea* DC.

*versicolor* Spgl. (Fisch. Lk.), buntfarbige, 4. f. Dahuria.

*vesicaria* Spgl., blasige, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

β) *scariosa* Rchb.

**Barleria** L. (J. Barrelier, berühmter französischer Botaniker), XIV. II., Acanthaceae.

? *alba* Hort., weisse, ♀. w. ? Neuholland.

*buxifolia* L., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.

*coerulea* Roxb., blaue, ♀. w. Ostindien.

*cristata* L., kammförmige, ♀. w. Ostindien.

*dichotoma* Roxb., zweizinkige, ♀. w. Ostindien.

*flava* Jacq., gelbe, ♀. w. Ostindien, Arabien.

*Hystrix* L., starkstachelige, ♀. w. Ostindien, Molucken.

*longiflora* L., langblumige, ♀. w. Malabar.

*lupulina*, Lindl., hopfenartige, ♀. w. Mauritius.

*Prionitis* L., fußangelförmige, ♀. w. Ostind., Arabien.

*purpurea* Lodd., purpurfarbige, ♀. w. Ostindien.

*solanifolia* L., nachtschattenblättrige, ♀. w. Westindien.

*strigosa* W., striegelige, ♀. w. Ostindien.

*coccinea* L. v. *Ruellia cocc.* *longifolia* L. (*hexacantha* Bertol. v. *Asteracantha longifol.* *mitis* Ker v. *flava*).

**Barnardia** Lindl. (E. Barnard, Vice-Secret. der Lond. Gartenbau-Gesellsch.), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*scilloides* Lindl., meerzwiebelähnliche, 4. Zw. k. t. China.



**Barosma** W. E. (*Baryosma* R. et S.), Barosme, V. I.,  
Tricoccae-Rutaceae.

angustifolia Bartl. et Wendl., schmalblättrige, ♂. t. C.  
d. gut. Hoffn.

betulina Bartl. et Wendl., birkenblättrige, ♂. t. Cap  
d. gut. Hoffn.

dioica Bartl. et Wendl., zweihäusige, ♂. t. C. d. g. H.

foetidissima Bartl. et Wendl., stinkende, ♂. t. C. d. g. H.

latifolia R. et S., breitblättrige, ♂. t. Cap. d. g. H.

oblonga Bartl. et Wendl., eiförmige, ♂. t. C. d. g. H.

pulchella, Bartl. et Wendl., hübsche, ♂. t. C. d. g. H.

serratifolia W., sägeblättrige, ♂. t. C. d. g. H.

β) odorata W. (*crenata* Hort.).

**Barringtonia** Forst. (Barrington, englischer Gelehrter),  
XVI. VIII., Myrtaceae.

speciosa Forst., prächtige, ♂. w. Ostind., Südseeinseln.

acutangula Roxb. et racemosa Spgl. vid. Stravadium  
acut. etc.

**Bartholina** RB. (Th. Bartholini, dänischer Arzt u. Ana-  
tom), XX. I., Orchideae.

pectinata R. B., kammförmige, 4. Kn. w. C. d. g. H.

*Bartlingia scoparia* Rchb. v. *Plocama pendula*.

**Bartonia** Sims (Barton, Botaniker zu Philadelphia),  
XII. I., Loasaceae.

albescens Gill., weißliche, ☉. f. m. Chili.

aurea Lindl., goldfarbige, ☉. f. Californien.

nuda Pursh, nacktkapselige, ♂. f. Nordamerika.

ornata Pursh (*decapetala* Sims), zierliche, ♂. f. Nord-  
amerika.

**Bartsia** L. (John Bartsch, M. D. Freund von Linné)  
XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

alpina L., Alpen-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische  
Alpen.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: Castilleja,  
Euchroma, Odontites et Trixago.

*Baryosma Tongo* G. v. *Dipterix odorata*.

**Basella** L. (malabarischer Name), V. III., Aizoideae-  
Atriplicineae.

alba L., weiß, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

cordifolia Lam., herzblättrige, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

lucida L., starkglänzende, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

marginata Humb., berandete, ☉. ♂. Sch. w. Quito,  
Mexico.

nigra Lour., schwarze, ☉. ♂. Sch. w. China.

rubra L., rothe, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

tuberosa Humb., knollige, 4. Kn. w. Neugranada.

**Bassia** König (F. Bassi, Vorsteher des botanischen Gar-  
tens zu Bologna), XI. I., Sapotaceae.

butyracea Roxb., buttergebende, ♂. w. Ostindien.

latifolia Roxb., breitblättrige, ♂. w. Ostindien.

longifolia Kön., L., langblättrige, ♂. w. Malabar.

**Batemannia** Lindl. (James Bateman, engl. Garten-  
freund), XX. I., Orchideae.

Colleyi Lindl., Colley's, 4. w. Demerara.

*Batschia canescens* Mch., *carolinensis* P. (*Gmelini* Mchx.),  
*longiflora* Pursh v. *Lithospermum canesc.* etc.

**Bauera** Andr. (Franz u. Ferd. Bauer, berühmte Pflan-  
zenmaler), XIII. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

galioides Sbr., labkrautähnliche, ♂. t. Neuholland.

**Bauera**

- humilis Swt., niedrige, f. t. Neuholland.  
 rubioides Andr., rötheähnliche, f. t. Neuholland.

**Bauhinia** Plum. (J. u. C. Bauhin, berühmte Botaniker),  
 X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

- aculeata L., stachelige, f. w. Westindien, Südamerika.  
 acuminata L., zugespitzte, f. w. Ost- u. Westindien.  
 ? alba Hort., weisse, f. w. ? Südamerika.  
 ? americana Dum. Cours., f. w. Südamerika.  
 anatomica H. Anglor., Lk., hautblättrige, f. w. Südamerika.  
 Anguina Roxb., Schlangen-B., f. Sch. w. Ostindien.  
 armata Otto, bewaffnete, f. Sch. w. Brasilien.  
 aurita Ait., geöhrt, f. w. Jamaica.  
 candida Ait., reinweisse, f. w. Ostindien.  
 chinensis DC., chinesische, f. w. China.  
 cumanensis Kunth, cumanische, f. Sch. w. Cumana.  
 divaricata L., sparrige, f. w. Westindien.  
 emarginata Mil., ausgerandete, f. w. Carthagen.  
 ferruginea Roxb., rostfarbige, f. Sch. w. Ostindien.  
 forficata Lk., scheerenförmige, f. w. Brasilien.  
 glabra Jacq., kahle, f. Sch. w. Carthagen.  
 glaucescens DC., blaugrüne, f. w. Cumana.  
 grandiflora Juss., großblumige, f. w. Peru.  
 guianensis Aubl., guianische, f. Sch. w. Guiana.  
 heterophylla Kth, verschiedenblättrige, f. w. Caraccas.  
 indica Lod., C., indische, f. w. Ostindien.  
 inermis P., unbewehrte, f. w. Südamerika.  
 Lamarckiana DC. (*divaricata* Lam.), f. w. Südamerika.  
 latifolia Cav., breitblättrige, f. w. Westindien.  
 leptopetala DC., schmalkronige, f. w. Neuholland.  
 Lunaria Cav., mondblättrige, f. w. Neuspanien.  
 madagascariensis Desv., madagascarisches, f. w. Madagascar.  
 malabarica Roxb., malabarische, f. Sch. w. Malabar.  
 microphylla Hort., kleinblättrige, f. w. Südamerika.  
 multinervia DC., vielnervige, f. w. Caraccas.  
 parviflora Vahl, kleinblumige, f. w. Ostindien.  
 Pauletia P., Paulet's, f. w. Panama.  
 porrecta Ait., hervorgestreckte, f. w. Westindien.  
 pubescens DC., weichhaarige, f. w. Jamaica.  
 purpurea L., purpurfarbige, f. w. Westindien.  
 racemosa Lam., traubige, f. Sch. w. Ostindien.  
 retusa Poir., abgestutzte, f. w. Ostindien.  
 rufescens Lam., fuchsröthliche, f. w. Afrika.  
 scandens L., klimmende, f. Sch. w. Ostindien.  
 semibifida Roxb., halbzeispaltige, f. Sch. w. Ostindien.  
 spathacea DC., scheidige, f. w. Mexico.  
 speciosa Hort., prächtige, f. Sch. w. ?  
 subrotundifolia Cav., rundlichblättrige, f. w. Neuspan.  
 tomentosa L., filzige, f. w. Ostindien.  
 triandra, Roxb., dreimännige, f. Sch. w. Ostindien.  
 unguolata L., klauenförmige, f. w. Südamerika.  
 variegata L., bunte, f. w. Ostindien.

**Beaufortia** RB. (Herzogin v. Beaufort, Beförderin der Botanik), XVIII. 11., Myrtaceae.

- Dampieri Cun. (*carinata* Cun.), Dampier's, f. t. Neuholland.  
 decussata RB., kreuzweifsblättrige, f. t. Neuholland.

**Beaufortia**

*sparsa* RB., zerstreutblättrige, f. t. Neuholland.

*splendens* Baxt., starkglänzende, f. t. Neuholland.

**Beaumontia** Wall. (Lady Beaumont), V. 1., Contortae-Apocynaeae.

*grandiflora* Wall., großblumige, f. Sch. w. Ostindien.

*longifolia* Lod., langblättrige, f. Sch. w. Ostindien.

**Beckmannia** Host. (Beckmann, Prof. zu Göttingen), III. II., Gramineae.

*erucaeformis* Host., raupenförmige, C. f. Süd- u. Osteuropa, Sibirien,

**Befaria** Mutis, Befarie, XI. 1., Ericaceae.

*glauca* Humb., blaugrüne, f. w. Neugranada.

*racemosa* Vent., traubige, f. k. Florida.

**Begonia** L. (Michael Begon, französischer Beförderer d. Botanik), Schiefblatt, XXI. IX. (XIII. III.), Portulacaeae-Polygoneae.

*acerifolia* H.B.K., ahornblättriges, f. w. Südamerika.

*acuminata* Dryand., zugespitztes, f. w. Jamaica.

*acutifolia* Jacq. (*purpurea* Sw.), spitzblättriges, f. w. Westindien.

*argyrostigma* Fisch., Lk. u. Otto, perlmutterfleckiges, f. w. Brasilien.

*bulbilifera* Lk., zwiebeltragendes, 4. Kn. w. Brasilien.

*castaneaefolia* Fisch., Schott., kastanienblättriges, f. w. Brasilien.

*dichotoma* Jacq., zweizinkiges, f. w. Südamerika.

*dipetala* Grah., zweiblättriges, f. w. Bombay,

*diptera* Dryand., zweiflügeliges, f. w. Brasilien, Cap d. gut. Hoffn.

*discolor* RB., verschiedenfarbiges, 4. w. China, Martinique.

*disticha* Lk., zweizeiliges, f. 4. w. ? Südamerika.

*diversifolia* Grah., verschiedenblättriges, 4. w. Brasilien.

*Dregei* H. Berol., Drege's, f. t. Cap d. g. Hoffn.

*dubia* Haw., zweifelhaftes. 4. w. Brasilien.

*fagifolia* Fisch., buchenblättriges, f. w. ?

*Fischeri*, Otto, Fischer's, f. w. Brasilien.

*geraniifolia* Hook, storchschnabelblätt., 4. Kn. w. Lima.

*heracleifolia* Schldl. et Ch., bärenklaublättriges, 4. Kn. w. Mexico.

*hirsuta* Aubl., rauhhaariges, C. ♂. w. Guiana.

*hirtella* Lk., kurzhaariges, f. 4. w. ?

*humilis* Dryand., niedriges, C. ♂. w. Westindien.

*incarnata* Lk. et Otto, fleischfarbiges, f. w. Brasilien.

*insignis* Grah., ausgezeichnetes, f. w. Südamerika.

*longipes* Hook, langstieliges, f. w. Mexico.

*lucida* Haw., starkglänzendes, f. w. Westindien.

*macrophylla* Dryand. (*grandifolia* Jacq.), großblättriges, f. w. Jamaica.

*Martiana* Lk. et Otto, Martius's, 4. w. Mexico.

*Meyeri* Lk. et Otto, Meyer's, f. w. Brasilien.

*monoptera* Otto, einflügeliges, 4. Kn. w. Brasilien.

*multibulbulosa* Mart. (? *bulbilifera*), vielzwiebeliges, 4. Kn. w. Brasilien.

*nitida* Ait., glänzendes, h. w. Jamaica.

*octopetala* L'Her., achtblättriges, 4. Kn. w. Peru.

*odorata* W., riechendes, 4. w. Südamerika.

*Ottoniana* \* (*parvifolia* Otto), Otto's, 4. Kn. w. t. C. d. g. Hoffn.

*palmata* D. Don, handförmiges, 4. t. Nepal.



**Begonia**

- papillosa* Grah., weichwarziges, ♀. w. Brasilien.  
*parvifolia* Schott., kleinblättriges, ♀. w. Brasilien.  
*patula* Haw., ausgebreitetes, ♀. w. Westindien.  
*pauciflora* Lindl., wenigblumiges, 4. w. ?  
*petaloides* Lindl., großblumiges, ♀. 4. w. Brasilien.  
*picta* Sm. (Hamilt.), bemaltes, 4. Kn. w. Nepal.  
*platanifolia* Schott., platanenblättriges, ♀. 4. w. Brasil.  
*pulchella* Radd., hübsches, ♂. w. Brasilien.  
*reniformis* Dryand., nierenförmiges, ♀. 4. w. Brasilien.  
*sanguinea* Radd., blutrothes, ♀. w. Brasilien.  
*scandens* Sw., klimmendes, 4. Sch. Kn. w. Jamaica, Guiana.  
*Sellowii* ? Otto, Sellow's, ♀. w. Brasilien.  
*semperflorens* Lk., immerblühendes, ♀. w. Mexico, Brasil.  
*spathulata* Hornem., spathelblättriges, 4. w. Westindien.  
*suaveolens* Haw., wohlriechendes, ♀. w. Westindien.  
*tuberosa* Dryand., knolliges, 4. Kn. w. Molucken.  
*ulmifolia* Humb., ulmenblättriges, ♀. w. Südamerika.  
*undulata* Schott., wellenblättriges, ♀. w. Brasilien.  
*villosa*, Bot. reg., zottiges, ☉. w. Südamerika.  
*vitifolia* Schott., weinblättriges, ♀. w. Brasilien.

*Evansiana* Andr. v. *discolor*. *glabra* Aubl. v. *scandens*. *grandiflora* Knowl. v. *octopetala*. *maculata* Radd. vid. *argyrostigma*. *minor* Jacq. et *obliqua* L'Her. v. *nitida*. *radiata* Grah. v. *heracleifolia*.

*Behrinia chondrilloides* Sieb. v. *Crepis chondr.*

*Belis jaculifolia* Salisb. v. *Cunninghamia lanceolata*.

**Bellevallia** Lapeyr. (P. R. Belleval, französischer Botaniker), VI. 1., (Coronariae-Asphodeleae).

*romana* (L.) (*operculata* Lap.), römische, 4. Zw. f. Italien.

*dubia* (Guss.), zweifelhafte, 4. Zw. Sicilien.

**Bellidiastrum** Cass., Bergmaßliebe, XIX. 11., Compositae Corymbiferae.

*Micheli* Cass. (*montanum* Bl. et Fing.), Micheli's, 4. f., Mitteleuropäische Alpen.

**Bellis** T., Gänseblümchen (Tausendschön), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*annua* L., jähriges, ☉. f. Südamerika.

*hybrida* Ten., Bastard-M., 4. f. Neapel.

*integrifolia* Michx., ganzblättrig., ☉. f. Nordam., Texas.

*perennis* L., gemeines, 4. f. Europa.

b. *hortensis*, c. *fistulosa*, d. *prolifera*.

*sylvestris* Cyril., wildes, 4. f. Neapel, Sicilien.

**Bellium** L., Maßliebe, XIX. 11., Composit. Corymbiferae. *bellidioides*, gänseblumähnliche, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*crassifolium* Moris, dickblättrige, 4. k. Sardinien.

*intermedium* J. C., mittlere, 4. f. ?

*minutum* L., kleine, ☉. f. Levante.

**Beloperone** N. E., Beloperone, II. 1., Acanthaceae.

*oblongata* N. E., langblättrige, ♀. w. Brasilien.

**Benincasa** Savi (Benincasa, italienischer Edelmann), XXIII. 1., Cucurbitaceae.

*cerifera* Savi, wachsgebende, ☉. w. Ostindien.

*cylindrica* N. E., cylinderförmige, ☉. w. Ostindien.

**Benthamia** Lindl. (G. Bentham, berühmter englischer Botaniker), V. 1., Corneae.

*fragifera*, erdbeertragende, ♀. k. t. Ostindien.

**Berardia subacaulis** Vill. v. *Arctium lanuginosum*.

**Berberis T.**, Sauerdorn, VI. 1., Berberiderae.

*asiatica* Roxb., asiatischer,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Ostind., Nepal.  
*buxifolia* Lam., buchsbaumblättriger,  $\frac{1}{2}$ . k. Magellani-  
 sche Meerenge.

*canadensis* Mill., canadischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.

*cerasina* Schrad. (*emarginata* H. Hafn.), kirschenähnli-  
 cher,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.

*Chitria* Hamilt., gegrannter,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.

*Coriaria* Wall. et Roysl., Gerber-S.,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.

*crataegina* DC., weifsdornähnlicher,  $\frac{1}{2}$ . f. Kleinasien.

*crenulata* Schrd. (*canadensis* Big.), gekerbter,  $\frac{1}{2}$ . f. Nord-  
 amerika.

*cretica* L., cretischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Candia.

$\beta$ ) *glauca* Schrad.

*daurica* Lod., daurischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Dahuria.

*dealbata* Lindl., weifsllicher,  $\frac{1}{2}$ . k. Mexico.

*declinata* Schrad. (*sinensis* H. Monspel.), niedergebeug-  
 ter,  $\frac{1}{2}$ . f. Mittelasien.

*dulcis* Swt., süfser,  $\frac{1}{2}$ . f. Magellanische Meerenge.

*emarginata* W., ausgerandeter,  $\frac{1}{2}$ . f. Sibirien.

*empetrifolia* Lam., rauschbeerenblättriger,  $\frac{1}{2}$ . k. Ma-  
 gellanische Meerenge.

*floribunda* Wall., blüthenreicher,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.

*heterophylla* Juss., verschiedenblättriger,  $\frac{1}{2}$ . k. Magel-  
 lanische Meerenge.

*iberica* Steven, iberischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Caucasus.

*ilicifolia* Forst., stechhülsenblättriger,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Feuerland.

*laxiflora* Schrad. (*canadensis* H. Vindob.), lockerblumige,  
 $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.

*lucida* Schrad., starkglänzender,  $\frac{1}{2}$ . f. Caucasus.

*macracantha* Schrad., großstacheliger,  $\frac{1}{2}$ . f. Pennsylvanien.

*macrocarpa* Schrad. (*sinensis*, *monspeliensis*, *glauca* Hort.),  
 großfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$ . f. ? Mittelasien.

*mitis* Schrad. (*crataegina* Hort.), unbewehrter,  $\frac{1}{2}$ . f. Nord-  
 amerika.

*nepalensis* Lodd., nepalischer,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.

*nitens* Schrad., glänzender,  $\frac{1}{2}$ . f. ?

*obovata* Schrad., verkehrteiförmiger,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Creta.

*provincialis* Audib. (*ilicifol.* H. Vind.), ausländischer,  $\frac{1}{2}$ . f. ?

*ruscifolia* Lam., mäusedornblättriger,  $\frac{1}{2}$ . t. Buenos Ayres.

*sanguinolenta* Schrad., blutrother,  $\frac{1}{2}$ . f. ?

*sibirica* Pall., sibirischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Sibirien.

*sinensis* Dsf., sinesischer,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordchina.

*virgata* R. et P., ruthenförmiger,  $\frac{1}{2}$ . t. Peru.

*vulgaris* L., gemeiner,  $\frac{1}{2}$ . f. Europa, Mittelasien.

$\beta$ ) *apyrena*.  $\gamma$ ) *flava*.  $\delta$ ) *sanguinea*.  $\epsilon$ ) *sero-*  
*tina*.  $\zeta$ ) *violacea*.

*Wallichiana* CC., Wallich's,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.

*Aquifol.* Pursh. *fasciculat.* Sims. *glumacea* Spgl.  
 etc. vid. *Mahonia Aquifol.* etc.

**Berchemia** Neck., Berchemie, V. 1., Rhamneae.

*lineata* DC., linirte,  $\frac{1}{2}$ . Sch. k. t. Ostindien, China.

*volubilis* DC., windende,  $\frac{1}{2}$ . Sch. k. f. b. Virgin., Carolina.

**Berkheya** Ehrh. (van Berkhey, holländischer Botan.),  
 Compositae-Corymbiferae.

*cernua* RB., übergebogene, ♂. t. Cap d. g. H.

*cuneata* W., keilförmige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.

*cynaroides* W., distelähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

*grandiflora* W., großblumige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.

**Berkheya**

incana W., weißgraue, ⚥. t. Cap d. g. H.

obovata W., verkehrt-eiförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

palmata W., handförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

pectinata W., kammförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

spinosissima W., stachelige, 4. t. Cap d. g. H.

uniflora W., einblumige, ⚥. t. Cap d. g. H.

*ciliaris* W. *setosa* W. et *squarrosa* W. v. *Callumia* cil. etc.

**Bergera** König (C. J. Berger, Prof. zu Kiel), X. 1., Hesperideae-Aurantiaceae.

integerrima Roxb., ganzblättrige, ⚥. w. Ostindien.

Königii Roxb., Königs-B., ⚥. w. Ostindien.

**Bergia** L. (P. J. Bergius, Prof. der Naturgeschichte zu Stockholm), XI. 1v., Lythriaceae.

verticillata W., wirtelblättrige, ☉. f. Aegypt., Ostind.

**Beringeria** Necker (*Marrub. spec. Auctor*), Beringerie, XIV. 1., Labiatae.

acetabulosa Benth. (L.), sauerblättrige, ⚥. k. Candia.

africana Benth. (L.), afrikanische, 4. k. Cap d. g. H.

cinerea Benth. (Desr.), aschgraue, 4. f. Spanien.

crispa Benth. (L.), krausblättrige, 4. f. Südeuropa.

hirsuta Benth. (W.), rauhhaarige, 4. f. ?

hispanica Benth. (L.), spanische, 4. f. Spanien.

orientalis Benth. (Spgl.), morgenländische, 4. k. Kleinasien.

Pseudo-dictamnus Benth. (L.), dostartige, ⚥. k. Candia.

**Bernhardia** W. (J. J. Bernhardt, berühmter Botaniker zu Erfurt), XXIV. 111., Lycopodiaceae.

dichotoma W., zweizinkige, 4. w. Westind., Mascarenas, Neuholland.

**Berrya** Roxb. (Dr. Berry, engl. Botan.), XIII. 1., Tiliaceae. Amomilla Roxb., Amomilla-B., ⚥. w. Ceylon.**Berteroa** DC. (C. J. Bertero, berühmter französischer Botaniker und Reisender), XV. 11., Cruciferae.

incana DC., graugrüne, ♂. f. Europa.

β) *viridis* Rehb. Tausch.

mutabilis DC., veränderliche, ⚥. k. f. b. Dalmatien, Griechenland.

obliqua DC., schiefe, ⚥. 4. k. Sicilien, Neapel.

**Bertholletia** Humb. Bonpl. (J. C. Berthollet, berühmter franz. Chemiker), XIII. 1., Myrtaceae-Lecythideae.

excelsa Humb. Bonpl., hohe, (brasil. Nufs), ⚥. w. Para.

**Berzelia** Brong. (Berzelius, berühmter schwedischer Chemiker), V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.

abrotanoides Brong. (Thbg.), stabwurzelähnliche, ⚥. t. Cap d. g. H.

lanuginosa Brong. (L.), wollige, ⚥. t. Cap d. g. H.

**Besleria** L. (Basil. Besler, Apotheker in Nürnberg), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.

coccinea Aubl., scharlachfarbige, ⚥. Sch. w. Guiana.

cristata L., kammförmige, ⚥. Sch. w. Westindien, Südamer.

dichrus Spgl. (*bicolor* Schott), zweifarbig, ⚥. w. Brasilien.

grandifolia Schott, großblättrige, ⚥. w. Brasilien.

grandiflora Bonpl., großblumige, ⚥. w. Neugranada.

hirtella Schott., kurzhaarige, ⚥. w. Brasilien.

incarnata Aubl., fleischfarbig, 4. w. Guiana.

lutea L., gelbblumige, ⚥. w. Westindien, Guiana.

melittaeifolia L., melissenblättrige, ⚥. w. Westindien.

mollis Hook., weiche, ⚥. w. Südamerika.

pulchella Don, schöne, ⚥. w. Trinidad.



**Besleria**

serrulata Jacq., sägezähnige, ♀. Sch. w. Westindien.

violacea Aubl., violette, ♀. Sch. Guiana.

**Beta** T. Mangold, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

orientalis Roth, morgenländischer, ♂. Asien.

patula Ait., ausgebreiteter, ♂. k. Madeira.

trigyna W. Kit., dreiweibiger, 4. f. Ungarn, Taur., Caucas.

vulgaris L., gemeiner, ♂. f. Europa, Afrika u. Mittelasien.

β) maritima. γ) macrorrhiza Steven. δ) Cicla

L. ε) hortensis (*brasiliensis* Hort.), a) alba, b) rubra,

c) lutea.

*bengalensis* Roxb. *foliosa* Ehrenb. et *maritima* MB.

v. *orientalis*.

**Betckea** DC. (Betcke hat über Valerianeen geschrieben),

III. I., Valerianeae.

major Fisch. et Mey., größere, ☉. f. Neucalifornien.

samolifolia DC., pungenblättrige, ☉. f. Chili.

**Betonica** L., Zehrkrut, XIV. I., Labiatae.

Alopecurus L., Fuchsschwanz-Z., 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

grandiflora W., großblumiges, 4. f. Sibirien, Caucasus.

heraclea L., dichtähriges, 4. f. Kleinasien.

hirsuta L., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa, Caucasus.

β) incana Ait.

nivea Steven, schneeweißes, 4. f. Caucasus.

officinalis L., officinelles, 4. f. Europa.

α) hirta Rchb. β) glabrata. γ) stricta Ait. δ) lati-

folia (*serotina* Host.). ε) alba.

orientalis L., morgenländisches, 4. f. Kleinasien.

*densiflora* Benth. *macroua* Host. *Monnieri* Gouan

v. *hirsuta*.

**Betula** T., Birke, XXI. IV., Amentaceae.

alba L., gemeine weiße, ♀. f. Europa, Asien.

a) aurea Borkh. b) dalecarlica L. c) hybrida

Bechst. d) laciniata Wahlenb. e) macrocarpa.

f) pendula. g) pontica W. h) urticifolia A. B.

i) verrucosa Ehrh.

carpinifolia Ehrh., hainbuchenblättrige, ♀. f. Nordamer.

dahurica Pall., dahurische, ♀. f. Sibirien.

β) parvifolia.

excelsa Ait., hohe, ♀. f. Nordamerika.

fruticosa Pall., strauchige, ♀. f. Deutschl., Sibirien.

glandulosa Mchx., drüsige, ♀. f. Nordamerika.

grandis Schrad., großzähnige, ♀. f. Nordamerika.

lanulosa Mchx., wollige, ♀. f. Nordamerika.

lenta L. (*nigra* du Roi), zähe, ♀. f. Nordamerika.

nana L., Zwerg-B., ♀. f. Europ. Alpen, Sibirien, Canada.

β) stricta Lod.

nigra L. (*angulata* Lodd.), schwarze, ♀. f. Nordamerika.

papyracea Ait. (*papyrifera* Mchx.), *canadensis* et *rubra*

Lod. Cat. (*lanceolata* Hort.), papiergebende, ♀. f.

Nordamerika.

β) fusca Bosc. γ) platyphylla Hortul. δ) tri-

choclada Hort.

populifolia Ait. (*lenta* du Roi), pappelblätt., ♀. Nordamer.

β) laciniata Lod. γ) pendula Lod.

pubescens Ehrh., weichhaarige, ♀. f. Deutschl., Ungarn,

Volhynien.

β) carpathica Kit. (*glutinosa* Wallr.).

pumila L., kleine, ♀. f. Nordamerika.

rubra Mchx., röthliche, ♀. f. Nordamerika.

**Betula**

- tristis* Wormsk., trauernde, ♀. f. Kamtschatka.  
*acuminata* Ehrh. vid. *populifolia*. *humilis* Schrk.  
 v. *fruticosa*. *lutea* Mchx. vid. *excelsa*. *ovata* Schrk.  
 et *oycoviensis* Bess. v. *Alnus viridis*. Hinsichtlich  
 der übrigen s. *Alnus*.

**Beureria** Jacq., \*Beurerie, V. I., Asperifol.

- exsucca* Jacq., saftlose, ♀. w. Westindien.  
*succulenta* Jacq., fleischige, ♀. w. Westind., Südamer.

**Bidens** T., Zweizahn, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

- angustissima* Kunth, schmalblättriger, 4. t. Neuspanien.  
*Berteriana* Spgl., Bertero's, 4. w. Portorico.  
*bipinnata* L., doppeltgefiederter, ♂. f. Nordamer., südl. Tyrol.  
*bullata* L., blasiger, ♂. f. Nordamerika, Oberitalien.  
*cernua* L., übergebogener, ♂. f. Europa, Nordamerika.  
 β) *radiata*.

- chinensis* W., chinesischer, ♂. f. China.  
*chrysantha* Ortega., goldblumiger, ♂. f. Südamerika.  
*chrysanthemoides* Mchx., wucherblumenähnlicher, ♂. f.  
 Nordamerika.

- connata* W., verwachsener, ♂. f. Nordamerika.

- coronata* Ait., gekrönter, ♂. t. ?

- crithmifolia* H. B. K., meerfenchelblättriger, 4. k. Mexico.

- cynapifolia* H. B. K., gleißblättriger, ♂. f. m. Cuba.

- foliosa* W., blätterreicher, ♂. f. ?

- frondosa* L., belaubter, ♂. f. Nordamerika.

- grandiflora* Balb. (*odorata* Hort.), großblumiger, ♂. f. m  
 Südamerika.

- helianthoides* H. B. K., sonnenblumenähnlich, ♂. f. Mexico.

- heterophylla* Ortega., verschiedenblättriger, 4. k. Mexico.

- hirtella* H. B. K., kurzhaariger, ♂. f. Mexico.

- leucantha* W., weißblumiger, ♂. f. m. Ost- u. Westindien.

- luxurians* W., üppiger, ♂. k. Mexico.

- macrosperma* Fisch., großsamiger, 4. f. Sibirien.

- nodiflora* L., knotenblumiger, ♂. m. f. Ostindien.

- odorata* Cav., wohlriechender, ♂. f. Mexico.

- parviflora* W., kleinblumiger, ♂. f. Sibirien.

- pilosa* L., haariger, ♂. f. Nordamerika, Westindien.

- procera* D. Don, hoher, 4. k. Mexico.

- procumbens* H. B. K., niederliegender, 4. f. Mexico.

- reflexa* Lk., zurückgebogener, ♂. k. t. Mexico.

- repens* D. Don, kriechender, 4. k. Nepal.

- sambucifolia* Cav., fliederblättriger, 4. k. Mexico.

- serrulata* Ait., sägezahniger, ♂. t. ?

- striata* Schott., gestreifter, ♂. f. Mexico.

- tripartita* L., dreitheiliger, ♂. f. Europa.

- arborea* Roxb. v. *Petrobium arboreum*. *nivea* L. v. *Me-*  
*lananthera hastata*. *scandens* L. v. *Salmea scandens*.

**Bifora** Hoffm. (*Biforis* Spgl.), Doppelkorn, V. II., Umbelliferae.

- radians* MB., strahlendes, ♂. f. Südeuropa, Taurien.

- testiculata* DC. (*flosculosa* MB.), gleichblumiges, ♂. f.  
 Südeuropa.

**Bifrenaria** Lindl., Doppelstendel, XX. I., Orchideae.

- aurantiaca* Lindl., orangefarbiger, 4. w. Demerara.

- longicornis* Lindl., langsporniger, 4. w. ?

**Bigelovia** Spgl. (*Borrera Meyer* DC.) (Prof. Bigelow in  
 Boston) IV. I., Rubiaceae.

- commutata* Spgl., verwechselte, 4. w. Westindien.

- cornifolia* (Fisch. DC.), cornusblättrige, ♂. f. m. Brasil.

**Bigelovia**

*parviflora* Spgl., kleinblumige, ☉. f. k. Südamerika.

*stricta* Spgl., steife, ♂. w. Ostindien.

*tenera* (DC.), zarte, ☉. f. m. Brasilien.

*tenuis* (DC.), dünne, ☉. f. m. Brasilien.

*vaginata* Spgl., scheidige, ♀. w. Hispaniola.

*verticillata* Spgl., wirtelförmige, ♀. w. Guinea, Jamaica.

**Bignonia** T. (Abbé Bignon, Bibliothekar Ludwig's des XIV.), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

*adenophylla* Wall., drüsenblättrige, ♀. w. Ostindien.

*aequinoctialis* L., cajennische, ♀. Sch. w. Guiana.

*aesculifolia* H. B. K., rofskastanienblättrige, ♀. w. Mexico.

*alliacea* Lam., knoblauchduftende, ♀. Sch. w. Guiana.

*amoena* Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

*apurensis* H. B. K., apurische, ♀. Sch. w. Südamerika.

*bijuga* Vahl, zweipaarige, ♀. w. Madagascar.

*candicans* Rich., weißliche, ♀. Sch. w. Cayenne.

*capreolata* L., rankende, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

*Chamberlaynii* B. Reg., Chamberlayn's, ♀. Sch. w. Brasil.

*chelonoides* L., schildblumenähnliche, ♀. w. Ostindien.

*Chica* Humb., Chica-B., ♀. Sch. Südamerika.

*chrysantha* Jacq., goldblumige, ♀. w. Caracas.

*chrysoleuca* Bonpl., gelbweißse, ♀. Sch. w. Südamerika.

*Clematis* H. B. K., Waldreben-B., ♀. Sch. w. Caracas.

*crenata* Lod. C., gekerbte, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

*crucigera*, L., kreuzblättrige, ♀. Sch. w. t. Virginien, Westindien.

*decipiens* Lod. C., täuschende, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

*digitata* H. angl. Lk. E., fingerförmige, ♀. Sch. w. ?

*diversifolia* H. B. K., andersblättrige, ♀. Sch. w. Mexico.

*elongata* Vahl, verlängerte, ♀. Sch. w. Südamerika.

*floribunda* H. B. K., blüthenreiche, ♀. Sch. w. Mexico.

*fluviatilis* Aubl., Fluß-B., ♀. w. Guiana.

*gracilis* Lod., schlanke, ♀. Sch. w. Südamerika.

*grandifolia* Jacq., großblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

*heterophylla* W. (*Cherere* Aubl.), verschiedenblättrige, ♀. Sch. w. Guiana.

*jasminifolia* H. B. K., jasminblätt., ♀. Sch. w. Südamerika.

*jasminoides* Cunn., jasminähnliche, ♀. Sch. t. Neuholl.

*incarnata* Aubl., fleischfarbige, ♀. Sch. w. Guiana.

*lactiflora* Vahl, milchweißblumige, ♀. Sch. w. Caraib. Ins.

*latifolia* Rich., breitblättrige, ♀. Sch. w. Cayenne.

*laurifolia* Vahl, lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Cayenne.

*Leucoxydon* L., Weißholz-B., ♀. w. Jamaica.

*litoralis* H. B. K., Seestrands-B., ♀. Sch. w. Mexico.

*mollis* Vahl, weiche, ♀. Sch. w. Cayenne.

*mollissima* H. B. K., weichblättrige, ♀. Sch. w. Caracas.

*multifida* Lod. Cat., vieltheilige, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

*pallida* Lindl., blaßblumige, ♀. Sch. w. Westindien.

*picta* H. B. K., bemalte, ♀. Sch. w. Südamerika.

*pubescens* L., weichhaarige, ♀. Sch. w. Neuspanien.

*purpurea* Lodd., purpurfarbige, ♀. w. Südamerika.

*rigescens* Jacq., starre, ♀. w. Caracas.

*salicifolia* H. B. K., weidenblättrige, ♀. Sch. w. Südamer.

*serratifolia* Vahl, sägeblättrige, ♀. w. Caraib. Inseln.

*serrulata* Wal., feinsägige, ♀. w. Ostindien.

*spectabilis* Vahl, ansehnliche, ♀. Sch. w. Westindien.

*spicata* Lock., ährenförmige, ♀. Sch. w. Trinidad.

*staminea* Lam., langfadige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

*suberosa* Roxb., korkige, ♀. Sch. w. Ostindien,



**Bignonia**

- triphylla L., dreiblättrige, ♂. w. Mexico.  
 Unguis L., klauenförmige, ♂. Sch. w. Westindien.  
 variabilis Jacq., veränderliche, ♂. Sch. w. Caracas.  
 venusta Ker, anmuthige, ♂. Sch. w. Brasilien.  
 viridiflora Lod., grünblumige, ♂. Sch. w. Südamerika.  
   *alba* Aubl., *brasiliانا* Lam., *coerulea* L., *echinata*  
   L. etc. vid. *Jacaranda alba* etc. *linearis* Cav. vid.  
 Chilopsis salign. *paniculata* W. vid. *Amphilobium*  
*panicul. radicans* L. etc. v. *Tecoma radicans* etc.  
*sempervirens* L. v. *Gelsemium semperv.* *tomentosa*  
 Thbg. v. *Incarvillea toment.* *uncata* Sims etc. vid.  
*Spathodea uncata* etc.

**Billardiera** Sm. (J. J. LaBillardière, berühmter französischer Botaniker), V. 1., Pittosporaeae.

- angustifolia* DC., schmalblättrige, ♂. Sch. t. Neuholl.  
*longiflora* La Bill., langblumige, ♂. Sch. t. Van-Diem. L.  
*mutabilis* Salisb., veränderliche, ♂. Sch. t. Neusüdwallis.  
*ovalis* Lindl., eiförmige, ♂. Sch. t. Van-Diemen's Land.  
*parviflora* DC., kleinblumige, ♂. Sch. t. Neuholland.  
*fusiformis* La Bill. v. *Sollya angustifolia*.

**Billbergia** Thbg. (J. G. Billberg, schwedischer Botaniker), VI. 1., Bromeliaceae.

- amoena* Lindl., liebliche, 4. w. Südamerika.  
*bicolor* Lod., zweifarbige, 4. w. Rio Janeiro.  
*clavata* Lind., (*melanantha* Ker.), keulenförmige, 4. w. Trinidad.  
*cruenta* Hook, blutrothe, 4. w. Rio Janeiro.  
*fasciata* Bot. reg., bandförmige, 4. w. Rio Janeiro.  
*iridifolia* Bot. reg., schwertelblättrige, 4. w. Rio Janeiro.  
*nudicaulis* Lindl., nacktstengelige, 4. w. Trinidad.  
*purpureo-rosea* Hook, purpurrosafarbige, 4. w. Brasilien.  
*pyramidalis* Lindl., pyramidalische, 4. w. Rio Janeiro.  
*zebrina* Lindl., gescheckte, 4. w. Südamerika.

**Billotia** Coll. (*Baudinia* Lesch.), (Madame Teophila Billoti zu Turin), XVIII. 11., Myrtaceae.

- acerosa* Coll., nadelblättrige, ♂. t. Neuholland.

**Biophytum** DC., Wunderklee, X. v., Oxalideae.

- sensitivum* DC., empfindsamer, ☉. m. f. China.

**Biscutella** L., Brillenschote (Doppelschild), XV. 11., Cruciferae.

- apula* L., apulische, ☉. f. Südl. Italien, Griechenland.  
*auriculata* L., geöhrt, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.  
   β) *erigerifolia* DC.  
*cichoriifolia* Lois. (*picridifol.* Lapey.), cichorienblättrige,  
 ♂. 4. f. b. k. Pyrenäen.  
*ciliata* DC. (*coronopifolia* et *didyma* W.), gefranzte, ☉.  
 f. Südeuropa.

- Columnae* Ten., *Columna's*, ☉. f. Süditalien.

β) *microcarpa* DC.

- coronopifolia* L., krähensfußblättrige, 4. f. Südeuropa.  
*depressa* W., niedergedrückte, ☉. f. Aegypten.  
*eriocarpa* DC., wollfrüchtige, ☉. f. Mauritanien.  
*hispida* DC., hackerige, ☉. f. Südfrankreich, Italien.  
*laevigata* L., glatte, 4. f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.

β) *alpestris* Kit. γ) *obcordata* Rchb.

- lucida* DC. (*subspatulata* Lam.), glänzende, 4. f. b. Neapel.

- lyrata* L., leierförmige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.  
*maritima* Tenor., Seestrands-B., ☉. f. Neapel.

**Biscutella**

*montana* Cav., Berg-B., 4. f. b. k. Südspanien.

β) *ovata* DC.

*raphanifolia* Poir., rettigblättrige, ☉. f. Sicil., Mauritan.  
*saxatilis* DC., Felsen-B., 4. f. Südeuropa.

*sempervirens* L., immergrüne, 4. k. Westeuropa.

? *stenophylla* Dsf., schmalblättrige, 4. f. b. k. Spanien.

*ambigua* DC. v. *coronopifolia*. *didyma* β. L. v. *Columnae*. *intermedia* Gouan. *leiocarpa* DC. v. *raphanifol.* *longifol.* Vill. (et *subspatulata* Sut.) v. *saxatilis*. *megalocarpa* Fisch. v. *Megacarpaea laciniata*.

**Biserrula** L., Sägekraut, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*pelecinus* L., gemeines, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Bivonaea** DC. (A. Bivoni Bernardi, italienischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

*lutea* DC., gelbe, ☉. f. Sicilien.

**Bixa** L., Orleanbaum, XIII. I., Bixaceae.

*Orellana* L., gemeiner, ♀. w. Westindien.

*purpurea* Hort., purpurfarbiger, ♀. w. Ostindien.

*Urucurana* W., Uruca-O., ♀. w. Brasilien.

**Blackwellia** Commers. (Elisab. Blackwell, botanische Malerin), XI. v., Amygdaleae-Homalineae.

*axillaris* Lam., achselblumige, ♀. w. Madagascar.

*cerasifolia* Vent., kirschblättrige, ♀. N. Madagascar.

*glauca* Vent., blaugrüne, ♀. w. Mascarenas.

*grandiflora* Lindl., großblumige, ♀. t. China.

*padifolia* Lindl., traubenkirschenblättrige, ♀. t. Chili.

*paniculata* Lam., rispige, ♀. t. Mascarenas.

*spiralis* Wall., spiralförmige, ♀. t. Mascarenas.

**Blairia** L. (P. Blair, engl. Naturf.), IV. I., Ericaceae.

*articulata* L., gegliederte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*ciliaris* L., gefranzte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*depressa* Lichtenst., niedergedrückte, ♀. t. C. d. g. H.

*dumosa* Wendl., heckige, ♀. t. Cap d. g. H.

*ericoides* L., heideähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

*fasciculata* W., büschelförmige, ♀. t. Cap d. g. H.

*glabella* Wendl., glatte, ♀. t. Cap d. g. H.

*muscosa* Ait., moosähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

*paucifolia* Wendl., wenigblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

*purpurea* L., purpurfarbige, ♀. t. Cap d. g. H.

*scabra* W., scharfe, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*bracteata* Wendl. v. *Sympieza capitellata*. ? *hirsuta* Lichtenst. v. *fasciculata*.

**Blakea** P. Br. (M. Blake, englischer Gelehrter), X. I., Lythriariae-Malastomeae.

*quinquenervia* Aubl., fünfnervige, ♀. w. Guiana.

*trinervia* L., suppl., dreinervige, ♀. w. Jamaica.

**Blandfordia** Sm. (Georg Marq. v. Blandford), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*grandiflora* RB., großblumige, 4. t. Neusüdwallis.

*nobilis* Sm., edle, 4. t. Neusüdwallis.

**Blandfordia cordata** Andr. v. *Galax aphylla*.

**Blechnum** L., Rippenfarn, XXIV. I., Pterioideae. (*Polypodiaceae*).

*angustifolium* W., schmalblättriger, 4. w. Guiana, Bras.

*australe* L., südlicher, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

*brasiliense* Desv., brasilianischer, 4. w. Brasilien.

*cartilagineum* Sw., knorpeliger, 4. w. Neuholland.

*glandulosum* Lk., drüsiger, 4. w. Brasilien.

**Blechnum**

- gracile Kaulf., schlanker, 4. w. Brasilien.  
 hastatum Kaulf., spontonförmiger, 4. w. Chili.  
 laevigatum Cav., glatter, 4. w. Neuholland.  
 Lanceola Sw., lanzettblättriger, 4. w. Brasilien.  
 ?  $\beta$ ) lanceolatum Radd.  
 longifolium Humb., langblättriger, 4. w. Neugranada.  
 occidentale L., abendländischer, 4. w. Westindien, Philippinen.  
 pectinatum Presl, kammförmiger, 4. w. Marianeninsel.  
 polypodioides Radd., tüpfelfarnähnlicher, 4. w. Brasil.  
 serrulatum Mchx., feinsägiger, 4. t. k. f. b. Florida.  
 striatum RB., gestreifter, 4. w. Neuholl., Neucaled.  
*calophyllum* Langsd. et Fisch. v. angustifol. *corcovadense* Radd. v. brasiliense. *stamineum* La Bill.  
 vid. striatum. Hinsichtlich der übrigen s. Lomaria und Woodwardia.

**Blechnum** Juss., Blechnum, XIV. II., Acanthaceae.

- angustifolium RB., schmalblättriges, 4. w. Westindien.  
 brasiliense Lod. C., brasilianisches, 4. w. Brasilien.  
 Brownei Juss., Brown's, 4. w. Jamaica.  
 laxiflorum Juss., lockerblumiges, 4. w. Jamaica.

**Blepharis** Juss., Doppelkelch, XIV. II., Acanthaceae.

- boerhaaviaefolia P., boerhaaviablättriger,  $\odot$ . w. f. m. Ostindien.

- capensis P., capischer,  $\sigma$ . k. Cap d. g. Hoffn.  
 edulis P., genießbarer,  $\mathfrak{f}$ . t. Persien, Arabien.  
 furcata P., gabeliger,  $\mathfrak{f}$ . t. Cap d. g. Hoffn.  
 linariaefolia P., leinkrautblättriger,  $\odot$ . w. Senegambien.  
 molluginifolia P., weichlingblättriger,  $\odot$ . 4. w. Ostind.  
 procumbens P., niederliegender,  $\mathfrak{f}$ . t. Cap d. g. H.  
 saturejaefolia P., satureiblättriger,  $\odot$ . f. m. C. d. g. H.

**Blephilia ciliata** et **hirsuta** Rafin. v. **Monarda ciliata** etc.**Bletia** R. et P. (Louis Blet, spanischer Apotheker u. Botaniker), XX. I. Orchideae.

- acutipetala Hook, spitzblumige, 4. Kn. w. t. Südcarolina.  
 capitata RB., kopfförmige, 4. Kn. w. Westindien.  
 florida RB., blüthenreiche, 4. Kn. w. Westindien.  
 gracilis Lod., schlanke, 4. w. Mexico.  
 guineensis G. Don, guineische, 4. Kn. w. Sierra Leone.  
 havannensis Booth, Havanna-B., 4. Kn. w. Havanna.  
 hyacinthina RB., hyacinthenähnliche, 4. Kn. w. China,  
 pallida Lod., bleiche, 4. Kn. w. Westindien.  
 patula Hook, ausgebreitete, 4. Kn. St. Domingo.  
 reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. Kn. w. Mexico.  
 speciosa H. B. K., prächtige, 4. Kn. w. Mexico.  
 Tankervilliae RB., Tankervillie's, 4. Kn. w. China, Cochinchina.

- verecunda RB., schamhafte, 4. Kn. w. Florida, Westind.  
 $\beta$ ) **Shepherdii** Hook: Jamaica.

- Woodfordii** Hook., Woodford's, 4. w. Trinidad.

**Blighia** König, (Bligh, englischer Capitain), VIII. I., Sapindaceae.

- sapida König, wohlschmeckende,  $\mathfrak{f}$ . w. Guinea.

**Blitum** L., Erdbeerspinat, I. II., Aizoideae-Atripliceae.

- capitatum L., kopfförmiger,  $\odot$ . f. Südeuropa.  
 chenopodioides Lam. (*petiolare* Lk.), gänsefußähnlicher,  $\odot$ . f. Tatarei.  
 maritimum Nutt., Seestrands-E.,  $\odot$ . f. Nordamerika.



**Blitum**

*virgatum* L., ruthenförmiger, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.  
*Bonus Henricus* C. A. Meyer. *glaucum* Koch. *rubrum* Rchb. v. Chenopod. Bonus Hen. etc.

**Blumea** DC. (C. L. Blume, niederländischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*longifolia* L., langblättrige, ☉. 4. t. Ostindien.

**Blumenbachia** Schrad. (J. F. Blumenbach, berühmter deutscher Naturforscher), XVIII. II., Loasaceae.

*insignis* Schrad., ausgezeichnete, ☉. 5. w. Chili.  
*multifida* Hook, vieltheilige, ☉. w. Buenos-Ayres.

**Blysmus** Panz., Quellenriet, III. I., Cyperaceae.

*compressus* Panz., plattes, 4. f. Deutschland.

*rufus* Lk., fuchsrothes, 4. f. Norddeutschland.

**Bobartia** L. (J. Bobart, Prof. der Botanik zu Oxford), III. I.

*aurantiaca* Zuc., orangenfarbene, 4. t. C. d. g. H.

*gladiata* Swt., schwertförmige, 4. t. Cap d. g. H.

*spathacea* L., scheidenblüthige, 4. t. Cap d. g. H.

**Bocconia** L. (P. Boccone, sicilianischer Botaniker), X. I., Papaveraceae.

*frutescens* L., strauchige, 5. w. Westind., Südamerika.

*integrifolia* H. B. K., ganzblättrige, 5. w. Neuspanien.  
*cordata* W. v. *Macleaya cordata*.

**Boebera chrysanthemoides** etc. v. *Dyssodia chrysanthemoides etc.***Boehmeria** Jacq. (G. R. Böhrer, Prof. zu Wittenberg), XXI. IV., Urticaceae.

*castaneaefolia* Cunn., kastanienblättrige, 5. w. Norfolk.

*caudata* Sw., geschwänzte, 5. w. Jamaica.

*cylindrica* W., cylinderförmige, 4. f. Virginien.

*elongata* Fisch., verlängerte, ☉. m. f. Brasilien.

*frondosa* D. Don, belaubte, 5. t. Neapel.

*frutescens* Thbg., strauchige, 5. t. Japan, Nepal.

*hirta* Sw., kurzhaarige, 5. w. Jamaica.

*interrupta* W., unterbrochene, 4. w. Ostindien.

*lateriflora* Mühlenb., seitenblumige, 4. f. Nordamerika.

*macrophylla* D. Don, großblättrige, 5. t. Nepal.

*platyphylla* D. Don, breitblättrige, 5. t. Nepal.

*ramiflora* Jacq., astblumige, 5. w. Westindien.

*rotundifolia* D. Don, rundblättrige, 4. t. Nepal.

*rubescens* Jacq., röthliche, 5. t. k. Canar. Inseln.

*salicifolia* D. Don, weidenblättrige, 4. k. f. b. Nepal.

*urticaefolia* Spgl. v. *Parietaria urticaefol.*

**Boenninghausenia** Rchb. (v. Bönninghausen, Regierungsrath zu Münster), X. I., Tricoccae-Rutaceae.

*albiflora* Rchb., weißblumige, 5. t. Nepal.

**Boerhaavia** L. (H. Boerhaave, berühmter holländischer Arzt u. Botaniker), II. I., Nyctagineae.

*discolor* H. B. K., verschiedenfarbige. 4. w. Südamer.

*erecta* L., aufrechte, 4. w. Westindien.

*excelsa* W., hohe, 5. w. Südamerika.

*hirsuta* L., rauhhaarige, 4. 5. w. Westind., mittägl. Amer.

*mutabilis* Ait., veränderliche. 4. t. Neuholland.

*plumbaginea* Cav., bleiwurzähnliche, 4. t. k. Spanien.

*procumbens* Roxb., niederliegende, 4. w. Ostindien.

*scandens* L., kletternde, 5. Sch. w. Westindien.

*viscosa* Lagasc., schmierige, 4. w. Peru.

*diffusa* W. v. *hirsuta*.

- Boldoa** Cav. (D. Boldo, span. Botan.), III. I., Nyctagineae.  
*lanceolata* Lagasc., lanzettblättrige, ♀. w. Neuspanien.  
*purpurascens* Cav., purpurfarbige, 4. w. Cuba.
- Boleum** Desv., *Boleum*, XV. II., Cruciferae.  
*asperum* Desv., rauhes, ♀. 4. k. Spanien.
- Bolivaria** Schlechtd. (Bolivar, Befreier Südamerika's),  
 II. I., Jasmineae.  
*trifida* Schlechtd., dreitheilige, ♀. w. Chili.
- Boltonia** L'Her. (J. B. Bolton, englischer Botaniker),  
 XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*asteroides* L'Her., sternblumenähnliche, 4. f. Nordamer.  
*glastifolia* L'Her., glatthblättrige, 4. f. Nordamerika.
- Bombax** L., Wollblume, XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.  
*Ceiba* L., fünfblättrige, ♀. w. Westindien.  
*globosum* Aubl., kugelfrüchtige, ♀. w. Cayenne.  
*malabaricum* DC., malabarische, ♀. w. Ostindien.  
*septenatum* Jacq., siebenblättrige, ♀. w. Neugranada.  
*heptaphyllum* L. v. *septenatum*. *heptaphyllum* Roxb.  
 v. *malabaricum*. *quinatum* Jacq. vid. *Ceiba*. Hin-  
 sichtlich der übrigen s. die Gattungen *Cochlospermum* et *Eriodendron*.
- Bonatea** W. (Bonato, Prof. der Botanik zu Padua),  
 XX. I., Orchideae.  
*speciosa* W., prächtige, 4. w. Cap d. g. H.
- Bongardia** C. A. Mey. (von Bongard, k. rufsischer Staatsrath u. Botaniker), VI. I., Berberideae.  
*Rauwolfii* C. A. Mey., Rauwolf's, 4. Kn. f. Griechenland, Kleinasien.
- Bonnaya** Lk., *Bonnaya* II. I., Personatae-Antirrhineae  
*brachiata* L., armförmige, ☉. w. Brasilien.  
*reptans* Spgl., kriechende, 4. w. Ostindien.  
*veronicaefolia* Spgl., ehrenpreisblättrige, ♂. w. Ostind.
- Bonnetia meridionalis** Sw. (*palustris* Vahl) vid. *Mahurea*  
*palustris*. *racemosa* Sw. v. *Mahurea speciosa*.
- Bonplandia** Cav. (A. Bonpland, berühmter französischer Botaniker u. Reisender), V. I., Acanthaceae.  
*geminiflora* Cav., doppelblumige, ♂. 4. w. Neuspanien.
- Bontia** L. (J. Bontius, Arzt zu Batavia), XIV. II., Globulariaceae (*Myoporinae*).  
*daphnoides* L., seidelbastähnliche, ♀. w. Ostindien.
- Boothia** Dougl. v. *Platystemon*.
- Borassus** L., Weinpalme, XXII. VI., Palmae.  
*flabelliformis* L., fächerförmige, ♀. w. Ostindien.
- Borbonia** L. (Gaston de Bourbon, Sohn Heinrich IV. von Frankreich), XVII. IV. (VI.), (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*barbata* Lam., härtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*ciliata* W., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*cordata* L., herzförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*crenata* L., gekerbte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*lanceolata* L., lanzettblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*ruscifolia* Ker, mäusedornblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*trinervia* L., dreinervige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*undulata* Thbg., wellenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*ericaefolia* L. vid. *Priestleya ericaefol.* *perfoliata*  
 Thbg. v. *Vascoa perfoliat.*
- Borkausia** Auctor v. *Barkhausia*.

**Boronia** Sm. (F. Borone, Begleiter von Sibthorp), VIII.

I., Tricoccae-Rutaceae.

*alata* Sm., geflügelte, ♀. t. Neuholland.*anemonefolia* Cunn., windblumenblättrige, ♀. t. Neuholl.*crenulata* Sm., gekerbte, ♀. t. Neuholland.*denticulata* Sm., gezähnelte, ♀. t. Neuholland.*ledifolia* Gay, borstblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*paradoxa* DC., wunderbare, ♀. t. Neuholland.*pilonema* La Bill., weichhaarige, ♀. t. Südl. Neuholl.*pinnata* Sm., gefiederte, ♀. t. Neusüdwallis.*polygalaefolia* Sm., kreuzblumenblättrige, ♀. t. Neuholl.*serrulata* Sm., sägezahnige, ♀. t. Neuholland.*tetrandra* La Bill., viermännige, ♀. t. Westl. Neuholl.**Borrigo** T., Borretsch, V. I., Asperifoliaceae.*crassifolia* Vent., dickblättriger, 4. k. Persien.*cretica* W., cretischer, 4. k. Creta.*laxiflora* Hornem., lockerblumiger, ♂. f. k. Corsica.*longifolia* Desv., langblättriger, ♂. f. Nordafrika.*officinalis* L., officineller, ♂. f. Kleinasien, Europa.β) *albiflora*.*orientalis* L., morgenländischer, 4. k. Türkei.**Borrera** G. F. W. Meyer v. Bigelovia.**Borya** W. (Bory de St. Vincent, berühmter franz. Naturforscher), XXII. II., Tricoccae-Euphorbiaceae.*acuminata* W., zugespitzte, ♀. k. Carolina, Georgien.*ligustrina* W., rheinweidenblättrige, ♀. k. Nordamerika.*nitida* W., glänzende, ♀. k. Nordamerika.*porulosa* W., poröse, ♀. k. Florida.*prinoides* W., winterbeerenähnliche, ♀. k. Nordamerika.*retusa* W., eingedrückte, ♀. k. Nordamerika.**Boscia** Lam. (J. Bosc, franz. Botan.), XI. I., Capparideae.*senegalensis* Lam., senegambische, ♀. w. Senegambien.**Bosea** L. (E. G. Bose, Prof. zu Leipzig), V. II., Aizoideae - Phytolacceae.*Yervamora* L., Goldruthen-B., ♀. k. Canarische Inseln.**Bossiaea** Vent. (Boissieu-Lamartinière, Begleiter von La Peyrouse), XVII. IV. (VI.), XVI. VI., Leguminosae-Papilionaceae.*buxifolia* Cunn., buchsbaumblättrige, ♀. t. Neuholl.*cinerea* RB., aschgraue, ♀. t. Neuholland.*cordifolia* Swt., herzblättrige, ♀. t. Neuholland.*ensata* Sbr., schwertförmige, ♀. t. Neuholland.*eriocarpa* Benth., wollfrüchtige, ♀. t. Neuholland.*foliosa* Cunn., blattreiche, ♀. t. Neuholland.*heterophylla* Sm., verschiedenblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*lenticularis* Sbr., linsenförmige, ♀. t. Neuholland.*linophylla* RB., leinblättrige, ♀. t. Neuholland.*microphylla* RB., kleinblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*prostrata* RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.*rhombifolia* Sieb., rautenförmige, ♀. t. Neuholland.*rotundifolia* DC., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.*rufa* RB., fuchsrothe, ♀. t. Neuholland.*Scolopendrium* RB., hirschezungenblättrige, ♀. t. Neuholl.*lanceolata* Sims v. *heterophylla*.**Boswellia** Roxb. (Colebr.), (Dr. John Boswell zu Edinburgh), X. I., Amyrideae.*glabra* Roxb., kahle, ♀. w. Coromandel.*serrata* Stackh., sägezahnige, ♀. w. Ostindien.**Botryadenia Gmelini** Fisch. et Mey. v. *Myriactis Gmelini*.



- Botryceras** W., Traubenhorn, IV. I., Aquifoliaceae.  
*laurinum* W., lorbeerblättriges, ♀. t. Neuholland.
- Botrychium** Sw., Traubenfarn, XXIV. I., Osmundaceae.  
*australe* RB., südlicher, 4. t. w. Neuholland.  
*dissectum* Spgl., schlitzblättriger, 4. f. k. Nordamer.  
*fumarioides* W. (*Fumariae* Spgl.), erdrauchähnlicher, 4. k. t. Carolina.  
*Lunaria* Sw., Mondrauten-T., 4. f. Europa, Nordasien.  
 β) *rutaceum* Sw.  
*Matricariae* Spgl. (*matricarioides* W.), mutterkrautähnlicher, 4. f. Europa.  
*virginicum* Sw., virginischer, 4. f. Nordamerika.
- Bothryspermum** Bunge, Traubensamen, V. I., Asperifoliaceae.  
*bicarunculatum* Bung., zweiwarziger, ♂. f. Nordchina.  
*chinense* Bung., chinesischer, ☉. f. China.  
*tenellum* F. et Mey., zarter, ☉. f. China, Ostindien.
- Botrophis actaeoides** Rafin. v. Cimicifuga Serpent.
- Boussingaultia** H. B. K. (J. B. Boussingault, französischer Naturforscher), V. I., Aizoideae-Phytolacceae.  
*baselloides* H. B. K., beerblumenähnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Bouvardia** Salisb. (Dr. Bouvard, französischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.  
*Jacquini* H. B. K. (*triphylla* Sal.), Jacquin's, ♀. k. t. Mexico.  
 β) *glabra*. γ) *pubescens*.  
*longiflora* H. B. K., langblumige, ♀. t. Mexico.  
*versicolor* Ker, buntfarbige, ♀. k. t. Südamerika.
- Bowiea** Haw. v. Aloe.
- Bowlesia** R. et P. (W. Bowles, ireländischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.  
*tenera* Spgl., zarte, ☉. f. Monte Video.
- Brabejum** L., Scepterblume, IV. I. (XXIII. I.), Proteaceae.  
*stellatum* Thbg. (*stellatifolium* L.), sternförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Brachycome** F. et Mey., Kurzschopf, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*diversifolia* Fisch. et M., verschiedenblättriger, 4. t. Neuholland.
- Brachyglottis** Forst., Kurzstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*repanda* Forst., ausgeschweifert, ♀. t. Neuzeeland.
- Brachylaena** RB., Kurzhülle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*neriifolia* RB., oleanderblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
- Brachypodium** P. B., Zwenke, III. II., Gramineae.  
*brevisetum* R. et S., kurzborstige, ☉. f. ?  
*distachyum* R. et S., zweiährige, ☉. f. Südeuropa, Nordafr.  
*genuense* R. et S., genuesische, 4. f. Genua.  
*longifolium* R. et S., langblättrige, 4. f. k. Spanien, Nordafr.  
*mexicanum* Lk., mexikanische, ☉. f. Mexico.  
*obtusifolium* Lk., stumpfblättrige, 4. f. k. Spanien.  
*phoenicoides* R. et S., schwingelähnliche, 4. f. Südfrankr.  
*pinnatum* P. B., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.  
 β) *caespitosum*. γ) *rupestre* R. et S.  
*ramosum* R. et S. (*Plukenetii* Lk.), ästige, 4. f. Südeuropa, Orient, Nordafrika.  
*rigidum* Lk. (*asperum* R. et S., starre, ☉. f. Spanien.  
*strigosum* R. et S., striegelige, 4. f. Taurien.

**Brachypodium**

*sylvaticum* R. et S., Wald-Z., 4. f. Europa, Caucasus.  
*Tenorianum* R. et S., Tenore's, 4. f. Neapel.

*Hosti* Lk. vid. *ramosum*. Hinsichtlich der übrigen  
 s. die Gattungen *Brizopyrum*, *Catapodium*, *Festuca*  
 (*Nardurus*), *Sclerochloa*.

**Brachysema** RB., Kurzfahne, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*latifolium* RB., breitblättrige, ⚥. Sch. t. Neuholland.  
*undulatum* Ker, wellenblättrige, ⚥. Sch. t. Neusüdwallis.

**Brachystelma** RB., Kurzkrone, V. 11., Asclepiadeae.

*crispum* Grah., krause, 4. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.  
*tuberosum* RB., knollige, 4. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.

*Bradleya nitida* Roxb. et *sinica* G. v. *Glochidion nitid.* etc.

**Brassavolea** RB. (A. M. *Brassavola*, italienischer Botaniker), XX. 1., Orchideae.

*angustata* Lindl., verschmälerte, 4. w. Demerara.  
*cordata* Lindl., herzlippige, 4. w. Brasilien.  
*cucullata* RB., kappenförmige, 4. w. Westindien.  
*grandiflora* Lindl., großblumige, 4. w. Honduras.  
*Martiana* Lindl., Martius's, 4. w. Brasilien.  
*nodosa* Lindl., knotige, 4. w. Mexico.  
*Perrinii* Lindl., Perrin's, 4. w. Brasilien.

*Brassenia peltata* Pursh v. *Hydropeltis purpurea*.

**Brassia** R. B. (Wilh. Brafs, Pflanzensammler auf der Westküste von Afrika), XX. 1., Orchideae.

*caudata* Lindl., geschwänzte, 4. w. Westindien.  
*cochleata* K. et W., schneckenförmige, 4. w. Demerara.  
*Lanceana* Lindl., Lance's, 4. w. Surinam.  
*maculata* RB., gefleckte, 4. w. Jamaica.  
*macrostachya* Lindl., großährige, 4. w. Demerara.

**Brassica** T., Kohl, XV. 111., Cruciferae.

*balearica* P., balearischer, 4. k. Minorca.  
*bracteolata* Fisch. et Mey., deckblättrig., ☉. f. Aegypt., Arab.  
*Cheiranthus* Vill. (*cheiranthiflora* DC.) lackblumiger, ♂.  
 f. Süd- und Westeuropa.

*chinensis* L., chinesischer, ♂. f. China.

*elongata* Ehr., verlängerter, ♂. f. Ungarn.

*Erucastrum* L., Rauken-K., ☉. f. Südeuropa.

*fruticulosa* Cyril., strauchiger, 4. ⚥. f. k. Italien.

*Gravinae* Tenor, Gravina's, 4. f. k. Neapel.

*Heleniana* Burch., St. Helena-K., ♂. k. t. St. Helena.

*humilis* DC., Zwerg-K., ♂. f. Südfrankreich.

*hybrida* Tenor., Bastard-K., ⚥. ♂. f. k. Neapel.

*incana* Tenor., weißgrauer, ⚥. ♂. f. k. Neapel.

*laevigata* Lagasc., glatter, ☉. f. Spanien.

*monensis* Huds., schottischer, ☉. f. Schottland.

*montana* Rafin., Berg-K., ⚥. 4. f. k. Sicilien.

*Napus* L., Rübsen-K., ⚥. ♂. f. England, Belgien.

α) oleifera. β) annua. γ) esculenta. b) alba.

c) flava. d) nigricans.

*nigra* Koch, schwarzer, ☉. f. Süddeutschl., Schweiz.

*oleracea* L., gemeiner, ♂. f. England, Griechenland.

α) capitata. β) rubra. γ) botrytis. δ) sabauda.

ε) sabellica. ζ) gemmifera. η) viridis. θ) crispa.

(*laciniata*). ι) selenisia. κ) exaltata. λ) caulorapa etc.

*pinnatifida* Dsf., fiederspaltiger, ♂. f. k. Spanien.

*Pseudo-erucastrum* Brot., unächter K., ☉. f. Westeuropa.

*Rapa* L., Rüben-K., ☉. ♂. f. Europa.

**Brassica**

*a)* campestris L. *β)* oleifera Metzg. *γ)* annua Metzg. (*praecox* W. K.).

repanda DC., ausgeschweifert, 4. f. Süd- u. Westfrankr.  
Richerii Vill., Richeri's, 4. f. Süd-u. Westfrankr., Oberital.  
Sabularia Brot., Sand-K., ☉. f. Westeuropa.

Tournefortii Gouan, Tournefort's, ☉. f. Spanien, Aegypt.  
valentina DC., valentinischer, ☉. f. Spanien.

villosa Bivon., zottiger, ♂. 4. k. f. b. Sicilien.

*β)* glabrata.

violacea L., violetter, ☉. ♂. f. China.

*alpina* L. v. *Arabis brassicaeformis*. *arvensis* L. v.

*Moricandia arvensis*. *austriaca* L. (et *orientalis* L.)

vid. *Erysimum austriac.* *crassifolia* L. v. *Erucaria*

*crassifol.* *Eruca* L. v. *Eruca sativa*. ?*mesopota-*

*mica* Bernh. v. *Tournefortii*. *polymorpha* Murr. v.

*Sisymbrium junceum*. *sempervirens* Schrk. v. *Balearica*.

**Bravoa** ? Herb. Bravoa ? VI. 1., ? *Narcisseae-Amaryllideae*.  
geminiflora Llex. et La Llave, doppeltblumige, 4. Zw.  
w. Mexico.

**Braya** Stbg. et Hoppe (Graf Bray, ehem. Präsident der  
Regensburger bot. Gesellsch.), XV. 11., *Cruciferae*.

*alpina* Stbg. et Hoppe, Alpen-B., 4. f. Kärnthien.

*pilosa* Hook., haarige, 4. f. Nordamerika.

**Bremontiera** DC. (M. Bremontier, Agronom), XVII.  
1V. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

*Ammoxylon* DC., Sandholz-B., ♂. w. Mauritius.

**Brexia** Noronh., Brexie, V. 1., *Aquifoliaceae*.

*chrysophylla* Swt., goldblättrige, ♂. w. Madagascar.

*madagascariensis* Ker, madagascarische, ♂. w. Madagasc.

*spinosa* Lindl., stachelzähne, ♂. w. Madagascar.

**Bridelia** W. (Bridel Brideri, berühmter Muscolog), XVI.  
III. (XXIII. 1.), *Tricoccae-Euphorbiac.*

*montana* W., Berg-B., ♂. w. Ostindien.

*scandens* W., klimmende, ♂. Sch. w. Ostindien.

*spinosa* W., dornige, ♂. w. Ostindien.

**Brignolia** Bertol. (J. L. Brignoli, italienischer Bota-  
niker), V. 11., *Umbelliferae*.

*panacifolia* Brign., kraftwurzblättrige, 4. f. b. k. Sici-  
lien, Nordafrika.

**Briza** L., Zittergras, III. 11., *Gramineae*.

*auriculata* Trevir., geöhrt, 4. w. Chili.

*elatior* Sibth., hohes, ♂. f. Griechenland.

*geniculata* Thbg., geknietes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

*humilis* MB., niederiges, ☉. f. Griechenland, Taurien.

*maxima* L., größtes, ☉. f. Südeuropa, Cap d. g. H.

*media* L., mittleres, 4. f. Europa, Nordamerika.

*minor* L., kleines, ☉. f. Engl., Südeuropa, Asien, Afrika.

*rubra* Lam., rothes, ☉. f. Ostindien.

*virens* L., grünliches, ☉. f. Südeuropa, Kleinas., Südafr.

*capensis* Thbg. v. *Eragrostis* (Poa) *brizoides*. *Era-*

*grostis* L. vid. *Eragrost*. (Poa. *megastach.*) *spicata*

Sibth. v. *humilis*.

**Brizopyrum** Lk., Zitteraehrchen, III. 11., *Gramineae*.

*americanum* Lk., amerikanisches, 4. f. Nordamer., Chili.

*siculum* Lk., sicilianisches, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

**Brodiaea** Sm. (J. J. Brodie, schottischer Kryptogamo-  
log), III. 1., *Coronariae-Asphodeleae*.

*congesta* Sm., dichtblumige, 4. k. Nordamerika.



**Brodiaea**

*grandiflora* Sm., großblumige, 4. k. (Nordamer. (Georg.).

Hinsichtlich der übrigen s. *Leucocoryne*.

**Bromelia** L. (Olaus Bromel, schwedischer Botaniker),

VI. 1., Bromeliaceae.

*Acanga* L., *Acanga-B.*, 4. w. Brasilien,

*bracteata* Sw., deckblättrige, 4. w. Jamaica.

*chrysantha* Jacq., goldblumige, 4. w. Caracas.

*cruenta* Grah., blutrothe, 4. w. Rio Janeiro.

*discolor* Lindl., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.

*exsudans* Lod., ausschwitzende, 4. w. Westindien.

*fastuosa* Lindl., prächtige, 4. w. Mexico.

*humilis* Jacq., niedrige, 4. w. Westindien.

*Karatas* L., wilde, 4. w. Westindien.

*lingulata* L., zungenblättrige, 4. w. Westindien.

*paniculigera* Sw., rispige, 4. w. Westindien.

*Pinguin* L., *Pinguin-B.*, 4. w. Westindien.

*sessiflora* Lod. C., stiellosblumige, 4. w. Südamerika.

*sylvestris* W., Wald-B., 4. w. Brasilien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Ananassa* und *Billbergia*.

**Bromus** L., Trespe, III. 11., Gramineae.

A. Genuini (Annui).

*Alopecurus* Vahl (*contortus* Dsf.), Fuchsschwanz, T. ☉.

f. Spanien, Nordafrika.

*brachystachys* Hornung, kurzährige, ☉. ♂. f. Thüringen.

*brizaeformis* Fisch. et C. A. Mey., zittergrasähnliche,

☉. f. Nordpersien.

*commutatus* Schrad. (*simplex* Gaud.), verwechselte, ☉.

♂. f. Deutschland, Illyrien, Taurien.

*confertus* MB. (*intermedius* Gufs.), gedrängtrispige, ☉. f.

Istrien, Italien, Caucasus.

*grossus* Dsf. (DC.), dickährige, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *velutinus* Schrad.

*lanceolatus* Roth, lanzettliche, ☉. f. Am caspisch. Meere.

*lanuginosus* Poir. (*divaricatus* Rohd. Loisel.), wollige,

☉. f. Südeuropa.

*macrostachys* Dsf., großährige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

*madritensis* L. (*diandrus*) Curt.), spanische, ☉. f. Eng-

land, Süd- und Westeuropa.

β) ? *jubatus* Tenor.

*maximus* Dsf., größte, ☉. f. Nordafrika.

*mollis* L., weiche, ☉. ♂. f. Europa.

β) *conglomeratus* P.

*patulus* M. et K., ausgebreitete, ☉. f. Mittel-, Süd- u.

Osteuropa.

β) ? *parviflorus* Hort.

*racemosus* L. (*pratensis* Ehrh.), traubige, ☉. ♂. f. Europa.

*rigidus* Roth, (*rubens* Host.), starre, ☉. f. Südeuropa.

*scoparius* L., besenartige, ☉. f. Westeuropa, Nordafrika.

*secalinus* L., Getreide-T., ☉. f. Europa, Mittelasien.

β) *elongatus* Gaud.

*squarrosus* L., sparrige, ☉. f. Europa, Nordasien, Nord-

afrika.

β) *villosus* Gmel.

*sterilis* L., unfruchtbare, ☉. f. Europa.

*tectorum* L., Dach-T., ☉. f. Europa.

β) *murorum* Bernh.

*vestitus* Schrad., bekleidete, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

*wolgensis* Spgl., russische, ☉. f. Mittelrussland.

**Bromus**

**B. Ceratochloa** P. B.

*arduennensis* Kunth, ardennische, ♂ f. Ardennen.

*pendulinus* Sess., herabhängende, ☉. f. Neuspanien.

*Schraderi* Kunth. (*Cerat. pendula* Schrad.), Schrader's, ☉. f. Carolina.

*unioloides* H. B. K., spitzgrasähnliche, ☉. f. Quito.

*Willdenowii* Kunth (*Ceratoch. unioloid.* PB., *Festuca unioloid.* W.), Willdenow's, ☉. f. Carol., Montevideo.

c. *Festuceae* (perennes).

*altissimus* Pursh., hohe, 4. f. Nordamerika.

*asper* L. (*hirsutus* Curt, *hirsutissimus* Cyril., *montanus* Poll.), rauhe, 4. f. Europa.

*australis* RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

*canadensis* Mchx., canadische, 4. f. Canada.

*catharticus* Vahl, purgirende, 4. k. f. b. Chili.

*ciliatus* L., gefranzte, 4. f. Canada.

*erectus* Huds. (*agrestis* All., *angustifolius* M. B.), aufrechte, 4. f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.

β) *laxus* Hornem. (*caucasicus* Hort.), γ) *stenophyllus* Lk., (*angustifolius* Hornem., ? *glaucus* Hort.).

*giganteus* L., große, 4. f. Europa.

*inermis* L., unbewehrte, 4. f. Europa.

*longiflorus* W., langährige, 4. f. ?

*pubescens* Mühlenb., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

*purgans* L., reinigende, 4. f. Nordamerika.

*variegatus* M. B., bunte, 4. f. Ostcaucasus.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Arthrostachya*,

*Brachypodium*, *Festuca*, *Rostraria*, *Trichaeta*, *Vulpia*.

**Brongniartia** H. B. K. (Adolph Brongniart, franz. Botaniker), XVII. iv.), *Leguminosae-Caesalpinieae*.

*podalyrioides* H. B. K., *podalyrienähnliche*, ♂. t. Neuspanien.

**Brosimum** Sw., Brodnufs, I. II. (XXIII. II.), *Urticaceae*.

*Alicastrum* Sw., weichfrüchtige, ♂. w. Jamaika.

**B. Galactodendron** Auct. v. *Galactodendr. utile*.

**Broteroa** W. (P. A. Brotero, portugiesischer Botaniker), XIV. v.), *Compositae-Cynarocephalae*.

*corymbosa* W., doldentraubige, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika.

**B. Contrayerva** Spgl. (*trinervata* DC.) v. *Flaveria repanda*.

**Broughtonia** RB. (Arthur Broughton, Botaniker zu Bristol), XX. i., Ostindien.

*nitida* Herb., glänzende, 4. w. Ostindien.

*sanguinea* RB. (*coccinea* Hook), blutrothe, 4. w. Jamaica.

**Broussonetia** Vent. (Broussonet, französischer Naturforscher), XXII. iv.), *Urticaceae*.

*papyrifera* Vent., papiergebende, ♂. f. Japan, Südseeinseln.

β) *cucullata* A. B. (*navicularis* Lod. Cat., *spathulata* Hort.). γ) *fructu albo*.

*tinctoria* Kunth v. *Maclura tinctoria*.

**Browallia** L. (J. Browallius, Bischof zu Abo), XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

*demissa* L., niedrige, ☉. m. f. Südamerika.

*elata* L., höhere, ☉. m. f. Südamerika.

β) *alba*.

*elongata* Kunth (*lactea* Hortul.), verlängerte, ☉. m. f. Südamerika.

*grandiflora* Graham., großblumige, ☉. m. f. Peru.

- Brownea** Jacq. (Patrick Browne, ireländischer Botaniker u. Reisender), XVII. IV. (VI.). (XVI. VI.), Leguminosae-Caesalpiniae.  
 coccinea Jacq., scharlachfarbige, ♀. w. Westindien.  
 latifolia Jacq., breitblättrige, ♀. w. Trinidad.  
 racemosa Jacq., traubige, ♀. w. Caracas.  
 Rosa W. (*Rosa de Monte* Berg., *speciosa* Auctor), Rosen-B. ♀. w. Südamerika.
- Brownlowia** Roxb. (Lady Brownlow, A. Humes Tochter), XIII. I., Tiliaceae.  
 elata Roxb., erhabene, ♀. w. Ostindien.
- Brucea** Mill., L'Her. (J. Bruce, berühmter Reisender in Afrika), XXII. IV. (IV. I.), Zanthoxyleae.  
 ferruginea L'Her., rostfarbige, ♀. w. Abyssinien.  
 gracilis DC., schlanke, ♀. w. Ostindien.  
 sumatrana Roxb., sumatranische, ♀. w. Sumatra.  
*trichotoma* Speg. v. *Tetradium trichotom.*
- Brugmansia** P. (S. J. Brugmans, Prof. der Naturgeschichte zu Leyden), V. I., Solanaceae.  
 candida P., reinweisse, ♀. t. w. Peru.  
 sanguinea D. Don (R. et P.), *bicolor* P.), blutrothe, ♀. t. Peru.  
 suaveolens W., wohlriechende, ♀. t. w. Peru.  
 β) flava.
- Waymanni Paxt., Wayman's, ♀. w. Südamerika.
- Brünnichia** G. Banks (F. Brünnich, dänischer Naturforscher, VIII. III., Polygoneae.  
 cirrhosa G., rankende, ♀. Sch. k. f. b. Carolina, Bahamische Inseln.
- Brunfelsia** L. (Otto Brunfels, alter deutscher Botaniker), XIV. II., ?Solanaceae.  
 americana L., amerikanische, ♀. w. Westindien.  
 α) angustifolia. β) latifolia.  
 montana Lod. C., Berg-B., ♀. w. ?Südamerika.  
 undulata L., wellenblumige, ♀. w. Jamaica.  
 violacea Lod. C., violette, ♀. w. Westindien.  
*uniflora* Hort. v. *Franciscea uniflora.*
- Brunia** L. (C. Brun, der die Levante und Rußland bereiste), V. I., Corniculatae-Cunoniaceae.  
 alopecuroides Thbg., fuchsschwanzähnliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 ciliata L., gefranzte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 comosa Thbg., schopfige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 deusta Thbg., brandige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 ?elegans Dum. C., nette, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 ericoides Wendl., heideähnliche, ♀. t. C. d. g. Hoffn.  
 ?formosa Dum. C., schöne, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 fragarioides W., erdbeerähnliche, ♀. t. C. d. g. H.  
 hirsuta Lod., rauhhaarige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 laevis Thbg., glatte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 macrocephala W., großköpfige, ♀. t. Cap d. g. H.  
 nodiflora L. (*globosa* Thbg.), knotenblumige, ♀. t. C. d. gut. Hoffn.  
 plumosa Lam., federige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 squarrosa Thbg., sparrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 superba Don (*arachnoides* Wendl., *speciosa* Hort.), stolze, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 verticillata Thbg., wirtelblättrige, ♀. t. C. d. g. H.  
*abrotanoides* L. (et *lanuginosa* L.) vid. Berzelia



**Brunia**

abrot. etc. *ciliata* L. v. *Staavia cil. laxa* Thbg.  
v. *Linconia thymifol. microphylla* Thbg. vid. *Raspailia microph. paleacea* L. (et *phylicoides* Thbg.).  
v. *Berardia paleacea* etc.

**Brunonia** Sm. (Rob. Brown, berühmter englischer Botaniker), V. 1., Campanulaceae-Goodenovieae).

*australis* Sm., neuholländische, 4. t. Neuholland.

**Brunsvigia** Heist., Ker, (zu Ehren des herzoglichen Hauses Braunschweig).

*ciliaris* Ker, gefranzte, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.

*coranica* Ker, coranische, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

β) *pallida*.

*disticha* Swt., zweizeilige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

*falcata* Ker, sichelförmige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

*grandiflora* Lindl., großblumige, 4. Zw. C. d. g. H.

*Josephinae* Ker, Josephinen's, 4. Zw. w. C. d. g. H.

β) *minor* Bot. reg. γ) *stricta* Bot. mag.

*lucida* Herb., starkglänzende, 4. Zw. w. C. d. g. H.

*marginata* Ker, berandete, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

*minor* Lindl., kleine, 4. Zw. w. Cap d. gut. Hoffn.

*multiflora* Heist., Sims, vielblumige, 4. Zw. w. C. d. g. H.

*radula* Ker, raspelige, 4. Zw. w. C. d. g. Hoffn.

*striata* Ker, gestreifte, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.

*toxicaria* Ker, giftige, 4. Zw. w. C. d. g. Hoffn.

**Brya** P.Br., Sprossenstrauch, XVII. iv. (vi.). (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*Ebenus* DC., Ebenholz-Sp., f. w. Jamaica.

*leonensis* Lod., C., afrikanischer, f. w. Sierra, Leone.

**Bryobium** Lindl., Sprossenstendel, XX. i., Orchideae.

*pubescens* Lindl., weichhaariger, 4. w. Ostindien.

**Bryonia** T., Zaurrübe, XXI. x. (XVI. i.), Cucurbitaceae.

*africana* Thbg., afrikanische, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

*alba* L., gemeine, 4. Sch. f. Europa.

*cordata* Thbg., herzblättrige, 4. Sch. k. C. d. g. H.

*cretica* L., cretische, 4. Sch. f. Creta.

*dioica* L., zweihäusige, 4. Sch. f. Schweiz, Süd- und Osteuropa, Nordafrika.

*dissecta* L. (*africana* L.), feinschlitzige, 4. Sch. C. d. g. H.

*epigaea* W., bodenblumige, 4. Sch. w. Ostindien.

*ficifolia* Lam., feigenblättrige, 4. Sch. w. Buen. Ayres.

*filiformis* Roxb., fadenförmige, 4. Sch. w. Ostindien.

*Garcini* W., Garcin's 4. Sch. w. Ceylon.

*grandis* L., großblumige, 4. Sch. w. Ostindien.

*laciniata* L., schlitzblättrige, 4. Sch. w. Ostindien.

*latebrosa* Ait., schattige, 4. Sch. k. Canar. Inseln.

*nitida* Lk., glänzende, 4. Sch. t. ?

*palmata* L., handförmige, 4. Sch. w. Ceylon.

*pinnatifida* Burch., fiederspaltige, 4. Sch. t. C. d. g. H.

*quinqueloba* Thbg., fünflappige, 4. Sch. t. C. d. g. H.

*scabra* L. suppl., scharfe, 4. Sch. t. C. d. g. H.

*scabrella* L. suppl., schärfliche, ☉. Sch. w. Ostindien.

*Tajuja* Mart., Tajuja-Z. 4. Sch. w. Brasilien.

*tenella* Roxb., zarte, 4. Sch. Ostindien.

*triloba* Thbg., dreilappige, 4. Sch. Cap d. g. Hoffn.

*verrucosa* Ait., warzige, 4. Sch. Canarische Inseln.

**Bryophyllum** Salisb., Sprossenblatt, VIII. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

*calycinum* Salisb., gekelchtes, 4. f. w. Mascarenas.

**Bubon** L., Steineppig, V. II., Umbelliferae.

*Galbanum* L., Galban-St.,  $\frac{1}{2}$ . 4. t. Cap d. g. Hoffn.  
*gummiiferum* W., gummigebender,  $\frac{1}{2}$ . 4. t. C. d. g. H.  
*laevigatum* Ait, glatter,  $\frac{1}{2}$ . 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*buchtormensis*, *dichotomus* Spgl. etc. v. *Seseli buch-*  
*tormens.* etc. *tortuosus* Lk., Hoffinsg. v. *Tragium*  
 Broteri.

**Bubroma** Schreb. v. *Guazuma* Plum.

**Bucco** Wendl., R. et S. v. *Agathosma*.

**Buchananian** Roxb. (C. F. Buchanan-Hamilton, Vor-  
 steher des botanischen Gartens zu Calcutta), X. IV.,  
 Terebinthaceae.

*angustifolia* Roxb., schmalblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*latifolia* Roxb., breitblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

**Buchozia** *coprosmoides* L'Her. v. *Serissa foetida*.

**Bucida** L., Ochsenhorn, X. I., Combretaceae.

*Buceras* L., westindisches,  $\frac{1}{2}$ . w. Jamaica.

**Buddlea** L. (A. Buddle, englischer Botaniker), IV. I.,  
 Personatae-Antirrhoneae.

*americana* L., amerikanische, L. w. Mexico.

*brasiliensis* Jacq. fil. (*Neemda* Hortul.), brasilianische,  
 $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.

*connata* R. et P., verwachsene,  $\frac{1}{2}$ . w. Peru.

*diversifolia* Vahl (*indica* Lam.), verschiedenblättrige,  
 $\frac{1}{2}$ . w. Java.

*globosa* Lam., kugelblumige,  $\frac{1}{2}$ . k. Chili, Peru.

*heterophylla* Bot. reg., ungleichblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamer.

*madagascariensis* Vahl, madagascarisches,  $\frac{1}{2}$ . w. Madagasc.

*Neemda* Buchan. (Roxb.), *Neemda-B.*,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

*paniculata* Wall., rispenblumige,  $\frac{1}{2}$ . w. Nepal.

*salicifolia* Vahl, weidenblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.

*saligna* W. (*salicifolia* Jacq.), weidenähnliche,  $\frac{1}{2}$ . w. C. d. g. H.

*salvifolia* Lam., salbeiblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Cap d. g. H.

**Büchnera** L., Büchnere, XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

*americana* L., amerikanische, 4. f. Nordamerika.

*cuneifolia* Thbg., keilblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.

*hispidula* Hamilt., hackerige, ♂. t. Nepal.

*urticaefolia* RB., nesselblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholland.

*capensis* W. *foetida* Andr. *viscosa* Ait vid. *Manulea cap.* etc.

**Büttneria** Loeffl. (D. S. A. Büttner, deutscher Botaniker), V. I. (v.), Malvaceae-Büttneriaceae.

*catalpaefolia* Jacq., catalpablättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Caracas.

*cistifolia*\* (Cunn.), ciströschenblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholl.

*cordata* Lam., herzbblättrige, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Peru.

*corylifolia*\* (Cunn.), haselnufsblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholl.

*dasyphylla* Gay, wollblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Van-Diemens-Land.

*grandifolia* DC., großblättrige, 4. w. Ostindien.

*herbacea* Roxb., krautige, 4. w. Ostindien.

*hermannifolia* Gay, hermannienblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholl.

*microphylla* L., kleinblättrige,  $\frac{1}{2}$ . w. Westindien.

*pannosa* DC. (*australis* Sbr.), wollige,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholland.

*scabra* L., scharfe,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika, Westindien.

**Buffonia** Sauv. L. (Graf Buffon, berühmter Naturforscher), IV. II., Caryophyllaceae-Alsineae.

*annua* DC., jährige, ♂. f. England. Südfrank., Taurien.

*tenuifolia* L. (*perennis* Pour.), feinblättrige, ♂. 4. f.  
 Wallis, Südfrankreich.

**Buginvillea** Commers. (Bougainville, französischer Schiffscapitain), VIII. 1. (VII. 1.), Nyctagineae.

spectabilis Juss., ansehnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.

**Bulbine** W., Bulbine, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

aloides W., aloeähnliche, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

annua W., jährige, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffnung

asphodeloides Spgl., affodilähnliche, ♂. k. t. Cap d. g. H.

australis Spgl., neuholländische, 4. Zw. t. Neuholland.

bisulcata Haw., zweifurchige, 4. Zw. t. Neuholland.

canaliculata Spgl., nachenförmige, 4. t. Cap d. g. H.

caudata Spgl., geschwänzte, 4. t. Cap d. g. H.

ciliata Lk., gefranzte, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

floribunda Schrad., blumenreiche, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

frutesceus L., strauchige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

glauca R. et S., blaugrüne, 4. Zw. t. Chili.

graminea Haw., grasartige, 4. t. k. Cap d. g. H.

hispida Swt., hackerige, 4. t. k. Cap d. g. H.

latifolia Spl., breitblättrige, 4. t. k. Cap d. g. H.

longiscapa W., langschaftige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. H.

mesembryanthoides Haw., zaserblumenähnliche, 4. t. k.

Cap der guten Hoffnung.

nutans Spl., überhängende, 4. t. k. Cap d. g. H.

praemorsa Spgl., abgebissene, 4. t. k. Cap d. g. H.

pugioniformis Lk., dolchförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

rostrata W., schnabelförmige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. H.

scabra Spgl., scharfe, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

semibarbata Spgl., halbbärtige, 4. t. k. Neuholland.

suavis Lindl., wohlriechende, 4. t. k. Neuholland.

triquetra Spgl., dreikantige, 4. t. k. Cap d. g. H.

undulata Spgl., wellenförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

**Bulbocodium** L., Lichtblume, VI. 1., Colchicaceae.

ruthenicum Fisch. et Mey., russische, 4. f. Südl. Rufsl.

vernum L., Frühlings-L., 4. f. Spanien.

versicolor Spgl., buntfarbige, 4. f. Südl. Rufsl.

*tryginum* Adams v. *Merendera caucasica*.

**Bulbophyllum** A. P. Th., Zwiebelblatt, XX. 1., Orchideae.

apiferum Bate, bienenblumiges, 4. w. Gambia.

barbigerum Lindl., bärtiges, 4. w. Sierra Leone.

bracteolatum Lindl., deckblättriges, 4. w. Demerara.

cocoinum Lindl., Cocos-Zw., 4. w. Sierra Leone.

cupreum Lindl., kupferfarbiges, 4. w. Manilla.

leopardinum Lindl., leopardfleckiges, 4. w. Ostindien.

saltatorium Lindl., tanzendes, 4. w. Sierra Leone.

setigerum Lindl., borstiges, 4. w. Demerara.

umbellatum Lindl., doldiges, 4. w. ? Calcutta.

**Bulliardia** DC. (M. Bulliard, französischer Botaniker),

IV. 111., Corniculatae-Crassulaceae.

aquatica DC., Wasser-B., ☉. Wa. f. Böhmen, Sachsen.

β) prostrata DC.

Vaillantii DC., Vaillant's, ☉. Süd- u. Osteuropa.

**Bumalda** Thbg. (J. A. de Bumalda, Botaniker zu Bologna), V. 11., Sapindacei-Staphyleaceae.

trifolia Thbg., dreiblättrige, ♀. t. Japan.

**Bumelia** Sw., Bumelie, V. 1., Sapotaceae.

borbonica Lod. C., bourbonische, ♀. w. Mascarenas.

cuneata Sw., keilförmige, ♀. w. Westindien.

foetidissima W., stinkende, ♀. w. Westindien.

lanuginosa Pursh, wollige, ♀. k. Carolina.

lycioides W., hocksbornartige, ♀. k. Carolina.



**Bumelia**

- nervosa Vahl, nervige, ♀. w. Guiana.  
 nigra Sw., schwarze, ♀. w. Jamaica.  
 oblongifolia Nutt., langblättrige, ♀. k. Nordamerika.  
 reclinata Vent., zurückgebeugte, ♀. k. Nordamerika.  
 rotundifolia Sw., rundblättrige, ♀. w. Westind., Südamer.  
 salicifolia Sw., weidenblättrige, ♀. w. Westindien.  
 serrata Pursh, sägezahnige, ♀. k. Nordamerika.  
 strigosa Spgl., striegelige, ♀. k. Nordamerika.  
 tenax W., zähe, ♀. k. Carolina.

**Bunchosia** Juss., Bunchosie, X. 1., Malpighiaceae.

- argentea DC., silberfarbige, ♀. w. Südamerika.  
 canescens DC., grauliche, ♀. w. Westindien.  
 cumanensis G. Don, cumanische, ♀. w. Cumana.  
 glandulifera H. B. K., drüsige, ♀. w. Westind., Südamer.  
 glandulosa DC., drüsenstielige, ♀. w. Westindien.  
 media DC., mittlere, ♀. w. Westindien.  
 nitida DC., glänzende, ♀. w. Westindien.  
 odorata DC., wohlriechende, ♀. w. Südamerika.  
 paniculata DC., rispige, ♀. w. Jamaica.  
 polystachya DC., vielöhrige, ♀. w. Westindien.  
 tuberculata DC., höckerige, ♀. w. Caracas.

**Bunias** L., Zackenschote, XV. 1., Cruciferae.

- Erucago L., senfblättrige, ☉. f. Südeuropa.

β) aspera Retz.

- orientalis L., morgenländische, ♂. 4. f. Nord- u. Osteuropa.  
*aegyptiaca* L. v. *Ochtodium aegypt.* *balearica* L.  
 vid. *Succowia balearica.* *cochlearioides* L. v. *Cale-*  
*pina* Corvini. *myagroides* L. v. *Erucaria aleppica.*  
*prostrata* Dsf. v. *Muricaria prostrat.* *spinosa* L. v.  
*Zilla myagroid.* *syriaca* G. v. *Euclidium syriac.*

**Bunium** L., Erdknoten, V. 11., Umbelliferae.

- ammoides Lk., ammiähnlicher, 4. Kn. f. Portugal.  
 flexuosum Wither. Sm., gebogener, 4. Kn. f. England,  
 Südeuropa.  
 pyrenaeum Loisel, pyrenäischer, 4. Kn. f. Pyrenäen.  
*acaule* MB. vid. *Ammi acaul.* *alpinum* Kit. v. *Li-*  
*gustic. alp.* *Bulbocastanum* L. vid. *Carum Bulb.*  
*copticum* Spgl. v. *Trachysperm. coptic.* *denudatum*  
 DC. vid. *Conopodium denud.* *peucedanoides* MB.  
 (et *ferulacaum* Sm.) v. *Sium peuced.* etc.

**Buonaparteia** R. et P. (Napoleon Buonaparte), VI. 1., Bromeliaceae.

- juncea R. et P., sinsenförmige, 4. w. Peru.  
 ?*gracilis* Swt. v. *Agave (Littaea) grac.* *juncea* Haw.  
 et Hortul. v. *Agave (Littaea) geminiflor.*

**Buphone ciliaris** Herb., *disticha* Herb. et *toxicaria* Herb.  
v. *Brunsvigia disticha* etc.**Bupthalmum** L., Rindsauge, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

I. *Asteriscus* T. Mönch.

- aquaticum L., Wasser-R., ☉. f. Südeuropa.  
 elegans Brouss. (*chrysanthomoides* Poir), nettes, ♀. Canarische Inseln.  
 graveolens Forsk., starkriechendes, ♀. 4. k. Aegypten.  
 laevigatum Brouss. (*coriaceum* Hort.), glattes, ♀. k. Teneriffa.  
 maritimum L., Seestrands-R., ♀. 4. k. Südeuropa.  
 odorum Schousb., wohlriechendes, ♀. k. Mauritanien.  
 sericeum L. suppl., seidenhaariges, ♀. k. Teneriffa.  
 stenophyllum Lk., schmalblättriges, ♀. k. Canar. Inseln.

**Bupthalmum**

II. Bupthal. genuina.

salicifolium L., weidenblättriges, 4. f. Mittel-u. Südeuropa.  
β) grandiflorum L.

III. Pallenis Cass.

spinosum L., dorniges, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

IV. Telekia Baumg.

cordifolium W. K. (*speciosum* Schreb.), herzblättriges, 4. f. Osteuropa, Caucasus.

speciosissimum Ard., prächtiges, 4. f. Rhaetische und Julische Alpen.

arborescens L. *frutescens* L. v. *Diomedea arboresc.*  
etc. *helianthoides* L. v. *Heliopsis laevis*.**Bupleurum** T., Hasenöhrchen, V. II., Umbelliferae.

altaicum Fisch., altaisches, 4. f. Altai.

arborescens Thbg., baumartiges, ♀. t. k. Cap d. g. H.

aristatum Bartl., gegranntes, ☉. f. Südeuropa.

β) nanum.

aureum Fisch., goldfarbiges, 4. f. Sibirien.

cernuum Tenor., übergebogenes, ☉. f. Neapel.

coriaceum Ait., lederblättriges, ♀. k. t. Südspan., Maurit.

difforme L., verschiedenblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

exaltatum M. B., hohes, 4. f. Taurien.

falcatum L. (*scorzonerifol.* W.), sichelförmiges, 4. f. Europa.

fruticescens L., kleinstrauchiges, ♀. k. Spanien.

fruticosum L., strauchartiges, ♀. k. Südeuropa, Nordaf.

Gerardi Jacq., Gerard's, ☉. f. Oesterreich.

glaucum C. et R. DC., blaugrünes, ☉. f. Südfrankreich.

glumaceum Sibth. Sm., spelzenhülliges, ☉. f. Griechenl.

graminifolium Vahl (*petraeum* Wulf), grasblättriges, 4.  
f. Mitteleuropäische Alpen.heterophyllum Lk. (*aegyptiacum* W.), verschiedenblätteri-  
ges, ☉. f. ? Aegypten.

junceum L., simsenartiges, ☉. f. Südeuropa.

lancifolium Hornem., lanzettblättriges, ♂. f. ? Taurien.

longifolium L., langblättriges, 4. f. Mittel-u. Südeuropa.

multinerve DC., vielnerviges, 4. f. Altai.

nodiflorum Sm., knotenblumiges, ☉. f. Griechenland.

nudum Ait., nacktes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Odontites L., sparriges, ☉. f. Südeuropa.

oppositifolium Lapeyr., gegenblättriges, ☉. f. Pyrenäen.

paniculatum Broter., rispiges, 4. f. Portugal.

petraeum L., Felsen-H., 4. f. Südeuropäische Alpen.

plantagineum Dsf. (*canescens* Schousb.), wegrittblätteri-  
ges, ♀. k. Nordafrika.

polyphyllum Ledeb., vielblättriges, 4. f. Caucasus.

protractum Lk. et Hoffinsg. (*subovatum* Hoppe), verläng-  
ertes, ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Portugal.

pyrenaicum Gouan, pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

ranunculoides L., ranunkelblättriges, 4. f. Mitteleuro-  
päische Alpen.α) angulosum L. β) caricifolium W. (*Burseria-*  
*num* Schlchr., *gramineum* Vill.). γ) caricinum DC.

rigidum L., starres, 4. f. Südfrankreich.

rotundifolium L., rundblättriges, ☉. f. Europa, Cauc., Sibir.

semicompositum L., ästiges, ☉. f. Südeuropa, Taurien.

β) ? gracile MB.

spinosum L., dorniges, ♀. k. t. Spanien, Mauritien.

stellatum L., sternförmiges, 4. f. Schweiz, Tyroler Al-  
pen, Pyrenäen.

**Bupleurum**

tenuissimum L. (*junceum* et *Pollichii* Gmel.), feines, ☉.  
f. Nord- und Mitteldeutschland.

trifidum Tenor, dreitheiliges.

*baldense* MB. vid. *exaltatum*. *baldense* Host. vid.  
*ranunculoides*.

**Burchardia** RB. (J. H. Burkhard, deutscher Botaniker), VI. I., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

umbellata RB., doldige, 4. t. Neuholland.

**Burchellia** RB. (W. Burchell, englischer Reisender in Afrika), V. I., Rubiaceae.

capensis RB., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

parviflora Lindl. (*bubalina* RB.), kleinblumige, ♀. t. C. d. g. H.

**Burlingtonia** Lindl. (Gräfin von Burlington), XX. I., Orchideae.

candida Lindl., reinweisse, 4. w. Demerara.

**Burmanna** L. (J. et N. L. Burmann, berühmte holländische Botaniker), III. I., Narcisseae-Burmannieae.

biflora L., zweiblumige, 4. Wa. k. Virginien, Carolina.

**Bursaria** Cav., Beutelblume, V. I., Pittosporae.

spinosa Cav., dornige, ♀. k. t. Neusüdwallis.

**Bursera** Jacq. (J. Burser, Schüler des Caspar Bauhin), X. I. (XXIII. II.), Terebinthaceae.

gummifera Jacq., gummigebende, ♀. w. Westindien.

serrata Roxb., sägezähnlige, ♀. w. Ostindien.

**Burtonia** RB. (D. Burton, Sammler für den Garten zu Kew), X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

conferta DC., dichtblättrige, ♀. i. Südwestl. Neuholl.

minor DC., kleine, ♀. t. Neuholland.

scabra RB., scharfblättrige, ♀. t. Neuholland.

sessilifolia DC., stiellosblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Butea** Roxb. (John, Graf von Bute, großmüthiger Beschützer der Botanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

frondosa Roxb., belaubte, ♀. w. Ostindien.

parviflora Roxb., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.

superba Roxb., prächtige, ♀. w. Ostindien.

**Butomus** T., Blumenbinse, XIX. III., Alismaceae-Butomeae.

latifolius D. Don, breitblättrige, 4. Wa. k. f. b. Nepal.

umbellatus L., doldige, 4. Wa. f. Europa, Nordasien.

*Butonica speciosa* Lam. v. *Barringtonia speciosa*.

**Buxus** T., Buchsbaum, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.

australis Cunn., neuholländischer, ♀. t. Neuholland.

balearica Lam., balearischer, ♀. k. f. b. Balearische Inseln.

chinensis Lk., chinesischer, ♀. t. k. China.

sempervirens L., gemeiner, ♀. ♀. t. Südeuropa, Nordpers.

a) *arborescens* Mill. a) *argentea*, b) *aurea*, c) *marginata*. β) *angustifolia* Mill. b) *variegata*. γ)

*suffruticosa* Mill. (*humilis* Dod. *nana* Dutham.).

δ) *myrtifolia* Lam.

**Byblis** Salisb. *Byblis*, V. v., Cistineae-Drosereae.

liniflora Salisb., leinblumige, 4. Wa. t. Neuholland.

**Byrsonima** Rich., *Byrsonima*, X. III., Malpighiaceae.

altissima DC., hohe, ♀. w. Guiana.

chrysophylla H. B. K., goldblättrige, ♀. w. Südamer.

coriacea DC., lederblättrige, ♀. w. Jamaica.

crassifolia DC., dickblättrige, ♀. w. Guiana.

laurifolia H. B. K., lorbeerblättrige, ♀. w. Cumana.



**Byrsonima**

- lucida DC., glänzende, ♀. w. Westindien.  
 Moureila DC., Moureila-B., ♀. w. Südamerika.  
 nervosa DC., nervige, ♀. w. Brasilien.  
 pallida DC., bleiche, ♀. w. Cayenne.  
 reticulata DC., netzförmige, ♀. w. Cayenne.  
 spicata DC., ährige, ♀. w. Antillen.  
 verbascifolia DC., wollkrautblättrige, ♀. w. Guiana.  
 volubilis DC., windende, ♀. Sch. w. Westindien.

**Bystropogon** L'Her., Kelchbart, XIV. 1., Labiatae.

- canariensis L'Her., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.  
 origanifolius L'Her., dostenblättriger, ♀. k. Canar. Inseln.  
 plumosus L'Her., federiger, ♀. k. Canarische Inseln.  
 punctatus L'Her., punctirter, ♀. k. Madeira.

**Cacalia** L., Cacalie (Pestwurz), XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- Anteuphorbium L., wolfsmilchähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.  
 appendiculata L. suppl., geöhrte, ♀. t. Teneriffa.  
 articulata Thbg., gegliederte, ♀. 4. t. Cap d. g. H.  
 atriplicifolia L., meldenblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 bicolor Roxb., zweifarbige, ♀. w. Ostindien.  
 canescens W. (*Haworthii* Swt.), weißgraue, ♀. t. C. d. g. H.  
 carnosa Ait., fleischige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 cordifolia H. B. K., herzblättrige, 4. Kn. t. Mexico.  
 cylindrica Lam., cylinderförmige, ♀. t. Cap d. g. H.  
 ficoides L., zaserblumenähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.  
 hastata L., spontonförmige, 4. f. Sibirien.  
 Kleinia L., canarische, ♀. t. Canarische Inseln.  
 longifolia Haw. (*pugioniformis* Lk.), langblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 macrophylla MB. (*rhombofolia* W.), großblättrige, 4. f. Caucasus.

- ovalis Ker, eiförmige, 4. w. Ostindien.  
 papillaris L., weichwarzige, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.  
 peltata H. B. K., schildförmige, 4. k. Mexico.  
 radicans Thbg., starkwurzelnde, 4. t. Cap d. g. H.  
 radulaefolia H. B. K., raspelblättrige, 4. k. Mexico.  
 reniformis W., nierenförmige, 4. f. Nordamerika.  
 repens L., kriechende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 reticulata Vahl, netzförmige, ♀. t. Mascarenas.  
 runcinata H. B. K., schrotsägenförmige, 4. k. Mexico.  
 sagittata Vahl, pfeilförmige, ♂. f. m. Java.  
 scandens Thbg., klimmende, 4. Sch. t. Cap d. g. H.  
 sonchifolia L., gänsedistelblättrige, ♂. f. m. Ostindien.

**β) coccinea** Curt.

- suaveolens L., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.  
 tomentosa Thbg., filzige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 tuberosa Nutt., knollige, 4. Kn. f. Nordamerika.

**B. Adenostyles** Cass.

- albifrons (L. fil.), (*Petasites* Lam., *tomentosa* Jacq.), weißblättrige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 alpina (L.), Alpen-C., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 leucophylla (W.) (*tomentosa* Vill.), schneeweißblättrige, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

**β) hybrida** Vill.

- salicina La Bill. v. Culcitium salic. saracenica L.  
 v. Senecio Cacaliaster.

**Cachrys** T., Nufsdolde, V. 11., Umbelliferae.

- alata MB., geflügelte, 4. f. Caucasus, Kleinasien.

**Cachrys**

- alpina MB., Alpen-B., 4. f. Taurien.  
 athamantoides MB., hirschwurzförmliche, 4. f. Taurien.  
 cretica Lam., cretische, 4. f. b. k. Griechenland.  
 Libanotis L., weihrauchwurzförmliche, 4. f. Sicilien.  
 microcarpa MB., kleinfrüchtige, 4. f. Caucasus.  
 Morisoni All., Morison's, 5. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafri.  
 odontalgica Pall., Zahn-N., 4. f. Sibirien.  
 seseloides MB., seseliähnliche, 4. f. Sibirien, Taurien.  
 taurica W., taurische, 4. f. Taurien.

Hinsichtlich der übrigen s. Athamanta, Caucalis et Laserpitium.

**Cactus** L., s. die Gattungen Cereus, Echinocactus, Epiphyllum, Mammillaria, Melocactus, Opuntia, Pereskia und Rhipsalis.

**Cadia** Forsk. (arabischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

purpurea Forsk. (*varia* L'Her.), purpurfarbige, 5. w. Arab.

**Caenopteris** Berg, Neufarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypod.*).

appendiculata La Bill., vielspaltiger, 4. w. Van-Diem.L.  
 ?dissecta H. Berol., zerschnittener, 4. w. Westindien.

furcata Berg, gabeliger, 4. w. Mascarenas.

myriophylla Sw., viellappiger, 4. w. Westindien.

Odontites Thbg., zahnappiger, 4. w. Südafrika, Neuhol.

rhizophylla Sm., wurzelwedeliger, 4. w. Westind., Brasil.

*thalictroides* Hortul. v. Ceratopteris thalictroid.

**Caesalpinia** Plum. (A. Caesalpin, berühmter italienischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

bahamensis Lam., bahamische, 5. t. w. Bahamische Inseln.

bijuga Sw., zweipaarige, 5. w. Jamaica.

brasilensis Sw. (? L.), brasilianische (Brasilienholz-C.), 5. w.

Cacalaco Humb., Cacalaco-C., 5. w. Mexico.

cassiodora W., cassiaähnliche, 5. w. Südamerika.

chinensis Roxb., chinesische, 5. w. Ostindien, China.

Crista L., kammförmige, 5. w. Westindien.

enneaphylla Roxb., neunblättrige, 5. w. Ostindien.

Gilliesii Wall., Gillie's, 5. w. Mendoza.

mimosoides Lam., sinnpflanzenähnliche, 5. w. Malabar.

mucronata W., stachelspitzige, 5. w. Brasilien.

Nuga RB., Nuga-C., 5. w. Ostindien.

oleosperma Roxb., ölsamige, 5. w. Ostindien.

paniculata Desf., rispige, 5. w. Malabar.

procera Poeppig, hohe, 5. w. Cuba.

punctata W., punctirte, 5. w. Brasilien.

Sappan L., Rothholz-C., 5. w. Ostindien, Molucken.

scandens Roth, kletternde, 5. Sch. w. Ostindien.

suberosa Lod., korkige, 5. w. Ostindien.

tortuosa Roxb., gedrehte, 5. w. Ostindien.

*visicaria* Lam. v. bijuga. Hinsichtlich der übrigen s. Coulteria, Poinciana et Reichardia.

**Caesia** RB., Caesie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

vittata RB., verschleierte, 4. k. t. Neusüdwallis.

**Caesulia** Roxb., Caesulie, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

axillaris Roxb., achselblumige, 6. ♂. w. Ostindien.

**Cajanus** DC. (malabarischer Name), Taubenklee, XVII. IV. (VI.).

bicolor DC., zweifarbig, 5. w. Ostindien.

flavus DC., hellgelber, 5. w. Ostindien.

**Cakile** T., Meersenf, XV. 1., Cruciferae.

americana Nutt., amerikanischer, ☉. f. Nordamerika.

maritima Scop., gemeiner, ☉. Europa, Nordafrika etc.

β) sinuatifolia DC. (*aegyptiaca* W. *latifolia* Poir.).

Hinsichtlich der übrigen s. Rapistrum.

**Caladenia** RB., Schöndrüse, XX. 1., Orchideae.

alata RB., geflügelte, 4. Kn. w. t. Neuholland.

alba RB., weisse, 4. Kn. w. t. Neuholland.

carnea RB., fleischfarbige, 4. Kn. w. t. Neuholland.

clavigera, Ait., keulige, 4. Kn. w. t. Neusüdwallis.

coerulea RB., blaue, 4. Kn. w. t. Neuholland.

congesta RB., gedrängte, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

dilatata RB., verbreiterte, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

flava RB., hellgelbe, 4. Kn. w. t. Südl. Neuholland.

gracilis RB., schlanke, 4. Kn. w. t. Van-Diemens L.

Patersonii RB., Paterson's, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

testacea RB., scherbengelbe, 4. Kn. w. t. Neuholland.

**Caladium** Vent., Caladium, XXI. 1x., Aroideae-Callaceae.

arborescens Vent., strauchartiges, ½. w. Westind., Brasil.

arborescens H. B. K., baumartiges, ½. w. Cumana.

auritum Vent., geöhrt, 4. w. Westindien.

bicolor Vent., zweifarbiges, 4. w. Brasilien.

cucullatum P., kappenförmiges, 4. w. Südchina.

discolor H. Berol., verschiedenfarbiges, 4. w. Südamer.

edule Mey., genießbares, 4. w. Surinam.

esculentum Vent., eßbares, 4. w. Amboina, Westindien, Brasilien.

grandifolium W., großblättriges, ½. w. Caracas.

helleborifolium Vent., niesswurzblättriges, 4. w. Westind.

lacerum W., schlitzbilättriges, ½. w. Westindien.

lividum Lod., blaubraunes, 4. w. Westindien.

maculatum Lod., geflecktes, ½. 4. w. Südamerika.

nymphaeae-folium Vent., seerosenblättriges, 4. w. Ostind.

odoratum Roxb., wohlriechendes, ½. 4. w. Pegu.

ovatum Vent., eiförmiges, 4. w. Ostindien.

pedatum Hook., fußförmiges, ½. 4. w. Brasilien.

pinnatifidum W., fiederspaltiges, 4. w. Caraccas.

pumilum D. Don, kleines, 4. w. t. Nepal.

sagittae-folium Vent., pfeilblättriges, 4. w. Westindien.

scandens W., klimmendes, ½. Sch. Guinea.

seguinum Vent., giftiges, ½. w. Westindien.

Simsii Hook. (*grandifol.* Sims), Sims's, ½. w. Südamer.

tripartitum W., dreitheiliges, 4. w. Caracas.

virginicum Hook., virginisches, 4. f. Virginien.

viviparum Roxb., lebendiggebärendes, 4. w. Ostindien.

xanthorrhizon W., gelbwurzeliges, ½. w. ? Südamerika.

zamiaefolium Lod., keulpalmenblättriges, 4. w. Brasil.

**Calamagrostis** Adans. Roth, Schilfrohr, III. 11., Gramineae.acutiflora DC. (*subulata* Dumort.), spitzblumiges, 4. f.

Mittel- und Süddeutschland, Frankreich.

canadensis Nutt., canadisches, 4. f. Nordamerika.

confinis Spgl., verwandtes, 4. f. Nordamerika.

epigejos Roth., Land-S., 4. f. Europa.

Halleriana DC., Haller's, 4. f. Mittel- u. Südeuropa, Sibir.

β) nutans Saut. γ) pulchella Saut.

Gaudiniana Rehb., Gaudin's, 4. f. Schweden, Deutschland, Schweiz.

lanceolata Roth. (*ramosa* Host.), lanzettförmiges, 4. f. Europa.



**Calamagrostis**

Huebneriana Rech., Hübner's, 4. f. Sachsen.  
 Langsdorffii Spgl. (Link.), Langsdorf's, 4. f. Sibirien.  
 lapponica Spgl. (Wahlbg.), lappländisches, 4. f. Lappl.  
 litorea DC. (*effusa* Gmel), Ufer-S., 4. f. Mittel- und  
 Osteuropa, Nordamerika.

β) *glauca* MB. γ) *laxa* Host.  
*montana* Host. (*varia* Auct., *Hostii* R. et S.), Berg-S.,  
 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.  
*purpurea* (Trin.), purpurfarbiges, 4. f. Sibirien.  
*stricta* Spgl. (*neglecta* Ehrh.), steifes, 4. f. Nordeuropa,  
 Nordamerika.  
*strigosa* Hart. (Wahlenb.), striegeliges, 4. f. Lappland,  
 Grönland.  
*sylvatica* DC. (*pyramidalis* Host.), Wald-S., 4. f. Eu-  
 ropa, Sibirien.  
*tenella* Host. (*alpina* Host.), zartes, 4. f. Mitteleurop, Alpen.  
*argentea* DC. (*speciosa* Host.) v. *Lasiagrostis Calama-*  
*magrostis*.

**Calamintha** T., Bergmünze, XIV. 1., Labiatae.I. *Acynos* P. (*Acinos* Dill.);

*Acynos* Clairv., gemeine, ☉. f. Europa, Mittelasien.  
 β) *villosa* (P.).  
*alpina* Lam., Alpen-B., 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.  
*graveolens* Lk. (MB.), starkkriechende, ♀. f. Taurien,  
 Caucasus, Griechenland.  
*Herba barona* G. Don (Loisel.), Baronskraut-B., ♀. k.  
 Corsica.  
*heterophylla* G. Don (Poir.), verschiedenblättrige, ☉.  
 ♂. f. Neapel.  
*patavina* (P.), italienische, ♂. f. Südeuropa.  
*purpurascens* (P.), purpurfarbiges, ♂. 4. Spanien.  
*rotundifolia* (P.), rundblättrige, ♀. f. b. k. Spanien.  
*suaveolens* G. Don (Sm.), wohlriechende, ☉. f. Griechenl.

II. *Calamintha genuina*.

*alba* Lk. (WK.), weisse, 4. f. Ungarn.  
*caroliniana* Swt., carolinische, 4. f. Carolina.  
*cretica* P., cretische, ♀. k. Süd- und Westeuropa.  
*dilatata* Schrad., verbreiterte, 4. f. Carolina.  
*fruticosa* P., strauchige, ♀. k. Spanien.  
*grandiflora* Lam., großblumige, 4. f. Südeuropa.  
 β) *variegata*.  
*marifolia* P., gamanderblättrige, 4. f. Spanien.  
*Nepeta* Clairv. (*rotundifolia* Host., *obliqua* Host.), po-  
 leiartige, 4. f. England, Südeuropa.  
 β) *athonica* (Bernh. Benth.).  
*officinalis* Mch. (*montana* Lam., *menthaefolia* Host.), ächte,  
 4. England, Süd- und Osteuropa.  
 β) *umbrosa* Rchb.  
*subnuda* (WK.), fastnackte, 4. f. Ungarn.  
*thymifolia* Rchb., thymianblättrige, 4. f. Krain, Kärn-  
 then, südliche Schweiz.

**Calampelis** D. Don, Schönranke, XIV. 11., Personatae-  
Bignoniaceae.

*scabra* D. Don, scharfe, 4. ♀. Sch. t. Chili.

**Calamus** L., Rotang, VI. 1., Palmae.

*Draco* W., Drachenblut-R., ♀. w. Ostindien.  
*niger* W., schwarzer, ♀. w. Molucken.  
*rudentum* Lour. (*albus* P.), weißer, ♀. w. Ostindien,  
 Cochinchina.

**Calamus**

verus Lour., wahrer, ♂. w. Ostindien, Cochinchina.  
 Zalacca G., Zalacca-R., ♂. w. Molucken.

**Calandrinia** H. B. K. (J. L. Calandrini, Genfer Botaniker), XI. 1., Portulacaceae.

acaulis H. B. K., stengellose, ☉. f. Quito.  
 arenaria Lindl., Sand-C., 4. w. Valparaiso.  
 caulescens H. B. K., stengelige, ☉. f. Quito, Mexico.  
 ciliata H. B. K., gefranzte, ☉. f. Chili.  
 discolor Schrad., verschiedenfarbige, 4. w. t. Chili.  
 grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Chili.  
 Llavea Ait., La Llave's, 4. w. Mexico.  
 micrantha, Schlchdl., kleinblumige, ☉. f. Mexico.  
 monandra DC., einmännige, ☉. f. Südamerika.  
 paniculata DC., rispige, 4. w. Südamerika.  
 pilosiuscula DC., wenighaarige (*compressa* Schrad., *adscendens* Hort.), ☉. f. Südamerika.  
 procumbens Moris, (*adscendens*, *glandulosa*, *lingulata*, *parviflora* Hort. ? *tenella* Hook.), niederliegende, ☉. f. Südamerika.  
 speciosa Lindl. Hook. (*spectabilis* Hort.), prächtige, 4. w. Chili.

**Calanthe** RB., Schönstendel, XX. 1., Orchideae.

australis Ait., neuholländischer, 4. w. Neusüdwallis.  
 bicolor Lindl., zweifarbig, 4. w. Java.  
 densiflora Lindl., dichtblumiger, 4. w. Silhet.  
 discolor Lindl., verschiedenfarbiger, 4. w. Japan, ? Java.  
 furcata Bate, gabeliger, 4. w. Insel Luzon.  
 sylvestris Lindl., waldiger, 4. w. Madagascar.  
 veratrifolia RB., niefswurzblättriger. 4. w. Amboina.

**Calathea** G. F. W. Meyer, Calathea I. 1., Scitamineae-Cannaceae.

Allouya (Jacq.), Allouya-C., 4. w. Westindien.  
 flavescens Lindl., gelbliche, 4. w. Brasilien.  
 grandifolia Lindl., großblättrige, 4. w. Brasilien.  
 longebracteata Lindl., langdeckblättrige, 4. w. Brasil.  
 orbiculata Lindl., kreisblättrige, 4. w. Westindien.  
 Rossii Lod. C., Rofs's, 4. w. Brasilien.  
 villosa Lod. C., zottige, 4. w. Brasilien.  
 violacea Lindl., violette, 4. w. Brasilien.  
 zebrina Lindl., gescheckte, 4. w. Brasilien.

**Calceolaria** L., Pantoffelblume, II. 1., Personatae Antirrhineae (*Scrofular.*).

adscendens Lindl., aufsteigende, ♂. k. t. Cordilleren.  
 angustiflora R. et P., schmalblumige, ♂. k. t. Peru.  
 arachnoidea Grah., besponnene, 4. k. t. Chili.  
     b. alba Hort.   c. refulgens D. Don.  
 bicolor R. et P. (*diffusa* Lindl.), zweifarbig, ♂. k. t. Peru.  
 chiloensis Lindl., chilesische. ♂. k. t. Chili.  
 connata Hook. (*floribunda* Lindl.), verwachsene, ♂. k. t. Chili.  
 corymbosa R. et P., traubendoldige, ♂. k. t. Chili.  
 crenatiflora Cav. (*anomala* P., *pendula* D. Don), gekerbtblumige, 4. k. t. Chili.  
 Fothergillii Ait., Fothergill's, ♂. 4. k. t. Falklandsinsel.  
 Herbertiana Lindl., Herbert's, ♂. 4. k. t. Chili, Valparaiso.  
     β) parviflora Lindl.  
 Neeana Spgl. (*Fothergillii* Cav.), Nee's, 4. k. t. Peru.  
 ovata Sm., eiförmige, ♂. 4. k. t. Peru.

**Calceolaria**

*petiolaris* Cav., gestielte, 4. k. t. Chili.

*pinnata* L., gefiederte, ☉. f. m. Peru.

*plantaginea* Sm., wegrittblättrige, 4. k. t. Chili.

*polifolia* Hook., poleiblättrige, ☿. 4. k. t. Cordilleras.

*punctata* Vahl, punctirte, ☿. k. t. Chili.

*purpurea* Grah., purpurfarbige, 4. k. t. Chili.

b) *elegans* D. Don. b) *picta* D. Don.

*rugosa* R. et P. (*salviaefolia* P.), runzelige, ☿. k. t. Chili.

β) *angustifolia* (*integrifolia* L.).

b) *excelsa* Hort. c) *robusta* Hort. d) *quercifolia*. e) *cinnamomea*. f) *marmorea* Hort.

*salicifolia* R. et P., weidenblättrige, ☿. k. t. Peru.

*scabiosaefolia* Sims, scabiosenblättrige, ☉. f. m. Peru.

*sessilis* R. et P., stiellose, ☿. k. t. Valparaiso.

*thyrsiflora* Grah., straußblumige, ☿. k. f. Chili.

*viscosissima* Lindl. (*rugosa latifolia* et *macrophylla* Hort.), schmierige, ☿. k. t. Chili.

Hybrid.: *Alexandrina*, *Atkinsiana* D. Don, *atropurpurea*, *atrosanguinea*, *coerulescens*, *cuprea*, *formosa*, *Gellianiana* Penny, *Harlequina*, *hians* Penny, *Hopeana* Morris., *knypersliensis* D. Don, *Leonidas*, *Martineauae*, *mirabilis* K. et W., *Morrisoni* Penny, *pardantha*, *polyantha* Penny, *Pressii aurantiaca* et *purpurea*, *tricolor brunnea* et *picta*, *turbinata*, *versicolor*, *velutina*, *Wheelerii* Swt., *Youngii* Penny (*atra* Penny, *dilecta* Penny et *pallidior* Penny), etc.

*Calcitrapa Hippophaestrum* G. v. *Centaurea Calcitrapa*.

*Caldasia heterophylla* W. v. *Bonplandia geminiflora*.

*Calea* L. RB., Schönkraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (? *Corymbiferae*).

*cordifolia* Sw., herzblättriges, 4. w. Jamaica.

*jamaicensis* L., Jamaica-S., 4. w. Jamaica.

*solidaginea* H. B. K., goldruthenähnliches, ☿. w. Caracas.

*aspera* Jacq. v. *Melananthera deltoidea*. *scoparia*

L. v. Bachar. *scopar*.

*Caleacte* RB., *Caleacte*, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

*urticifolia* RB., nesselblättrige, 4. ☿. w. Vera Cruz.

*Calendula* L., Ringelblume, XIX. 1v., Compositae-Corymbiferae.

*aegyptiaca* Dsf., ägyptische, ☉. f. Aegypten.

*arborescens* Jacq. (*rigida* Ait., *muricata* Thbg.), strauchartige, ☿. t. Cap der guten Hoffnung.

*aragonensis* Fisch., arragonische, ☉. f. Spanien.

*arvensis* L., Acker-R., ☉. f. Europa.

β) *bicolor*.

*Asterias* F. et Mey., Stern-R., ☉. f. ? Westeuropa.

*dentata* Bot. Reg., gezahnte, 4. ☿. t. Cap d. g. H.

*denticulata* Schousb., gezähnelte, ☿. t. k. Cap d. g. H.

*eriocarpa* DC., wollfrüchtige, ☉. f. ?

*gracilis* Fisch. et Mey. DC., schlanke, ☉. f. Persien.

*incana* W. (*tomentosa* Dsf.), weißgraue, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*marginata* W. (*fruticosa* et *hispanica* Hort.), berandete, ☿. k. Gibraltar.

*officinalis* L., gemeine officinelle, ☉. f. Südeuropa.

b) *prolifera*.

*parviflora* Rafin. (*sicula* W.), kleinblumige, ☉. f. Sicilien.

*persica* C. et Meyer, persische, ☉. f. Persien.



**Calendula**

? *sancta* L., heilige, ☉. f. Palästina.

*sicula* Cyril. (? *ceratosperma* Viv.), sicilische, ☉. f. Sicilien.

*stellata* Cav., sternförmige, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

β) *spatulata* Hoffm. (undulata Rafin.). β) ? *fulgida* Raf. (*cornuta* Poir.)

*suffruticosa* Vahl, halbstrauchig, ♀. ♀. t. Nordaf., Portug. *chrysanthemifolia* Vent., flaccida Vent. (*aurantiaca*), *fruticosa* L., *graminifolia* L., *hybrida* L., *nudicaulis* L., *oppositifolia* Ait., *pluvialis* L. (*decurrens* Thbg.), *Tragus* Jacq. *viscosa* Andr. vid. *Dimorphotheca chrysanthemifolia* etc.

**Calepina** Adans., *Calepina*, XV. 1., Cruciferae.

*Corvini* Desv., *Corvin's*, ☉. f. Südeuropa.

*prostrata* Spgl. v. *Muricaria* prostr.

**Caleya** RB. (George Caley, Vorsteher des botanischen Gartens zu St. Vincent.), XX. 1., Orchideae.

*major* RB., große, 4. Kn. t. w. Südwallis.

*minor* RB., kleine, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Calla** L., Schlangenkraut, VII. 1. (XXI. vi.), Aroideae-Callaceae.

*palustris* L., Sumpf-S., 4. f. Europa.

*pertusa* Kunth, durchbohrtes, 4. w. Westind., Südamer.

*aethiopica* L. etc. v. *Richardia aethiop.*

**Callicarpa** L., Schönfrucht, IV. 1., Verbenaceae.

*americana* L., amerikanische, ♀. k. Carolina, Virginien.

*arborea* Roxb., baumartige, ♀. w. Ostindien, Nepal.

*cana* L. (*tomentosa* Lam.), graufilzige, ♀. w. Ostindien, Cochinchina.

*ferruginea* Sw., rostfarbige, ♀. w. Jamaica.

*incana* Roxb., weißgrau, ♀. w. Ostindien.

*lanata* L., wollige, ♀. w. Ostindien, Neuholland.

*lanceolaria* Roxb., lanzettliche, ♀. w. Ostindien.

*longifolia* Lam. (*japonica* Thbg.), langblättrige, ♀. t.

China, Japan.

*macrophylla* Vahl, großblättrige, ♀. w. Ostindien.

*purpurea* Juss., purpurfarbige, ♀. w. Südchina.

*reticulata* Sw., netzförmige, ♀. w. Westindien.

*rubella* Lindl., rötliche, ♀. t. China.

**Callicephalus** C. A. Mey., Schönpf., XIX. III. Compositae-Cynarocephalae.

*nitens* C. A. Mey., glänzender, 4. f. Taurien.

**Callichroa** Fisch. et Mey., Schönstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*platyglossa* Fisch. et Mey., breitzungiger, ☉. f. Neucaliforn.

**Callicoma** RB., Schönschopf, X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

*serratifolia* RB., sägeblättriger, ♀. t. Neusüdwallis.

**Calligonum** L., Schönknöterig, XI. v., Polygoneae.

*Pallasia* Ait., Pallas's, ♀. f. k. Südliches Rußland.

*polygonoides* L. (*comosum* L'Her.), schopfger, ♀. k.

Armenien, Nordafrika.

*canescens* Pursh. v. *Atriplex canesc.*

**Calliopea aurea** D. Don v. *Crepis aurea*.**Calliopsis** Reichenb., Schöngesicht, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

*Atkinsoniana* Dougl. Hook., 4. f. Columbia.

*bicolor* Rchb., zweifarbig, ☉. f. Nordamer. (Arkansa).

**Calliopsis**b) *atrosanguinea* Hort.*Drummondii* D. Don, Drummond's, ☉. f. ? Californien.*palmata* Spgl. et *rosea* Spgl. v. *Creopsis palmat.* etc.**Calliphysa** Fisch. et Mey., Kahlknöterig, ? XI. v., Polygoneae.*junceae* Fisch. et Mey., simsenförmiger, ☿. f. k. Am caspischen Meere.**Calliprora** Lindl., Prachtaffodile, VI. i., Coronariae-Asphodeleae.*lutea* Lindl., gelbe, 4. Zw. f. Neucalifornien.**Callisace** Fisch., Schöndolde, V. ii., Umbelliferae.*dahuria* Fisch., dahurische, 4. f. Dahurien.**Callisia** L., Callisie, III. i., Commelineae.*repens* L., kriechende, 4. w. Westindien.**Callista** Salisb. v. *Erica*.**Callistachys** Vent., Schönähre, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.*cuneata* Sm., keilförmige, ☿. t. Neuholland.*lanceolata* Vent., lanzettblättrige, ☿. t. Neuholland.*linariaefolia* Mac. Cat., leinblättrige, ☿. t. Neuholland.*ovata* Sims, eiblättrige, ☿. t. Neuholland.*retusa* Lod., eingedrückte, ☿. t. Neuholland.**Callistemma** Cass. (*Callistephus* Cass.) v. *Aster*.**Callistemon** RB., Schönfaden, XII. i, Myrtaceae.*formosus* Ma. C., schöner, ☿. t. Neuholland.*juniperinus* (Rchb.), wachholderblättriger, ☿. t. Neuholl.*lanceolatus* Swt., lanzettblättriger, ☿. t. Neuholland.*leptostachyus* Swt., leichtähriger, ☿. t. Neuholland.*linearifolius* (Lk.), schmalblättriger, ☿. t. Neuholland.*linearis* Swt., linienblättriger, ☿. t. Neuholland.*lophanthus* Swt., büschelblumiger, ☿. t. Neuholland.*marginatus* Swt., berandeter, ☿. t. Neusüdwallis.*microphyllus* Ma. C., kleinblättriger, ☿. t. Neuholland.*microstachys* Lindl., kleinähriger, ☿. t. Neuholland.*pinifolius* Swt., kieferblättriger, ☿. t. Neusüdwallis.*pungens* G. Don, stechender, ☿. t. Neusüdwallis.*rigidus* RB., starrer, ☿. t. Neusüdwallis.*rugulosus* G. Don, runzeliger, ☿. t. Neusüdwallis.?  $\beta$ ) *scaber* Lod.*salignus* DC., weidenblättriger, ☿. t. Neuholland. $\beta$ ) *ruber*.*semperflorens* Lod., immerblühender, ☿. t. Neusüdwallis.*speciosus* Swt., prächtiger, ☿. t. Neusüdwallis.*vininalis* G. Don, ruthenförmiger, ☿. t. Neusüdwallis.*viridiflorus* Swt., grünblumiger, ☿. t. Neuholland.**Callitriche** L., Wasserstern, I. ii., Callitrichineae (? Halorageae).*autumnalis* L., Herbst-W., 4. Wa. f. Nordeuropa.*hamulata* Kützing, hakenförmiger, 4. Wa. f. Europa.*platycarpa* Kützing, breitfrüchtiger, 4. Wa. f. Europa.*stagnalis* Scop., Weiher-W., 4. Wa. f. Europa.*verna* L. (*vernalis* Kütz.), Frühlings-W., 4. Wa. f. Europa, Amerika. $\beta$ ) *pedunculata* DC.**Callitris** Vent., Schmuckcypresse, XXI. x., Coniferae.*conglobata* Sbr., zusammengeballte, ☿. t. Neuholland.*cupressiformis* Vent. (? *australis* Sbr.), neuholländische, ☿. t. Neuholland.

**Callitris**

*elegans* Sbr., zierliche, ♀. t. Neuholland.

*Fothergilli* Loud., Fothergill's, ♀. k. t. ?

*macrostachya* Loud. (*macrocarpa* Hort.), grofsährige, ♀. t. Neuholland.

*montana* Sbr. (? *pyramidalis* Hort.), Berg-Sch., ♀. t. Neuholland.

*oblonga* Rich. (*fruticosa* RB.), längliche, ♀. t. Port Jackson.

*quadrivalvis* Vent., vierklappige, ♀. t. k. Nordafrika.

*rhomboidea* RB., rautenförmige, ♀. t. Neuholland.

*triquetra* Loud., dreikantige, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.

**Calluna** Salisb., Heidekraut, VIII. 1., Ericaceae.

*vulgaris* Salisb., gemeines, ♀. f. Europa.

a) *purpurea* G. Don. b) *spuria* G. Don. c) *decumbens* G. Don.

d) *tomentosa* G. Don. e) *alba* G. Don.

f) *flore pleno* G. Don. g) *foliis varieg.* G. Don.

h) *aurea* G. Don. i) *coccinea* G. Don.

k) *spicata* G. Don. l) *atrorubens* Loud. m) *serotina* Loud.

*Calobotrya sanguinea* Spach etc. v. *Ribes sanguin.*

**Calochilus** RB., Schönlippe, XX. 1., Orchideae.

*campestris* RB., Feld-S., 4. kn. t. w. Neuholland.

*paludosus* RB., Sumpf-S., 4. kn. t. w. Neuholland.

**Calochortus** Pursh, Graslilie, VI. III., Colchicaceae.

*elegans* Pursh, zierliche, 4. Zw. k. Louisiana, Californ.

*luteus* Dougl., gelbe, 4. Zw. k. Californien.

*macrocarpus* Dougl., grofsfrüchtige, 4. Zw. k. Californ.

*nitidus* Dougl., glänzende, 4. Zw. k. Californien.

*splendens* Dougl., schimmernde, 4. Zw. k. Californien.

*venustus* Dougl., annehmliche, 4. Zw. k. Californien.

**Calodendron** Thbg., Schönbaum, V. 1., Tricoccae Rutaceae.

*capense* Thbg., capischer, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Calophaca** Fisch., Schönlinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*wolgarica* Fisch., sibirische, ♀. f. Sibirien.

**Calophanes** D. Don, Schönklau, XIV. II., Acanthaceae.

*oblongifolia* D. Don, langblättriger, 4. t. w. Carolina.

**Calophyllum** L., Schönblatt, XVI. 1., Guttiferae.

*Calaba* Jacq., Calaba S., ♀. w. Westindien.

*Inophyllum* L., wohlriechendes, ♀. w. Ostindien.

*spurium* DC. (*Calaba* L.), unächt, ♀. w. Malabar.

*Tacamahaca* W., Tacamahaca S., ♀. w. Mascarenas.

**Calopogon** RB., Bartstendel, XX. 1., Orchideae.

*pulchellus* RB., schöner, 4. t. Nordamerika.

**Calorophus elongat** La Bill. v. *Restio lateriflorus*.**Calostemma** RB., Prachtkrone, VI. 1., Narcisseae Amaryllideae.

*album* RB., weisse, 4. Zwt. w. Neuholland.

*Cunninghami* Ait., Cunningham's, 4. Zw. t. w. Neuhol.

*luteum* Ker, gelbe, 4. Zw. t. w. Neuholland.

*purpureum* RB., purpurfarbige, 4. Zw. t. w. Neuhol.

**Calothamnus** La Bill., Schönstrauch, XVIII. II., Myrtaceae.

*clavata* Ma. C., keulförmiger, ♀. t. Neuholland.

*gracilis* RB., schlanker, ♀. t. Südliches Neuholland.

*quadrifida* RB., vierspaltiger, ♀. t. Südl. Neuholland.

? *robusta* Hortul., starker, ♀. t. Neuholland.



**Calothamnus**

*sanguinea* La Bill., blutrother,  $\frac{1}{2}$  t. Südl. Neuholl.  
*villosa* RB., zottiger,  $\frac{1}{2}$  t. Südl. Neuholland.

**Calotheca** P. B., Schönbüchse, III. II., Gramineae.

*brizoidea* P. B. (*elegans* H. B. K.), zittergrasähnliche,  
 4. w. Montevideo.

$\beta$ ) *dilatata* Lk.

*litoralis* Spgl. et *repens* Spgl. vid. *Dactylis* lit. etc.

**Calotis** RB., Schönfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*cuneifolia* RB., keilblättriges, 4. K. A. Neuholland.

**Calotropis** RB., Calotropis, V. II., Asclepiadeae.

*gigantea* RB., große,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*procera* RB., hohe,  $\frac{1}{2}$  w. Aegypten, Ostindien.

**Caltha** L., Dotterblume, XIII. VI., Ranunculaceae.

*asarifolia* DC., haselwurzblättrige, 4. Wa. f. Aleutische Inseln.

*biflora* DC., zweiblumige, 4. f. Nordamerika.

*flabellifolia* Pursh, fächerblättrige, 4. Wa. f. Nordamerika.

*leptosepala* DC., schmalkronige, 4. f. Nordamerika.

*natans* Pall., schwimmende, 4. Wa. f. Ostsibirien.

*palustris* L., Sumpf-D., 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. c) *minor* Mill.

*parnassifolia* Rafin. (*ficarioides* Pursh), parnassienblättrige, 4. Wa. f. Nordamerika.

*radicans* Forst., wurzelnde, 4. f. Schottland.

**Calycanthus** L., Gewürzstrauch (*Kelchblume*), XII. III., Calycantheae.

*floridus* L. (*sterilis* Walt.), blüthenreicher,  $\frac{1}{2}$  f. Carolina.

a) *oblongus* Ait. b) *ovatus* Ait. c) *asplenifolius* Lod. d) *longifolius* Lod. e) *variegatus* Lod. f) ? *inodorus* Lod.

*glaucus* W. (*fertilis* Walt., *acuminatus* Hort.), blaugrüner,  $\frac{1}{2}$  f. Carolina.

$\beta$ ) *oblongifolius* Nutt.

*laevigatus* W. (*pensylvanicus* Lod., *nanus* Hort., *ferax* Mchx.), glatter,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *heterophyllus* Hort.

*prunifolius* Hort., pflaumenblättriger,  $\frac{1}{2}$  f. Carolina.

*praecox* L. vid. *Chimonanthus fragrans*.

*Calycotome spinosa* Lk. et *villosa* Lk. vid. *Cytisus spinos.* etc.

*Calymenia angustifol.* Nutt. et *decumbens* Nutt. v. *Allionia linearis* et *decumb.*

**Calypso** Salisb., Calypso XX. I., Orchideae.

*americana* RB. (*borealis* Hook.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

*borealis* Salisb., nördliche, 4. f. Lappland, Finnland.

**Calyptranthes** Sw., Deckelblume, XII. I., Myrtaceae.

*caryophyllifolia* W., gewürznelkenblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*Chytraculia* Sw., *Chytraculia*-D.,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

*Jambolana* W., *Jambolana*-D.,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*Syzygium* Sw. (*Zuzygium* L.), *Syzygium*-D.,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

*Calyptrion Gingins* vid. *Corynostyles*.

**Calystegia** RB., Bärwinde, V. I., Convolvulaceae.

*Catesbeiana* Pursh, *Catesbai's*, 4. Sch. f. Nordamer.

**Calystegia**

dahurica Fisch., dahurische, 4. Sch. f. Dahuria.  
 marginata RB., gerandete, 4. f. b. k. Neuholland.  
 paradoxa Pursh, wunderbare, 4. f. Nordamerika.  
 reniformis RB., nierenförmige, 4. f. b. k. Neuholland.  
 sepium RB., Zaum-B., 4. Sch. f. Europa, Asien, Nordamerika, Neuholland.

$\beta$ ) incarnata.  $\gamma$ ) novae hollandiae.

Soldanella RB., rundblättrige, 4. f. b. k. Europa.  
 spithamaea Pursh, spannenlange, 4. Sch. f. Nordamer.  
 sylvestris R. et S., Wald-B., 4. Sch. f. Ungarn.  
 tomentosa Pursh, filzige, 4. f. Nordamerika.

**Calythrix** La Bill., Haarkelch, XII. 1. Myrtaceae.

glabra RB. (*floribunda* Hort.), glatter,  $\S$ . t. Neuholl.  
 scabra DC. (? *pubescens* Swt.), schärflicher,  $\S$ . t. Neu-Süd-Wallis.

virgata Cunn. (*ericoides* Cunn), ruthenförmiger,  $\S$ . t. Neuholland.

**Camaridium** Lindl., Bogenstendel, XX. 1., Orchideae.  
 ochroleucum Lindl., weißgelber, 4. w., Trinidad.**Camassia** Lindl. (*Quamash* oder *Camass*, nordwestamerikanischer Name), VI. 1., Coronariae — Asphodeleae.  
 esculenta Lindl., genießbare, 4. Zw. f. b. Columbia.**Camelina** Crtz., Leindotter, XV. 11., Cruciferae.

dentata P. (*pinnatifida* Hornem.), gezählelter,  $\odot$ . f. Europa, Mittelasien.

sativa Crtz., gemeiner,  $\odot$ . f. Europa, Mittelasien.

$\beta$ ) microcarpa Andr. (*sylvestris* Wallr.)  $\gamma$ ) glabrata DC.

*austriaca* RB. et *barbareaefolia* DC. vid. Nasturtium austr. etc.

**Camellia** L. (G. J. Kamel [Camellus], Apotheker der mährischen Brüder-Mission auf Manila), XVI. VIII., Theaceae (*Camelliaceae*).

euryoides Lindl., euryablättrige,  $\S$ . t. China.

japonica L., japanische, Japan, China.

Vorzügl. Varietäten: Aitonia, alba plena, alb. semiduplex, alb. simplex, alb. striata, Alnuts alba et splendens et superba, althaeiflora, anemoneflora (Waratah) alba et purpurea et rosea et striata et variegata, ardens et superba, atropurpurea, atrorubens, aucubaefolia, augusta, bicolor, blanda, Blackburniana, candidissima, conchaeiflora, concinna, conspicua, corallina, crassinervia, dahliaeflora, decora, delecta, delicatissima, dianthiflora, Dorsetii et pendula, Donckelaerii, Eclipsis, elegans, elegantissima, Elphinstonian, epsomensis Chand., excelsa, expansa, eximia Chand., fimbriata, flavescescens (Buff), florida, fulgens, gigantea, hybrida Mack C., gloria belgica et mundi, grandiflora simpl. et superba, Griffini, heptangularis, hexangularis, humilis (*nana*), imbricata, incarnata, insignis alba et rubra, involuta, Kew blush, Knightii Lod., Lady Admiral Campbell et Humes blush, longifolia, monstrosa, myrtifolia, nivea, ornata, oxoniensis, paeoniflora, rubra et alba, Palmeri, Palmer's striped et white, papaveracea, paradoxa, Parksii, Parmentieri, pomponia alba et incarnata, Pressii et rosea princeps, pulchella, punctata et major, Reevesiana, Reevesii, Rollinsoniana, Rosa mundi, Rosa sinensis

**Camellia**

Rossii, rotundifolia, rubra plena, rubricaulis, rubropunctata, sanguinea, Sabiniana, Simsii, spathulata, splendens (*coccinea*) speciosa, straminea, Sussanna Sweetiana, Taylori, tricolor, triumphans, variabilis, variegata, versicolor, Wadieana, Welbankiana, Weymouriana, Wiltonii, Woodsii u. v. a.

Kissi Wall. (*Keina* D. Don), nepal'sche, ♀. t. Nepal.

maliflora Lindl. (*Sasanqua plena rubra (rosea)*), äpfelblumige, ♀. t. China.

oleifera Abel, ölgebende, ♀. t. China.

β) latifolia.

reticulata RB., netzförmige, ♀. t. China.

Sasanqua Thbg., theegebende, ♀. t. Japan, China.

b) plena. c) semiplena.

axillaris Sims v. Polyspora axillaris. *Thea et viridis* Lk. v. *Thea Bohea et viridis*.

**Cameraria** Plum. (J. Camerarius, Botaniker zu Nürnberg), V. 1., Apocynae.

angustifolia L., schmalblättrige, ♀. w. Südamerika.

dubia Sims, zweifelhafte, ♀. w. Ostindien.

latifolia L., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

**Campanula** T., Glockenblume, V. 1., Campanulaceae.

Adami MB., Adam's, 4. f. Caucasus.

affinis R. et S., ähnliche, 4. f. w. Spanien.

alliarafolia W., lauchkrautblättrige, 4. f. Cappadocien.

Allionii Vill., Allione's, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich.

alpina Jacq., Alpen-G. 4. f. Osteuropäische Alpen.

altaica A. DC. (*sanensis* Fisch. *pilosa* Ledeb. non Pall.), altaische, 4. f. Altai, Dahur., Persien.

americana L. (*acuminata* Mchx., *declinata* Mch. *obliqua* Jacq.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

anchusaeflora Sibth., ochsenzungenblumige, ♂. f. Griechenland.

Andrewsii A. DC. (*laciniata* Andr.) Andrew's, ♂. f. Griechenland.

? aspera Mch., rauhe, ♂. f. ? ?

barbata L., bärtige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) cyanea.

bellidifolia Lapeyr., maßliebenblättrige, 4. f. Pyrenäen.

betonicaefolia Sibth. et Sm., betonienblättrige, ♂. f. Griechenland.

Biebersteiniana R. et S. (*rupestris* MB.), Bieberstein's, 4. f. Caucasus.

bononiensis L. (*Thaliana* Wallr.), Bologneser-G., 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) lychnitis Hornem. γ) obliquifolia Tenor.

δ) ruthenica MB. ε) simplex Lam. et DC.

caespitosa Scop. (*pumila* Curt., *Bellardi* All.), Oesterreich, krainerische Alpen.

b) fl. albo.

carnica Schiede, karnische, 4. f. Krain, Kärnthen.

carpathica Jacq., karpathische, 4. f. Siebenbürgen, Carpathen.

b) fl. albo.

caucasica MB., caucasische, 4. f. Caucasus.

cenisia L., savoyische, 4. f. Savoyen.

Celsii A. DC., Cels's, ♂. k. f. b. Griechenland.

Cervicaria L., natterkopfbältrige, ♂. f. Mittel- und Nordeuropa, Sibirien.



## Campanula

- cichoracea Sibth. (? *capitata* Bot. mag.), cichorienblättrige,  
 ♂. n. f. b. Thessalien.
- ciliata Stev., gefranzte, 4. f. Altai, Dahur., Pers.
- collina MB., Hügel-G., 4. f. Caucasus.
- corymbosa Dsf., traubendoldige, 4. k. f. b. Creta.
- crispa Lam., krause, 4. k. f. b. Armenien.
- dasyantha MB., wollblumige, 4. f. Sibirien.
- decumbens A. DC., niederliegende, ☉. f. Spanien.
- dichotoma L., (*afra* Cav., *decipiens* R. et S.), zweizinkige,  
 ☉. f. Süditalien, Griechenland.
- divaricata Mchx. (? *virgata* Rafin.), sparrige, 4. f. Nordamerika.
- divergens W. (*spathulata* W. K., *nutans* Vahl, Hornem.),  
 divergirende, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien.
- drabaefolia Sibth., hungerblümchenblättrige, ☉. f. Griechenland, Kleinasien.
- Elatines L., Wasserpfeffer-G., 4. f. Oberital., Dauphiné.
- elatinoides Morett., langgriffeliges, 4. f. Südliches Tyrol, Oberitalien.
- elegans R. et S. (*speciosa* W.), nette, 4. f. Sibirien.
- erinoides L., erinusähnliche, ☉. f. Spanien, Nordafrika.
- Erinus L., schmalblumige, ☉. f. Südeuropa.
- excisa Schlchr., schlitzkronige, 4. f. Südliche Schweiz.
- fastigiata Dufour, gipfelständige, ☉. f. Arragonien, Südrussland.
- foliosa Tenor., blattreiche, 4. f. Neapel.
- fragilis Cyril. (*cochlearifol.* Vahl, *crassifol.* N. E., *Cavolini* a Ten., *diffusa* Vahl), zerbrechliche, 4. k. Neapel.  
 β) *hirsuta* (*Barrelieri* Presl), Cavolini β) Ten.
- garganica Ten., apulische, 4. f. Apulien, Dalmatien.
- glomerata L., knaulblumige, 4. f. Europa, Armenien, Sibirien.  
 β) *aggregata* W. γ) *elliptica* Kit. δ) *cervicarioides* R. et S. ε) *farinosa* Befs. ζ) *nicaeensis* R. et S. η) *speciosa* Hornem.
- Gart. Var.: b) *alba elata*. c) *pallida*. d) *lilacina*.  
 e) *coerulea elata*. f) *flore pleno purpureo*.
- grandis Fisch., große, ♂. 4. f. Natolien.
- Grossekii Heuf., Grossek's, 4. f. Ungarn.
- Herminii Hoffinsg. et Link, Hermin's, ? ☉. f. Portugal.
- heterophylla L., verschiedenblättrige, 4. k. Griechenl.
- Hostii Baumg., Host's, 4. f. Siebenbürgen.
- illinoensis Fresen., illinoensische, 4. f. Nordamerika.
- isophylla Morett., (*floribunda* Viv.), gleichblättrige, 4. f. Ligurien.
- Kitaibelii R. et S. (*microphylla* Kit.), Kitaibel's, 4. f. Ungarn.
- laciniata L., schlitzblättrige, ♂. k. f. b. Griechenland.
- lactiflora MB., milchweißblumige, 4. f. Caucasus, Iberien.
- lamiifolia MB., taubnesselblättrige, 4. f. Caucasus.  
 β) *macrophylla* Sims.
- latifolia L., breitblättrige, 4. f. Europa, Altai, Nordpersien, Nepal.  
 β) *macrantha* Hornem. γ) *eriocarpa* MB.
- b) *alba*. c) *polyantha* Hook.
- ligularis Lam., bandförmige, 4. f. ?
- lingulata W. K., zungenförmige, ♂. f. Ungarn, Dalmatien.
- linifolia Lam., gleichbreitblättrige, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen, westliches Nordamerika.

## Campanula

$\beta$ ) *valdensis* All. (*uniflora* Vill.)  $\gamma$ ) *Scheuchzeri* Vill.  $\delta$ ) *Langsdorffiana* Fisch. (? *heterodoxa* Bong.)  
*Loeflingii* Brot., (*Broussonetiana* R. et S.), *Loefling's*,  
 ☉. f. Spanien, Portugal, Nordafrika.

*Loreyi* Poll. (*baldensis* Balb., *ramosissima* Host.), *Lorey's*,  
 ☉. f. Oberitalien, Dalmatien.

b) fl. albo.

*lunariaefolia* W., mondviolenblättrige, 4. f. Caucasus.  
*lyrata* Lam., leierförmige, 4. f. Orient.

*macrorhiza* Gay, großwurzelige, 4. f. Südfrankreich.  
*madritensis* A. DC., madritische, ☉. f. Spanien.

*Medium* L., Marien-G., ♂. f. Südeuropa, Taurien.

b) flore albo. c) fl. albo pleno. d) fl. coerul. plen.  
*mollis* L., weiche, 4. f. b. k. Spanien, Neapel, Creta,  
 Mauritanien.

$\beta$ ) *microphylla* Cav.

*Morettiana* Rchb. (*filiformis* Morett.), *Moretti's*, 4. f.  
 Südliches Tyrol, Oberitalien, Dalmatien.

*multiflora* W. K., vielblumige, ♂. f. Banat.

*muralis* Maund, mauerliebende, 4. f. Südeuropa.

*nemorosa* A. DC. (*elongata* Portenschl.), Hain-G., 4. f.  
 Oesterreich, Mähren.

*Nuttalli* Penny, *Nuttal's*, 4. f. Nordamerika.

*parviflora* Lam., kleinblumige, 4. f. Iberien.

*patula* L., ausgebreitete, ♂. f. Europa, Nordafrika.

$\beta$ ) *neglecta* R. et S. b) fl. albo Hortul.

*peregrina* L. (*alata* Bové, *lanuginosa* Lam.), fremde.  
 ♂. k. Syrien, Mauritanien.

*persicaefolia* L., pfirsichenblättrige, 4. f. Mitteleuropa,  
 Altai.

$\beta$ ) *macrantha* (*maxima*) Curt.  $\gamma$ ) *dasycarpa* Kit.

$\delta$ ) *hispida* Lejeun.  $\epsilon$ ) *calycina* Rchb. b) fl. albo  
 pleno. c) fl. coerul. pleno.

*petraea* Lam., steinliebende, 4. f. Oberital., Südfrankr.  
*planiflora* Lam. (*nitida* Ait.), glänzende, 4. f. k. Nord-  
 amerika.

b) flore albo. c) fl. albo plen. d) fl. coerul. pleno.

*Portenschlagiana* R. et S., (? *muralis* Hort.), *Porten-  
 schlag's*, 4. f. Dalmatien.

*primulaefolia* Broter, primelblättrige, ♂. k. Portugal.  
*propinqua* Fisch. et Mey., verwandte, ☉. f. Nordpersien.

*ptarmicaefolia* Lam., dorantblättrige, 4. f. k. Armenien,  
 Cappadocien.

*pulla* L., schwarzblaue, 4. f. Oestreichische Alpen.

*punctata* Lam., punctirte, 4. f. Ostsibirien, Dahurien, Japan.

*pusilla* Haenk., kleine, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

$\beta$ ) *pubescens* Schm.

*pyramidalis* L., pyramidale, ♂. 4. f. Südeuropa.

*Raineri* Perpent., *Rainer's*, 4. f. Südtirol, Oberitalien.  
*ramosissima* Sibth., starkästige, ☉. f. Griechenland.

*rapunculoides* L., rapunzelähnliche, 4. f. Europa, Cau-  
 casus, Westsibirien.

$\beta$ ) *crenata* Lk. (*ucranica* et *neglecta* Bess., *infundibuliformis* B. Mag.)  $\gamma$ ) *macrophylla* Hort.  $\delta$ )  
*trachelioides* MB. b) flore pleno.

*Rapunculus* L., Rapunzel-G., ♂. f. Europa, Caucasus.

$\beta$ ) *calycina* Boeb.

*rhomboidalis* L. (*azurea* B. Mag.), rautenförmige, 4. f.  
 Mittel- und Südeuropa.

## Campanula

- β) lanceolata Lapeyr. b) rubra Hort.  
 rotundifolia L. (*Baumgartenii* Beck), rundblättrige, 4. f.  
 Europa, Sibirien, westliches Nordamerika.  
 β) tenuifolia Hoffm. b) flore albo. c) fl. albo  
 pleno. d) fl. coerul. pleno.  
 sarmatica Ker (*betonicaefolia* Redows., *gummifera* W.,  
*commutata* R. et S.). russische, 4 f. Caucasus.  
 β) glabra A. et DC.  
 saxatilis L., Gestein-G., 4. k. Creta.  
 Saxifraga MB., Steinbrech-G., 4. f. Caucasus.  
 sibirica L., sibirische, ♂. f. Nordasien, Caucasus, Ost-  
 europa, Piemont.  
 silenifolia Fisch. (*Infundibulum* Rchb.), silenenblättrige,  
 4. f. Ostsibirien, Dahurien.  
 spathulata Sibth. et Sm., spathelblättrige, 4. f. b. k.  
 Griechenland.  
 speciosa Pourr. (*longifolia* Lapeyr.), prächtige, 4. f.  
 Pyrenäen.  
 β) bicaulis Lapeyr.  
 spicata L., aehrenförmige, ♂. f. Mitteleuropa.  
 β) ramosa. γ) interrupta.  
 Steveni MB. (*simplex* Stev., *Vittinghoffiana* R. et S.),  
 Steven's, 4. f. Caucasus, Armenien, Ukraine.  
 β) sibirica A. DC. (?*Infundibulum* Vest non Rchb.)  
 stricta L., steife, 4. f. b. k. Armenien, Griechenland.  
 Tenorii Morett. (*corymbosa* Ten., *Rosani* Ten., *versicolor*  
 Guf.), Tenore's, 4. f. Neapel.  
 thyrsioidea L., straußförmige, 4. f. Mitteleurop. Alpen.  
 tomentosa Lam., filzige, 4. k. Levante.  
 Trachelium L., Halskraut-G., 4. f. Europa.  
 β) urticaefolia Schm. b) flore pleno. c) flore  
 albo. d) fl. albo pleno.  
 trichocalycina Ten., haarkelchige, 4. f. Süditalien, Creta.  
 uniflora L., einblumige, 4. f. Lappland, Grönland.  
 Vandesii G. Don, Vandes's, 4. f. ?  
 velutina Dsf., sammethaarige, 4. f. Nordafrika, Südeuropa.  
 versicolor Sibth. et Sm. (*Willdenowiana* R. et S., *pla-*  
*niflora* W. non Lam.), verschiedenfarbige, 4. f.  
 Griechenland.  
 β) multiflora.  
 violaefolia Lam., veilchenblättrige, 4. f. Sibirien.  
 Waldsteiniana R. et S. (*flexuosa* WK., *rupestris* Host),  
 Waldstein's. 4. f. Croatien.  
 Wanneri Roch., Wanner's, 4. f. Banat.  
 Zoisii Wulfen, Zoys's, 4. f. Steyerm., Kärnthen, Krain.  
*Alpini* L. v. *Adenophora liliifolia*. *allariaefolia*  
 Reichb. v. *Symphyandra pendula*. *armena* Steven.  
 v. *Symphyandra armena*. *aurea* L. vid. *Musschia*  
*aurea*. *capensis* L. (*elongata* W.) et *cernua* Thhg.  
*hederacea* L., *litoralis* LaBill., *lobelioides* L. etc. v.  
*Wahlenbergia capensis* etc. *coronata* Ker. (*mar-*  
*supiflora* R. et S.) et *coronopifolia* R. et S. etc. v.  
*Adenophora marsupiflora* etc. *fruticosa* L. v. *Light-*  
*footia subulata*. *graminifolia* L. et *tenuifolia* W. K.  
 etc. v. *Edraianthus graminifol.* etc. *grandiflora*  
 Jacq. v. *Pladycodon grandiflor.* *hybrida* L. et *per-*  
*foliata* L. et *Speculum* L. etc. v. *Specularia hy-*  
*brida* etc. *porosa* Thhg. v. *Samolus campanu-*  
*loid.* etc.



**Campelia** Rich., Campelia, VI. 1., Commelineae.

Zanonia Rich., scheidenblüthige, 4. w. Westindien.

**Camphorosma** L., Kampferkraut, IV. 1., Aizoideae-Atripliceae.

annua Pall., jähriges, ☉. f. Südrussland.

monspeliaca L., französisches, ☿. 4. k. Südeuropa, Mittelasien.

ovata Kit., eiförmiges, ☉. f. Ungarn.

ruthenica MB., russisches, ☉. f. Taurien, Caucasus.

? *acuta* L. v. *Hemichroa erinacea*.

**Campylanthus** Roth, Krummröhre, II. 1., Acanthaceae, salsoloides Roth, salzkrautähnliche, ☿. k. b. Canarische Inseln.]

**Canarina** L., Canarienkraut, VI. 1., Campanulaceae.

Campanula L., glockenblumiges, 4. k. Canarische Ins.

laevigata G. Don., glattes, 4. k. Canarische Inseln.

**Canavalia** DC. (malabarischer Name), XVII. 1v. (vi.), XVI. vi.

bonariensis Lindl., bonarische, ☿. Sch. Buenos-Ayres.

ensiformis DC., schwertförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.

gladiata DC., degenfrüchtige, ☿. Sch. w. Ostindien.

obtusifolia DC., sumpflblätterige, ☿. Sch. w. Ostindien.

rosea DC., rosafarbige, 4. w. Jamaica.

**Candollea** La Bill. (Aug. Pyr. de Candolle, berühmter Botaniker zu Genf), XVIII. 11., Dilleniaceae.

Brunonis Hügel, Brown's, ☿. t. Neuholland (Schwanenfluß).

cuneiformis La Bill., keilblätterige, ☿. t. Südl. Neuholl.

fasciculata RB., büschelförmige, ☿. t. Südl. Neuholland.

Hügelii Endl., Hügel's, ☿. t. Neuholl. (Schwanenfluß).

pedunculata RB., gestielte, ☿. t. Neuholland.

**Canella** P. Br., Canellbaum, XI. 1., Guttiferae.

alba Murr., weißer, ☿. w. Westindien.

axillaris Murr., achselblumiger, ☿. w. Südamerika.

? *laurifolia* Hortul., lorbeerblätteriger, ☿. w. Südamerika.

**Canna** L., Blumenrohr, I. 1., Scitamineae - Cannaceae.

Achiras Gill., Achiras-B., 4. w. Mendoza.

Altensteinii Bouché, Altenstein's, 4. w. Mittägl. Amerika.

? *angustifolia* L., schmalblätteriges, 4. w. Südamerika.

aurantiaca Rosc., orangefarbiges, 4. w. Brasilien.

brasiliensis Rosc., brasilianisches, 4. w. Brasilien.

carnea Rosc., fleischfarbiges, 4. w. Brasilien.

chinensis W., chinesisches, 4. w. China, Cochinch., Brasil.

coccinea Mill. Ait. (? *rubra* W.), scharlachfarbiges, 4. w.

Jamaica, Südamerika.

commutata Bouché (*lutea* Hort.), verwechseltes, 4. Südamerika.

compacta Rosc., dichtähriges, 4. w. Ostindien, Westind.

denudata Rosc., entblöstes, 4. w. Ostindien.

discolor Lindl., verschiedenfarbiges, 4. w. Trinidad.

edulis Ker. (*indica* R. et S., *rubricaulis* Lk.), eßbares, 4. w. Peru.

Ehrenbergii Bouch., Ehrenberg's, 4. w. St. Thomas.

flaccida Rosc. Salisb., schlaffes, 4. w. Carolina.

flavescens Lk., gelbliches, 4. w. Ostindien.

gigantea Dsf. (*latifolia* Rosc., *gemella* N. E., *excelsa* Löd.), riesenhaftes, 4. w. Brasilien.

glauca L., blaugrünes, 4. w. Westindien.

b) *rubro-lutea* Hook.

heliconiaefolia H. Berol., heliconienblätterig. 4. w. Mexico.

**Canna**

- humilis Bouché, niedriges, 4. w. China.  
 indica L. (*variabilis* W.), indisches, 4. w. Ostindien.  
 iridiflora R. et P., schwertelblumiges, 4. w. Peru.  
 ?juncea RB., simsensförmiges, 4. w. China.  
 lagunensis Lindl., lagunisches, 4. w. Mexico.  
 Lamberti Rosc. (*maxima* Lod.), Lambert's, 4. w. Südamerika, Trinidad.  
 lanceolata Lod., lanzettliches, 4. w. Brasilien.  
 lanuginosa Rosc., wolliges, 4. w. Ostindien.  
 leptochila Bouché, schmallippiges, 4. w. ?  
 limbata Rosc. (*aureovittata* Lod., *patens* Hook.), gerandetes, 4. w. Brasilien.  
 Linkii Bouché, Link's, 4. w. Brasilien.  
 lutea Ait., gelbes, 4. w. Südamerika.  
 maculata Lk., geflecktes, 4. w. Westindien.  
 mexicana H. Berol. (*glauca rufa* Bot. mag., *liturata* Lk.), mexicanisches, 4. w. Mexico.  
 miniata Bouché, zinnoberrothes, 4. w. Brasilien.  
 nepalensis H. Par., nepalisches, 4. w. Nepal.  
 occidentalis Rosc., abendländisches, 4. w. Westindien.  
 orientalis Rosc. (*indica* Roxb.), morgenländisches, 4. w. Ostindien.  
 pallida Rosc., bleiches, 4. w. Südamerika.  
 patens Rosc. (*thyrsiflora* Hegetsch., ?*crocea* Lag.), offestehendes, 4. w. St. Helena.  
 pedunculata Sims (*Buchii* Weinm. *reflexa* N. E.), gestieltes, 4. w. Brasilien.  
 polymorpha Lod., vielgestaltiges, 4. w. ?  
 Reevesii Lindl., Reeves's, 4. w. China.  
 Roscoeana H. Berol., Roscoe's, 4. w. Ostindien.  
 sanguinea Lod., blutrothes, 4. w. Südamerika.  
 Sellowii H. Berol., Sellow's, 4. w. Brasilien.  
 speciosa Rosc. (*bifida* Herb.), prächtiges, 4. w. Nepal.  
 stolonifera H. Berol., sprossendes, 4. w. Montevideo.  
 sylvestris Rosc., Wald-B., 4. w. Südamerika.  
 tenuiflora Bouché, dünnblumiges, 4. w. Westindien.  
 violacea H. Berol., violettes, 4. w. Westindien.  
 xalapensis H. Berol., xalapensisches, 4. w. Xalapa.

**Cannabis** T., Hanf, XXII. v., Urticaceae.

- sativa L., gemeiner, ☉. f. Taurien, Sibirien, Persien, Ostindien.

β) indica L.

**Canthium** Lam. (malabarischer Name), V. I., Rubiaceae.

- dubium Lindl., zweifelhaftes, ☿. t. w. Ostindien.  
*chinense* P. v. *Gardenia spinosa*. *coronatum* Lam.  
 v. *Gardenia dumetorum*. *corymbosum* P. et *cymosum* P. v. *Webera corymb.* etc.

**Cantua ligustrifolia** Juss. v. *Vestia lycioides*.**Capnophyllum** G., Erdrauchdolde, V. II., Umbelliferae.

- africanum G., afrikanische, ☉. f. Cap d. guten Hoffn.

**Capparis** T., Kaper, XIII. I., Capparideae.

- acuminata W., zugespitzte, ☿. w. Ostindien,  
 acutifolia Swt., spitzblättrige, ☿. w. Südamerika.  
 aegyptiaca Lam., aegyptische, ☿. w. t. Aegypten.  
 amygdalina Lam., mandelähnliche, ☿. w. Westindien.  
 aphylla Roth., blattlose, ☿. w. Ostindien.  
 auriculata Lod. C., geöhrt, ☿. w. ?  
 Baducca L., Baducca K., ☿. w. Ostindien.

**Capparis**

- Brassii DC., Brass's, f. w. Westafrika.  
 Breynia L., Breyn's, f. w. Westindien.  
 ceylanica L., ceylonische, f. w. Ceylon.  
 chinensis G. Don, chinesische, f. w. China.  
 citrifolia Lam., citronenblättrige, f. w. Südafrika.  
 cynophallophora Mill. (*flexuosa* L.), langfrüchtige, f. w.  
 Eustachyana Jacq. St., Eustachische, f. w. Caraibische Inseln.  
 ferruginea L. (*octandra* Jacq.), rostfarbige, f. w. Westindien.  
 Fontanesii DC. (*ovata* Dsf.), Desfontaine's, f. t. k. Süd-europa, Nordafrika.  
 frondosa Jacq., belaubte, f. w. Carthagera, Domingo.  
 herbacea W. (*ovata* MB.), krautartige, 4. k. Taurien, Caucasus.  
 jamaicensis Jacq., jamaische, f. w. Jamaica.  
 linearis Jacq., linienblättrige, f. w. Westindien,  
 longifolia Sw., langblättrige, f. w. Jamaica.  
 mariana Jacq., marianische, f. w. Marianen-Inseln.  
 odoratissima Jacq., wohlriechende, f. w. Hispaniola, Südamerika.  
 peltata Lock., schildförmige, f. w. Trinidad.  
 pulcherrima Jacq. (*arborescens* Mill.), schöne, f. w. Südamerika.  
 saligna Vahl, weidenblättrige, f. w. Caraibische Inseln.  
 sepiaria L., Hecken-K., f. w. Ostindien.  
 spinosa L., gemeine dornige, f. k. t. Südeuropa, Nordafrika.  
 tenuisiliqua Jacq., dünnschotige, f. w. Südamerika.  
 torulosa Sw., höckerige, f. w. Westindien.  
 triflora Mill., dreiblumige, f. w. Südamerika.  
 undulata Lod. C., wellenblättrige, f. w. ?  
 verrucosa Jacq., warzige, f. w. Carthagera.  
*heteroclita* Roxb. v. *Niebulria longifolia*, Morisonia Sw. v. *Morisonia americana*. *paradoxa* Jacq. v. *Stephania cleomoides*. *trifoliata* Roxb. v. *Crataeva* Roxburghii.

**Capraria L., Herzblume, XIV. II., Personatae - Antirrhineae.**

- biflora L., zweiblumige, 4. w. Westindien, Südamerika.  
 cuneata RB., keilblättrige, f. w. Südamerika.  
 humilis Ait., niedrige, ①. w. Ostindien.  
 lanceolata L. suppl., lanzettblättrige, f. k. Cap der guten Hoffnung.  
 undulata L. suppl., wellenblättrige, f. k. t. C. d. g. H.  
*durantifolia* L. v. *Stemodia durantifol.* *lucida* Ait. v. *Teedia lucida*.

**Caprifolium T. v. Lonicera.****Capsella Med., Hirtentäschel, XV. II., Cruciferae.**

- Bursa pastoris, Mch., gemeines, ①. f. Europa etc.  
 pauciflora Koch, wenigblumiges, ①. f. Südtirol.  
 procumbens Fr. (*elliptica* C. A. Mey.), niederliegendes, ①. f. Schweden, Thüringen, Spanien, Taurien.

**Capsicum T., Beifsbeere (spanischer Pfeffer), V. I., Solanaceae.**

- angulosum Mill., kantigfrüchtige, ①. m. f. Ostind., Südamer.  
 annuum L., einjährige (gemeine), ①. m. f. Ostid., Südamer.  
 baccatum L., rundfrüchtige, f. w. Ostindien.  
 bicolor Jacq. (*violaceum* Hort., *nigrum* W.), zweifarbige, f. w. Westindien.



## Capsicum

β) *purpureum* Hornem.

*cerasiforme* W., kirschfrüchtige, ♀. w. ? Westindien.

*chinense* L., chinesische, ♀. w. China.

*ciliare* W. (? *cerasiflorum* Lk.), gefranzte, ♀. w. ?

*conicum* Lam., kegelfrüchtige, ☉. m. f. Guiana.

*conoides* Mill., kegelnähnliche, ♀. w. Ostindien, Südamer.

*cordiforme* Mill., herzförmige, ☉. m. f. Ostind., Südamer.

*frutescens* L., strauchige, ♀. w. Ostindien.

b) *torulosum* Jacq.

*globiferum* Mey., kugelfrüchtige, ♀. w. Guiana.

*grossum* W., dicke, ☉. ♂. w. Ostindien.

β) *globosum*. c) *luteum*.

*longum* DC., langfrüchtige, ☉. m. f. Ostindien.

*luteum* Lam., gelbfrüchtige, ♀. w. Ostindien.

*micranthum* Lk., kleinblumige, ♀. w. Brasilien.

*microcarpum* DC., kleinfrüchtige, ♀. w. ?

*Milleri* R. et S. (*cerasiforme* Mill.), Miller's, ☉. m. f.

Westindien.

*ovatum* DC., eiförmige, ♀. w. ?

*pendulum* W., hängende, ♀. w. ?

*pyramidale* Mill., pyramidenförmige, ♀. w. Aegypten.

*sphaericum* W., rundfrüchtige, ♀. w. ?

*tetragonum* Mill., vierkantige, ☉. m. f. Ostindien.

*ustulatum* Paxt., brandige, ☉. m. f. Chili.

Gartenvarietäten: *falcatum*, *teretiusculum*, *tomati-  
forme* etc.

## Caragana Lam., Erbsenbaum, XVII. IV. (VI.), Legu- minosae-Papilionaceae.

*Altagana* Poir., dahurischer, ♀. f. Dahurien.

*arborescens* Lam., baumartiger, ♀. f. Sibirien.

b) *inerinis*.

*arenaria* Sims, Sand-E., ♀. f. Sibirien.

*Chamlagu* Lam., chinesischer, ♀. f. b. Nordchina.

*frutescens* DC., strauchiger, ♀. f. Podol., Caucas., Mittelas.

a) *angustifolia*. b) *latifolia*.

*grandiflora* DC., großblumiger, ♀. f. Georgien.

*jubata* Poir., bemähter, ♀. f. b. Dahurien.

*microphylla* DC., kleinblättriger, ♀. f. Sibirien.

*mollis* Bess., weicher, ♀. f. Podol., Bessarab., Caucas.

*pygmaea* DC., zwergiger, ♀. f. Sibir., Mongol., Nordchina.

*Redowskii* DC. (Fisch.), Redowski's, ♀. f. Sibirien.

b) *praecox*.

*spinosa* DC. (*ferox* Lam.), dorniger, ♀. f. Sibirien.

b) *albida*.

*tragacanthoides* Poir. (*macracantha* Lod.), tragantähn-  
licher, ♀. Sibirien.

*glomerata* Booth Cat. et *mongolica* Hort. sind nicht  
in das System aufgenommen.

## Caraguata Plum. (südamerikanischer Name), VI. 1., Bromeliaceae.

*lingulata* Lindl., zungenblättrige, 4. w. Mittägliches  
Amerika, Jamaica.

## Carallia Roxb. (hindostanisch. Name), X. 1., Rhizophoreae.

*lucida* Roxb., glänzende, ♀. w. Ostindien.

## Caralluma RB. (ostind. Name), V. 11., Asclepiadeae.

*adscendens* RB., aufsteigende, ♀. 4. w. Ostindien.

*umbellata* Haw., doldige, ♀. 4. w. Ostindien.

**Carapa** Aubl. (guianischer Name), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

guianensis Aubl., guianische, f. w. Guiana.

guineensis G. Don, guineische, f. w. Sierra Leone.

moluccensis Lam., moluckische, f. w. Molucken.

procera DC., hohe, f. w. Westindien.

**Cardamine** T., Schaumkraut, XV. III., Cruciferae.

africana L., afrikanisches, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

alpina W., Alpen-S., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amara L., bitteres, 4. Wa. f. Europa, Sibirien.

β) hirta Wimm. et Grab. (*pubescens* Lej. *umbrosa* Lej. *Libertiana* Lej.). γ) subalpina Koch (*Opicii* Presl.).

asarifolia L., haselwurzblättriges, 4. f. Südeurop. Alpen.

bellidifolia L., maßliebenblättriges, 4. f. Nordeuropäische Alpen, Nordamerika, Sibirien.

chelidonia L., schöllkrautblättriges, 4. f. Croatien, Ital.

chilensis DC., chilesisches, 4. k. Chili.

granulosa All., körniges, 4. Wa. f. Oberitalien.

hirsuta (*umbrosa* Andr.), rauhhaariges, 4. f. Europa.

impatiens L., Spring-S., ♂. f. Europa, Mittelasien.

latifolia Vahl, breitblättriges, 4. Wa. f. Spanien, Italien.

macrophylla W., großblättriges, 4. f. Sibirien.

maritima Portenschl., Meerstrands-S., ♂. f. Südeuropa.

microphylla Adam, kleinblättriges, 4. f. Nordsibirien.

parviflora L., kleinblumiges, 4. f. Nord-, Ost- u. Südeuropa, Nordamerika.

pennsylvanica Mühlbg., pennsylvanisches, 4. f. Pennsylvanien.

pratensis L., Wiesen-S., 4. f. Europa, Nordas. u. Amer.

β) dentata Schult. (*sylvatica* Bess.). b) fl. pleno.

c) fl. albo pleno A. P.

prorepens Fisch., kriechendes, 4. Wa. f. Ostsibirien.

resedaefolia L., resedablättriges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

rhomboidea DC., rautenförmiges, 4. f. Nordamerika.

rotundifolia Mchx., rundblättriges, 4. f. Nordamerika.

sylvatica Lk., Wald-S., 4. f. Europa.

thalictroides All., wiesenrautenähnliches, ♂. f. Istrien, Oberitalien.

trifolia L., dreiblättriges, 4. f. Oesterreich etc. Ungarische Alpen.

uliginosa MB., Sumpf-S., 4. Wa. f. Taurien, Sibirien.

*carnosa* W. K. (et *glauca* Spgl., *graeca* L.) vid.

*Pteroneuron carnosum*, graec. *nivalis* Pall. v. *Macropodium nivale*.

**Cardiospermum** L., Herzsame, VIII. III., Sapindacei.

canescens Wall., weißgraulicher, 4. Sch. w. Ostindien.

coluteoides H. B. K., blasenstrauchähnlicher, f. 4. Sch. w. Südamerika.

Corindum L., brasilianischer, 4. Sch. w. Brasilien.

grandiflorum Sw., großblumiger, 4. Sch. w. Jamaica.

Halicacabum L., glatter, 4. Sch. w. Ost- u. Westindien.

hirsutum W., rauhhaariger, 4. Sch. w. Guinea.

pubescens Lagasc., weichhaariger, f. 4. Sch. w. Neuspan.

**Cardopatum corymbosum** Juss. v. *Brotera corymbosa*.**Carduncellus** Adans., Zwergdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

caeruleus DC., blaue, 4. k. Griechenland, Corsica, Westeuropa, Nordafrika.

β) tingitanus DC.

**Carduncellus**

- mitissimus DC., unbewehrte, 4. f. Frankreich.  
 monspeliensium All., französische, 4. f. Südfrankreich,  
 Spanien, Italien.  
 pinnatus DC., gefiederte, 4. k. f. b. Sicil., Nordafrika.  
 β) acaulis Guss. γ) humilis DC.

**Carduus** T., Distel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.  
I. Genuini.

- acanthoides L., krebssdistelartige, ♂. f. Europa, Taurien.  
 arabicus Jacq., arabische, ♂. f. Griechenland, Arabien, Sicilien.

- arctioides W., klettenähnliche, 4. f. Kärnthen, Krain, Croat.  
 Argemone Pourr., stachelmohnähnliche, 4. f. Pyrenäen.  
 argentatus L., silberweißse, ♂. f. Aegypten, Griechenl.  
 argyrea Bivon., silberfarbige, ♂. f. Sicilien.

β) fastigiatus Moris.

- candicans W. Kit., weißliche, ♂. f. Ungarn, Siebenb.  
 carlinaefolius Lam., eberwurzblättrige, 4. f. Südfrankr.  
 carlinoides Gouan, eberwurzähnliche, ♂. f. Pyrenäen,  
 Piemont.

- chrysacanthus Tenor., goldstachelige, 4. f. Neapel.

- cinereus MB., aschgraue, ♂. f. Taurien.

- collinus W. K., Hügel-D., ♂. f. Ungarn.

- corymbosus Tenor., traubendoldige, ♂. f. Neapel.

- crispus L., krause, ♂. f. Europa, Sibirien, Nordchina.

β) multiflorus Gaud. (*polyanthemos* Schlr.).

- defloratus L., Wald-D., 4. f. Mitteleuropa.

β) alpestris W. K. γ) cirsioides Vill. (*spinulosus* Bertol.). δ) rhaeticus Thom. ε) transalpinus Sut. (*glaucophyllus* Hortul.). ζ) sumanus Poll. (*crassifolius* W. E.).

- dubius Balb., zweifelhafte, 4. f. ?

- glaucus Ledeb., blaugrüne, 4. f. ?

- hamulosus Ehrh., kurzhackige, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.

- Hystrix C. A. Meyer, starkstachelige, ♂. f. Caucasus.

- lanuginosus W., wollige, ♂. f. Armenien.

- macrocephalus Desf., grofsköpfige, ♂. f. Nordafrika, Neapel, Taurien.

- medius Gouan, mittlere, 4. f. Pyrenäen.

- neglectus Tenor., übersehene, ♂. f. Neapel.

- nigrescens Vill., schwärzliche, ♂. f. Frankreich.

- nutans L. (*apenninus* Jan., *montosus* Poll.), nickende, ♂. f. Europa.

b) flore albo.

- onopordioides Fisch., onopordumähnliche, 4. f. Iberien.

- Personata Jacq., klettenartige, ♂. f. Mitteleurop. Alpen.

- platylepis Saut., breitschuppige, ♂. f. Tyrol.

- podacanthus DC., flügelstachelige, ♂. f. Dauphiné, Pers.

- seminudus MB., halbnackte, ♂. f. Taurien.

- tenuiflorus Curt., Sm., dünnblumige, ♂. f. Nord- und Südeuropa, Taurien, Madeira.

- tenuifolius Gaud. (*crassifolius* Hornem., *pannonicus* Schlch.), dünnblättrige, 4. f. Schweiz.

β) albidus MB. γ) pycnocephalus L.

- uncinatus MB., hackige, ♂. f. Taurien.

## II. Clavena DC.

- canariensis DC. (*clavulatus* Lk.), ♂. f. Canarische Inseln.

- squarrosus DC., sparrige, ♂. f. Canarische Inseln.

*Acarna* L. v. *Picnomon* *Acarna*. *acaule* L. etc. v.



## Carduus

*Cirsium* acaule etc. *afer* Jacq. etc. vid. *Chamaepeuce* *afra* etc. *alatus* Don vid. *Jurinea* *alata*. *atriplicifol.* Trevir. vid. *Rhaponticum* *atriplicifol.* *benedictus* Cam. v. *Cnicus* *benedictus*. *cyanoides* L. etc. v. *Jurinea* *cyanoid.* etc. *leucanthus* Cav. v. *Serratula* *leucantha*. *leucographus* L. v. *Tyrimnus* *leucographus*. *Marianus* L. v. *Silybum* *Marianum*. *orientalis* Adam. (et *wolgensis* MB.) etc. v. *Cousinia* *carduiformis* etc. *pygmaeus* Jacq. etc. v. *Saussurea* *pygmaea* etc. *pyrochroos* Less. vid. *Erythrolaena* *conspicua*. *syriacus* L. v. *Notobasis* *syriaca*. Hinsichtlich der übrigen s. *Cirsium* u. *Serratula*.

- Carex** Dill., Segge (Riedgras), XXI. III., Cyperaceae.
- acuminata* W. (*cuspidata* Host.), zugespitzte, 4. f. Istrien.
- acuta* L., spitze, 4. f. Europa, Nordamerika.
- alba* Scop. (*nemorosa* Schrk.), weißse, 4. f. Süddeutschland, Nordamerika.
- alpestris* All. (*gynobasis* Vill., *diversiflora* Host.), Vor-alpen-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.
- amblyocarpa* W. (*Micheliana* Sm.), stumpffrüchtige, 4. f. Italien, England.
- ampullacea* Good., flaschenfrüchtige, 4. f. Europa.
- anceps* Mühlbg., zweischneidige, 4. f. Nordamerika.
- angustifolia* Sm., schmalblättrige, 4. f. Schottland.
- appressa* RB., angedrückte, 4. k. Neusüdwallis.
- aquatis* Wahlenb., wasserliebende, 4. f. Lappl., Schwed.
- arenaria* L., Sand-S., 4. f. Europa.
- aterrima*, Hoppe, violett-schwarze, 4. f. Mitteleurop. Alpen.
- atrata* L., schwärzliche, 4. f. Europäische Alpen.
- axillaris* Good., achselständige, 4. f. Norddeutschland, England, Japan.
- baldensis* L., baldische, 4. f. Süd-Tyrol.
- Bertolonii* Schk. (*cuspidata* Bertol), Bertolone's, 4. f. Ital.
- bicolor* All. (*androgyna* Balb.), zweifarbigse, 4. f. Schweizer, Tyroler, Piemonteser Alpen, Lappland.
- binervis* Sm., zweinervige, 4. f. Norddeutschland, Frankreich, England, Schweden.
- Boenninghausiana* Weihe, Boenninghausen's, 4. f. Westphalen.
- brizoides* L., zittergrasähnliche, 4. f. Europa.
- bullata* W., bauschige, 4. f. Nordamerika.
- Buxbaumii* Wahlenb. (*polygama* Schk.), Buxbaum's, 4. f. Nord- und Mitteldeutschland, Schweiz.
- caespitosa* L., rasenartige, 4. f. Europa.
- canescens* L. (*curta* Good.), grauliche, 4. f. Europa.
- β) *brunnescens* P. (*Gebhardi* Hoppe, *Personii* Sbr.).
- capillaris* L., haarförmige, 4. f. Europäische Alpen.
- capitata* L., kopfförmige, 4. f. Scandinavien, Baiern, Tyrol.
- chordorrhiza* Ehrh., langwurzelige, 4. f. Nord- und Süddeutschland, Schweiz, Schweden.
- clavaeformis* Hoppe, keulförmige, 4. f. Kärnthen.
- conglobata* Kit., zusammengeballte, 4. f. Ungarn.
- corsicana* Lk., corsische, 4. f. Corsica.
- crinita* Lam., beinähnte, 4. f. Nordamerika.
- curvula* All., gekrümmte, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Siebenbürgen, Caucasus.
- cyperoides* L., cypergrasähnliche, 4. f. Deutschl., Sibir.
- Davalliana* Sm., Davall's, 4. f. Europa.
- depauperata* Good. (*triflora* W., *monilifera* Thuill.),

## Carex

- arnblumige, 4. f. England, Mittelfrankreich.  
 digitata L., fingerförmige, 4. f. Europa.  
 dioica L., zweihäusige, 4. f. Europa, Nordamerika.  
 distans L., entferntblumige; 4. f. Europa.  
 disticha Huds. (*intermedia* Good.), zweizeilige, 4. f. Europa.  
 divisa Huds. Good., unterbrochenährige, 4. f. England, österreichisches Litorale.  
 divulsa Good., entferntährige, 4. f. England, Nord- und Süddeutschland, Caucasus.  
 Ecklonii N. B., Ecklon's, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
 elongata L., verlängerte, 4. f. Europa.  
 ericetorum Poll. (*ciliata* W.), Heide-S., 4. f. Deutschland, Schweden.  
 erythraea Schrad., röthliche, 4. f. k. Nepal.  
 evoluta Hartm. (*Kochiana* Schübl. et Mart.), ausgewickelte, 4. f. Scandinavien, Württemberg.  
 extensa Good. (*Balbisii* Schk.), erweiterte, 4. f. Norddeutschland, österreichisches Litorale.  
 ferruginea Scopol. (*Mielichhoferi* Schk., *Scopolii* Gaud.), rostfarbige, 4. f. Europäische Alpen.  
 festucacea W., schwingelartige, 4. f. Nordamerika.  
 filiformis Good. (*lasiocarpa* Ehrh.), fadenförmige, 4. f. Europa.  
 firma Host., hartblättrige, 4. f. Mittel- u. osteurop. Alpen.  
 flava L., hellgelbe, 4. f. Europa, Nordamerika.  
 β) patula Host.  
 flexuosa Mühlbg. (*tenuis* Rudg.), gebogene, 4. f. Nordamerika.  
 foenea W., Heu-S., 4. f. Nordamerika.  
 foetida Hall. All., stinkende, 4. f. Schweiz, Südtirol etc.  
 formosa Dewey, schöne, 4. f. Nordamerika.  
 Fraseri Sims, Fraser's, 4. f. k. Nordcarolina.  
 frigida All., kalte, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 fuliginosa Schk., rußige, 4. f. Salzburg, Kärnthen.  
 fulva Good., gelbbraune, 4. f. Nordeuropa, Deutschl.  
 Gaudiniana Guthnick, Gaudin's, 4. f. Schweiz, Tyrol.  
 glareosa Wahlenb., kiesliebende, 4. f. Scandinavien.  
 glauca Scop. (*recurva* Huds., *flacca* et *pendula* Schreb.), blaugrüne, 4. f. Europa.  
 globularis L., kugelfrüchtige, 4. f. Lappland.  
 granularis Mühlbenb., körnige, 4. f. Nordamerika.  
 Grypus Schk., kleinährige, 4. f. Wallis.  
 gynomane Bertol. (*Linkii* Schk., *distachya* Dsf.), zweijährige, 4. f. Istrien, Oberitalien.  
 Heleonastes Ehrh., concavfrüchtige, 4. f. Lappland. Baiern, Salzburg.  
 hirta L., rauhhaarige, 4. f. Europa.  
 hordeiformis Wahlb. (*secalina* W.), gerstenähnliche, 4. f. Unterösterreich, Litorale.  
 Hornschuchiana Hoppe (*speirostachya* Sm.), Hornschuch's, 4. f. Europa.  
 humilis Leyss. (*clandestina* Good.), niedrige, 4. f. Europa.  
 incurva Light. (*juncifolia* All.), einwärtsgekrümmte, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen.  
 inversa RB., umgekehrte, 4. k. Neuholland.  
 irrigua Sm., Wahlbg., Wasser-S., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.  
 juncea W., simsenförmige, 4. f. Nordamerika.

## Carex

- laevigata Sm. (*biligularis* DC.), glatte, 4. f. Norddeutschland, England, Belgien, Frankreich.
- lagopina Wahlenb. (*leporina* W., *Lachenalii* Schk., *approximata* Hoppe), Rypen-S., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.
- lagopodioides W., stumpfährige, 4. f. Nordamerika.
- leporina L. (*ovalis* Good), Hasen-S., 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) *argyroglochin* Hornem.
- limosa L., Schlamm-S., 4. f. Europa.
- loliacea L. (*tenella* Schk.), lolchähnliche, 4. f. Schweden, Norddeutschland.
- longifolia Host. (*umbrosa* Hoppe, *polyrrhiza* Wallr.), langblättrige, 4. f. Mittel- und Süddeutschland.
- longipes D. Don, langstielige, 4. k. f. b. Nepal.
- lucorum W. (? *Collinsii* Nutt.), Hain-S., 4. f. Nordamerika.
- maritima Müll., Meerstrands-S., 4. f. Norwegen, Island.
- maxima Scop. (*agastachys* Ehrh., *pendula* Good.), größte, 4. f. Europa.
- membranacea Hoppe, häutige, 4. f. Kärnten, Schweiz.
- Michellii Host., Michelis, 4. f. Ost- u. Südeuropa, Cauc.
- microglochin Wahlenb., grannige, 4. f. Scandinavien, Baiern, Wallis.
- microstachya Ehrh., kleinährige, 4. f. Schweden, Norddeutschland.
- montana L. (*collina* W.), Berg-S., 4. f. Europa.
- mucronata All., stachelspitzige, 4. f. Mitteleurop. Alpen.
- Mühlenbergii W., Mühlenberg's, 4. f. Nordamerika.
- multiflora Mühlenb., vielblumige, 4. f. Nordamerika.
- muricata L., weichstachelige, 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) *virens* Lam. (*loliacea* Auctor, *nemorosa* Lumn.),
- nepalensis Spgl. (*macrolepis* D. Don), nepal'sche, 4. f. k. Nepal.
- nigra All., schwarze, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- nitida Host., glänzende, 4. f. Oesterreich, Krain, südliches Tyrol, Istrien.
- norwegica Wahlenb., norwegische, 4. f. Scandinavien.
- nutans Host., überhängende, 4. f. Oesterreich.
- Oederi, Ehrh., Oeder's, 4. f. Europa.
- ornithopoda Willd, vogelkrallige, 4. f. Europa.
- pallescent L., bleiche, 4. f. Europa.
- paludosa Good. (*acutiformis* Ehrh.), Sumpf-S., 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) *Kochiana* DC. (*spadicea* Roth.).
- panicea L., fennichähnliche, 4. f. Europa.
- paniculata L., rispige, 4. f. Europa.
- paradoxa W., wunderbare, 4. f. Schweden, Deutschland, Ungarn.
- pauciflora Lightf. (*leucoglochin* L. suppl.), wenigblumige, 4. f. Mittel- und Nordeuropa.
- pennsylvanica Lam. (*varia* Mühlbg.), pennsylvanische, 4. f. Nordamerika.
- peregrina Lk., fremde, 4. w. Congo.
- phaeostachya Sm. (*salina* G. Don), braunährige, 4. f. Schottland.
- pilosa Scop., weichhaarige, 4. f. Mittel- und Süddeutschland, Italien.
- pilulifera L., pillenfrüchtige, 4. f. Europa.
- plantaginea Lam. (*latifolia* Schk.), wegrittblättrige, 4. f. k. Nordamerika.
- podocarpa RB., stielfrüchtige, 4. f. Nördl. Amerika.



**Carex**

*praecox* Jacq. (*stolonifera* Ehrh., *umbrosa* Host.), Frühlings-S., 4. f. Europa.

*Pseudo-Cyperus* L., unächte Cyper-S., 4. f. Europa, Neuholland.

*pulicaris* L. (*psyllophora* L. suppl.), Floh-S., 4. f. Europa.

*punctata* Gaud., punctirte, 4. f. Salzburg, ital. Schweiz.

*pyrenaica* Wahlenb. (*spicata* Schk.), pyrenäische, 4. f.

Pyrenäen, Gegend von Leipzig.

*rariflora* Sm., sparsamblumige, 4. f. Scandinav., Schottl.

*remota* L., einzelnährige, 4. f. Europa.

*rigida* Good., starre, 4. f. England, Mitteldeutschland.

*riparia* Curt. Good. (*crassa* Ehrh.), Strand-S., 4. f. Europa.

*rosea* Schk., rosafarbene, 4. f. Nordamerika.

*rostrata* Mühlenb., geschnäbelte, 4. f. Nordamerika.

*rotundata* Wahlbg. (*globularis* Vahl.), rundfrüchtige, 4. f. Lappland.

*rupestris* All. (*petraea* Schk.), Felsen-S., 4. f. Europ. Alpen.

*salina* Wahlbg., Salinen-S., 4. f. Norwegen.

*saxatilis* L. (*pulla* Good.), Stein-S., 4. f. Nordeuropa, Nordasien.

*schoenoides* Host. (*austriaca* Schk.), knopfgrasähnliche, 4. f. Unterösterreich.

*Schraderi* W., Schrader's, 4. f. Galicien.

*Schreberi* Schrk. (*praecox* Schrbr.), Schreber's, 4. f. Europa.

*scoparia* W., besenförmige, 4. f. Nordamerika.

*scotica* Spgl. (*Mielichhoferi* Sm.), schottische, 4. f. Schottl.

*secalina* Wahlbg., getreideähnliche, 4. f. Nordeuropa.

*sempervirens* Vill., immergrüne, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

*stellulata* Good., sternfrüchtige, 4. f. Europa.

*stenophylla* Wahlbg. (*juncifolia* et *glomerata* Host.), feinblättrige, 4. f. Osteuropa.

*stictocarpa* Sm., punctfrüchtige, 4. f. Schottland.

*stipata* Mühlbg., dichtährige, 4. f. Nordamerika.

*straminea* W., strohfarbige, 4. f. Nordamerika.

*stricta* Good., steife, 4. f. Nordeuropa, Deutschl., Nordamer.

*strigosa* Huds. (*leptostachys* Ehrh.), striegelige, 4. f. Norddeutschland, England, Schweiz.

*supina* Wahlbg. (*campestris* Host.), kleine, 4. f. Deutschl.

*sylvatica* Huds. (*Drymeja* Ehrh.), Wald-S., 4. f. Europa.

*tenuis* Host. (*brachystachys* Schk.), dünne, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

*teretiuscula* Good., rundhalmige, 4. f. Nordeuropa, Deutschland.

β) major.

*tomentosa* L. (*sphaerocarpa* Ehrh.), filzige, 4. f. Europa, Caucasus.

β) *thuringiaca* Schk.

*ustulata* Wahlbg. (*atrofusca* Schk.), brandige, 4. f.

Scandinavische, kärnthner, salzburg. und Krain-Alpen.

*vaginata* Tausch (*salina* Don, *tetanica* Rehb. *subsp. thacea* Wormskiöld), scheidige, 4. f. England, Schweden, Deutschland (Brocken, Sudeten).

*VahlII* Schk. (*alpina* Sw.), Vahl's, 4. f. Lappl., Schottl.

*vesicaria* Huds., blasige, 4. f. Europa.

*vulpina* L., Fuchs-S., 4. f. Europa.

β) *nemorosa* W.

*Bellardi* All. et *myosuroides* Vill. v. *Elyna spicata*.

*hybrida* Schk. v. *Kobresia caricina*. *uncinata* Sw.

v. *Uncinia jamaicensis*.

- Careya** Roxb. (William Carey, Arzt zu Serampore in Ostindien), XVI. VIII., Myrtaceae.  
 arborea Roxb., baumartige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 herbacea Roxb., krautartige, 4. w. Ostindien.  
 sphaerica Roxb., kugelige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.
- Cargillia** RB. (James Cargill, Arzt zu Aberdeen), VIII. I. (XXIII. II.), Sapotaceae-Ebenaceae.  
 australis RB., südliche,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 laxa RB., lockerästige,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.
- Carica** L., Melonenbaum, XXII. IX., Cucurbitaceae.  
 cauliflora Jacq., stammlumiger,  $\frac{1}{2}$  w. Caracas.  
 citriformis Jacq. fil., citronenfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  w. Guinea.  
 digitata Aubl. (*spinosa* W.) fingerblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.  
 microcarpa Jacq., kleinfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  w. Caracas ? Chili.  
 $\beta$ ) monoica Dsf.  
 Papaya L., gemeiner,  $\frac{1}{2}$  w. Ost- und Westindien.  
 pyriformis W., birnförmiger,  $\frac{1}{2}$  w. Lima.
- Carissa** L., Carissa, V. I., Contortae-Apocynaceae.  
 Carandas L., netzblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 lanceolata RB., lanzettblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. w. Neuholland.  
 ovata RB., eiblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. w. Neuholland.  
 spinarum L., dornige,  $\frac{1}{2}$  w. Molucken.  
 Xylopicron Thouar., mascarenische,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas.  
*Arduina* Lam. v. *Arduina hispinosa*.
- Carlina** T., Eberwurz, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.  
 acanthifolia All. (*utzka* Hacq.), bärenklaublättrige, ♂. 4. f. Krain, Piemont, Frankreich.  
 $\beta$ ) *Cynara* Pourr. (*onopordifolia* Bess.), Pyrenäen, Podolien.  
 acaulis L. (*Subacaulis* DC.), stengellose, ♂. 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) *caulescens* Lam.  $\gamma$ ) *simplex* W. K., *aggregata* W.  
 corymbosa L. (*hispanica* Lam., *Lobeliana* Tausch., *longifolia* Viv., *racemosa* Gouan), traubendoldige, ♂. f. Süd-, Ost- und Westeuropa, Nordafrika.  
 Fontanesii DC. (*macrocephala* Less.), Desfontaine's, 4. k. Nordafrika.  
 gummifera Less., gummigebende, 4. k. Griechenland, Süditalien, Spanien, Nordafrika.  
 lanata L., wollige, ☉. f. Ost-, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.  
 macrocephala Moris, grofsköpfige, ☉. f. Sardinien, Sicilien.  
 nebrodensis Guss. (*longifolia* Rehb. non Viv.), langblättrige, ♂. Tyrol, Vogesen, Sicilien.  
 $\beta$ ) *monocephala* (Pola Hacq.).  $\gamma$ ) *prolifera*.  
 racemosa L. (*sulfurea* Desf., *radiata* Viv.), traubige, ☉. f. Süditalien, Westeuropa, Nordafrika.  
 $\beta$ ) *glabriuscula* DC. (? *Biebersteinii* Bernh. Hornem.)  
 falicifolia Less., weidenblättrige,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Ins.  
 $\beta$ ) *corymbosa* (Cass.).  
 sicala Tenor. (*bracteata* Presl), sicilianische, ♂. f. k. Sicilien.  
 $\beta$ ) *purpurascens* Jan.  
 vulgaris L., gemeine, ♂. f. Europa, Orient.  
 $\beta$ ) *sublanata* DC. (*lanata* Pall.).  
*Acarna* MB. v. *Picnomon Acarna*. *Echinus* MB. v. *Echinus carlinoides*. *pyrenaica* L. v. *Carduus carlinoides*.
- Carlowitzia salicifolia* Mch. v. *Carlina salicifol*.
- Carludovicia** R. et Pav. (Carl IV., König v. Spanien, und Louisa, dessen Gemahlin), XXI. IX., Palmae-Cyclanthaceae (Callaceae Alior).

**Carludovicia**

*angustifolia* R. et P., schmalblättrige, 4. w. Peru.  
*funifera* (Poit.), schnurähnliche, 4. Sch. w. Trinidad, Guiana.

*latifolia* R. et P., breitblättrige, 4. w. Peru.

*jamaicensis* Lod. C., jamaische, 4. Sch. w. Jamaica.

*palmata* R. et P., handförmige, 4. w. Peru, Neugranada.

**Carmichaelia** R. B. (Capit. Dugald Carmichael), XVII.

IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*australis* RB., neuholländische, 5. t. Neuholland.

**Carolinea** L. fil. (Princess Sophia Carolina v. Baden), XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

*alba* Lodd., weisse, 5. w. Brasilien.

*insignis* Sw., ausgezeichnete, 5. w. Westindien, Südamerika.

*minor* Sims, kleine, 5. w. Guiana.

*princeps* L. fil., fürstliche, 5. w. Südamerika.

*insignis* Hortul. v. *Sciadaphyllum anomalum* G. Don.

**Carpesium** L., Kragenblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*cernuum* L., gebogene, 4. f. Süd- und Osteuropa.

*pubescens* Wall., weichhaarige, 4. f. Nepal.

*abrotanoides* L., stabwurzähnliche, 4. f. Oesterreich, Litorale, Dalmatien, Caucasus, China, Nepal.

**Carpinus** T., Hainbuche (Weißbuche), XXI. IX. Amentaceae.

*americana* Mchx., nordamerikanische, 5. f. Nordamer.

*Betulus* L., gemeine, 5. f. Europa.

b) *incisa* Lod. (*quercifolia* Dsf., *heterophylla* Hort.)

c) *variegata* Lod.

*orientalis* Lam. (*duinensis* Scop.), morgenländische, 5. f.

Krain, Ungarn, Caucasus, Armenien.

*Ostrya* L. et *virginiana* Lam. v. *Ostrya vulgaris* etc.

**Carpodinus** RB., Rundfrucht, V. I., Apocynae.

*dulcis* G. Don, süsse, 5. w. Sierra Leone.

**Carpodontos** (*Carpodon* Spgl.), La Bill, Fruchtzahn, XIII. V., Hypericineae.

*lucidus* La Bill, glänzender, 5. t. Nördl. Neuholland.

**Carpopogon giganteus** Roxb. et *imbricatus* Roxb. v. *Mucuna gigantea* et *imbricata*.**Carrichtera** Adans. Carrichtera, XV. III., Cruciferae.

*Vellae* DC., jährige, ☉. f. England, Südeuropa.

**Carthamus** T., Saflor., XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

*tinctorius* L., färbender, ☉. f. Ostindien, Aegypten.

*Oxyacantha* MB., starkstacheliger, ☉. f. Caucasus, Persien, Ostindien.

*arborescens* L., *creticus* L. etc. v. *Kentrophyllum*

*arborescens* etc. *cynaroides* MB. v. *Cousinia cyna-*

*roides*, *integrifolius* Hortul. v. *Carlina salicifolia*.

*mitissimus* L. (et *Carduncellus* L.) v. *Carduncellus*

*mitissimus* et *monspel.*

**Cartonema** RB., Kahlfaden, VI. I., Commelineae.

*spicatum* RB., ähriger, 4. w. Neuholland.

**Carum** R., Kümmel (Karbe), V. I., Umbelliferae.

*Bulbocastanum* Koch, Erdnuß-K., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*Carvi* L., gemeiner, ♂. f. Europa.

*divaricatum* Koch, sparriger, 4. f. Istrien.



**Carum**

verticillatum Koch, wirtelförmiger, 4. f. England, Südeuropa.

*Bunius* L. v. *Ptychotis heterophylla*.

*Caruncularia* Haw. v. *Stapelia*.

**Carya** Nutt., Hickorynußs, XXI. ix., Amyrideae-Iuglandaceae.

*alba* Nutt. (*compressa* G. Don), weiße, 5. f. Nordamer.

*amara* Nutt., bittere, 5. f. Nordamerika.

*aquatica* Nutt., Wasser-H., 5. f. Nordamerika.

*integrifolia* Spgl., ganzblättrige, 5. f. Louisiana.

*microcarpa* Nutt., kleinfrüchtige, 5. f. Pennsylvanien.

*myristicaeformis* Nutt., muscatnußsähnliche, 5. f. Südcarolina.

*olivaeformis* Nutt., olivenfrüchtige, 5. f. Louisiana.

*porcina* Nutt. (*obcordata* Swt.), Ferkel-H., 5. f. Nordamer.

β) *glabra* (Mühlbg.).

? *rigida* Loud. (Lod. C.), starre, 5. f. Nordamerika.

*sulcata* Nutt., gefurchte, 5. f. Nordamerika.

*tomentosa* Nutt., filzige, 5. f. Nordamerika.

β) *maxima* Swt. γ) *pubescens* (W.).

**Caryocar** L., Butternußs, XIII. iv., Malvaceae-Bombaceae (Rhizoboleae).

*glabrum* P., glatte, 5. w. Guiana.

*nuciferum* L., ächte, 5. w. Guiana.

*tomentosum* W., filzige, 5. w. Guiana.

**Caryophyllus** T., Gewürznelkenbaum, XII. i., Myrtaceae.

*aromaticus* L., gewöhnlicher, 5. w. Moluckische Inseln.

**Caryota** L., Brennpalme, XXI. ix. (XIII. iii.), Palmae.

*horrida* Jacq., stachelige, 5. w. Südamerika.

*mitis* Lour., unbewehrte, 5. w. China.

*urens* L., ächte, 5. w. Ostindien, moluckische Inseln.

**Casearia** Jacq. (J. Casearius, Mitarbeiter am Hort. malabar.), X. i., Amygdalaceae-Samydeae.

*hirsuta* Sw., rauhhaarige, 5. w. Jamaica.

*parviflora* W., kleinblumige, 5. w. Westindien.

*parvifolia* W., (*decandra* Jacq.), kleinblättrige, 5. w. Martinique.

*ramiflora* Vahl, astblumige, 5. Westindien, Guiana.

*serrulata* Sw., sägezähnige, 5. w. Jamaica.

*sylvestris* Sw., Wald-C., 5. w. Jamaica.

**Cassandra** D. Don (*Baumannia* DC. Hort. Genev. *Diplaria* Rafin.), Cassandra, X. i., Ericaceae.

*angustifolia* D. Don, schmalblättrige, 5. f. b., Nordamer.

β) *anomala* (Vent.).

*calyculata* G. et D. Don, gekelchte, 5. f. Nordeuropa, Nordasien und Amerika.

a) *ventricosa* Sims. b) *latifolia* Lod. c) *nana* Sims.

**Cassia** T. (arabischer Name), X. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

*Absus* L., Absus-C., ☉. w. Ceylon, inneres Afrika.

*acapulcensis* H. B. K., Acapulco-C., 5. w. Mexico.

*acuminata* W. (*Apoucouito* Aubl.), zugespitzte, 5. w. Guiana.

*aegyptiaca* W., ägyptische, 5. w. Aegypten.

*Aeschynomene* DC., schampflanzenähnl., ☉. w. Westind.

*alata* L., geflügelte, 5. w. Westindien.

## Cassia

- angustissima Lam., schmalblättrige, ☉. w. Java.  
 arenaria H. B. K., Sand-C., ☿. w. Südamerika.  
 artemisioides Gaud. DC., beifußähnliche, ☿. t. Neuholl.  
 aspera Mühlenb., rauhe, ☉. f. m. Carolina, Georg.  
 atomaria L., feinpunktirte, ☿. w. Südamerika.  
 auriculata L., geöhrte, ☿. w. Ostindien.  
 australis Sims, neuholländische, ☿. t. Neuholland.  
 aversiflora Herb., verkehrtblumige, ☿. w. Brasilien.  
 bacillaris L., Stöcklein-C., ☿. w. Südamerika.  
 Barclayana Swt., Barclay's, ☿. t. Neuholland.  
 Berteri Coll., Bertero's, ☿. w. Westindien.  
 bicapsularis L., zweikapselige, ☿. t. w. Westindien, Madeira.  
 biflora L., (? *geminiflora* Collad.), zweiblumige, ☿. w. Westindien.  
 bifoliolata DC., zweiblättrige, ☿. w. Brasilien.  
 bracteata L. deckblättrige, ☿. w. Surinam, Westindien.  
 brevifolia Lam., kurzblättrige, ☿. w. Madagascar.  
 Burmanni DC. (*flexuosa* Burm.), Burmann's, ☉. m. f.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 capensis Thbg., capische, ☿. t. Cap der guten Hoffn.  
 Chamaecrista L., niedrige, ☉. m. f. Westindien, Virgin.  
 chinensis Lam., chinesische, ☿. w. China.  
 ciliaris Collad., gefranzte, ♂. w. Ostindien.  
 ciliata Hoffmsg., gewimperte, ☿. w. Cuba.  
 coromandeliana Jacq., coromandelische, ☿. w. Coromandel.  
 corymbosa Lam. (*crassifolia* Orteg.), traubendoldige, ☿. w. Buenos Ayres.  
 cubensis Hoffmsg., cubensische, ☿. w. Cuba.  
 cuspidata H. B. K., feinspitzige, ☿. w. Südamerika.  
 diphylla L., zweilappige, ☉. ☿. w. Westindien.  
 dispar W., ungleichblättrige, ☿. w. Südamerika.  
 elliptica H. B. K., elliptische, ☿. w. Cumana.  
 emarginata L., ausgerandete, ☿. w. Westindien.  
 fastigiata Vahl, gipfelständige, ☿. w. Ostindien.  
 Flindersii Ait., Flinder's, ☿. w. t. Neu-Südwallis.  
 floribunda Cav., blüthenreiche, ☿. w. Neuspanien.  
 florida Vahl, schönblühende, ☿. w. Ostindien.  
 flexuosa L., gebogene, ☉. w. Brasilien.  
 frondosa Ait., belaubte, ☿. w. Westindien.  
 glandulosa L., drüsige, ☿. w. Westindien.  
 glauca Lam., blaugrüne, ☿. w. Ostindien.  
 glutinosa DC., klebrige, ☿. t. Neuholland.  
 gracilis H. B. K., schlanke, ☿. w. Südamerika.  
 Herbertiana Lindl., Herbert's, ☿. w. Barbados.  
 hirsuta L., rauhhaarige, ☿. w. Südamerika.  
 hirta W., kurzhaarige, ☿. w. Südamerika.  
 humilis Collad., niedrige, ♂. w. Südamerika.  
 laevigata W. (*grandiflora* Dsf.), glatte, ☿. w. Südamer.  
 lanceolata Forsk. (*orientalis* P., ? *Senna* a L.), lanzettblättrige, ☿. Oberaegypten.  
 ligustrina L., ligusterblättrige, ☿. w. t. Südamerika, Bahamische Inseln.  
 ligustrinoides Schrad., ligusterähnliche, ☿. w. Arabien.  
 linearis Mchx., schmalschotige, ☿. k. t. Carolina.  
 lineata Sw., linirte, ☿. w. Jamaica.  
 longisiliqua L., langschotige, ☿. w. Westindien.  
 lotoides H. B. K., schotenkleeähnliche, ☿. w. Südamer.  
 macranthera DC., großbeutelige, ☿. w. Brasilien.  
 marginata W., randige, ☿. w. Surinam.

## Cassia

marilandica L., marilandische, 4. f. Nordamerika.  
 mexicana Jacq., mexicanische, ♀. w. Mexico.  
 microphylla W., kleinblättrige, ☉. w. Caraibische Ins.  
 mimosoides L., sinnpflanzenähnliche, ☉. w. Ceylon.  
 mollissima H. B. K., weiche, ♀. w. Südamerika.  
 nictitans L., nickende, ☉. w. m. f. Virginien, Westind.  
 nigricans Vahl, schwärzliche, ♀. w. Arabien, Aegypten.  
 obovata Collad. (*Senna* Lam., *β. italic.* L.), verkehrt-eiblättrige, ☉. w. Aegypten.  
 obtusata Hayn. (*Senna* Jacq., *italica* Lam.), ♀. w. Aegypt.  
 obtusifolia L., stumpfblättrige, ☉. w. Jamaica, Cuba.  
 occidentalis L. (*glaucescens* Hoffmsg.), westindische, ♀. w. Westindien, Südamerika.

## β) homophylla Hoffmsg.

pallida Vahl, bleichblumige, ♀. w. Südamerika.  
 Parkeriana DC., Parker's, ♀. w. Demerara.  
 patula Ait., ausgebreitete, ♀. w. Westindien.  
 pendula Humb., hängende, ♀. w. Südamerika.  
 pentagona Mill., fünfkantige, ♂. w. Peru.  
 pilosa L., behaarte, 4. w. Jamaica.  
 planisiliqua L., plattschotige, ♀. w. Westindien, Südamer.  
 polyphylla Jacq., vielblättrige, ♀. w. Westindien.  
 procumbens L., niederliegende, ☉. f. m. Virgin., Carolina.  
 prostrata Humb., gestreckte, 4. w. Mittägl. Amerika.  
 puberula H. B. K., wenighaarige, ♀. w. Neugranada.  
 pubescens Jacq., weichhaarige, ♀. w. Südamerika.  
 pulchella Boj., schöne, ♀. w. t. Mascarenas.  
 pumila Lam., kleine, ☉. w. m. f. Ostindien, China, Japan.  
 purpurea Carey, purpurfarbige, ♀. w. Bengalen.  
 quinquangularis Rich., fünfeckige, ♀. w. Cayenne.  
 reticulata W., netzförmige, ♀. w. Brasilien.  
 Richardiana H. B. K., Richard's, ♀. w. Cumana.  
 robinoides W., schotendornähnliche, ♀. w. Südamerika.  
 ruscifolia Jacq., mäusedornblättrige, ♀. t. Madeira.  
 sennoides Jacq., sennaähnliche, ♀. w. Ostindien.  
 sericea Sw. (*sensitiva* Jacq.), seidenhaarige, ☉. w. Jamaica.  
 Sophora L., sophoraähnliche, ♀. w. Ostindien, Südchina, Aegypten.  
 speciosa Schrad., prächtige, ♀. w. Brasilien.  
 spectabilis DC., ansehnliche, ♀. w. Caracas.  
 stipulacea Ait., zwischenblättrige, ♀. w. Chili.  
 suffruticosa Kön., halbstrauchige, ♀. w. Ostindien.  
 sulcata DC. (*cernua* Balb.), gefurchte, ♀. w. Südamer.  
 sulfurea DC. (*arborescens* Vahl), schwefelgelbe, ♀. w. Südamerika.  
 Tagera Lam., Tagera-C., ♂. w. Ostindien.  
 Tarantan H. B. K., Tarantan-C., ♀. w. Cumana.  
 tenella H. B. K., zarte, ♀. w. Südamerika.  
 Thonningii DC., Thonning's, ☉. w. Guinea.  
 tomentosa L. (*multiglandulosa* Jacq.), filzige, ♀. w. Südamer.  
 Tora L., viereckigfrüchtige, ☉. w. Ostindien, Arabien.  
 torosa Cav. (*chinensis* Jacq.), angeschwollene, ♀. w. t. Nordchina.  
 triflora Jacq., dreiblumige, ☉. w. Westindien.  
 viminea L., peitschenförmige, ♀. w. Jamaica.  
 virgata Sw., ruthenartige, ♀. w. Westindien.  
 Wallichiana DC. (*dimidiata* Roxb.), Wallich's, ☉. m. f. Nepal.

*Fistula* L. v. *Cathartocarpus* *Fistula*.



**Cassia**

*grandis* L. suppl. v. Cathartoc. brasil. *marginata* Roxb. v. Cathartoc. Roxburghii. *speciosa* H. B. K. v. Cathartoc. Humboldtianus.

**Cassine** L., Cassine, V. III., Aquifoliaceae.

*aethiopica* Thbg., aethiopische, ♀. t. Südafrika.  
*barbara* L., fremde, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*capensis* L., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*Colpoon* Thbg., langgrispige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*discolor* Wall., verschiedenfarbige, ♀. w. Silhet.  
*excelsa* Wall., hohe, ♀. t. Nepal.  
*Maurocenia* L., lederblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
*laevigata* Lam. v. *Celastrus tricuspidatus. xylocarpa* Vent. v. *Elaeodendrum xylocarp.*

**Cassinia** R. B. (Heinrich Cassini, berühmter französischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Eupatorineae.

*affinis* RB., ähnelnde, ♀. t. Neuholland.  
*aurea* RB., goldfarbige, ♀. t. Neuholland.  
*leptophylla* RB., schmalblättrige, ♀. t. Neuseeland.  
*longifolia* RB., langblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*?speciosa* Ait., prächtige, 4. ♀. t. Neuholland.  
*aurea* H. Kew. v. *Angianthus tomentosus* Nachtr.  
*spectabilis* var. RB. v. *Apalochlamys* Billardieri, Nachtr.  
*spectabilis* Ker. v. *Apalochlam. Kerrii* Nachtr.

**Cassiope** D. Don, Cassiope, X. I., Ericaceae.

*ericoides* D. et G. Don, heideähnliche, ♀. f. k. Sibirien, Dahurien.  
*fastigiata* D. et G. Don, gipfelständige, ♀. k. Nepal, Nordchina.  
*hypnoides* D. et G. Don, moosähnliche, ♀. f. k. Nördliches Europa, Asien und Amerika.  
*Mertensiana* D. et G. Don, Mertens's, ♀. f. k. Sitcha.  
*Redowskii* G. Don, Redowski's, ♀. f. k. Ostsibirien.  
*tetragona* D. et G. Don, vierkantige, ♀. f. k. Nördliches Europa und Amerika.

**Cassytha** L., Schlinglorbeer, IX. I., Laurineae, *filiformis* L., fadenförmige, 4. Sch. w. Ostindien, Südafrika. *glabella* RB., glatte, 4. Sch. t. w. Neuholland.**Castanea** T., Kastanie (Maronenbaum), XXI. IX., Amentaceae.

*chinensis* Spgl., chinesische, ♀. k. f. b. China, Cochinchina.  
*indica* Roxb., indische, ♀. w. Ostindien.  
*pumila* Mchx., niedrige, ♀. f. Nordamerika.  
*vesca* G., gemeine, ♀. f. Südeuropa, Nordamerika.  
 β) *americana* P. b) *asplenifolia* Lodd. C. (*heterophylla laciniata* et *salicifolia* Hort.). c) *cochleata* Lodd. d) *glabra* Lodd. (*lucida* Hort.), *glauca* A. B., *variegata* A. B. (*foliis aureo varieg.* Lodd. C.)

**Castanospermum** Cun., Kastaniensame, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Caesalpinieae.

*australe* Cun., neuholländischer, ♀. t. Neuholland.

**Castela** Turp. (M. Castel, Verfasser eines Gedichts über Pflanzen), V. III. (I.), Tricoccae-Ochnaceae.

*erecta* Turp., aufrechte, ♀. w. Westindien.

**Castilleja** Mut. (Don Castilleja, spanischer Botaniker), XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

*integrifolia* L. suppl., ganzblättrige, ♀. w. Südamerika.  
*moranensis* Kunth, mexicanische, ♀. w. Mexico.

**Castilleja**

*pallida* Spgl. (L.), (*sibirica* Lindl.), sibirische, 4. f. Sibirien.  
*septentrionalis* Lindl., nördlichste, ☉. 4. f. Labrador.  
*serrata* Hort., sägezähnige, ♀. w. ?

*sessiliflora* Pursh (*grandiflora* Spgl.) v. *Euchroma grandiflora*.

**Casuarina** L., Casuarbaum (Streitkolbenbaum), XXI. 1., Casuarineae.

*distyla* Vent., zweigriffeliger, ♀. t. Neuholland.  
*equisetifolia* Forst., schachtelhalmblättriger, ♀. t. Südseeinseln.

*glauca* Sbr., blaugrüner, ♀. t. Neuholland.

*lateriflora* Lam., seitenblumiger, ♀. t. Mascarenas.

*muricata* Roxb., weichstacheliger, ♀. t. Molucken.

*nana* Sbr. (*pumila* Hort.), zwergiger, ♀. t. Neuholland.

*nodiflora* Forst., knotenblumiger, ♀. t. Neu-Caledonien.

*paludosa* Sbr., Sumpf-C., ♀. t. Neuholland.

*quadrivalvis* La Bill., vierklappiger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*stricta* Ait. (*truncata* W.), steifer, ♀. t. Neuholland.

*tenuissima* Sbr., feinästiger, ♀. t. Neuholland.

*torulosa* Ait., aufgetriebener, ♀. t. Neuholland.

**Catabrosa aquatica** P. B. v. *Glyceria aquatica*.**Catalpa** Juss., Catalpabaum, II. 1., Bignoniaceae.

*cordifolia* Mönch. (*syringifolia* Sims), herzblättrige, ♀. f. Carolina, Japan.

*longissima* Sims, langblättrige, ♀. w. Westindien.

*microphylla* Spgl., kleinblättrige, ♀. w. Hispaniola.

**Catananche** T. Vaill., Rasselblume, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*coerulea* L., blaue, ♂. 4. f. b. K., West- und Südeuropa, Nordafrika.

β) *bicolor* Penny.

*lutea* L., gelbe, ☉. f. Griechenland, Ober- und Süditalien, Nordafrika.

**Catasetum** Rich., Fadenstendel, XX. 1., Orchideae.

*atratum* Lindl., schwärzlicher, 4. w. Brasilien.

*Claveringii* Lindl., Clavering's, 4. w. Brasilien.

*cristatum* Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.

*floribundum* Hook., blüthenreicher, 4. w. Trinidad.

*Hookeri* Lindl., Hooker's, 4. w. Brasilien.

*luridum* Lindl., bleifarbiger, 4. w. Brasilien.

*maculatum* H. B. K., gefleckter, 4. w. Neu-Granada.

*Milleri* Lod., Miller's, 4. w. Brasilien.

*poriferum* Lindl., löcheriger, 4. w. Demerara.

*semiapertum* Hook. (*inapertum* Hook., ? *purum* N. E.), halbgeöffneter, 4. w. Brasilien.

*tridentatum* Hook., dreizähniger, 4. w. Brasilien.

**Catesbaea** Gronov (M. Catesby, englischer Naturforscher und Reisender), IV. 1., Rubiaceae.

*latifolia* Lindl., breitblättrige, ♀. w. Westindien.

*parviflora* Sw., kleinblumige, ♀. w. Westindien.

*spinosa* L., dornige, ♀. w. t. Bahamische Inseln.

**Cathartocarpus** P. Purgirfrucht, XVII. 1. (VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

*brasilianus* DC. (*grandis* P.), brasilianische, ♀. w. Südamerika, Westindien.

*conspicuus* G. Don, ansehnliche, ♀. w. Sierra Leone.

*Fistula* P., aechte, ♀. w. Ostindien, Aegypten, Südamer.

*fistuloides* Coll., fistulaähnliche, ♀. w. Mexico.

*Humboldtianus* DC., Humboldt's, ♀. w. Caraccas.

**Cathartocarpus**

- javanicus P., javanische,  $\frac{1}{2}$  w. Java, Molucken.  
 Roxburghii DC., Roxburgh's,  $\frac{1}{2}$  w. Coromandel.  
 Trinitatis Rich., Trinidad's,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad.

**Cattleya** Lindl. (W. Cattley, Mitglied der Londoner Gartenbaugesellschaft), XX, 1., Orchideae.

- bicolor Lindl., zweifarbige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 citrina Lindl., citronengelbe,  $\frac{1}{2}$  w. Mexico.  
 crispa Lindl., krause,  $\frac{1}{2}$  w. Rio Janeiro.  
 elatior Lindl., erhabene,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 Forbesii Lindl., Foibe's,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 guttata Lindl., getropfte,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.

$\beta$ ) Russeliana Hook.

- intermedia Grahl., mittlere,  $\frac{1}{2}$  w. Rio Janeiro.

$\beta$ ) angustifolia Hook. (Perrinii Lindl.).  $\gamma$ ) pallida Lindl.

- labiata Lindl., lippige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 Loddigesii Lindl., Loddiges's,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 Mossiae Hook., Mofs's,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 odoratissima Bate, wohlriechende,  $\frac{1}{2}$  w. Demerara.  
 pumila Hook., kleine,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 Skinneri Bate, Skinner's,  $\frac{1}{2}$  w. Rio Janeiro.  
 coccinea Lindl. v. Sophronitis grandiflora.

**Caucalis** T., Haftdolde, V. 11., Umbelliferae.

- daucoides L., möhrenblättrige,  $\odot$  f. Mitteleuropa.  
 glabra Forsk. Delil., glatte,  $\odot$  f. Aegypten.  
 hispida Desf., hackerige,  $\odot$  f. Italien, Südfrankreich.  
 leptophylla L. (humilis Jacq.), schmalblättrige,  $\odot$  f. Südeuropa, Nordafrika.

- mauritanica L., mauritanische,  $\odot$  f. Mauritaniën.

grandiflora L. etc. v. Orlaya grandiflora etc. latifolia L. vid. Turgenia latifolia. orientalis Buxb. etc. v. Platyspermum orient. etc. Hinsichtlich der übrigen s. Torilis.

**Caulophyllum** Mchx., Stengelblatt, VI. 1., Berberideae.

- thalictroides Mchx., wiesenrautenähnliches,  $\frac{1}{2}$  Kn. f. Nordamerika.

**Ceanothus** L., Säckelbaum, V. 1., Rhamneae.

- americanus L., amerikanischer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 azureus Dsf. (coeruleus Lag.), azurblauer,  $\frac{1}{2}$  k. t. Mexico.  
 capensis DC., capischer,  $\frac{1}{2}$  t. Cap der guten Hoffn.  
 infestus H. B. K., schädlicher,  $\frac{1}{2}$  t. Mexico.  
 intermedius Pursh, mittlerer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 laevigatus DC., glatter,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 macrocarpus Cav., großfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  w. Neuspanien.  
 microphyllus Mchx., kleinblättriger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 Mocinianus DC., Mocino's,  $\frac{1}{2}$  w. Mexico.  
 mystacinus DC., abyssinischer,  $\frac{1}{2}$  f. Abyssinien.  
 nepalensis Wall., nepal'scher,  $\frac{1}{2}$  t. Nepal.  
 ovatus Dsf., eiförmiger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 perennis Pursh, krautiger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 sanguineus Pursh, blutrother,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 sphaerocarpus DC., kugelfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.  
 tardiflorus Hornem., spätblumiger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 zeylanicus Roth, zeylanischer,  $\frac{1}{2}$  w. Ceylon.

africanus L. Mill. v. Willemetia afric. asiaticus L., colubrinus Lam. etc. v. Colubrina asiat. capsularis Forst., discolor Vent., globulosus La Bill. etc. v. Pomaderris discolor etc.



**Cecropia** L., Hohlschaft (Kanonenbaum), XXII. II.,  
Urticaceae.

concolor W., gleichfarbiger, f. w. Brasilien.

palmata W., handförmiger, f. w. Brasilien.

peltata L., schildförmiger, f. w. Westindien, Südamer.

**Cedrela** P. Br. (Bastardceder), V. I., Hesperideae-  
Cedreleae.

australis Ait., neuholländische, f. w. t. Neusüdwallis.

odorata L., wohlriechende, f. w. Westind., Südamer.

Toona Roxb., Toona-B., f. w. Ostindien.

velutina DC., samanthaarige, f. w. ?

*Cedrus* T. vid. *Pinus*.

**Celastrus** L., Celaster, V. I., Celastrineae.

bullatus L., blasiger, f. Sch. k. f. Virginien, Westind.

buxifolius L., buchsbaumblättriger, f. k. Cap d. g. H.

cassinoides L'H., cassinenähnlicher, f. k. t. Canar. Inseln.

cernuus Thbg., gebogener, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

cymosus Soland. (? *multiflorus* Lam.), afterdoldiger, f.

k. t. Cap der guten Hoffnung.

emarginatus W., ausgerandeter, f. w. Ostindien.

flexuosus Thbg., beugsamer, f. k. t. Cap d. g. H.

ilicifolius Schrad., stechhülsenblättriger, f. w. Brasilien.

ilicinus Burch., stechhülsenähnlicher, f. k. t. Cap d. g. H.

laurinus Thbg., lorbeerblättriger, f. k. t. Cap d. g. H.

lucidus L., glänzender, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

mexicanus M. et S., mexicanischer, f. w. Mexico.

multiflorus Roxb. (*dependens* Wall.), vielblumiger, f. w.

Nepal.

myrtifolius L., myrtenblättriger, f. w. Westindien.

nutans Roxb., überhängender, f. Sch. w. Ostindien.

oleoides Lam., ölbaumähnlicher, f. k. t. Cap d. g. H.

plerocarpus DC., vollfrüchtiger, f. k. t. Cap d. g. H.

punctatus Thbg., punctirter, f. k. t. Cap d. g. H.

pyracanthus L., rothdorniger, f. k. t. Cap d. g. H.

quadrangulatus Schrad., vierkantiger, f. w. Brasilien.

retusus Poir (*emarginatus* R. et S.), abgestutzter, f. w.

Peru.

rigidus Thbg., starrer, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

scandens L., klimmender, f. Sch. Nordamerika.

tetragonus Thbg., vierseitiger, f. k. t. Cap d. g. H.

tricuspidatus Lam., dreispitziger, f. k. t. Cap d. g. H.

trigynus Lam., dreiweibiger, f. w. Mascarenas.

undatus Thbg., welliger, f. k. t. Cap d. g. H.

*verticillatus* Roxb. v. *Senecia nepalensis*. *zeylanicus*

Schult. v. *Ceanothus zeylanicus*.

**Celosia** L., Hahnenkamm, V. I., Aizoideae-Amarantheae.

argentea L., silberfarbiger, ☉. w. Ostindien, China.

castrensis L., langähriger, ☉. w. Ostindien.

cernua Andr., übergebogener, ☉. w. China.

coccinea L., scharlachfarbiger, ☉. w. China.

comosa Retz, schopfiger, ☉. w. Ostindien.

cristata L., gewöhnlicher, ☉. w. Ost- u. Westindien.

a) elata. b) compacta. c) flavescens.

dichotoma Roth, zweizinkiger, ☉. w. Ostindien.

echinata H. B. K., stacheliger, ☉. w. Südamerika.

glaucia Wendl., blaugrüner, f. k. t. Cap d. g. H.

margaritacea L. (*argentea* Hortul.), perlartiger, ☉. w.

Ost- und Westindien.

Monsoniae Retz, Monson's, ☉. w. Ostindien.

**Celosia**

- nitida Vahl, glänzender, ☉. w. Westindien.  
 nodiflora L., knotenblumiger, ☉. w. Ceylon.  
 pyramidalis Burm., pyramidenförmiger, ☉. w. Ostindien.  
*baccata* Retz vid. *Deeringia indica*. *lanata* L. vid.  
*Aerva lanata*. *paniculata* L. v. *Lestibudesia paniculata*.

**Celsia** L. (Olaus Cels, Professor zu Upsala), XIV. II., Personatae-Veroniceae.

- Arcturus L., langstielige, ♂. k. Griechenl., Kleinasien.  
 betonicaefolia Dsf., betonienblättrige, ♂. k. Nordafrika.  
 coromandelina Vahl, coromandelische, ♂. ☉. w. Ostind.  
 cretica L., cretische, ♂. k. Creta, Nordafrika.  
 heterophylla P., verschiedenblättrige, ♂. k.  
 lanata Jacq., wollige, ♀. k. t. ?  
 lanceolata Vent., lanzettblättrige, ♂. k. Syrien.  
 orientalis L., morgenländische, ☉. f. Levante.  
 viscosa Roth, schmierige, ☉. w. ?  
*linearis* Jacq. v. *Alonsoa linearis*.

**Celtis** T., Zuergelbaum, V. II. (XXIII. I.), Urticaceae-Ulmaceae.

- aculeata Sw., stacheliger, ♀. w. Westindien.  
 australis L., südeuropäischer, ♀. f. Südeuropa, Nordafrika.  
 chinensis P. (*caucasica* W.), chinesischer, ♀. f. Mittel- und Südasien.  
 crassifolia Lam. (*cordata* Dsf., *cordifolia* L'Her.), dickblättriger, ♀. f. Nordamerika.  
 laevigata W., glatter, ♀. f. Louisiana.  
 Lima Sw., westindischer, ♀. w. Westindien.  
 micrantha Sw., kleinblumiger, ♀. w. Westind., Südamer.  
 occidentalis L., abendländischer, ♀. w. Nordamerika.  
 β) *cordata*. γ) *scabriuscula* (*aspera* Lod., *orientalis* Hort.).  
 orientalis L., morgenländischer, ♀. w. Ost- u. Südasien.  
 pumila Pursh, zwergiger, ♀. f. Nordamerika.  
 Tournefortii Lam. (*orientalis* Mill.), Tournefort's, ♀. Armenien.

**Cenchrus** L., Stachelgras, III. II., Gramineae.

- australis RB., neuholländisches, ☉. f. Neuholland.  
 catharticus H. Monspil., purgirendes, ☉. ♂. m. Nubien.  
 echinatus L., gemeines, ☉. ♂. f. w. Westindien.  
 pungens H. B. K., stechendes, ☉. f. Südamerika.  
 spinifex Cav., herzblättriges, ♂. w. Südamerika.  
 tribuloides L., hürzeldornfrüchtiges, ☉. f. Nordamerika.  
*capitatus* L. v. *Echinaria capitata*. *laevigatus* Trin. v. *Antheophora elegans*. *lappaceus* L. vid. *Cenotheca lappacea*. *racemosus* L. vid. *Lappago racemosa*. *villosus* Spgl. v. *Antheophora villosa*. Hinsichtlich der übrigen s. *Penicillaria* et *Pennisetum*.

**Cenia** Commers., Cenie (Blasenkelch), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- turbinata P., aufgetriebene, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

**Centaurea** L., Flockenblume, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

- A. Amberboa DC. (et Chryseis Less. Cass.),  
 crupinoides Dsf., zweifarbige, ☉. f. Nordafrika.  
 erucaefolia L., rankenblättrige, ☉. ? 4. f. ?  
 Lippii L., Lipp's, ☉. f. Arabien, Nordafrika.  
 moschata L. (*glauca* W.), moschusduftende, ☉. f. m. Kleinasien, Griechenland.

## Centaurea

b) alba.

muricata L. (*pubigera* P.), weichstachelige, ☉. f. Spanien.  
spectabilis DC. (*Balsamita* Don), ansehnliche, 4. f. Nordpersien.

suaveolens W. (*odorata* DC.), wohlriechende, ☉. f. m. Persien, Taurien, Iberien.

II. Centaur. genuin.

Adami W., Adam's, ☉. f. Taurien, Caucasus, Persien.

aegyptiaca L. (*cancellata* Sbr.), ägyptische, ☉. f. Aegypt.

africana Lam., afrikanische, 4. k. Nordafrika.

alata Lam., geflügelte, 4. f. Pers., Armenien, Caucas.

alba L., weiße, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.

α) concolor DC. (*splendens* Ten., *globosa* Hort.),

β) densta Ten. γ) angustifolia Guss. (*splendens* Auct. ? L.).

alexandrina Delil. (*pallescens* Bové), alexandrinische, ☉.

♂. f. Aegypten.

alpina L. (*baldensis* P.), Alpen-F., 4. f. Oberitalien.

amara L., bittere, 4. f. Südeuropa.

β) angustifolia Schk. γ) bracteata Bertol.

ambigua Guss., zweifelhafte, 4. f. Neapel.

americana Nutt. (*Nuttallii* Spgl.), amerikanische, ☉. f.

Nordamerika (Arkansa).

apiculata Led., kurzspitzige, 4. f. Taurien.

aplolepis Moretti, borstenschuppige, 4. f. Mittel- und Süditalien.

apula Lam. (*lyrata* P.), apulische, ☉. f. Süditalien, Südfrankreich, Nordafrika, Brasilien, Chili etc.

arenaria MB., Sand-F., 4. f. Südrussland, Podolien.

argentea L., silberfarbige, 4. k. Creta.

arguta N. E., spitzzahnige, ⚥. k. Teneriffa.

argyrophylla W. (*jacobaeifolia* Spgl.), silberweißblättrige, 4. f. ?

aspera L., rauhe, 4. f. Süd- und Westeuropa.

? astracana Spgl. (? *auriculata* Spgl.), astracanische, 4. f. Astrachan.

aurea Ait., goldfarbige, 4. f. Südeuropa.

austriaca W. (*phrygia* Jacq. non L.), 4. f. Nord-, Mittel-, Ost- und Südeuropa.

β) cirrhata Rchb.

axillaris W., achselblumige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.

α) carniolica Host, β) stricta WK. γ) seusana Vill. (*variegata* Lam.). δ) Fischeri W.

babylonica L., babylonische, 4. f. b. k. Orient, Palästina.

Balsamita Lam., Frauenmünzen-F., ☉. f. Armenien, Cappadocien.

Behen L., Behen-F., ☉. f. Persien, Cappadocien.

Biebersteinii DC. (*paniculata* MB.), Bieberstein's, ☉. f. Caucasus, Bessarabien.

Calcitrapa L., Sterndistel-F., ☉. ♂. f. Europa, Taurien, Griechenland, Aegypten, Madeira.

β) autumnalis DC. (*horrida* Tènor).

calcitrapoides L., sterndistelähnliche, ☉. ♂. f. Caucasus, Persien, Palästina, Aegypten.

calocephala W., schönköpfige, 4. f. Osteuropa.

α) flava (*glauca* Dsf.). β) mixta. γ) atropurpurea WK. (*calophylla* Steudel).

canariensis Brouss. W., canarische, ⚥. k. Teneriffa.

Centaurium L., Güldenkraut-F., 4. f. Italienische Alpen.



## Centaurea

- centauroides L., güldenkrautähnliche, 4. f. Südeuropa.  
 ceratophylla Tenor. (*eriophylla* Spgl.?), hornblättrige, 4. f. Süditalien.  
 cerinthefolia Sibth. et Sm. (*Behen* Lam.), wachsblumenblättrige, 4. f. b. Griechenland, Kleinasien.  
 cheiranthifolia W. (*ochroleuca* Sims), levkoiblättrige, 4. f. Armenien, Persien, Caucasus.  
 chilensis Hook., chilesische, 4. k. Chili.  
 Cineraria L., Aschenkraut-F. 4. k. Süditalien, Nordafr.  
 cinerea Lam. (*Cineraria* Jacq.), aschfarbige, 4. f. b. k. Süditalien.  
 coerulescens W. (*maculosa*  $\beta$ . DC.), bläuliche, 4. f. k. Südeuropa, Taurien.  
 collina L. (*cicutae* fol. Horn.), Hügel-F., 4. f. b. Südeuropa, Orient.  
 coronopifolia Lam., krähensfußblättrige,  $\odot$ . f. Ostiberien.  
 Crocodylium L., syrische,  $\odot$ . f. Syrien, Creta.  
 cruenta W., blutfarbige, 4. f. ?  
 Cyanus L., Korn-F.,  $\odot$ . f. Europa.  
 dealbata W. MB., weißliche, 4. f. Caucasus, Persien.  
 declinata M. B. (*taurica* Stev.), niedergebeugte, 4. f. Taurien, Iberien.  
 decumbens DC. (*procumbens* Habl.), niederliegende, 4. f. Caucasus.  
 decurrens DC., herablaufende, 4. f. ?  
 depressa MB. (*pygmaea* Hoffm.), hinabgedrückte,  $\odot$ .  $\sigma$ . Iberien, Persien.  
 diffusa Lam. (*sabulosa* Hornem.), weitschweifige,  $\sigma$ . f. Taurien, Griechenland, Südfrankreich.  
 diluta Ait. (*elongata* Schousb., *raphanifolia* Salzm. ? *subspinosa* Roch.), hellrothe, 4. f. Nordafrika.  
 dissecta Tenor., schnitzblättrige, 4. f. Süditalien.  
 eriophora L., wolköpfige,  $\odot$ . f. Portugal.  
 eryngioides Lam., mannstreuähnliche, 4. f. b. k. Griechenland, Aegypten.  
 ferox Dsf., großstachelige, 4. f. b. k. Nordafrika.  
 flosculosa Balb., fruchtstrahlige, 4. f. Siebenbürgen, Krain, Piemont, Belgien.  
 fuscata Dsf., bräunliche, 4. f. Süditalien, Nordafrika.  
 $\beta$ ) *xanthina* Spgl. (*aurea* Hort.).  
 glastifolia L., waidblättrige, 4. f. Armenien, Caucasus, Südsibirien.  
 glomerata Vahl (*prolifera* Vent., *straminea* W.), knaulförmige,  $\odot$ . f. Aegypten.  
 Grafiana DC. (*sordida* Graf), Graf's, 4. f. Krain.  
 horrida Badaro (? *spinosa* W.), rauhe,  $\frac{1}{2}$ . k. Süditalien.  
 hybrida All. (*solstitialipaniculata* Schied.), Bastard-F.,  $\sigma$ . f. Oberitalien.  
 hyssopifolia Vahl, ysopblättrige, 4. f. Spanien.  
 Jacea L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.  
 $\beta$ ) *pratensis* Thuill. (*banatica* Hortul.).  $\gamma$ ) *decumbens* Dubois.  $\delta$ ) *mollis* Schlchr.  $\epsilon$ ) *decipiens* Thuill.  
 jacobaeaefolia Lam., jacobskrauthblättrige, 4. f. ?  
 iberica Trev., iberische,  $\odot$ .  $\sigma$ . f. Caucasus, Iberien, Armen.  
 incana Tenor., weißgraue, 4. f. Süditalien.  
 intybacea Lam., endivienähnliche,  $\frac{1}{2}$ . f. Südfrankreich.  
 $\beta$ ) *leucantha* Pourr.  
 Isnardi L., Isnard's, 4. f. Süd- und Westeuropa,  
 Kartschiana Scop., krainerische, 4. f. Oesterr. Litorale.

**Centaurea**

latisquama DC., breitschuppige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.  
 leucolepis DC., weißschuppige, 4. f. Ital., östr. Litorale.  
 leucophylla MB., weißblättrige, 4. f. Caucasus.

a) taurica (? tatarica W.), β) salonitana Vis.

lingulata Lagasc., zungenförmige, 4. f. Spanien.

linifolia L. Vahl (*linearifolia* Lam. P.), leinkrautblättrige, 4. f. Spanien.

livonica Ledeb., liefländische, 4. f. Liefland.

macrocephala W., großköpfige, 4. f. Armenien, Iberien.

maculosa Lam. (*corymbosa* Pourr.), gefleckte, ♂. 4. Südfrankreich.

margaritacea Ten., perlartige, 4. f. Taurien.

Marschalliana Spgl., Marschall's, 4. f. Caucas., Podolien.

melitensis L., maltaische, ☉. f. Süditalien, Nord- und Südafrika, Südamerika.

mexicana DC. (*grandiflora* Sessé), mexican., ☉. f. Mexico.

montana L. (*mollis* Kit.), Berg-F., 4. f. Mitteleuropa.

muricata L., weichstachelige, ☉. f. Spanien.

mutabilis St. Am., veränderliche, 4. f. Frankreich.

myacantha DC., rinnenstachelige, ☉. ♂. f. Frankreich.

napifolia L., rübsenblättrige, ☉. f. Süditalien, Griechenland, Nordafrika.

nigra L., schwarze, 4. f. Mittel-u. Südeuropa, Nordamer.

nigrescens W. (*vochinensis* Bernh., *transalpina* Schlei.), schwärzliche, 4. f. Oesterreich, Ungarn, Pyrenäen.

nitens MB. (*setifera* Lag.), glänzende, ☉. f. Caucasus.

ochroleuca W. (*leucantha* Adam.), gelbweißse, 4. f. Caucas.

orientalis L. (*tatarica* L.), morgenländische, 4. f. Taurien, Siebenbürgen, Sibirien.

ornata W., zierliche, 4. f. Spanien.

ovina Pall., Schaf-F., 4. f. Caucasus, Sibirien.

pallescens Delill., bleiche, ☉. f. Aegypten.

paniculata L., rispige, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.

parviflora Dsf., kleinblumige, ☉. f. Nordafrika, Persien.

pectinata L., kammförmige, 4. f. Ungarn, Südfrankr.

phrygia L., phrygische, 4. f. Nord-, mittel-u. südeurop. Alp.

β) nervosa W.

polyacantha W., vielstachelige, ☉. f. ?

pratensis Hornem. (? *banatica* Hort.), Wiesen-F., 4. f. Ungarn.

procumbens Balb., niederliegende, 4. f. Piemont.

procurrens Sbr., hervorlaufende, ☉. f. Palästina.

pterolopha DC. (*ovina* Hort. ruth.), flügelkelchige, 4. f. ?

pubescens W. (*incana* Dsf.), weichhaarige, 4. f. b. k. Nordafr.

pulchella Ledeb., hübsche, ☉. f. Persien.

β) glabra.

pulcherrima W., schönste, 4. f. Iberien.

pulchra (*pulcherrima* Wight et Royle), schöne, ☉. f. Ostind.

pullata L., schwarzbraune, ☉. ♂. f. Südeuropa, Orient. Nordafrika.

pumila (*mucronata* Forsk.), kleine, 4. k. Aegypt., Griechenl.

ragusina L., ragusanische, 4. k. Süddalmatien.

reflexa Lam., zurückgebogene, 4. f. Caucas., Armenien.

Reichenbachii DC. (*arenaria* Rchb.), Reichenbach's, 4. f. ? Südrussland.

rigida W. (*rigescens* Hornem.), starre, 4. f. ?

rigidifolia Bess. (*sulphurea* Lag.), steifblättrige, 4. f. ?

? rivularis Brot., Bach-F., 4. k. f. Portugal.

rupestris L., Felsen-F., 4. f. Krain, Italien.

β) adonifolia Rchb.

**Centaurea**

ruthenica Lam., russische, 4. f. Siebenb., Rußland.  
 sabulosa Ledeb., sandige, 4. f. Sibirien.  
 salicifolia MB., weidenblättrige, 4. f. Caucasus.  
 Scabiosa L., Scabiosen-F., 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.  
 β) italica P. γ) coriacea WK. δ) adpressa Ledeb.  
 sempervirens L., immergrüne, 4. f. k. Süditalien, Süd-  
 frankreich, Portugal.

Seridis L., Seridia-F., 4. f. Spanien.  
 sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien, Ural.  
 sicala L., sicilianische, 4. f. Sicilien.  
 solstitialis L., Sonnenwenden-F. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
 β) lappacea Tenor.

sonchifolia L., gänsedistelblättrige, 4. f. Italien, Frank-  
 reich, Nordafrika.

β) dimorpha DC. (bimorpha Viv.).

spathulata Tenor., spatelblättrige, 4. f. Neapel.  
 sphaerocephala L., kugelblumige, 4. f. Süditalien, Spa-  
 nien, Nordafrika.

β) romana L. (Zanonii Sebast. et Maur.).

spinosa L., dornige, 4. k. Griechenland.  
 spinosociliata Bernh. (cristata Bartl.), franzenstachelige,  
 4. Istrien.

spinulosa Roch., feinstachelige, 4. f. Banat.  
 stereophylla Bess., podolische, 4. f. Südpodolien, Odessa.  
 Steveni MB., Steven's, 4. f. Iberien.  
 sulphurea W. (Pottii Hort.), schwefelgelbe, 4. f. ?  
 tagana Broter., portugiesische, 4. k. f. b. Westeuropa,  
 Nordafrika.

tenuiflora DC. (ovina MB.), dünnblumige, 4. f. Tau-  
 rien, Caucasus.

trichacantha Spgl. (penicillata Delill., pterocephala H.  
 Monspel.), haarstachelige, 4. f. ?

trichocephala W., haarköpfige, 4. f. Südpodolien, Cauc.  
 trinervia Steph., dreinervige, 4. f. Caucasus, Taurien.

Triumfetti All., Triumfetti's, 4. f. Oberitalien.

uliginosa Brot., Sunpf-F., 4. f. b. Portugal.

uniflora L., einblumige, 4. f. Schweiz, Piemont, Südfrankr.

Verutum L., spiefsartige, 4. f. Orient.

Wiedemanniana Fisch. et Mey., Wiedemann's, 4. f. Natol.

wolgensis DC., wolgaische, 4. f. Südrußland.

Zuccariniana DC., Zuccarini's, 4. f. b. k. Griechenland.

### III. Microlonchus Cass. DC.

salmantica L. (tenella et tenuiflora Hortul.), salman-  
 tische, 4. f. Südeuropa, Mauritanien.

### IV. Crupina Cass.

Crupina L., bartsblumige, 4. f. Orient, Süd- u. West-  
 europa, Nordafrika.

altaica Fisch. (et conifera L. etc.) v. Leuzea altaica  
 conifera etc. benedicta L. vid. Cnicus benedictus.  
 cretica Spgl. v. Kentrophyllum tauricum. Galactites  
 L. v. Galactites tomentosa. lanata DC. v. Kentro-  
 phyllum lanat. nudicaulis L. et radiata L. v. Ser-  
 ratula xeranthemoides et nudic. repens L. vid.  
 Acroptilon repens Nachtr. Rhapontica L. v. Rha-  
 ponticum scariosum.

### Centotheca Desv., Stechspelze, III. II., Gramineae.

lappacea Desv., klettenähnliche, 4. f. m. w. Ostindien,  
 Societätsinseln.

### Centranthus Neck., Spornbaldrian, I. I., Valerianeae.

angustifolius DC., schmalblättriger, 4. f. Südeuropa.



**Centhranthus**

*Calcitrapa* Dufresn., portugiesischer, ☉. f. Süd- und West-europa.

*intermedius* Hortul., mittlerer (Bastard-S.), 4. f. ?

*ruber* DC., rother, 4. f. b. Südeuropa.

b) flore albo.

*Centrocarpha* D. Don v. *Rudbeckia*.

*Centroclinium* D. Don v. *Onoseris*.

*Centrospermum Chrysanthemum* Spgl. vid. *Chrysanthemum viscosum*.

**Centunculus** L., Centunkel, V. 1., Primulaceae.

*minimus* L., kleinsten, ☉. f. Europa.

**Cephaelis** Sw., Kopfbeere, V. 1., Rubiaceae.

*axillaris* Sw. (*calycina* Lindl.), achselblumige, ♀. w. Westindien, Brasilien.

*elata* Sw., (*punicea* Vahl) erhabene, ♀. w. Jamaica.

*involuta* W., großhüllige, ♀. w. Guiana.

*pedunculata* Salisb., gestielte, ♀. w. Sierra Leone.

*purpurea* W., purpurfarbige, 4. w. Guiana.

*tomentosa* Vahl, filzige, ♀. w. Südamerika, Westind.

*violacea* Sw., violette, ♀. w. Westindien, Guiana.

**Cephalanthera** Rich., Kopfbeutel, XX. 1., Orchideae.

*ensifolia* Rich., schwertblättriger, 4. f. Europa, Nordafr.

*pallens* Rich., blafsblumiger, 4. f. Europa.

*rubra* Rich., rothblumiger, 4. f. Europa.

**Cephalanthus** L., Knopfsbaum, IV. 1., Rubiaceae.

*occidentalis* L., abendländischer, ♀. f. Nordamerika.

*Cephalaria* Schrad. v. *Succisa*.

**Cephalophora** Cav., Köpfchenträger, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

*aromatica* Schrad., gewürzhafter, ☉. f. Chili.

*glauca* Cav., blaugrüner, ♂. ♀. t. w. Chili.

**Cephalotus** La Bill., Drüsenköpfchen, XI. vi., ? Rosaceae.

*follicularis* La Bill., halbfruchtiges, 4. t. Neuholland.

**Ceranthra** P. B., Hornbeutel, V. 1., Violaceae.

*subintegrifolia* P. B., fastganzblättriger, ♀. w. Guinea.

**Cerastium** L., Hornkraut, X. iv., Caryophyllaceae-Alsineae.

*alpinum* L., Alpen-H., 4. f. Europäische Alpen.

β) *lanatum* Lam. γ) *glutinosum* Koch (*Soleirolia Sering.*). δ) *glabratum* Hartm.

*argenteum* MB., silberfarbiges, 4. f. Iberien.

*arvense* L., Acker-H., 4. f. Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika.

β) *strictum* Hänke. γ) *suffruticosum* L. (*laricifolium* Vill.).

*brachypetalum* Desport. P. (*barbulatum* Wahlenb., *strigosum* Fr.), kleinkroniges, ☉. f. Europa.

*campanulatum* Viv. (*praecox* Tenor.), glockenblumiges, ☉. ♂. f. Schweiz, Italien, Ungarn.

*caucasicum* Fisch. (*elongatum* MB.), caucasisches, ☉. f. Caucasus.

*chloraefolium* Fisch. et Mey., chlorablättriges, ☉. ♂. f. Natolien.

*ciliatum* W. Kit. (*matrense* Kit.), gewimpertes, 4. f. Croatien.

*Colsmanni* Lehm., Colsmann's, 4. k. Magellanische Meerenge.

*dahuricum* Fisch. (*amplexicaule* MB.), dahurisches, 4. f. Dahurien.

*dichotomum* L., zweizinkiges, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

**Cerastium**

- ? diffusum P., ausgebreitetes, 4. f. ?  
 dioicum Ait., zweihäusiges, 4. f. Spanien.  
 fimbriatum Ledeb., gefranztes, 4. f. Sibirien.  
 frigidum MB. (*purpurascens* Adam, *collinum* Hort.), kaltes, 4. Caucasus.  
 glomeratum Thuill. (*ovale* P., *rotundifolium* Stg., Hoppe), knaulförmiges, ☉. f. Europa.  
 grandiflorum WK., großblumiges, 4. f. Ungarn.  
     β) bannaticum Roch. (? *suffruticosum* L.).  
 hirsutum Ten., rauhhaariges, 4. f. Neapel.  
 incanum Ledeb., graugrünes, 4. f. Sibirien.  
 inflatum H. C., aufgeblasenes, ☉. f. ?  
 latifolium L., breitblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
     β) glaciale Gaud. (*uniflorum* Murr.). γ) intermedium Gaud. (*flexuosum* Hegetschw.). δ) pedunculatum Gaud. (*filiforme* Schlchr.).  
 Ledebouri Spgl., Ledebour's, 4. f. Sibirien.  
 maximum L., größtes, ☉. f. Sibirien.  
 microspermum Fisch. et Mey., kleinsamiges, ☉. f. Südliches Rußland.  
 multiflorum C. A. Mey., vielblumiges, ☉. f. Südl. Rußland.  
 nemorale MB., Hain-H., ☉. f. Caucasus.  
 ovatum Hoppe (*carinthiacum* Vest.), eiblättriges, 4. f. Kärnthen, Steyermark.  
 pauciflorum Stev., wenigblumiges, ☉. f. Sibirien.  
 pennsylvanicum Hornem. (*tenuifolium* Pursh, *glutinosum* Nutt.), pennsylvanisches, 4. f. Pennsylvanien.  
 pentandrum L., fünf männiges, ☉. f. Spanien, Taurien.  
 perfoliatum L., durchwachsenes, ☉. f. Griechenland, Sibirien.  
 pilosum Ledeb., haariges, 4. f. Sibirien.  
 pubescens Gol., weichhaariges, 4. f. Nordamerika.  
 pumilum Curt. (*semidecandrum* P., *ovale* Bess.), niederiges, ☉. f. Europa.  
     β) glandulosum.  
 repens L., kriechendes, 4. f. Südeuropa.  
 ruderale MB., Schutt-H., ☉. f. Taurien.  
 rupestre Fisch., Felsen-H., ♂. f. Sibirien.  
 Scarani Tenor., Scarani's, 4. f. Neapel.  
 semidecandrum L. (*viscidum* Lk., *viscosum* P., *pellucidum* Chaub.), fünfbeuteliges, ☉. f. Europa, Nordamerika.  
     β) glutinosum Fr. (*glandulosum*). γ) macilentum Aspegren.  
 serpyllifolium MB., lavendelblättriges, ♂. f. Sibirien.  
 sylvaticum W. K., Wald-H., ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Illyrien.  
 tauricum Spgl., taurisches, ☉. f. Taurien.  
 Tenoreanum Ser. (*pilosum* Ten.), Tenore's, ☉. f. Neapel.  
 tetrandrum Curt., vier männiges, ☉. f. Nordeuropa.  
 tomentosum L. (*Biebersteinii* DC.), filziges, 4. f. Südeuropa, Taurien.  
 triviale Lk. (*vulgatum* Wahlbg. ? L.), gemeines, ☉. ♂. f. Europa.  
     β) glandulosum (*viscosum* L.). γ) holosteoides Fr.  
     *aquaticum* L. et *manticum* L. v. *Malachium aquaticum* et *manticum*.

*Cerasus* T. Juss. v. *Prunus*.

*Ceratiola* Mchx., Hornnarbe, XXI. II. (II. I.), *Tricoccae-Empetreae*.

- ericoides L., heideähnliche, ♂. k. Georgien, Florida.
- Ceratocarpus** L., Hornfrucht, XXI. 1., Aizoideae-Atripliceae.
- arenarius L., sandliebende, ☉. f. Südsibirien, Tartarei.
- Ceratocephalus** Mch., Hornköpfchen, V. VI. (XI. VII.), Ranunculaceae.
- falcatus P., sichelförmiges, ☉. f. Süd- und Osteuropa.
- orthoceras DC., gerades, ☉. f. Taurien, Südsibirien.
- Ceratochilus grandiflorus** Lod., *insignis* Lindl. et *oculatus* Lod. v. *Stanhopea grandiflora* etc.
- Ceratochloa** P. B. v. Bromus.
- Ceratonia** L., Johannisbrodbaum, V. 1. (XXIII. II.), Leguminosae-Caesalpinieae.
- Siliqua L., gemeiner, ♂. k. Südeuropa, Kleinasien, Syrien.
- Ceratopetalum** Sm., Hornblatt, X. 1. Corniculatae-Cunoniaceae.
- gummiferum Sm., gummigebendes, ♂. t. Neuholland.
- Ceratophyllum** L., Wasserhorn, XXI. IX., Ceratophylleae.
- demersum L. (*oxyacanthum* Cham.), rauhes, 4. Wass. f. Europa, Nordamerika.
- platyacanthum Chamiss., breitstacheliges, 4. Wa. f. Brandenburg.
- submersum L. (*muticum* Cham.), glattes, 4. Wa. f. Europa, Ostindien.
- Ceratopteris** Brongn., Hornfarn, XXIV. 1. Pteroidae.
- thalictroides Brongn., wiesenrautenähnlicher, 4. w. Ostind.
- Ceratosanthes** Burm., Hornblume, XXI. x. (XVI. 1.).
- tuberosa Juss., knollige, 4. Kn. Sch. Westindien.
- Cerbera** L., Schellenbaum, V. 1., Contortae-Apocynae.
- Ahovai L., brasilianischer, ♂. w. Brasilien.
- fruticosa Roxb., strauchiger, ♂. w. Pegu.
- lactaria Hamilt. (*Manghas* G.), milchender, ♂. w. Molucken.
- laurifolia Lod., lorbeerblättriger, ♂. w. Ostindien.
- Odallam Hamilt. (*Manghas* Ait.), Odallam-S., ♂. w. Ostindien.
- ovata Cav., eiförmiger, ♂. w. Neuspanien.
- Thevetia** L., Thevetia-S., ♂. w. Westindien.
- thevetioides Bonpl., thevetiaähnlicher, ♂. w. Neuspanien.
- borbonica* Spgl. v. *Ochrosia borbonica*. *chinensis* Spgl. v. *Dissolena verticillata*. *Tanghin* Bot. Reg. v. *Tanghinia veneniflua*.
- Cercis** L., Judasbaum, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
- canadensis L., kanadischer, ♂. f. b. Nordamerika.
- β) pubescens.
- Siliquastrum L., gemeiner, ♂. f. b. k. Südeuropa, Taurien, Japan.
- b) parviflorum DC. c) flore albido. d) flore roseo.
- Ceresia elegans** P. v. *Paspalum membranaceum*.
- Cereus** Juss. Haw., Fackeldistel, XII. 1., Cactaeae.
- abnormis Swt. (W.), (*monstrosus* Dsf.), abweichende, ♂. w. Südamerika.
- acutangulus Otto (*undulatus* Hort.), spitzkantige, ♂. w. Südamerika.
- albispinus Salm. (*octogonus* Hort.), weißstachelige, ♂. w. Südamerika.
- armatus Otto (*Royeni* Hort.), bewaffnete, ♂. w. Südamer.
- aureus Salm., goldfarbige, ♂. w. Südamerika.
- azureus Parmentier, azurblaue, ♂. w. Südamerika.
- Baxaniensis Karwinsk, baxaniensische, ♂. w. Mexico.
- Bonplandii Parm., Bonpland's, ♂. w. Südamerika.



## Cereus

- candicans Gill. (*Montezumae* Hort.), weifslliche, ♀. w. Südamerika.
- chilensis Colla (*subrepandus*, *pyramidalis* Hort.), chile-sische, ♀. w. Chili.
- β) tenuispinus Haw,
- cinerascens DC. (*Deppei* Otto), aschfarbige, ♀. w. Mexico.
- β) acinaciformis.
- coccineus Salm., scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.
- coerulescens Salm. (*Mendory* Hort.), bläuliche, ♀. w. Südamer.
- conicus Otto, kegelförmige, ♀. w. Südamerika.
- crenulatus Lk. Salm., gekerbte, ♀. w. Westindien.
- cylindricus Haw., cylinderförmige, ♀. w. Peru.
- divaricatus Lum. (? *fimbriatus* Hort.), sparrige, ♀. w. Sdamer.
- divergens Otto (? *imbricatus* Haw., *monoclonus* Hort.), divergirende, ♀. w. Südamerika.
- eburneus Salm. (*peruvianus* W., *coquimbanus* Hort., *polygonatus* Hort.), elfenbeinweise, ♀. w. Südamerika.
- erectus Karw, aufrechte, ♀. w. Mexico.
- eriphorus Otto (*cubensis* Zucc., *subrepandus* Hort.), woll-tragende, ♀. w. Südamerika.
- β) laetevirens Salm.
- extensus Salm., ausgestreckte, ♀. w. ? Südamerika.
- flagelliformis Mill., peitschenförmige, ♀. w. Südamerika.
- β) minor.
- flagriformis Zucc., geißelförmige, ♀. w. Südamerika.
- flavispinus Haw., gelbstachelige, ♀. w. Westindien.
- glaucus Salm., blaugrüne, ♀. w. Südamerika.
- gracilis Haw. Salm. (*humilis* DC., *myriacaulon* Hort., *Mariculi* Hort.), schlanke, ♀. w. Südamerika.
- grandiflorus Mill., großblumige, ♀. w. Jamaica.
- griseus Haw. (*polygonatus* Hort.), grauliche, ♀. w. Südamer.
- hexagonus Haw., sechskantige, ♀. w. Südamerika.
- Hystrix Salm, Haw., starkstachelige, ♀. w. Südamer.
- Jamacaru Pison, (*laetevirens* Hort., *glaucus* Hort.), ♀. w. Südamerika.
- lanuginosus Haw., wollige, ♀. w. Südamerika.
- leptophis DC., lockerstachelige, ♀. w. Südamerika.
- lividus Pfeiff. (*Parotetti* Hort.), bräunliche, ♀. w. Südamer.
- marginatus DC. (*incrustedatus* Lk. Otto, *cupulatus* Hage), gerandete, ♀. w. Südamerika.
- β) gemmatus Zucc.
- Martianus Zucc., Martius's, ♀. w. Brasilien.
- multangularis Haw., vielkantige, ♀. w. Südamerika.
- β) ochrocanthus.
- Napoleonis Grah., Napoleon's, ♀. w. Südamerika.
- niger Haw., schwarze, ♀. w. ? Südamerika.
- nobilis Haw. (*recurvus* Mill.). edle, ♀. w. Westindien.
- nycticalus Lk. et Otto (*pteranthus* Otto, *brevispinus* Salm, *Antoini* Hort., *rosaceus* Hort., *obtusus* Hort.), nächtliche, ♀. w. Südamerika.
- Olfersii Lk. et Otto Olfer's, ♀. w. Brasilien.
- ovatus G. Don, eiförmige, ♀. w. Chili.
- pellucidus Otto, durchschimmernde, ♀. w. Südamerika.
- pentagonus Haw. (*reptans* Hort.), fünfkantige, ♀. w. Sdamer.
- pentalophus DC., (*propinquus* Salm.), fünfsamige, ♀. w. Mexico.
- β) leptacanthus DC. (*subarticulatus* Pfeiff.).
- peruvianus (DC. L.), *heptagonus* Hort. et ? *hexagonus* Hort., peruvianische, ♀. w. Südamerika.
- platyacanthus Pfeiff., breitstachelige, ♀. w. Südamerika.

**Cereus**

- polygonus (Lam.), vielkantige, ♀. w. Hispaniola.  
 prismaticus (W.), prismatische, ♀. w. Südamerika.  
 radicans DC. (biformis Hort.), wurzelnde, ♀. w. Südamer.  
 ramosus Karw., ästige, ♀. w. Mexico.  
 reductus Lk. (*Haworthii* DC., *nobilis* Mill.), zurückgekrümmte, ♀. w. Südamerika.  
 repandus (L.), ausgeschweifte, ♀. w. Westindien.  
 roridus Otto, bereifte, ♀. w. Südamerika.  
 Royeni Haw. (L.), *gloriosus* Hort., Royen's, ♀. w. Südamer.  
 Schrankii Zucc., Schrank's, ♀. w. Südamerika.  
 Scopa (Spgl.), Scopa-F., ♀. w. ?Südamerika.  
 senilis DC. (*Bradypus* Lehm.), greise, ♀. w. Mexico.  
 serpentinus Lag., Schlangen-F., ♀. w. Südamerika.  
 setaceus Salm., borstige, ♀. w. Brasilien.  
 speciosissimus (Dsf.), (*speciosus* Haw. Dsf.), prächtige, ♀. w. Mexico.  
 splendidus Paxt., ansehnliche, ♀. w. Mexico.  
 spinibarbis H. Berol, bartige, ♀. w. Südamerika.  
 spinulosus DC., feinstachelige, ♀. w. Südamerika.  
 strictus (W.), (*mollis*, *nigricans*, *repandus spin. aureis* Hort.), steife, ♀. w. Südamerika.  
 strigosus Salm. (*myriophyllus* G. M.), striegelige, ♀. w. Südamerika.  
 tenuis Salm., dünne, ♀. w. Brasilien.  
 tetragonus Haw. (L.), (*quadrangularis* Hort.), vierkantige, ♀. w. Südamerika.  
 tilophorus Pfeiff. (*retroflexus* Hort.), zurückgebogene, ♀. w. Südamerika.  
 triangularis Haw. (L.), dreikantige, ♀. w. Westindien.  
     β) variegatus.  
 tripteris Salm., dreiflügelige, ♀. w. ?Südamerika.  
 triquetter Haw. (? *trigonus* Haw.), dreiseitige, ♀. w. Südamer.  
 validus Haw., starkstachelige, ♀. w. Südamerika.  
 variabilis Pfeiff.,  
     (? *polymorphus* G. Don), *Pitaiaya* Jacq., *rosaceus*,  
     *formosus*, *grandis*, *obtus*, *cognatus* H. Vindob.,  
     *affinis et prismatiformis* Hort.), veränderliche, ♀. w. Südamerika.  
 virens DC. (*affinis* H. Berol.), grünliche, ♀. w. Südamer.  
     Engl. Hybrid: *Colvillii* Swt., *Mallisonii* Hort., *Vandesii* Hort. Hinsichtlich der übrigen s. *Epiphyllum* et *Lepismium*.

**Cerinth** T., Wachsblume, V. I., Asperifoliaceae.

- alpina Kit. (*quinquemaculata* Wahlbg., *suevica* Mart., *glabra* Gaud., 4. f. Ungarn, Oesterreich, Süddeutschland, Schweiz.  
 aspera Roth, rauhe, ♂. f. Südeuropa.  
 maculata L., gefleckte, ♂. f. Südeuropa, Taurien.  
 major L. (*glabra* DC., *glauca* Mch.), große, ♂. f. Süddeutschland.  
 minor L., kleine, ♂. f. Ost-, Mittel- und Südeuropa.  
 retorta Sm., zurückgekrümmte, ♂. f. Griechenland, Kleinasien.

**Ceropegia** L., Leuchterblume, V. II. Asclepiadeae.

- acuminata Roxb., zugespitzte, 4. Kn. w. Ostindien.  
 africana RB., afrikanische, 4. Sch. t. w. Cap d. g. H.  
 aphylla Haw., blattlose, 4. ♀. Sch. t. w. Canarische Ins.  
 australis Lod., südliche, 4. ♀. Sch. t. w. ?Neuholland.  
 bulbosa Roxb., zwiebelige, 4. Kn. Sch. w. Ostindien.

**Ceropegia**

- dichotoma Haw., zweizinkige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 elegans Wall., zierliche, 4. Sch. w. Ostindien.  
 juncea Roxb., binsenförmige,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.  
 Lushii Grah., Lush's, 4. Kn. Sch. w. Ostindien.  
 stapeliaeformis Haw., stapelienförmige, 4.  $\frac{1}{2}$  t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 tuberosa Roxb., knollige, 4. Kn. w. Ostindien.  
 Wightii Grah., Wight's, 4. Sch. w. Ostindien.  
*sagittata* L. et ? *sinuata* Poir v. *Microloma sagittat.*  
 et *Microlom. linear.*

*Cestrinus carthamoides* Cass. v. *Rhaponticum acaule.*

**Cestrum** L., Hammerstrauch, V. I. Solanaceae.

- acuminatum Swt., zugespitzter,  $\frac{1}{2}$  t. Mexico.  
 alaternoides ? Poir., wegdornähnlicher,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad.  
 angustifolium Lod., schmalblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 auriculatum L'Her., geöhrt,  $\frac{1}{2}$  w. Peru.  
 bracteatum Grah., deckblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 cauliflorum Jacq., stamblumiger,  $\frac{1}{2}$  w. Martinique.  
 citrifolium Retz., citronenblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 confertum R. et Pav., dichtblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Peru.  
 diurnum L., Tag-H.,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 exstipulatum Ledeb., achselblattloser,  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 fastigiatum Jacq., gipfelständiger,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 foetidissimum Jacq., stinkender,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 hirtum Sw., kurzhaariger,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.  
 latifolium Lam., breithblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad.  
 laurifolium L'Her., lorbeerblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 macrophyllum Vent., großblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 nocturnum L., nächtlicher,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien, Südamer.  
 odontospermum Jacq., gezahntsamer,  $\frac{1}{2}$  w. ? Westind.  
 Parqui L., chilesischer,  $\frac{1}{2}$  k. Montevideo, Chili.  
 pendulinum Jacq., überhängender,  $\frac{1}{2}$  w. Neu-Granada.  
 salicifolium Jacq., weidenblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 suberosum Jacq., korkiger,  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 tinctorium Jacq., färbender,  $\frac{1}{2}$  w. Caracas.  
 tomentosum L., filziger,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 undulatum R. et P., wellenblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Peru.  
 venenatum Thbg., giftiger,  $\frac{1}{2}$  k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 vespertinum L., Abend-H.,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
*campanulatum* Lam. v. *Atropa arborescens. lycoi-*  
*des* Lichtenst. v. *Lycium cinereum.*

**Ceterach** W., Milzfarn, XXIV. I. Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- officinarum W., officineller, 4. k. f. Mittel-, Süd- und  
 Westeuropa, Nordafrika.

**Chaenanth** Lindl., Chaenanth, XX. I. Orchideae.

- Barkeri Lindl., Barker's, 4. w. Para.

**Chaerophyllum** T., Kälberkropf, V. II. Umbelliferae.

- angelicaefolium MB., angelicablättriger, 4. f. Caucasus.  
 aromaticum L., wohlriechender, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
 aureum L., goldfarbiger, 4. f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.  
 $\beta$ ) *maculatum* W.  $\gamma$ ) *monogonum* Kit. (? *angu-*  
*latum* Kit. et *ciliatum* R. et S. Auctor).  
 Biebersteinii R. et S., Bieberstein's, 4. f. Caucasus.  
 bulbosum L., knolliger,  $\frac{1}{2}$  f. Europa, Nordasien.  
 capense Thbg., capischer,  $\frac{1}{2}$  f. Cap der guten Hoffn.  
 coloratum L., farbiger, 4. f. Dalmatien.  
 elegans Gaud., zierlicher, 4. f. Wallis.



**Chaerophyllum**

- gracile Bess. Trev. (*Cyminum* Fisch.), schlanker, 4. f. ?  
 hirsutum L., rauhhaariger, 4. f. Mitteleuropa.  
 humile MB., niedriger, 4. f. Iberien.  
 nodosum Lam., knotiger, ☉. f. Südeuropa.  
 procumbens Lam., niedergestreckter, ☉. f. Virginien.  
 roseum MB. (*tenuifolium* Stev.), rosafarbener, 4. f.

Armenien, Caucasus.

- temulum L., betäubender, ♂. f. Europa.  
 tenuifolium Poir., feinblättriger, ♂. f. b. Marocco.  
 torquatum DC., gelenkiger, ♂. f. Südfrankreich.  
 Villarsii Koch (*Cicutaria* Rchb.), Villars's, 4. f. Mittel-

europäische Alpen.

- canadense* P. et *Claytoni* P. v. *Conopodium canad.*  
 etc. *sativum* C. Bauh. et *sylvestre* L. v. *Anthriscus* Cerefol. et *sylvestr.*

*Chaetachlaena* odorata D. Don v. *Onoseris* odorata.

**Chaetanthera** R. et Pav., Schweifbeutel, XIX. II.

Compositae-Eupatorineae.

- chilensis* DC., chilesischer, 4. k. t. Chili.  
*ciliata* R. et P., gefranzter, ☉. f. Chili.  
*incana* Poepp. (*chilensis* Hook. et Arn.), graugrüner, ☉. f. Chili.

- multicaulis* DC. (*flabellata* Don), vielstengeliger, ☉. f. Chili.  
*serrata* R. et P., sägezahniger, 4. k. t. Chili.

*Chaetaria coerulescens* P. B. etc. v. *Aristida coerulescens* etc.

**Chaetocalix** DC. (*Böninghausia* Spgl.), Schweifkelch, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- vincentina* DC., St. Vincent's, ♂. Sch. w. Westindien.

**Chaetogastra** DC., *Chaetogastra* X. I., Lythraeae-Melastomaceae.

- gracilis* Hook., schlanke, 4. w. Brasilien.  
*lanceolata* DC., lanzettblättrige, ☉. w. Trinidad.

**Chaetospora** RB., Schweifried, III. I., Cyperoidae.

- circinalis* Schrad., eingerolltes, 4. k. t. Cap d. gut. H.  
*dispar* (Spgl.), ungleiches, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*turbinata* RB., aufgetriebenes, 4. k. t. Cap d. gut. H.

**Chaeturus** Lk., Schweifgras, III. II., Gramineae.

- fasciculatus* Lk., büschelförmiges, ☉. f. Spanien, Portugal.

**Chailletia** DC. (M. Chaillet, schweizerischer Botaniker), V. II., Amyrideae-Chailletieae.

- Toxicaria* G. Don, giftige, ♂. w. Sierra Leone.

**Chamaedorea** W., Bergpalme, XXII. VI. (VI. III.), Palmae.

- elatio* H. Berol., hohe, ♂. w. Mexico.  
*elegans* H. Berol., zierliche, ♂. w. Mexico.  
*fragrans* Mart., wohlriechende, ♂. w. Peru.  
*gracilis* W., schlanke, ♂. w. Südamerika.  
*Schiedeana* H. Berol., Schiede's, ♂. w. Mexico.

**Chamaelirium** W., Zwergglilie, VI. I., Colchicaceae.

- carolinianum* W., carolinische, 4. f. Nordamerika.

*Chamaenerion* T. v. *Epilobium*.

**Chamaepeuce** Pr. Alp. DC., Sterndistel, XIX. I.

Compositae-Cynarocephalae.

- afra* DC., afrikanische, ♂. f. k. Griechenland, Nordafrika.  
*Casabonae* DC., Casabonische, ♂. k. Süditalien.  
*cynaroides* DC., artischockenähnliche, ♂. f. k. Creta, Ostcaucasien.

- diantha* DC., zweistachelige, ♂. f. k. Syrien.

**Chamaepeuce**

- echinocephala* DC., stachelköpfige, 4. f. Taurien, Caucasus.  
*fruticosa* DC., strauchige, 7. k. Griechenland.  
*gnaphalodes* DC., ruhrkrautähnliche, 7. k. Neapel.  
*mutica* DC., unbewehrte, 7. k. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.  
*stellata* DC., gemeine, 10. f. Ober- u. Süditalien, Orient.  
*stricta* DC., steife, 4. f. b. k. Neapel.

**Chamaerops** L., Zwergpalme, VI. III. (XXIII. II.), Palmae.

- excelsa* Wall., hohe, 7. w. t. Nepal.  
*gracilis* Lod., schlanke, 7. w. Südamerika.  
*guianensis* Lod., guianische, 7. w. Guiana.  
*humilis* L., gemeine, 7. t. w. Südeuropa, Nordafrika.  
*Hystrix* Fras., starkstachelige, 7. t. w. Georgia (Nordamer.).  
*Palmetto* Mchx., graugrüne, 7. t. w. Carolina, Florida.  
*serrulata* Mchx., feingesägte, 7. t. w. Georgia.  
*excelsa* Thbg. v. *Rhapis flabelliformis*.

**Chamagrostis minima** Borkh. v. *Mibora verna*.**Chamissoa** Humb. B. K. (A. Chamisso, berühmter Reisender und Botaniker zu Berlin), V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.

- altissima* H. B. K., hohe, 7. w. Westindien, Südamer.  
*muricata* Spgl. v. *Cladostachys frutescens*.

**Chamorchis** Rich. (*Chamaerepes* Spgl.), Zwergstendel, XX. I. Orchideae.

- alpina* Rich., Alpen-Z., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.

**Chaptalia** Vent. (M. Chaptal, berühmter französischer Chemiker, XIX. IV., Compositae-Eupatorieae).

- tomentosa* Vent., filzige, 4. f. b. k. Carolina, Florida.  
*Anandria* Spgl. vid. *Anandria Bellidiastrum*  $\beta$ . *lyrata* Spgl. v. *Anandria Bellidiastrum* a.

**Chardinia** Dsf., *Chardinia*, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- xeranthemoides* Dsf., strohblumenähnliche, 10. f. Armenien, Syrien, Persien.

**Charieis Neesii** Cass. v. *Kaulfussia amelloid*.**Charlwoodia** Swt. (G. Charlwood, englischer Botaniker), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

- australis* G. Don, südliche, 7. t. Neuzeeland.  
*congesta* Swt., gedrängtblumige, 7. t. Neuholland.  
*indivisa* G. Don, ungetheilte, 7. t. Neuzeeland.  
*stricta* Swt., steife, 7. t. Neuzeeland.

**Chasmonia** Lindl., Stachelkelch, XIV. I., Labiatae.

- incisa* Lindl., schlitzblättriger, 10. f. Calabrien, Griechenland.

**Cheilanthes** Sw., Schuppenfarn, XXIX. I., Pteroideae (*Polypod.*).

- angustifolia* H. B. K., (*decomposita* W.), schmalblättriger, 4. w. Mexico.  
*capensis* Sw., capischer, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.  
*caudata* RB., geschwänzter, 4. w. t. Neuholland.  
*crenulata* Lk. et Otto, gekerbter, 4. w. ? Südamerika.  
*cuneata* Lk. et Otto, keilförmiger, 4. w. ? Südamerika.  
*dicksonioides* J. Bevis, dicksonienähnlicher, 4. w. ?  
*ferruginea* W., rostfarbiger, 4. w. Peru.  
*fragrans* Sw., wohlriechender, 4. t. w. Madeira, Ostind.

**Cheilanthes**

- gracilis* Kaulf., schlanker, 4. f. k. Canada.  
*hirsuta* H. Berol., rauhhaariger, 4. w. Mexico.  
*hirta* Sw., kurzhaariger, 4. w. t. Cap der gut. Hoffn.  
*lendigera* Sw. (*elegans* Desv.), körnertragender, 4. w.  
 Neuspanien, Quito, Chili.  
*macrophylla* J. Bevis, großblättriger, 4. w. Westind.  
*micromera* H. Berol., feiner, 4. w. Mexico.  
*microphylla* Sw., kleinblättriger, 4. w. Westindien.  
*micropteris* Sw., kleiner, 4. w. Quito, Montevideo.  
*myriophylla* Desv., vielzertheilter, 4. w. Südamerika.  
*odora* Sw., riechender, 4. t. k. Schweiz, Italien, Südfrankreich.  
*profusa* Kunze, großer, 4. t. w. Cap der gut. Hoffn.  
*pteroides* Sw., saumfarnähnlicher, 4. t. w. C. d. g. H.  
*repens* Kaulf., kriechender, 4. w. Westindien.  
*rufa* Don, braunrother, 4. w. Nepal.  
*rufescens* Lk., bräunlicher, 4. w. Mexico.  
*sinuosa* J. Bevis, buchtiger, 4. w. Westindien.  
*spectabilis* Kaulf., ansehnlicher, 4. w. Brasilien.  
*suaveolens* Sw., starkkriechender, 4. t. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.  
*tenuifolia* Sw., feinblättriger, 4. w. Ostindien, Neuholland, Inseln des stillen Meeres.  
*tomentosa* H. Berol., filziger, 4. w. Mexico.  
*vestita* Sw., bekleideter, 4. t. w. Pennsylvanien, Carolina.

**Cheiranthus** L., Lack, XV. III., Cruciferae.

- alpinus* L., Alpen-L., 4. f. Scandinavien.  
*Cheiri* L., Gold-L., ♂. ♀. f. k. Mittel- u. Südeuropa.  
 β) *fruticulosus* L.  
 Garten-Varietäten: *ferrugineus*, *flavescens*, *flore pleno*, *grandiflorus*, *haemanthus*, *maximus*, *patulus*, *purpurascens*, *purp. variegatus*, *sanguineus*, *serratus*, *thyrsoides*, *variegatus*, *varius* etc.  
*linifolius* P., leinblättriger, ♀. k. Spanien.  
*mutabilis* L'Her., veränderlicher, ♀. 4. t. k. Canar. Inseln.  
 β) *longifolius* Vent.  
*scoparius* Brouss., besenartiger, ♀. 4. t. k. Teneriffa.  
 β) *aeruginosus* DC. γ) *chamaeleo* Ker.  
*semperflorens* Schousb. (*linearis* Vent.), immerblühender, ♀. 4. t. k. Barbarei.  
 β) *frutescens* P.  
*tenuifolius* L'Her., feinblättriger, ♀. 4. k. t. Madeira.  
*annuus* L. etc. v. *Matthiola annua*. *cuspidatus* MB. (*bithymicus* P.) etc. v. *Erysimum cuspidat. lyratus* Sibth. Sm., *maritimus* L. v. *Malcolmia lyrat. maritima* etc.  
*mollis* Hornem. vid. *Arabis albid. pinnatifidus* W. v. *Andreoskia pectinata*. *tomentosus* W. et *torulosus* MB. vid. *Sterigma toment.* etc. Hinsichtlich der meisten übrigen s. *Erysimum* und *Matthiola*.

**Cheirostemon** Humb. Bonpl., Fingerbaum, XVI. VI., Malvaceae-Sterculiaceae.

- platanoides* Humb., Bonpl., platanenblättriger, ♀. w. Neuspanien.

**Cheirostylis** Lindl., Fingerstendel, XX. I., Orchideae.

- parvifolia* Lindl., kleinblättriger, 4. w. Ceylon.

**Chelidonium** T., Schöllkraut, XIII. I., Papaveraceae.

- grandiflorum* DC. (*dahuricum* Hort.), großblumiges, 4. f. Dahurien.



**Chelidonium**

laciniatum Mill., schlitzbblätteriges, 4. f. Südeuropa.

majus L., gemeines, 4. f. Europa.

b) flore pleno.

Hinsichtlich der übrigen s. Glaucium et Roemeria.

**Chelone L., Schildblume, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.**

barbata Cav. (*formosa* Wendl., *ruelloides* Andr.), bärtige, 4. f. b. k. Mexico.

β) major.

centranthifolia Benth., spornbaldrianblättrige, 4. f. Californien.

glabra L., glatte, 4. f. Nordamerika.

Lyoni Pursh. (*major* Ker), Lyon's, 4. f. Carolina.

nemorosa Dougl., Hain-S., 4. f. Nordwestl. Amerika.

obliqua L., schiefe, 4. f. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. Pentstemon.

*Chenolea diffusa* L. v. *Kochia sericea*.

**Chenopodium T., Gänsefuß, V. II., Aizoideae-Atripliceae.**

acuminatum W., zugespitzter, ☉. f. Sibirien.

album L. (*leiospermum* DC.), weißlicher, ☉. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.

β) glomerulosum Rchb. γ) paganum Rchb. δ) viride L.

ambrosioides L., wohlriechender, ☉. f. Mittel- u. Südamerika, Cap d. g. H., Mittel- und Süddeutschland.

anthelminticum L., wurmtreibender, ♂. 4. k. Nord- u. Südamerika.

aristatum L., gegrannter, ☉. f. Sibirien, Virginien.

Atriplicis L., Melden-G., ☉. f. China.

Biebersteinianum R. et S., Bieberstein's, ☉. f. Caucasus.

Bonus Henricus L., Dorf-G., 4. f. Europa.

botryoides Sm., traubenähnlicher, ☉. f. England.

Botrys L., Trauben-G., ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südasien, Nordamerika.

carthagenense Zucc., neuspanischer, ☉. f. Südamerika.

caudatum Jacq., geschwänzter, ☉. f. m. Guinea.

ficifolium Sm. (*serotinum* Huds.), feigenblättriger, ☉. f. Deutschland, England.

foetidum Schrad. (*Schraderianum* R. et S.), stinkender, ☉. f. ? Südeuropa.

giganteum D. Don, riesenhafter, ☉. f. Nepal.

glaucum L., blaugrüner, ☉. f. Europa.

graveolens W. (*incisum* Poir.), starkkriechender, ☉. f. Mexico.

hircinum Schrad., Bock's-G., ☉. f. Brasilien.

humifusum Zuc., gestreckter, ☉. f. ?

hybridum L., Bastard-G., ☉. f. Europa, Asien, Nordamer.

lanceolatum W., lanzettblättriger, ☉. f. Nordamerika.

laterale Ait., seitenblumiger, ☉. f. Canarische Inseln.

leiospermum Schrad., weißsämiger, ☉. f. Chili.

marginatum Hornem., gerandeter, ☉. f. ?

multifidum L., vieltheiliger, 4. k. Südamerika.

murale L., Mauer-G., ☉. f. Europa, Asien, Afrika, Amer.

β) guinense Jacq.

opulifolium Schrad. (*microspermum* Wallr., *concatenatum* Thuill.), wasserholderblättriger, ☉. f. Europa.

patulum Roth, ausgebreiteter, ☉. f. Ostindien.

petiolare H. B. K., gestielter, ☉. f. Quito.

**Chenopodium**

*polyspermum* L., vielsamiger, ☉. f. Europa.

β) *acutifolium* Kit.

*punctulatum* Scop., punctirter. ☉. f. ?

*Quinoa* W., *Quinoa-G.*, ☉. f. Südamerika.

b) *rubrum*.

*rubrum* L. (*blitoides* Lej., *crassifolium* Hornem.), rother, ☉. f. Europa.

*sepium* Mayer, Zaun-G., ☉. f. Böhmen, Mähren.

*serotinum* L., spätblühender, ☉. f. Westeuropa, Sibirien.

*suffruticosum* W., halbstrauchiger, ♀. 4. Pensylv., Mexico.

*triangulare* RB., dreieckiger, ☉. f. Neuholland.

*Tournefortianum* Fisch., *Tournefort's*, ☉. f. Armenien.

*urbicum* L. (*melanospermum* Wallr., *chrysomelanospermum* Balb.), Stadt-G., ☉. f. Europa.

β) *rhombifolium* Mdhlg. (*intermedium* Koch).

*Vulvaria* L. (*foetidum* Lam., *olidum* Sm.), übelriechender, ☉. f. Europa.

*altissimum* RB. v. *Schanginia altissima*. *arenarium* Flor. Wett. (et *hirsutum* Wahlbg. etc.) v. *Kochia arenaria* etc. *baccatum* La Bill. vid. *Rhagodia Billardieri*. *crassifolium* Dsf. vid. *Cochliospermum Cavanillesii*. *hortense* R. et S. vid. *Suaeda hortensis*. *maritimum* L. etc. v. *Schoberia maritima* etc.

**Cherleria** L. (J. H. Cherler, Gehilfe von Johann Bauhin), X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

*sedoides* L., sedumähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Schottland.

*octandra* Sbr. (*imbricata* Sering.) v. *Alsine aretioides*.

*Chilochloa* P. B. v. *Phleum*.

**Chilophyllum** DC., Garbenchamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*globosum* DC., kugelblumige, 4. k. t. Mexico.

**Chilodia** RB., Lippenzahn, XIV. I., Labiatae.

*scutellarioides* RB. (*australis* Hort.), schildkrautähnlicher, ♀. t. Neusüdwallis.

**Chiloglottis** RB., Zungenstendel, XX. I., Orchideae.

*diphylla* RB., zweiblättriger, 4. Kn. w. t. Neuholland.

**Chilopsis** D. Don, Lippenmaske, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

*saligna* D. Don, weidenblättrige, ♀. t. Mexico.

*Chimaphila* Pursh v. *Pyrola*.

**Chimonanthus** Lindl., Winterblume, XII. III., Calycanthaceae.

*fragrans* Lindl. (*praecox* Lk.), wohlriechende, ♀. f. b. k. Japan, China.

β) *grandiflorus* Lindl. γ) *luteus*. δ) *parviflorus*.

**Chiococca** P. Br., Schneebeere, V. I., Rubiaceae.

*anguifuga* Mart. (*paniculata* Hoffmannsegg), rispenblumige, ♀. w. Brasilien.

*racemosa* L., traubenblumige, ♀. w. Westind., Südamer.

**Chionanthus** L., Schneeflockenbaum, II. I., Sapotaceae-Oleinae.

*axillaris* RB., achselblumiger, ♀. t. Neuholland.

*virginica* L., virginischer, ♀. f. Nordamerika.

β) *latifolia* Catesb. (*montana* Pursh). γ) *angustifolia* Ait. (*trifida* Mch.). δ) *maritima* Pursh Lod.

- Chironia** L., Chironie, V. I., Contortae-Gentianeae.  
*baccifera* L., beerentragende, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*decussata* Vent., kreuzblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*frutescens* L., strauchige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 β) *angustifolia* Bot. mag. (? *grandiflora* Hort.)  
 γ) *albiflora* Hort.  
*jasminoides* L., jasminblumige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.  
*linoides* L., leinblättrige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.  
*lychnoides* L., lychnisartige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.  
*nudicaulis* L., nackstengelige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*peduncularis* Lindl. (*Barclayana* et *trinervia* Hortul.), gestielte, 4. ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*tetragona* L., vierkantige, 4. ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*Centaurium* L. etc. v. *Erythraea* Cent. etc. *gracilis* Mchx. v. *Sabbatia gracilis* etc.
- Chitonia albicans** D. Don etc. v. *Diplochita albicans* etc.
- Chlidanthus** Herb., Weichblume, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.  
*fragrans* Lindl., wohlriechende, 4. Zw. w. Chili.
- Chloanthes** RB., Grünling, XIV. II., Verbenaceae.  
*glandulosa* RB., drüsiger, ♀. t. Neuholland.  
*rosmarinifolia* Cunn., rosmarinblättriger, ♀. t. Neuholl.  
*Stoechadis* RB., stoechasblättriger, ♀. t. Neuholland.
- Chlora** L., Chlore, VIII. II., Contortae-Gentianeae.  
*imperfoliata* L., undurchwachsene, ☉. f. Oberitalien.  
*perfoliata* L., durchwachsene, ☉. f. England, Mittel- und Südeuropa.  
*serotina* Koch (*acuminata* Koch et Ziz.), spätblühende, ☉. f. Süddeutschland.
- Chloraea** Lindl., Grünstendel, XX. I., Orchideae.  
*longibracteata* Benth., deckblättriger, 4. w. Chili.
- Chloranthus** Sw., Grünblume, IV. I. (XX. III.), Sandalaceae-Chlorantheae.  
*elatio* RB., erhabene, ♀. t. w. China.  
*inconspicuus* Sw., unansehnliche, ♀. t. w. China, Japan.  
*monander* RB., einmännige, ♀. t. w. China.  
*monostachys* Lindl., einährige, ♀. 4. t. w. China.
- Chloris** Sw., Chloris, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.  
*barbata* Sw. (*caribaea* Spgl.), bärtige, ☉. w. Westindien, Südamerika.  
*ciliata* Sw., gefranzte, ☉. w. Westindien, Südamerika.  
*elegans* H. B. K., zierliche, ☉. w. f. Mexico.  
*fasciculata* Schrad., büschelförmige, ☉. w. Brasilien.  
*gracilis* Durand. (*Durandiana* R. et S.), schlanke, ☉. w. f. Mexico.  
*inflata* Lk., aufgeblasene, 4. k. t. Californien.  
*polydactyla* Sw. (*compressa* DC.), vielährige, ☉. w. Westindien, Südamerika.  
*polystachya* Roxb. (*Roxburghiana* R. et S.), Roxburgh's, ☉. w. Ostindien.  
*pubescens* Lagasc., weichhaarige, ☉. w. ? Peru.  
*radiata* Sw. (*pallida* W.), strahlige, ☉. w. f. Westindien, Cap der guten Hoffnung.  
*retusa* Lag., eingestutzte, ☉. m. f. Bonarische Inseln.  
*submutica* H. B. K. (*imberbis* DC.), unbewehrte, ☉. w. f. Mexico, Brasilien.  
*truncata* RB. (*doligostachya* Lag., *elongata* Poir., *megastachya* Schrad.), abgestutzte, 4. w. Neuh., Philippinen.  
*ventricosa* RB., bauchige, 4. t. Neuholland.



**Chloris**

- curtipendula* Mchx. vid. *Atheropogon apludoides*.  
*monostachya* W. vid. *Chondrosium tenue*. *petraea*  
 Thbg. v. *Eustachys petraea*. *poaeformis* H. B. K.  
 v. *Leptochloa virgata*.

**Chlorophytum** Ker, Grünlilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*elatum* RB., erhabene, 4. t. Cap d. g. Hoffnung.

*inornatum* Ker, ungezierte, 4. w. Sierra Leone.

*Orchidastrum* Lindl., orchisähnliche, 4. w. Sierra Leone.

**Chloroxylon** DC., Grünholz, X. 1., Hesperideae-Cedreleae.

*Swietenia* DC., van Swieten's, 5. w. Ostindien.

**Choisya** H. B. K. (J. D. Choisy, Genfer Botaniker), X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*ternata* H. B. K., dreizählige, 5. w. Mexico.

**Chomelia** Jacq. (J. B. Chomel, französischer Naturforscher), IV. 1., Rubiaceae.

*fasciculata* Sw., büschelförmige, 5. w. Jamaica.

*spinosa* Jacq., dornige, 5. w. Caracas.

*Chona* D. et G. Don v. *Erica*.

**Chondrilla** L., Knorpelsalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*aspera* Poir., rauher, ♂. f. ?

*brevirostris* Fisch. et Mey. (*juncea* Ledeb.), kurzschnebeliger, ♂. f. Altai.

*graminea* MB., grasartiger, 4. f. Caucasus.

*juncea* L., gemeiner, ♂. f. Europa, Sibirien.

β) *rigens* Rchb. (*latifolia* Koch, *Gaudini* Hegetsch. *virgata* Presl). γ) *acantophylla* Wallr.

*latifolia* MB., breitblättriger, ♂. f. Taurien, Griechenl.

*pauciflora* Ledeb., wenigblumiger, 4. f. Sibirien.

*prenanthoides* Vill., hasenlattichartiger, 4. f. Baiern, Krain, südliche Schweiz.

*stricta* Ledeb., steifer, ♂. f. Taurien.

**Choretis** Herb., Choretis, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*glaucula* Herb., blaugrüne, 4. Zw. w. Mexico.

**Chorisporea** DC., Griffelrettig, XIX. 1., Cruciferae.

*iberica* DC., iberischer, ♂. f. Ostcaucasus.

*sibirica* DC., sibirischer, ♂. f. Sibirien.

*stricta* DC., steifer, ♂. f. Sibirien.

*tenella* DC., zarter, ♂. f. Podolien, Taurien, Sibirien.

β) *arcuata*.

**Chorizema** La Bill., Chorizema, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*cordatum* Lindl., herzblättrige, 5. t. Neu-Südwallis.

*Dicksonii* R. G., Dickson's, 5. t. Neuholland.

*Henchmanni* RB., Henchmann's, 5. t. Neuholland.

*ilicifolium* La Bill., stechhülsenblättrige, 5. t. Neuholl.

*nanum* Sims, Zwerg-Ch., 5. t. Neuholland.

*ovatum* Lindl., eiförmige, 5. t. Neuholland.

*rhombeum* RB., rautenförmige, 5. t. Neuholland.

*spartioides* Lod., pfriemenähnliche, 5. t. Neuholland.

*triangulare* Lindl., dreieckige, 5. t. Neuholland.

*scandens* Sm. v. *Podolobium scandens*.

**Chrysanthellum** Rich., Zwergwucherblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*procumbens* Rich., niederliegende, ♂. f. m. Westindien.

**Chrysanthemum** T. L., Wucherblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

# Chrysanthemum

## I. Genuini.

Broussonetii Balb., Broussonet's,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Inseln.

$\beta$ ) parvifolium.

carinatum Schousb. (*tricolor* Andr.), nachenförmige,  $\odot$ . f. m. Nordafrika.

carnosulum DC. (*frutescens* Thbg.), fleischige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Cap der guten Hoffnung.

coronarium L., gekrönte,  $\odot$ . f. Orient, Südeuropa, Nordafrika.

$\beta$ ) matricarioides Hortul.

foeniculaceum DC., fenchelblättrige,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Ins.

frutescens L., strauchige,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Inseln.

a) crithmifolium (W.).  $\beta$ ) pinnatifidum (*foeniculaceum* W.).  $\gamma$ ) bipinnatifidum (*anethifolium* W.).

grandiflorum W., großblumige,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Inseln.

a) adauctum (*tanacetifolium* H. Par.).  $\beta$ ) intermedium (*foliosum* Brouss.).  $\gamma$ ) subnudum.  $\delta$ )

cuneiforme (*coronopifolium* W.).

pinnatifidum L. suppl., fiederspaltige,  $\frac{1}{2}$  k. Madeira.

Roxburghii Dsf. (*senecioides* Dunal), Roxburgh's,  $\odot$ . f. m. Ostindien.

a) discoideum.  $\beta$ ) breviradiatum Hortul.  $\gamma$ ) radiatum.

segetum L., Saat-W.,  $\odot$ . f. Scandinavien, Deutschland, Frankreich, England.

viscosum Dsf., schmierige,  $\odot$ . f. Südspanien.

## II. Leucanthemum T. DC.

arcticum L., nördliche, 4. f. Kamtschatka.

atratum L., schwärzliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

cebnense DC. (*monspeliense* L.), französische, 4. f. Frankreich.

corsicum Sieb., corsische, 4. f. Corsica.

graminifolium L., grasblättrige, 4. f. West- und Südeuropa, Rußland.

heterophyllum W., verschiedenblättrige, 4. f. Piemont.

integrifolium Richard's, ganzblättrige, 4. f. Nordamer.

ircutianum DC., sibirische, 4. f. Sibirien.

lanceolatum P., lanzettblättrige, 4. f. Südfrankreich.

latifolium (W.), (*grandiflorum* Hort.), breitblättrige, Pyrenäen, Portugal.

$\beta$ ) lacustre Brot.

Leucanthemum L. (*sylvestre* W.), gemeine, 4. f. Europa.

maximum Ramond (*grandiflorum* Lapeyr.), größte, 4. f. Pyrenäen.

montanum L., Berg-W., 4. f. Süddeutschland, Oberitalien, Frankreich.

pallens Gay (*hispidum* A. Rich.), bleiche, 4. f. Südfrankreich.

rotundifolium W. K., rundblättrige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

setabense Dufour (*paludosum* Dsf., *glabrum* Poir., *carnosum* P.), spanische,  $\odot$ . f. Spanien, Nordafrika.

sibiricum Turcz. (*monspeliense* H. Par.), *arcticum* Ledeb.), 4. f. Sibirien, Dahurien.

sinuatum Ledeb. (*absinthifolium* Fisch.), buchtige,  $\frac{1}{2}$  4. f. Sibirien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Matricaria* et *Pyrethrum*.

*Chryseis californica* Lindl., *crocea* Benth etc. v. *Eschscholtzia californica* etc.

*Chryseis* Cass. Less. v. *Centaurea moschata* etc.

**Chrysiphiala** Lamb. Ker, Goldnarcisse, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*curvidendata* Herb., krümmzähnige, 4. Zw. w. t. Peru.

*flava* Ker, hellgelbe, 4. Zw. w. t. Peru.

*pauciflora* Lindl., wenigblumige, 4. Zw. w. t. Peru.

*crocea* Loud. v. *Stenomesson croceum*.

**Chrysobalanus** L., Goldpflaume, XII. 1., Amygdalaceae-Chrysobalaneae.

*Icaco* L., westindische, 5. w. Westindien, Südamerika.

*oblongifolius* Mchx., langblättrige, 5. k. t. Carolina, Florida.

*Chrysobotrya* Spach. v. *Ribes aureum* etc.

**Chrysocoma** L., Goldhaar, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

I. genuin.

*ciliata* L. (*ciliaris* W.), gefranztes, 5. k. Cap d. g. H.

*Coma aurea* L., aechtes, 5. k. Cap der guten Hoffn.

β) *patula* L. γ) *cernua* L.

? *nivea* W., schneeweisses, 5. k. Cap der guten Hoffn.

II. *Bigelowia* DC.

*dracunculoides* Pursh (*graveolens* Nutt.), dragunähnliches, 5. 4. f. Nordamerika.

*missouriensis* DC. (*nauseosa* Pursh), missourisches, 4. f. Nordamerika.

*nudata* Mchx., kahles, 4. f. Nordamerika.

*virgata* Nutt., ruthenförmiges, 4. f. Nordamerika.

III. *Linosyris* Lob. (*Crinitaria* Less., *Crinita* Mch.).

*divaricata* Fisch., sparriges, 4. f. Astrachan.

*glabrata* Lindl., glattes, 4. f. Altai.

*Linosyris* L. (*vulgaris* Cass.), flachsblättriges, 4. f. Europa.

*punctata* Cass. (*dracunculoides* Lam., *biflora* L. spec.), punktirtes, 4. f. Sibirien.

*villosa* L., zottiges, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.

*amara* Schum. v. *Decaneuron senegalense*. *biflora*

Lam. v. *Aster* (*Galatella*) *dracunculoides*. β) *cam-*

*phorata* Rob. et Cast. (*saxatilis* DC.) v. *Jasonia*

*glutinosa*. *cinerea* La Bill. v. *Ozothamnus cinereus*.

*graminifol.* L. (*virginiana* H. Par.) v. *Solidago graminifol.*

*scabra* Thb. v. *Aster* (*Felicia*) *reflexus*,

*squamata* La Bill. v. *Leptorhynchus squamatus*.

**Chrysogonum** L., Goldkante, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

*Diotostephus* DC. (*virginianum* Mchx.), zweiöhrige, 4. f. Carolina.

*virginianum* L., virginische, 4. f. Virginien, Carolina.

**Chrysophyllum** L., Goldblatt, V. 1., Sapotaceae.

*angustifolium* Lam., schmalblättriges, 5. w. Westindien.

*argenteum* Jacq., silberblättriges, 5. w. Westindien.

*Cainito* L., Sternapfel-G., 5. w. Westindien.

β) *jamaicense*. γ) *coeruleum*. δ) *microphyllum*.

*glabrum* Jacq., glattes, 5. w. Westindien.

*macrophyllum* G. Don, großblättriges, 5. w. Sierra Leone.

*monopyrenum* Sw. (*acuminatum* Lam.), einkörniges, 5. w. Westindien.

*macrophyllum* Lam. v. *Bumelia nervosa*. *splendens*

Spgl. v. *Nycterisition ferrugineum*.



**Chrysopogon** Trin., Goldbart, III. II. (XXIII. I.),  
Gramineae.

*Gryllus* Trin., südlicher, 4. f. b. Südeuropa.

**Chrysopsis** Nutt., Goldalant, XIX. II., Compositae-  
Corymbiferae.

*villosa* Nutt., zottiger, 4. f. Nordamerika.

**Chrysosplenium** T., Goldmilz (*Milzkraut*), X. II.,  
Saxifrageae.

*alternifolium* L., wechselblättriges, 4. f. Europa, Japan.

*nepalense* D. Don, nepal'sches, 4. f. Nepal.

*oppositifolium* L., gegenblättriges, 4. f. Europa.

*Chrysostemma tripteris* Less. v. *Coreopsis tripteris*.

**Chrysurus** P., Goldschwanz, III. II., Gramineae.

*cynosuroides* P. (*aureus* P. B.), kammgrasähnlicher, ☉. f.  
Südeuropa, Levante, Nordafrika.

*echinata* P. B., *effusus* P. B. et *elegans* P. B. v.

*Cynosurus echinatus* etc.

**Chymocarpus** D. Don, Capucinerbeere, VIII. I.,  
Tropaeoleae.

? *brachyceras*\* (Hook), kurzspornige, 4. Sch. t. Chili.

? *Jarattii*\* (Youell), Jaratti's, 4. Sch. t. Santiago.

*pentaphyllus* D. Don, fünfblättrige, 4. Sch. t. k. Monte  
Video.

? *polyphyllus*\* (Cav.), vielblättrige, 4. Sch. t. Chili.

*tricolor*\* (*tricolorum* Swt.), dreifarbig, 4. Sch. t, Val-  
paraiso.

? *tuberosus* (Maund), 4. Kn. Peru.

**Chysis** Lindl., Chysis, XX. I., Orchideae.

*aurea* Lindl., goldfarbig, 4. w. Venezuela.

**Cibotium** Kaulf., Knorpelfarn, XXIV. I., Pterioideae.

*Billardieri* Kaulf., Billardier's, 4. 5. w. Neuholland.

*Schiedei* H. Berol., Schiede's, 4. w. Mexico.

**Cicca** L., Cicca, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae,

*disticha* L., zweizeilige, 5. w. Ostindien.

**Cicer** T., Kichern, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papi-  
lionaceae.

*arietinum* L., gemeine, ☉. f. Südeuropa.

*Lens* W. v. *Ervum* Lens.

**Cichorium** T., Wegwart, XIX. I., Compositae-Cicho-  
riaceae.

*Endivia* L., Endivien-W., ☉. ♂. f. Ostindien, Nepal.

a) *Cosnia* Hamilt. β) *sativa*.

*Intybus* L., Cichorien-W., 4. f. Europa.

β) *divaricatum* Schousb. Ost- und Westeuropa,  
Nordafrika.

*pumilum* Jacq., kleine, ☉. f. ?

*spinosum* L., stechende, ☉. ♂. f. k. Griechenland, Sicilien.

*Ciconium* Swt. v. *Pelargonium*.

**Cicuta** L., Wasserschierling, V. II., Umbelliferae.

*bulbifera* L., knolliger, 4. f. Nordamerika.

*dahurica* Fisch., dahurischer, 4. f. Sibirien.

*maculata* L., gefleckter, 4. f. Nordamerika,

*virosa* L., giftiger, 4. f. Europa, Sibirien.

β) *tenuifolia* Fröl. (*angustifolia* Kit., *stricta*  
Schulz).

*venenata* Nutt. v. *Ferula villosa*.

**Cimicifuga** L., Wanzenkraut, XIII. V., Ranunculaceae.

I. *genuina*.

*americana* Mchx., amerikanisches, 4. f. Carolina.

*cordifolia* Pursh, herzblättriges, 4. f. Carolina.

**Cimicifuga**

*foetida* L., stinkendes, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Sibirien, Nordamerika.

( $\beta$ ) *simplex* Wormsk. (*macropoda* Turcz.).

II. *Botrophis* Rafin. (*Macrotis* Rafin.).

*Serpentaria* Pursh, Schlangen-W., 4. f. Nordamerika.  
*palmata* Mchx. v. *Trautvetteria palmata*.

**Cinchona** L., Fiebertindenbaum, V. 1., Rubiaceae.

*Condaminea* Humb. (*officinalis* L.), Condamine's, 5. w. Peru, Südamerika.

? *scabra* Lod., scharfer, 5. w. Südamerika.

*excelsa* Roxb. et *thyrsiflora* Roxb. v. *Hymenodictyon excelsum* etc. *gratissima* Wall. v. *Luculia gratissima*.

**Cineraria** L., Aschenpflanze, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

? *alliariaefolia* Dsf., lauchkrautblättrige, 5. k. t. ?

*aurita* L'Her., geöhrte, 5. k. t. Madeira.

*canescens* Wendl. (*parviflora* Ait., *Aitoniana* Spgl.), weisgraue, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*cruenta* Mass. (*aurita* Andr.), blutrothe, 4. k. t. Teneriffa.

( $\beta$ ) ? *lactea* Jacq. fil.

*geifolia* L., geumblättrige, 4. 5. k. t. Cap d. gut. H.  
*geraniifolia* DC. (? *angulosa* Lam.), storchschnabelblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*humifusa* L'Her., niedergestreckte, 4. k. t. Cap d. g. H.

*hybrida* W., Bastard-A., 5. k. t. ?

*lanata* L'Her., wollige, 5. k. t. Teneriffa.

*lobata* L'Her., gelappte, 4. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*malvaefolia* L'Her., malvenblättrige, 4. k. t. Azoren, canarische Inseln.

*multiflora* L'Her., vielblumige, 4. k. t. Canarische Inseln.

( $\beta$ ) ? *elatio*r Bouché.

*Petasites* Sims (*platanifolia* Schrk.), pestwurzblättrige, 5. k. t. Mexico.

*populifolia* L'Her. (*appendiculata* L. fil.), pappelblättrige, 5. k. t. Canarische Inseln.

( $\beta$ ) *leucantha* Vent. (*lactea* W. non Jacq. *alba* Hortul.).

*ramentacea* L'Her., schuppige, 4. k. t. Teneriffa.

*tomentosa* Less., filzige, 4. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

? *viscosa* Ait., schmierige, ♂. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*altaica* Meyer, *macrophylla* Ledeb., *sibirica* L.,

*speciosa* Schrad. (*Fischeri* Ledeb.) v. *Ligularia*

*altaica* etc. *amelloides* L., *tenella* Lk. v. *Agathaea*

*amelloides* etc. *aurantiaca* Hoppe, *campestris* Retz

etc. v. *Senecio aurantiacus* etc. *cymbalariaefol.* L.

Thbg., *elongata* L. fil. (*scordifolia* H. Berol.) v.

*Brachyrhynchos cymbalariaefol.* etc. *hirsuta* Vent.

v. *Munychia (Aster) hirsut.* *linifolia* L. v. *Euryops*

*linifol.* *Tussilaginis* L'Her. v. *Pericallis Tussilag.*

**Cinna** L., Cinna, III. 11., Gramineae.

*arundinacea* L., rohrartige, 4. f. Nordamerika.

*filiformis* Lk., fadenförmige, 4. f. Nordamerika.

*lateriflora* Kunth, seitenblüthige, 4. f. Nordamerika.

*mexicana* Lk., mexicanische, 4. f. k. Mexico.

*racemosa* Kunth, traubige, 4. f. Nordamerika.

*sobolifera* Lk., sprossende, 4. f. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. *Mühlenbergia*.

**Cinnamomum** R. B. N. E., Zimmtbaum, IX. 1., Laurineae.

**Cinnamomum**

- Beiologota Swt. (*Hamilt.*), Beiologota-Z.,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 Camphora Swt., Kampferbaum,  $\frac{1}{2}$  k. Japan, China.  
 Cassia D. Don, Kassien-Z.,  $\frac{1}{2}$  w. Ceylon, Cochinchina.  
 Culilaban Swt., Nelken-Z.,  $\frac{1}{2}$  w. Molucken.  
 dulce, G. Don, süßser,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien, Java.  
 glaucum, G. Don, blaugrüner,  $\frac{1}{2}$  t. k. Japan.  
 gracile Swt., schlanker,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 Malabattrum G. Don, malabarischer,  $\frac{1}{2}$  w. Malabar.  
 montanum G. Don, Berg-Z.,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 nitidum Hook., glänzender,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 verum Swt., wahrer,  $\frac{1}{2}$  w. Ceylon, Cochinchina.

**Cipura** Aubl., Sumpfschwertel, III. 1., Irideae.

- coelestis\* (Lehm.), himmelblauer, 4. w. Brasilien, Mexico.  
 coerulea\* (Ker), blauer, 4. w. Brasilien.  
 gracilis\* (Herb.), schlanker, 4. w. Brasilien.  
 humilis Humb., niedriger, 4. w. Neu-Granada,  
 longifolia\* (Lk. et Otto), langblättriger, 4. Kn. w. Brasilien.

- martinicensis Humb., martiniquischer, 4. w. Westindien.  
 Northiana\* (Schneev.), breitstieliger, 4. w. Brasilien.  
 paludosa Aubl., guianischer, 4. w. Guiana.

$\beta$ ) graminea Humb.

- Sabini\* (Lindl.), Sabine's, 4. w. St. Thomas.  
 semiaperta\* (Lod.), halbgeöffnete, 4. w. Brasilien.

**Circaea** T., Hexenkraut, II. 1., Onagrariae.

- alpina L., Alpen-H., 4. f. Europa, Nordamerika.  
 intermedia Ehrh., mittleres, 4. f. Europa, Nordamerika.  
 lutetiana L., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.

**Cirrhaea** Lindl., Cirrhaea, XX. 1., Orchideae.

- fuscolutea Lindl., braungelbe, 4. w. Brasilien.  
 Loddigesii Lindl. (*dependens* Bot. reg.), Loddiges's, 4. w. Brasilien.

obtusata Lindl., stumpfe, 4. w. Brasilien.

Seideliana Rchb., Seidel's, 4. w. Brasilien.

tristis Lindl., traurige, 4. w. Mexico.

viridipurpurea Lod., grünpurpurfarbige, 4. w. Brasilien.

Warreana Lod., Warre's, 4. w. Brasilien.

**Cirrhopetalum** Lindl., Braunstendel, XXI. 1., Orchideae.

caespitosum Wal., rasenartiger, 4. w. Ostindien.

Thouarsii Lindl., Thouar's, 4. w. Societätsinseln.

Wallichii Lindl., Wallich's, 4. w. Nepal.

**Cirsium** T., Federdistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

acaule All., stengellose, 4. f. Europa, Caucasus.

$\beta$ ) caulescens.  $\gamma$ ) Gmelini Spgl.

aciculare Tausch (*orgyale* Hort.), nadelartige, ♂. f. ?

aduncum Fisch. et Mey., hackenförmige, ♂. f. Persien.

altissimum Lk., höchste, 4. f. Nordamerika.

ambiguum All., zweifelhafte, 4. f. Piemont, Dauphiné.

$\beta$ ) hastatum.  $\gamma$ ) albidum.

anglicum Lobel DC. (*pratens.* Huds.), englische, 4. f.

Süddeutschland, England, Frankreich, Oberitalien.

angustifolium DC., schmalblättrige, 4. f. ?

arachnoideum MB., spinnwebenhaarige, ♂. f. Caucasus.

arvense Scop., Acker-F., ♂. f. Europa, Nordamerika.

$\beta$ ) neglectum Fisch., Sibirien.

Bertolonii Spgl., Bertolone's, ♂. f. Italien.



**Cirsium**

*bulbosum* DC. (*tuberosum* All. et *medium* All.), knollige, 4. f. England, Deutschl., Schweiz, Frankr., Piemont.  
*canum* MB., graublätterige, 4. f. Ostdeutschl., Taurien.  
*carniolicum* Scop. (*rufescens* Ram.), krainerische, 4. f. Krain, Kärnthen, Pyrenäen.

*cernuum* Lag. (*lappac.* H. Par.), übergebogene, 4. k. Mexico.  
*Chailletii* Gaud., Chaillet's, ♂. f. Oesterreich, Schweiz.  
*chium* DC., griechische, 4. f. Chios.

*ciliatum* MB., gefranzte, 4. f. Taurien, Caucasus, Persien, Sibirien.

*controversum* DC., streitige, 4. f. Schweiz, Piemont.

α) *purpureum* All. (*tricephaloides* β. DC. Cervini Thom.). β) *albidum*.

*creticum* d'Urv., cretische, 4. f. b. k. Creta.

*dealbatum* MB., weisblätterige, 4. f. Nordcaucasus.

*desertorum* Fisch., Wüsten-F., 4. f. Sibirien.

*discolor* Lk., verschiedenfarbige, 4. f. Nordamerika.

*echinatum* DC., starkstachelige, ♂. f. Südfrankr., Nordafr.

*echinocephalum* MB., stachelköpfige, 4. f. Caucasus.

*eriphorum* Scop., wolkköpfige, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *spurium*.

*erucagineum* DC., rankenähnliche, 4. f. Dauphiné, südliche Schweiz.

β) *Hallerianum*.

*ferox* DC., wilde, ♂. f. Südeuropa.

β) *Lobellii* Ten.

*fimbriatum* Spgl., gefranzte, 4. f. Caucasus.

*giganteum* Spgl., riesenförmige, ♂. f. Süditalien, Nordafr.

*glabro-monspessulanum* Gay, glatte, 4. f. Pyrenäen.

*glabrum* DC., kahle, 4. f. Pyrenäen.

*glutinosum* Lam. (*Erisithales* Lk.), kleberige, 4. f. Europäische Alpen.

*heterophyllum* All., verschiedenblätterige, 4. f. Europa, Nordasien.

β) *helenioides* All.

*horridum* MB., abschreckende, ♂. f. Caucas., Armenien.

*hybridum* Koch (*palustri-oleraceum* Schied.), Bastard-F., ♂. f. Deutschland.

*incanum* Fisch., weißgraue, 4. f. Sibirien, Taurien, Persien.  
*inermis* Lk., unbewehrte, 4. f. ? Pyrenäen.

*italicum* DC. (*samniticum* Ten.), italienische, ♂. f. Italien, Griechenland.

*Lachenalii* Koch (*pallens* DC. *tuberos. olerac.* Schied.), Lachenal's, 4. f. Europa.

*lanceolatum* Scop., lanzettige, ♂. f. Europa, Nordamer.

β) *hypoleucum* Rchb. γ) *brevedecurrens* DC.

*laniflorum* MB., wollblumige, ♂. f. Taurien.

*lappaceum* MB., klettenartige, ♂. f. Caucasus.

*lucidum* DC., glänzende, 4. f. ?

*macrocephalum* C. A. Mey., großköpfige, ♂. f. Ostcaucas.  
*mite* Fisch., milde, ♂. f. ? Sibirien.

*montanum* Spgl., Berg-F., 4. f. Croatien, Oberitalien.

*monspessulanum* All., französische, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich, Spanien.

β) *pyrenaicum* DC. γ) *dissectum* DC.

*munitum* MB., verwahrte, 4. f. Caucasus.

*muticum* Mchx., kurzspitzige, 4. f. Nordamerika.

*neglectum* Fisch., übersehene, 4. f. Sibirien.

*nemorale* Rchb., Hain-F., ♂. f. Sachsen.

**Cirsium**

- Nuttallii DC., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.  
 obvallatum MB., verhüllte, ♂. f. Caucasus.  
 ochroleucum All., weißgelbe, 4. f. Mitteleuropa.  
     β) arachnoideum DC. γ) mixtum DC. (hybrid.  
     Schlchr. non Koch).  
 oleraceo-rivulare Schied. (*praemorsum* Michl.), Bastard-  
 gemüse-F., 4. f. Deutschland.  
 oleraceum All., Gemüse-F., 4. f. Mittel- und Nord-  
 europa, Sibirien.  
 orgyale Lk., klastenhohe, 4. f. ?  
 palustre Scop., Sumpf-F., 4. f. Europa, Sibirien.  
 palustri-bulbosum DC. (*tuberosum* Schied.), 4. f. Deutschl.  
 pannonicum Gaud., ungarische, 4. f. Ungarn, Kärn-  
 then, Oesterreich, Schweiz.  
 parviflorum DC., kleinblumige, 4. f. Deutschland.  
 pauciflorum Spgl., wenigblumige. 4. f. Steiermark.  
 polyanthemum Spgl. (et *pungens* Spgl., *elatus* Lk.),  
 vielblumige, ♂. f. Italien.  
 pratense DC., Wiesen-F., 4. f. Südfrankreich.  
 rigens Wallr. (*tataricum* Auctor. *decoloratum* Koch, *acauli-*  
*olerac.* Schied.), starre, 4. f. Deutschland.  
 rigidum DC., steife, ♂. f. Iberien.  
 rivulare Lk. (*tricephaloides* DC.), Bach-F., 4. f. Mittel-  
 europäische Voralpen.  
     β) falisburgense (W.).  
 semidecurrens DC. (? *paniculatum* Spgl.), halbherablauf-  
 ende, 4. f. ?Pyrenäen.  
 semipectinatum Ledeb., halbkaminförmige, 4. f. ?Sibirien.  
 serratuloides DC., scharfenähnliche, 4. f. Sibirien.  
 serratum Tausch., gesägte, 4. f. Südeuropa.  
 serrulatum MB., feingesägte, ♂. f. Mittelrussland.  
 setosum MB. (*argenteum* Peyer), borstige, ♂. f. Ost-  
 europa, Taurien.  
 siculum Spgl., sicilische, ♂. f. Sicilien, Armenien.  
     β) *pungens*.  
 sorocephalum Fisch. et Mey., dichtköpfige. ♂. f. Nord-  
 persien.  
 spathulatum Gaud., spathelförmige, ♂. f. Oberitalien,  
 südliche Schweiz.  
 spinosissimum Scop., langstachelige, 4. f. Mitteleuro-  
 päische Alpen, Sibirien.  
 squarrosus Fisch., sparrige, 4. f. Sibirien.  
 strictum Tenor., steife, 4. f. Neapel.  
 strigosum Fisch. et Mey., striegelige, ♂. f. Caucasus,  
 Armenien.  
 subalpinum Gaud., Voralpen-F., 4. f. Süddeutschland,  
 Schweiz.  
     β) *lacteum* Schlchr.  
 sylvaticum Tausch, Wald-F., ♂. f. Böhmen.  
 tataricum Wim. et Grab., tatarische, 4. f. Osteuropa,  
 Sibirien.  
 Tauschii DC. (*angustifol.* Tausch), ♂. f. ?  
 uliginosum MB., Sumpf-F., 4. f. Caucasus.  
 Zizianum Koch, Ziz's, 4. f. Süddeutschland.  
     *Acarna* Mch. v. *Picnomon* *Acarna*. *afrum* DC.,  
*Casabonae* DC. etc. v. *Chamaepeuce* *afra* etc. *sal-*  
*inum* MB. v. *Leuzea* *salina*. *scleranthum* MB. (*car-*  
*linoides* Fisch.) v. *Echenais* *carlinoides*, *syriacum*  
 G. v. *Notabasis* *syriaca*.

**Cissampelos** L., Pareirawurzel, XXII. XIII., Menispermaceae.

- Caapeba L., Caapeba-P., 4. Sch. w. Westindien.  
 capensis Thbg., capische, 5. Sch. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 hirsuta Hamilt., rauhhaarige, 5. Sch. t. Nepal.  
 mauritiana Thouars, mascarenische, 5. Sch. w. Mascarenas.  
 microcarpa DC., kleinfrüchtige, 5. Sch. w. Westindien.  
 Pareira L., ächte, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.  
 smilacina W. v. Menispermum smilac.

**Cissus** L., Klimme, IV. I., Viniferae.

- acida L., saure, 5. Sch. Westindien.  
 adnata Roxb., verwachsene, 5. Sch. Ostindien.  
 angustifolia Roxb., schmalblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.  
 antarctica Vent., südliche, 5. Sch. t. Neuholland.  
 auriculata Roxb., geöhrt, 5. Sch. w. Ostindien.  
 caesia Afzel., hechtblaue, 5. Sch. w. Guinea.  
 capensis Thbg., capische, 5. Sch. t. w. Cap der guten  
 Hoffnung, Mascarenas.  
 diversifolia DC. (*heterophylla* W.), verschiedenblättrige,  
 5. Sch. w. ?  
 glandulosa Gmel., drüsige, 5. Sch. w. Arabien, Ostindien.  
 glauca Roxb., blaugrüne, 5. Sch. w. Malabar.  
 latifolia Lam., breitblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.  
 microcarpa Vahl, kleinfrüchtige, 5. Sch. w. Westindien.  
 orientalis Lam., morgenländische, 5. Sch. w. Ostindien.  
 ovata Lam., eiförmige, 5. Sch. w. Westindien.  
 pentaphylla W. (*tenuis* P.), dünne, 5. Sch. t. Japan.  
 punctulosa Rich., feinpunctirte, 5. Sch. w. Cayenne.  
 quadrangularis L., vierkantige, 5. Sch. w. Arab., Ostind.  
 quinata Ait., fünfzählige, 5. Sch. w. t. Cap d. g. H.  
 quinquefolia Soland., fünfblättrige, 5. Sch. w. Brasilien.  
 repens Lam., kriechende, 5. Sch. w. Malabar.  
 sicyoides L., sicyosähnliche, 5. Sch. w. Jamaica.  
 smilacina Kunth, smilaxähnliche, 5. Sch. w. Südamerika.  
 trifoliata L. (*alata* Jacq.), dreiblättrige, 5. Sch. w. Jamaica.  
 trilobata Lam., dreilappige, 5. Sch. w. Ostindien.  
 vitiginea L., weinblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.

**Cissus Ampelopsis** P. v. *Ampelopsis cordata*.

*hederacea* P. v. *Ampelopsis hederacea*.

**Cistus** T., Ciströschen, XIII. I., Cistineae.

- albidus L., weißliches, 5. k. Spanien, Portugal.  
 asperifolius Swt., rauhblättriges, 5. k. Südeuropa.  
 candidissimus Dun., weißfilziges, 5. k. Canarische Inseln.  
 canescens Swt., grauliches, 5. k. ?  
 Clusii Dun. (*Libanotis* Dsf., *stenophyllus* Lk.), Clusius's,  
 5. k. Spanien, Nordafrika.  
 complicatus Lam., gefaltetes, 5. k. Kleinasien, Spanien.  
 corbariensis Pourr. (*hybridus* Pourr.), corbierisches, 5. k.  
 Südfrankreich, Spanien.  
 cordifolius, Swt., herzblättriges, 5. k. ?  
 creticus L., cretisches, 5. k. Creta, Kleinasien, Taur.  
 β) tauricus Presl.  
 crispus L., krausblättriges, 5. k. Südeuropa.  
 Cupanianus Presl., Cupani's, 5. k. Sicilien.  
 β) acutifolius Swt. (*salviaefolius* β. *humifusus* DC.).  
 cymosus Dun., afterdoldiges, 5. k. Spanien.  
 cyprius Lam. (*ladaniferus* B.M.), cyprisches, 5. k. Cyprus.  
 Dunalianus Swt. (*undulatus* Dun.), Dunal's, 5. k. ?  
 florentinus Lam., florentinisches, 5. k. ? Italien.  
 heterophyllus Dsf., verschiedenblättriges, 5. k. Nordafrika.



**Cistus**

*hirsutus* Lam., rauhhhaariges,  $\text{f. k.}$  Spanien, Portugal.  
*incanus* L., weifsgraues,  $\text{f. k.}$  Südeuropa.  
*ladaniferus* L., Ladanum-C.,  $\text{f. k.}$  Spanien, Portugal.

$\beta$ ) *albiflorus*  $\gamma$ ) *maculatus*.

*latifolius* Swt., breitblättriges,  $\text{f. k.}$  Barbarei.  
*laurifolius* L., lorbeerblättriges,  $\text{f. k.}$  Südfrankr., Span.  
*laxus* Ait., lockeres,  $\text{f. k.}$  Spanien, Portugal.  
*Ledon* Lam., mittelländisches,  $\text{f. k.}$  Südfrankreich.  
*longifolius* Lam. (*nigricans* Pourr.), langblättriges,  $\text{f. k.}$  Spanien, Südfrankreich.

*lusitanicus* Hort., portugiesisches,  $\text{f. k.}$  Portugal.  
*monspeliensis* L., französisches,  $\text{f. k.}$  Süd-u. Westeuropa.  
*oblongifolius* Swt., verlängertes,  $\text{f. k.}$  Südeuropa.

*obtusifolius* Swt., stumpfblättriges,  $\text{f. k.}$  ?

*parviflorus* Lam., kleinblumiges,  $\text{f. k.}$  Creta.

*platysepalus* Swt., breitblumiges,  $\text{f. k.}$  ?

*populifolius* L., pappelblättriges,  $\text{f. k.}$  Südfrankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika.

*psilosepalus* Swt., schmalkroniges,  $\text{f. k.}$  ?

*purpureus* Lam., purpurfarbiges,  $\text{f. k.}$  Kleinasien.

*salvifolius* L., salbeiblättriges,  $\text{f. f. b. k.}$  Südeuropa.

$\beta$ ) *erectusculus*.  $\gamma$ ) *ochroleucus*.

*sericeus* Vahl, seidenhaariges,  $\text{f. k.}$  Spanien.

*undulatus* Lk., wellenblättriges,  $\text{f. k.}$  Spanien.

*vaginatus* Ait., scheidiges,  $\text{f. k.}$  Teneriffa.

*villosus* Lam., zottiges,  $\text{f. k.}$  Südeuropa, Nordafrika.

$\beta$ ) *virescens* DC. (? *rotundifolius* Swt.). Hinsichtlich der übrigen s. *Helianthemum*.

**Citharexylum** L., Geigenholz, XIV. II., Verbenaceae.

*caudatum* L. (*erectum* Jacq.), geschwänztes,  $\text{f. w.}$  Jamaica.

*cinereum* L., aschfarbiges,  $\text{f. w.}$  Westindien, Brasilien.

*dentatum* Lod., gezähntes  $\text{f. w.}$  ? Ostindien.

*molle* Jacq., weiches,  $\text{f. w.}$  Westindien.

*pentandrum* Vent. (*pulverulentum* P.),  $\text{f. w.}$  Portorico.

*quadrangulare* Jacq., vierkantiges,  $\text{f. w.}$  Westindien.

*sericeum* Lod., seidenhaariges,  $\text{f. w.}$  Ostindien.

*suberratum* Sw., feinsägezahniges,  $\text{f. w.}$  Westindien.

*villosum* Jacq., zottiges,  $\text{f. w.}$  St. Domingo.

**Citriobatus** Cun., Orangendorn, V. I., Pittosporaeae.

*multiflora* Cun., vielblumiger,  $\text{f. t.}$  Neusüdwallis.

*pauciflora* Cun., wenigblumiger,  $\text{f. t.}$  Neuholland.

**Citrullus** Neck. Schrad. v. Cucumis.**Citrus** T., Orangenbaum, XVIII. II., Hesperideae-Aurantiaceae.

*angulata* W., kantiger,  $\text{f. t.}$  Ostindien.

*Aurantium* Risso (*dulcis* Hort.), süßser,  $\text{f. k.}$  Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.

$\beta$ ) *sinensis* Mill.

*buxifolia* Poir., buchsbaumblättriger,  $\text{f.}$  China, Mascar.

*decumana* L., Pompelmus-O.,  $\text{f. k.}$  China, Ostindien.

*Hystrix* DC., langdorniger,  $\text{f. t. k.}$  Ostindien.

*japonica* Thbg., japanischer,  $\text{f. k.}$  Japan.

*Limetta* Risso, Bergamotten-O.,  $\text{f. k.}$  Asien.

*Limonium* Risso, Limonien-O.,  $\text{f. k.}$  Asien.

*madurensis* Lour., madurische,  $\text{f. t.}$  Ostindien.

*Margarita* Lour., Perllimonie,  $\text{f. t. k.}$  China.

*medica*, Citronenbaum,  $\text{f. k.}$  Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.

**Citrus**

- b) *dulcis*. c) *elongata*. d) *flore pleno*. e) *maxima*. f) *romana*.  
*nobilis* Lour., edler, *h. t.* China, Cochinchina.  
 β) *minor*.  
*spinosissima* Meyer, starkdorniger, *h. w.* Surinam.  
*vulgaris* Risso, gemeiner, *h. k.* Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.  
 b) *crispa*. c) *flore pleno*. d) *fol. variegat.* e) *gibbosa*. f) *latifolia*. g) *longifolia*. h) *macrocarpa*. i) *multiflora*. k) *myrtifolia*. l) *Pomum Adami*. m) *salicifolia* etc.  
*trifoliata* L. v. *Aegle sepiaria*.

**Cladanthus** Cass., Sprossenkamille, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- arabicus* Cass. (*proliferus* DC.), arabische, ☉. f. m. Nordafrika, ? Arabien.  
*canescens* Swt., weißgrau, *h. k.* Canarische Inseln.

**Cladium** P. Br., Sumpfgras, III. 1., Cyperaceae.

- glomeratum* RB., knaulförmiges, 4. t. Neuholland.  
*juncum* RB., binsenförmiges, 4. t. Neuholland.  
*Mariscus* RB. (*germanicum* Schrad.), gemeines, 4. f. Europa, Amerika, Neuholland.  
*occidentale* Schrad., westindisches, 4. w. Jamaica, Hispaniola.

*schoenoides* RB., knopfgrasähnliches, *h. t.* Neuholland.

**Cladostachys** D. Don, Aestchenähre, V. 1., Aizoideae-Amarantheae.

- alternifolia* Swt., wechselblättrige, ♂. w. f. m. Ostindien.  
*frutescens* D. Don, strauchige, *h. w.* Ostindien.

**Clarkia** Pursh. (Clark, engl. Kapitän u. Reisender), VIII. 1.

- elegans* Doug., schöne, ☉. f. Californien.  
 b) *flore pleno*.  
*gauroides* Doug. (*rhomboidea* Doug.), nachtkerzenähnliche, ☉. f. Californien.  
*pulchella* Pursh, niedliche, ☉. f. Nordamerika.  
 b) *flore albo*.

**Clausena** Burm., Clausena, X. 1., Hesperideae-Aurantaceae.

- pentaphylla* DC., fünfblättrige, *h. w.* Coromandel.

**Clavija** R. et P. (J. Clavijo Faxardo, spanischer Naturforscher), V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.

- macrophylla* R. et P., großblättrige, *h. w.* Südamerika.  
*ornata* D. Don, zierliche, *h. w.* Caraccas.

**Claytonia** L. (J. Clayton, Arzt, welcher in Virginien Pflanzen sammelte), V. 1., Portulacaceae.

- acutifolia* Pall., spitzblättrige, 4. f. Sibirien.  
*acutiflora* Swt. (*virginica* Bot. mag.), spitzblumige, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*californica* F. et Mey., californische, ☉. f. Californien.  
*caroliniana* Mchx., carolinische, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*grandiflora* Swt., großblumige, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*gypsophiloides* Fisch. et Mey., gypskrautähnliche, ☉. f. Neucalifornien.  
*Ioannea* R. et S., Ioanne's, ☉. f. Sibirien.  
*lanceolata* Pall., lanzettliche, 4. k. f. Sibirien, Nordamer.  
*longifolia* Penny, langblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*perfoliata* Don (*cubensis* Humb.), durchwachsene, ☉. f. Nordamerika, Westindien.

**Claytonia**

polyphylla Penny, vielblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.

sibirica L., sibirische, ☉. f. Sibirien.

unalaschkensis Fisch. (*bifida* W.), Unalaschka-C., ☉. f. Unalaschka.

Vestiana Fisch., Vest's, 4. f. Altai.

virginica Ait., virginische, 4. Kn. f. Virginien.

**Cleisostoma** Lindl., Mundstendel, XX. 1., Orchideae.

roseum Lindl., rosafarbiger, 4. w. Manilla.

tridentatum Lindl., dreizähner, 4. w. Neuholland.

**Clematis** L., Waldrebe, XIII. VI., Ranunculaceae.

americana Mill., amerikanische, ♀. Sch. w. Südamerika.

angustifolia Jacq. (*sibirica* Lam., *Pallasii* Gmel., *hexapetala* Pall.), schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

aristata RB., grannige, ♀. Sch. t. Neuholland.

balearica Rich. (*calycina* Ait.), balearische, ♀. Sch. k. Balearische Inseln.

bicolor Lindl. (*Sieboldii* D. Don), zweifarbige, ♀. Sch. t. k. Japan.

brachiata Ker, armförmige, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. H.

brasiliانا DC., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

campaniflora Broter., glockenblumige, ♀. Sch. Portugal.

caripensis H. B. K. (*caracasana* Bonpl.), caripensische, ♀. Sch. w. Südamerika, Westindien.

chinensis Retz, chinesische, ♀. Sch. t. k. China.

cirrhusa L. (*balearica* P.), gabelrankige, ♀. Sch. k. Süditalien, Griechenland, Kleinasien, Spanien, Nordafrika.

coerulea Lindl. (*coerulea grandiflora* Hort., *azurea* Hort.), blaue, ♀. Sch. t. k. Japan.

coriacea DC. (*australis* Lod.), lederartige, ♀. Sch. t. Neuholland.

crispa L., krause, ♀. Sch. f. Nordamerika.

cylindrica Sims (*crispa* Lam., *Viorna* Andr., *divaricata* Jacq.), cylinderförmige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

dahurica Pers., dahurische, ♀. Sch. f. Dahurien.

dioica L., zweihäusige, ♀. Sch. w. Westindien.

diversifolia DC., verschiedenblättrige, 4. f. ?

erecta L. (*corymbosa* Poir.), aufrechte, 4. f. Mitteleuropa, Sibirien.

β) *hispanica*.

Flammula L., scharfe, 4. f. Südeuropa, Cauc., Nordaf.

β) *fragrans* Tenor. (*rotundifol.*). γ) *maritima* L.

δ) *rubella* P. ε) *caespitosa* Scop.

florida Thbg., schönblühende, ♀. Sch. k. Japan.

glauca W., blaugrüne, ♀. Sch. f. Südsibirien.

glycinoides DC., glycinenähnliche, ♀. Sch. t. Neuholl.

grandiflora DC. (*chlorantha* Lindl.), großblumige, ♀. Sch. w. Sierra Leone.

hedysarifolia DC., hahnenkopflättrige, ♀. Sch. w. Ostind.

Hendersonii Hort., Henderson's, ♀. 4. f. ?

integrifolia L., ganzblättrige, 4. f. Ost- u. Südeuropa, Caucasus, Sibirien.

b) *latifolia* Hort.

lathyrifolia H. Berol., wickenblättrige, 4. f. Sibirien.

lineariloba DC., gleichbreitlappige, 4. f. b. Südcarolina.

Massoniana DC., Masson's, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. H.

montana Buchan. (*anemonaeiflora* D. Don), Berg-W., ♀. Sch. k. t. Nepal.

nepalensis DC. (*montana* D. Don), nepal'sche, ♀. Sch. k. t. Nepal.



**Clematis**

*ochroleuca* Ait. (*sericea* Mchx.), weißgelbe, 4. f. Nordamer.  
*odorata* Wall., wohlriechende, ♀. Sch. t. k. Nepal.  
*orientalis* L., morgenländische, ♀. Sch. f. Kleinasien, Cauc.  
*paniculata* Thbg., rispige, ♀. Sch. k. Japan.  
*pedicellata* Swt. (*cirrhus* β. DC.), gestielte, ♀. Sch. k.  
 Majorca.

*reticulata* Walt., netzförmige, ♀. Sch. f. Nordamerika.  
*semitriloba* Lag. (*polymorpha* a Vis.), halbdreilappige,  
 ♀. Sch. f. b. k. Spanien, Corsica.

*Simsii* Swt. (*cordata* Sims), Sims's, ♀. Sch. f. Nordamer.  
*smilacifolia* Wall., smilaxblättrige, ♀. Sch. w. Ostind.  
*tritermata* DC., dreizählige, ♀. Sch. w. ?

*Viorna* L., glockenblumige, ♀. Sch. f. Nordamerika.  
*viornoides* Schrad., glockenblumenähnliche, ♀. Sch. f.  
 Nordamerika.

*virginiana* L., virginische, ♀. Sch. f. Nordamerika.

β) *bracteata* Mchx.

*Vitalba* L., gemeine, ♀. Sch. f. Mittel- und Südeuropa,  
 Kleinasien.

β) *integrata* A. B.

*Viticella* L., italienische, ♀. Sch. f. Südeuropa, Kleinasien.

b) *purpurea*. c) *multiplex* (*pulchella* P.).

*capensis* Poir. et *tenuifolia* Poir. v. *Pulsatilla* afri-  
 cana et *tenuifolia*. Hinsichtlich der übrigen s.  
 Atragene.

**Cleome** L., Senfkapper, VI. 1. (XV. III.), Capparideae.

*aculeata* L., stachelige, ☉. w. Südamerika.

*arabica* L., arabische, ☉. w. m. f. Arabien.

*arborescens* Weimn., baumartige, ♀. w. Brasilien.

*cardinalis* DC., scharlachblumige, ☉. w. Mexico.

*dendroides* Schult., strauchige, ♀. w. Brasilien.

*diffusa* Banks, ausgebreitete, ☉. w. Brasilien.

*Dilleniana* DC. (? *ornithopodioides* Lk.), Dillen's, ☉. m. f.  
 Levante.

*Eckloniana* Schrad., Ecklon's, ☉. f. m. Cap d. g. H.

*gigantea* L. (*arborescens* Kunth, *viridiflora* Schbr.), große,  
 ♀. w. Südamerika.

*heptaphylla* L., siebenblättrige, ☉. w. Ost- u. Westind.

*Houstonia* RB., Houston's, ☉. w. Jamaica.

*iberica* DC. (*ornithopodioides* MB.), iberische, ☉. f. Iberien.

*monophylla* L., einblättrige, ☉. w. Ostindien.

β) *ceylanica* DC.

*polygama* L., vielehige, ☉. w. Westindien.

*procumbens* L., niederliegende, 4. w. Westindien.

*pubescens* Sims, weichhaarige, ☉. w. ?

*pungens* W. (*spinosa* Sims), stechende, ♂. w. West-  
 indien, Südamerika.

*rosea* Vahl, rosafarbige, ☉. w. Brasilien.

*speciosissima* Deppe, prächtige, ☉. f. m. w. Mexico.

*spinosa* L., stachelige, ♀. ♂. w. Westindien, Brasilien.

*viminea* Schrad., ruthenförmige, ☉. w. m. f. Cap d. g. H.

*violacea* L., violette, ☉. w. f. m. Südamerika, Portugal.

*virgata* Steven, ruthenförmige, ☉. f. m. Iberien, Nordamer.

*Candelabrum* Sims etc. v. *Gynandropsis* *Candela-*  
*brum* etc. *capensis* L. vid. *Heliophila* *cleomoides*.

*Chelidonii* L. suppl. (et *dodecandra* L., *viscosa* L.  
 etc.) v. *Palanisia* *Chelidon*. etc. *pinnata* Pursh v.

*Stanleya* *pinnatifida*. *prostrata* Hortul. vid. *Rothia*  
*trifoliata*. *serrulata* Pursh v. *Peritoma* *serrulata*.

**Cleonia L.**, Cleonie, XIV. 1., Labiatae.

lusitanica L., portugiesische, ☉, f. Portugal.

**Clerodendron L.**, Loosbaum, XIV. II., Verbenaceae.

angustifolium Spgl., schmalblättriger, f. w. Mascarenas.

attenuatum RB., verschmälerter, f. w. Neuholland.

buxifolium L., buchsbaumblättriger, f. w. ?

calamitosum L., kümmerlicher, f. w. Java.

cernuum Wall., übergebogener, f. w. Ostindien.

coromandelinum Spgl. (*ovatum* Poir., *madagascarense*

Lod.), coromandelischer, f. w. f. w. Coromandel.

costatum RB., gerippter, f. w. Neuholland.

emirnense Boj., madagascarischer, f. w. Madagascar.

foetidum D. Don, stinkender, f. w. Nepal.

floribundum RB., blumenreicher, f. w. Neuholland.

fortunatum L., glücklicher, f. w. China.

fragrans Vent., wohlriechender, f. w. t. Japan, China.

b) flore pleno.

glaucum Wall., blaugrüner, f. w. Ostindien.

hastatum Wall., spontonblättriger, f. w. Ostindien.

helianthifolium Wall., sonnenrosenblättriger, f. w. Ostind.

heterophyllum RB., verschiedenblättriger, f. w. Mascar.

inermis RB., unbewehrter, f. w. China, Ostind., Neuholl.

infortunatum L., unglücklicher, f. w. Ceylon.

Leucosceptrum D. Don, weifsähriger, f. w. Nepal.

ligustrinum RB., ligusterähnlicher, f. w. Mascarenas.

lividum Lindl., blaubrauner, f. w. China.

macrophyllum Sims, großblättriger, f. w. Mascarenas.

nutans Wall., überhängender, f. w. Ostindien.

paniculatum L. (*pyramidale* Andr.), f. w. Java, Cochinchina.

phlomoides L. suppl., phlomisähnlicher, f. w. Ostind.

pubescens Lindl., weichhaariger, f. w. Westindien.

salicifolium Lod., weidenblättriger, f. w. Ostindien.

serratum Spgl., sägezahniger, f. w. Ostindien.

Siphonanthus RB., röhrenblumiger, f. w. Ostind., Java.

squamatum Vahl (*speciosissimum* Paxt.), schuppiger, f.

w. China, Japan.

ternifolium H. B. K., dreiblättriger, f. w. Südamerika.

tomentosum RB., filziger, f. w. t. Neusüdwallis.

trichotomum Thbg., dreizinkiger, f. w. t. Japan.

urticaefolium Roxb., nesselblättriger, f. w. Ostindien.

verticillatum D. Don, wirtelblättriger, f. w. Nepal.

violaceum Zeyh., violetter, f. w. ?

viscosum Vent., schmieriger, f. w. Ostindien.

volubile P. B., windender, f. Sch. Guinea.

? *coccineum* Hort. v. *Holmskioldia sanguinea*.

**Clethra L.**, Else, X. 1., Ericaceae.

acuminata Mchx. (*glauca* Hort.), zugespitzte, f. f. b. Carolina.

alnifolia L., erlenblättrige, f. f. b. Nordamerika.

arborea Ait., baumartige, f. k. Madeira.

β) minor. γ) variegata.

ferruginea Lk., rostfarbige, f. t. Peru.

nana Lod., Zwerg-E., f. f. b. Nordamerika.

paniculata Ait., rispige, f. f. b. Carolina.

scabra P., scharfe, f. f. b. Georgien.

tinifolia Sw., lorbeerblättrige, f. w. Jamaica.

tomentosa Lam. (*incana* P., *pubescens* W., *glauca* Hort.),

filzige, f. f. b. Nordamerika.

**Cleyera Thbg.** (A. Cleyer, ein Hesse, welcher Japan und China bereiste), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

japonica Thbg., japanische, f. t. Japan.

**Clianthus** Sol., Prachtwicke, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

puniceus Sol., dunkelrothe, f. t. Neuzeeland.

**Clidemia** D. Don, Clidemia, X. i., Lythraeae-Melastomaceae.

aggregata D. Don, angehäuften, f. w. Peru.

agrestis D. Don, Acker-C., f. w. Guiana.

alata G. Don, geflügelte, f. w. Guiana.

cernua D. Don, übergebogene, f. w. Peru.

elegans D. Don, zierliche, f. w. Guiana.

hirta D. Don, scharfhaarige, f. w. Jamaica.

holosericea D. Don, seidenhaarige, f. w. Brasilien.

microphylla D. Don, kleinblättrige, f. w. Südamerika.

nivea D. Don, schneeweiße, f. w. Südamerika.

rubra G. Don, rothe, f. w. Guiana.

spicata D. Don, ährenförmige, f. w. Guiana.

velutina D. Don, sammethaarige, f. w. Westindien.

**Cliffortia** L. (G. Cliffort, berühmter Beförderer der Botanik), XIII. ii. (XXII. xii.), Rosaceae.

cinerea Thbg., aschfarbige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

cordifolia Lam., herzblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

crenata L., gekerbte, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

cuneata Ait., keilblättrige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

ericaefolia L., heideblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

falcata L., sichelförmige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

ilicifolia L., stechhülsenblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

obcordata L., verkehrtherzblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

pulchella L., hübsche, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

ruscifolia L., mäusedornblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

sarmentosa L., rankende, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

strobilifera L., zapfenähnliche, f. k. t. Cap d. gut. H.

ternata L., dreizählige, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

tridentata W., dreizählige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

trifoliata L., dreiblättrige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Cliftonia** Banks, Cliftonie, X. i., Ericaceae.

ligustrina Sims, ligusterähnliche, f. k. f. b. Georgia (Nordamerika).

**Clinopodium** T., Wirbelborste, XIV. i., Labiatae.

aegyptiacum Lam., ägyptische, 4. f. Aegypten.

organifolium La Bill., dostenblättrige, 4. f. Syrien.

vulgare L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

**Clintonia** Dougl. (De Witt. Clinton, Gouverneur von Neu-York), XVI. ii, Campanulaceae-Lobeliaceae.

elegans Dougl., zierliche, ①. f. m. Columbien.

pulchella Lindl., hübsche, ①. f. m. Columbien.

**Clitoria** L., Clitorie, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

arborescens Anders., baumartige, f. w. Trinidad.

brasiliensis L., brasilianische, ①. w. Brasilien.

coerulea Schr., scharlachfarbige, f. Sch. w. Brasilien.

formosa H. B. K., schöne, 4. f. Sch. w. Südamerika.

gracilis Fisch., schlanke, 4. f. Sch. w. Südamerika.

heterophylla Lam., verschiedenblättrige, 4. f. Sch. w. Ostindien.

lascivia Boj., üppige, f. Sch. w. Madagascar.

mariana L., maryländische, 4. f. b. Nordamerika.

mexicana Lk., mexicanische, 4. Sch. t. w. Mexico.

Plumieri Turp., Plumier's, 4. Sch. w. Westindien.

ternatea L., moluckische, 4. f. Sch. w. Molucken.



**Clitoria**

*virginiana* L., (*amoena* Roth), virginische, 4. Sch. t. w.  
 Virginien, Westindien.

*Broussonetii* Balb. v. *Cologania Broussonetii*. *Galactia* L. v. *Galactia pendula*. *multiflora* Sw. v. *Vilmorinia multiflora*. *polyphylla* Poir. v. *Barbieria polyphylla*.

**Clivea** Lindl. (zu Ehren der Herzogin von Northumberland so genannt), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*nobilis* Lindl., edle, 4. Zw. t. w. Cap der gut. Hoffn.

**Clusia** Plum. (Charles de l'Ecluse [Clusius], berühmter Botaniker), XIII. 1. (XXIII. 1.), Guttiferae.

*alba* L., weiße, 5. w. Westindien.

*flava* L., gelbe, 5. w. Jamaica.

*nemorosa* Meyer, Hain-C., 5. w. Surinam.

*rosea* L., rosafarbige, 5. w. Carolina, Hispaniola.

*venosa* L., aderige, 5. w. Martinique.

*scandens* Roxb. v. *Bridelia scandens*.

**Cluytia** Ait. (*Clutia* Boerh.), (Cluyt, Professor der Botanik zu Leyden), XVI. III. (XXII. XIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*alaternoides* L., schmalblättrige, 5. k. t. Cap d. g. H.

*collina* Roxb., Hügel-C., 5. w. Ostindien.

*daphnoides* W., kellerhalsähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

*ericoides* Thbg., heideähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

*heterophylla* Thbg., verschiedenblättrige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*patula* Roxb., ausgebreitete, 5. w. Ostindien.

*polifolia* Jacq., poleiblättrige, 5. k. t. Cap d. gut. H.

*polygonoides* L., knöterichähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

*pubescens* Thbg., weichhaarige, 5. k. t. Cap d. g. H.

*pulchella* L., hübsche, 5. k. t. Cap der guten Hoffn.

*tenuifolia* W., feinblättrige, 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*tomentosa* L., filzige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Clypeola** L., Schildkraut, XV. 1., Cruciferae.

*echinata* DC. (*lasiocarpa* P.), stacheliges, 6. f. Kleinasien.

*eriphora* DC., wolköpfiges, 6. f. Spanien.

*Jonthlaspi* L., ausgebreitetes, 6. f. Südeuropa, Mittelasien.

*maritima* L. v. *Koniga maritima*.

**Cnemidostachys** Mart., Spindelähre, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*Chamaelea* Spgl., stachelfrüchtige, 6. w. Ostindien.

**Cneorum** L., Zeiland, III. 1., Tricoccae-Stachhouseae.

*pulverulentum* Vent., aschfarbiger, 5. k. Teneriffa.

*tricocon* L., dreiköpfiger, 5. k. Südeuropa.

**Cnestis** Juss., Hornkapsel, X. IV., Amyrideae-Connaraceae.

*corniculata* Lam., schmale, 5. w. Guinea.

*glabra* Lam., glatte, 5. w. Mascarenas.

*polyphylla* Lam., vielblättrige, 5. w. Mascarenas.

**Cnicus** Vaill., Benediktenkraut, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

*benedictus* L. G., gemeines, 6. f. Griechenland, Kleinasien, Südeuropa.

*Acarna* L. v. *Picnomon Acarna*. *afer* Tenor (et *Cassabonae* W. etc.) v. *Chamaepeuce nivea*, *carlinoides* Schr. v. *Echenais carlinoides*. *carthamoides*

**Cnicus**

Lk. v. *Leuzea carthamoides*. *cernuus* L. v. *Silybum* (Alfredia) *cernuum*. *pinnatifidus* W. v. *Serratula pinnatifida*. *pygmaeus* L. v. *Saussurea pygmaea*. *rectus* H. Par. v. *Chamaepeuce stricta*. *syriacus* W. (*obvallatus* Salzm.) v. *Notobasis syriaca*. *uniflorus* L. v. *Rhapontica uniflora*. Hinsichtlich der übrigen s. *Cirsium*.

**Cnidium** Cass., *Cnidium*, V. II., Umbelliferae.

*apioides* Spgl., selleriähnliches, 4. f. Krain, österreichisches Litorale.

*atropurpureum* Spgl., schwarzpurpurfarbiges, 4. f. Nordamerika.

*canadense* Spgl., canadisches, 4. f. Canada.

*dahuricum* Fisch. et Mey. (*striatum* Turcz.), dahurisches, 4. f. Dahurien.

*Fischeri* Spgl., Fischer's, 4. f. Sibirien.

*Monnieri* Cass. (*confertum* Mch.), Monnier's, 4. f. Krain, südliches Frankreich.

*palustre* Rchb. (*venosum* Koch), Sumpf-C., 4. f. Deutschland, Schweden, Podolien.

*pyrenaicum* Spgl., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

*alsaticum* Spgl. v. *Peucedanum alsaticum*. *Silau* Spgl. v. *Silau pratensis*.

**Cnidoscolus** Pohl, Brennnufs, XXI. x. (XVI. vi.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*fragrans* Pohl (Kunth), wohlriechende, 4. w. Cuba.

*herbaceus* Pohl (L.), krautige, 4. w. Carolina, Neuspan.

*napaeifolius* Pohl (Desr.), napaeablätterige, 4. w. Westindien.

*urens* Pohl (L.), ächte, 4. w. Südamerika.

*vitifolius* Pohl, weinblätterige, 4. w. Brasilien.

**Cobaea** Cav. (B. Cobo, spanischer Botaniker), V. I., Convolvulaceae-Cobaeaceae.

*scandens* Cav., klimmende, 4. 4. Sch. t. k. Mexico.

**Coburgia** Swt. (zu Ehren des Hauses Sachsen-Coburg so genannt), VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

*fulva* Herb., rothbraune, 4. Zw. w. Südamerika.

*incarnata* Swt., fleischfarbige, 4. Zw. w. Quito.

*reticulata* Herb. v. *Amaryllis*.

**Coccocypselum** P.Br., Beerenröthe, IV. I., Rubiaceae.

*repens* P.B. (*herbaceum* Lam.), kriechende, 4. w. Jamaica.

*buxifolium* Spgl. v. *Fernelia buxifolia*.

**Coccoloba** L., Seetraube, VIII. III., Portulacae-Polygoneae.

*acuminata* H. B. K., zugespitzte, 4. w. Neu-Granada.

*barbadensis* Jacq., barbadensische, 4. w. Westindien, Südamerika.

*brasiliensis* Spgl., brasilianische, 4. w. Brasilien.

*diversifolia* Jacq., verschiedenblätterige, 4. w. Hispaniola.

*emarginata* Jacq., ausgerandete, 4. w. Südamerika.

*excoriata* L., rindenlose, 4. w. Westindien.

*flavescens* Jacq., gelbliche, 4. w. Hispaniola.

*latifolia* Lam., breitblätterige, 4. w. Südamerika.

*laurifolia* Jacq., lorbeerblätterige, 4. w. Caraccas.

*longifolia* Lk., langblätterige, 4. w. Westindien.

*nivea* Jacq., schneeweiße, 4. w. Westindien.

*obovata* H. B. K., verkehrteiförmige, 4. w. Südamer.

*obtusifolia* Jacq., stumpfblätterige, 4. w. Südamerika.

**Coccoloba**

- orbicularis* Lod., rundblättrige, ♀. w. Südamerika.  
*pubescens* L. (*grandifolia* Jacq.), weichhaarige, ♀. w. Westindien.  
*punctata* L. (*coronata* Jacq.), punktirte, ♀. w. Westind.  
*tenuifolia* L., feinblättrige, ♀. w. Jamaica.  
*uvifera* L., ächte, ♀. w. Westindien, Südamerika.  
*virens* Lindl., grünliche, ♀. w. ? Westindien.

**Cocculus** C. Bauh., Fiskkörnerbaum, XXII. VI. (VI. III.), Menispermaceae.

- carolinus* DC., carolinischer, ♀. Sch. k. Carolina, Georgien.  
*cordifolius* DC., herzblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*crispus* DC., krauser, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*incanus* Coleb., weißgrauer, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*laurifolius* DC., lorbeerblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*orbiculatus* DC., kreisblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*palmatius* DC., handförmiger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*Plukenetii* DC., Plukenet's (*ächter*), ♀. Sch. w. Ostind.  
*rotundifolius* DC., rundblättriger, ♀. Sch. w. ?  
*suberosus* DC., korkiger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*tomentosus* Coleb., filziger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*villosus* DC., zottiger, ♀. Sch. w. Ostindien.  
 β) *hirsutus* DC.

**Cochlearia** T., Löffelkraut, XV. III., Cruciferae.

## I. Genuinae.

- anglica* L., englisches, ☉. f. Nördl. Europa, Sibirien.  
*danica* L., dänisches, ☉. f. Nordeuropa.  
*fenestrata* RB., gitterförmiges, ♂. f. Grönland.  
*glastifolia* L., waidblättriges, ♂. f. ? Süddeutschland, Frankreich.  
*integrifolia* DC., ganzblättriges, ☉. f. Sibirien.  
*officinalis* L., officinelles, ♂. f. Nordeuropa, Deutschland, Schweiz etc.

β) *groenlandica* L. (*minor* Sm.).

- pyrenaica* DC., pyrenäisches, ♂. f. Pyrenäen, Steyermark.

II. *Jonopsidium* DC.

- acaulis* Dsf. (*pusilla* et *olysipponensis* Brot.), stengelloses, ♂. f. k. Portugal, Nordafrika.  
*Armoracia* L. et *macrocarpa* W. K. v. *Armoracia rusticana* etc. *auriculata* Lam. et *saxatilis* Lam. v. *Kerneria saxatilis* etc. *Draba* L. v. *Lepidium* *Draba nilotica* Del. v. *Senebiera nilotica*.

**Cochliospermum** Lagasc., Schneckensame, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

- Cavanillesii* Lagasc., Cavanille's, ☉. f. Spanien.  
*Clemente* Lagasc., Clemente's, ☉. f. Spanien.

**Cochlospermum** H. B. K. v. Wittelsbachia.**Cocos** L., Kokospalme, XXI. VI. (VI. I.), Palmae.

- flexuosa* Mart., gebogene, ♀. w. Brasilien.  
*nucifera* L., wahre, ♀. w. Ost- und Westindien.  
*plumosa* Lod. (? *comosa* Mart.), federige, ♀. w. Brasilien.  
*aculeata* Jacq. et *fusiformis* Sw. v. *Acrocomia acul. maldivica* Gmel. v. *Lodoicea Sechellarum*.

**Codarium** Soland., Mehlhülse, II. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

- acutifolium* Afzel. (*nitidum* Vahl), spitzblättrige, ♀. w. Guinea.  
*obtusifolium* Afzel., stumpfblättrige, ♀. w. Guinea.



**Codon** L., Codon, X. 1., Convolvulaceae.

Royeni L., Royen's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
*Codonophora grandiflora* Lindl. v. *Gesneria prasinata. lanceolata* Lindl. v. *Rytidophyllum tomentosum*.  
*Codonoprasum* Rchb. v. *Allium*.

**Coelestina** Cass., Coelestine, XIX. x., Compositae-Eupatorineae.

ageratoides H. B. K., ageratumähnliche, 4. ♀. k. t. Mexico.

β) latifolia DC. γ) corymbosa DC. (coerulea Cass.).  
 micrantha Spgl., kleinblumige, 4. ♀. k. t. Neuspanien.

**Coelogyne** Lindl., Hohnarbe, XX. 1., Orchideae.

cristata Lindl., kanmige, 4. w. Nepal.  
 fimbriata Lindl., gefranzte, 4. w. China.  
 flaccida Lindl., schlaffe, 4. w. Ostindien.  
 nitida Lindl., glänzende, 4. w. Ostindien.  
 maculata Lindl., gefleckte, 4. w. Pundua.  
 Gardneriana Lindl., Gardner's, 4. w. Ostindien.  
 ocellata Lindl., geäugelte, 4. w. Nepal.  
 ovalis Lindl., eiförmige, 4. w. Ostindien.  
 prolifera Lindl., sprossende, 4. w. ? Ostindien.  
 punctulata Lindl., feinpunktirte, 4. w. Ostindien.  
 Wallichiana Lindl., Wallich's, 4. w. Pundua.

**Coffea** L., Kaffeebaum, V. 1., Rubiaceae.

arabica L., arabischer, ♀. w. Arabien, Ostafrika.

occidentalis L. v. *Tetramerium odoratissimum*.

**Coix** L., Thränengras, XXI. III. (III. 1.), Gramineae.

agrestis W., Acker-T., 4. w. Ostindien.  
 arundinacea Lam., rohrartiges, 4. w. Mexico.  
 exaltata Jacq., hohes, 4. w. China.  
 Koenigii Spgl., König's, 4. w. Ostindien.  
 Lacryma L., gemeines, ☉. w. m. f. Ostindien.

*Colax Barringtoniae* Lindl. etc. v. *Maxillaria Barringtoniae* etc.

**Colbertia** Salisb. (M. Colbert, berühmter französischer Minister), XIII. v., Dilleniaceae.

coromandelina Salisb., coromandelische, ♀. w. Coromandel.

scabrella D. Don, schärfliche, ♀. w. Nepal.

**Colchicum** T., Zeitlose, VI. III., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

alpinum DC. (montanum All.), Alpen-Z., 4. f. Südliche Schweiz, Apenninen.

arenarium Kit., Sand-Z., 4. Zw. f. Ungarn, Oberitalien, Taurien.

autumnale L., Herbst-Z., 4. Zw. f. Europa.

b) album. c) atropurpureum. d) fol. variegat.

e) flore pleno. f) purpureo striatum. g) striatum flore pleno.

byzantinum Ker, byzantinische, 4. Zw. f. Thracien, Kleinasien.

crociflorum Sims, safranblumige, 4. Zw. f. Südeuropa.

montanum L. (*bulbocodioides* Brot.), Berg-Z., 4. Zw. f. Süd- und Westeuropa.

Szovitsii Fisch. et Mey., Szovits's, 4. Zw. f. Sonchetien.

tessellatum Mill., würfelige, 4. Zw. f. Südeuropa.

umbrosum Fisch., schattenliebende, 4. Zw. f. Krim.

variegatum L., bunte, 4. Zw. f. Sicilien, Creta, Portugal.

**Colchicum**

*caucasicum* Spgl. v. *Merendera caucasica*. *versicolor* Ker v. *Bulbocodium versicolor*.

**Coldenia** L. (C. Colden, nordamerikanischer Botaniker), IV. III., *Asperifoliaceae*.

*procumbens* L., niederliegende, ☉. m. f. w. Ostindien.

*Coleanthus subtilis* Seid. v. *Schmidtia subtilis*.

**Colebrookea** Sm. (H. F. Colebrooke, englischer Botaniker), XIV. II., *Verbenaceae*.

*oppositifolia* Sm., gegenblättrige, ☼. t. Nepal.

*ternifolia* Roxb., dreiblättrige, ☼. w. t. Ostindien.

**Coleonema** Bartl. et Wendl., Scheidenfaden, V. I., *Tricoccae-Rutaceae*.

*album* Bartl. et Wendl., weißer, ☼. t. k. Cap d. g. H.

*pulchrum* Hook. (? *erubescens* Hort.), schöner, ☼. t. Cap der guten Hoffnung.

**Coleus** Lour., Scheidenlippe, XIV. I., *Labiatae*.

*aromaticus* Benth. (? *amboinicus* Lour.), wohlriechende, ☼. w. Ostindien.

*barbatus* Benth., bärtige, ☼. w. Abyssinien.

*Collaea procumbens* Spgl. v. *Chrysanthellum procumbens*.

**Colletia** Commers. (Collet, französischer Botaniker), V. I., *Rhamneae*.

*horrida* Brogn. (*ferox* Gill.), rauhe, ☼. k. t. Chili.

*serratifolia* Vent., sägeblättrige, ☼. w. Peru.

*spinosa* Lam. (*horrida* W.), dornige, ☼. w. Peru.

*Ephedra* Vent. et *obcordata* Vent. v. *Retanilla Ephedra* et *obcordata*.

**Collinsia** Nutt. (Z. Collins, Vicepräsident der naturforschenden Gesellschaft zu Philadelphia), XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

*bicolor* Benth., zweifarbig, ☉. f. Californien.

*grandiflora* Lindl., großblumige, ☉. f. Columbien.

*heterophylla* Nutt., verschiedenblättrige, ☉. f. Columbien.

*parviflora* Lindl., kleinblumige, ☉. f. Columbien.

*verna* Nutt., Frühlings-C., ☉. f. Nordamerika.

*sparsiflora* Fisch. et Méy., zerstreutblumige, ☉. f. Neu-Californien.

**Collinsonia** L. (P. Collinson, ein Beförderer der Botanik), II. I., *Labiatae*.

*anisata* Sims, gewürzhafte, 4. f. b. Südcarolina, Georgien.

*canadensis* L., canadische, 4. f. Nordamerika.

β) *cordata*. γ) *ovata*.

*ovalis* Pursh, eiförmige, 4. f. b. Südcarolina.

*scabra* P. (*praecox* Walt., *scabriuscula* Ait.), scharfe, 4. f. b. Südcarolina.

*tuberosa* Mchx. (*serotina* Walt.), knollige, 4. Kn. f. b. Carolina.

**Collomia** Nutt., *Collomia*, V. I., *Polemoniaceae*.

*Cavanillesii* H. et A., Cavanille's, ☉. f. Chili.

*coccinea* Lehm. (*lateritia* D. Don), scharlachfarbig, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

*gilioides* Benth., giliaähnliche, ☉. f. Californien.

*glutinosa* Benth., kleberige, ☉. f. Californien.

*gracilis* Dougl., schlanke, ☉. f. Nordwestliches Amerika, Californien.

*grandiflora* Dougl., großblumige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

*heterophylla* Hook., verschiedenblättrige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

**Collomia**

*linearis* Nutt., gleichbreitblättrige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

*Colobachne Gerardi* P. Beauv. et *vaginata* P. Beauv. v. *Alopecurus Gerardi* et *angustifol.*

**Colocynthis** T. Schrad., Coloquinte, XXI. x., Cucurbitaceae.

*amarissima* Schrad., bittere, ☉. m. f. Cap d. gut. H.

*officinalis* Schrad., officinelle, ☉. m. f. Cap d. gut. H.

**Cologania** H. B. K., Cologanie, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, 4. Sch. w. Mexico.

*Broussonetii* DC., Broussonet's, 4. Sch. w. ?

**Colophonia** Commers., Colophonie, VI. i., Amyrideae.

*mauritiana* Kunth, mascarenische, 5. w. Mascarenas.

**Colpodium** Trin., Kielgras, III. ii., Gramineae.

*altaicum* Trin., altaisches, 4. f. Altai.

*latifolium* RB., breitblättriges, 4. f. Nördlichstes Amerika, Sibirien.

*Steveni* Trin. (*Agrostis versicolor* Stev.), Steven's, 4. f. Caucasus.

**Colubrina** Brong., Natterbaum, V. i., Rhamneae.

*asiatica* Brong., asiatischer, 5. w. Ceylon.

*cubensis* Brong., cubaischer, 5. w. Cuba.

*ferruginosa* Brong., rostfarbiger, 5. w. Bahama.

*reclinata* Brong., zurückgebogener, 5. w. Jamaica.

*Columellea biennis* Jacq. v. *Nestlera biennis*.

**Columnea** L. (Fab. Columna [Colonna], berühmter italienischer Botaniker), XIV. ii., Personatae-Bignoniaceae (*Gesneraceae*).

*hirsuta* Sw., rauhhaarige, 5. w. Jamaica.

*rutilans* Sw., rothgelbe, 5. w. Jamaica.

*scandens* L. (*villosa* P.), klimmende, 5. Sch. w. Westindien, Südamerika.

*erecta* Lam. v. *Trevirania coccinea*. *trifoliata* Lk. (*violacea* Jacq. fil.) v. *Stemodia trifoliata*.

**Coluria** RB., Colurie, XII. iii., Rosaceae.

*potentilloides* RB., fingerkrautähnliche, 4. f. Sibirien.

**Colutea** T., Blasenstrauch, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*arborescens* L., baumartiger, 5. f. Mittel- u. Südeuropa.

*cruenta* Ait. (*orientalis* Lam., *sanguinea* Pall., *humilis* Scop.), blutfarbiger, 5. f. Süddeutschland, Italien, Taurien.

*media* W., mittlerer (Bastard-B.), 5. f. ?

*nepalensis* Sims, nepal'scher, 5. f. b. k. Nepal.

*Pocockii* Ait. (*haleppica* Lam., *istria* Mill., *procumbens* L'Her.), Pocock's, 5. f. Levante.

*caspica* MB. et *davurica* MB. v. *Sphaerophysa caspica* etc. *frutescens* L. v. *Sutherlandia frutescens*.

*herbacea* L. (*annua* Murray) et *perennans* Jacq. v. *Lessertia annua* etc.

**Colvillea** Boj. (Sir Charles Colville, Gouverneur der Insel Mauritius), XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.

*racemosa* Boj., traubige, 5. w. Mascarenas.

*Colymbea excelsa* Sogl. et *quadrifaria* Salisb. v. *Araucaria excelsa* et *imbricata*.

**Comandra** Nutt., Schopfbeutel, V. i., Sandalaceae.

*umbellata* Nutt., doldiger, 4. f. Nordamerika.



- Comaropsis** Rich., Sumpfbeere, XIII. III., Rosaceae.  
*Doniana* DC., Don's, 4. f. Nordamerika.  
*fragarioides* DC., erdbeerähnliche, 4. f. Nordamerika.
- Comarum** L., Sumpfröschen, XII. III., Rosaceae.  
*palustre* L., fünfblättriges, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.
- Combretum** Löffl., Langfaden, VIII. I., Onagrariae-Combretaceae.  
*elegans* H. B. K., zierlicher, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*farinosum* H. B. K., mehlig, ♀. Sch. w. Mexico.  
*grandiflorum* G. Don, großblumiger, ♀. w. Sierra Leone.  
*nanum* Hamilt. D. Don, zwergiger, ♀. t. w. Nepal.  
*paniculatum* G. Don, rispiger, ♀. Sch. w. Guinea.  
*racemosum* P. Beau., traubiger, ♀. Sch. w. Guinea.  
*secundum* Jacq. (*laxum* Aubl.), einseitiger, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.  
*Afzelii* G. Don. *barbatum* G. Don. *comosum* G. Don, *decandrum* Roxb., *intermedium* G. Don, *purpureum* Vahl v. *Poivrea Afzelii* etc.
- Comesperma** La Bill., Schopfsame, XVII. v. (XVI. v.), Polygalaceae.  
*cordifolium* Cunn., herzblättriger, ♀. t. Neuholland.  
*ericinum* DC., heideähnlicher, ♀. t. Neuholland.  
*gracile* Pox., schlanker, ♀. t. Neuholland.
- Commelina** Plum. (Joh. et Casp. Commelin, berühmte holländische Botaniker), III. I., Commelinaceae.  
*africana* L., afrikanische, 4. k. t. Cap d. g. H.  
*angustifolia* Mchx. (*truncata* W.), schmalblättrige, 4. k. Carolina.  
*caripensis* Humb., caripensische, 4. w. Südamerika.  
*caroliniana* Walt., carolinische, 4. k. Carolina.  
*cayennensis* Rich., cayennische, 4. w. Cayenne.  
*clandestina* Mart., heimlichblüthige, 4. w. Brasilien.  
*coelestis* W. (*urania* Hortul.), himmelblaue, 4. k. ? Mexico.  
*communis* L., gemeine, ☉. m. f. w. Westindien.  
*cucullata* L. (*bengalensis* Murr.), kappenförmige, 4. w. Ostind.  
*cyanea* RB., kornblumenblaue, 4. k. t. Neuholland.  
*deficiens* Herb., abfallende, 4. w. Brasilien.  
*dianthifolia* Red., nelkenblättrige, 4. Kn. w. ?  
*dubia* DC., zweifelhafte, 4. w. ?  
*gracilis* R. et Pav., schlanke, 4. k. t. Lima.  
*hirtella* Vahl, kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.  
*longicaulis* Jacq., langstengelige, 4. w. Caracas.  
*mollis* Jacq., weiche, 4. w. Caracas.  
*obliqua* Vahl, schieflättrige, 4. w. ?  
*orchiodes* Booth., orchisähnliche, 4. t. w. Mexico.  
*pallida* Humb., Bonpl., bleiche, 4. w. Südamerika.  
*parviflora* Lk., kleinblumige, 4. t. ?  
*polygama* Roth, vielehige, 4. w. Japan, China, Ostind.  
*rosea* Schlchd., rosafarbige, ☉. m. f. Mexico.  
*tuberosa* L., knollige, 4. Kn. k. t. Mexico.  
*variabilis* Schlchd., bunte, 4. w. Mexico.
- Hinsichtlich der übrigen s. *Asteilema*.
- Commersonia** Forst. (Commerson, berühmter französischer Reisender u. Botaniker), V. v., Büttneriaceae.  
*echinata* Forst., stachelige, ♀. w. Molucken.  
 β) *platyphylla* Andr.  
*Fraseri* Gay, Fraser's, ♀. t. Neuholland.  
*Gaudichaudii* Gay, Gaudichaud's, ♀. t. Westl. Neuholl.  
*diphylla* Andr. et *dasyphylla* Bot. Rep. v. Büttneria *dasyphylla*. *speciosa* Sonn. v. *Barringtonia speciosa*.

- Commiphora** Jacq., Gummibeere, XXII. VII. ?  
*madagascarensis* Jacq., madagascarisches, f. w. Madagascar.
- Comocladia** P. Br., Schopfast, III. I., Amyrideae.  
*dentata* Jacq., gezähnelter, f. w. Westindien.  
*ilicifolia* Sw., stechhülsenblättriger, f. w. Westindien.  
*integrifolia* L., ganzblättriger, f. w. Westindien.
- Comparettia** Pop. (A. Comparetti, italienischer Botaniker), XX. I., Orchideae.  
*coccinea* Lindl., scharlachfarbige, 4. w. Brasilien.  
*falcata* Pöpp., sichelförmige, 4. w. Mexico.
- Comptonia** Banks (H. Compton, Bischof zu London, Freund des J. Banks), XXI. III. Amentaceae.  
*asplenifolia* Ait., strichfarnblättriger, f. f. Nordamer.
- Conanthera** R. et Pav., Kegelbeutel, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*bifolia* R. et P., zweiblättriger, 4. Zw. t. Chili.  
*Simsii* Swt. (*bifolia* Sims), Sims, 4. Zw. t. Chili.  
*campanulata* Hook. v. *Cummingia campanul.*
- Condalia** Cav. (A. Condal, spanischer Naturforscher), V. I., Rhamneae.  
*microphylla* Cav., kleinblättriger, f. k. t. Chili.  
*Condonocarpus australis* Cun. v. *Gyrostemon attenuatus*.
- Condyllocarpus officinalis** Hofm. v. *Tordylium officinale*.
- Conium** L., Schierling, V. II., Umbelliferae.  
*maculatum* L., ächter, ♂. f. Europa.  
*β) croaticum* Kit.  
*moschatum* Humb. Bonpl., moschusduftender, 4. w. Südamerika.  
*africanum* L. v. *Capnophyllum africanum*. *Arracacha* Hook. vid. *Arracacia esculenta*. *dichotomum* Brouss. v. *Oenanthe nodiflora*. *dichotomum* Dsf. v. *Ulopermum dichotomum*. *rigens* L. vid. *Trachyspermum rigens*.
- Connarus** L., Baumbohne, XVI. VI., Amyrideae-Connaraceae.  
*nitidus* Roxb., glänzende, f. w. Silhet.  
*paniculatus* Roxb., rispige, f. w. Ostindien.  
*pubescens* DC., weichhaarige, f. w. Guiana.  
*africanus* Lam. v. *Omphalobium africanum*.
- Conocarpus** Jacq., Kegelzapfen, V. I., Onagrariae-Combretaceae.  
*acutifolius* H. B. K., spitzblättriger, f. w. Südamerika.  
*erectus* Jacq., aufrechter, f. w. Jamaica.  
*procumbens* Jacq., niederliegender, f. w. Cuba.  
*racemosus* L. Jacq., traubiger, f. w. Südamerika.
- Conocephalus** Blume, Kegelnessel, XXI. IV., Urticaceae.  
*naucleiflorus* Lindl., naucleablumige, f. w. Ostindien.
- Conopodium** Koch, Kegeldolde, V. II., Umbelliferae.  
*canadense* Koch, canadische, S. f. Nordamerika.  
*Claytoni* Koch, Clayton's, S. f. Nordamerika.  
*denudatum* Koch, kahle, 4. f. England, Südeuropa, Taurien.
- Conospermum** Sm., Kegelsame, IV. I., Proteaceae.  
*capitatum* RB., kopfförmiger, f. t. Neuholland.  
*coeruleum* RB., blauer, f. t. Neuholland.  
*ellipticum* RB., elliptischer, f. t. Neuholland.  
*ericifolium* RB., heideblättriger, f. t. Neuholland.  
*longifolium* Sm., langblättriger, f. t. Neuholland.

**Conospermum**

taxifolium Sm., taxusblättriger, ⚥. t. Neuholland.

triplinervium RB., dreinerviger, ⚥. t. Neuholland.

**Conostylis** RB., Kegelgriffel, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

aculeata RB., stacheliger, 4. t. Neuholland.

serrulata RB., feinsägiger, 4. t. Neuholland.

setigera RB., borstiger, 4. t. Neuholland.

*americana* Pursh v. *Lophiola aurea*.

**Conringia** Lk. Heist. v. *Erysimum*.**Convallaria** L., Maiblume, VI. 1., Asparagineae.

majalis L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

b) rubra. b) flore pleno.

*bifolia* L. etc. v. *Majanthemum bifolium*. *japonica*

L. v. *Ophiopogon japonicus*. *Polygonatum* L. etc.

v. *Polygonatum vulgare*.

**Convolvulus** T., Winde, V. 1., Convolvulaceae.

albivenus Lindl., weifsaderige, ⚥. Sch. w. Algoa-Bai.

althaeoides L. (*argyreus* DC.), eibischähnliche, 4. Sch.

k. Südeuropa, Nordafrika.

arborescens Humb. Bonpl., baumartige, ⚥. w. Mexico.

arvensis L., Acker-W., 4. Sch. f. Europa.

β) corsicus R. et S.

bicolor Vahl, zweifarbig, ☉. Sch. w. Ostindien.

bicuspidatus Fisch., zweispitzi, 4. Sch. f. Dahurien.

bogotensis W., bogotische, 4. Sch. w. Südamerika.

bonariensis Cav., bonarische, 4. Sch. t. Chili.

bryonifolius Sims, zaunrübenblättrige, 4. Sch. k. t. China.

canariensis L., canarische, ⚥. Sch. k. t. Canarische Inseln.

candicans W., weifsbühende, 4. Sch. t. w. Ostindien.

Cantabrica L., cantabrische, 4. f. Südeuropa.

chinensis Ker, chinesische, 4. Sch. k. China.

ciliatus Vahl, gefranzte, 4. Sch. w. Cayenne.

Cneorum L., candische, ⚥. k. Süditalien, Griechenland.

dentatus Vahl, gezähnelte, 4. Sch. w. Ostindien.

Dorycnium L., griechische, ⚥. k. Griechenland.

ebracteatus Desr., kahle, 4. Sch. w. Südamerika.

elongatus W. (*pseudosiculus* Cav.), verlängerte, ☉. f.

Canarische Inseln.

emarginatus Lk., ausgerandete, 4. Sch. f. ?

erubescens Sims, röthliche, ♂. Sch. k. t. Neuholland.

farinosus L., mehlig, ☉. Sch. f. Madeira.

filicaulis Vahl, fadenstengelige, 4. w. Guinea.

floridus L., blüthenreiche, ⚥. k. Westind., canar. Inseln.

Gerardi R. et S., Gerard's, 4. f. Südeuropa.

glaber Aubl., kahle, ⚥. Sch. w. Guiana.

guianensis Aubl., guianische, ⚥. Sch. w. Guiana.

Hermanniae L'Her. (*crenatus* Jacq.), Herrmann's, 4.

Sch. w. Peru.

hirsutus MB., rauhhaarige, 4. Sch. f. Taurien.

hirtus L., rauhe, ☉. w. f. m. Ostindien.

Imperati Vahl, Imperati's, 4. f. Neapel, Nordafr., Paläst.

intermedius Lois., mittlere, 4. f. Südfrankreich.

italicus R. et S. (*hirsutus* Ten., *alceaefolius* Lam.), ita-

lienische, 4. Sch. k. Süditalien.

lanuginosus Vahl, wollige, 4. Sch. w. Ostindien.

linearis Curt. (*Tournefortii* Sbr.), schmalblättrige, 4.

k. Südfrankreich, Creta.

lineatus L., linirte, 4. k. Spanien, Portugal, Griechenl.

macrocarpus L., grofsfrüchtige, ☉. Sch. w. m. f. Südamer.



## Convolvulus

*maximus* L., größte, 4. Sch. w. Ceylon.  
*micranthus* W., kleinblumige, ⚥. Sch. w. Westindien.  
*multifidus* Thbg., vieltheilige, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.  
*ochraceus* B. Reg., ochergelbe, 4. Sch. w. Guinea.  
*panduratus* L., geigenförmige, 4. t. k. Virginien, Carolina.  
*pannifolius* Dry., starrblättrige, ⚥. Sch. k. Canarische Inseln.

*pentanthus* Jacq., fünfblumige, ⚥. Sch. w. Ostindien.  
*pentapetaloides* L., fünfblättrige, ☉. f. Majorca.  
*quinquefolius* L., fingerblättrige, ☉. w. Westindien.  
*reptans* L., kriechende, 4. w. Ostindien.  
*salvifolius* Sbr., salbeiblättrige, 4. w. Palästina.  
*saxatilis* Vahl, felsige, 4. f. Südeuropa, Kleinasien, Sibirien.

*Scammonia* L., Scammonium-W., 4. Sch. k. Kleinasien.  
*scoparius* L., besenartige, ⚥. k. Canarische Inseln.  
*scrobiculatus* Bot. Reg., grubige, 4. w. Südamerika.  
*serotinus* DC., späte, 4. Sch. f. ? Nordamerika.  
*Sibthorpii* R. et G. (*sagittifolius* Sibth.), Sibthorp's, 4. f. Griechenland.

*siculus* L., sicilianische, ☉. f. Süditalien.  
*suberosus* W., korkige, ⚥. w. ?  
*suffruticosus* Dsf., halbstrauchige, ⚥. Sch. k. Nordafrika, Griechenland.

*tiliaceus* W., lindenblättrige, 4. Sch. w. Brasilien.  
*tricolor* L., dreifarbig, ☉. f. Südeuropa.  
*undulatus* Cav. (*humilis* Jacq., *decumbens* Orteg., *evolvuloides* Dsf., *ciliatus* Roth), wellenblättrige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

*verticillatus* L., wirtelförmige, ⚥. Sch. w. Westindien.  
*Catesbaei* Spgl. etc. v. *Calystegia Catesbaeiana* etc.  
*nervosus* Burm. v. *Argyrea speciosa*. Hinsichtlich der übrigen s. *Ipomoea*.

## Conyza T., Dürrewurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuin.  
*aegyptiaca* Ait. (*spathulata* Hornem.), ägyptische, ☉. f. Aegypten.

*albida* W., weißliche, ☉. w. f. m. Brasilien.  
*altaica* DC., altaische, ♂. f. Sibirien.  
*ambigua* DC., zweifelhafte, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.  
*amoena* Lk., liebliche, 4. w. Congo.

*arguta* Less., scharfgesägte, 4. w. Brasilien.  
*candida* L., weißliche, ⚥. k. Candia.  
*chilensis* Spgl., chilesische, 4. k. f. Südamerika, westliches Nordamerika.

*diversifolia* Weinm., verschiedenblättrige, 4. k. t. Chili, Nordindien.

*fastigiata* W. (*paniculata* Dsf.), gipfelständige, ☉. w. m. f. Südafrika.

*floribunda* H. B. K., blüthenreiche, 4. w. Quito.

*Gouani* W., Gouan's, 4. k. t. Canarische Inseln.

*Grahami* DC., Graham's, 4. t. Bonarische Inseln.

*incisa* Ait., eingeschnittene, 4. ⚥. k. t. Cap d. gut. H.  
 a) *stipulacea* Dsf. β) *hirta* Less.

*ivaefolia* Less., ivablättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. H.

*laurifolia* Lam., lorbeerblättrige, ⚥. w. Mascarenas.

*limonifolia* Sm. (*candida* W.), limonienblättrige, ⚥. k. Griechenland.

*pinnatifida* Roxb., fiederspaltige, 4. w. Ostindien.

**Conyza**

*squarrosa* L., sparrige, 4. f. Europa.  
*thapsoides* MB., thapsusähnliche, 4. f. Südrufsland.  
*verbascifolia* W., königskerzenblättrige, 4. k. Sicilien,  
 Griechenland.

**II. Commidendrum DC.**

*gummifera* Roxb., gummigebende, ♀. w. t. St. Helena.  
*rugosa* Ait., runzelige, ♀. w. t. St. Helena.

*amplexicaulis* Lam. v. *Blumea amplexans* Nachtr.  
*angustifolia* H. Par. v. *Bacharis Pingraea* Nachtr.  
*arborescens* L. v. *Vernonia arborescens*. *aurita* L.  
 fil. etc. v. *Blumea aurita* etc. *balsamifera* L., *bi-*  
*frons* L. etc. v. *Pluchea balsamifera* etc. *cinerea*  
 L. v. *Vernonia cinerea*. *geminiflora* Ten. v. *Phag-*  
*nalon rupestre*. *glutinosa* Lam. v. *Psiadia glutinosa*.  
*inuloides* Ait. v. *Jasonia dichotoma*. *patula* Ait.  
 v. *Cyanopsis pubescens*. *prolifera* Lam. v. *Micro-*  
*glossum proliferum*. *rigida* Sw. v. *Vernonia rigida*.  
*saxatilis* L. v. *Phagnalon saxatile*. *sericea* Ait. v.  
*Schizogyne sericea*. *sordida* L. v. *Phagnalon sord-*  
*idum*. *Tenorii* Spgl. v. *Phagnalon rupestre*. *vir-*  
*gata* L. v. *Pterocaulon virgatum*. *viscosa* Hortul.  
 v. *Inula viscosa*.

**Cookia** Sonn. (Capit. Cook, berühmter Seefahrer), X. 1.,  
 Hesperideae-Aurantaceae.

*punctata* Sonn., punktirte, ♀. w. Südchina, Molucken.

**Cooperia** Herb. (J. Cooper, englischer Garten-Cultivator),  
 VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*chlorosolen* Herb., grünröhrige, 4. Zw. t. Texas.

*Drummondii* Herb., Drummond's, 4. Zw. t. Texas.

**Copaifera** L., Copaivbalsambaum (*Copaiba*, brasilia-  
 nischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

*guianensis* Desf., guianische, ♀. w. Guiana.

*officinalis* L., officinelle, ♀. w. Südamerika.

**Coptis** Salisb., *Coptis*, XIII. VI., Ranunculaceae.

*asplenifolia* Salisb., strichfarnblättrige, 4. f. Westliches  
 Nordamerika.

*trifolia* Salisb., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika, Grön-  
 land, Sibirien.

**Corallorrhiza** RB., Korallenwurz, XX. 1., Orchideae.

*innata* RB., verwachsene, 4. Kn. f. Europa, Nordamer.

*multiflora* Nutt., vielblumige, 4. Kn. f. Canada.

*odontorrhiza* Spgl., zahnige, 4. Kn. f. Nordamerika.

*hyemalis* Nutt. v. *Aplectrum hyemale*.

**Corbularia** Sal., Corbularie, VI. 1., Narcisseae-Ama-  
 ryllideae.

*serotina* Haw., spätblühende, 4. Zw. f. k. Portugal.

**Corchorus** L., Mufspflanze, XIII. 1., Tiliaceae.

*acutangulus* Lam., spitzkantige, ♀. w. Ostindien.

*aestuans* L., hitzige, ☉. w. Südamerika.

*capsularis* L., kapseltragende, ☉. w. Ostindien.

*hirsutus* L., rauhhhaarige, ♀. w. Westindien.

*hirtus* L., rauhästige, ♀. w. Südamerika.

*olitorius* L., gemeine, ☉. w. Ost- und Westindien etc.

*pilolobus* Lk. (*lasiolobus* Spgl.), rauhlapfige, ♀. w.  
 Südamerika.

*siliquosus* L., schotige, ♀. w. Westindien.

*tridens* L., dreizähnige, ♀. w. Ostindien.

**Corchorus**

*trilocularis* L., dreifächerige, ☉. w. Arabien.

*japonicus* L. v. *Kerria japonica*.

**Cordia** Plum. (E. et V. Cordus, alte deutsche Botaniker),  
Brustbeere, V. I., Asperifoliaceae.

*Collococca* L., zottigfrüchtige, ♀. w. Jamaica.

*dentata* Vahl, gezähnelte, ♀. w. Westindien.

*dichotoma* Forst., zweizinkige, ♀. t. Neuholland.

*Dillenii* Spgl. (*Sebestena* W.), Dillen's, ♀. w. Bahamische Inseln.

*domestica* Roth, gebaute, ♀. w. Ostindien.

*elliptica* Sw., elliptische, ♀. w. Antillen.

*flavescens* Aub., gelbliche, ♀. w. Guiana.

*Gerascanthus* Jacq., knaulblumige, ♀. w. Westindien,

*grandiflora* Lindl., großblumige, ♀. w. Südamerika.

Mexico.

*laevis* Jacq., glatte, ♀. w. Neu-Granada.

*latifolia* Rumpf., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

*macrophylla* L., großblättrige, ♀. w. Westindien.

*micrantha* Sw., kleinblumige, ♀. w. Jamaica.

*monoica* Roxb., einhäusige, ♀. w. Ostindien,

*Myxa* L., schwarze, ♀. w. Ostindien.

*nervosa* Lam., nervige, ♀. w. Guiana.

*nodosa* Lam., knotige, ♀. w. Guiana.

*obliqua* W., schiefblättrige, ♀. w. Ostindien.

*parviflora* Dsf., kleinblumige, ♀. w. Jamaica.

*reticulata* Roth, netzförmige, ♀. w. Ostindien,

*rugosa* W., runzelige, ♀. w. Südamerika.

*Sebestena* L., *Sebestena*-C., ♀. w. Westindien.

*spinescens* L., dornige, ♀. w. Ostindien.

*angustifolia* R. et S., *martinicensis* R. et S. v. *Varonia angustifol.* etc. *Patagonula* Ait. v. *Patagonula americana*.

**Cordyline** Commers., *Cordyline*, VI. I., Coronariae-  
Asphodeleae.

*australis* Endl., südliche, ♀. t. Norfolkinsel.

*cannaefolia* RB., blumenrohrblättrige, ♀. t. Neuholland.

*hemichrysa* Commers., goldfarbige, ♀. w. Ostindien,  
Mascarenas.

**Corema** D. Don, *Corema*, XXII. III., Tricoccae-Em-  
petreae.

*alba* D. Don, weißse, ♀. k. Portugal.

**Coreopsis** L., Wanzenblume, XIX. III., Compositae-  
Corymbiferae.

*alba* L., weißse, 4. w. Jamaica.

*angustifolia* Ait., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

*arguta* Pursh, spitzzahnige, 4. f. Nordamerika.

*aurea* Ait. (*trichosperma*  $\beta$  *aurea* Nutt.), goldfarbige,  
♂. f. Nordamerika.

*auriculata* L., geöhrt, 4. f. Nordamerika.

$\beta$ ) *glabrata*.

*chrysantha* L., goldfarbige, ♂. w. Westindien.

*coronata* Hook., gekrönte, ?☉. f. Texas.

*diversifolia* DC., Hook., verschiedenblättrige, 4. f. Ca-  
rolina, Texas.

*ferulaefolia* Jacq., steckenkrautblättrige, 4. k. Mexico.

*filifolia* Hook., fadenblättrige, ?☉. f. Mexico.

*grandiflora* Hogg., großblumige, 4. f. Nordamerika.

*incisa* Ker, eingeschnittene, 4. Sch. t. w. Jamaica.



**Coreopsis**

*integrifolia* Poir., ganzblättrige, 4. f. Carolina.  
*lanceolata* L., lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *glabella* Mchx. γ) *crassifolia* Ait.

*latifolia* Mchx., breitblättrige, 4. f. Carolina.  
*longipes* Hook., langfüßige, ? ⊙. f. Texas.  
*pauciflora* Lehm., wenigblumige, 4. f. Nordamerika.  
*reptans* L., kriechende, 4. Sch. t. Westindien.  
*senifolia* Mchx., kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.

β) *rigida* Nutt.

*tenuifolia* Ehrh. (*verticillata* Lam.), feinblättrige, 4. f. Nordamerika.

*trichosperma* Mchx., haarsamige, ♂. 4. f. Nordamerika.  
*Tripteris* L., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

*verticillata* L. (*delphinifolia* Lam.), wirtelblättrige, 4. f. Nordamerika.

*alata* Pursh., *alternifolia* L. etc. v. *Actinomeris*  
*alata et squarrosa. amplexicaulis* Cav. v. *Simsia*  
*amplexicaulis. artemisiaefolia* Jacq. v. *Cosmea sul-*  
*furea. Atkinsoniana* Dougl. v. *Calliopsis Atkinso-*  
*niana. heterophylla* Cav. v. *Echinacea heterophylla.*  
*parviflora* Jacq. v. *Cosmea parviflora. procera* Ait.  
 v. *Actinomeris squarrosa. tinctoria* Nutt. v. *Cal-*  
*liopsis tinctoria.* Hinsichtlich der übrigen s. *Bidens.*

*Coreosma viscosissima* Spach v. *Ribes viscosissimum.*

**Coriandrum** T., Coriander, V. II., Umbelliferae.

*sativum* L., gemeiner, ⊙. f. Südeuropa.

*testiculatum* L. v. *Bifora radians.*

**Coriaria** Nifs., Gerberstrauch, XXII. IX., Tricoccae-Corarieae.

*myrtifolia* L., myrtenblättriger, ♂. k. f. b. Südeuropa, Nordafrika.

*sarmentosa* Forst., starkwurzelnde, ♂. k. t. Neuzeeland.

**Coris** T., Coris, V. I., Globulariaceae.

*monspeliensis* L., französische, ♂. ♂. k. Südeuropa.

**Corispermum** L., Wanzensame, I. II., Aizoideae-Amaranthaceae.

*canescens* Kit., grauer, ⊙. f. Ungarn.

*glomeratum* Lag., knaulförmiger, ⊙. f. ?

*hyssopifolium* L., ysopblättriger, ⊙. f. Süd- und Osteuropa.

*intermedium* Schweig., mittlerer, ⊙. f. Preußen.

*Marschallii* Steven, Marschall's, ⊙. f. Taurien.

*nitidum* Kit., glänzender, ⊙. f. Ungarn.

*patens* R. et S., absteher, ⊙. f. ?

*polygaloides* Fisch. et Mey., kreuzblumenähnlicher, ⊙. f. Nordpersien.

*pungens* Vahl, stechender, ⊙. f. Caucasus.

*Redowskyi* Fisch., Redowsky's, ⊙. f. Sibirien.

*squarrosus* L. (*spicatus* W., *hyssopifol.* Pall.), sparriger, ⊙. f. Osteuropa, Asien.

*tenuis* Lk., feiner, ⊙. f. ?

**Cornucopiae** L., Füllhorngras, III. II., Gramineae.

*cucullatum* L., kappenförmiges, ⊙. f. Griechenland, Kleinasien.

**Cornus** T., Hartriegel, IV. I., Corneae.

*alba* L. (*stolonifera* Mchx., *tatarica* Mill.), weißer, ♂. f. Sibirien, Canada.

*alternifolia* L., wechselblättriger, ♂. f. Nordamerika.

**Cornus**

*asperifolia* Mchx. Ell., scharfblättriger, ♀. f. Südcarolina.  
*canadensis* L., canadischer, ♀. f. Canada.

*circinnata* L'Her. (*tomentosa* Mchx., *rugosa* Lam., *virginiana* H. P.), kreisblättriger, ♀. f. Nordamerika.  
*florida* L., schönblühender, ♀. f. Nordamerika.

*mascula* L., Corneliuskirschen-H., ♀. f. Europa.

a) fruct. ceræ coloris Duh. b) variegatus.

*oblonga* Wall., länglichblättriger, ♀. f. b. k. Nepal.

*paniculata* L'Her. (*albida* Ehrh., *racemosa* Lam., *citri-folia* H. Par.), rispiger, ♀. f. Nordamerika.

b) *radiata* Pursh.

*sanguinea* L. (*foemina* Raj.), gemeiner, ♀. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *Purshii* Don. c) fol. variegat.

*sericea* L'Her. (*Amomum* du Roi, *rubiginosa* Ehrh., *coerulea* Lam., *lanuginosa* Mchx., *candidissima* Mill., *cyanocarpos* Mch.), seidenhaariger, ♀. f. Nordamerika.

β) *oblongifolia* Rafin.

*stricta* Lam. (*fastigiata* Mchx., *canadensis* H. Par., *cyanocarpos* Gmel.), steifer, ♀. f. Nordamerika.

b) *sempervirens* Lod.

*suecica* L., schwedischer, 4. f. Nordeuropa.

**Cornutia** L. (J. P. Cornutus, französischer Botaniker), II. 1., Verbenaceae.

*pyramidata* L., pyramidale, ♀. w. Mexico.

*punctata* W. v. *Hosta coerulea*.

**Coronilla** T., Kronenwicke, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*argentea* L., silberfarbige, ♀. k. Creta.

*cappadocica* W. (*orientalis* Mill.), cappadocische, 4. f. Cappadocien.

*coronata* L. DC., gekrönte, ♀. 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

*cretica* L., cretische, ☉. f. Creta, Taurien, Istrien.

*Emerus* L., Scorpions-K., ♀. f. Süd-, West- und Osteuropa.

*glaucula* L. (*odorata* Hort.), blaugrüne, ♀. k. Südfrankreich.

β) *variegata*.

*globosa* Lam., kugelblumige, 4. k. Creta.

*iberica* MB., iberische, 4. f. Kleinasien, Caucasus.

*junceae* L., binsenförmige, ♀. k. Südfrankreich.

*minima* L., kleinste, ♀. 4. k. Süd- und Westeuropa.

*montana* Riv. Jacq., Berg-K., 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

*pentaphylla* Dsf., fünfblättrige, ♀. k. Numidien.

*squamata* Cav., schuppige, 4. f. Spanien.

*vaginalis* Lam. (*minima* Jacq.), scheidige, ♀. 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*valentina* L. (*stipularis* Lam.), spanische, ♀. k. Süd- und Westeuropa.

*varia* L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

*viminalis* Salisb., ruthenförmige, ♀. k. Mauritanien.

*Securidaca* L. v. *Securigera* Coronilla.

**Coronopus** *didyma* Sm. v. *Senebiera pinnatifida*, *nilotica* Del. *Ruellii* G. vid. *Senebiera nilotica* et *Coronopus*.

**Corraea** Sm. (J. Correa de Serra, berühmter portugiesischer Botaniker), VIII. 1., Tricoccae-Rutaceae.

**Corraea**

- alba Andr., weisse, ⚥. t. Neusüdwallis.  
 pulchella RB., hübsche, ⚥. t. Neuholland.  
 rufa G., gelbrothe, ⚥. t. Neuholland.  
 speciosa Andr., prächtige, ⚥. t. Neusüdwallis.  
 virens Sm. (*viridiflora* Andr.), grünliche, ⚥. t. Neusüdwallis.

**Corrigiola** L., Hirschsprung, V. III., Portulacaceae.

- capensis Thbg., kapischer, ☉. f. Cap d. g. H.  
 litoralis L., Strand-H., ☉. f. Europa.  
 telephiifolia Pourr., telephiumblättrige, ☉. f. Südfrankr.

**Cortusa** Clus. L. (J. A. Cortusus, Professor der Botanik zu Padua), V. I., Primulaceae.

- Matthioli L., Matthioli's, 4. f. Oesterreichische, baierische, tyroler Alpen, Sibirien.

**Corvisartia Helenium** Merat. Cass. v. *Inula Helenium*.**Coryanthes** Hook. v. *Corysanthes*.**Corycarpus** Zea, Helmspelze, II. II., Gramineae.

- arundinaceus Zea, rohrartige, 4. f. Nordamerika.

**Corycium** Sw., Helmstendel, XX. I., Orchideae.

- crispum Sw., krauser, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 orobanchoides Sw., sommerwurzähnlicher, 4. Kn. t.  
 Cap der guten Hoffnung.

**Corydalis** Vent., Kappenmohn, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumarieae.

- acaulis P., stengelloser, 4. f. Oesterreichisches Litorale.  
 angustifolia DC., schmalblättriger, 4. Kn. f. Caucasus.  
 aurea W., goldfarbiger, ♂. f. Nordamerika.  
 β) flavula Rafin.

- ? bicalcarata Haw., zweisporniger, 4. Kn. f. ?

- bracteata P., deckblättriger, 4. Kn. f. Sibirien.

- breviflora DC., kurzblumiger, ☉. f. Kamtschatka.

- bulbosa P. (*tuberosa* DC., *cava* Schwg.), hohlknolliger,  
 4. Kn. f. Europa, Nordasien.

- β) albiflora Kit.

- capnoides P., weißer, ♂. f. Südeuropa.

- caucasica DC., caucasischer, 4. Kn. f. Caucasus.

- claviculata DC. P., rankender, ☉. f. Sch. Nördl. Europa.

- fabacea P. (? *pumila* Host.), kleiner, 4. Kn. f. Europa.

- Gebleri Ledeb., Gebler's, 4. f. Altai.

- glauca Pursh, blaugrüner, ♂. ☉. f. Nordamerika.

- Halleri W. (*bulbosa* DC., *solida* Sm., *digitata* P.), Hal-  
 ler's, 4. Kn. f. Europa, Sibirien.

- impatiens Fisch. DC., springschotiger, ☉. f. Sibirien.

- longiflora P., langblumiger, 4. Kn. f. Altai.

- lutea DC. P., gelber, 4. f. England, Deutschl., Frankr.

- Marschalliana P., Marschall's, 4. Kn. f. Taurien.

- nobilis P., edler, 4. Kn. f. Sibirien.

- ochroleuca Koch, weißgelber, 4. f. Oesterr. Litorale.

- paeonifolia P., päonienblättriger, 4. f. Sibirien.

- pauciflora P., wenigblumiger, 4. Kn. f. Sibirien.

- sibirica P., sibirischer, 4. f. Sibirien.

- stricta Fisch., steifer, ♂. f. Sibirien.

- uralensis DC., uralischer, ♂. f. Altai.

- bracteosa* Spgl., *canadensis* Gold., *Cucullaria* P.,  
*eximia* Spgl., *formosa* Pursh etc. v. *Dielytra bracteosa*  
 etc. *fungosa* Vent. v. *Adlumia cirrhosa*.

**Corylus** T., Haselnufs, XXI. IX., Amentaceae.

- americana Mchx., amerikanische, ⚥. f. Nordamerika.

- Avellana L., gemeine, ⚥. f. Europa, Nordasien, Japan.



**Corylus**

- b) *pumila* A. B. c) *heterophylla* A. B. Lod. (*laciniata* Hort., *urticifolia* Hort.), d) *purpurea* Lod. (*atropurp.* Hort.). e) *tubulosa* W. (*maxima* Mill. *sativa* Bauh.). f) *tubulosa alba*. g) *crispa*. h) *tenuis* Lod. i) *glomerata* Bauh. k) *barcelonensis* Lod. (*grandis* Lod.). l) *Lamberti* Lod. etc.  
*Columna* L. (*arborea* Hort.), türkische,  $\frac{1}{2}$  f. Thracien.  
 b) *intermedia* Lod. c) *arborescens* Fisch.  
*humilis* W. (*americana humilis* Wang.), niedrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
*rostrata* Ait. (*cornuta* Hort.), geschnäbelte,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamer.  
**Corymbium** L., Straußdolde, XIX. v., Compositae-Vernoniaceae (*Eupatorineae*).  
*glabrum* Thbg., glatte, 4. t. Cap der guten Hoffnung.  
*nervosum* Thbg., nervige, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
*scabrum* L. fil., scharfe, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
**Corynandra** Schrad., Keulenfaden, XIII. i., Capparideae.  
*pulchella* Schrad., schöner,  $\odot$ . w. Neapel, China.  
**Corynephorus** P. Beauv., Keulengras, III. ii., Gramineae.  
*articulatus* P. B., gegliedertes, 4. f. k. Südeuropa, Nordafr.  
*canescens* P. B., graues, 4. f. Europa.  
**Corynocarpus** Forst., Keulenfrucht, V. i., Sapota-ceae-Myrsineae.  
*laevigatus* Forst., glattes,  $\frac{1}{2}$  t. Neuzeeland.  
**Corynostyles** Mart., Keulengriffel, V. i., Violaceae.  
*Hybanthus* Mart., guianischer,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Guiana.  
*pyrifolia* Mart., birnblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
**Corypha** L., Schirmpalme, VI. iii., Palmae.  
*australis* RB., neuholländische,  $\frac{1}{2}$  w. Neuholland.  
*elata* Roxb., hohe,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
*glaucescens* Hort., blaugrüne,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
*Pumos* Humb., mexicanische,  $\frac{1}{2}$  w. Mexico, Cuba.  
*tectorum* Humb., Dach-Sch.,  $\frac{1}{2}$  w. Neugranada.  
*umbraculifera* L., ächte,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
*Utan* Lam., moluckische,  $\frac{1}{2}$  w. Molucken.  
*minor* Jacq. v. *Sabal Adansonii*. *Palmetto* Walt. v.  
*Chamaerops* Palm. *Talieria* Roxb. v. *Taliera* bengalensis.  
**Corysanthes** RB., Helmstendel, XX. i., Orchideae.  
*bicalcarata* RB., zweisporniger, 4. Kn. w. t. Neuholland.  
*fimbriata* RB., gefranzter, 4. Kn. w. t. Neuholland.  
*macrantha* Hook., großblumiger, 4. w. Caracas.  
*maculata* Hook., gefleckter, 4. w. Demerara.  
*unguiculata* RB., nagelförmiger, 4. Kn. w. t. Neuholland.  
**Coscinium** Col., Lochkeim, XXII. vi., Menispermeeae.  
*fenestratum* Col., windender,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ceylon.  
**Cosmanthus** Nolte, Franzenblume, V. i., Hydrophyllaeae.  
*fimbriatus* Nolt., carolinische,  $\odot$ . f. Carolina.  
**Cosmea** Cav. (W.), Cosmea, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.  
*bipinnata* Cav., doppeltgefiederte,  $\odot$ . m. f. Mexico.  
 $\beta$ ) *exaristata*.  
*caudata* H. B. K., geschwänzte, 4. w. Westindien.  
*chrysanthemoides* H. B. K. (*chrysanthemifol.* Spgl.), wucherblumenähnliche,  $\odot$ . 4. t. m. f. Mexico.  
*crithmifolia* H. B. K., meerfenchelblättrige,  $\odot$ . m. f. Mexico.  
*diversifolia* Hort., verschiedenblättrige,  $\odot$ . f. Nordamer.  
*lutea* Sims, gelbe, 4. t. Mexico.

**Cosmea**

- parviflora H. B. K., kleinblumige, ☉. m. f. Mexico.  
 pilosa H. B. K., haarige, ? 4. w. Mexico.  
 scabiosoides H. B. K. (*Scabiosae* Spgl.), scabiosenähnliche, 4. ? Kn. Mexico.  
 sulfurea W., schwefelgelbe, ☉. 4. m. f. t. Mexico.  
 tenella H. B. K., zarte, ☉. m. f. Mexico.  
 tenuifolia Lindl., feinblättrige, ☉. m. f. Mexico.

**Cosmelia** RB., Cosmelie, V. 1., Epacrideae.

- rubra RB., rothblumige, ☿. t. Neuholland.

**Cossignia** Commers. (*Cossinia* Spgl.), VI. 1., Sapindacei.

- horbonica DC. (*triphylla* Lam., *pinnata* Lam.), borbonische, ☿. w. Mascarenas.

**Costus** L., Kostwurz, I. 1., Scitamineae-Amomeae.

- af<sup>r</sup> Ker, afrikanische, 4. w. Sierra Leone.  
 comosus Jacq., schopfige, 4. w. Caracas.  
 discolor Rosc., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.  
 glabratus Sm., kahle, 4. w. Westindien.  
 maculatus Rosc., gefleckte, 4. w. Tropisches Afrika.  
 nepalensis Rosc. (*speciosus* β. *angustifolius* Bot. reg.), nepal'sche, 4. w. Nepal.  
 pictus D. Don, gemalte, 4. w. Mexico.  
 Pisonis Lindl., Piso's, 4. w. Brasilien.  
 speciosus Sm. (*arabicus* L.), prächtige, 4. w. Ostindien.  
 spicatus Sm., ährige, 4. w. Westindien.  
 spiralis Rosc., spiralige, 4. w. Caracas.

**Cotoneaster** Medic., Quittenmispel, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.

- acuminata Lindl., zugespitzte, ☿. k. f. b. Nepal.  
 affinis Lindl., ähnelnde, ☿. k. f. b. Nepal.  
 buxifolia Wall., buchsbaumblättrige, ☿. k. f. b. Nepal.  
 frigida Wall., kalte, ☿. k. f. b. Nepal.  
 laxiflora Jacq. (*vulgaris* β. *laxiflora* Lindl.), lockerblumige, ☿. f. Osteuropa.  
     b) uniflora Fisch.  
 microphylla Wall., kleinblättrige, ☿. k. Nepal.  
 Nummularia Lindl., pfennigkrauthlättrige, ☿. k. Nepal, Nordpersien.  
 rotundifolia Wall. (*microphylla* β. *Uva ursi* Lindl.), rundblättrige, ☿. k. Nepal.  
 tomentosa Lindl., filzige, ☿. f. Schweiz, Oesterreich, Salzburg etc.  
 vulgaris Lindl., gemeine, ☿. f. Mittel- u. Osteuropa, Sibir.  
     α) erythrocarpa Led.   β) melanocarpa Led.   γ) depressa Fr.

**Cotula** L. G., Laugenblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- anthemoides L., kamillenähnliche, ☉. f. Spanien, Aegypten, Cap der guten Hoffnung.  
 aurea L., goldfarbige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Orient, Aegypten.  
 coronopifolia L., krähensfußblättrige, ☉. f. Norddeutschland, Spanien, Afrika, Amerika.  
 filifolia Thbg., fadenblättrige, ☉. f. Cap d. g. H.  
 nudicaulis Thbg., nacktstengelige, ☉. f. Cap d. g. H.  
 pusilla Thbg., niedrige, ☉. f. Cap der guten Hoffn.  
 sphaerantha Lk., kugelblumige, 4. w. Congo.  
     **bicolor** Roth. (*latifolia* Dsf.) v. *Dichrocephala latifolia*. *caneifolia* et *minuta* W. v. *Myriogyne minuta*. *maderaspatana* Dsf. v. *Grangea maderaspa-*

## Cotula

tana. *stricta* L. vid. *Lidbeckia pectinata*. *tanacetifolia* W. v. *Tanacetum multiflorum*. *viscosa* L. v. *Egletes viscosa*.

## Cotyledon T., Fettblatt (Nabelblatt), X. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

acalioides Thbg., acaliaähnliches, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 canaliculata Haw., nachenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 clavifolia Haw., keilblättriges, 4. t. Cap d. g. H.  
 coruscans Haw., blitzendes, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.  
 crassifolia Haw., dickblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 cristata Haw., kammförmiges, 4. t. Cap d. g. Hoffn.  
 cuneata Thbg., keilblättriges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.  
 cuneiformis Haw., keilförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 curviflora Sims (*purpurea* Haw.), krummblumiges, ⚥. t.

Cap der guten Hoffnung.

decussata Lindl. Sims (*papillaris* Haw. non Thbg.),  
 kreuzblättriges, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.  
 dichotoma Haw., zweizinkiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 elata Haw., erhabenes, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 fascicularis Ait., büschelförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 gracilis Haw., schlankes, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 hemisphaerica L., halbkugelförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 interjecta Haw., zwischenliegendes, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 jasminiflora Salm, jasminblumiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 maculata Salm (*alternans* Haw.), geflecktes, ⚥. t. C. d. g. H.  
 mammillaris Thbg., warzenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 mucronata Lam. (*undulata* Haw.), stachelspitziges, ⚥. t.

Cap der guten Hoffnung.

oblonga Haw., längliches, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 orbiculata L., kreisförmiges, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 ovata Haw., eiförmiges, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 papillaris Haw., weichwarziges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 ramosa Haw. (*ramosissima* Mill.), ästiges, ⚥. t. C. d. g. H.  
 ramosissima Salm, Haw., starkästiges, ⚥. t. C. d. g. H.  
 rhombifolia Haw., rautenblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 rotundifolia Haw., rundblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 spuria L., unächtes, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.  
 teretifolia Thbg., rundblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 tricuspidata Haw., dreispitziges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 triflora Thbg., dreiblumiges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.  
 tuberculosa Lam., höckeriges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.  
 ungulata Lam., klauenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.  
 viridis Haw., grünes, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

*crenata* Ait. v. *Kalanchoe crenata*, *calycina* Lam.  
 v. *Bryophyllum calycinum*. *coccinea* Cav. etc. v.  
*Echeveria coccinea* etc. *hispanica* L. v. *Pistorinia*  
*hispanica*. *Livenii* Ledeb., *lutea* Huds., *Malacophyllum* Pall.,  
*serrata* L., *spinosa* L., *Umbilicus* L.  
 v. *Umbilicus Livenii* etc.

Coulteria H. B. K. (Th. Coulter, Genfer Botaniker),  
X. i., Leguminosae-Caesalpineae.

horrida H. B. K., stachelige, ⚥. w. Südamerika.

mollis H. B. K., weiche, ⚥. w. Südamerika.

tinctoria DC. H. B. K., färbende, ⚥. w. Südamerika.

Cousinia Cass. (Cousin, französischer Staatsmann und  
Gelehrter), XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

carduiformis Cass. et Mey., distelartige, ♂. f. Nordpers.

cynaroides C. A. Meyer, artischockenähnliche, ♂. f.  
 Ostcaucasus.



**Cousinia**

*Hohenackeri* Fisch. et Mey., Hohenacker's, 4. f. Nordpersien.

*macrocephala* C. A. Mey., großköpfige, ♂. f. Nordpersien.

*tenella* Fisch. et Mey., zarte, ☉. f. Armenien.

**Coutarea** Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

*speciosa* Aubl., prächtige, ♀. w. Guiana.

**Coutoubea** Aubl. (guianischer Name), IV. 1., Contortae-Gentianeae.

*ramosa* Aubl., ästige, ☉. w. Guiana.

*spicata* Aubl., ährige, ♂. w. Guiana.

*verticillata* G. Don, wirtelblättrige, ♂. w. Trinidad.

**Cowania** D. Don (James Cowan, englischer Kaufmann), XII. III., Rosaceae.

*mexicana* D. Don, mexicanische, ♀. t. w. Mexico.

*plicata* D. Don, gefaltete, ♀. t. Mexico.

**Crambe** T., Meerkohl, XV. 1., Cruciferae.

*aspera* MB., rauher, 4. f. Taurien.

*cordifolia* Stev., herzblättriger, 4. f. Caucasus.

*filiformis* Jacq., fadenförmiger, ☉. ♂. f. Patagonien.

*fruticosa* L., suppl., strauchiger, ♀. k. Madeira.

*grandiflora* Stev., großblumiger, 4. f. Südl. Rußland.

*hispanica* L., spanischer, ☉. f. Westeuropa.

β) *cordifolia* Duf.

*junceae* MB., binsenförmiger, 4. f. Caucasus.

*maritima* L., gemeiner, 4. f. Europa.

*orientalis* L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

*pinnatifida* RB. (*orientalis* Jacq.), fiederspaltiger, 4. f.

Ungarn, Taurien, Caucasus.

*reniformis* Dsf., nierenförmiger, ☉. f. Nordafrika.

*strigosa* L'Her., striegelig, ♀. k. Canarische Inseln.

*Tataria* Jacq. (*laciniata* Lam.), ungarischer, 4. f. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.

*macrocarpa* MB. v. *Sobolewsia lithophila*.

**Craniolaria** L., Craniolarie, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae (Sesameae).

*annua* L., jährige, ♂. t. w. Südamerika.

**Craniotome** Rchb., Craniotome, XIV. 1., Labiatae.

*versicolor* Rchb., buntfarbige, ☉. m. f. Nepal.

**Craspedia** Forst., Craspedie, XIX. 1., Compositae-Helichryseae.

*fimbriata* DC. (*uniflora* Forst.), gefranzte, 4. t. Neuseeland.

*macrocephala* Hook., großköpfige, 4. t. Van-Diemensland.

*Richea* Cass. (*glauca* et *pilosa* Spgl.), blaugrüne, 4. t. Van-Diemens-Land, Neuholland.

**Crassula** L., Dickblatt, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

A) *Genuinae*.

*acutifolia* Lam., spitzblättriges, ♀. t. Cap d. gut. H.

*albiflora* DC. Sims, weißblumiges, ♀. t. Cap d. g. H.

*andegaviensis* DC., anger'sches, ☉. f. Frankreich.

*arborescens* Mill. (*Cotyledon* Jacq., *portulacacea* W.), baumartiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*bibracteata* Haw., doppeltdeckblättriges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *major* Haw.

## Crassula

biplanata Haw., doppeltgeebnetes, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 bullulata Haw., blasiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 centauroides L., flockenblumenähnliches, ♂. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

ciliata L., gefranztes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) media Haw. γ) minor Haw.

coccinella Haw., scharlachpunctirtes, ♀. t. Cap d. g. H.  
 columnaris L., säulenförmiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 concinna Haw., nettes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 cordata Ait., herzblättriges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 corymbulosa Lk., traubendoldiges, ♀. t. Cap d. g. H.  
 Cotyledonis L., nabelblattähnliches, ♀. t. Cap d. g. H.  
 dejecta Jacq., niedergebeugtes, ♀. t. Cap der gut. H.  
 diffusa Ait., weitschweifiges, ⊙. m. f. t. Cap d. g. H.  
 expansa Ait., ausgebreitetes, ⊙. m. f. t. Cap d. g. H.  
 filicaulis Haw., fadenförmiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 glabra Haw. (*glomerata* β. Ait.), kahles, ⊙. m. f. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

glomerata L., knauförmiges, ⊙. m. f. t. Cap d. g. H.  
 imbricata L., dachziegelförmiges, 4. ♀. t. Cap d. g. H.  
 lactea Ait., milchweißes, 4. ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 lineolata Ait., linirtes, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.  
 Magnolii DC. (*caespitosa* Cav.), Magnol's, ⊙. f. Süd-  
 frankreich, Oberitalien, Istrien.

marginalis Ait., berandetes, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 moschata Forst., moschusduftendes, ⊙. m. f. Neu-  
 südwallis.

obliqua Ait. (*portulacea* Lam.), schiefes, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

obtusata Haw., stumpfes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 orbicularis L., kreisförmiges, 4. t. Cap der gut. Hoffn.  
 pellucida L., durchscheinendes, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 perfoliata Scop. (*perforata* Lam., *perforata* L.), durch-  
 stochenes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

perforata Thbg., durchbohrtes, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 pulchella Ait., hübsches, ⊙. m. f. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 punctata L., punkirtes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 ramosa Ait., ästiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 ramuliflora Lk., astblumiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 retroflexa L., zurückgebeugtes, ⊙. m. f. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

revolvens Haw., zurückgewickelter, ♀. t. Cap d. g. H.  
 rosularis Haw., rosenförmiges, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 rubens L., röthliches, ⊙. f. Süddeutschland, Schweiz,  
 Frankreich etc.

scabra L., scharfes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

scabrella Haw., schärfliches, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 sparsa Ait., zerstreutstehendes, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 spathulata Thbg., spatheblättriges, 4. ♀. k. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

squamulosa Haw., schuppiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 subulata L., pfriemenförmiges, ⊙. t. m. f. Cap d. g. H.  
 telephioides Haw., telephiumähnliches, ♀. t. Cap d. g. H.  
 tetragona L., vierseitiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.  
 verticillaris L., wirtelförmiges, ⊙. f. Südeuropa.

B) Turgosia Haw.

aloides Ait. Haw., aloeähnliches, ♂. t. Cap d. gut. H.  
 Capitella L. Haw., kopfförmiges, ♂. t. Cap d. gut. H.  
 linguaefolia Haw., zungenblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

**Crassula**

obovata Haw., verkehrteiförmiges, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 pertusa Haw., durchlöcherter, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 tomentosa L., filziges, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
 Turrita L., thurmformiges, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

β) rosea Haw.

C) Globulea Haw.

atropurpurea Haw., dunkelpurpurfarbiges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 canescens Schult. Haw., grauliches, 4. t. Cap d. g. Hoffn.  
 capitata Haw., kopfförmiges, 4. t. Cap der gut. Hoffn.  
 cultrata L., messerförmiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 hispida Haw., hackeriges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 impressa Haw., eingedrücktes, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) minor Haw.

lingua Haw., Zungen-F., ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 lingula Haw., gezüngeltes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 mesembryanthoides Haw., zaserblumenähnliches, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

β) altior Haw.

mollis L. suppl. Ait., weiches, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 nudicaulis L., nacktstengeliges, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 obvallata L., verhülltes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 paniculata Haw., rispiges, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
 radicans Haw., starkwurzelndes, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
 subincana Haw., fastgraues, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

β) erecta Haw.

sulcata Haw., gefurchtes, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
 coccinea L., jasminea Ker, odoratissima Andr., versicolor Burch. etc. v. Dietrichia coccinea etc. dichotoma L. v. Grammanthes dichotoma. falcata L., perfoliata L. v. Rochea falcata etc. rotundifolia Haw. v. Kalanchoe rotundifolia. undulata Haw. v. Cyrtogyne undulata.

**Crataegus T.**, Weißdorn, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.  
 apiifolia Mchx. (*Oxyacantha* Walt.), sellerieblättriger, ♀. f. Nordamerika.

b) minor.

Aronia Bosc., levantischer, ♀. f. Levante.

Azarolus L., Azarol-W., ♀. f. Südeuropa.

coccinea L., scharlachfarbiger, ♀. f. Nordamerika.

b) corallina Lod. (*pyriformis* Lod.). c) indentata Lod. d) maxima Lod. (*spinosa* Godefroy, ? *flabellata* Hort.).

cordata Mill. (*populifolia* Walt.), herzblättriger, ♀. f. Nordamerika.

Crusgalli L. (*lucida* Wangenh.), langsporniger, ♀. f. Nordamerika.

β) splendens DC. (*arbutifolia* Hort.). γ) pyracanthifolia DC. δ) salicifolia DC. ε) linearis DC. ζ) nana DC.

Douglassii Lindl. (*punctata* var *brevispina* Doug.), Douglas's, ♀. f. Nordamerika.

flava Ait. (*glandulosa* Mchx., *viridis* Walt., *Michauxii* P.), gelber, ♀. f. Nordamerika.

glandulosa Ait. (*sanguinea* Pall., *rotundifolia* Booth), drüsiger, ♀. f. Nordamerika, Sibirien.

heterophylla Flügge (*neapolitana* Hort.), verschiedenblättriger, ♀. f. Ost- und Südeuropa.

lobata Bosc. (*lutea* Hort.), gelappter, ♀. f. ?



**Crataegus**

*macracantha* Lodd., großstacheliger, *h. f.* Nordamerika.  
*β)* *minor*.

*maroccana* P. (*maura* L. suppl.), marockanischer, *h. f.* Nordafrika, Neapel.

*melanocarpa* MB. (*platyphylla* Lindl., *fissa* Lee), schwarzfrüchtiger, *h. f.* Taurien.

*mexicana* Moc. et Sess. (*stipulacea* Lod.), mexicanischer, *h. k. t.* Mexico.

*monogyna* Jacq., einweibiger, *h. f.* Europa, Sibirien.

a) *kyrtostyla* Fingerh. b) *sibirica* Lod. c) *transylvanica* Hortul. d) *quercifolia* Booth. e) *lacinata* Lod. f) *pteridifolia* Lod. (*pectinata* Hort.). g) *eriocarpa* Lindl. h) *purpurea* Penny. i) *Oliveriana* Bosc. (*orientalis* Hortul.). k) *aurea*. l) *aurantiaca*. m) *leucocarpa*. n) *rosea*. o) *punicea*. p) *punicea fl. pleno*. q) *Celsiana*. r) *prae-cox*. s) *capitata*. t) *flexuosa*. u) *pendula*. v) *reginae* Hortul. etc. (Zum Theil auch Bastarde von *orientalis*, *nigra* und *Oxyacantha*).

*nigra* W. K. (*carpathica* Lodd.), schwarzer, *h. f.* Ungarn, Siebenbürgen.

*β)* *rubra*.

*orientalis* MB. (*odoratissima* Hort.), morgenländischer, *h. f.* Taurien.

*ovalifolia* Horn. (*elliptica* Lod.), eiblätteriger, *h. f.* Nordamerika.

*Oxyacantha* L., gemeiner, *h. f.* Europa.

b) *obtusata* (*oxyacanthoides* Thuill.). c) *multiplex* (*fl. pleno*). d) *stricta* Lod. (*rigida* Ronalds.).

Hinsichtlich der übrigen Variet. s. *C. monogyna*.

*parvifolia* Ait. (*tomentosa* L., *uniflora* du Roi, *viridis* et *axillaris* et *betulifolia* et *florida* et *linearis* Hort.), kleinblättriger, *h. f.* Nordamerika.

*pentagyna* W. K., fünfweibiger, *h. f.* Ungarn.

*prunifolia* Bosc (*caroliniana* Lod.), pflaumenblättriger, *h. f.* Nordamerika.

*β)* *ingestria* Lod.

*punctata* Ait. (*Crusgalli* du Roi), punktirter, *h. f.* Nordamer.

a) *rubra* Pursh (*edulis* Ronalds). *β)* *stricta* Ronalds.

γ) *aurea* Pursh (*flava*, *dulcis*, *edulis* Hortul.)

*purpurea* Bosc (*sanguinea* Hort.), purpurfarbiger, *h. f.* ? Sibirien.

*β)* *altaica*.

*Pyracantha* P., immergrüner (Feuerdorn), *h. f.* Süd- und Osteuropa.

b) *crenulata* A. B.

*pyrifolia* Ait. (*leucophleos* Mch., *radiata* Lodd., *tomentosa* du Roi, *latifolia* Ronalds, *cornifolia* Booth), birnblättriger, *h. f.* Nordamerika.

*sanguinea* Schrad. (? *purpurea* Bosc.), blutrother, *h. f.* Osttaurien.

? *β)* *altaica* Hortul.

*spathulata* Mchx. Ell. (*microcarpa* Lindl.), spathelblättriger, *h. f.* Nordamerika.

*tanacetifolia* P., rainfarnblättriger, *h. f.* Griechenland, Kleinasien.

b) *glabra* Lodd. c) *Leeana* Loud. (*incisa* Lee).

*trilobata* Lodd. (*spinosissima* Lee), dreilappiger, *h. f.* ?

*turbinata* Pursh, aufgetriebener, *h. f.* Nordamerika.

*virginica* Lodd., virginischer, *h. f.* Nordamerika.

**Crataegus**

*arbutifolia* Ait. fil. v. *Photinia arbutifolia*. *Aria* L. v. *Sorbus Aria*. *glabra* Thbg. v. *Photinia glabra* (*serrulata*), *glauca* Wall. v. *Stranvaesia glauca* (*glaucescens*). *indica* L. v. *Raphiolepis indica*. *latifolia* Lam. (*dentata* Thuill.) vid. *Sorbus latifolia*. *torminalis* L. v. *Sorbus torminalis*.

**Crataeva** L. (*Crataevus*, griechischer Kräuterkenner), XI. 1., Capparideae.

*gynandra* L., weibliche, f. w. Jamaica.

*Roxburghii* RB., Roxburgh's, f. w. Ostindien.

*Tapia* L., *Tapia-C.*, f. w. Ost- und Westindien.

*tapioides* DC., *tapia*ähnliche, f. w. Südamerika.

*caffra* Burch. v. *Niebulria caffra*. *fragrans* Sims v. *Richiea fragrans*.

**Crepidaria** Haw. v. *Pedilanthus*.**Crepis** L., Pippau, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.A) *Genuinae*.

*adenantha* Visian, drüsiger, ☉. f. Dalmatien.

*agrestis* W. K. (*Bauhiniana* Tausch), Acker-P., ☉. f. Deutschland, Ungarn, Taurien.

*andryaloides* Low., wollsalatähnlicher, ♂. k. Madeira.

*baicalensis* Ledeb., baical'scher, 4. f. Sibirien

*biennis* L., zweijähriger, ♂. f. Europa, Amerika.

β) *americana*. γ) *prolifera*.

*Bungei* Ledeb. (*Bungeana* Mey.), Bunge's, 4. f. Sibirien.

*corymbosa* Tenor., traubendoldiger, ☉. f. Neapel.

*fuliginosa* Sibth. Sm., rusiger, ☉. f. Griechenland.

*interrupta* Sibth. Sm., unterbrochener, ♂. f. Griechenl.

*lodomiriensis* Bess. (*banatica* Roch., *Gmelini* Schult.),

*lodomirischer*, ♂. f. Deutschland, Galicien, Ungarn.

*parviflora* Dsf., kleinblumiger, ☉. f. ?

*pauciflora* Dsf., wenigblumiger, ☉. f. Aegypten.

*rhagadioloides* L., rissiger, ☉. f. Spanien.

*rigens* Ait., starrer, ♂. 4. k. Azoren.

*scabra* W., scharfer, ☉. f. Südfrankreich, Oberitalien.

*stenoma* Turz., schmalkandiger, ♂. f. Dahurien.

*tectorum* L. (*stricta* Schultz), Dach-P., ☉, f. Europa.

β) *segetalis* Roth. (*Lachenalii* Gochn.).

*virens* Vill. (*diffusa* Auctor., *pinnatifida* W., *polymorpha* Wallr.), grünlicher, ☉. f. Europa.

II. *Brachyderea* Cass.

*lacera* Tenor., schlitzeblättriger, ♂. 4. f. Neapel.

*rigida* W. K. (*latialis* Sebast.), steifer, 4. f. Osteuropa, Caucasus, Italien.

III. *Phaeasium* Cass.

*pulchra* L., schöner, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

IV. *Geracium* Rchb. (*Intybellia* Mon., *Intybus* Fries).

*Fröhlichiana* DC. (*incarnata lutea* Koch), Fröhlich's, 4. f. Schweiz und südliches Tyrol.

*Gmelini* Fröhl., *Gmelin's*, 4. f. Sibirien.

*incarnata* Tausch, fleischfarbiger, 4. f. Krain, Tyrol.

*multicaulis* Ledeb., vielstengelig, 4. f. Sibirien.

*praemorsa* Tausch, abgebissener, 4. f. Europa.

V. *Aetheorrhiza* Cass.

*alpestris* Tausch, Voralpen-P., 4. f. Mittel- und süd-europäische Voralpen.

β) *discolor*.

*aurea* Tausch, goldfarbiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

**Crepis**

bulbosa Tausch, knolliger, 4. f. Südeuropa.

VI. Berinia Brign. (*Wibelia* Hoppe).

chondrilloides Jacq. (*foeniculacea* Fröl., *Adonis*, Spgl.), knorpelsalatblättriger, 4. f. Krain, östreich. Litorale.

? tenuifolia W. (*graminifol.* Ledeb., *pulcherrima* Fisch.), feinblättriger, 4. f. Sibirien.

VII. Catonia Mch. (*Hapalostephium* D. Don, *Lepicaune* Lapeyr., *Omalocine* Cass., *Soyeria* Monnier).

blattarioides Vill. (*austriaca* Jacq., *multicaulis* Lapeyr.), mottenkrautähnlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

chrysantha Fröl., goldfarbiger, 4. f. Altai.

grandiflora W., Tausch., großblumiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

hyoseridifolia Tausch., hyoserisblättriger, 4. f. Steiermark, Schweiz, Dauphiné.

Jacquini Tausch. (*chondrilloides* Fröl.), Jacquin's, 4. f. Oesterreich, Steiermark, tyroler Alpen.

lampsanoides Tausch., rainkohlblättriger, 4. f. Pyren.

? lyrata \* (L.), leierblättriger, 4. f. Sibirien.

montana Tausch., Berg-P., 4. f. Mitteleurop. Alpen.

paludosa Mönch, Sumpf-P., 4. f. Europa.

pygmaea L., zwergiger, 4. f. Schweizer, franz. Alpen.

sibirica L., sibirischer, 4. f. Ungarn, Volhyn., Sibir., Cauc.

spinulosa Lapeyr., feinstacheliger, 4. f. Pyrenäen.

succisaefolia Tausch., scabiosenblättriger, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

β) hieracioides WK. (*integrifol.*).

Zweifelhafte:

coriacea Hornem., lederartiger, ♂. f. ?

sagittata Wender., pfeilblättriger, 4. f. ?

albida Vill. vid. *Barkhausia albida* Nachtr. *alpina*

L. vid. *Barkhaus.* alpin. *altissima* Balb. v. *Tolpis*

*altissim.* ? *banatica* W. v. *Barkhausia setosa.* *bar-*

*bata* L. v. *Tolpis barbata.* *coronopifolia* Dsf. vid.

*Tolpis coronopifol.* *crithmifolia* Lk. vid. *Tolpis*

*crithmifol.* *croatica* Hornem. et *Dioscoridis* W. (? W.).

v. *Gatyona globifera.* *filiformis* Ait. v. *Tolpis fili-*

*formis.* *globifera* Hall. fil. et *heterosperma* Schrad. v.

*Gatyona globifera.* *glandulosa* Guss. v. *Barkhaus.*

*glandul.* Nacht. *hispida* WK. v. *Barkhausia setosa.*

*hyemalis* Guss. v. *Barkhausia taraxacifol.* *macrorrhiza*

Lam. vid. *Tolpis macrorrhiz.* *muricata* Sibth. vid.

*Barkhaus.* aspera. *nemausensis* L. vid. *Lagoseris*

*nemaus.* *pinnatifida* Hort. v. *Achyropappus pinna-*

*tifid.* Nacht. *pterosperma* Hortul. v. *Gatyona globif.*

*purpurea* MB. v. *Intybellia purpurea.* *Sprengeriana* W.

v. *Picris pauciflora.* *tomentosa* Mch. v. *Gatyona glo-*

*bifera.* *versicolor* Fisch. v. *Ixeris versicolor.* *vesi-*

*caria* L. v. *Barkhaus.* vesicar. *vesicar.* Balb. vid.

*Barkhausia taraxacifol.* *virgata* Dsf. vid. *Tolpis*

*altissima.*

**Crescentia** L. (Pietro Crescenti, Gelehrter zu Bologna),

XIV. II., Solanaceae.

acuminata Bonpl., zugespitzte, ♂. w. Cuba.

cucurbitina L., ächte, ♂. w. Westindien, Südamerika.

Cujete L., großfrüchtige, ♂. w. Westindien, Südamer.

*pinnata* Jacq. v. *Tanaecium pinnatum.*

**Cressa** L., Cresse, V. II., Convolvulaceae.

cretica L., cretische, ♂. 4. k. Creta.



**Crinum** L., Hackenlilie, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.  
 algoense Herb., Algoa-H., 4. Zw. w. Cap d. g. H.  
 amabile Don (*superbum* Roxb.), liebliche, 4. Zw. w.  
 Bengalen.

*americanum* L., amerikanische, 4. Zw. w. Südamerika.  
*amoenum* Roxb., angenehme, 4. Zw. w. Ostindien.

β) *laeve*. γ) *angustifolium*.

*angustifolium* RB., schmalblättrige, 4. Zw. w. Neuholl.

*anomalum* Herb., ungewöhnliche, 4. Zw. w. China.

*aquaticum* Burch. (*campanulatum* B. Mag.), Wasser-H.,  
 4. Zw. w.

*arenarium* Sims, Sand-H., 4. Zw. w. Neuholland.

β) *blandum*.

*asiaticum* L. (*toxicarium* Roxb.), asiatische, 4. Zw. w. China.

*augustum* Roxb., herrliche, 4. Zw. w. Mascarenas.

*brachyandrum* Carey, kurzfadige, 4. Zw. w. Neuholl.

*bracteatum* W. (*brevifolium* Bot. Reg.), deckblättrige,  
 4. Zw. w. Ostindien.

β) *angustifolium* Herb.

*brevilimbium* Carey, kurzsaumige, 4. Zw. w. Inseln des  
 stillen Meeres.

*Broussoneti* Herb., Broussonet's, 4. Zw. w. Sierra Leone.

*caffrum* Herb., caffrische, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

*canaliculatum* Roxb., rinnenförmige, 4. Zw. w. Ostind.

*canalifolium* Carey, röhrenblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

*capense* Herb., capische, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

β) *Gowenianum*.

*Careyanum* Herb., Carey's, 4. Zw. w. t. Mascarenas.

*Commelini* Jacq., Commelin's, 4. Zw. w. Südamerika.

*confertum* Herb., dichte, 4. Zw. w. Neuholland.

*crassifolium* Herb. (*capense* β. *viridifolium* Bot. mag.),

dickblättrige, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffn.

*cruentum* Ker, blutrothe, 4. Zw. w. Ostindien.

*declinatum* Ker, Herb., niedergebeugte, 4. Zw. w. Ostind.

*defixum* Ker, hineingewachsene, 4. Zw. w. Ostindien.

*distichum* Herb., zweizeilige, 4. Zw. w. Guinea.

*elegans* Herb. Carey, zierliche, 4. Zw. w. Ostindien.

*ensifolium* Roxb., schwertförmige, 4. Zw. w. Ostindien.

*erubescens* Ait., röthliche, 4. Zw. w. Südamerika.

a) *rubro-limbium*. b) *majus*. c) *minus*. d) *viridifolium*. e) *berbicense*.

*erythrophyllum* Carey, rothblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

*exaltatum* Herb., hohe, 4. Zw. w. Ostindien.

*flaccidum* Herb., schlaffe, 4. Zw. w. Neuholland.

*formosum* Herb., schöne, 4. Zw. w. Brasilien.

*giganteum* Andr., riesenhafte, 4. Zw. w. Guinea.

*Herberti* G. Don (*revolutum* H. Kew.), Herbert's, 4.

Zw. w. Cap der guten Hoffnung.

*humile* Sims, niedrige, 4. Zw. w. Ostindien.

*insigne* Herb., ausgezeichnete, 4. Zw. w. Ostindien.

*Lancei* Herb., Lance's, 4. Zw. w. Surinam.

*latifolium* Herb. Andr., breitblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

*longifolium* Roxb., langblättrige, 4. Zw. w. Bengalen.

*longiflorum* Herb., langblumige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

*lorifolium* Roxb., riemenblättrige, 4. Zw. w. Pegu.

*macrocarpum* Carey, großfrüchtige, 4. Zw. w. Pegu.

*mauritanum* Lod., mascarenische, 4. Zw. w. Mascarenas.

*moluccanum* Roxb. Herb., moluckische, 4. Zw. w. Molucken.

*multiflorum* Desf., vielblumige, 4. Zw. w. ?

*pedunculatum* RB., gestielte, 4. Zw. w. Neusüdwallis.

**Crinum**

- plicatum* Hort., gefaltete, 4. Zw. w. China.  
*procerum* Carey, erhabene, 4. Zw. w. Pegu.  
*purpurascens* Herb., purpurfarbige, 4. Zw. w. Südamer.  
*revolutum* Lindl., zurückgerollte, 4. Zw. w. Südamer.  
*riparium* Herb., Ufer-H., 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.  
*scabrum* Sims, scharfe, 4. Zw. w. Brasilien.  
*sinicum* Carey, chinesische, 4. Zw. w. China.  
*speciosum* Herb., prächtige, 4. Zw. w. Ostindien.  
*strictum* Herb., steife, 4. Zw. w. Ceylon.  
*submersum* Herb., untergetauchte, 4. Zw. w. Ceylon.  
*sumatranum* Roxb., sumatranische, 4. Zw. w. Sumatra.  
*undulatum* Hook., wellenförmige, 4. Zw. w.  
*venosum* RB., aderige, 4. Zw. w. Neuholland.  
*venustum* Carey, holdselige, 4. Zw. w. Ostindien.  
*verecundum* Herb., schamhafte, 4. Zw. w. Ostindien.  
*Yuccaeoides* Herb., yuccaähnliche, L. Zw. w. Guinea.  
*zeylanicum* Herb., zeylanische, 4. Zw. w. Ceylon.

Engl. Hybrid.: *Baconi* Herb. *hybridum* Bot. mag.  
*africanum* L. v. *Agapanthus umbellatus. angustifol.*  
 L. suppl. (et *obliquum* L. suppl.) vid. *Cyrtanthus*  
*angustifol.* etc. *caspium* Pall. v. *Allium casp. nervosum* Roxb. v. *Eurycles nervosa*.

**Cristaria** Cav., Kammmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

*coccinea* Pursh, scharlachfarbige, 4. f. b. Nordamer.

**Critamus** *agrestis* Bess. v. *Falcaria* Rivini. *Critamus heterophyllus* Koch v. *Ptychotis heterophylla*.**Crithmum** T., Meerfenchel, V. II., Umbelliferae.

*latifolium* L., breitblättriger, 4. k. Canarische Inseln.

*maritimum* L., gemeiner, 4. f. Engl., Südeuropa, Taurien.

**Crithodum** Lk., *Crithodum* III. II., Gramineae.

*aegyptiacum* Trin., ägyptisches, ①. f. Aegypten.

**Critonia** *eupatorioides* G. et *Kuhnia* G. v. *Kuhnia eupatorioides* etc.**Crocus** T., Safran, III. I., Irideae.

*albiflorus* Kit., weißblumiger, 4. Zw. f. Ungarn, Illyrien.

*autumnalis* Mill. (*sativus* All.), Herbst-S., 4. Zw. f. Griechenland, Kleinasien.

*biflorus* Mill. (*vernus* MB.), zweiblumiger, 4. Zw. f. Taur.

b) *stigmatosus* Sab. c) *Parkinsoni* Sabin.

*candidus* Clark. (? *argenteus* Sab.), reinweißser, 4. Zw. f. Kleinasien.

*Imperati* Ten. (*recurvus* J. Don), *Imperati's*, 4. Zw. f. Neapel.

*lacteus* Haw. Sab., milchweißser, 4. Zw. f. Kleinasien. b) *striatus*.

*lagenaeiflorus* Salisb., flaschenblumiger, 4. Zw. f. Griechenland.

b) *flavus*.

*luteus* Lam. (*aureus* Sm.), gelber, 4. Zw. f. Griechenl. β) *moesiacus* Ker.

*minimus* Red., kleinsten, 4. Zw. f. Corsica.

β) *striatus* Link.

*nudiflorus* Sm. (*multifidus* Poir., *serotinus* Salisb.), nacktblumiger, 4. Zw. f. England, Pyrenäen.

*odorus* Bivon., wohlriechender, 4. Zw. f. Sicilien.

*Pallasii* Goldb. (*autumnalis* MB.), *Pallas's*, 4. Zw. f. Taur.

*pusillus* Tenor., niedriger, 4. Zw. f. Neapel.

*reticulatus* Stev., netzförmiger, 4. Zw. f. Illyrien, Dalmatien, Taurien, Caucasus.

**Crocus**

β) variegatus Hoppe.

sativus L., ächter, 4. Zw. f. Griechenland, Kleinasien.  
 speciosus MB., prächtiger, 4. Zw. f. Taurien, ? Dalmatien.  
 stellaris Haw., sternförmiger, 4. Zw. f. ?  
 suaveolens Ten., starkkriechender, 4. Zw. f. Neapel.  
 sulfureus Ker, schwefelgelber, 4. Zw. f. ?

b) albidus Sab. c) flavus. d) isabellinus. e)  
 striatus Sab. f) striatulus Sab.

Susianus Curt., türkischer, 4. Zw. f. Kleinasien.

b) minor Sab.

Thomasii Tenor., Thomas's, 4. Zw. f. Neapel.

vernus All., Frühlings-S., 4. Zw. f. Mittel-u. Südeuropa.

Garten-Varietäten: puniceus Sab. purpureus Sab.  
 marginatus Sab. Sabini Anders. grandis Sab. obo-  
 vatus Sab. concinnus Sab. Phäeton Sab. pur-  
 purascens J. C. gracilis J. C. maculosus Sab.  
 plumosus J. C. turbinatus Sab. clavatus Sab.  
 violacens Sab. dubius Sab. pruinosis Sab. fusi-  
 formis Sab. stylosus Sab. plumbeus Sab. infla-  
 tus Sab. tulipaceus Sab. pallens Sab. minutus  
 Sab. nanus J. C. pallidus Sab. neapolitanus  
 Ten. neapolit. praecox Sab. lilacinus maculatus  
 J. C. lilacinus praecox J. C. pictus Sab. fuca-  
 tus Sab. dorsalis Sab. unguis Sab. unguis ma-  
 jor Sab. leucorhynchus Sab. pulchellus Sab. li-  
 neatus Sab. striatus Sab. Glorianella Sab. Glo-  
 riana Sab. elegans J. C. speciosus J. C. va-  
 riegate Sab. propinquus Sab. dentosus Sab. de-  
 corus J. C. bicolor Sab. affinis J. C. emargi-  
 natus J. C. tortuosus J. C. reticulatus Sab. gri-  
 seus Sab. pectinatus Sab. incurvus Sab. lineellus  
 Sab. obesus Sab. spectabilis J. C. obtusus J.  
 C. crassus Sab. Andersoni Sab. penicillatus J. C.  
 stellatus J. C. albidus J. C. parvulus Sab. uni-  
 lineatus J. C. trilineatus Sab. undulatus J. C.  
 obsoletus Sab. albus major Sab. albus minor Sab.  
 delectus Sab. alpinus Sab. aprilis Sab. tardi-  
 florus Sab.

versicolor Ker, buntfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa.

Garten-Varietäten: Gawleri Sab. neglectus Sab.  
 similis Sab. plumosus Sab. venustus Sab. ele-  
 gans Sab. purpureus Sab. violaceus Sab. Ha-  
 worthii Sab. lineatus Sab. vittatus J. C. flori-  
 bundus Sab. pectinatus Sab. spectabilis J. C. stria-  
 tulus J. C. Morleon Sab. inconspicuus Sab. stella-  
 tus Sab. penicillatus J. C. pulchellus J. C. pro-  
 pinquus Sab. affinis Sab. urbanus Sab. pallidus J. C.

**Crossandra** Salisb., Franzenbeutel, XIV. II., Acan-  
 thaceae.

undulaefolia Salib., wellenblättriger, ♀. w. Ostindien.

**Crotalaria** T., Klapperschote, XVII. IV. (VI.), XVI.

VI., Leguminosae-Papilionaceae.

acuminata DC., zugespitzte, ☉. w. f. m. Cap d. g. H.

alata Hamilt., geflügelte, ♂. w. Nepal, Ostindien.

anagyroides H. B. K., anagyrisähnliche, ♀. w. Caracas.

angulata Mill., kantige, ☉. w. Südamerika.

angustifolia Jacq. (elongata Thbg.), schmalblättrige, ♀.  
 t. Cap der guten Hoffnung.

anthylloides Lam., wollblumenähnliche, ♀. w. Java, Neuhol.



## Crotalaria

- arborescens Lam. (*capensis* Thbg., *incanescens* L. suppl.),  
 baumartige, ♀. t. Cap der guten Hoffn., Mascarenas.  
 argentea Jacq., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 axillaris Ait., achselblumige, ☉. w. Guinea.  
 bengalensis Lam., bengalische, ♀. w. Ostindien.  
 Berteriana DC. (*pellita* Bert.), Bertero's, ♀. w. Jamaica.  
 bialata Schrk., zweiflügelige, ☉. w. ? Südamerika.  
 bifaria W., zweireihige, ♀. w. Ostindien.  
 biflora L. (*nana* Burm.), zweiblumige, ♀. w. Ostindien.  
 bracteata Roxb., deckblätterige, ♀. w. Ostindien.  
 Brownei Bert., Brown's, 4. w. Jamaica.  
 Burmanni DC. (*sericea* Burm.), Burmann's, ☉. w. Ostind.  
 cajanifolia H. B. K., cajanblätterige, ♀. w. Mexico.  
 calycina Schrk., gekelchte, ☉. w. Ostindien.  
 chinensis L., chinesische, ♀. w. China.  
 cubensis DC. (*hirta* Lag.), cubensische, ☉. w. Cuba.  
 cuneiformis Lam., keilförmige, ♀. t. Südafrika.  
 curtata Lk., abgekürzte, ☉. w. ?  
 cytisoides Roxb., cytissusähnliche, ♀. w. Ostindien.  
 dichotoma Roth, zweizinkige, ♀. w. Ostindien.  
 diffusa Lk., weitschweifige, ☉. w. ?  
 fenestrata Ker, gitterförmige, ♀. w. Ostindien.  
 foliosa W., blätterreiche, ? 4. ♀. w. Ostindien.  
 fruticosa Mill., strauchige, ♀. w. Jamaica.  
 fulva Roxb., braungelbe, ☉. w. Ostindien.  
 glauca W., blaugrüne, ♀. w. Guinea.  
 Grahami\* (*dichotoma* Grah.), Graham's, ♀. t. Mexico.  
 hirsuta W., rauhhaarige, ♀. w. Ostindien.  
 hirta W. (*pilosa* Rottl.), kurzhaarige, ☉. w. Ostindien.  
 incana L., weißgraue, ☉. w. Westindien.  
 juncea L., binsenförmige, ☉. w. Ost- und Westindien.  
 laburnifolia L., bohnenbaumblätterige, ☉. w. Ostindien.  
 Langsdorfii Fisch., Langsdorf's, ☉. w. ? Brasilien.  
 leioloba Bartl., leichtlappige, ♀. w. Java.  
 linifolia L. suppl., leinblätterige, ♀. w. Ostindien, Nepal.  
 lotifolia L., schotenkleeblätterige, ♀. w. Westindien.  
 medicaginea Lam. (*Trifolium* W., *stricta* Roth),  
 schneckenkleeähnliche, ☉. w. Ostindien.  
 micans Lk. (*lotifolia* Hort.), schimmernde, 4. w. ?  
 micrantha Lk., kleinblumige, ☉. w. Ceylon.  
 nepalensis Lk., nepal'sche, ☉. w. Nepal.  
 novae Hollandiae DC., neuholländische, 4. ♀. t. Neuholl.  
 obscura DC., dunkle, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 orixensis Rottler W., Orix-K., ☉. w. Ostindien.  
 ovalis Pursh (*sagittalis* γ. Mchx.), eiförmige, ☉. t.  
 Carolina.  
 pallida Ait., bleiche, ☉. w. Abyssinien.  
 paniculata W. (*chinensis* Lam.), rispige, ♀. w. Ost-  
 indien, China.  
 parviflora Roth, kleinblumige, ☉. w. Ostindien.  
 paulina Schrank, Paulinische, 4. w. Brasilien.  
 pendula Berter, überhängende, ♀. w. Jamaica.  
 platycarpa Lk., breitfrüchtige, ☉. f. m. Nordamerika.  
 procumbens M. et S., niederliegende, 4. w. Mexico.  
 prostrata Rottl., gestreckte, ☉. w. Ostindien.  
 pulchella (*pulchra*) Andr., hübsche, ♀. w. Ostindien.  
 pulcherrima Roxb., sehr schöne, ♀. w. Ostindien.  
 pumila Orteg., kleine, ☉. w. Cuba.  
 purpurascens Lam., purpurfarbige, ☉. w. Madagascar.

## Crotalaria

*purpurea* Vent., purpurblumige, ♀. t. Cap der gut. H. Purshii Spgl. (*laevigata* Pursh), Pursh's, ☉. m. f. Nordamer.  
*pusilla* Roxb. (? *pumila* Schk.), kleine, ☉. w. Ostindien.  
*quinquefolia* L., fünfblätterige, ☉. w. Ostindien.

*retusa* L., abgestutzte, ☉. w. Ostindien.  
*Roxburghii* DC. (*stricta* Roxb., *anthylloides* D. Don),  
 Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

*rubiginosa* W., röthliche, ☉. w. Ostindien.  
*sagittalis* L., pfeilförmige, ☉. w. Westindien, Nord- und Südamerika.

*Saltiana* Bot. Rep., Salt's, ♀. w. Abyssinien.

*semperflorens* Vent., immerblühende, ♀. w. Ostindien.

*senegalensis* DC., senegal'sche, ☉. w. Senegal.

*sericea* Retz, seidenhaarige, ☉. w. Ostindien.

*speciosa* Roth, prächtige, ♀. w. Ostindien.

*spectabilis* Roth, ansehnliche, ? ☉. w. Ostindien.

*stipularis* Desv., zwischenblätterige, ☉. w. Cayenne.

*striata* DC., gestreifte, ☉. w. Ostindien.

*tenuifolia* Roxb., feinblätterige, 4. ♀. w. Ostindien.

*tetragona* Andr., vierseitige, ♂. w. Ostindien.

*thebaica* DC., thebaische, ♀. t. Aegypten.

*triantha* M. et S., dreiblumige, ☉. w. Mexico.

*tuberosa* Hamilt. D. Don, knollige, ♀. 4. Kn. Sch. Nepal.

*turgida* Dum. Cours., aufgetriebene, ♀. w. ?

*verrucosa* L. (*angulosa* Lam., *coerulea* Jacq.), warzige,  
 ☉. ♀. w. Ost- und Westindien.

*villosa* Thbg., zottige, ☉. t. f. m. Cap der gut. Hoffu.

*virgata* Roxb., ruthenförmige, ♀. w. Ostindien.

*vitellina* Ker (*holosericea* N. E.), dottergelbe, ♀. w. Brasilien.

*amplexicaulis* Lam. v. *Vascoa perfoliata*. *cordifolia*  
 L. v. *Hypocalyptus obcordatus*. *elegans* Hort. v.  
 ? *Goodia pubescens*. *floribunda* Lodd. (*obcordata*  
 Berg.) v. *Viborgia obcordata*. *guianensis* Aubl. (*longi-*  
*folia* Lam. v. *Neurocarpum guianense*. *opposita* L.  
 v. *Rafnia opposita*.

**Croton** L., Croton, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*argenteum* L., silberfarbener, ☉. w. Südamerika.

*aromaticum* L., wohlriechender, ♀. w. Ostindien, Molucken.

*astroides* Ait. (*venosus* N. E.), sternförmiger, ♀. w. Westindien.

*Cascarilla* L., Cascarilla-C., ♀. w. Bahamische Inseln.

*digitatum* Fisch., fingerförmiger, ♀. w. t. Neuholland.

*Eluteria* L., Eluteria-K., ♀. w. Westindien.

*flabellifolium* Lod., fächerblätteriger, ♀. w. ?

*flavens* L., gelblicher, ♀. w. Westindien.

*glabellum* L., glatter, ♀. w. Jamaica.

*glandulosum* L., drüsiger, ☉. w. Westindien, Quito.

*gossypifolium* Vahl, baumwollenblätteriger, ♀. w. Trinidad.

*hibiscifolium* H. B. K. (*digitatum* Hort.), eibischblätteriger,  
 ♀. w. Neugranada, Mexico.

*humile* L., niedriger, ♀. w. Westindien.

*lacerum* Dsf. (*palmatum* H. Cels), schlitzzblätteriger,  
 ♀. w. ?

*lineare* Jacq. (*Cascarilla* Mill.), gleichbreitblätteriger, ♀. w. Westindien.

*lobatum* L., gelappter, ☉. w. Südamerika.

*lucidum* Sw., starkglänzender, ♀. w. Jamaica.

**Croton**

- macrophyllum Sw., großblättriger, ♂. w. Jamaica.  
 maritimum Walt. (*disjunctiflorum* Mchx.), Seestrand's-K.,  
 ♂. t. Carolina, Mexico.  
 micans Sw., schimmernder, ♂. w. Jamaica.  
 nitens Sw., glänzender, ♂. w. Jamaica.  
 niveum Jacq., schneeweißer, ♂. w. Jamaica.  
 penicillatum Vent. (*ciliato glandulosum* Orteg.), pinsel-  
 förmiger, ♂. w. Cuba.  
 pictum Roxb., gemalter, ♂. w. Ostindien.  
 pungens Jacq., stechender, ♂. w. Neugranada, Peru.  
 Tigilium L., Purgir-C., ♂. w. Ostindien, Molucken.  
 tomentosum H. Par. Lk. Enum., filziger, ♂. w. ?  
 xalapensis H. P. K., xalapensischer, ♂. w. Mexico.  
*castaneaefol.* L. v. *Caperonia castaneaefol.* Nachtr.  
 ?*moluccanum* Hort. v. *Aleurites triloba.* *palustre*  
 L. v. *Caperonia palust.* Nachtr. *paniculatum* Lam.  
 v. *Rottlera panicul.* *tinctorum* L. v. *Crozophora*  
*tinctoria.* *variegatum* L. v. *Codiaeum chrysosticton*  
 Nachtr.

**Crotonopsis** Mchx., Krebsblümchen, XXI. v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- elliptica Mchx., elliptisches, ☉. f. Carolina.  
 linearis Mchx., gleichbreitblättriges, ☉. f. Carolina.

**Crowea** Sm. (J. Crowe, englischer Botaniker), X. i., Tricoccae-Rutaceae.

- latifolia Lod., breitblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.  
 saligna Sm., weidenblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.

**Crozophora** Neck., Crozophore, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- tinctoria Adr. Juss., färbende, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Crucianella** L., Kreuzpflanze, IV. i., Rubiaceae.

- aegyptiaca L. (*herbacea* Forsk.), ägyptische, ☉. f. Aegypten.  
 angustifolia L. (*mucronata* Roth), schmalblättrige, ☉. f. Südeuropa.

- aspera MB. (*prostrata* Adams), rauhe, 4. f. Iberien.

- ciliata Lam. (*diffusa* Roth), gefranzte, ☉. f. Orient.

- gilanica Trin., gilanische, 4. f. Persien.

- glomerata MB., knaulförmige, 4. f. Iberien.

- hispidula Fisch. et Mey., hackerige, ☉. f. Ararat.

- latifolia L., breitblättrige, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.

- maritima L., Meerstrands, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

- molluginoides MB. (? *anomala* Loud.), weichlingähnliche, 4. f. Caucasus, Ungarn.

- monspeliaca L., französische, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.

- patula L. (*pentanda* Duf.), ausgebreitete, ☉. f. Spanien.

- pubescens W., weichhaarige, ☉. f. Creta.

- stylosa Trin., langgriffelige, 4. f. Persien.

- suaveolens C. A. Mey., wohlriechende, 4. f. Südrussl.

- tuberculosa Cav., höckerige, ☉. f. Spanien.

C. americana Mill. et hispida Mill. sind zweifelhaft.

**Cruickshanksia cistiflora** Hook. v. *Balbisia peduncularis*.**Crusea** Chamiss. et Schld. (Cruse, deutscher Botaniker), IV. i., Rubiaceae.

- calocephala DC., schönköpfige, ☉. m. f. Mexico.

- coccinea DC., scharlachblumige, ♂. w. Neuspanien.

- rubra Cham. et Schld., rothe, ☉. m. f. Vera-Cruz, Cuba.

**Crybe** Lindl., Hüllstendel, XX. i., Orchideae.



**Crybe**

rosea Lindl., rosafarbiger, 4. t. w. Mexico.

**Crypsis** Ait., Dornengras, III. II., Gramineae.

aculeata Ait., stechendes, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Sibirien.

alopecuroides Schrad., fuchsschwanzähnliches, ☉. f. Oesterreich, Mähren, Sibirien.

phalaroides MB., glanzgrasähnliches, ☉. f. Caucasus.

schoenoides Lam., knopfgrasähnliches, ☉. f. Oesterreich, Litorale, Caucasus, Sibirien.

squarrosa Nutt., sparriges, ☉. f. Nordamerika.

**Cryptandra** Sm., Hüllbeutel, V. I., Rhamneae.

amara Sm., bitterer, ♀. t. Neuholland.

arbutiflora Fenzl, erdbeerbaumblüthiger, ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

ericifolia Sm., heideblättriger, ♀. t. Neuholland.

obovata Sbr., verkehrteiförmiger, ♀. t. Neuholland.

spinescens Sbr., dorniger, ♀. t. Neuholland.

**Cryptantha** Lehm., Kleinblümchen, V. I., Asperifoliaceae.

glomerata Lehm., knaulförmiges, ☉. f. Chili.

microcarpa Fisch. et Mey., schmalfrüchtiges, ☉. f. Chili.

**Cryptarrhena** RB., Schnabelstendel, XX. I., Orchideae.

lunata RB., mondförmiger, 4. w. Jamaica.

**Cryptocarpha** Cass. v. Acicarpha.**Cryptocarya** RB., Kelchnufs, IX. I., Laurineae.

glaucescens RB., blaugrünliche, ♀. t. Neuholland.

obovata RB., verkehrteiblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Cryptochilus** Wall., Hülllippe, XX. I., Orchideae.

sanguinea Wall., blutrothe, 4. t. w. Nepal.

**Cryptolepis** RB., Hüllschuppe, V. I., Contortae-Apocynae.

elegans Lod., zierliche, ♀. Sch. w. Brasilien.

**Cryptolobus** *americanus* Spgl. et *sarmentosus* Spgl. v. *Amphicarpa monoica* et *sarmentosus*.**Cryptospermum** P., Verstecktsame, IV. I., Rubiaceae-Opercularieae.

Youngii P., Young's, ♀. t. Neusüdwallis.

**Cryptostegia** RB., Cryptostegie, V. II., Asclepiadeae.

grandiflora RB., großblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.

madagascariensis Lod., madagascarische, ♀. Sch. w. Madagascar.

**Cryptostemma** RB., Verstecktfaden, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

calendulaceum RB., ringelblumenähnlicher, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

hypochondriacum RB., hypochondrischer, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

runcinatum RB., schrotsägeförmiger, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

**Cryptostylis** RB., Verstecktgriffel, XX. I., Orchideae.

erecta RB., aufrechter, 4. w. Neuholland.

longifolia RB., langblättriger, 4. w. Neuholland.

**Cubaea speciosa** Spgl. v. *Moldenhawera floribunda*. *Cucifera thebaica* Delil. v. *Hyphaene coriacea*.**Cucubalus** T., Taubenkropf, X. III., Caryophyllaceae.

bacciferus L., beerentragender, 4. f. Europa.

Behen L. etc. v. *Silene inflata* etc.

- Cucumis** T., Gurke, XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.  
*africanus* L., afrikanische, ☉. m. Cap der guten Hoffn.  
*Anguria* L., Angurien-G., ☉. m. Jamaica.  
*caffer* Eckl. (*Citrullus caffer* Schrad.), caffer'sche, ☉. m.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*Chate* L., rauhfrüchtige, ☉. m. Aegypten, Arabien.  
*Citrullus* Ser., Wasser-G., ☉. m. f. Südeuropa.  
 a) *Pasteca* Sering. β) *Jace* Sering.  
*deliciosus* Roth, süße, ☉. m. Ostindien.  
*Dudaim* L., *Dudaim*-G., ☉. m. Ostindien.  
*flexuosus* L., gebogene, ☉. m. Ostindien.  
*integrifolius* Roxb., ganzblättrige, ☉. m. Ostindien.  
*jamaicensis* Berter., Jamaica-G., ☉. m. Jamaica.  
*lineatus* Boss., linirte, ☉. m. Guiana.  
*maculatus* W., gefleckte, ☉. m. ? Guinea.  
*maderaspatanus* L., maderaspatanische, ☉. m. Ostindien.  
*Melo* L., Melonen-G., ☉. m. Ostindien.  
 a) *reticulatus* Sering. β) *Cantalupo* Sering. γ) *maltensis* Sering.  
*Momordica* Roxb., springkürbisähnliche, ☉. m. Ostind.  
*muricatus* W., weichstachelige, ☉. m. Ostindien.  
*prophetarum* L., Propheten-G., ☉. m. Arabien, Nord- und Südafrika.  
*pubescens* W., weichhaarige, ☉. m. ?  
*sativus* L., gemeine, ☉. m. f. Ostindien.  
 a) *viridis* Sering. β) *flavus* Sering. γ) *albus* Sering. δ) *variegatus* Sering. ε) *fastigiatus* Sering.  
*utilissimus* Roxb., nutzbare, ☉. m. Ostindien.  
*acutangulus* L. v. *Luffa acutangul*, *anguinus* L. v. *Trichosanthes anguina*. *Colocynthis* L. v. *Colocynthis* officinal. s. vulg. ? *pseudocolocynthis* Wender. v. *Colocynth. amarissima*.
- Cucurbita** T., Kürbis, XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.  
*aurantia* W., orangefrüchtiger, ☉. m. ?  
 a) *orangina* Sering. β) *colocynthoides* Sering.  
*mammosa* Molin., zitteriger, ☉. m. Chili.  
*maxima* Duchesn., größter, ☉. f. ?  
*Melopepo* L., Türkenbund-K., ☉. f. Ostindien.  
*moschata* Duch., moschusduftender, ☉. f. ?  
*ovifera* L., eiförmiger, ☉. f. Astrachan.  
 a) *pyriformis* Sering. β) *subglobosa* Sering. γ) *grisea* Sering.  
*Pepo* L., gemeiner, ☉. f. Levante, Ostindien.  
 a) *subrotunda* W. β) *oblonga* W.  
*Potira* Duch., Potiron-K., ☉. f. ?  
 a) *viridis* Sering. β) *gourgera* Ser.  
*siceraria* Molin., berauschender, ☉. m. f. Chili.  
*subverrucosa* W., leichtwarziger, ☉. m. f. ?  
*tuberculosa* Schrad., höckeriger, ☉. m. f. ?  
*urnigera* Schrad., becherförmiger, ☉. m. f. ?  
*verrucosa* L., warziger, ☉. m. f. ?  
*caffer* Eckl. v. *Cucumis caffer*. *cerifera* Fisch. v. *Benincasa cerifera*. *Citrullus* L. (*Anguria* Duch., *pinnatifida* Schrk.) v. *Cucumis* Citr. *Lagenaria* L. v. *Lagenaria vulgaris*.
- Culcasia scandens** P. Beauv. v. *Caladium scandens*.  
**Culcitium** Bonpl., Culcitium, XIX. i., Compositae-Eupatocineae.  
*salicinum* Spgl., weidenblättriges, ♀. t. Van-Diemens-Land.

- Cullumia** RB. (Sir Thomas Cullum, englischer Gelehrter), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.  
*ciliaris* RB., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*setosa* RB., borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung,  
*squarrosa* RB., sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Cuminum** T., Kreuzkümmel, V. II., Umbelliferae.  
*Cyminum* L., officineller, ☉. f. Aegypten, Griechenland.
- Cunningia** D. Don (zu Ehren der Lady Gordon Cumming), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*campanulata* D. Don, glockige, 4. Zw. k. t. Chili.  
*tenella* D. Don, zarte, 4. Zw. k. t. Chili.  
*trimaculata* D. Don, dreifleckige, 4. Zw. k. t. Chili.
- Cunila** L., Cunile, II. I., Labiatae.  
*coccinea* Nut. Hook., scharlachrothe, 4. k. f. b. Florida.  
*mariana* L., maryländische, 4. f. Virginien.  
*capitata* L. v. *Ziziphora clinopodioides*. *pulegioides* L. et *thymoides* L. v. *Hedeoma puleg.* etc.
- Cunninghamia** RB. (J. und A. Cunningham, berühmte englische Botaniker und Reisende), XXI. x., Coniferae.  
*lanceolata* RB. (*sinensis* Rich.), lanzettblättrige, ♀. k. China.
- Cunonia** L. (J. C. Cuno zu Amsterdam, Freund des Linné), X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.  
*capensis* L., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Cupania** Plum. (F. Cupani, italienischer Botaniker), VIII. I., Sapindacei.  
*canescens* P., weißgraue, ♀. w. Ostindien.  
*dentata* Sessé, gezähnte, ♀. w. Mexico.  
*excelsa* H. B. K., hohe, ♀. w. Mexico.  
*glabra* Sw., kahle, ♀. w. Jamaica.  
*saponarioides* Sw. (*Saponaria* P.), seifenbaumähnliche, ♀. w. Westindien.  
*setigera* Cun., borstige, ♀. t. Neuholland.  
*tomentosa* Sw., filzige, ♀. t. Westindien.
- Cuphea** P. Br. Jacq., Krummkapsel, XI. I., Lythriariae (*Salicariae*).  
*circaeoides* Ker, Sims, hexenkrautähnliche, ☉. w. m. f. Südamerika,  
*decandra* RB., zehnmännige, ♀. w. Jamaica.  
*gracilis* H. B. K. (*fruticosa* Spgl. N. E.), schlanke, ♀. w. Südamerika.  
*lanceolata* RB., lanzettliche, ♂. w. Mexico.  
*Llavea* DC., Llave's, ♀. t. Mexico.  
*Melvilla* Lindl., Melville's, ♀. w. Guiana.  
*micropetala* H. B. K., kleinkronige, ♀. w. Mexico.  
*multiflora* Lod., vielblumige, ♀. w. Trinidad.  
*parviflora* Hook., kleinblumige, ♀. w. Demerara.  
*procumbens* Cav., niederliegende, ☉. m. f. Mexico.  
*scabrida* H. B. K., schärfliche, ♀. t. Mexico, Brasilien.  
*serpyllifolia* H. B. K., quendelblättrige, ♀. Neugranada, Trinidad.  
*silenooides* N. E., silenähnliche, ☉. m. f. Mexico.  
*virgata* Cav., ruthenförmige, ☉. m. f. Mexico.  
*viscosissima* Jacq., schmierige, ☉. f. m. Virginien, Südamer.
- Cupressus** T., Cypresse, XXI. x., Coniferae.  
*bacciformis* W., beerenförmige, ♀. k. ?  
*glauca* Lam. (*lusitanica* T. ? *Tournefortii* Audib. *pendula* L'Her.), blaugrüne, ♀. k. t. Ostindien, Portugal.  
*pendula* Thbg., überhängende, ♀. k. t. Japan, China.



**Cupressus**

*sempervirens* L., immergrüne, f. k. f. b. Südeuropa, Griechenland.

a) *stricta* Mill. b) *horizontalis* Mill. (*expansa* Targ., *thurifera* H. B. K., weihrauchgebende, f. k. t. Mexico. *torulosa* Lamb. D. Don, aufgetriebene, f. k. t. Nepal. *triquetra* Lod., dreiseitige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*australis* P. Hort. vid. ? *Callitris cupressiformis*.

*disticha* L. vid. *Taxodium distichum*, *juniperoides*

L. v. *Taxodium juniperoid*. *thyoides* L. v. *Thuja sphaeroidea*.

**Curatella** L., Polirholz, XIII. II., Dilleniaceae.

*alata* Vent., geflügeltes, f. w. Guiana.

*americana* L., amerikanisches, f. w. Südamerika.

**Curculigo** G. Curculigo, VI. I., Narcisseae-Hypoxydeae.

*brevifolia* Dryand., kurzblättrige, 4. w. Ostindien.

*latifolia* Dryand., breitblättrige, 4. w. Amboina.

*orchioides* Roxb., orchisähnliche, 4. w. Ostindien.

*plicata* Dryand., gefaltete, 4. t. Cap d. guten Hoffn.

β) *glabra*.

*recurvata* Dryand., zurückgekrümmte, 4. w. Bengalen.

*sumatrana* Roxb., sumatranische, 4. w. Sumatra.

**Curcuma** L., Gelbwurz, I. I., Scitamineae-Amomeae.

*aeruginosa* Roxb., kupferfarbige, 4. w. Pegu.

*Amada* Roxb., Amada-G., 4. w. Bengalen.

*angustifolia* Roxb., schmalblättrige, 4. w. Ostindien.

*aromatica* Salisb. (*Zedoaria* Roxb.), gewürzhafte, 4. w. Ostindien.

*caesia* Roxb., hechtblaue, 4. w. Bengalen.

*comosa* Roxb., schopfige, 4. w. Pegu.

*elata* Roxb., erhabene, 4. w. Pegu.

*ferruginea* Roxb., rostfarbige, 4. w. Bengalen.

*latifolia* Rosc., breitblättrige, 4. w. Ostindien.

*leucorrhiza* Roxb., weißwurzelige, 4. w. Ostindien.

*longa* L., lange, 4. w. Ostindien.

*montana* Roxb., Berg-G., Ostindien.

*parviflora* Wall., kleinblumige, 4. w. Ostindien.

*petiolata* Roxb., gestielte, 4. w. Pegu.

*reclinata* Roxb., zurückgebeugte, 4. w. Ostindien.

*rubescens* Roxb., röthliche, 4. w. Bengalen.

*rubricaulis* Lk., rothstengelige, 4. w. Ostindien.

*viridiflora* Roxb., grünblumige, 4. w. Sumatra.

*xanthorrhiza* Roxb., gelbwurzelige, 4. w. Amboina.

*Zedoaria* Rosc. (*Zerumbet* Roxb.), *Zedoaria*-G., 4. w. Ostindien.

*rotunda* L. v. *Kaempferia pandurata*.

**Curtisia** Ait. (W. Curtis, berühmter englischer Botaniker), IV. I., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

*faginea* Ait., rothbuchenblättrige, f. t. Cap d. g. H.

**Cuscuta** T., Flachsseide, V. II., Aizoideae-Phytolacceae (Cuscutinae).

*americana* L., amerikanische, 4. w. Westind., Nordamer.

*australis* RB., neuholländische, 4. k. t. Neuholland.

*chilensis* Ker, chilesische, 4. f. k. Chili.

*chinensis* Lam., chinesische, 4. f. k. China.

*Epilinum* Weihe, ächte, ☉. f. Deutschland.

*Epithymum* Murr., Thymian-F., ☉. f. Europa.

*europaea* L., gemeine, ☉. f. Europa.

*Hookeri* Swt. (*reflexa* var., *verrucosa* Hook.) ♂. w. Ostind.

**Cuscuta**

*monogyna* Vahl (*lupuliformis* Krock.), ☉. f., einweibige, Osteuropa, Kleinasien, Caucasus.

*planiflora* Ten., flachblumige, ☉. f. Südtyrol, Italien.

*verrucosa* Swt., warzige, 4. f. k. Nepal.

**Cussonia** Thbg. (M. Cusson, französischer Botaniker), V. II., Araliaceae.

*spicata* L., ährenförmige, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

*thyrsiflora* L., strauchblumige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

*tripteris* Coll., dreiflügelige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

**Cyamopsis** DC., Afterbohne, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*psoraleoides* DC., psoraleaähnliche, ☉. f. Arabien.

**Cyamus** *Nelumbo* Salish. v. *Nelumbium speciosum*.

**Cyanella** L., Cyanelle, VI. I., Coronariae-Asphodelaceae.

*alba* Thbg., weisse, 4. Zw. k. t. Cap der g. Hoffn.

*capensis* L., capische, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*lineata* Burch., linirte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*lutea* Thbg., gelbe, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*odoratissima* Lindl., wohlriechende, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*orchidiformis* Jacq., orchisähnliche, 4. Zw. k. t. C. d. g.

**Cyanopsis** *pubescens* DC. v. *Scheuchleria patula*.

**Cyanotis** D. Don., Blauhaar, VI. I., Commelineae.

*axillaris* D. Don, achselständiges, ♂. t. Ostindien.

*barbata* D. Don, härtiges, 4. f. b. k. Nepal.

*cristata* D. Don, kammiges, ♂. t. w. Ceylon.

**Cyathea** Sm., Becherfarn, XXIV. I., Pterioideae.

*arborea* Sm., baumartiger, ♂. w. Westindien.

*excelsa* Sw. (*arborea* Bory), hoher, ♂. w. Mascarenas.

**Cyathodes** LaBill., Becherheide, V. I., Epacrideae.

*acerosa* RB., nadelartige, ♂. t. Neuholland.

*glauca* LaBill., blaugrüne, ♂. t. Van-Diemens-Land.

*Oxycedrus* RB., vierblättrige, ♂. t. Van-Diemens-Land.

**Cycas** L., Farnpalme. XXII. XII., Cycadeae.

*angulata* RB., kantige, ♂. w. Neuholland.

*circinalis* L., kreisförmige, ♂. w. Molucken.

*glauca* Lk., blaugrüne, ♂. w. Ostindien.

*revoluta* Thbg., zurückgerollte, ♂. w. China, Japan.

*squarrosa* Lod., sparrige, ♂. w. Ostindien.

**Cyclachaena** Fresen., *Cyclachaena*, XIX. IV., Compositae-Ambrosiaceae.

*xanthiifolia* Fresen., spitzklettenblättrige, ☉. f. Nordamer.

**Cyclamen** T., Erdscheibe, Schweinsbrot, V. I., Primulaceae.

*coum* Mill., rundblättrige, 4. Kn. k. Südeuropa, Taurien, Griechenland.

*europaeum* L. (*Clusii* Lindl.), gemeine, 4. Kn. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

*ficariaefolium* Rchb., schöllkrautblättrige, 4. Kn. k. f. b. Dalmatien.

*hederaefolium* Ait., epheublättrige, 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

a) *albidum*. b) *purpurascens*.

*ibericum* Goldie, iberische, 4. Persien.

*indicum* L., indische, 4. Kn. t. Ceylon.

*latifolium* Sibth., breitblättrige, 4. Kn. f. b. Süd- und Osteuropa.

*linearifolium* DC., schmalblättrige, 4. Kn. k. Südfrankr.

*neapolitanum* Ten., neapolitanische, 4. Kn. k. Istrien, Ital.

**Cyclamen**

*persicum* Mill. (*cyprium* Hoffmsg.), persische, 4. Kn. k. Griechenland.

a) *inodorum*. b) *odoratum*. c) *albiflorum* (? *alepicum* Hort.). d) *laciniatum*. e) *lilacinum*. f) *punctatum*.

*repandum* Sibth., ausgeschweifte, 4. Kn. k. f. b. Italien, Griechenland.

*subhastatum* Rchb., spontonblättrige, 4. Kn. k. Südeuropa.

*vernum* Mill., Frühlings-E., 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

**Cyclanthus** Poit., Scheibenblume, XXI. ix., Palmae-Cyclantheae.

*Plumieri* Poit., Plumier's, 4. w. Westindien.

**Cyclobothra** Swt., Scheibentraube, VI. i., Coronariae-Tulipaceae.

*alba* Benth., weisse, 4. Zw. f. b. k. Californien.

*barbata* Swt., bärtige, 4. Zw. t. Mexico.

*lutea* Lindl., gelbblumige, 4. Zw. t. Mexico.

*pulchella* Benth., hübsche, 4. Zw. f. b. k. Californien.

*purpurea* Swt., purpurfarbige, 4. Zw. t. Mexico.

**Cyclopia** Vent., Cyclopie, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

*galioides* DC., labkrautähnliche, f. t. Cap d. g. H.

*genistoides* Vent., ginsterähnliche, f. t. Cap d. g. H.

*latifolia* DC., breitblättrige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

*tenuifolia* Lehm., feinblättrige, f. t. Cap d. g. H.

**Cynoches** Lindl., Schwanenstendel, XX. i. Orchideae.

*Loddigesii* Lindl., Loddiges's, 4. w. Surinam.

*ventricosus* Bate, bauchiger, 4. w. Guatamala.

**Cydonia** T., Quitte, XII. ii., Rosaceae-Pomaceae.

*chinensis* Thouin, chinesische, f. f. China.

*japonica* P., japanesische, f. f. b. Japan.

b) *flore albo*, c) *flore semipleno*.

*vulgaris* P., gemeine, f. f. Griechenl., Taur., Siebenb.

a) *maliformis* Mill. b) *pyriformis* Mill. c) *lusitanica* Mill. Duham.

**Cylista** Ait., Cyliste, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*albiflora* Sims, weifsblumige, f. Sch. w. Mascarenas.

*polystachya* DC., vielährige, f. Sch. w. Westafrika.

*scariosa* Roxb., trockenhäutige, f. Sch. w. Ostindien.

*tomentosa* Roxb., filzige, f. Sch. w. Ostindien.

*villosa* Ait., zottige, f. Sch. w. Cap d. g. Hoffnung.

**Cymation laevigatum** Spgl. et *undulat.* Spgl. vid. *Lichtensteinia laevigata* etc.**Cymbaria** L., Cymbelkapsel, XIV. ii., Personatae-Antirrhineae (*Scroful.*).

*borysthenica* Pall., chersonische, 4. f. Südrufsland.

*dahurica* L. (*daurica*), dahurische, 4. f. Dahurien.

**Cymbidium** Sw., Cymbelstendel (Kahnlippe), XX. i., Orchideae.

*aloëfolium* Sw., aloëblättriger, 4. w. Ostindien.

*chinense* W., chinesischer, 4. w. China.

*ensifolium* Sw., schwertförmiger, 4. w. China, Japan.

β) *estriatum* Lindl.

*giganteum* Sw., riesenhafter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

*lancifolium* Hook., lanzettblättriger, 4. w. Ostindien.

*marginatum* Lindl., gerandeter, 4. w. Rio Janeiro.

*suave* RB., wohlriechender, 4. w. Neuholland.

*tripterum* Sw., dreiflügeliger, 4. w. Jamaica.



**Cymbidium**

*virescens* Lindl., grünlicher, 4. w. Japan,

*xiphiifolium* Ker, schmalblättriger, 4. w. China.

*dependens* Lod. v. *Cirrhaea dependens*. *graminoides* Sw. v. *Isochilus graminifolius*. *reflexum* RB. v. *Sturmia reflexa*. *scriptum* Sw. vid. *Grammatophyllum speciosum*. *tessellatum* Roxb. vid. *Vanda tessellata*.

**Cymbopogon** Spgl., Cymbelbart, III. II. (XXIII. 1.), Gramineae.

*Schoenanthus* Spgl., wohlriechender, 4. w. Ostindien, Arabien, Cap der guten Hoffnung.

**Cyminosma** G., Cyminosma, VIII. I., Tricoccae-Rutaceae.

*oblongifolia* Hook., langblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.

*odorata* DC., wohlriechende, ♂. t. China.

*pedunculata* DC., gestielte, ♂. t. Ostindien.

**Cynanchum** L., Hundswürger, V. II., Asclepiadeae.

*acutum* L., spitziger, 4. Sch. f. b. k. Süd- u. Westeuropa.

*capense* L., capischer, ♂. Sch. t. Cap der gut. Hoffn.

*cirrhum* Sw., wickelrankiger, 4. Sch. f. ?

*crassifolium* RB., dickblättriger, ♂. 4. Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

*excelsum* Dsf., hoher, 4. Sch. k. Nordafrika.

*foetidum* H. B. K., stinkender, ♂. Sch. w. t. Mexico.

*fuscum* Lk. (*medium* RB.), bräunlicher, 4. f. Süd-europa, Portugal.

*Heynianum* R. et S., Heyne's, ♂. Sch. w. Ostindien.

*luteum* Spgl., gelber, 4. f. b. k. Creta.

? *melanthos* Dsf., schwarzblumiger, 4. Sch. f. Frankreich.

*monspeliacum* L., französischer, 4. Sch. f. Spanien.

*mucronatum* H. B. K., stachelspitziger, ♂. Sch. w. Neugranada.

*nigrum* P., schwarzer, 4. Sch. f. Ostrußland.

*pauciflorum* RB., wenigblumiger, ♂. Sch. w. Ostindien.

*pilosum* RB., weichhaariger, ♂. Sch. t. Cap d. g. H.

*roseum* RB., rosafarbiger, 4. Sch. f. Dahurien.

*sibiricum* RB., sibirischer, 4. f. Sibirien.

*undatum* B. Rep., welliger, ♂. Sch. w. Westindien.

*Vincetoxicum* P., Schwalbenwurz, H. 4. f. Europa.

*viridiflorum* Ker, grünblumiger, ♂. Sch. w. Ostindien.

*Argel* Delil. vid. *Solenostemma Argel*. *bicolor* Bot.

rep. vid. *Doemia bicolor*. *discolor* Sims v. *Gonolobus*

*discolor*. *extensum* Ait. vid. *Doemia extensa*. *fimbriatum*

Kunth. vid. *Metaplexis fimbriata*. *hirsutum* Vahl v. *Macroscelis*

*obovata*. *nigrum* Cav. *parviflorum* Sw. v. *Metastelma*

*parviflorum*. *viminale* L. v. *Sarcostemma viminale*.

**Cynara** T., Artischocke, XIX. I., Compositae-Gynarcephalae.

*Cardunculus* L., Cardi-A. (spanische), ♂. f. Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

*horrida* Ait., rauhe, 4. k. Madeira,

*humilis* L., niedrige, 4. f. Spanien, Nordafrika, Griechenland.

*pygmaea* W., zwergige, 4. f. Spanien.

*Scolymus* L., ächte, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

*spinosissima* Presl., starkstachelige, 4. f. Sicilien.

**Cynodon** Rich., Hundsgras, III. II., Gramineae.

- Dactylon* Rich. P., fingerförmiges, 4. f. Südeuropa, Caucasus, Amerika, Afrika, Neuholland.  
*linearis* W., schmalähhriges, 4. k. Ostindien.  
*stellatus* W., sternförmiges, 4. k. St. Helena.  
*virgatus* W., ruthenförmiges, 4. w. Ostindien.

**Cynoglossum** T., Hundszunge, V. I., Asperifoliaceae.

- apenninum* L., apenninische, ♂. f. Italien.  
*australe* RB., neuholländische, 4. k. t. Neuholland.  
*canescens* W. (*hirsutum* Jacq., *micranthum* DC.), grau-liche, ☉. f. m. Ostindien.  
*cheirifolium* L. (*argenteum* Lam.), levkoiblätterige, ♂. f. b. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.  
*clandestinum* Dsf. (*fulvum* Rudolph.), heimlichblumige, ♂. f. Portugal, Nordafrika.  
*Columnae* Tenor., Columna's, ♂. f. Neapel, Sicilien.  
*divaricatum* Lehm., ausgesperrte, ♂. f. Sibirien.  
*elongatum* Hornem., verlängerte, ♂. f. ?  
*grandiflorum* Benth., großblumige, 4. f. b. k. Cashmire.  
*holosericeum* Stev., sammethaarige, ☉. f. Sibirien.  
*lanceolatum* Forsk. (*hirsutum* Thbg.), lanzettblätterige, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.  
*latifolium* RB., breitblätterige, 4. k. Neuholland.  
*montanum* Lam. (*sylvaticum* Haenke, *Haenkei* Schult., *Dioscoridis* Vill.), Berg-H., ♂. f. Deutschl., Frankr. etc.  
*officinale* L., officinelle, ♂. f. Europa, Asien, Nordafrika und Amerika.  
 β) *bicolor* W.  
*pictum* Ait. (*cheirifol.* Scop., *creticum* Vill.), bemalte. Südeuropa.  
*sylvaticum* Sm. (*apenninum* Roth.), Wald-H., ♂. f. England, Südeuropa.  
*umbellatum* Kit., doldige, ♂. f. Ungarn, Sibirien.  
*virginicum* L. (*amplexicaule* Mchx.), virginische, 4. f. Nordamerika.  
*glomeratum* Pursh v. *Myosotis glomerata*. *linifolium* L., *nitidum* W., *Omphalodes* L., *scorpioides* Haenk. etc. v. *Omphalodes linifol.* etc. *Rindera* Pall. vid. *Rindera laevigata*.

**Cynometra** L. (*Cynomorium* Rumpf.), Hundsfuß, X. I., Leguminosae-Caesalpineae.

- cauliflora* L., stengelblumiger, ♀. w. Ostindien.  
*polyandra* Roxb., vielmänniger, ♀. w. Ostindien.

**Cynorchis** Thouars, Hundsstendel, XX. I., Orchideae.

- fastigiata* Thouars, Lindl., gipfelständiger, 4. Kn. w. Mascarenas.

**Cynosurus** L., Kammgras, III. II., Gramineae.

- cristatus* L., gemeines, 4. f. Europa.  
*echinatus* L., stacheliges, ☉. f. Südeuropa.  
*elegans* Dsf. (*effusus* Lk.), zierliches, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.  
*aureus* L. v. *Chrysosurus cynosuroides*. *coeruleus* L. etc. vid. *Sessleria coerulea* etc. *coracanus* L. etc. vid. *Eleusine coracana* etc. *distichus* Hoffm. v. *Oreochloa disticha*. *domingensis* Jacq. etc. vid. *Leptochloa domingensis*. *durus* L. v. *Sclerochloa dura*. *erucaeformis* W. v. *Beckmannia erucaeformis*. *Lima* L. v. *Wangenheimia Lima*. *retroflexus* Vahl v. *Dineba aegyptiaca*.

- Cynthia** Don (*Luthera* Schulz), Cynthie, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.  
*virginica* Don, virginische, 4. f. Nordamerika.
- Cypella** Herb., Cypelle, XVI. 1., Irideae.  
*Drummondii* Grah., Drummond's, 4. Kn. w. Südamerika.  
*Herberti* Bot. mag., Herbert's, 4. Zw. t. Buenos Ayres.  
*plumbea* Lindl. v. *Phalocallis plumbea*.
- Cyperus** T., Cypergras, III. 1., Cyperaceae.  
*Aitoni* R. et S., Aiton's, 4. t. Cap der guten Hoffn.  
*alopecuroides* Rottb., fuchsschwanzähnliches, 4. w. Südafrika, Neuholland.  
*alternifolius* L., wechselblättriges, 4. w. Madagascar.  
*articulatus* L. (*nodosus* W.), gegliedertes, 4. w. Ost- und Westindien.  
*aureus* Humb. (*quitensis* Spgl.), goldfarbiges, 4. w. Südamer.  
*auricomus* Sbr. (*xanthocomus* Lk.), goldschopfiges, 4. w. Aegypten.  
*australis* Schrad. (*glomeratus* Host.), südliches, 4. k. f. Südeuropa.  
*badius* Dsf. (*thermalis* Dumort.), kastanienbraunes, 4. f. k. Westdeutschland, Frankreich, Nordafrika.  
*brachiatus* Poir., armförmiges, 4. w. Madagasc., Manilla.  
*brizaeus* Rich., zittergrasähnliches, 4. w. Westindien.  
*brunneus* Sw., braunes, 4. w. Westindien.  
*caricinus* D. Don, riedgrasähnliches, 4. k. t. Nepal.  
*chrysomelinus* Lk., goldfarbiges, 4. w. ? Nepal.  
*comosus* Sm., schopfiges, 4. k. Griechenland.  
*compactus* Retz (*congestus* Poir.), dichtes, 4. w. China.  
*compressus* L., flaches, 4. w. Ost- und Westindien.  
*conglomeratus* Rottb. (*arundinaceus* Forsk.), zusammengehalttes, 4. w. Arabien.  
*cruentus* Rottb. (*globosus* Forsk.), blutfarbiges, 4. w. Arab.  
*densiflorus* Meyer, dichtblumiges, 4. w. Surinam.  
*difformis* L., unförmliches, 4. w. Ostind., Afr., Neuholl.  
*distans* L. suppl. (*elatus* Rottb.), entferntstehendes, 4. k. w. Ost- und Westindien, Nordamerika.  
*Dives* Delil. (*fastigiatus* Forsk.), göttliches, 4. w. Aegypt.  
*elatus* L., hohes, 4. w. Ostindien.  
*elegans* Vahl, zierliches, 4. w. Westindien, Südamerika.  
*Eragrostis* Vahl, schönes, 4. w. Tranquebar.  
*erythraeus* Schrad. (*erubescens* Lk., *globosus* Hort.), röthliches, 4. w. ?  
*esculentus* L., Erdmandel-C., 4. Kn. Südeuropa, Griechenland, Aegypten.  
*fasciculatus* Ell., büschelförmiges, 4. f. k. Nordamerika.  
*fastigiatus* Rottb. (? *venustus* RB.), gipfelständiges, 4. w. Ostindien, Neuholland.  
*flavescens* L., gelbliches, 4. ♂. f. Europa, Nordamerika.  
*fuscus* L., dunkelbraunes, 4. f. Europa, Nordamerika.  
    β) *virescens* Hoffm. (*glaber* Sturm).  
*glaber* L. (*pictus* Ten.), glattes, 4. f. Italien, Sicilien, Griechenland.  
*globosus* All., kugelhähriges, 4. k. Italien, Nordafrika.  
*glomeratus* L., knaulförmiges, 4. f. Italien.  
*holosericeus* Hornem., sammetartiges, 4. w. ?  
*Hydra* Mchx., langhülliges, 4. k. Süd- u. Nordamerika.  
*Jacquini* Schrad. (*elatus* H. Vindob.), Jacquin's, 4. w. ? Ostindien.  
*incarnatus* Lk., fleischfarbiges, 4. w. Brasilien.  
*Iria* L., entferntschuppiges, 4. w. Ostindien.



**Cyperus**

kyllingioides Vahl, kyllingiaähnliches, 4. k. Nordamer.  
leucocephalus Retz (*dubius* Rottb.), weifsköpfiges, 4. w.  
Ostindien.

ligularis L., blattthäutiges, ☉. w. Jamaica.

longus L., langes, 4. f. England, Südeuropa, Griechenl.

Luzulae L., Rottb. (*polycephalus* Lam.), aftersimsen-  
ähnliches, 4. w. Ost- und Westindien.

Monti L. (*serotinus* Rottb.), Monti's, 4. f. k. Südeuropa.

mucronatus Retz (*lateralis* Forsk., *maritimus* Gouan,  
*junciformis* Dsf. *distachys* All.), stachelspitziges, 4. k.

Südeuropa, Asien, Nordafrika.

niloticus Forsk., ägyptisches, ☉. m. f. Aegypten.

nudus Humb., nacktes, 4. w. Südamerika.

pallescens Dsf. (*radicosus* Sm., *olivaris* Targ.), bleiches,  
4. k. Italien, Nordafrika, Griechenland.

Pangorei Rottb., Pangore's, 4. w. Ceylon.

paniculatus Rottb., rispiges, 4. w. Westindien.

pannonicus Jacq., ungarisches, ☉. f. Ungarn, Griechenl.

paramattensis Lk. (*Paramatta* Mart.), paramattisches,  
4. w. Südamerika.

patens Vahl, abstehendes, ☉. w. Guinea.

patulus Kit., ausgebreitetes, ☉. f. Ungarn.

polycephalus Lk. (*multiceps* Lk.), vielköpfiges, 4. k.  
Süd- und Osteuropa.

polystachys Rottb., vielähriges, 4. w. Ostindien, Afrika,  
Neuholland.

protractus Delil., verlängertes, ☉. f. m. Aegypten.

pygmaeus Rottb., zwergiges, 4. w. Ostindien.

rigidus Vahl, starres, 4. w. Ostindien.

scaber Lagasc., scharfes, 4. w. ?

Sellowii Lk., Sellow's, ☉. w. Montevideo.

Sieberianus Lk. (*esculentus* Sbr.), Sieber's, 4. Kn. w. Aegypt.

spectabilis Schreb. ? H. Erf., ansehnliches, ? Ostindien.

strigosus L., striegeliges, 4. w. k. Jamaica, Virginien.

tenellus L. suppl. (*minimus* Thbg.), zartes, ☉. t. w. C. g. H.

Tenorii Lk. (*aureus* Tenor.), Tenore's, 4. k. Neapel.

tenuiflorus Rottb., dünnblüthiges, 4. k. t. Kleinasien.

trisulcus D. Don, dreifurchiges, 4. k. Nepal.

tuberosus Rottb., knolliges, 4. Kn. w. Ostindien.

vegetus W. (*monandrus* Roth, *compressus* Jacq., *Eragrostis*  
Lam.), lebhaftes, 4. w. t. Mittelamerika, Carolina.

viscosus Ait. (*elegans* Rottb.), schmieriges, 4. w. Westind.

*incompletus* Lk. v. *Mariscus patulus*. *Michelianus*

Lk. et *pygmaeus* Hortul.) v. *Dichostylis Micheliana*.

*Papyrus* L. v. *Papyrus antiquorum*.

**Cyphia** Berg., Krummnarbe, V. I., Campanulaceae-Lo-  
beliaceae (Cyphiaceae).

bulbosa Berg., knollige, ♂. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.

Cardamines W., springkressenähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

incisa W., schlitzblättrige, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

volubilis W., windende, ☉. ♂. Sch. m. f. t. Cap d. g. H.

**Cyphonema** Hook., Cyphonéma, VI. I., Narcisseae-  
Amaryllideae.

Loddigesianum Hook., Loddigs's, 4. Zw. w. Valparaiso.

**Cypripedium** L., Frauenschuh, XX. II., Orchideae,  
arietinum RB., canadischer, 4. Kn. f. k. Canada.

Calceolus L., gemeiner, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

candidum W., reinweißser, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

guttatum Sw., getüpfelter, 4. Kn. f. k. Sibirien.

**Cypripedium**

*humile* Sw. (*acaule* Ait. Mchx.), niedriger, 4. Kn. f. Nordamerika.

*insigne* Wall., ausgezeichneter, 4. Kn. w. Nepal.

*macranthum* Sw., großblumiger, 4. Kn. f. k. Sibirien.

*parviflorum* Sw., kleinblumiger, 4. Kn. f. k. Virginien.

*pubescens* W. (*flavescens* Redout.), weichhaariger, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

*purpuratum* Lindl., purpurfarbiger, 4. Kn. f. k. Nordamer.

*spectabile* Sw. (*album* Ait., *canadense* Mchx.), ansehnlicher, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

*ventricosum* Sw., bauchiger, 4. Kn. f. k. Sibirien.

*venustum* Wall., lieblicher, 4. Kn. w. Nepal.

**Cyrrilla** L. (Cyrillo, Professor der Botanik zu Neapel), V. I., Corniculatae-Cunoniaceae.

*antillana* Mchx., antillische, ⚥. t. w. Westindien.

*caroliniana* Mchx. (*racemiflora* L.), carolinische, ⚥. k. f. b. Carolina.

**Cyrrilla pulchella** L'Her. v. *Trevirana coccinea*.**Cyrtanthus** Ait., Bogenlilie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

*angustifolius* Ait., schmalblättrige, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffnung.

*collinus* Burch., Hügel-B., 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

*obliquus* Ait., schiefe, 4. Zw. w. t. Cap d. gut. Hoffn.

*odorus* Ker, wohlriechende, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

*pallidus* Sims, bleiche, 4. Zw. w. t. Cap der gut. H.

*spiralis* Burch., spiralförmige, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

*ventricosus* W. (*angustifolius* Jacq.), bauchige, 4. Zw. t. Cap des guten Hoffnung.

*vittatus* Dsf., verschleierte, 4. Zw. w. Cap d. gut. H. *uniflorus* Ker v. *Gastronema clavatum*.

**Cyrtorchilum** H. B. K., Bogenlippe, XX. I., Orchideae.

*bictoniense* Bate, bictonische, 4. w. Südamerika.

*flavescens* Lindl., gelbliche, 4. w. Mexico.

*maculatum* Lindl., gefleckte, 4. w. Mexico.

*mystacinum* Lindl., bärtige, 4. w. ?Südamerika.

**Cyrtogyne** Haw., Cyrtogyne, V. v., Corniculatae-Grassulaceae.

*undata* Haw., wellige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

*undulata* Haw., schmalwellige, ⚥. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Cyrtolapis** DC., Bogenschuppe, XIX. II., Compositae-Corymbif.

*alexandrina* DC., aegyptische, ☉. f. Aegypten.

**Cyrtopodium** RB., Bogenfuß, XX. I., Orchideae.

*Andersonii* RB., Anderson's, 4. w. Westindien.

*flavum* Lk. et Otto, gelber, 4. w. Südamerika.

*glutinosum* Mey., klebriger, 4. w. Südamerika.

*punctatum* Lindl., punktirter, 4. w. Brasilien.

*Willmorei* K. et W., Willmore's, 4. w. Venezuela.

*Woodfordii* Sims, Woodford's, 4. w. Südamerika.

**Cyrtostylis** RB., Bogengriffel, XX. I., Orchideae.

*reniformis* RB., nierenförmiger, 4. Kn. t. w. Neuholl.

**Cysticapnos** Boerh. G., Blasenrauch, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumariaeae.

*africana* G., afrikanischer, ☉. Sch. f. Cap der gut. H.

*alexandrina* G. Don., alexandrinischer, ☉. Sch. f. Aegypten.

**Cystanthe** RB., Blasenblümchen, V. I., Epacrideae.

*sprengelioides* RB., sprengeliaähnliches, ⚥. t. Van-Diemens-Land.

**Cytisus** T., Geißklee, Bolnenbaum, XVII. IV. (VI.),

Leguminosae-Papilionaceae.

aeolicus Guss., liparischer,  $\S$ . f. b. Liparische Inseln.albidus DC., weißlicher,  $\S$ . f. Südeuropa.albus Lk., weißer,  $\S$ . k. Portugal, Nordafrika.

b) incarnatus. c) luteus.

alpinus Mill., Alpen-G.,  $\S$ . f. Schweiz, Kärnten, Tyrol, Krain, Italien, Ungarn.arbores DC., baumartiger,  $\S$ . t. k. Numidien.argenteus L., silberfarbiger,  $\S$ . k. f. b. Krain, Südfrankreich, Spanien.austriacus L., österreichischer,  $\S$ . f. Osteuropa, Ital., Caucas.

b) pendulus. c) odoratus.

biflorus L'Her. (*supinus* Jacq.), zweiblumiger,  $\S$ . f. Süd- und Ostdeutschland, Ungarn. $\beta$ ) minor (*cinereus* Host.).  $\gamma$ ) glaber L.calycinus MB. (*pauciflorus* W.), großkelchiger,  $\S$ . f. Taurien, Caucasus, Kleinasien, Persien.canescens W., graulicher,  $\S$ . k. Teneriffa.capitatus Jacq., kopfförmiger,  $\S$ . f. Süd- u. Osteuropa.elegans Ait., zierlicher,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.elongatus W. K., verlängerter,  $\S$ . f. Ungarn.glabratus Lk., glatter,  $\S$ . k. Portugal.glomeratus Boj., knaulförmiger,  $\S$ . w. Zanzibar.grandiflorus Spgl., großblumiger,  $\S$ . k. Portugal.hirsutus L. (*polytrichus* MB., *falcatus* W. K., ? *Tournefortianus* Lois., *virgatus* Vest.), rauhhaariger,  $\S$ . f. Ost- und Südeuropa, Spanien.Laburnum L., gemeiner,  $\S$ . f. Südeuropa.b) quercifolium Hortul. (*incisum* Hort.). c) pendulum Hort. d) fol. variegat. e) purpurascens Hortul. (*Adami* Poir., *coccineum* Baum.).laniger DC., wolliger,  $\S$ . k. Portugal, Spanien. $\beta$ ) rigidus DC.leucanthus W. K., weißblumiger,  $\S$ . f. Ungarn, Galicien, Podolien.mollis W., weicher,  $\S$ . k. ?multiflorus G. Don, Lindl. (*elongatus* Hort.), vielblumiger,  $\S$ .  $\S$ . f. Osteuropa.nanus W., zwergiger,  $\S$ . f. Kleinasien.nigricans L., schwärzlicher,  $\S$ . f. Mitteldeutschland, Südeuropa.nubigenus Lk. (*fragrans* Lam.), wohlriechender,  $\S$ . k. Teneriffa.orientalis Lois., morgenländischer,  $\S$ . f. Kleinasien.patens L., absteher,  $\S$ . k. Spanien, Portugal.ponticus W., pontischer,  $\S$ . f. Kleinasien.procerus Lk., hoher,  $\S$ . k. Portugal.proliferus L. suppl., sprossender,  $\S$ . t. k. Teneriffa.prostratus Scop. (*bisflorens* Host.), gestreckter,  $\S$ . f. Krain, Tyrol, Ungarn. $\beta$ ) ciliatus Wahlenb.purpureus Scop., purpurfarbiger,  $\S$ . f. Krain, Croatien, Tyrol, Oberitalien.

b) albiflorus.

pygmaeus W., kleiner,  $\S$ . f. b. Türkei.ruthenicus Fisch., russischer,  $\S$ . f. Südrussland.sessilifolius L., stielloser,  $\S$ . f. Südeuropa.spinescens Sieb. (*argyreus* Rchb., *ramosissimus* Ten.), feindorniger,  $\S$ . f. b. Istrien, Dalmatien.



**Cytisus**

*spinosus* Lam., dorniger, ♀. k. f. b. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*supinus* L., niedriger, ♀. f. Oesterreich.

*triflorus* L'Her., dreiblumiger, ♀. f. Spanien, Italien, Nordafrika.

*uralensis* Ledeb., uralischer, ♀. f. Ural.

*Weldenii* Visian., Welden's, ♀. f. Dalmatien.

Hybrid: *bracteolatus* Hort., *tetragonocladus* Hort., *racemosus* Marnock.

*Cajan* L. v. *Cajanus flavus*. *complicatus* Brot. v. *Adenocarpus intermedius*. *divaricatus* L'Her. (*parvifolius* Lam.) v. *Adenocarpus parvifol.* *foliolosus* L'Her., *hispanic.* Lam. v. *Adenocarp. foliolos.* etc. *pinnatus* Pall. (*wolgaricus* L. suppl.) v. *Calophaca wolgarica*. *Pseudocajan* Jacq. v. *Cajanus bicolor*, *psoralioides* L. v. *Indigofera psoraleoid.* *rhombifol.* Fras. Pursh v. *Termopsis rhombifol.* (fabacea). *sagittatus* Koch (et *radiatus* Koch) v. *Genista sagittat.* etc. *scoparius* Lk. v. *Sarothamnus scoparius.* *telonensis* Lois. v. *Adenocarpus telonens.* *tomentosus* Andr. v. *Goodia polysperma.* *violaceus* Aubl. v. *Rhynchosia violacea.*

**Czackia** Andr. (A. Czack, russischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*Liliastrum* Andr., lilienähnliche, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Oberitalien.

**Daboecia** D. Don, Daboecie, VIII. 1., Ericaceae.

*polifolia* D. Don, poleiblätterige, ♀. f. b. k. Irland.

b) flore albo Swt.

**Dacrydium** Banks Soland., Gummitanne, XXI. X. Coniferae-Taxineae.

*cupressinum* Soland., cypressenähnliche, ♀. t. Neuseeland.

*elatum* Wall., hohe, ♀. t. w. Ostindien.

*Dactylanthus Anacantha* Haw., *globosa* Haw., *tuberculata* Haw. etc. v. *Euphorbia Anacantha* etc.

**Dactylicapnos** Wall., Fingerfrucht, XVII. 11., Papaveraceae-Fumarieae.

*thalictrifolia* Wall., wiesenrautenblättrige, 4. Sch. t. Nepal.

**Dactylis** L., Knaulgras, III. 11., Gramineae.

*abbreviata* Bernh., abgekürztes, 4. f. ?

*capitellata* Lk., kleinköpfiges, 4. f. Südfrankreich.

*cynosuroides* Roth, kammgrasähnliches, ♂. w. Ostindien.

*glaucescens* W., blaugrünes, 4. f. Südeuropa.

*glomerata* L., gemeines, 4. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

*hispanica* Roth (*cylindrica* Brot.), (*villosa* Tenor.), spanisches, 4. f. Süd- und Westeuropa.

β) *altaica* Bess. γ) *nemoralis*.

*litoralis* W. (*maritima* Schrad., *distichophylla* Brignol.), Seestrands-K., 4. f. Südeuropa.

*pungens* Dsf., stechendes, 4. f. k. Griechenland, Nordafrika.

*repens* Dsf., kriechendes, 4. f. Caucasus, Griechenland, Südfrankreich, Nordafrika.

*adscendens* Schrad. (et *ciliaris* Thbg. et *hispida*

**Dactylis**

Thbg.) v. *Lasiochloa adscendens* etc. *cristata* MB.  
(et *lobata* MB.) v. *Koeleria cristata*, *glauca* etc.  
*paspaloides* W. v. *Dineba aegyptiaca*.

**Dactyloctenium** W., Muschelgras, III. II., Gramineae.  
*aegyptiacum* W., aegyptisches, ☉. f. Aegypten, Sicilien,  
Ost- und Westindien.

*aristatum* Lk., gegranntes, ☉. f. Aegypten.

*mucronatum* W., stachelspitziges, ☉. f. Nordamerika,  
Antillen.

*prostratum* W., gestrecktes, ☉. w. Malabar.

**Dactylon officinale** Vill. v. *Cynodon Dactylon*. *Dahlia Cer-*  
*vantesii* Lag., *coccinea* Cav., *rosea* Cav. v. *Georgina*  
*Cervantesii*, *coccinea* etc.**Dais** L., Dais, X. I., Thymeleaceae.

*cotinifolia* L. (*laurifolia* Jacq.), lorbeerblättrige, ♀. t.  
Cap der guten Hoffnung.

**Dalbergia** L. fil. (N. Dalberg, schwedischer Botaniker),  
XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*alata* Roxb., geflügelte, ♀. w. Ostindien.

*Barclayi* Hook., Barclay's, ♀. Sch. w. Mascarenas.

*Crowei* Roxb., Crowe's, ♀. w. Ostindien.

*emarginata* Roxb., ausgerandete, ♀. w. Ostindien.

*frondosa* Roxb., belaubte, ♀. w. Ostindien.

*latifolia* Roxb., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

*marginata* Roxb., berandete, ♀. Sch. w. Ostindien.

*ougeiensis* Roxb., ougeinische, ♀. w. Ostindien.

*paniculata* Roxb., rispige, ♀. w. Ostindien.

*rimosa* Roxb., rissige, ♀. Sch. w. Ostindien.

*robusta* Roxb., rüstige, ♀. w. Ostindien.

*rubiginosa* Roxb., verrostete, ♀. w. Ostindien.

*scandens* Roxb., kletternde, ♀. Sch. w. Ostindien.

*Sissoo* Roxb., Sissoo-D., ♀. w. Ostindien.

*stipulacea* Roxb., zwischenblättrige, ♀. w. Ostindien.

*tamarindifolia* Roxb., tamarindenblättrige, ♀. Sch. w.  
Ostindien.

*Telfairii* Hook., Telfair's, ♀. Sch. w. Mascarenas.

*timoriensis* DC., timorische, ♀. w. Ostindien.

*volubilis* Roxb., windende, ♀. Sch. w. Ostindien.

*Diphaca* P. v. *Diphaca cochinchinensis*. *domingen-*  
*sis* P. v. *Lonchocarpus domingensis*.

**Dalea** L. (Thomas Dale, englischer Botaniker), XVII. IV.  
(VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*alopecuroides* W., fuchsschwanzähnliche, ☉. m. f. Nord-  
amerika.

*aurea* Nutt., goldfarbige, 4. f. Nordamerika.

*bicolor* W., zweifarbige, ♀. w. Südamerika.

*citriodora* W., citronduftende, ☉. w. Südamerika.

*Cliffortiana* W., Cliffort's, ☉. m. f. Vera-Cruz.

*enneaphylla* W., neunblättrige, ♀. w. Westindien,  
Neugranada.

*Lagopus* W., zottigährlige, ☉. f. m. Mexico.

*laxiflora* Pursh, lockerblumige, 4. f. b. Louisiana.

*mutabilis* W., veränderliche, 4. t. w. Neuspanien.

*nutans* W., nickende, 4. w. t. Mexico.

*phymatodes* W., drüsige, ♀. w. t. Caracas.

*reclinata* W., zurückgebeugte, 4. w. Mexico.

*sericea* Lagasc., seidenhaarige, 4. w. Mexico.

*Thouini* Schrk., Thouin's, ☉. m. f. ?



**Dalea**

tuberculata Lag., höckerige, ♀. w. Mexico.

*Kuhnistera* W. v. *Petalostemon corymbosum*.

**Dalechampia** L. (J. Dalechamp, alter französischer Botaniker), XXI. x. (XVI. viii.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

brasiliensis Lam., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

ficifolia Lam., feigenblättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.

scandens L., kletternde, ♀. Sch. w. Westindien, Südamer.

**Dalibarda** L. (Denis Dalibard, französischer Botaniker), XII. iii., Rosaceae.

repens L. (*violaeoides* Mchx.), kriechende, 4. f. Nordamerika.

*fragarioides* Mchx. v. *Comaropsis fragar. fragarioides* Bot. mag. v. *Comaropsis Doniana*.

**Dalrymplea** Roxb. (Alex. Dalrymple, englischer Gelehrter), V. i. (XXIII. ii.), Celastrineae.

pomifera Roxb., orangenfrüchtige, ♀. w. t. Ostindien, Nepal.

**Damasonium** Schreb., Wasserschalt, VI. iv., Hydrocharideae.

indicum W., indischer, 4. Wa. w. Ostindien, Aegypten.

ovalifolium RB., eiblättriger, 4. Wa. w. t. Neuholland.

*stellatum* P. v. *Actinocarpus Damasonium*.

**Dammara** Rumpf., Dammaratanne (Amboinischer Name), XXI. x., Coniferae.

australis Lamb., südliche, ♀. t. w. Neuzeeland.

orientalis Lamb. (*alba* Rumpf.), morgenländische, ♀. w. Molucken.

**Dampiera** RB. (Cap. Dampier, berühmter Seefahrer), V. i., Campanulaceae-Goodenovieae.

ovalifolia RB., eiblättrige, 4. ♀. t. Neusüdwallis.

stricta RB., steife, 4. ♀. t. Neuholland.

**Danaea** Sw. (P. M. Dana, piemontesischer Botaniker), XXIV. i., Osmundaceae.

alata Sm., geflügelte, 4. w. Westindien.

**Danthonia** DC. (M. Danthoine, französischer Botaniker), III. ii., Gramineae.

calycina R. et S., gekelchte, 4. t. Cap der gut. Hoffn.

lanata Schrad., wollige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

Linkii Kunth, Link's, 4. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, 4. t. Neuholland.

micrantha Trin., kleinblüthige, ☉. ♂. f. t. Cap d. g. H.

pilosa RB., haarige, 4. t. Neuholland.

provincialis DC. (*alpina* Vest., *calycina* Rehb.), südeuropäische, 4. f. Südeuropa, Taurien.

semianularis RB., halbringförmige, 4. t. Neuholland.

sericea Nutt., seidenhaarige, 4. f. Nordamerika.

spicata R. et S., ährige, 4. f. Nordamerika.

*calycina* Hort. v. *Schismus marginatus. decumbens* DC. v. *Triodia decumbens. discolor* R. et S. v. *Aira media. glandulosa* Schrad. (et *curvifolia* Schr., *macrantha* Schrad., *papillosa* Schrad.) v. *Pentameris glandulosa* etc.

**Daphne** L., Seidelbast, VIII. i., Thymeleaceae.

alpina L., Alpen-S., ♀. f. Mitteleuropäische Alpen.

altaica Pall., altaisches, ♀. f. Sibirien.

Blagayana Rehb., Blagay's, ♀. f. b. k. Krain.



**Daphne**

*chinensis* Lam., chinesischer, ♀. t. China.

*Cneorum* L., rosmarinblättriger, ♀. k. f. b. Mittel- und Südeuropa.

b) fol. variegat. c) fl. albo.

*collina* Sm., Hügel-S., ♀. k. f. b. Italien.

*Gnidium* L., rispenblumiger, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

*hybrida* Swt. (*Dauphinii* Hortul.), Bastard-S., ♀. k. ?

*jasminea* Sm., jasminähnlicher, ♀. k. Griechenland.

*indica* L., indischer, ♀. t. China.

*Laureola* L., lorbeerblättriger, ♀. f. Ost- und Mitteleuropa.

*Mezereum* L., gemeiner (Kellerhals), Europa, Nordasien.

b) flore albo. c) autumnalis.

*neapolitana* Lod. (? *australis* Cyril., *collina* β) *neapolitana* Bot. Reg.), neapolitanischer, ♀. k. Süditalien. •

*odora* Thbg., wohlriechender, ♀. t. k. Japan.

b) variegata. c) rubra.

*oleoides* Schreb., ölbaumähnlicher, ♀. k. Creta, Caucasus, Sardinien.

*papyracea* Wall. (*cannabina* Wall.), nepal'scher, ♀. t. Nepal.

*pontica* L., pontischer, ♀. k. Kleinasien.

b) rubra. c) fol. variegat.

*salicifolia* Lam. (*caucasica* Pall.), weidenblättriger, ♀. k. Caucasus.

*sericea* Vahl (*oleaeifolia* Lam.), seidenhaariger, ♀. k. Creta, Kleinasien, Neapel.

*striata* Tratt., gestreifter, ♀. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*viridiflora* Ait., grünblumiger, ♀. t. Nepal.

*calycina* Berg. v. *Passerina dioeca*. *calycina* Lap.

v. *Passerina calycina*. *coridifolia* Lam. (*pubescens*

L.) v. *Passerin*. *corifol*. *Lagetta* Sw. v. *Lagetta*

*linteraria*. *Tartonraira* L. et *Thymelaea* L. (*villosa*

L.) v. *Passerina Tarton-raira* etc.

*Darea appendiculata* W. et *Odontites* W. etc. v. *Caenopteris*.

**Darlingtonia** DC. (W. Darlington, nordamerikanischer Botaniker), V. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

*brachyloba* DC., kurzlappige, 4. k. Nordamerika.

*glandulosa* DC., drüsige, 4. k. Nordamerika.

**Darwinia** Rudg. (Darwin, englischer Gelehrter und Dichter), X. 1., Thymeleaceae.

*fascicularis* Rudg., büschelförmige, ♀. t. Neuholland.

*taxifolia* Cun., taxusblättrige, ♀. t. Neuholland.

*Dasyanthus* Salisb. v. *Erica*.

**Datisca** L., Strichkraut, XXII. x., Datisceae.

*cannabina* L., hanfartiges, 4. f. Creta, Kleinasien.

*hirta* L., rauhes, 4. f. Pennsylvanien.

**Datura** L., Stechapfel, V. 1., Solanaceae.

*ceratocaula* Jacq. Orteg. (*macrocaulis* Roth), gehörnter,

⊙. m. f. Cuba, Mexico.

*fastuosa* L., schöner, ⊙. m. f. Südamerika, Aegypten.

b) flore pleno. c) fl. albo pleno.

*ferox* L., wilder, ⊙. f. China.

*guayaquilensis* Bonpl., guayaquil'scher, ⊙. m. f. Quito.

*laevis* L., glatter, ⊙. f. Afrika.

*Metel* L., weißer, ⊙. f. Südasien, Afrika.

*muricata* Lk., weichstacheliger, ⊙. f. ?

*quercifolia* H. B. K., eichenblättriger, ⊙. m. f. Mexico.

**Datura**

*Stramonium* L., gemeiner, ☉. f. Europa, Asien, Amerika.  
*Tatula* L., blafsblauer, ☉. f. Südeuropa, Nordamerika.  
*arborea* Hort. v. *Brugmansia suaveolens. arborea*  
 L. v. *Brugmansia candida. bicolor* P. v. *Brugman-*  
*sia sanguinea.*

**Daubentonia** DC. (Daubenton, berühmter französischer Zoolog), XVII. II. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*longifolia* DC., langblättrige, ☿. w. Neuspanien.  
*punicea* DC., dunkelrothe, ☿. w. Neuspanien.

**Daubenia** Lindl. (D. C. Daubeny, Professor der Botanik zu Oxford), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*aurea* Lindl., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

**Daucus** T., Möhre, V. II., Umbelliferae.

\* *aureus* Dsf., goldfarbige, ☉. f. Sicilien, Nordafrika, Kleinasien.

*Carota* L., gemeine, ♂. f. Europa, Mittelasien, Amerika.  
 b) *hortensis.* c) *aurantia.* d) *praecox.*

*crinitus* Dsf. (*meifolius* Brot.), bemähnte, ♂. f. Portugal, Nordafrika.

*Gingidium* L. (*lucidus* L.), glänzende, ♂. f. Südeuropa.  
*gummifer* Lam., harzige, ♂. f. Italien.

*hispidus* Dsf., hackerige, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

*litoralis* Sm., Strand-M., ☉. f. Griechenland, Aegypten.

*maritimus* Lam. (*bicolor* Sm.), Seestrands-M., ♂. f. England, Südeuropa.

*mauritanicus* L., mauritanische, ♂. f. Nordafrika.

*maximus* Dsf., größte, ♂. f. Nordafrika.

*montevidensis* Lk., südamerikanische ♂. f. Monte-Video.

*parviflorus* Dsf., kleinblumige, ♂. f. Sicilien, Nordafrika.

*polygamus* Gouan, vielehige, ♂. f. Süd- u. Westeuropa.

*siculus* Tin., sicilianische, ☉. f. Sicilien.

*copticus* P. v. *Trachyspermum coptic. muricatus*

L. v. *Platyspermum muricatum. Visnaga* L. v.

*Ammi Visnaga.*

**Davallia** Sm. (E. Davall, schweizer Botaniker), XXIV. I., Pterioideae.

*canariensis* Sw., canarische, 4. k. t. Canarische Inseln.  
*dubia* RB., zweifelhafte, 4. t. w. Neuholland.

*elegans* Sw. (*bidentata* Schk.), zierliche, 4. w. Ostindien, Neuholland.

*flaccida* RB., schlaffe, 4. t. w. Neuholland.

*gibberosa* Sw., höckerige, 4. t. w. Inseln des stillen Meeres.

*pyxidata* Cav., büchsenförmige, 4. t. w. Neuholland, Philippinen.

**Daviesia** Sm. (H. Davies, englischer Botaniker), X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

*acicularis* Sm., nadelblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

*alata* Sm., geflügelte, ☿. t. Neusüdwallis.

*cordata* Sm., herzblättrige, ☿. t. Neuholland.

*corymbosa* Sm., traubendoldige, ☿. t. Neusüdwallis.

*genistoides* Ait., ginsterähnliche, ☿. t. Neuholland.

*incrassata* Sm., verdickte, ☿. t. Neuholland.

*juncea* Sm., binsenförmige, ☿. t. Neuholland.

*juniperina* Lod., wachholderähnliche, ☿. t. Neuholland.

*latifolia* RB., breitblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

*leptophylla* Cun., schlankblättrige, ☿. t. Neuholland.

*linearis* Lod., gleichbreitblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

**Daviesia**

*mimosoides* RB. (*glauca* Lod.), acacienähnliche, ⚥. t. Neusüdwallis.

*physodes* Cun., aufgeblasene, ⚥. t. Neuholland.

*racemulosa* DC., traubige, ⚥. t. Neuholland.

*squarrosa* Sm., sparrige, ⚥. t. Neuholland.

*ulicina* Sm. (*ulicifolia* Andr.), stechginsterähnliche, ⚥. t. Neusüdwallis.

*umbellata* Sm., doldige, ⚥. t. Neuholland.

*virgata* Cun., ruthenförmige, ⚥. t. Neuholland.

*humifusa* Sbr. (*umbellata* Sbr.) v. *Podolobium* scan-

dens. *reticulata* Sm. v. *Jacksonia reticulata*.

*Deastella vacciniifolia* Kng. v. *Mimetes vacciniifolia*.

**Decaneuron** DC., Decaneuron, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*senegalense* DC., senegalischer, ⚥. w. Westafrika.

*Decaspermum fruticosum* Forst. v. *Nelitris Jambosella*.

**Deckera** C. A. Mey., Deckera, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*canescens* C. A. Mey., grauliche, 4. f. Caucasus.

**Decodon** Gmel., Zahnkelch, X. I., Lythraeae-Salicariae.

*verticillatus* Ell., wirtelförmiger, 4. f. Nord- u. Südamer.

**Decumaria** L., Decumarie, XI. I., Philadelphaeae.

*barbara* L., carolinische, ⚥. Sch. f. k. Carolina.

*prostrata* Lod., gestreckte, ⚥. Sch. f. k. Carolina.

*sarmentosa* Bosc, starkwurzelnende, ⚥. Sch. f. k. Carolina.

**Deeringia** RB. (C. Deering, englischer Botaniker), V. I., Aizoideae-Amarantheae.

*celosioides* RB., hahnenkammähnliche, ♂. t. w. Neuholland, Ostindien.

*indica* Spgl., indische, ♂. w. Ostindien.

**Delima** L., Delima, XIII. I., Dilleniaceae.

*nitida* DC., glänzende, ⚥. Sch. w. Trinidad.

*sarmentosa* L., starkwurzelnende, ⚥. Sch. w. Ceylon, Malabar.

**Delphinium** T., Rittersporn, XIII. III., Ranunculaceae.

*Aconiti* L. (*monogynum* Forsk.), sturmhutähnlicher, ☉. f. Levante.

*Ajaxis* L., Garten-R. ☉. f. Südeuropa, Taurien.

β) flore pleno.

*albiflorum* DC., weißblumiger, 4. f. Armenien.

*ambiguum* L., zweifelhafter, ☉. f. Nordamerika.

*amoenum* Stev., lieblicher, 4. f. Sibirien.

*azureum* Mchx., azurblauer, 4. f. Nordamerika.

*cardiopetalum* (*peregrinum* Lam.), herzblättriger, ☉. f. Pyrenäen.

*cheilanthum* Fisch., lippenblumiger, 4. f. Sibirien.

b) multiplex (*Barlowii* Hort.).

*ciliatum* Stev. (*flexuosum* MB.), gefranzter, 4. f. Caucasus.

*Consolida* L., Feld-R., ☉. f. Europa, Nordamerika.

b) flore pleno.

*dasycarpon* Stev., wollfrüchtiger, 4. f. Cauc., Nordpersien.

*decorum* Fisch. et May., zierlicher, 4. f. Neucaliforn.

*discolor* Fisch., verschiedenfarbiger, 4. f. Sibirien.

*elatum* L., hoher, 4. f. Mittel- und Osteuropa, Sibirien, Nordamerika.

β) alpinum Kit. et b) chrysopogon Hort. γ) al-

taicum Fisch. δ) americanum Mill. ε) cunea-

tum Stev. ζ) dictyocarpon DC. η) crassicaule

Schrad. θ) intermedium Ait. (*Clusianum* Host.).



**Delphinium**

b) altissimum. c) corymbosum. d) ranunculi-  
folium. e) strictum. i) lazulinum Rchb. z) la-  
xiflorum DC. λ) montanum DC. (elatum All.,  
hirsutum Roth). μ) palmatifidum DC. ν) revo-  
lutum Dsf. ξ) speciosum MB. o) urceolatum  
Jacq. et b) lilacinum W. π) villosum Stev. ρ)  
spurium Fisch. (? decumbens H. Dorp.). Andere  
Garten-Varietäten: coerulescens Lindl. densiflo-  
rum Hort. pallidum Lindl. sapphirinum Lindl.  
moschatum Hortul. vitifolium Hortul. etc.

elegans DC., zierlicher, 4. f. Nordamerika.

b) flore pleno.

exaltatum Ait., höchster, 4. f. Nordamerika.

fissum Kit. (velutinum Bertol.), gespaltener, 4. f. Un-  
garn, Illyrien, Italien.

grandiflorum L., großblumiger, ♂. 4. Sibirien.

β) chinense Fisch. (virgatum Jacq. fil.).

Gartenvarietäten: album, album fl. plen. pallidum,  
lilacinum, purpurascens, Hulmii.

halteratum Sm., stielkroniger, ☉. f. Sicilien.

hybridum W., Bastard-R., ♂. 4. f. Taurien, Caucasus.

junceum DC. (peregrinum L.), binsenförmiger, ☉. f.

Südeuropa, Nordafrika, Syrien.

Menziesii DC., Menzie's, 4. Kn. f. Nordamerika.

mesoleucum Sk., gelblichblauer, 4. f. ?

ochroleucum Stev., weißgelber, ♂. 4. Iberien.

officinale Wender., officineller, ♂. f. k. Süd- u. Osteuropa.

Oliverianum DC., Olivier's, ☉. f. Westpersien.

pentagynum Lam., fünfweibiger, ♂. 4. f. k. Port., Nordaf.

pictum W., bemalter, ♂. f. k. Südeuropa.

pseudoperegrinum Fisch., fremder, 4. Sibirien.

pubescens DC. (ambiguum Lois.), weichhaariger, ☉. f.

Südfrankreich.

puniceum L., dunkelrother, ♂. 4. f. Caucasus, Sibirien.

Requienii DC., Requien's, ♂. k. Majorka.

Staphisagria L., scharfer, ♂. f. k. Istrien, Dalmatien,  
Griechenland.

tenuissimum Sm. (? divaricatum Ledeb.), feiner, ☉. f.  
Griechenland.

tricolor Bernh., dreifarbiger, ♂. 4. f. Iberien.

tricorne Mchx., dreihörniger, 4. Kn. f. Nordamerika.

tridactylum Mchx., dreitheiliger, 4. f. Nordamerika.

triste Fisch., trauriger, ♂. 4. f. Dahurien.

vineum D. Don, schlanker, 4. f. Nordamerika.

**Dendrobium Sw., Baumstendel, XX. I., Orchideae.**

aemulum RB., lieblicher, 4. w. Neuholland.

aggregatum Roxb., angehäufter, 4. w. Ostindien.

amplum Lindl., herrlicher, 4. w. ?

Calceoaria Hook., pantoffelblumenähnlicher, 4. w. Ostind.

canaliculatum RB., nachenförmiger, 4. w. Neuholland.

candidum Wall., reinweißser, 4. w. Ostindien.

cassithoides R. Cun., schlinglorbeerähnlicher, 4. w. Neuholl.

chrysanthum Wall., goldfarbiger, 4. w. Nepal.

coerulescens Wall., bläulicher, 4. w. Ostindien.

crumenatum Sw., taschenförmiger, 4. w. Amboina.

cucullatum RB. (Pierardi Roxb.), kappenförmiger, 4.  
Ostindien.

cupreum Herb., kupferfarbiger, 4. w. Ostindien.

densiflorum Wall., dichtblumiger, 4. w. Nepal.

**Dendrobium**

- denudans Don, entblößter, 4. w. Ostindien.  
 fimbriatum Hook., gefranzter, 4. w. Ostindien.  
 floribundum D. Don, blüthenreicher, 4. w. Nepal.  
 formosum Lindl., schöner, 4. w. Ostindien.  
 Gibsonii Paxt., Gibson's, 4. w. Ostindien.  
 heterocarpum Lindl., verschiedenfrüchtiger, 4. w. ?  
 linguaeforme Sw., zungenförmiger, 4. w. Neuholland.  
 longicorne Lindl., langhorniger, 4. w. Nepal.  
 macrostachyum Lindl., großsähriger, 4. w. Ceylon.  
 moniliforme Sw., armbandförmiger, 4. w. Japan, China.  
 moschatum D. Don Wall., moschusduftender, 4. w. Nepal.  
 Myosurus Sw., geschwänzter, 4. w. Societätsinseln.  
 nobile Lindl., edler, 4. w. China.  
 pulchellum B. C., hübscher, 4. w. Ostindien.  
 pygmaeum Cun., zwergiger, 4. w. Neuholland.  
 rigidum RB., starrer, 4. w. Neuholland.  
 secundum Lindl., einseitiger, 4. w. Sumatra.  
 speciosum Sw., prächtiger, 4. w. Neuholland.  
 stuposum Lindl., wunderbarer, 4. w. Ostindien.  
 sulcatum Lindl., gefurchter, 4. w. Ostindien.  
 teretifolium RB., rundblättriger, 4. w. Neuholland.  
 undulatum RB., wellenblumiger, 4. w. Neuholland.

*album* Hook. v. *Camaridium ochroleucum*. *anceps* Sw. v. *Aporum anceps*. *longifolium* H. B. K. (et *squalens* Bot. reg.) v. *Xylobium longifol.* et *squalens*. *polystachyum* Sw. v. *Polystachya luteola*. *pubescens* Hook. v. *Eria pubescens*. *punctatum* Sm. v. *Dipodium punctatum*. *retusum* La Llave etc. vid. *Specklinia retusa* etc. *sanguineum* Swt. v. *Broughtonia sanguinea*.

**Dendromecon** Benth., Strauchmohn, XIII. 1., Papaveraceae.

- rigida* Benth. (*rigidum*), starrer, f. k. t. Californien.

**Dentaria** T., Zahnwurz, XV. III., Cruciferae.

- bulbifera* L. zwiebeltragende, 4. Kn. f. Europa, Mit-telasien.

- dasyloba* Turcz., wolllappige, 4. Kn. f. Südrussland.  
*digitata* Lam. (*pentaphyllos* Scop.), fingerförmige, 4. Kn. f. Krain, Tyrol, Salzburg etc.

- diphylla* Mchx., zweiblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*enneaphylla* L., neunblättrige, 4. Kn. f. Mitteleuropa.  
*glandulosa* Kit., drüsige, 4. Kn. f. Schlesien, Ungarn, Siebenbürgen.

- laciniata* Mühlbg. (*concatenata* Mchx.), schlitzbüttrige, 4. Kn. f. Nordamerika.

- maxima* Nutt., größte, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*pinnata* Lam. (*heptaphyllos* C. Bauh. Vill.), gefiederte, 4. Kn. f. Süddeutschland, Schweiz, Oberital., Frankr.  
*polyphylla* W. K. (*ochroleuca* Gaud.), vielblättrige, 4. Kn. f. Ungarn, Croatien, Schweiz, Oberitalien.  
*quinquefolia* MB., fünfblättrige, 4. Kn. f. Taurien, Caucasus, Ukraine.

- tenella* Pursh, zarte, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*trifolia* WK., dreiblättrige, 4. Kn. f. Croatien.

**Dentella** Forst., Zahnling, V. 1., Rubiaceae.

- repens* Forst., kriechender, 4. f. t. Ostind., Neucaledonien.

**Deschampsia caespitosa** P. B. etc. v. *Aira caespitosa*.

**Desmanthus** W., Schopflume (Büschelschopf), X. 1.

(XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

- callistachys DC., schönährige, ♀. w. t. Teneriffa.  
 cinereus W., aschgraue, ♀. w. Ostindien.  
 diffusus W., ausgebreitete, ♀. w. Südamerika.  
 divergens W., divergirende, ♀. w. ? Abyssinien.  
 lacustris W., Teich-S., 4. Wa. w. Südamerika.  
 leptostachys DC., schlankährige, ♀. w. Guinea.  
 natans W., schwimmende, ♂. Wa. w. Ostind., Cochinchina.  
 plenus W., volle, ♂. Wa. w. Neuspanien.  
 punctatus W., punctirte, ♀. w. Jamaica.  
 strictus Berter, steife, ♀. w. Westindien.  
 triquetrus W., dreiseitige, 4. Wa. w. Ostindien.  
 virgatus W., ruthenförmige, ♀. w. Ostindien.

**Desmia** Salisb. v. Erica.**Desmochaeta** DC., Bandhaar, V. 1., Aizoideae-Amarantheae.

- atropurpurea DC., dunkelpurpurrothes, 4. ♀. w. Ostind.  
 flavescens DC., gelbliches, ♂. ♂. w. m. f. Ostindien.

β) patula R. et S.

- globosa R. et S., kugeliges, ♂. m. f. Ostindien.  
 micrantha DC., kleinblumiges, ♂. m. f. Ostind., Mascarenas.  
 prostrata DC., gestrecktes, ♀. w. Ostindien, Westafrika.  
 tomentosa Spgl., filziges, ♀. w. Ostindien.  
 uncinata R. et S., hackiges, ♂. m. f. Ostindien.

alternifolia DC. v. Cladostachys alternifol.

**Desmodium** Desv. DC., Desmodium, XVII. 1v. (vi.),

Leguminosae-Papilionaceae.

- acuminatum DC., zugespitztes, 4. f. Nordamerika.  
 adscendens DC., aufsteigendes, ♀. w. Jamaica.  
 alatum DC., geflügeltes, ♂. w. Ostindien.  
 angustifolium DC., schmalblättriges, ♀. w. Mexico.  
 Aparines DC., klebkrautähnliches, 4. ♀. w. Mexico.  
 asperum Desv., rauhes, 4. ♀. w. ?  
 auriculatum DC., geöhrt, ♂. w. Timor.  
 bracteatum DC., deckblättriges, 4. f. Nordamerika.  
 brasiliense Poir., brasilianisches, ♀. w. Brasilien.  
 cajanifolium DC., cajanblättriges, ♀. w. Caracas.  
 canadense DC., canadisches, 4. f. Nordamerika.  
 canescens DC., grauliches, 4. f. Nordamerika.  
 capitatum DC., kopfförmiges, 4. ♀. w. Ceylon.  
 cephalotes Roxb., grofsköpfiges, ♀. w. Ostindien.  
 ciliare DC., gefranztes, 4. f. Nordamerika.  
 cinereum DC., aschgraues, 4. ♀. w. Mexico.  
 collinum Roxb., Hügel-D., 4. ♀. w. Ostindien.  
 cuspidatum DC., langspitziges, 4. f. Nordamerika.  
 diffusum DC., ausgebreitetes, 4. ♀. w. Ostindien.  
 diversifolium DC., verschiedenblättriges, 4. ♀. w. Ostind.  
 dubium Lindl., zweifelhaftes, 4. ♀. w. Nepal.  
 gangeticum DC., Ganges-D., ♂. w. Ostindien.  
 glabellum DC., glattes, 4. f. Nordamerika.  
 guianense DC., guianisches, ♀. w. Guiana.  
 gyrans DC., bewegliches, ♂. w. Ostindien.  
 gyroides DC., ähnliches, ♂. w. Ostindien.  
 hamosum Roxb., kurzhackiges, ♀. w. Ostindien.  
 heterophyllum DC., manchfaltigblättriges, 4. w. Ostind.  
 incanum DC., weifsgraues, ♀. w. Jamaica.  
 lacteum Boj., milchweisses, ♀. w. Mauritius.  
 lasiocarpum DC., wollfruchtiges, ♀. w. Guinea.  
 latifolium DC., breitblättriges, ♀. w. China, Ostindien.



**Desmodium**

- Lechenaultii* DC., Lechenault's,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*Lindleyi* Hort., Lindley's,  $\text{f. w. ?}$   
*maculatum* DC., geflecktes,  $\odot. w.$  Ostindien.  
*malacophyllum* DC., weichblättriges,  $4. w.$  Manila.  
*marilandicum* DC., marylandisches,  $4. f.$  Nordamerika.  
*multiflorum* DC., vielblumiges,  $\text{f. w.}$  Nepal.  
*nudiflorum* DC., nacktblumiges,  $4. f.$  Nordamerika.  
*nutans* Wall., überhängendes,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*obtusum* DC., stumpfes,  $4. f.$  Nordamerika.  
*paniculatum* DC., rispiges,  $4. f.$  Nordamerika.  
*pauciflorum* DC., wenigblumiges,  $4. f.$  Nordamerika.  
*pseudotriquetrum* DC., unächtdreikantiges,  $\text{f. w.}$  Nepal.  
*reniforme* DC., nierenförmiges,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*retusum* D. Don, abgestutztes,  $\text{f. w.}$  Nepal.  
*rotundifolium* DC., rundblättriges,  $4. f.$  Nordamerika.  
*sagittatum* DC., pfeilblättriges,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*serotinum* DC., spätes,  $4. f. k. ?$   
*spectabile* Boj., ansehnliches,  $\text{f. w.}$  Mauritius.  
*spirale* DC., spiralförmiges,  $4. \text{Sch. w.}$  Jamaica.  
*stipulaceum* DC., zwischenblättriges,  $4. w.$  Mexico.  
*supinum* DC., niedriges,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
*tenellum* DC., zartes,  $\odot. w.$  Caracas.  
*tomentosum* DC., filziges,  $4. t.$  China.  
*tortuosum* DC., gedrehtes,  $\text{f. w.}$  Jamaica.  
*triflorum* DC., dreiblumiges,  $4. w.$  Ostindien.  
*trigonum* DC., dreiseitiges,  $\text{f. w.}$  Jamaica.  
*trinervium* Fisch., dreinerviges,  $\text{f. w. ?}$   
*triquetrum* DC., dreikantiges,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*umbellatum* DC., doldiges,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*viridiflorum* DC., grünblumiges,  $4. f.$  Nordamerika.  
*sambuense* DC. v. *Ototropis sambuenensis*.

**Desmoncus** Mart., Bandpalme, XXI. VI., Palmae.  
*americanus* Lod., amerikanische,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
*dubius* Lod., zweifelhafte,  $\text{f. w.}$  Trinidad.

*orthacanthus* Mart., geradstachelige,  $\text{f. w.}$  Brasilien.  
*polyacanthus* Mart., vielstachelige,  $\text{f. w.}$  Brasilien.

**Desvauxia** RB. (N. A. Desvaux, französischer Botaniker), I. IV., Restiaceae.

*Billardieri* Ait., Billardier's,  $\odot. \text{f. w. t.}$  Neuholland.

**Deutzia** Thbg. (J. Deutz, Rathsherr zu Amsterdam, Beförderer der Botanik), X. III., Philadelphaeae.

*scabra* Thbg. (*grandiflora* Hortul.), scharfe,  $\text{f. t.}$  Japan.

**Dianella** Lam., Dianelle, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*coerulea* Sims, blaue,  $4. \text{Kn. t.}$  Neuholland.

*congesta* RB., gedrängte,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Neuholland.

*divaricata* RB., sparrige,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Neusüdwallis.

*laevis* RB., glatte,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Neuholland.

*longifolia* RB., langblättrige,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Neuholland.

*nemorosa* Lam. (*ensifolia* Sims), schwertblättrige,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Ostindien.

*revoluta* RB. (*strumosa* Ker), zurückgerollte,  $4. \text{Kn. t. w.}$  Neuholland.

**Dianthus** L., Nelke, X. II., Caryophyllaceae.

*albens* Ait., weißliche,  $4. t. k.$  Cap der guten Hoffn.

*alpestris* Hoppe Stbg., Voralpen-N.,  $4. f.$  Süddeutsche Alpen.

*alpinus* L., Alpen-N.,  $4. f.$  Oesterreich, Steyermark, Sibirien.

**Dianthus**

- arboreus L., baumartige, ♂. k. Creta.  
 Arbuscula Lindl., strauchartige, ♂. k. China.  
 arenarius L., Sand-N., 4. f. Nordeuropa.  
 Armeria L., Büschel-N., ☉. f. Mitteleuropa.  
 armerioides Rafin. (? *carolinianus* Walt.), büschelähnliche,  
 ☉. f. Nordamerika.  
 Arrosti Presl, Arrost's, 4. f. Süditalien.  
 atrorubens All., schwarzrothe, 4. f. Oesterreichisches Li-  
 torale, Südtirol, Oberitalien.  
 barbatus L., bärtige, 4. f. Süddeutschland, Frankreich.  
 β) aggregatus Poir. γ) latifolius W. (*pumilus*  
 Hort.). b) flore pleno.  
 bicolor MB., zweifarbige, 4. f. Taurien.  
 biflorus Sm. (*geminatus* Kit., *furcatus* Hornem., *Horne-*  
*manni* Sering.), zweiblumige, 4. f. Ungarn, Ober-  
 italien, Griechenland.  
 buchtormensis Ledeb., buchtormische, 4. f. Sibirien.  
 caesius Sm., hechtblaue, 4. f. England, Mitteldeutschl.  
 campestris MB., Feld-H., 4. f. Podolien, Taurien.  
 capitatus DC. (*atrorubens* MB.), kopfförmige, 4. f. Tau-  
 rien, Caucasus.  
 Carthusianorum L., Karthäuser-N., 4. f. Europa,  
 Kleinasien,  
 β) vaginatus Vill. b) flore pleno.  
 Caryophyllus L., Garten-N., 4. ♂. f. k. Nordfrankreich,  
 England, Italien.  
 β) clavatus Spgl. b) flore pleno. c) fruticans.  
 d) imbricatus.  
 caucasicus MB., caucasische, 4. f. Caucasus.  
 cephalotes Sering., grofsköpfige, 4. f. ?  
 chinensis L., chinesische, ♂. 4. f. China.  
 b) hybridus.  
 crenatus Thbg., gekerbte, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
 Cyri Fisch. et Mey., Cyrus's, ☉. ♂. f. Natolien.  
 deltoides L., deltaförmige, 4. f. Europa, Taurien etc.  
 β) wolgensis Fisch. et Mey.  
 dentatus Fisch., gezähnte, 4. f. Sibirien.  
 diffusus Sm., weitschweifige, 4. f. Cyprus.  
 discolor Sims, verschiedenfarbige. 4. f. Caucasus.  
 diutinus Kit. (*polymorphus* MB.), langblühende, 4. f.  
 Ungarn.  
 divaricatus Urvill. (*tripunctatus* Sm.), sparrige, 4. f.  
 Griechenland.  
 ferrugineus L., rostfarbige, 4. f. Calabrien.  
 b) sulphureus. Hens.  
 fimbriatus MB. (*orientalis* Sims, *contortus* Sm.), gefranzte,  
 4. f. Iberien, Sibirien.  
 fragrans MB., wohlriechende, 4. f. Caucasus.  
 fruticosus L., strauchige, 4. ♂. k. Griechenland.  
 furcatus Balb., gabelige, 4. f. Piemont.  
 gallicus P. DC., französische, 4. f. Frankreich.  
 giganteus Urv., riesenhafte, 4. ♂. k. Griechenland.  
 glacialis Haenk., Gletscher-N., 4. f. Salzburg, Kärnthen,  
 Tyrol, Schweiz.  
 glaucus Huds. Sm., blaugrüne, 4. f. Deutschland, Eng-  
 land, Ungarn.  
 guttatus MB., getüpfelte, 4. f. Caucasus.  
 hirtus Vill., rauhe, 4. f. Südfrankreich.

**Dianthus**

- hortensis* Schrad., Garten-Feder-N., 4. f. Ungarn, Südfrankreich.
- japonicus* Thbg., japanische, 4. f. b. k. Japan.
- leptopetalus* W. (*pomeridianus* MB., *bicolor* Hornem., *cretaceus* Adam), schlankkronige, 4. f. Caucasus.
- Libanotis* La Bill., Libanon-N., 4. f. k. Libanon.
- Liboschitzianus* Sering. (*petraeus* MB., *bracteatus* W. herb.), Liboschitz's, 4. f. Armenien.
- liburnicus* Barth. Wendl., illyrische, 4. f. Illyrien, Oberitalien.
- ?β) *Balbisii* Sering. (*glaucophyllus* Hornem., *collinus* Balb.).
- longicaulis* Tenor., langstengelige, 4. f. Neapel.
- marginatus* Poir., berandete, 4. f. Südeuropa.
- monadelphus* Vent. (*procumbens* P.), einbrüderige, 4. f. k. Syrien.
- moussessulanus* L. (*erubescens* Trev., *acuminatus* Tausch.), südfranzösische, 4. f. Südeuropa.
- β) *plumosus* Spgl. (*Waldsteinii* Stbg.).
- montanus* MB. (*Fischeri* Spgl.), Berg-N., 4. f. Caucasus.
- neglectus* Lois. (*glacialis* DC., *tener* Balb., ? *nanus* Swt.), übersehene, 4. f. Französische und schweizer Alpen.
- nitidus* Kit., glänzende, 4. f. Ungarn.
- pallidiflorus* Sering. (*pallens* MB.), *ramosissimus* Poir.), blafsblumige, 4. f. Caucasus.
- petraeus* W. Kit., Klippen-N., 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.
- b) *grandiflorus*.
- pinifolius* Sm., kieferblättrige, 4. f. k. Griechenland.
- plumarius* L. (*moschatus* Hort., *dubius* Hornem.), Feder-N., 4. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.
- b) *flore pleno*.
- Poiretianus* Sering., Poiret's, 4. f. ?
- b) *flore pleno*.
- pomeridianus* L., nachmittägige, 4. f. Palästina.
- pratensis* MB. (*ochroleucus* Lk.), Wiesen-N., 4. f. Caucasus.
- prolifer* L. (*diminutus* L.), sprossende, 4. f. Europa, Mittelasien.
- prostratus* Jacq., gestreckte, 4. f. k. Cap der gut. Hoffn.
- Pseudarmeria* MB., unächte Büschel-N., 4. f. Taurien.
- pubescens* Sm., weichhaarige, 4. f. Griechenland.
- pulchellus* Schrad., schöne, 4. f. ?
- punctatus* Spgl., punktirte, 4. f. ?
- pungens* L. (*hispanicus* Asso), stechende, 4. f. Spanien.
- pyrenaicus* Bernh., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- rigidus* MB., starre, 4. f. Südrufsländ.
- Rupicola* Bivon. (*Bisignani* Ten.), Felsen-N., 4. f. k. Sicilien, Calabrien.
- ruthenicus* Roem., russische, 4. f. Rufsländ.
- saxatilis* P., Felsen-N., 4. f. Frankreich.
- Seguieri* Vill. (*collinus* Gaud.), Segulier's, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
- a) *asper* W. (*scaber* Schlchr., *Courtoisii* Rehb.).
- β) *sylvaticus* Hoppe. γ) *collinus* W. K. δ) *controversus* Gaud. (*Sternbergii* Schlchr.).
- serotinus* Kit., spätblühende, 4. f. Ungarn.
- serratus* Lapeyr., sägezähnige, 4. f. Pyrenäen.
- siculus* Presl., sicilianische, 4. f. Sicilien.
- spinosus* Dsf., stachelige, 4. f. k. Persien.



**Dianthus**

squarrosus MB. (*arenarius* Pall., *Mussini* Hornem.),  
sparrige, 4. f. Caucasus.

strictus Sm., steife, 4. f. Griechenland.

suavis W., starkkriechende, 4. f. ?

suffruticosus W., halbstrauchige, 4. k. Kleinasien.

superbus L., stolze, ♂. f. Europa, Caucasus.

sylvestris Wulf., Wald-N., 4. f. Illyrien, Krain, Kärn-  
then, Tyrol, Schweiz.

β) *caryophylloides* Rchb. (*virginicus* Jacq.). γ)

*Scheuchzeri* Rchb. δ) *frigidus* Hoppe.

umbellatus DC. (*patens* W., *ruthenicus* Hort.), doldige,  
4. f. Rußland.

velutinus Guss. (? *ciliatus* Hort.), sammthaarige, ☉. f.  
Italien.

versicolor Fisch., hunte, 4. f. Südrußland.

virginicus L., Jungfern-N., 4. f. Südfrankreich.

Willdenowii Lk. (*ibericus* W.), Willdenow's, 4. f.  
? Caucasus.

*hyssopifolius* Hort. et *tauricus* Hort. sind ungewifs.

**Diapensia** L., Diapensie, V. I., Ericaceae.

*lapponica* L., lappländische, 4. f. Lappland, Nordamer.

*cuneifolia* Pursh. v. *Pyxidanthra* barbulata.

**Diarrhena** americana P. B. v. *Corycarpus* arundinaceus.

**Diascia** Lk., Doppelnapf, XIV. II., Personatae-Antir-  
rhineae.

*Bergiana* Lk., Bergius's, ☉. m. f. Cap der gut. Hoffn.

*Thunbergiana* Spgl., Thunberg's, ☉. m. f. Cap d. g. H.

**Diasia** DC., Diasie, III. I., Irideae.

*graminifolia* DC., grasblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*intermedia* (Sw.), mittlere, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*iridifolia* DC., irisblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

**Diastrophis** Fisch. et Mey., Doppelbogen, XV. III.,  
Cruciferae.

*cristata* Fisch. et Mey., kammiger, 4. 4. f. b. Armenien.

**Dicera** Forst., Doppelhorn, XI. I., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

*dentata* Forst., gezähneltes, 4. t. Neuzeeland.

**Diceratium** prostratum Lagasc. v. *Notoceras* hispanic.

**Dicerma** DC., Doppelblättchen, XVII. IV. (VI.), Legu-  
minosae-Papilionaceae.

*biarticulatum* DC., zweigliederiges, 4. w. Ostindien.

*elegans* DC., zierliches, 4. w. China.

*pulchellum* DC., schönes, 4. w. Ostindien.

**Dichilus** DC., Doppellippe, XVII. IV. (VI.), Legumi-  
nosae-Papilionaceae.

*lebeckioides* DC., lebeckiaähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

**Dichoglottis** Fisch. et Mey., Doppelzüngelchen, X.  
III., Caryophyllaceae-Alsineae.

*linearifolia* Fisch. et Mey., gleichbreitblättriges, ☉. f.  
Gegend des caspischen Meeres.

**Dichondra** Forst., Doppelkorn, V. II., Convolvulaceae.

*argentea* W., silberfarbiges, 4. w. Südamerika.

*carolinensis* Mchx., carolinisches, 4. t. k. Carolina.

*repens* Forst., kriechendes, 4. t. w. Neuzeeland, Ja-  
maica, Quito, Mascarenas.

*sericea* Sw., seidenhaariges, 4. w. Westindien, Südamer.

**Dichorisandra** Mik., Doppelbeutel, VI. I., Commelineae.

*gracilis* Mart., schlanker, 4. w. Brasilien.

**Dichorisandra**

*picta* Lod., bunter, 4. w. Südamerika.

*puberula* Mart., feinhaariger, 4. w. Brasilien.

*oxypetala* Hook., schmalkroniger, 4. w. Brasilien.

*thyrsiflora* Mik., straußblumiger, 4. w. Brasilien.

*Dichosma bifida* DC. v. *Agathosma bifida*.

**Dichostylis** N. E., Zinkengriffel, III. 1., Cyperaceae.

Michelianus N. E., Micheli's, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

**Dichrocephala** DC., Doppelköpfchen, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*latifolia* DC., breitblättriges, ☉. w. m. f. Ostindien, Java.

*sonchifolia* DC., gänsedistelblättriges, ☉. f. Caucasus.

**Dicksonia** L'Her. (J. Dickson, englischer Botaniker), XXIV. 1., Pterioideae.

*adiantoides* Humb., frauenhaarähnliche, 4. w. Westindien, Südamerika.

*arborescens* L'Her., baumartige, 4. f. St. Helena.

*davallioides* RB., davalliaähnliche, 4. w. Neuhollland.

*dissecta* Sw. (*tenera* Presl), schlitzblättrige, 4. w. Westindien.

*pilosiuscula* W. (*pubescens* Schk.), weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

*rubiginosa* Kaulf., rostfarbige, 4. w. Brasilien, Westindien.

*scandens* Loud. suppl., klimmende, 4. Sch. w. ?

*antarctica* La Bill. v. *Cibotium* Billardieri. *Culcita* L'Her. v. *Balanium* Culcita.

**Dicliptera** Juss., Doppelklappe, II. 1., Acanthaceae.

*assurgens* Juss., aufsteigende, f. w. Westindien.

*bivalvis* Juss., ächte, f. w. Ostindien, Arabien.

*chinensis* Juss., chinesische, 4. w. Ostindien, China, Arabien.

*martinicensis* Juss., westindische, f. w. Westindien.

*pectinata* Juss., kamnige, f. w. Ostindien.

*peruviana* Juss., peruvianische, f. w. Peru.

*resupinata* Juss., umgekehrte, ☉. w. Südamerika.

*retusa* Juss., abgestutzte, 4. w. Westindien.

*scorpioides* Juss., rauhblättrige, f. w. Westindien.

*sexangularis* Juss., sechskantige, ☉. w. Jamaica.

*verticillaris* Vahl, wirtelförmige, f. t. Cap der gut. H. *spinosa* Lod. v. *Barleria lupulina*.

**Dicrypta** Lindl., Dicrypte, XX. 1., Orchideae.

*bicolor* Bate, zweifarbig, 4. w. Demerara.

*crassifolia* Lindl., dickblättrige, 4. w. Brasilien.

*iridifolia* Bate, schwertelblättrige, 4. w. Trinidad.

**Dictamnus** L., Diptam, X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*angustifolius* Swt., schmalblättriger, 4. f. Altai.

*Fraxinella* P. (*albus* L.), gemeiner, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

a) *ruber*. β) *albus*.

*obtusiflorus* Koch, stumpfblumiger, 4. f. Südtyrol, Oesterreichisches Litorale.

**Didelta** L'Her., Didelte, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*carnosum* Ait., fleischige, f. t. Cap der guten Hoffn.

*cernuum* Less., übergebogene, f. t. Cap d. gut. Hoffn.

*spinousum* L'Her. Ait., feinstachelige, f. t. Cap d. g. H.

**Didesmus** Desv., Kreuzbändchen, XV. 1., Cruciferae.

*aegyptiacus* Desv., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

**Didesmus**

hipinnatus DC., doppeltgefiedertes, ☉. f. Nordafrika.

*Didiscus coeruleus* DC. v. *Hügelia coerulea*. *Didymocarpus* Rexii Bow. v. *Henckelia* Rexii.

**Didymochlaena** Desv., Doppelschleierchen, XXIV. 1., Pterioideae.

sinuosa Desv., buchtiges 4. w. Westind., Brasilien, Java.

**Diectomis** H. B. K., Diectome, III. 11., Gramineae.

fastigiata H. B. K. (P. Beauv.), gipfelständige, 4. w. Westindien, Südamerika.

laxa N. E., lockere, ☉. w. Brasilien.

**Dielytra** Borkh., Doppelsporn, XVII. 11. (1v.), Papaveraceae-Famariaceae.

bracteosa DC., deckblättriger, 4. f. Nordamerika.

canadensis DC., canadischer, 4. f. Nordamerika.

Cucullaria DC., kappenförmiger, 4. f. Nordamerika.

eximia DC., ausgezeichnete, 4. f. Nordamerika.

formosa DC., schöner, 4. f. Nordamerika.

lachenaliaeflora DC., lachenalienblumiger, 4. f. Sibirien.

speciosa Nois., prächtiger, 4. f. ?

spectabilis DC., ansehnlicher, 4. f. Sibirien.

tenuifolia DC., feinblättriger, 4. f. Kamtschatka, Nordamerika.

**Diervilla** T. (Dierville, französischer Arzt und Reisender), V. 1., Caprifoliaceae.

canadensis W. (*Tournefortii* Mchx., *humilis* P., *lutea* Pursh., *trifida* Mchx., *arcadiensis* Duh.), canadische, 4. f. Nordamerika.

**Dietes** Salisb., Dietes, III. 1., Irideae.

bicolor Swt., zweifarbige, 4. t. Neuholland.

catenulata Swt., kettenförmige, 4. w. Madagascar.

iridioides Swt., irisähnliche, 4. t. k. Cap d. gut. Hoffn.

**Digitalis** T., Fingerhut, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

aurea Lindl. (*ferruginea* Sm.), goldfarbiger, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

eristachya Fisch., wollähriger, ♂. f. Südrussland.

ferruginea L., rostfarbiger, ♂. f. Oesterreichisches Littorale, Italien, Caucasus.

fulva Lindl., braungelber, 4. f. ?

fuscescens W. Kit., bräunlicher, 4. f. Ungarn, Croatien.

grandiflora Lam. (*ambigua* Murr.), großblumiger, 4. f. Mitteleuropa.

laevigata W. Kit., glatter, ♂. f. Krain, Croatien.

lanata Ehrh. (*Winterli* Roth), wolliger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Sicilien.

leucophaea Sm., weißlicher, 4. f. Griechenland.

lutea L., gelber, ♂. 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Italien, Frankreich.

lutescens Lindl., gelblicher, 4. f. ?

media Roth (*intermedia* P., *ambiguo-lutea* Mey.), ♂. f. Westdeutschland.

micrantha Roth (*australis* Ten.), kleinblumiger, 4. f. Süditalien, ? Schweiz.

minor L., kleiner, 4. f. Spanien.

obscura L., dunkler, ♂. k. Spanien.

ochroleuca Jacq. (*ambigua* Schk.), weißgelber. 4. f. Deutschland.

orientalis Lam., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.



**Digitalis**

parviflora Jacq., kleinblumiger, 4. f. ?

purpurascens Roth (*erubescens* Ait., *longiflora* Lej., *purpureo-lutea* Mey.), purpurfarbiger, ♂. Westdeutshl. *purpurea* L., gemeiner, ♂. f. Europa.

b) *alba*.

*rigida* Lindl., starrer, 4. f. ?

*Thapsi* L., wollkrautähnliche, ♂. 4. f. Spanien.

*tomentosa* Lk. (*Thapsi* Brot.), filziger, ♂. 4. f. Portugal.

*tubiflora* Lindl., röhrenblumiger, 4. f. ?

*viridiflora* Lindl., grünblumiger, ♂. 4. f. Griechenland.

*canariensis* L. et *Sceptrum* L. v. *Isoplexis cana-*

*riensis* et *Sceptr. glutinosa* G. v. *Rehmannia chi-*

*nensis*.

**Digitaria** Scop. Hall., Fingergras, III. II., Gramineae.

*aegyptiaca* W., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

*affinis* R. et S., ähnliches, ☉. f. w. Südamerika.

*barbata* W., bärtiges, ☉. f. w. Ostindien.

*bicornis* R. et S., zweihörniges, ☉. f. w. Ostindien.

*biformis* W., mascarenisches, ☉. f. w. Mascarenas.

*brevifolia* Lk., kurzblättriges, ☉. f. w. Mexico.

*ciliaris* W. (*commutata* Schult.), gefranztes, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Asien, Ost- und Westindien.

*denudata* Lk., kahles, ☉. f. ?

*domingensis* R. et S. (*repens* H. Par.), westindisches, ☉. f. w. Westindien.

*erigona* Schrad., wollkantiges, ☉. f. w. ?

*fascicularis* Schrad., büschelförmiges, ☉. f. ?

*filiformis* Mühlbg. (? *villosa* P.), fadenförmiges, ☉. f. Nordamerika.

*fimbriata* Lk., gefranztes, ☉. f. w. Brasilien.

*horizontalis* W. (*setigera* Roth), wagerechtes, ☉. f. w. Südamerika, Westindien, Madeira.

*humifusa* P. (*glabra* R. et S., *filiformis* Koel.), niedergestrecktes, ☉. f. Europa.

*inaequalis* Spgl. Lk., ungleiches, ☉. f. w. Manila.

*linearis* P., schmalähriges, ☉. f. w. Ost- u. Westindien.

*marginata* Lk., gerandetes, ☉. f. w. Brasilien.

*mollissima* Schrad., weiches, ☉. f. ?

*paspaloides* Mchx. (*foliosa* Lag.), paspalumähnliches, ☉. f. Nordamerika, Cuba.

*puberula* Lk., feinhaariges, ☉. f. w. ?

*Roxburghii* Spgl., Roxburgh's, ☉. f. w. Ostindien.

*sanguinalis* Scop., gemeines, ☉. f. Europa, Nordamer. etc.

β) *praecox* W.

*undulata* Schrk., welliges, ☉. f. w. Südamerika.

*violascens* Lk., violettes, ☉. f. w. Brasilien.

*stolonifera* Schrad. v. *Cynodon Dactylon*.

**Digraphis** *colorata* Trin. v. *Phalaris* (Baldingera) arundinacea.

**Dilatris** L., *Dilatris*, III. I., Narcisseae-Haemodoraceae.

*corymbosa* Thbg. (*umbellata* L.), doldentraubige, 4. t.

Cap der guten Hoffnung.

*paniculata* Thbg., rispige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

*viscosa* Thbg., schmierige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

**Dillenia** L. (J. J. Dillen, berühmter deutscher Botaniker), XIII. VI.

*speciosa* Thbg. (*indica* L.), prächtige, 5. w. Ostindien.

*dentata* Thbg. v. *Wormia dentata*. *pentagyna* Roxb.

v. *Colbertia coromandeliana*. *scandens* W. (*volubilis* Vent., *speciosa* Curt.) v. *Hibbertia volubilis*.

**Dillwynia** Sm. (L. W. Dillwyn, englischer Botaniker),

X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*acicularis* Sieb., nadelblättrige, ♀. t. Neuholland.

*cinerascens* RB., grauliche, ♀. t. Neusüdwallis.

*ericaefolia* Sm., heideblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*floribunda* Sm., blüthenreiche, ♀. t. Neusüdwallis.

*glaberrima* Sm., glatte, ♀. t. Neusüdwallis.

*glycinifolia* Sm., glycinenblättrige, ♀. t. Neuholland.

*juniperina* Lod. (? Sbr.), wachholderähnliche, ♀. t. Neuholland.

*parvifolia* RB., kleinblättrige, ♀. t. Neuholland.

*phylicoides* Cun., phylicaähnliche, ♀. t. Neuholland.

*rudis* Sbr., rauhe, ♀. t. Neuholland.

β) *brevifolia*. γ) *teretifolia*. δ) *hispidula*.

*sericea* Cun., seidenhaarige, ♀. t. Neuholland.

*tenuifolia* Sbr., feinblättrige, ♀. t. Neuholland.

*myrtifolia* Sm. (*obovata* La Bill.) v. *Eutaxia myrtifol.*

*pungens* Mack. Cat. v. *Eutaxia pungens*.

*Dimocarpus Litchi* Lour. et *Longan* Lour. vid. *Euphoria Litchi* etc.

*Dimorpha grandiflora* W. v. *Parivoa grandiflora*.

**Dimorphotheca** Vaill., Mch., Wechselsame, XIX. iv.,  
Compositae-Corymbiferae.

*aurantiaca* DC., orangefarbener, ♀. t. Cap d. g. H.

*chrysanthemifolia* DC., goldblumenblättriger, ♀. t. Cap  
der guten Hoffnung.

*cuneata* DC., keilblättriger, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*fruticosa* DC., strauchiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*graminifolia* DC., grasblättriger, 4. t. Cap d. g. H.

*hybrida* DC. (*incrassata* Mch.), Bastard-W., ☉. f. m.  
Cap der guten Hoffnung.

*nudicaulis* DC., nacktstengeliger, ☉. f. m. Cap d. g. H.

*pluvialis* Mch., Regen-W., ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.

*sinuata* DC., buchtiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*Tragus* DC., Bocks-W., ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Dineba** Delil. (*Dinebra* Auct.) (arabischer Name), III.  
II., Gramineae.

*aegyptiaca* Del. (*arabica* P. B.), aegyptische, ☉. f. Ae-  
gypten, Arabien, Persien, Indien.

*curtipendula* DC. v. *Atheropogon apludoides*. Lima  
P. B. v. *Wangenheimia* Lima.

**Dinetus** Swt., Rispwinde, V. 1., Convolvulaceae.

*paniculata* Swt., ostindische, ☉. Sch. w. Ostindien.

*racemosa* Swt., nepal'sche, ☉. Sch. f. Nepal. . .

**Dioclea** Spgl., Diocles Carystinus, alter griechischer  
Arzt und Kräuterkenner), V. 1., Asperifoliaceae.

*hispidissima* Spgl., hackerige, ☉. ♂. f. Aegypten.

*Dioclea mollis* DC. et *sericea* Kunth. vid. *Hymenospron*  
molle et seric.

**Diodia** L., Diodia, IV. 1., Rubiaceae.

*prostrata* Sw., gestreckte, ♀. w. Westindien.

*sarmentosa* Sw., starkwurzelnde, ♀. w. Westindien.

*verticillata* Vahl, wirtelförmige, 4. w. Westindien.

*virginica* L., virginische, 4. f. Virginien.

**Diomedea** Cass., Diomedea, XIX. vi., Compositae-  
Corymbiferae.

*argentea* H. B. K., silberfarbiger, ♀. t. w. Südamerika.

*bidentata* Cass., zweizählige, ♀. t. w. Westindien.

*glabrata* H. B. K., glatte, ♀. t. w. Südamerika.



**Dionaea** Ell., Fliegenfänger, X. 1., Cistineae-Drosereae.

*Muscipula* L., wunderbarer, 4. k. t. Carolina.

**Dioscorea** L., Yamswurzel, XXII. VI. (VI. III.), Asparagineae-Dioscoreae.

*aculeata* L., stachelige, 4. Kn. w. Ostindien.

*alata* L., geflügelte, 4. Kn. w. Ostindien, Molucken.

*altissima* Lam. (*martinicensis* Speg.), höchste, 4. Kn. w. Martinique.

*anguina* Roxb., Schlangen-Y., 4n. w. Ostindien.

*angustifolia* Lam., schmalblättrige, 4. Kn. w. Peru.

*atropurpurea* Roxb., dunkelpurpurrothe, 4. Kn. w. Ostind.

*brasiliensis* W., brasilianische, 4. Kn. w. Brasilien.

*bulbifera* L., knollige, 4. Kn. w. Ostindien, Neuholl.

*cinnamomifolia* Hook., zimtblättrige, 4. Kn. w. Brasil.

*coriacea* Humb., lederblättrige, 4. Kn. w. Quito.

*crispata* Roxb., krause, 4. Kn. w. Ostindien.

*fasciculata* Roxb., büschelförmige, 4. Kn. w. Ostindien.

*glabra* Roxb., glatte, 4. Kn. w. Ostindien.

*globosa* Roxb., kugelige, 4. Kn. w. Ostindien.

*heterophylla* Roxb., verschiedenblättrige, 4. Kn. w. Ostind.

*leonensis* G. Don, leonische, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*nepalensis* Swt., nepal'sche, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*Nummularia* Lam., nummularienähnliche, 4. Kn. w. Molucken.

*oppositifolia* L., gegenblättrige, 4. Kn. w. Ostindien.

*pentaphylla* L., fünfblättrige, 4. Kn. w. Ostind., Molucken.

*piperifolia* Humb., pfefferblättrige, 4. Kn. w. Südamer.

*pulchella* Roxb., schöne, 4. Kn. w. Ostindien.

*purpurea* Roxb., purpurfarbige, 4. Kn. w. Ostindien.

*quaternata* Walt., vierblättrige, 4. Kn. f. Nordamer.

*quinqueloba* Thbg., fünfflappige, 4. Kn. t. k. Japan.

*rubella* Roxb., röthliche, 4. Kn. w. Ostindien.

*sativa* L., ächte, 4. Kn. w. Ostindien, Molucken.

*scabra* Humb., scharfe, 4. Kn. w. Südamerika.

*trifida* L. suppl., dreispaltige, 4. Kn. w. Surinam, Trinid.

*trifoliata* Humb., dreiblättrige, 4. Kn. w. Caracas.

*triphylla* L., dreizählige, 4. Kn. w. Ostind., Molucken.

*villosa* L., zottige, 4. Kn. f. Nordamerika.

**Diosma** Berg., Göttergeruch, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*ambigua* Bartl. et Wendl., zweifelhafter, 4. t. C. d. g. H.

? *corymbosa* Mont., traubendoldiger, 4. t. Cap d. g. H.

*cupressina* L. (*dichotoma* Berg.), cypressenartiger, 4. t.

Cap der guten Hoffnung.

*ericoides* L., heideähnlicher, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*glabrata* G. F. W. Meyer (? *aspalathoides* Lam.), glatter, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

*hirsuta* L., rauhhaariger, 4. t. Cap der guten Hoffn.

*longifolia* Wendl. (*tenuifolia* W., *linifolia* Hort.), langblättriger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

*oppositifolia* L. (*pectinata* Thbg. W., *subulata* Wendl., ? *pinifolia* Fisch.), gegenblättriger, 4. t. Cap d. g. H.

*ramosissima* Bartl. et Wendl. (*cupressina* Lam.), starkästiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

*rubra* L. (*ericifolia* Andr.), rother, 4. t. Cap d. g. H.

*scabra* Lam. (*succulenta* Wendl., Willd., Lk.), scharfer, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

*scoparia* Lod., besenartiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

? *sphaerocephala* Lod., kugelblumiger, 4. t. Cap d. g. H.

*succulenta* Berg. (*rigidula* W. *tetragona* Hortul.), saftiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.



**Diosma**

- ?tenella Lodd., zarter,  $\text{f. t.}$  Cap der guten Hoffnung.  
 ?teretifolia Lk. (*ferulacea* H. Kew.), rundblättriger,  $\text{f. t.}$  Cap der guten Hoffnung.  
 ?ulicina Lodd., stechginsterähnlicher,  $\text{f. t.}$  Cap d. g. H.  
 virgata Meyer, ruthenförmiger,  $\text{f. t.}$  Cap d. g. Hoffn.  
*alba* Thbg. (et *angustifolia* Hort.) vid. *Coleonema album et pulchrum. amoena* Ker v. *Adenandra amoena* etc. *barbigera* L. suppl. v. *Macrostylis barbigera. betulina* Thbg. etc. vid. *Barosma betulina* etc. *bifida* Jacq., *bruniodes* Lk. etc. v. *Agathosma bifida, cuspidata* etc. *capitata* L. v. *Audouinia capitata. cuspidata* Thbg. (et *deusta* Thbg.) v. *Limonia cuspidata* etc. *glandulosa* Hort. (*orbicularis* Hort.) v. *Barosma ovata. glomerata* Mey. vid. *Euchaetis glomerata. hirta* Vent. v. *Agathosma Ventenatiana. hispida* Hortul. vid. *Agathosma Cerefolium. mixta* H. Kew. (*acuta* Lee) v. *Agathosma cuspidata. myrtifolia* Hort. angl. v. *Agathosma ciliata. obtusata* Thbg. (et *tetragona* L. fil.) v. *Acmadenia obtusata* etc. *purpurea* Hort. (*rubra* Hort.) vid. *Agathosm. villosa. rugosa* H. angl. v. *Agathosma laxa. speciosa* Sims v. *Adenandra umbellata. virgata* Hortul. v. *Agathosma imbricata*  $\beta$ .

**Diospyros** L., Dattelpflaume, VIII. I. (XXIII. II.), Sapotaceae-Ebenaceae.

- Chloroxylon* Roxb., Grünholz-D.,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*cordifolia* Roxb., herzblättrige,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*discolor* W., verschiedenfarbige,  $\text{f. w.}$  Philippinen.  
*Ebenaster* Retz, Ebenaster-D.,  $\text{f. w.}$  Bengalen.  
*Ebenum* Retz, Ebenholz-D.,  $\text{f. w.}$  Ceylon, Madagascar.  
*edulis* Lod., wohlschmeckende,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*Embryopteris* P., kleberige,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*hirsuta* L. suppl., rauhhaarige,  $\text{f. w.}$  Ceylon.  
*Kaki* L., suppl., japanische,  $\text{f. k.}$  Japan.  
*lobata* Lour., gelappte,  $\text{f. t.}$  China, Cochinchina.  
*Lotus* L., gemeine,  $\text{f. f. b. k.}$  Südeuropa, Nordafrika.  
*lucida* Lod., glänzende,  $\text{f. f. b.}$  Nordamerika.  
*lycioides* Dsf., bocksdornähnliche,  $\text{f. k. t. ?}$   
*Mabola* Roxb., Mabola-D.,  $\text{f. w.}$  Philippinen.  
*Melanoxylon* Roxb., Schwarzholz-D.,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*montana* Roxb., Berg-D.,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*obovata* Jacq. (*tetrasperma* Sw., *revoluta* Poir.), verkehrteiförmige,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
*pubescens* Pursh, weichhaarige,  $\text{f. f. b.}$  Nordamerika.  
*reticulata* W., netzförmige,  $\text{f. w.}$  Mascarenas.  
*rugulosa* RB, runzelige,  $\text{f. t.}$  Neuholland.  
*sylvatica* Roxb., Wald-D.,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
*vaccinioides* Hook., heidelbeerähnliche,  $\text{f. t.}$  China.  
*virginiana* L., virginische,  $\text{f. f. b.}$  Nordamerika.
- Diotis** Schreb., Doppelohr, XXI. IV., Aizoideae-Atripliceae.  
*ceratoides* W., gehörntes,  $\text{f. f.}$  Mähren, Oesterreich, Caucasus, Armenien, Sibirien etc.  
*atriplicoides* MB. (*atriplicina* Sogl.) v. *Halimus pendunculatus. candidissima* Dsf. v. *Otanthus maritimus.*
- Diphaca** Lour., Doppellinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*cochinchinensis* Lour., cochinchinesische,  $\text{f. w.}$  China, Cochinchina.

- Diphylleja** Mchx., *Diphylleja*, VI. I., Berberideae.  
*cymosa* Mchx., afterdoldige, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Diphysa** Jacq., *Diphysa*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*carthagenensis* Jacq., *carthaginensis* Sche. f. w. Carthagera.
- Diplachne** P. Beauv., Büschelgras, III. II., Gramineae.  
*fascicularis* P. B., nordamerikanisches, ①. f. Nordamer.  
*fusca* P. Beauv., braunes, ♂. f. Aegypten, Palästina.  
*serotina* Lk., spätblühendes, 4. f. Südeuropa.
- Diplacus** Nutt., *Diplacus*, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.  
*puniceus* Nutt., hochrother, 4. f. k. Californien.
- Diplasia** Rich., *Diplasia*, III. I. (VI. II.), Cyperaceae.  
*karataefolia* P., ananasblättrige, 4. w. Guiana.
- Diplazium** Sw., Aderfarn, XXIV. I., Pterioideae.  
*acuminatum* Radd., zugespitzter, 4. w. Brasilien.  
*arborescens*, Sw., baumartiger, f. w. Mascarenas.  
*auriculatum* Kaulf., geöhrt, f. w. Neugranada, Brasil.  
*castaneaefolium* Sw., kastanienblättriger, 4. w. Guinea.  
*esculentum* Sw., genießbarer, 4. w. Ostindien.  
*grandifolium* Sw., großblättriger, 4. w. Jamaica.  
*juglandifolium* Sw., nußblättriger, 4. w. Jamaica.  
*malabaricum* Spgl., malabarischer, 4. w. Ostindien.  
*plantagineum* Sw., wegrittblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.  
*serampurens* Spgl., serampur'scher, 4. w. Ostindien.  
*pulcherrimum* Radd. v. *Didymochlaena sinuosa*.
- Diplocoma** D. Don, Doppelschopf, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*villosa* D. Don, zottiger, 4. f. Mexico.
- Diplolepis** RB. v. *Sonninia*.
- Diplolaena** Dsf. RB., *Diplolaena*, X. I., Tricoccae-Rutaceae.  
*Dampieri* Dsf. Dampier's, f. t. Westl. Neuholland.  
*grandiflora* Dsf., großblumige, f. t. Westl. Neuholland.
- Diplonyx** Rafin., Spornflügel, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*elegans* Raf., zierlicher, f. Sch. k. Louisiana.
- Diplopappus** DC. Cass. v. *Aster*, V.
- Diplopeltus** Endl., Doppelschild, ? VIII. I., Sapindaceae.  
*Hügelii* Endl., Hügel's, f. t. Neuholl. (Schwanenfluß).
- Diplophyllum** Lehm., Doppelblatt, II. I., Personatae-Veroniceae.  
*veronicaeforme* Lehm., ehrenpreisähnliches, ①. f. Caucas.
- Diplostegium** Cass. v. *Aster* VI.
- Diplotaxis** DC., Mauersenf, XV. III., Cruciferae.  
*Barrelieri* DC., Barrelier's, ①. f. Südfrankr., Spanien.  
*catholica* DC., spanischer, ①. f. Calab., Spanien, Portug.  
*crassifolia* DC., dickblättriger, ①. f. Sicilien.  
*erucoides* DC., rankenähnlicher, ①. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.  
*hispidula* DC., hackeriger, ①. f. Aegypten, Syrien.  
*muralis* DC., gemeiner, ①. f. England, Schweiz, Nord- und Süddeutschland.  
*pendula* DC., hängender, ①. f. Nordafrika.  
*saxatilis* DC., steiniger, 4. f. Südeuropa.  
*tenuifolia* DC., feinblättriger, ①. f. Mittel-u. Südeuropa.  
*viminea* DC., schlanker, ①. f. Frankreich, Italien.  
*virgata* DC., ruthenförmiger, ①. f. Spanien.



- Diplothemium** Mart., Doppelscheide, XXI. ix. (XIII. III.), Palmae.  
 campestre Mart., Feld-D., ♀. w. Brasilien.  
 maritimum Mart., Seestrands-D., ♀. w. Brasilien.
- Dipodium** RB., Dipodium, XX. i., Orchideae.  
 punctatum RB., punctirtes, 4. w. Neuholland.
- Dipsacus** Vaill., Karden, IV. i., Dipsaceae.  
 ferox Lois., wilde, ♂. f. Südeuropa.  
 fullonum Mill., gemeine, ♂. f. England, Südeuropa.  
 Gmelini MB., Gmelin's, ♂. f. Caucasus.  
 inermis Wall. (*mitis* D. Don), unbewehrte, ♂. f. Nepal.  
 laciniatus L. (? *divaricatus* Presl.), schlitzbblätterige, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Persien.  
 pilosus L., behaarte, ♂. f. Europa.  
 strictus D. Don (*inermis* a Wall.), steife, ♂. f. Nepal.  
 sylvestris Mill., wilde, ♂. f. Europa.
- Dipteracanthus** N. E., Flügelklau, XIV. II., Acanthaceae.  
 Schauerianus N. E., Schauer's, ♀. w. Brasilien.  
 strictus N. E., steifer, 4. k. Carolina.  
 viscidulus N. E., schmieriger, ♀. w. Brasilien.
- Dipterix** Schreb., Tonkabohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Caesalpineae.  
 odorata W., wohlriechende, ♀. w. Guiana.
- Dipterocoma** Fisch. et Mey., Flügelschopf, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.  
 pusilla Fisch. et Mey., niedriger, ☉. f. Nordpersien.
- Dirca** L., Lederholz, VIII. i., Thymeleaceae.  
 palustris L., Sumpf-L., ♀. f. Virginien.
- Disa** Berg., Disa, XX. i., Orchideae.  
 chrysostachya Sw., goldährige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 cornuta Sw., gehörnte, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 draconis Sw., buntaderige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 ferruginea Sw., rostfarbige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 flexuosa Sw., gebogene, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 grandiflora L. suppl., großblumige, 4. Kn. t. w. Cap der guten Hoffnung.  
 lacera Sw., schlitzbblumige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 prasinata Ker, grünblumige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
- Disandra** L., Disandra, VII. i., Personatae-Antirrhineae.  
 prostrata L., gestreckte, 4. k. Nordafrika, Madeira.
- Dischidia** RB., Spaltkrone, V. II, Asclepiadeae.  
 bengalensis Coleb., bengalische, 4. ♀. w. Bengalen.  
 Nummularia RB., rundblättrige, 4. w. Amboina, Neuholl.
- Disemma** La Bill., Doppelkrone, XVI. II., Passifloreae.  
 adiantifolia DC., frauenhaarblättrige, ♀. 4. Sch. w. Norfolkinseln.  
 Herbertiana DC., Herbert's, ♀. 4. Sch. w. Neuholland.
- Disperis** Sw., Disperis, XX. i., Orchideae.  
 capensis Sw., capische, 4. Kn. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 cucullata Sw., kappenförmige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.  
 secunda Sw., einseitige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
- Disporum** Salisb., Lochlilie, VI. i., Coronariae-Colchicaceae (*Melanthaceae*).  
 fulvum Salisb., gelbbraune, 4. t. China.  
 parviflorum D. Don, kleinblumige, 4. t. Nepal.
- Dissolena** Lour., Doppelröhre, V. i., Contortae-Apocynaceae.  
 verticillata Lour., wirtelförmige, ♀. w. t. China.



- Distreptus** Cass., Drehdosten, XIX. V., Compositae-Eupatorieae.  
 spicatus Cass., ährenförmiger, 4. w. Jamaica.
- Diuris** Sm., Schweifstendel, XX. I., Orchideae.  
 aurea Sm. (*spathulata* Sw.), goldfarbiger, 4. t. w. Neuholl.  
 maculata Sm., gefleckter, 4. Kn. t. w. Neuholland.  
 pedunculata RB., gestielter, 4. Kn. t. w. Neuholland.  
 sulfurea RB., schwefelgelber, 4. Kn. t. w. Neuholland.
- Dodartia** L. (D. Dodart, französischer Akademiker und Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.  
 orientalis L., morgenländische, 4. f. Kleinasien, Caucasus, Südsibirien.
- Dodecatheon** L., Götterblume, V. I., Primulaceae.  
 frigidum Chamiss., nördlichste, 4. Westl. Nordamerika.  
 integrifolium Mchx., ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 Meadia L., virginische, 4. f. Nordamerika.  
 a) albiflorum Swt. b) elegans Swt. c) giganteum Swt. d) lilacinum Swt.
- Dodonaea** L. (Rembert Dodoens [*Dodonaeus*], alter berühmter holländ. Botaniker), VIII. I., Sapindaceae.  
 angustissima Hortul., schmalblättrige, ♀. t. ?  
 asplenifolia Rudg., strichfarnblättrige, ♀. t. Neuholl.  
 attenuata Cun., verdünnte, ♀. t. Neuholland.  
 bialata H. B. K., zweiflügelige, ♀. w. Neugranada.  
 Burmanniana DC. (*angustifolia* Roxb.), Burmann's, ♀. w. Ostindien.  
 ceratocarpa Lindl., hornfrüchtige, ♀. t. ? Neuholland.  
 cuneata Sm., keilförmige, ♀. t. Neuholland.  
 dioica Roxb. (*heterophylla* Hort.), zweihäusige, ♀. w. Ostind.  
 elaeagnoides Rudg., oleasterähnliche, ♀. w. St. Domingo.  
 filiformis Lk., fadenförmige, ♀. t. ?  
 jamaicensis DC. (*viscosa* Cav., *angustifolia* Sw.), westindische, ♀. w. Jamaica.  
 laurina Sbr. (*laurifolia* Lour.), lorbeerblättrige, ♀. t. Neuholland.  
 microcarpa DC., kleinfrüchtige, ♀. w. Mascarenas.  
 oblongifolia Lk., länglichblättrige, ♀. t. Neuholland.  
 paulliniaefolia Cunn., paullinienblättrige, ♀. t. Neuholl.  
 pinnata Sm., gefiederte, ♀. t. Neuholland.  
 salicifolia DC. (*angustifolia* Lam.), weidenblättrige, ♀. t. Neuholland.  
 scabra Lod., scharfe, ♀. t. Neuholland.  
 spathulata Sm., spatelblättrige, ♀. t. Australien.  
 triquetra Andr., dreiseitige, ♀. t. Neuholland.  
 truncata Lod., abgestutzte, ♀. t. Neuholland.  
 viscosa L., schmierige, ♀. t. Westindien, Westafrika.
- Doemia** RB. (*Daemia* et *Dimia* Auctor, arabischer Name), V. II., Asclepiadeae.  
 bicolor Swt., zweifarbig, ♀. Sch. w. Ostindien.  
 cordata RB., herzblättrige, ♀. Sch. w. Arab., Aegypt.  
 extensa RB., ästige, ♀. Sch. w. Ostindien.  
 scandens G. Don, steigende, ♀. Sch. w. Gambia.
- Dolichonemia** speciosa N. E. v. Moldenhawera floribunda.
- Dolichos** L., Faseole, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 angulosus DC., kantige, ☉. f. Nordamerika.  
 biflorus L., zweiblumige, 4. Sch. w. Ostindien.  
 capensis L., capische, 4. Sch. t. Cap d. g. Hoffn.  
 Catiang L., schmalfrüchtige, ☉. w. Ostindien.  
 chinensis L., chinesische, ☉. Sch. f. Ostindien, Java.

**Dolichos**

*frutescens* Hamilt., strauchige, ♀. t. Nepal.  
*gangeticus* Roxb., Ganges-F., 4. Sch. w. Ostindien.  
*heterophyllus* Horn., verschiedenblättrige, ☉. Sch. f.  
 Canarische Inseln.

*hirsutus* Thbg., rauhhaarige, ♀. Sch. t. Japan.

*Jacquini* DC., Jacquin's, ♀. Sch. w. Südamerika.

*lignosus* L., holzige, ♀. Sch. w. Molucken.

*lobatus* W., gelappte, ☉. Sch. f. Cap der guten Hoffn.

*Lubia* Forsk., *Lubia*-F., ☉. f. m. Aegypten.

*luteus* Sw., gelbe, ♀. Sch. w. Jamaica.

*melanophthalmus* DC., schwarze, ☉. Sch. f. Italien.

*monachalis* Broter., Mönchs-F., ☉. f. Spanien, Portugal.

*pilosus* W., haarige, ☉. Sch. w. Ostindien.

*reticulatus* Ait., netzförmige, ♀. Sch. t. Neusüdwallis.

*sesquipedalis* L., langhülsige, ☉. Sch. w. Westindien.

*setaefolius* Boj., borstenblättrige, ♀. Sch. w. Mauritius.

*sphaerospermus* DC., kugelsamige, ☉. w. Jamaica.

*tetraspermus* W., viersamige, 4. Sch. w. Ostindien.

*tranquebaricus* Jacq., tranquebarische, ☉. Sch. w. Ostind.

*unguiculatus* L. Jacq., hackenhülsige, ☉. Sch. w. Ost-  
und Westindien.

*vexillatus* H. B. K., großsfahnige, ☉. w. Sch. West-  
indien, Südamerika.

*albus* Lour., *bengalensis* Jacq., *cultratus* Thbg. (et  
*Lablab* L. et *purpureus* L.) etc. v. *Lablab* peren-  
 nans beng. cultrat. vulgaris etc. *bulbosus* L. v.  
*Pachyrhizus* angulatus. *ensiformis* L. etc. v. Cana-  
 valia ensiform. etc. *luteolus* Jacq. v. *Vigna* glabra.  
*minimus* L. (et *scarabaeoides* L. etc. v. *Rhynchosia*  
 minima etc. *mollis* Jacq. v. *Hymenospron* moll.  
*polystachys* L. v. *Phaseolus* perennis, *polystachyus*  
 Thbg. v. *Wistaria* floribunda. *psoraleoides* Lam.  
 (*fabaeformis* L'Her.) v. *Cyamopsis* psoral. *Soja* L.  
 v. *Soja* hispida. *tetragonolobus* L. v. *Psophocarpus*  
*tetragonol.* *urens* L. v. *Mucuna* *urens*.

**Doliocarpus** Roland., Schlingbeere, XIII. r., Dilleniaceae.

*Calinea* J. F. Gmel., guianische, ♀. Sch. w. Guiana.

**Dombeya** Cav. (J. Dombey, französischer Botaniker und  
 Reisender), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

*cannabina* Humb. Bonpl., hanfähnliche, ♀. w. Mauritius.

*cordifolia* DC., herzblättrige, ♀. w. Ostindien.

*ferruginea* Cav., rostfarbige, ♀. w. Mascarenas.

*ovata* Cav., eiförmige, ♀. w. Mascarenas.

*punctata* Cav., punktirte, ♀. w. Mascarenas.

*tiliaefolia* Cav., lindenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

*Dombeya* Lam. v. *Araucaria*. *Dombeya lappacea* L'Her. v.  
*Tourrettia lappacea*.

*Donax arundinaceus* P. B. v. *Arundo* *Donax*. *borealis* Trin.  
 (*festucaceus* P. B.) v. *Scolochloa festucacea*. *tenax*  
 P. B. v. *Ampelodesmos* *ten*.

*Dondia*, *Epipactis* Spgl. v. *Hacquetia* *Epipactis*.

*Donia ciliata* Nut., *glutinosa* RB., *squarrosa* Pursh. v. *Grin-*  
*delia ciliata* etc. *Donia punicea* G. Don v. *Clianthus*  
*puniceus*.

**Doodia** RB. (Samuel Doody, englischer Botaniker),  
 XXIV. r., Pterioideae.

*aspera* RB., rauhe, 4. t. w. Neusüdwallis.

*caudata* RB., geschwänzte, 4. t. w. Neuholland.



**Doodia**

*maxima* J. Bevis, größte, 4. t. w. Neuholland.

*media* RB., mittlere, 4. t. w. Neuholland.

**Dorema** G. Don, Gummidolde, V. II. Umbelliferae.

*armeniaceum* G. Don, armenische, ♂. 4. f. b. k. Armenien.

*glabrum* Fisch. et Mey., glatte, 4. f. b. Armenien.

**Doronicum** T., Gemswurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*altaicum* Pall., altaische, 4. f. Altai.

*austriacum* Jacq., österreichische, 4. f. Mittel-, ost- und westeuropäische Alpen.

*caucasicum* MB. (*orientale* Adams), caucasische, 4. f. Caucasus, mitteleuropäische Alpen, Südtalien.

β) *Columnae* Tenor. (*cordifolium* Stbg.).

*dentatum* Lk. (*plantagineum* W.), gezähnte, 4. f. ?

*macrophyllum* Fisch., großblättrige, 4. f. Sibirien, Cauc.

*oblongifolium* DC. (*plantagineum* C. A. Meyer), 4. f. Ostcaucasus.

*Pardalianches* L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

β) *latifolium* Clus. Rchb. (*Matthioli* Tausch.).

*plantagineum* L., wegrittblättrige, 4. f. Frankreich, Spanien, Portugal.

*scorpioides* W., gegliederte, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.

*Bellidiastrum* L. v. *Bellidiastrum* Michellii. *mexicanum* Cerv. (*villosum* Sessé) v. *Diplocoma villosa*. *peruvianum* Lam. v. *Werneria peruviana*.

**Dorstenia** Plum., *Dorstenia*, IV. I. (XXI. IV.), Urticaceae.

*arifolia* Lam., arumblättrige, 4. w. Brasilien.

*brasiliensis* Lam., brasilianische, 4. w. Brasilien.

*ceratosanthes* Lod., hornblumige, 4. w. Südamerika.

*Contrayerva* L., wurmtreibende, 4. w. Westind., Südamer.

*cordifolia* Lam., herzblättrige, 4. w. Westind., Südamer.

*Drakenia* L., drakenische, 4. w. Neuspanien.

*Houstonii* L., Houston's, 4. w. Südamerika.

*tubicina* R. et P., röhrlige, 4. w. Peru, Trinidad.

**Doryanthes** Correa RB., Spießblume, I. I., Bromeliaceae.

*excelsa* Corr., hohe, 4. t. Neuholland.

**Dorycnium** T., *Dorycnium*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*herbaceum* Vill. (*intermedium* Ledeb., *sabaudum* Rchb.), krautartiges, 4. f. Süd- und Osteuropa.

*latifolium* W. M. B. (*ibericum* W.), breitblättriges, 4. f. f. Taurien, Caucasus.

*rectum* Sering., gerades, f. f. k. Südeuropa.

*suffruticosum* Vill. (*monspeliense* W., *pentaphyllum* Rchb.), halbstrauchiges, 4. f. Süd- und Westeuropa.

*hirsutum* Sering. etc. v. *Bonjeania hirsuta* Nachtr.

**Douglasia** Lindl. (D. Douglas, englischer Reisender und Botaniker), V. I., Primulaceae.

*navalis* Lindl., Schnee-D., 4. f. Nordamerika.

**Draba** Dill., Hungerblümchen, XV. II., Cruciferae.

A) *Genuina*.

*aizoides* L., immergrünes, 4. f. Mitteleuropa.

β) *affinis* Host. γ) *Aizoon* Wahlenb. (*elongata* Host.).

*alpina* L. (*pauciflora* RB.), Alpen-H., 4. f. Lapland.

*aurea* Vahl, goldfarbiges, ♂. ☉. f. Grönland.

*brachystemon* DC., kurzfadiges, 4. f. ? Schweiz.



**Draba**

- bruniaefolia* Stev., brunienblättriges, 4. f. Caucasus.  
*carinthiaca* Hoppe (*hirta* Gaud., *Johannis* Host., *nivalis* DC. Gaud.), kärnthnerisches, 4. f. Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Schweiz.  
*ciliata* Scop. (*androsacea* W., *fladnizensis* DC.), gefranztes, 4. f. Krain.  
*cinerea* Adams, aschgraues, ♂. f. Sibirien.  
*confusa* Ehrh., verwechseltes, ♂. f. Tyrol, Schweiz.  
*corymbosa* RB., traubendoldiges, 4. f. Baffins-Bay.  
*crassifolia* Grah., dickblättriges, 4. f. Nordamerika.  
*cuspidata* MB., langspitziges, 4. f. Taurien.  
*dahurica* DC., dahurisches, ♂. f. Dahurien.  
*ericaefolia* Steven., heideblättriges, 4. f. Caucasus.  
*fladnizensis* Wulf. (*helvetica* Schlchr., *sclerophylla* Gaud.), Fladnizer, 4. f. Kärnthen, Tyrol, Schweiz.  
*frigida* Saut. (*stellata* Auctor.), kaltes, 4. f. Schweiz, Tyrol, Salzburg etc.  
*glacialis* Adams, eisiges, 4. f. Ostsibirien.  
*Gmelini* Adams, Gmelin's, 4. f. Sibirien.  
*gracilis* Grah. (*lutea*  $\beta$  *longipes* Rich.), schlankes, ☉. f. Nordamerika.  
*grandiflora* C. A. Mey., großblumiges, 4. f. Altai.  
*hirta* L. (*pyrenaica* Oed., *nivalis* DC.), rauhes, 4. f. Scandinavien, Nordamerika.  
*Hoppeana* Rchb. (*Zahlbruckneri* Host., *glacialis* Auctor), Hoppe's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*incana* L. (*contorta* Ehrh.), weißsgraues, ♂. f. Nord-europa, Schweiz.  
*incompta* Stev., ungeziertes, 4. f. Caucasus.  
*laevigata* Hoppe, glattes, 4. f. Kärnthen.  
*lapponica* W. (*androsacea* Wahlbg., *ciliaris* Wahlbg., *Wahlenbergii* Hartm.), lappländisches, 4. f. Scandinavien, Schweiz, Kärnthen.  
*lasiocarpa* Roch., wollfrüchtiges, 4. f. Ungarn.  
*Liljebladii* Wallm. (*hirta* Oed., *nivalis* Liljeb., *muricella* Wahlbg.), Liljeblad's, 4. f. Scandinavien, Nordamer.  
*lutea* Gilib., gelbes, ☉. f. Nordamerika.  
*muralis* L. (*nemorosa* All.), Mauer-H., ☉. f. Europa, Nordafrika.  
*nemoralis* Ehrh. (*pontica* Dsf.), Hain-H., ☉. f. Schweden, Rußland, Ungarn, Mittelasien.  
*Nummularia* Ehrenb. Lk., nummularienähnliches, ☉. f. ?  
*oblongata* RB., verlängertes, 4. f. Nordamerika.  
*pilosa* Adams, haariges, 4. f. Ostsibirien.  
*repens* MB., kriechendes, 4. f. Caucasus.  
*rigida* W. (*bryoides* DC.), starres, 4. f. Caucasus.  
*rivularis* Bernh., Bach-H., ♂. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*rupestris* RB. (*hirta* Sm.), Felsen-H., 4. f. Schottland, Norwegen.  
*Sauteri* Hoppe, Sauter's, 4. f. Salzburg, Steyermark.  
 $\beta$ ) *Spitzelii* Hoppe.  
*siliquosa* MB., langschotiges, 4. f. Caucasus.  
*stellata* Jacq. (*austriaca* Crtz., *saxatilis* Koch), sternförmiges, 4. f. Oesterreich, Steyermark.  
*stylaris* Gay., langgriffeliges, ♂. ?  
*tomentosa* Wahlbg., filziges, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Salzburg.  
*Traunsteineri* Hoppe, Traunsteiner's, 4. f. Kärnthen, Tyrol etc.

**Draba**

tridentata DC., dreizähniges, ♂. 4. f. Caucasus.  
 unalascensis DC., Unalaskha-H., ☉. f. Unalaskha.

B) *Erophila* DC.

americana DC. (*caroliniana* Bart.), amerikanisches, ☉. f. Nordamerika.

praecox Stev., frühes, ☉. f. Caucasus, Ostdeutschland.

verna L. (*E. vulgaris* DC.), Frühlings-H., ☉. t. Europa.

*hesperidiflora* Lam. v. *Aubrietia hesperidiflor.*

*pyrenaica* L. v. *Petrocallis pyrenaica.*

*uralensis* W. v. *Schivereckia podolica.*

**Dracaena** L., Drachenbaum, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

arbores Lk., baumartiger, ♀. w. Sierra Leone.

brasiliensis Parm., brasilianischer, ♀. w. Brasilien.

Draco L., ächter, ♀. w. Ostindien.

ensifolia Haw., schwertblättriger, ♀. w. Neuspanien.

ferrea L., eisenfarbiger, ♀. w. Ost- u. Westind., China.

β) *terminalis* Jacq.

fragrans Ker., wohlriechender, ♀. w. Afrika.

interrupta Haw., unterbrochener, ♀. w. Sierra Leone.

leonensis Lod., guineischer, ♀. w. Sierra Leone.

nodosa Lod., knotiger, ♀. w. ?

ovata Sims, eiförmiger, ♀. w. Sierra Leone.

purpurea Lod., purpurfarbiger, ♀. w. Ostindien.

reflexa Lam., zurückgebogener, ♀. w. Mascarenas, Madagascar.

salicifolia Ait., windenblättriger, ♀. w. ?

striata L. suppl. ? Lod., gestreifter, ♀. w. t. Cap der guten Hoffnung.

surculosa Lindl., ästiger, ♀. w. Sierra Leone.

tessellata W. (*marginata* Lam.), gewürfelter, ♀. w. Madagascar.

umbraculifera Jacq., schattengebender, ♀. w. Mascarenas.

*australis* Forst. (et *indivisa* Forst., *stricta* Sims) v.

*Charlwoodia australis* etc. *ensifolia* L. v. *Dianella*

*nemorosa.* *marginata* Ait. v. *Lomatophyllum bor-*

*bonicum.*

**Dracocephalum** L., Drachenkopf, XIV. 1., Labiatae.

altaianse Laxm. (*grandiflorum* Bot. mag.), altaischer, 4. f. Altai.

argunense Fisch., argunischer, 4. f. Sibirien.

austriacum L., österreichischer, 4. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.

botryoides Stev., traubiger, 4. f. Caucasus.

canariense L., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.

canescens L., graulicher, ☉. f. Kleinasien.

chamaedryoides Balb., gamanderähnlicher, 4. f. ?

grandiflorum L., großblumiger, 4. f. Sibirien.

ibericum Stev. (*odoratissimum* Poir.), iberischer, 4. f. Georgien, Taurien.

mexicanum H. B. K., mexicanischer, 4. k. t. Mexico.

Moldavica L., moldauischer, ☉. f. Südpodolien, Moldau, Sibirien.

nutans L., überhängender, 4. f. Sibirien.

origanoides W., dostenähnlicher, 4. f. Sibirien.

palmatum W., handförmiger, 4. f. Sibirien.

parviflorum Nutt., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

peltatum L., schildförmiger, ☉. f. Levante,

peregrinum L., fremder, 4. f. Sibirien.

**Dracocephalum**

*pinnatum* L., gefiederter, 4. f. Sibirien.

*Ruyschiana* L., Ruysch's, 4. f. Nord-, Ost- u. Südeuropa.

*sibiricum* L., sibirischer, 4. f. Sibirien.

*thymiflorum* L., thymianblumiger, ☉. f. Sibirien.

*cordatum* Nutt., *denticulatum* L., *speciosum* Swt.  
*variegatum* Vent., *virginianum* L. v. *Physostegia*  
*cordata* etc.

**Dracontium** L., Drachenwurz, VII. 1., Aroideae.

*lanceaefolium* Jacq., lanzettblättrige, 4. w. Caracas.

*polyphyllum* L., vielblättrige, 4. w. Südamerika.

*sagittaeifolium* Meyer, pfeilblättrige, 4. w. Guiana.

*foetidum* L. v. *Symplocarpus foetidus*. *pertusum*

Mill. v. *Calla pertusa*. *spinosum* L. v. *Pothos heterophyllum*.

**Dracophyllum** RB., Drachenblatt, V. 1., Epacrideae.

*capitatum* RB., kopfförmiges, ♀. t. Neuholland.

*longifolium* RB., langblättriges, ♀. t. Neuholland.

*secundum* RB., einseitiges, ♀. t. Neuholland.

*gracile* RB. v. *Sphenotoma gracilis*.

**Drepanophyllum** *agreste* Hoffm. (*sioides* Wib.) v. *Falcaria* Rivini.**Drepania** Juss. v. Tolpis.**Drepanocarpus** Mey., Sichelhülse, XVII. IV. (VI.),

Leguminosae-Papilionaceae.

*lunatus* Mey., mondförmige, ♀. w. Südamerika.

**Drimia** Jacq., Drimia, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*acuminata* Lod., zugespitzte, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*altissima* Ker., höchste, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

*ciliaris* Jacq., gefranzte, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

*elata* Jacq., erhabene, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffn.

*lanceaefolia* Ker., lanzettblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*longipedunculata* Loud., langstielige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*media* Jacq., mittlere, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffn.

*purpurascens* Jacq., purpurfarbige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*pusilla* Jacq., niedrige, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

*revoluta* Sims (*lanceaefolia* β Bog. mag., *lanceolata* R.

et S.), zurückgerollte, 4. Zw. Cap der guten Hoffn.

*undulata* Jacq., wellige, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

*villosa* Lindl., zottiger, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

**Drimys** Forst., Gewürzrinde, X. III. (IV.), Magnoliaceae.

*chilensis* DC., chilesische, ♀. w. t. Chili.

*Winteri* Forst., Winter's, ♀. w. t. Magellanische Meerenge.

**Drosera** L., Sonnentau, V. v., Cistineae-Drosereae.

*acaulis* Thbg., stengelloser, 4. Wa. t. Cap d. gut. H.

*americana* W., amerikanischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

*binata* La Bill, zweitheiliger, 4. Wa. t. Neuholland.

*cistiflora* L., cistusblumiger, 4. Wa. t. Cap d. gut. H.

*filiformis* Pursh (*tenuifolia* W.), fadenförmiger, 4. Wa. f.

Nordamerika.

*intermedia* Hayn. (*longifolia* Sm.), mittlerer, ♂. 4. Wa. f.

Europa.

*linearis* Goldie, gleichbreitblättriger, 4. Wa. f. Nordamer.

*longifolia* L. (*anglica* Huds.), ♂. 4. Wa. f. Mittel- und

Nordeuropa.

*obovata* Mert. et Koch, verkehrteiförmiger, ♂, 4. Wa. f.

Salzburg, Baiern, Vogesen.

*pauciflora* Banks (*trinervia* Spgl.), wenigblumiger, 4. Wa. t.

Cap der guten Hoffnung.



**Drosera**

rotundifolia L., rundblättriger, ♂. 4. Wa. f. Europa.  
*lusitanica* L. v. *Drosophyllum lusitanicum*.

**Drosophyllum** Lk., Thaublatt, X. v., Cistineae-Drosereae.

*lusitanicum* Lk., portugiesisches, ♂. 4. Wa. k. t. Portugal, Nordafrika.

**Drummondia** DC. (J. Drummond, englischer Botaniker, eifriger Reisender und Sammler), V. II., Saxifrageae.  
*mitelloides* DC., mitellaähnliche, 4. f. Nordamerika.**Drusa** DC. (M. le Dru, französischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.

*oppositifolia* DC., gegenblättrige, 4. Sch. k. t. Teneriffa.

**Dryandra** RB. (Jonas Dryander, berühmter Botaniker, Bibliothekar des Sir J. Banks), IV. I., Proteaceae.

*arctotides* RB., bärenohrblättrige, ♀. t. Neuholland.

*armata* RB., bewaffnete, ♀. t. Neuholland.

*Baxteri* RB., Baxter's, ♀. t. Neuholland.

*bipinnatifida* RB., doppeltgefiederte, ♀. t. Neuholland.

*blechnifolia* RB., rippenfarnblättrige, ♀. t. Neuholland.

*calophylla* RB., schönblättrige, ♀. t. Neuholland.

*concinna* RB., nette, ♀. t. Neuholland.

*cuneata* RB., keilblättrige, ♀. t. Neuholland.

a) *brevifolia*. β) *longifolia*.

*floribunda* RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

*foliolata* RB., blätterreiche, ♀. t. Neuholland.

*formosa* RB., schöne, ♀. t. Neuholland.

*Fraseri* RB., Fraser's, ♀. t. Neuholland.

*longifolia* RB., langblättrige, ♀. t. Neuholland.

*mucronulata* RB., stachelspitzige, ♀. t. Neuholland.

*nervosa* RB., nervige, ♀. t. Neuholland.

*nivea* RB., schneeweiße, ♀. t. Neuholland.

*obtusa* RB., stumpflappige, ♀. t. Neuholland.

*plumosa* RB., federige, ♀. t. Neuholland.

*pteridifolia* RB., saumfarnblättrige, ♀. t. Neuholland.

*seneciifolia* RB., kreuzkrautblättrige, ♀. t. Neuholland.

*Serra* RB., sägezahnige, ♀. t. Neuholland.

*squarrosa* RB., sparrige, ♀. t. Neuholland.

*tenuifolia* RB., feinblättrige, ♀. t. Neuholland.

Noch findet man nachstehende in den Garten-Katalogen  
 verzeichnet: *dentata*, *planifolia*, *spinosa*.

*falcata* RB. v. *Hemiclidia Baxteri*.

**Dryas** L., Waldgöttinkraut, XII. III., Rosaceae.

*Drummondii* Hook. (*octopetala* Pursh), Drummond's, 4.  
 ♀. f. Nordamerika.

*integrifolia* Vahl, ganzblättriges, 4. ♀. f. Grönland.

*intermedia* Cham., mittleres, 4. ♀. f. Nordamerika,  
 Aleutische Inseln.

*octopetala* L., gemeines, 4. ♀. f. Mitteleuropäische  
 Alpen, Nordeuropa, Asien und Amerika.

b) *minor* J. C.

*tenella* Pursh, zartes, 4. ♀. f. Canada.

*anemonoides* Pall. (*pentapetala* L.) et *geoides* Pall.  
 v. *Sieversia anem.* etc. *trifoliata* Pall. v. *Comaropsis fragarioides*.

**Drymaria** W., Hainling, V. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

*cordata* W., herzförmiger, 4. w. Südamerika.

*gracilis* Lk., schlanker, 4. w. Brasilien.

- Drymonia** Mart., Waldglocke, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.  
 calcarata Mart., gespornte, 4. w. Brasilien.  
 serrulata Mart. (*Jacquini* G. Don, *bicolor* Lindl.), sägezähnlige, 4. f. Sch. w. Westindien.
- Drypetes** Vahl, Schlitzdorn, XXII. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
 crocea Poit., safranfarbener, f. w. Westindien.
- Drypis** L., Knotenkraut, V. III., Caryophyllaceae.  
 spinosa L., stacheliges, ♂. 4. f. k. Krain, Istrien, Italien, Nordafrika.
- Dulichium** P., Dulichium, III. I., Cyperaceae.  
 spathaceum P., scheidiges, 4. f. k. Nordamerika.
- Dumasia** DC. (M. Dumas, französischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 pubescens DC., weichhaarige, 4. Sch. t. Nepal.  
 villosa DC., zottige, 4. Sch. t. Nepal.
- Dumerilia** Lagasc. (M. A. M. Constant Dumeril, französischer Zoolog), XIX. I., Compositae-Eupatorineae.  
 paniculata DC., rispige, f. w. Peru.
- Duranta** L. (Castor Durantes, alter italienischer Arzt und Kräutersammler), XIV. II., Verbenaceae.  
 argentea Lod., silberfarbige, f. w. ? Ostinden.  
 Ellisia L., Ellis's, f. w. Westindien.  
 inermis Mill., unbewehrte, f. w. Südamerika.  
 macrocarpa H. B. K. (? *dentata* P.), großfrüchtige, f. Südamerika.  
 Mutisii L., Mutis's, f. w. Neugranada.  
 Plumierii L., Plumier's, f. w. Südamerika.  
 xalapensis H. B. K., xalapensische, f. w. Mexico.
- Durio** L. (malayischer Name), XVIII. I., Malvaceae.  
 Zibethinus L., wohlschmeckender, f. w. Molucken.
- Duvalia** Haw. v. *Stapelia*.
- Duvaua** Kunth (M. Duvau, französischer Botaniker), XXI. VII., Amyrideae.  
 dependens DC., herabhängende, f. k. t. Chili.  
 dentata DC., gezähnelte, f. k. t. Sandwichinseln.  
 latifolia Gill. (*dependens* γ) Hook.), breitblättrige, f. k. t. Chili.  
 ovata Lindl., eiförmige, f. t. Chili.
- Dyckia** Schult. fil. (Fürst von Salm-Dyck, berühmter Kenner der Saftpflanzen), VI. I., Bromeliaceae.  
 rariflora Sch. fil. (*remotiflora*), entferntblumige, 4. w. Brasilien.
- Dysodium divaricatum** Rich. v. *Malampod divaricatum*.
- Dyssodia** Cav., *Dyssodia*, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
 appendiculata Lagasca, anhängselige, ♂. f. m. Mexico.  
 chrysanthemoides DC. (*glandulosa* Cav.), wucherblumenähnliche, ♂. f. m. Mexico.  
 incana Lagasca, weißgraue, ♂. f. m. Mexico.  
 Porophyllum Cav., drüsenblättrige, ♂. f. m. Neuspan.  
 pubescens Lagasca, weichhaarige, ♂. f. m. Mexico.  
*Porophyllum* W. non Cav. v. *Lebetina cancellata*.
- Dyssophylla** Blume, Stinkmünze, XIV. I., Labiatae.  
 pumila Benth., kleine, 4. f. k. Nepal.  
 quadrifolia Benth., vierblättrige, 4. f. t. Nepal, Ostind.

- Ebenus** L. (Abnous, arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*cretica* L., cretische, ♀. k. Creta.  
*pinnata* Ait. Dsf., gefiederte, ♂. k. Nordafrika, Kleinasien.
- Ecastaphyllum** P. Br., Kreishülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*Brownei* Rich. P., Brown's, ♀. Sch. w. Westindien.  
*Plumieri* P., Plumier's, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*Sieberi* Rchb., Sieber's, ♀. Sch. w. Guinea.
- Eccremocarpus** R. et P., Hängkapsel, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.  
*longiflorus* Humb., langblumige, ♀. Sch. t. Peru.  
*scaber* R. et P. v. *Calampelis scabra*.
- Echenais** Cass., Rauschdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.  
*carlinoides* Cass., eberwurzähnliche, ♂. f. Caucasus.
- Echeveria** DC., Echeverie, X. IV., Corniculatae-Crassulaceae.  
*coccinea* DC., scharlachfarbige, ♀. k. t. Mexico.  
*grandifolia* Haw., großblättrige, ♀. t. Mexico.  
*gibbiflora* DC., höckerigblumige, ♀. t. Mexico.  
*lurida* Haw., bleifarbig, 4. t. Mexico.  
*racemosa* Otto, traubige, 4. t. Mexico.  
*secunda* Booth., einseitige, 4. t. Mexico.
- Echinacea** Mch., Stachelkopf, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.  
*angustifolia* DC., schmalblättriger, 4. f. b. k. Texas.  
*Dicksonii* Lindl., Dickson's, 4. f. b. k. Mexico.  
*heterophylla* D. Don, verschiedenblättriger, 4. f. b. k. Mexico.  
*napifolia* Swt., rübenblättriger, 4. k. t. Mexico.  
*purpurea* Mönch, purpurfarbiger, 4. f. Nordamerika.  
*serotina* D. Don, spätblühender, 4. f. Nordamerika.
- Echinaria** Dsf., Stachelgras, III. II., Gramineae.  
*capitata* Dsf., kopfförmiges, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.
- Echinocactus** Salm., Igelfackeldistel, XII. I., Cactaeae.  
 I. *Cereastri*.  
*denudatus* Lk. et Otto, kahle, ♀. w. Südbrasilien.  
*Eyriesii* Turp., Eyries's, ♀. w. Buenos Ayres.  
     β) *glaucus* Lind. γ) *Lehmanni* H. Dresd.  
*gibbosus* DC., höckerige, ♀. w. Jamaica.  
*leucanthus* Gillies, weißblumige, ♀. w. Chili.  
*multiplex* Hort. Berol., vielfältigende, ♀. w. Südbrasilien.  
     β) *monstrosus*.  
*oxygonus* Lk. et Otto, schmalkantige, ♀. Südbrasilien.  
*pulchellus* Mart., schöne, ♀. Mexico.  
*Schelhasii* Pfr. (*Boutillieri* Parm.), Schelhase's, ♀. w. ? Südamerika.  
*tubiflorus* H. Angl., röhrenblumige, ♀. w. Mexico.  
*turbinatus* H. Berol. Pfr., aufgetriebene, ♀. w. ? Südamer.
- II. *Genuini*.  
*aciculatus* Salm., feinstachelige, ♀. w. Brasilien.  
*acuatus* Lk. et Otto, scharfkantige, ♀. w. Montevideo.  
*acutissimus* H. Berol., spitzigste, ♀. w. Chili.  
*anfractuusus* Mart., gewundene, ♀. w. Mexico.  
*armatus* Salm., bewaffnete, ♀. w. ? Südamerika.  
*? aureus* Mey., goldfarbige, ♀. w. Peru.  
*centeterius* Lehm., dichtblumige, ♀. w. Südamerika.  
*Ceratistes* Otto, gehörnte, ♀. w. Chili.



## Echinocactus

- ?cereiformis DC., cereusähnliche, f. w. Mexico.  
 cornigerus DC., hornstachelige, f. w. Mexico.  
 corynodes H. Berol. (*acutangulus* Zucc., *rosaceus* et *Sellowianus* Hort.), spitzkantige, f. w. Mexico.  
 crispatus DC., krause, f. w. Mexico.  
 depressus DC., niedergedrückte, f. w. Südamerika.  
 dichroacanthus Mart., verschiedenstachelige, f. w. Mexico.  
 Echidne DC., starrstachelige, f. w. Mexico.  
 exsculptus Otto (*subgibbosus* Haw., *Acanthion* et *interruptus* H. Berol., *Cereus montevidensis* Hortul.), webtstachelige, f. w. Chili, Mexico.  
 formosus H. Angl., schöne, f. w. Mendoza.  
 gladiatus Lk. et Otto, degenförmige, f. w. Mexico.  
 glaucescens DC., blaugrüne, f. w. Mexico.  
 Hoffmannseggii H. Dresd., Hoffmannsegg's, f. w. Südamer.  
 hybocentrus Lehm., braunstachelige, f. w. Brasilien.  
 ingens Zucc., große, f. w. Mexico.  
 intortus DC., einwärtsgedrehte, f. w. Antigua.

### β) purpureus Plum.

- intricatus H. Berol., verworrene, f. w. Montevideo.  
 Karwinskii Zucc., Karwinski's, f. w. Mexico.  
 Langsdorffi Lehm., Langsdorf's, f. w. Brasilien.  
 leucacanthus Zucc., weißstachelige, f. w. Mexico.  
 Linkii Lehm., Link's, f. w. Mexico.  
 Mackieanus Hook., Mackie's, f. w. Chili.  
 macrodiscus Mart., großscheibige, f. w. Mexico.  
 mammillarioides Hook., mammillarienähnliche, f. w. Chili.  
 melocactiformis DC., melonenähnliche, f. w. Mexico.  
 muricatus H. Berol., weichstachelige, f. w. Südbrasilien.  
 obvallatus DC., verschanzte, f. w. Mexico.  
 oligacanthus Mart., wenigstachelige, f. w. Mexico.  
 ornatus DC., gezielte, f. w. Mexico.  
 orthacanthus Lk. et Otto, geradstachelige, f. w. Montevideo.  
 Ottonis Lehm., Otto's, f. w. Mexico.

### β) tenuispinus Lk. et Otto. Brasilien.

- oxypterus Zucc. (? *Hystrix* DC.), schmalflügelige, f. w. Mexico.

- pachycentrus Lehm., dickköpfige, f. w. Brasilien.  
 parvispinus DC., kleinstachelige, f. w. Westind., Südamer.  
 Pfeifferi Zucc., Pfeiffer's, f. w. Mexico.  
 phyllacanthus Mart., blattstachelige, f. w. Mexico.  
 platyacanthus Lk. et Otto, breitstachelige, f. w. Mexico.  
 polyacanthus Lk. et Otto, vielstachelige, f. w. Brasilien.  
 pruinosis Otto (*Cereus roridus* Hort.), bereifte, f. w. Brasil.  
 recurvus Lk. et Otto (*glaucus* Karw.), zurückgekrümmte, f. w. Peru, Mexico.  
 rhodacanthus Salm (*coccineus* H. Berol.), rothstachelige, f. w. Mendoza.

- robustus Otto (*spectabilis subuliferus* Hort. *viviparus* Hort.), starke, f. w. Mexico.

### β) prolifer (*agglomeratus* Karw.), γ) monstrosus.

- sclerothrix Lehm., harthaarige, f. w. Südamerika.  
 Sellowianus Lk. et Otto, Sellow's, f. w. Montevideo.  
 sessiliflorus Hook., stiellose, f. w. Mexico.  
 Sickmanni Lehm., Sickmann's, f. w. Südamerika.  
 Spina Christi Zucc. (*Fischeri* H. Berol.), Christdorn-J., f. w. Brasilien.  
 spiralis Karw. (*Besleri*, *affinis agglomeratus* Hortul.), spiralförmige, f. w. Mexico.

**Echinocactus**

- subuliferus Lk. et Otto, pfriemenförmige,  $\frac{1}{2}$  w. Mexico
- tephracanthus Lk. et Otto, strahlstachelige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasil.
- tortuosus Lk. et Otto (*muricatus* Hort.), gedrehte,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.

tuberculatus Lk. et Otto, höckerige,  $\frac{1}{2}$  w. Mexico.

*Scopa* H. Berol. v. *Cereus Scopa*.

*Echinochloa* P. B. v. *Oplismenus*.

**Echinophora** L., Stacheldolde, V. II., Umbelliferae.  
*spinosa* L., gemeine, 4. f. b. k. Südeuropa, Engl., Nordafrika.  
*tenuifolia* L., feinblättrige, 4. f. b. k. Süditalien, Griechenland, Taurien.

*trichophylla* Sm., haarblättrige, 4. k. Creta.

**Echinopogon** P. B., Stachelbart, III. II., Gramineae.  
*ovatus* P. B. (*Agrostis ovata* La Bill.), eiförmiger, 4. k. t. Neuholland, Neuzeeland.

**Echinops** L., Kugeldistel, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

*banaticus* Roch., banatische, 4. f. Banat.

b) *albus*.

*dahuricus* Fisch., dahurische, 4. f. Dahurien.

$\beta$ ) *angustilobus* (*ruthenicus* Bess. non MB.).

*exaltatus* Schrad. (*strictus* Fisch.), hohe, ♂, f. ? Osteuropa.  
*glaberrimus* DC. (*Prescottii* Fisch. et Mey.), glatte, 4. f. Syrien.

*Gmelini* Turz., Gmelin's, ♂. f. Sibirien.

*graecus* Mill. (*lanuginosus* Lam.), griechische, 4. f. Griechenland.

*horridus* Dsf., rauhe, 4. f. Persien.

*humilis* MB., niedrige, 4. f. Ostsibirien.

*persicus* Stev. et Fisch., persische, ♂. f. Caucasus.

*platylepis* Trautv. (*humilis* Rchb.), breitschuppige, ♂. 4. f. ?

*Ritro* L., italienische, ♂. f. Südeuropa, Südrussland.

$\beta$ ) *tenuifolius* Fisch.  $\gamma$ ) *polycephalus* Gouan (*virgatus* Lam.).

*ruthenicus* MB. (*tauricus* W.), russische, ♂. f. Südrussl.

*sphaerocephalus* L. (*viscosus*, *ruthenicus*, *villosus*, *altai-cus*, *giganteus*, Auctor. et hortul.), gemeine, 4. f.

Mittel-, Süd- u. Westeuropa, Siebenbürg., Taur., Sibir.

$\beta$ ) *glabratus* (*paniculatus* Bot. reg.).  $\gamma$ ) *paniculatus* Jacq.

*spinosa* L. (*tunetanus* Vahl), stachelige, 4.  $\frac{1}{2}$  k. Creta, Nordafrika.

*strigosus* L., striegelige, ♂. f. Spanien.

*Szowitzii* Fisch. et Mey., Szowitz's, ♂. f. Nordpersien.

*Tournefortii* Ledeb. (*strigosus* MB.), Tournefort's, 4. f. Caucasus.

*viscosus* MB., schmierige, 4. f. Taurien.

Unbestimmt: *pungens* Loud., ♂. f. Russland.

**Echinospermum** Sw. Lehm., Stachelsame, V. I., Asperifoliaceae.

*barbatum* Lehm., bärtiger, ♂. f. Taurien, Caucasus.

*caspicum* Fisch. et Meyer, caspischer, ♂. f. Turcomanien.

*consanguineum* Fisch. et Mey., verwandter, ♂. f. Südrussl.

*deflexum* Lehm., herabgebogener, ♂. f. Deutschland, Schweiz, Ungarn, Lappland.

*gracile* Lehm., schlanker, ♂. f. Chili.

*Lappula* Lehm., gemeiner, ♂. f. Europa, Asien, Nordamer.

$\beta$ ) *squarrosus* Rchb.

*leiocarpum* Fisch. et Mey., glatter, ♂. f. Neucalifornien.

**Echinosperrum**

- leucanthum Ledeb., weifsblumiger, ☉. f. Südrufsland.  
 marginatum Lehm., gerandeter, ☉. f. Caucasus.  
 minimum Lehm., kleinster, ☉. f. Sibirien.  
 patulum Lehm. (*squarrosus* MB., *Redowskii* Hornem.),  
 ausgebreiteter, ♂. f. Caucasus, Sibirien.  
 Szovitsianum Fisch. et Mey., Szowits's, ☉. f. Nordpersien.  
 virginicum Lehm., virginischer, ♂. f. Virginien.

**Echites** L., Klammerstrauch, V. 1., Contortae-Apocynae.

- antidysenterica Roth, ruhrvertreibender, ♂. Sch. w. Ostind.  
 biflora Jacq., zweiblumiger, ♂. Sch. w. Westindien.  
 hispinosa Thbg., zweidorniger, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.  
 caryophyllata Roxb., nelkenähnlicher, ♂. Sch. t. Ostind.  
 cymosa W., afterdoldiger, ♂. Sch. w. Ostindien.  
 difformis Walt., unförmlicher, ♂. Sch. t. Carolina.  
 domingensis Sw., domingensischer, ♂. Sch. w. Westind.  
 frutescens Roxb., strauchiger, ♂. Sch. w. Ostindien.  
 grandiflora Roth (*macrantha* Spgl.), grofsblumiger, ♂.  
 Sch. w. Ostindien.

- Heynii Spgl. (*dichotoma* Roth), Heyne's, ♂. Sch. w. Ostind.  
 longiflora Dsf., langblumiger, ♂. Sch. w. Brasilien.  
 malabarica Lam., malabarischer, ♂. Sch. w. Malabar.  
 paniculata Poir., rispiger, ♂. Sch. w. Südamerika.  
 peltata Lock., schildförmiger, ♂. Sch. w. Trinidad.  
 reticulata Roth, netzförmiger, ♂. Sch. w. Ostindien.  
 Richardii R. et S., Richard's, ♂. Sch. w. Guiana.  
 stellaris Lindl., sternförmiger, ♂. Sch. w. Brasilien.  
 suberecta Jacq., fastaufrechter, ♂. Sch. w. Jamaica.  
 succulenta Thbg., saftiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 tomentosa Vahl, filziger, ♂. Sch. w. Cayenne.  
 torosa Jacq., wulstiger, ♂. Sch. w. Jamaica.  
 tuberosa Haw., knolliger, ♂. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.  
 umbellata Jacq., doldiger, ♂. Sch. w. Jamaica.

*caudata* L. v. *Strophanthus dichotomus*. *corymbosa*  
 Jacq. et *floribunda* Sw. vid. *Parsonsia corymb.* et  
*floribund.* *nutans* Anders. (*sanguinolenta* Juss.) v.  
*Haemadictyon venosum*.

**Echium** T., Natterkopf, V. 1., Asperifoliaceae.

- aculeatum DC., stacheliger, ♂. k. Canarische Inseln.  
 ambiguum DC., zweifelhafter, ♂. k. Canarische Inseln.  
 amoenum Fisch. et Mey., lieblicher, ♂. 4. Nordpersien.  
 argenteum L. (*fruticosum* Jacq., *ferocissimum* Andr.),  
 silberfarbiger, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 australe DC., südlicher, ☉. f. Südeuropa.  
 banaticum H. Vindob., banatischer, ♂. 4. f. Banat.  
 bifrons DC., zweiflügeliger, ♂. t. Canarische Inseln.  
 brachyanthum Hornein., kurzblumiger, ♂. k. Canar. Inseln.  
 candicans L. (*nervosum* Ait.), weifslicher, ♂. k. Madeira.  
 capitatum L., kopfförmiger, ♂. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
 caudatum Thbg., geschwänzter, 4. ♂. k. t. Cap d. g. H.  
 creticum L. (*rubrum* Mch.), cretischer, ☉. f. Griechenl.  
 cynoglossoides R. et S., hundsungenähnlicher, ♂. k.  
 Canarische Inseln.  
 densiflorum DC., dichtblumiger, ♂. k. Canarische Inseln.  
 diffusum Sibth., weitschweifiger, ☉. f. Creta.  
 elegans Lehm. (*hispidum* Sibth., *Siphthorpii* R. et S.), zier-  
 licher, ♂. f. Süditalien, Griechenland.  
 fastuosum Jacq., prächtiger, ♂. k. Canarische Inseln.  
 foliosum Lehm., blätterreicher, ♂. k. Canarische Inseln.



## Echium

formosum P. (*grandiflorum* Andr.), schöner, ⚥. t. k.

Cap der guten Hoffnung.

fruticosum L., strauchiger, ⚥. k. t. Cap d. g. Hoffn.

giganteum L., riesenhafter, ⚥. k. Teneriffa.

glabrum Vahl (*falcatum* Lam.), kahler, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

glaucophyllum Jacq., blaugrüner, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

grandiflorum Dsf. (*macranthum* R. et S.), großblumiger,

⊙. f. Nordafrika.

hispidum Thbg., hackeriger, ⚥. t. k. Cap d. g. H.

italicum L. (*asperimum* MB., *altissimum* Jacq.), ♂. f.

England, Südeuropa, Caucasus.

laevigatum L., glatter, ⚥. k. t. Cap d. guten Hoffn.

lineatum Jacq., linirter, ⚥. k. Canarische Inseln.

longifolium Delil., langblättriger, ⊙. f. Aegypten.

longiflorum Dum., langblumiger, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

lusitanicum L., portugiesischer, ⊙. f. Portugal.

macrophyllum Lehm., großblättriger, ⚥. k. Canarische Inseln.

maritimum W. (*setosum* Delil.), Meerstrand-N., ⊙. f. Sicilien, Nordafrika, Aegypten.

Mertensii Lehm., Merten's, ♂. 4. f. Spanien.

molle Lagasc. (*lasiophyllum* Lk.), weicher, ⚥. k. Canarische Inseln.

orientale L., morgenländischer, ⊙. f. Armenien.

paniculatum Thbg., rispiger, ⚥. t. k. Cap der gut. H.

parviflorum Roth (*micanthum* Schousb., ? *calycinum* Viv.), kleinblumiger, ⊙. f. Südeuropa, Nordafrika.

? β) prostratum Ten.

plantagineum L., wegrittblättriger, ⊙. f. Süd- und Westeuropa.

prostratum Delil., niedergestreckter, ⊙. f. Aegypten.

pustulatum Sibth. Sm., blättriger, ♂. f. Istrien, Dalmatien, Süditalien, Griechenland.

pyramidatum Dum., pyramidenförmiger, ⚥. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pyrenaicum L. (*pyramidale* Lapey.), pyrenäischer, ♂. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.

rubrum Jacq., rother, ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Galicien, Taurien, Sibirien.

salmanticum Lagasc., spanischer, ♂. f. Spanien.

simplex DC., einfacher, ⚥. k. Canarische Inseln.

spathulatum Viv., spathelförmiger, ⚥. k. Nordafrika.

spicatum L., ährenförmiger, 4. k. t. Cap der gut. H.

strictum L., steifer, ⚥. k. Canarische Inseln.

strigosum Sw., striegeliger, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

tenue Roth (*humile* Dsf.), dünner, ♂. f. Nordafrika, Sicilien.

thyrsoideum Juss., straußförmiger, ♂. f. ? Südeuropa.

tuberculatum Lk., höckeriger, ♂. f. Portugal.

verrucosum Sw., warziger, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

violaceum L. (*valentinum* Lagasc.), violetter, ⊙. f. Süd- und Westeuropa.

virescens DC., grünlicher, ⚥. k. Canarische Inseln.

vulgare L., gemeiner, ♂. f. Europa, Nordamerika.

β) Wierzbickii Haberl.

**Eclipta** L., Mehlblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

erecta L., aufrechte, ⊙. f. Aegypten, Kleinasien, Nord- und Südamerika.

**Eclipta**

- latifolia L. suppl., breitblättrige, ♂. t. Ostindien.  
 longifolia Schrad., langblättrige, ☉. f. m. Westindien.  
 procumbens Mchx., niederliegende, ☉. f. Carolina.  
 prostrata L., niedergestreckte, ♂. f. m. Ostindien.  
 punctata L., punktirte, ♂. t. w. Westindien.  
 undulata W., wellenförmige, ♂. t. w. Ostindien.

*Ectasis* D. et G. Don v. *Erica*.

- Edrajanthus** A. DC., Zwergglocke, V. 1., Campanulaceae.  
 graminifolius A. DC., grasblättrige, 4. f. Ungarn, Italien.  
 Kitaibelii A. DC., Kitaibel's, 4. f. Ungarn.  
 Pumilio A. DeC., kleine, 4. f. b. k. Dalmatien.  
 serpyllifolius A. DC., quendelblättrige, 4. f. b. Dalmatien.  
 tenuifolius A. DC., feinblättrige, 4. f. Istrien, Dalmatien.

**Edwardsia** Salisb. (S. Edwards, englischer Botaniker),  
 X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- chilensis Miers, chilesische, ♀. k. t. Chili.  
 chrysophylla Salisb., goldblättrige, ♀. k. Sandwichinsel.  
 denudata DC., kahle, ♀. w. Mascarenas.  
 grandiflora Salisb. (*tetraptera* Lk.), großblumige, ♀. k.  
 Neuzeeland,  
 microphylla Salisb., kleinblättrige, ♀. k. Neuzeeland.  
 minima Lod. (*myriophylla* Hort.), kleinste, ♀. k. Neuzeel.  
 nitida DC., glänzende, ♀. w. Mascarenas.

**Egletes** Cass. Less., Egletes, XIX. 11., Compositae-  
 Corymbiferae.

- bellidiflora Less., maßliebenblumige, ♀. w. Südamerika.  
 domingensis Cass., westindische, ♀. w. St. Domingo.

**Ehretia** L. (D. G. Ehret, deutscher Botaniker), V. 1.,  
 Asperifoliaceae.

- acuminata RB., zugespitzte, ♀. t. Neuholland.  
 aspera Roxb., rauhe, ♀. w. Ostindien.  
 buxifolia Roxb., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.  
 divaricata DC. (*Radula* Poir.), ausgespreizte, ♀. Westind.  
 dubia Jacq., zweifelhafte, ♀. w. Jamaica.  
 internodis L'Her., zwischenknotige, ♀. w. Mascarenas.  
 laevis Roxb., glatte, ♀. w. Ostindien, Neuholland.  
 laxa Jacq., lockere, ♀. w. Mascarenas.  
 microphylla Lam., kleinblättrige, ♀. w. Ostindien.  
 serrata Roxb., sägeblättrige, ♀. w. Ostindien.  
 tinifolia L., lorbeerblättrige, ♀. w. Westindien.

*Bourreria* Lam. v. *Beureria succulenta halimi-*  
*folia* L'Her. v. *Grabowskia boerhaaviaefolia*.

**Ehrharta** Thbg. (F. Ehrhart, deutscher Botaniker),  
 VI. 1., Gramineae.

- calycina Sm., gekelchte, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 distichophylla LaBill., zweizeiligblättrige, 4. k. t. Neuholl.  
 gigantea Ehrh., riesenhafte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 panicea Sm., fennichartige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*stipoides* LaBill. v. *Microlaena stipoides*.

**Ekebergia** Sparm. (C. G. Ekeberg, schwedischer Naturforscher und Reisender), X. 1. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

- capensis Sparm., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Elaeagnus** T., Oleaster, IV. 1., Sandalaceae.

- acuminata Lk., zugespitzter, ♀. k. t. ?  
 angustifolia L. (*hortensis* MB.), schmalblättriger, ♀. f.  
 Südeuropa, Kleinasien, Taurien, Aegypten.

**Elaeagnus**

- β) dactyliformis Hort. γ) orientalis L. δ) spinosa L.  
 arborea Roxb., baumartiger, f. k. t. Nepal.  
 argentea Pursh, silberfarbiger, f. f. Nordamerika.  
 conferta Roxb., dichtblumiger, f. k. t. Nepal.  
 latifolia L. (*macrophylla* Thbg.), breitblättriger, f. f.  
 Ceylon, Japan.  
 salicifolia ? D. Don, weidenblättriger, f. f. b. ?

Gartenvariet.: flava, fusca, nepalensis, songarica.

- Elaeis** Jacq., Oelpalme, XXII. vi. (VI. iii.), Palmae.  
 guineensis Jacq., guineische, f. w. Guinea, Westindien.  
 melanococca G., schwarzfrüchtige, f. w. Neugranada.  
 occidentalis W., westindische, f. w. Westindien.  
 pernambucana Lod., pernambucanische, f. w. Brasilien.

- Elaeocarpus** L., Oelfrucht, XI. i., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

- grandiflorus Wall., großblumige, f. w. Ostindien.  
 reticulatus Sm. (*cyaneus* Sims), netzförmige, f. t. Neuholl.  
 serratus L., sägezahnige, f. w. Ostindien.

dentatus Vahl v. *Dicera dentata*. *peduncularis* La Bill. v. *Friesia peduncularis*.

- Elaeodendron** Jacq., Oelstrauch, V. i., Evonymeae.  
 australe Vent., neuholländischer, f. t. Neuholland.  
 glaucum P., blaugrüner, f. w. Ceylon.  
 integrifolium Trat., ganzblättriger, f. t. Neuholland.  
 orientale Jacq., morgenländischer, f. w. Madagascar.  
 xylocarpum DC., holzfrüchtiger, f. w. Antillen.

*Argan* W. v. *Argania Sideroxylon*.

- Elaphrium** Jacq., Elaphrium, VIII. i., Amyrideae.

- glabrum Jacq., glattes, f. w. Neugranada.

- Elate** L., Tannenpalme, XXI. vi., Palmae.

- sylvestris L., Wald-T., f. w. Ostindien.

- Elaterium** L., Springkapsel, XXI. x. (XVI. iii.), Cucurbitaceae.

- carthagenense L., carthagenensische, ♂. Sch. m. Südamer.  
 tamnoides W., schmeerwurzähnliche, ♂. Sch. m. Mexico.

- Elatine** T., Tannenwedel, VIII. iv., Lythriariae (*Salicariae*).

- Alsinastrum L., quirlblättriger, ♂. f. Europa.  
 hexandra DC. (*tripetala* Sm.), sechsmänniger, ♂. f. Europa.  
 Hydropiper L., gemeiner, ♂. f. Europa.  
 major A. Braun, größer, ♂. f. Westdeutschland, Frankreich.

- Schkuhriana Drev. et Hayne, Schkuhr's, ♂. f. Deutschl.  
 triandra Schk., dreimänniger, ♂. f. Deutschland.

- Elegia** Thunb., Elegie, III. iii. (XXII. iii.), Restiaceae.  
 juncea Thbg., simsenförmige, 4. k. t. Cap d. gut. H.  
 racemosa Lam., traubige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

- Eleiotis** DC., Eleiotis, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- sororia DC., verschwisterte, ♂. Sch. w. Ostindien.

- Eleocharis** Auctor. v. *Heleocharis*.

- Eleogenus* ovatus N. E. v. *Heleocharis ovata*.

- Eleogiton fluitans* Lk. et *parvula* Lk. v. *Scirpus fluitans* etc.

- Elephantopus** L., Elefantenfuss, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

- angustifolius Sw., schmalblättriger, 4. w. Jamaica.  
 carolinianus W. (? *tomentosus* L.), carolinischer, 4. k. t.  
 Carolina, Virginien.



**Elephanthopus**

- mollis* H. B. K., weicher, 4. w. Südamerika.  
*nudicaulis* Poir., nacktstengeliger, 4. t. Carolina.  
*nudiflorus* W., nacktblumiger, 4. w. Westindien.  
*scaber* L., scharfer, 4. w. Ostindien.

*spicatus* Juss. v. *Distreptus spicatus*.

**Elephantosis** Fisch. et Mey., Elephantose, XIX. 1.,  
Compositae-Eupatorieae.

- liatroides* Fisch. et Mey., schartenähnliche, 4. w. Brasilien.

**Eleusine** G., Eleusine, III. 11., Gramineae.

- calycina* Roxb., großkelchige, ☉. f. Ostindien.  
*coracana* G., krummährige, ☉. f. Ostindien, Japan.  
*distans* Lk., entferntstehende, ☉. f. ?  
*indica* G., indische, ☉. f. Aegypten, Ost- und Westindien, Süd- und Nordamerika.  
*oligostachya* Lk. (*rigida* Spgl.), wenigährige, ☉. f. ?  
*Tocussa* Fresen., *Tocussa-E.*, ☉, f. Abyssinien.  
*verticillata* Roxb., wirtelförmige, ☉. f. Ostindien.  
*filiformis* P., *tenerrima* Hornem. etc. v. *Leptochloa filiformis* etc.

**Elichrysum** W. v. *Helichrysum*.**Elisena** Lindl., Elisena, ? VI. 1., ? Coronariae-Asphodeleae.  
*longipetala* Lindl., langkronige, 4. Zw. t. w. Lima.**Elliotia** Mühlbg. (Stephan Elliot, nordamerikanischer Botaniker), VIII. 1., Ericaceae.

- racemosa* Mühlbg., traubige, f. f. b. k. Georgia (Nordamer.)

**Ellisia** L. (J. Ellis, berühmter englischer Naturforscher), V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

- Nyctelaea* L., virginische, ☉. f. Virginien.

**Ellobocarpus oleraceus** Kaulf. v. *Ceratopteris thalictroides*.**Elodea** Mchx., Elodea, III, 111., Hydrocharideae.

- canadensis* Mchx., canadische, ☉. Wa. f. k. Nordamerika, Westindien.

**Elodea pulchella** Loud. v. ?**Elsholtzia** W. (J. S. Elsholtz, preussischer Botaniker), XIV. 1., Labiatae.

- cristata* W., kammige, ☉. f. Sibirien.  
*ocymoides* P., basilicumähnliche, 4. w. Ostindien.  
*paniculata* W., rispige, ♂. w. Ostindien.

**Elymus** L., Haargras, III. 11., Gramineae.

- arenarius* L., Sand-H., 4. f. Europa, Sibirien.  
*canadensis* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.  
*Caput Medusae* L. (*crinitus* MB.), langborstiges, ♂. f. Spanien, Portugal, Taurien, Ungarn.  
*crinitus* Schreb. (*intermedius* MB.), bemähntes, ☉. f. Ungarn, Taurien, Orient, Nordafrika.  
*dahuricus* Ledeb. Loud., dahurisches, 4. f. Dahurien.  
*Delileanus* Schult. (*aegyptiacus* Spgl.), Delil's, ☉. f. Aegypten.  
*europaeus* L., europäisches, 4. f. Europa, Caucasus, Nordamerika.  
*geniculatus* Curt., gegliedertes, 4. f. England, Schweden, Holland.  
*giganteus* Vahl (? *mexicanus* Cav., *macrostachyus* Spgl.), riesenhaftes, 4. f. ?  
*glaucifolius* Mühlbg., blaugrünblättriges, 4. f. Nordamer.  
*philadelphicus* L., philadelphisches, 4. f. Nordamerika.  
*platatherus* Ehrbg. Lk., lauggranniges, ☉. f. Aegypten.

**Elymus**

- propinquus Fresen., verwandtes, 4. f. Nordamerika.  
 sabulosus MB., sandliebendes, 4. f. Taurien, Sibirien, Caucasus.  
 sibiricus L. (*tener* L. suppl.), sibirisches, 4. f. Sibirien.  
      $\beta$ ) ramosus Dsf.  
 striatus W. (*hordeiformis* R. et S.), gestreiftes, 4. f. Nordamerika.  
 villosus Mühlbg., zottiges, 4. f. Nordamerika.  
 virginicus L., virginisches, 4. f. Nordamerika.  
*Hystrix* L. v. *Gymostichum Hystrix*.

**Elyna** Schrad., Hüllried, III. 1., Cyperaceae.

- spicata Schrad., ährenförmiges, 4. f. Europäische Alpen.  
*caricina* M. et K. v. *Kobresia caricina*.

**Elytraria** Mchx., Elytrarie, II. 1., Acanthaceae.

- caulescens Loud., stengelige, ♂. w. Ostindien.  
 crenata Vahl, gekerbte, 4. w. Ostindien.  
 imbricata Vahl, dachziegelförmige, ♂. w. Westindien.  
 lyrata Vahl, leierförmige, ♂. w. Ostindien.  
 marginata Vahl, berandete, ♂. w. Guinea.  
 ramosa Humb., ästige, ♂. w. Mexico.  
 virgata Mchx., ruthenförmige, 4. k. Südcarolina.

**Embelia** Burm. (*Aembilla*, zeylamischer Name), V. 1., Sapotaceae-Ardisieae.

- robusta Roxb., starke, ♂. w. Ostindien.

**Emblica** G. (moluckischer Name), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- officinalis G., officinelle, ♂. w. Ostindien.  
 racemosa Spgl., traubige, ♂. w. Ostindien.

**Embothrium** Forst., Prachtstrauch, IV. 1., Proteaceae.

- strobilinum La Bill, zapfentragender, ♂. t. Neuholland.  
*buxifolium* Sm. etc. v. *Grevillea buxifolia* etc. *herbaceum* Cav. et *myricoides* G. (*silatifolia* Sm.) v. *Lomatia silatifolia* et *longifolia*. *salignum* Andr. v. *Hakea saligna*. *speciosissimum* Sm. v. *Telopea speciosissima*.

**Embryopteris glutinifera** Roxb. (*peregrina* G.), v. *Diospyros Embryopteris*.**Emex** Neck., Zwergampfer, VI. III., Portulacae-Polygoneae.

- spinosus Campd., stacheliger, ♂. f. Süditalien, Portugal, Griechenland, Nordafrika, Cap der guten Hoffnung.

**Empetrum** T., Rauschbeere, XXII. III., Tricoccae-Empetreae.

- nigrum L., schwarze, ♂. f. Europa, Mittel- u. Nordamer.  
      $\beta$ ) scoticum Hook.  
 rubrum Vahl, rothe, ♂. k. Magellanische Meerenge.  
*album* L. v. *Corema alba*,

**Empleurum** Soland., Empleurum, XXI. IV. (IV. 1.), Tricoccae-Rutaceae.

- serrulatum Ait., sägezähniges, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

**Enarthrocarpus** La Bill, Gliederschote, XV. 1., Cruciferae.

- arcuatus La Bill., bogenförmige, ♂. f. Syrien.  
 pterocarpus DC., flügelige, ♂. f. Aegypten.

**Encelia** Adans., Encelie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

- canescens Cav., grauliche, ♂. t. Peru.

**Encelia**

*halimifolia* Cav., meldenblättrige, ♀. t. Mexico.

*Encephalartos* Lehm. v. *Zamia* II.

**Encyanthus** Lour., Prachtglocke, X. 1., Ericaceae.

*biflorus* Lour., zweiblumige, ♀. t. China.

*quinqueflorus* Lour., fünfblumige, ♀. t. China.

*reticulatus* Lindl., netzförmige, ♀. t. China.

**Encyclia** Hook., Kreisstendel, XX. 1., Orchideae.

*viridiflora* Hook., grünblumiger, 4. w. Brasilien.

*patens* Hook. v. *Epidendrum odoratissimum*.

*Enneapogon* Desv. v. *Pappophorum*.

*Enodium* Gaud. v. *Molinia*.

**Entada** Adans. (malabarischer Name), X. 1. (XXIII. 1.),  
Leguminosae-Mimoseae.

*Adenanthera* DC., drüsige, ♀. Sch. w. Südseeinseln.

*Gigalobium* DC., westindische, ♀. Sch. w. Westindien.

*monostachya* DC., einährige, ♀. Sch. w. Ostindien.

*polystachya* DC., vielährige, ♀. Sch. w. Westindien.

*Pursaetha* DC., ostindische, ♀. Sch. w. Ostindien.

**Entelea** RB., Entelea, XIII. 1., Tiliaceae.

*arborescens* RB., baumartige, ♀. t. Neuzeeland.

*palmata* Lindl., handförmige, ♀. t. ?

**Epacris** Forst., Felsbusch, V. 1., Epacrideae.

*apiculata* Cunn., kurzspitziger, ♀. t. Neusüdwallis.

*auriculata* Benth., geöhrt, ♀. t. Neuholland.

*campanulata* Lodd., glockenblumiger, ♀. t. Neuholland,  
Van-Diemens-Land.

β) *alba*.

*ceraeflora* Grah., wachsbäumiger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*coriacea* A. Cunn., lederartiger, ♀. t. Neu-Cambria.

*crassifolia* RB., dickblättriger, ♀. t. Neuholland.

*exserta* RB., langfadiger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*grandiflora* Sm. (*longiflora* Cav.), großblumiger, ♀. t.  
Neuholland.

*heteronema* LaBill., haariger, ♀. t. Van-Diemens-Land,  
Neuholland.

β) *subreflexa* DC. (*heteronema* Hook.).

*impressa* LaBill., eingedrückter, ♀. t. Neuholland.

β) *parviflora* Lindl.

*lanuginosa* LaBill., wolliger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*microphylla* RB., kleinblättriger, ♀. t. Neuholland.

*mucronulata* RB., stachelspitziger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*myrtifolia* LaBill., myrtenblättriger, ♀. t. Van-Diemens-Ld.

*nivea* DC. (*nivalis* Grah.), schneeweiß, ♀. t. Neuholl.

*obtusifolia* Sm., stumpfblättriger, ♀. t. Neuholland,  
Van-Diemens-Land.

*onosmaeflora* Cunn., lotwurzblumiger, ♀. t. Neuholland.

*paludosa* RB., sumpfliebender, ♀. t. Neuholland.

*pauciflora* Less. et Rich., wenigblumiger, ♀. t. Neuzeel.

*pedicellata* DC. (*microphylla* Gaudich.), gestielter, ♀. t.  
Neuholland.

*pulchella* Cav., schöner, ♀. t. Oestliches Neuholland.

*purpurascens* RB., purpurfarbiger, ♀. t. Neuholland.

h) *rubra*.

*rigida* Shr. (*carinata* Cunn.), starrer, ♀. t. Neuholland.

*riparia* RB., uferliebender, ♀. t. Neuholland.

*ruscifolia* RB., mäusedornblättriger, ♀. t. Neuholland.

*serpyllifolia* RB., quendelblättriger, ♀. t. Van-Diemens-  
Land.



**Epacris**

*sparsa* RB., zerstreutblumiger, ♂. t. Neuholland.  
*variabilis* Lodd., veränderlicher, ♂. t. Neuholland, Van-  
 Diemens-Land.

*villosa* Cav., zottiger, ♂. t. Neuholland.

*attenuata* Lod. etc. v. *Lysinema pungens* β. *capitata* Poir. v. *Sphenotoma capitata*. *fasciculata* Forst.  
 v. *Leucopogon fascicul.* *frondosa* G. v. *Dracophyl-  
 lum longifolium.* *gracilis* Poir. v. *Sphenot.* *gracil.*  
*odorata* Sm. v. *Lysinema pungens.* *rosea* Lodd. v.  
*Lysinema pungens* β.

**Ephedra** L., Meerträubel, XXII. XIII. (XVI. v.), Taxineae (? Casuarineae).

*altissima* Dsf., höchstes, ♂. Sch. k. Nordafrika.

*distachya* L., zweiähriges, ♂. f. Südeuropa.

*monostachya* L., einähriges, ♂. f. Ungarn, Bessarabien,  
 Taurien, Sibirien.

**Ephemerum** Dodon. v. *Lysimachia*.

**Ephielis** *fraxinea* W. v. *Matayba guianensis*.

**Epidendrum** L., Baumstendel, XX. I., Orchideae.

*aemulum* Lindl., ähnlicher, 4. w. Para.

*anceps* Lod., zweikantiger, 4. w. Ostindien.

*angustifolium* Sw., schmalblättriger, 4. w. Jamaica.

*armeniaceum* Lindl., aprikosenblättriger, 4. w. Brasilien.

*aromaticum* Bate., gewürzhafter, 4. w. Guatemala.

*asperum* Lindl., rauher, 4. w. ? Südamerika.

*aurantiacum* Bate., orangefarbiger, 4. w. Guatemala.

*bicornutum* Hook., zweihörniger, 4. w. Trinidad.

*bifidum* Aubl., weispaltiger, 4. w. Westind., Guiana.

*Boothianum* Lindl., Booth's, 4. w. Cuba.

*calamarium* Lindl., rohrartiger, 4. w. Brasilien.

*cauliflorum* Lindl., stengelblumiger, 4. w. Brasilien.

*chloranthum* Lindl., grünblumiger, 4. w. Demerara.

*chloroleucum* Hook., grünweißlicher, 4. w. Demerara.

*ciliare* L., gefranzter, 4. w. Westindien.

*clavatum* Lindl., keulförmiger, 4. w. Cumana.

*cochleatum* L., löffelförmiger, 4. w. Westindien.

*conopseum* Bartr. (*Magnoliae* Mühlbg.), schneckenblumiger, 4. k. t. Südcarolina, Florida.

*coriaceum* Park., lederartiger, 4. w. Demerara.

*cucullatum* Lindl., kappenförmiger, 4. w. Para.

*cuspidatum* Lodd., langspitziger, 4. w. Westindien.

*dichotomum* Lindl., zweizinkiger, 4. w. Brasilien.

*diffusum* Sw., weitschweifiger, 4. w. Jamaica.

*ellipticum* Grah. Hook., elliptischer, 4. w. Brasilien.

*elongatum* Jacq., verlängerter, 4. w. Neugranada.

*equitans* Lindl., reitender, 4. w. Vera Cruz.

*floribundum* H. B. K., blüthenreicher, 4. w. Südamerika.

*fragrans* Sw. (*cochleatum* Curt.), wohlriechender, 4. w. Jamaica.

*fucatum* Lindl., geschmückter, 4. w. Havannah.

*fuscum* Sm. (*anceps* Jacq.), bräunlicher, 4. w. Westind.

*gracile* Lindl., schlanker, 4. w. Bahama.

*Harrisoniae* Hook., Harrison's, 4. w. Brasilien.

*jonosmum* Lindl., feinriechender, 4. w. Essequibo.

*lacerum* Lindl., zerschlitzter, 4. w. Havannah.

*lividum* Lindl., blaubrauner, 4. w. Columbia.

*longicolle* Lindl., langhälsiger, 4. w. Demerara.

*macrochilum* Hook., großlippiger, 4. w. Mexico.

*monophyllum* Hook., einblättriger, 4. w. Jamaica.

**Epidendrum**

nocturnum L., nächtlicher, 4. w. Westindien.

β) latifolium Lindl.

nutans Sw., überhängender, 4. w. Jamaica.

ochraceum Lindl., ockerfarbiger, 4. w. Mexico.

odoratissimum Lindl., starkkriechender, 4. w. Brasilien.

oncidoides Lindl., oncidiumähnlicher, 4. w. Südamerika.

pachyanthum Lindl., dickblumiger, 4. w. Guiana.

papillosum Bate., weichwarziger, 4. w. Mexico.

pastoris Llav., Hirten-B., 4. w. Mexico.

pictum Lindl., bemalter, 4. w. Demerara.

primulinum Lindl. (*altissimum* Bate.), primelblumiger, 4. w. Bahama.

pumilum Lindl., kleiner, 4. w. Calcutta.

pygmaeum Hook., zwergiger, 4. w. Brasilien.

rhizophorum Bate., wurzeltragender, 4. w. Guatemala.

rigidum Jacq., starrer, 4. w. Westindien.

Schomburgkii Lindl., Schomburgk's, 4. w. Südamerika.

secundum L., einseitiger, 4. w. Westindien.

selligerum Bate., sattelähnlicher, 4. w. Südamerika.

Skinneri Bate., Skinner's, 4. w. Cumana.

smaragdinum Lindl., smaragdfarbiger, 4. w. Demerara.

stenopetalum Hook., schmalkroniger, 4. w. Jamaica.

tessellatum Bate., würfeliger, 4. w. Guatemala.

tibicinis Bate., pfeifenähnlicher, 4. w. Honduras.

tridactylum Lindl., dreigabeliger, 4. w. Brasilien.

umbellatum Sw. (*difforme* Jacq.), doldiger, 4. w. Jamaica.

varicosum Bate., dickaderiger, 4. w. Guatemala.

variegatum Hook., bunter, 4. w. Brasilien.

verrucosum Sw., warziger, 4. w. Jamaica.

vesicatum Lindl., blasiger, 4. w. Brasilien.

viridipurpureum Hook., grünlichrother, 4. w. Jamaica.

*aloëfolium* L. (et *ensifolium* L. etc.) v. *Cymbidium*

*aloëfolium* etc. *altissimum* Jacq. v. *Oncidium*

*altissimum*. *amabile* L. vid. *Phalaenopsis amabilis*.

*caudatum* L. v. *Brassia caudata*. *flos aëris* L. v.

*Aerides arachnites*. *juncifolium* L. vid. *Oncidium*

*juncifolium*. *punctatum* L. v. *Cyrtopodium puncta-*

*tum*. *sanguineum* Swt. vid. *Broughtonia sanguinea*.

*scriptum* L. v. *Grammatophyllum speciosum*. *Vanilla*

L. v. *Vanilla aromatica*.

**Epigaea** L., Grundstrauch, X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

repens L., kriechender, f. f. Nordamerika.

β) rubicunda D. Don.

**Epilobium** L., Weidenröschen. VIII. 1., Onagrariae.

alpestre Jacq. (*trigonum* Schk.), Voralpen-W., 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

alpinum L. (*anagallidifolium* Lam.), Alpen-W., 4. f. Europäische Alpen.

β) nutans Tausch.

angustifolium L. (*spicatum* Lam.), schmalblättriges, 4. f. Europa.

b) album.

angustissimum Ait. (*angustifolium* Lam., *Dodonaei* Vill., *Halleri* Retz.), schmales, 4. f. Europäische Alpen.

coloratum Mühlbg., farbiges, 4. f. Nordamerika.

crassifolium Lehm., dickblättriges, 4. f. ?

dahuricum Fisch., dahurisches, ©. f. Dahurien.

hirsutum L. (*grandiflorum* All.), rauhaariges, 4. f. Europa, Asien.

**Epilobium**

$\beta$ ) *tomentosum* Vent. (*incanum* P.)  $\gamma$ ) *intermedium* Merat. —  $\delta$ ) *variegatum* Dens.

*hypericifolium* Tausch., *johanniskrautblättriges*, 4. f. Böhmen.

*latifolium* L., *breitblättriges*, 4. f. Nördlichstes Europa und Asien.

*mexicanum* DC., *mexicanisches*, 4. k. Mexico.

*minutum* Lindl., *kleinstes*, 4. f. ? Rußland.

*montanum* L., *Berg-W.*, 4. f. Europa, Caucasus.

$\beta$ ) *lanceolatum* Sebast. (*nitidum* Host.).  $\gamma$ ) *collinum* Gmel.

*nutans* Hornem., *nickendes*, 4. f. Dänemark.

*obscurum* Schreb., *dunkles*, 4. f. Deutschland.

*organifolium* Lam. (*alsinesifolium* Vill.), *dostenblättriges*, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Schottland.

*palustre* L., *Sumpf-W.*, 4. f. Europa, Nordamerika.

$\beta$ ) *simplex* Tratt.

*parviflorum* Schreb. (*pubescens* Roth, *villosum* Ait.), *kleinblumiges*, 4. f. Europa.

$\beta$ ) *rivulare* Wahlenb.

*persicinum* Rchb. (*foliosum* \*), *pfirsichblüthfarbiges*, 4. f. Deutschland.

*roseum* Schreb. (*purpureum* Fries), *rosafarbiges*, 4. f. Europa.

*rosmarinifolium* Hänke (*Fleischeri* Hochst., *denticulatum* Wender.), *rosmarinblättriges*, 4. f. Tyrol, Schweiz etc.

*sericeum* Bernh., *seidenhaariges*, 4. f. ?

*squamatum* Nutt. (*lineare* Mühlbg., *rosmarinifolium* Pursh), *schuppiges*, 4. f. Pennsylvanien.

*strictum* Mühlbg. (*molle* Torr.), *steifes*, 4. f. Nordamer.

*tetragonum* L. (*ramosissimum* Mch., *trigonum* Hortul.), *vierkantiges*, 4. f. Europa, Nordamerika.

*villosum* Thbg., *zottiges*, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

*virgatum* Fries (*Schmidtianum* Rostk.), *ruthenförmiges*, 4. f. Norddeutschland, Dänemark, Schweden.

**Epimedium** T., Sockenblume, IV. 1., Berberideae.

*alpinum* L., *Alpen-S.*, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*diphyllum* Lodd. (*album* Hort.), *zweiblättriges*, 4. k. f. b. Japan.

*hexandrum* Hook., *sechsmännige*, 4. f. Nordamerika.

*macranthum* Lindl. (*grandiflorum* Siebold), *großblumige*, 4. k. f. b. Japan.

*pinnatum* Fisch., *gefiederte*, 4. k. f. b. Nordpersien.

*violaceum* Siebold, *violette*, 4. k. f. b. Japan.

**Epipactis** Sw., Sumpfwurz, XX. 1., Orchideae.

*atrorubens* Hoffm. (*purpurata* Sm., *latifolia*,  $\beta$ . *rubiginosa* Koch), *schwarzrothe*, Kn. 4. f. Deutschl., Engl.

*latifolia* All. Sw., *breitblättrige*, 4. Kn. f. Europa.

*microphylla* Sw., *kleinblättrige*, 4. Kn. f. Nord- und Mitteldeutschland.

*palustris* Sw., *gemeine*, 4. Kn. f. Europa.

*viridiflora* Rchb., *grünblumige*, 4. Kn. f. Deutschland.

*cucullata* La Bill. v. *Eriochilus autumnalis*. *ensiflora*

Sw. etc. v. *Cephalanthera ensifolia* etc. *Nidus avis*

All. Sw. v. *Neottia* Nid. av.

**Epiphyllum** Herm. Haw., Flügelblatt, XII. 1., Cacteeae.

A. *Cereastri* (et *Rhipsalis* Pfeiffer).

*Ackermanni* Haw., *Ackermann's*,  $\frac{1}{2}$ . w. Mexico.



**Epiphyllum**

alatum Haw., ächtes, f. w. Jamaica.  
 crispatum Haw., krauses, f. w. ? Südamerika.  
 β) latior Salm.

Hookeri Haw., Hooker's, f. w. Brasilien.  
 latifrons Zucc., breites, f. w. Mexico.  
 oxypetalum Hort., schmalkroniges, f. w. Mexico, Guatemala.  
 pachypterum (Pfeiff.), (*Cereus alat.* Lk. et Otto et Bot. mag.), dickes, f. w. Westindien.

β) crassior Salm.

Phyllanthus Haw., milzfarnähnliches, f. w. Südamerika,  
 platycarpum Zucc., breitfrüchtiges, f. w. Brasilien.  
 ramulosum Hort. (*ciliare, ciliatum* Hort.), ästiges, f. w. Jamaica.

rhombeum Hort. (*crenulatum* Hort.), rautenförmiges, f. w. ?  
 speciosum Haw. (*Cactus phyllanthoides* DC. *elegans* Lk. *alat.* Hortul.), prächtiges, f. t. w. Mexico.

Bastarde mit *Cereus speciosissimus* und *Epiphyll. speciosum*: β) *hybridum* Hort. γ) *Jenkinsonii* Hort. Angl. δ) *Vandesii* H. Angl. ε) *ignescens* H. Dresd. ζ) *Guillardieri*. η) *Curtisii*. θ) *Roydii*. ι) *Desvauxii*. κ) *Linkii*. λ) *Kiardi*. μ) *coccineum grandiflorum*. ν) *unduliflorum*. ξ) *Eugenia*. ο) *May fly*. π) *Makoyi*. ρ) *aurantiacum*. σ) *albiflorum*. τ) *grandiflorum* (mit *Cereus grandiflorus* befruchtet \*).

**B. Genuini.**

*Altensteinii* Pfeiff. (*truncatum multiflorum* Hort.), Altenstein's, f. w. Brasilien.

*truncatum* Haw., abgestutzter, f. w. Brasilien.

β) *coccineum* Hort. γ) *aurantiacum* Hort.

**Epipogium** Gmel. RB., Schuppenstendel, XX. 1., Orchideae.

*Gmelini* Rich., Gmelin's, 4. f. Deutschland, Schweiz, Caucasus, Sibirien.

**Epithecia** K. et W., Epithecie, XX. 1., Orchideae.

*glauca* K. et W., blaugrüne, 4. w. Mexico.

**Equisetum** T., Schachtelhalm, XXIV. 11., Equisetaceae.

*arvense* L., Acker-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

*Drummondii* Hook., Drummond's, 4. f. Schottland.

*fluviatile* L. (*Telmateia* Ehrh., *eburneum* Roth.), Fluß-S., 4. f. Europa, Sibirien, Nordafrika.

*hyemale* L., Winter-S., 4. f. Europa, Asien,

*limosum* L., Teich-S., 4. f. Europa.

*palustre* L., Sumpf-S., 4. f. Europa, Nordamerika.

*pannonicum* Kit., ungarischer, 4. f. Ungarn.

*pratense* Ehrh., Wiesen-S., 4. f. Deutschl., Oberitalien.

*reptans* Wahlbg. (*scirpoides* Mchx.), kriechender, 4. f. Scandinavien, Schweden, Nordamerika.

*sylvaticum* L., Wald-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

*umbrosum* Mey., schattenliebender, 4. f. Norddeutschland, Sachsen, Pyrenäen, Nordamerika.

*variegatum* W. (*multiforme* Vauch.), bunter, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Italien, Frankreich.

\*) Vorstehende Arten und Abarten gehören nach Dr. Pfeiffer theils zu *Cereus*, theils zu *Rhipsalis*, da aber die meisten Gärtner gewohnt sind, sie nach ihrer Blattgestalt als *Epiphyllum* aufzuführen, so haben wir sie einstweilen hier stehen lassen.

**Eragrostis** P. B. (et *Megastachya* P. B.), Liebesgras,  
III. II., Gramineae.

- abyssinica R. et S., abyssinisches, ☉. f. Abyssinien.  
aegyptiaca R. et S., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.  
amabilis P. B., liebliches, ☉. w. Ostindien.  
amboinensis R. et S., amboinisches, ☉. w. Molucken.  
capensis Trin. (*brizoides* R. et S.), capisches, 4. k.  
Cap der guten Hoffnung.  
capillaris Lk., haarförmiges, ☉. f. Nordamerika.  
ciliaris Lk., gefranztes, ☉. w. Ost- und Westindien.  
comta Lk., geziertes, 4. w. Monte-Video.  
cynosuroides R. et S., kammgrasähnliches, ☉. f. Aegypten, Ostindien.  
elongata Lk. (*dependens* Hornem.), verlängertes, 4. w. Ostindien.  
expansa Lk., ausgestrecktes, 4. w. Montevideo.  
filiformis Lk. (*tenella* Pursh. ? *Purshii* Bernh.), fadenförmiges, ☉. f. Nordamerika.  
*Megastachya* Lk. (*major* Host.), grofsähriges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
mexicana Lagasc., mexicanisches, ☉. f. Mexico.  
namaquensis N. E., namaquisches, ☉. f. Cap d. g. H.  
nigricans R. et S., schwärzliches, 4. w. Südamerika.  
nitida Lk., Ehrenbg., glänzendes, ☉. f. Aegypt., Nubien.  
pilosa P. B., haariges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
pilosissima Lk., starkhaariges, ☉. f. ? ?  
plumosa Lk. (*despiciens* R. et S., *tenella* Lk.), federiges, ☉. f. Ostindien, Neuholland.  
poeaeoides P. B. (*poeaeformis* Lk.), rispiges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
punctata R. et S., punctirtes, ☉. w. Malabar.  
purpurascens Lk. Spgl., purpurfarbiges, ☉. f. ?  
rufescens Schrad., röthliches, ☉. f. ?  
senegalensis N. E., senegal'sches, 4. t. Senegal.  
tephrosanthes R. et S., grauähriges, ☉. w. Malabar.  
verticillata R. et S., wirtelförmiges, ☉. f. Spanien.

**Eranthemum** L. RB., Frühlingsblume, II. I., Acanthaceae.

- ambiguum R. et S., zweifelhafte, ⚥. w. ?  
armatum RB., bewaffnete, ⚥. w. Jamaica.  
bicolor Schrank., zweifarbiges, ⚥. w. Philippinen.  
? capense L., capische. ⚥. w. Aethiopien, Ostindien.  
crenatum Wall., gekerbte, ⚥. w. Nepal.  
elegans RB., zierliche. ⚥. w. Guinea.  
microphyllum RB. (? *parvifolium* Lk.), kleinblättrige, ⚥. w. Westindien.  
nervosum RB. (*pulchellum* Andr.), nervige, ⚥. w. Ostind.  
roseum RB., rosafarbiges, ⚥. w. Ostindien.  
secundum Lindl., einseitige, ⚥. w. Brasilien.  
spinosum RB., dornige, ⚥. w. Südamerika.  
strictum Colebr., steife, ⚥. w. Ostindien.  
variabile RB., veränderliche, ⚥. t. Neuholland.  
*flavum* W. v. Barleria flava.

**Eranthis** Salisb., Winter-Sturmhut, XIII. VI., Ranunculaceae.

- hyemalis Salib., gemeiner, 4., Kn. f. Mittel- u. Südeuropa.  
sibirica DC., sibirischer, 4. Kn. f. Ostsibirien.

**Eremia** D. Don v. Erica.

**Eremurus** MB., Schweifaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

**Eremurus**

*spectabilis* MB., ansehnliche, 4. f. Sibirien, Caucasus, Taurien.

**Eria** Lindl., Wollstendel, XX. 1., Orchideae.

*bicolor* Lindl., zweifarbiger, 4. w. Ceylon.

*densiflora* Lindl., dichtblumiger, 4. w. Java.

*paniculata* Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.

*pubescens* Lindl., weichhaariger, 4. w. Ostindien.

*rosea* Lindl., rosafarbiger, 4. w. China.

*stellata* Lindl., sternförmiger, 4. w. Ostindien.

**Eriachne** RB., Wollspelze, III. 11., Gramineae.

*obtusata* RB., stumpfe, 4. f. Nordamerika.

**Erianthus** Mchx., Wollgras, III. 11., Gramineae.**A. Genuin.**

*brevibarbis* Mchx., kurzbärtiges, 4. f. Nordamerika.

*Ecklonii* N. E., Ecklon's, 4. t. Cap der guten Hoffn.

*saccharoides* Mchx., zuckerrohrähnliches, 4. k. f. b. Nordamerika.

**B. Ripidium** Trin.

*Ravennae* P. B., italienisches, 4. f. Italien.

*strictus* Trin. (non Ell.), steifes, 4. f. Ungarn.

**Erica** T., Heide, VIII. 1., Ericaceae.

1. *Ectasis* s. *Acrostemon* Klotzsch. — *Macrostemum* Dryand. *Gypsocallidis* spec. et *Eriodesmia* et *Desmia* D. et G. Don.

*accomodata* Klotzsch, gefällige, 4. t. Cap d. g. H.

*adunca* Benth., hackenförmige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*aequalis* D. et G. Don, gleichförmige, 4. t. Cap d. g. H.

*azaleaefolia* Salish., azaleenblättrige, 4. t. Cap d. g. H.

*Banksii* W. (*monadelpha* Curt., *fragilis* Salish.), Bank's,

4. t. Cap der guten Hoffnung.

*barbigera* Klotzsch, härtige, 4. t. Cap der gut. Hoffn.

*bruniades* L., brunienähnliche, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

a) *velleriflora* Salish. (*capitata* Thbg.), β) *car-*

*basina* Salish. (*lasiocephala* et *eriantha* Klotzsch).

*bruniaefolia* Salish., brunienblättrige, 4. t. Cap d. g. H.

*capitata* L. (*byssina* Salish.), kopfförmige, 4. t. Cap d. g. H.

*carnea* L. (*herbacea* L., *purpurascens* L., *saxatilis* Salish.),

fleischfarbige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*chrysantha* Klotzsch, goldfarbige, 4. t. Cap d. g. H.

*conferta* Andr., dichtblumige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*crassiseppala* Benth., dickkronige, 4. t. Cap d. g. H.

*desmantha* Benth., büschelblumige, 4. t. Cap d. g. H.

*humilis* Benth., niedrige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

*imbricata* L. (*flexuosa* Andr., *divaricata* Wendl., *actaea*

Hort. non Lk., *caesia* et *stylosa* Salish., *ramulosa*,

*imbricata*, *ornata*, *leptocephala*, *trifaria*, *densiflora*

*sparsa*, *paleacea*, *pyramidalis*, *squamaeflora*, *stylosa* et

*violacea* Auctor.), dachziegelförmige, 4. t. Cap d. g. H.

*intermedia* Klotzsch, mittlere, 4. t. Cap d. g. H.

*involuta* Klotzsch, breithüllige, 4. t. Cap d. g. H.

*invovens* Benth., eingehüllte, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*lanata* Andr. (*flaccida* Lk.), wollige, 4. t. Cap d. g. H.

*Lehmanni* Klotzsch, Lehmann's 4. t. Cap d. g. Hoffn.

*lineata* Benth., linienförmige, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

*lycopodioides* Lodd., bärlappähnliche, 4. t. ? Cap d. g. H.

*mediterranea* L. (*lugubris* Salish.), mittelländische, 4. k.

f. b. Süd- und Westeuropa.

*monadelpha* Andr. (*surfurosa* Salish.), einbrüderige, 4.

t. Cap der guten Hoffnung.



## Erica

- nutans Wendl. (*pudibunda* Salisb.), überhängende, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- obtusata Klotzsch, stumpfliche, ♀. t. Cap der gut. H.
- penicillata Andr. (*Plukenetii inflata et conferta* Wendl.),  
 pinselförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- penicilliflora Salisb. (*calyculata* Wendl., *rostellia* Bedf.,  
*Rastellum* Spgl., *rostrata* Bartl.), pinselblumige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- petiolata Thbg. (*petiolaris* Salisb.), gestielte, ♀. t. Cap  
 der guten Hoffnung.
- Petiveri W. (*follicularis* Salisb.) Petiver's, ♀. t. Cap d. g. H.
- physantha Benth., aufgeblasene, ♀. t. Cap der gut. H.
- β) Melastoma Andr.
- Plukenetii L. (*penicillata* Lod., *fusiformis* Salisb., *revol-*  
*vens* Bartl.), Plukenet's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- pogonantha Bartl. (*tiaraeflora* β *squarrosa* Klotzsch),  
 purpurbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- polifolia Salisb. (*cuspidata* Klotzsch), poleiblätterige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- Sebana Dryand. (*Petiveri* L., *coccinea* L., *baculiflora* et  
*cothurnalis* Salisb.), Seba's, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- senilis Klotzsch, greisige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- setifera Klotzsch, borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- sexfaria Dryand. (*spumosa* Thbg.), sechsreihige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- socciflora Salisb. (*Sebana lutea* Andr. et *viridis* Andr.,  
*demissa* Bedf.), sockenblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.
- spumosa L. (*scariosa* Berg. Wendl.), schaumige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- stellata Lod. (*solandroides* Andr., *incurva* Wendl., *stella-*  
*ris* Nois.), sternförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- stylaris Spgl. (*congesta* Lodd.), langgriffelige, ♀. t. Cap  
 der guten Hoffnung.
- suffulta Wendl. (*tiaraeflora a stricta* Klotzsch), unter-  
 stützte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- tiaraeflora Andr. (*leptophylla* Kl., *placentaeiflora* Salisb.),  
 mützenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- triceps Lk. (*spumosa* Wendl.), dreiköpfige, ♀. t. Cap  
 der guten Hoffnung.
- turmalis Salisb., säulenförmige, ♀. t. Cap der gut. H.
- vestiflua Salisb. (*Petiveri hirsuta* Andr. *picta* Bedf.),  
 schönbekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- villosa Pluk. (*canescens* Dryand., *?eriocephala* Andr., *pi-*  
*losa* Lodd.), zottige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- viridiflora Andr., grünblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- β) ?clavata Andr.
- II. *Syringodea* s. *Tubiflorae*, et *Dasyanthes*, Chona,  
*Eurylepis* et *Eurystegia* D. et G. Don.
- abietina L. (*Patersonia* Andr., *spissifolia* Salisb.), tannen-  
 ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- aurea Andr. (*grandiflora brevifolia* Wendl.), goldfarbige,  
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) viscosissima Lee.
- blanda Andr. (*mammosa* Thbg., *doliiformis* Salisb.),  
 liebliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Bowieana Lodd. (*Bowiei* Bedf., *Bauerea* Andr.), Bowie's,  
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- brachialis Salisb., armförmige, ♀. t. Cap der gut. H.

## Erica

Broadleyana Andr., Broadley's, ♀. t. Cap der guten H. buccinaeformis Salisb. (*curvisflora* L. Andr., *simpliciflora* Wendl. W.), posaunenblumige, ♀. t. Cap d. gut. H. Burchellii Benth., Burchell's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn. cerinthoides L., wachsblumenähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

b) major. c) nana.

chloroloma Lindl., grünsaumige, ♀. t. Cap d. gut. H. clavaeflora Salisb. (*sessiliflora* Andr.), keulenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

coccinea Berg. (*frondosa* Salisb.), scharlachblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) echiiflora Andr. (*glandulosa* Wendl., *ostrina* Lodd., *pulviniformis* Salisb.). γ) Archeriana Lodd. δ) Rollinsonia Bedf. G. Don. ε) sanguinea Bedf. Lodd.

colorans Andr. Lodd., farbändernde, ♀. t. Cap d. g. H. concinna Soland. (*paludosa* Salisb.), nette, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

conspicua Soland., ansehnliche, ♀. t. Cap der gut. H.

a) longiflora Andr. β) splendens Kl. Wendl. (*elata* Andr., *laniflora glabra* Andr.). γ) lanata Wendl. (*verticillaris* et *longiflora* Salisb.). δ) laniflora Wendl. (*sordida* Andr., *floccosa* Salisb.).

cruenta Soland. (*melliflua* Salisb.), blutfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) lucida Benth. (*concinna* Drege). ?γ) mutabilis Lodd. non Salisb.

curvisflora Thbg. L. (*simpliciflora* W. et *fastuosa* Salisb.), gekrümmtblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

cylindrica Wendl., cylinderblumige, ♀. t. Cap d. g. H. dichrus Spgl. (*dichromata* Lodd., *bicolor* Andr., *quadriflora* Kl., *refulgens brevifolia* Kl.), zweigabelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

discolor Andr. (*cupressiformis* Salisb.), verschiedenfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) puberula.

elongata Lodd. (*transparentis* Thbg., *strigilifolia* Salisb., *venusta* Kl.), verlängerte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

erubescens Andr. (*cerinthoides* β. Thbg., *pectinifolia* Salisb.), schönrothe, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

exurgens Andr. (*pharetraeformis* Salisb.), aufgerichtete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

?β) hybrida Andr. ?γ) formosa Andr. (*curvisflora rubra* Hortul.).

fascicularis L. fil. (*octophylla* Thbg., *coronata* Andr., *radiiflora* Salisb.), büschelförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Hybrid.: imperialis Andr.

flammea Andr. (*bibax* Salisb.), flammende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

foliacea Andr., blätterreiche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn. fulgida Bedf. Lodd. (*speciosissima* Klot.), brennendrothe. ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

gelva Wendl. (*gelida* Andr., *alveiflora* Salisb.), fahlgelbe, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

grandiflora L. fil. (*grandiflora* β., *longifolia* Wendl., *strictifolia* Kl.), großblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

Halicacaba L. (*rupestris* Salisb.), judenkirschartige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

## Erica

hebecalyx Benth. (*speciosa tomentosa* Kl.), stumpfkelchige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

Hesseana Wendl., Hesse's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.

Hibbertiana Andr., Hibbert's,  $\S$ . t. Cap der gut. Hoffn.

ignescens Andr. Wendl. (*tubiflora* L. spec. Salish., *cuspidigera* Wendl., *procera* Wendl.), feuerfarbige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

insulsa Bedf., zweifelhafte,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.

lanuginosa Andr., wollige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.

Leeana Dryand., Lee's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

a) aurantiaca Benth. (*costaeflora* Salish.).  $\beta$ ) candida Bartl. (*pinca* Wendl., ? *pura* Andr.).  $\gamma$ ) viridis Andr.  $\delta$ ) glutinosa minor Andr.  $\epsilon$ ) glaucescens Bartl.  $\zeta$ ) pulchella Thbg. (*argentifolia* Salish.)

longifolia Ait. (*pinca* et *pinifolia* Andr., *vestita coccinea* Bot. mag. et Lodd., *pithyophylla* Spgl.), langblättrige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

mammosa L. (*abietina* Berg., *speciosa* Schneev., *verticillata* Andr. Lodd.), zitzenartige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) albiflora Hort. (*gelida* Hort.).  $\gamma$ ) ? *pallida* Hort. Massoni L. fil. (*Massonia* Andr., *lycopodiifolia* Salish.), Masson's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

Mertensiana Wendl., Merten's,  $\S$ . t. ? Cap d. gut. H.

Meuroni Benth. (*verecunda* Lodd., *metulaeflora* Kl.), Meuron's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) minor Hort. (*gemmifera* Lod.).

Monsoniana L. fil. (*variifolia* Salish.), Monson's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

nana Salish. (*depressa* Andr.), Zwerg-H.,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

Niveni Andr. (*embothrifolia* Salish., *Chona sanguinea* D. et G. Don), Nieven's,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) longiflora Andr.

oblongiflora Benth., verlängertblumige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

onosmaeflora Salish. (*glutinosa* Andr., *viscida* Wendl.), lothwurzblumige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

pallens Andr. (*Dickensoni* Lodd.), bleiche,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

pellucida Andr., durchschimmernde,  $\S$ . t. Cap d. g. H.

a) rubra Andr. (*pelluc. tenera* Kl.) *glandulosa* Thbg., *Syringod. exposita* et *Bedfordiana* G. Don.

$\beta$ ) media Kl.  $\gamma$ ) exsudans Andr.  $\delta$ ) hirtiflora Benth. (? *exsudans* Lodd., *glandulosa* Drege).

$\epsilon$ ) ? *breviflora* Benth.

perspicua Wendl. (*Linnaeana* Andr. Lod.), durchsichtige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

\* *linnaeoides* Andr. (*hirsuta* Lodd.), *Linnaea superba* Andr. Lod.).

puberula Kl., feinhaarige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.

purpurea Andr. Wendl. (*phylicifolia* Salish., *formosa* Andr., *pinca purpurea* Lod., *rigidiuscula* Wendl.), purpurfarbige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) argentiflora Andr.

regia Bartl., königliche,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.

sacciflora Salish. (*epistomia* Lodd.), sackblumige,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.



## Erica

- serratifolia Andr. (*cyndriflora* Salib.), sägeblättrige,  
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 β) plumosa Wendl. non Andr.
- Sparmanni L. (*aspera* Andr., *hystriciflora* Salib., *armata* Spgl.), Sparmann's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- speciosa Andr., prächtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 β) hirta Andr. γ) calycina Benth. (*speciosa* Lod.).  
 spicata Thbg. (*sessiliflora* L. fil., *favosa* Salib.), ährenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 β) ciliata (*sceptriformis* Salib.).
- sulcata Benth., gefurchte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- sulfurea Andr. (*stagnalis* Salib.), schwefelgelbe, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- transparens Andr. (*diaphana* Spgl.), durchleuchtende, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- tubiflora W., röhrenblumige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- tumida Ker (*splendens* Andr.), aufgeschwollene, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.
- Uhria Andr. (*decora* Salib.), Uhrsche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- versicolor Andr., buntfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 β) major Andr. (*refulgens* Andr.). γ) costata Andr. Salib. (*versic. ciliata* Wendl.).
- vestita Thbg. (*longifolia carnea* Bot. mag., *pinifolia* Salib.), bekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 \* rosea Andr. Lodd. a) alba. b) blanda. c) incarnata. d) purpurea. e) rosea. f) fulgida. g) coccinea. h) lutea. i) mutabilis. k) elegans.
- virescens Lk. (*viridescens* Lodd., *hirta viridiflora* Andr., *unicolor* Wendl.), grünliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- Wendlandiana Kl., Wendland's, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- Hybriden, von Tubiflor. et Limbat. erzogen: A. Syringodoideae: cylindrica Andr. Lodd. (*ambigua* Wendl., *hybrida* Hortul.). b) alba. Patersonioides Bedf. (*Patersonia coccinea* Andr., *Andrewsii* Kl.), magnifica Andr., rubida Lodd. (*rubercalix* Andr.), pallida Lodd. B. Evanthis-stellatae: radiata Andr. (*calamiformis* Salib.), radiata-discolor. Swainsonia Andr., undulata Lodd. Andr. (*Westphalingia* Hortul.), rigida Lodd., spuria Andr. (*culcitiaeflora* Salib., *tubulosa* Wendl., *translucens* Andr.), perspicuoides Bedf. (*Syringod. Bedfordiana* G. Don), buccinaeflora Sims, calostoma Lodd., stellifera Andr. Lodd. (*bibracteata* Kl.). C. Pleurocalli-stellatae: acuminata Andr. Lodd., carinata Lodd. (*acuminata angustiflora* Andr.), pseudovestita Benth., rugosa Andr. D. Dasyanthi-stellatae: princeps Andr. Lodd., oblonga Bedf., metulaeflora Curt. Lodd. non Andr., adjuvans parviflora Kl., Andrewsii Hort. (*metulaefl.* Andr.), Templea Andr. (*Callista Templeana* G. Don), quadrangularis Andr. (*erosa* Lodd.).
- III. Stellanthae seu Limbatae (et *Calycinae* Lk.), Euryloma, Callista et Lamprotis D. et G. Don.
- Aitoniana Mass. (*jasminiflora* Salib.), Aiton's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- albens L. mant. Wendl. (*albida* Thbg., *viminalis* Salib.).  
 weißliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 β) longiflora.

## Erica

ampullacea Curt. And. (*ampullaeformis* Salisb.), flaschenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

aristata Andr. Lodd., gegrannte, ♀. t. ? Cap d. g. H.

Hybrid.: (von Massoni, retorta, ampullacea und aristata), crinita Lodd. (*Hartnelli* Roll.), pinguis Kl. (*tricolor comosa* et *Clowieana* Hort.), aristella Bedf. (*Sprengelii* Hort., *aristata minor* Andr., *eximia* Lodd., *equestris* Kl.), Forbesiana Kl. (*Euryloma ampullaceoides* G. Don), tricolor Nois. non Spgl. ducalis Kl.

articularis L. non Thbg., gegliederte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Bartlingiana Kl., Bartling's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn. Blandfordiana Andr., Blandford's, ♀. t. Cap d. gut. H. borboniaefolia Salisb. (*togata* Sims, *aperta* Spgl.), borbonienblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

bracteata Thbg. (*obvallaris* et *hyssopifol.* Salisb., *obcordata* Bedf., *togatoides* Hortul., *Lamprotis calycina* G. Don), deckblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffn. caledonica Spgl. fil. (*marginata* Bartl.), caledonische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

chlorosepala Benth., grünelchige, ♀. t. Cap d. gut. H. comosa L. (*transparens* Berg, *galiiflora* Salisb.), schopfige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

corifolia L. (*calycina* Andr., *corifol. spicata* Wendl., *articularis* Curt., *tunicata* Bartl., *alopecias* Tausch), erdkieferblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Corydalis Salisb., kappenmohnähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

curvifolia Salisb. (*Comptoniana* Andr., *terminal.* Kl.), krummblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

daphniflora Salisb. (*incerta* et *ingesta* Kl.), kellerhalsblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

denticulata L. mant. (*dentata* Thbg., *venusta* Hort.), gezähnelte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dianthifolia Salisb. (*biflora* Lk. Lodd., *oppositifolia major* Andr.) nelkenblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

eripus Benth., wollstielige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

fastigiata L. Wendl. (*fasciformis* Salisb., *mundula* Andr., *Humeana* Lodd.), gipfelständige, ♀. t. Cap d. g. H.

\* *primuloides* Andr. Lodd.

glandulifera Kl., drüsige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

glomerata Andr. (*rubella* Ker Lodd., *Lambrotes calycinodes* et *rubida* G. Don), knaulförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

glutinosa Berg. (*droseroides* Andr.), kleberige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

jasminiflora Andr. (*lagenaeformis* Salisb.), jasminblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

\* *minor* Andr.

incarnata Thbg. non Andr. (*amoena* Salisb. non Wendl.), fleischfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

inflata Thbg. (*amabilis* Salisb., *Sainsburyana* Andr., *cariniula* Lodd., *carneola* G. Don), blasigröhrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *ollula* Andr. Lodd.

Irbyana Andr. Lodd., Irby's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

\* *Bandonia* Andr.

**Erica**

laevigata Bartl. (*oppositifolia rubra* Lodd.), glatte, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

lamprotes Kl., glänzendblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

Lawsoniana Andr. (*infundibuliformis* Bartl., *leptocarpa* Spgl.), Lawson's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

lutea L. (*imbellis* Salisb.), gelbe, ♀. t. Cap d. gut. H.

β) albiflora Benth. (*oppositifol.* Andr. Lodd., *biflora* Hort.)

Meyeriana Kl. (*pallescens* Kl.), Meyer's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Muscari Andr. Wendl. (*moschata* Lodd., *fragrans* Salisb.),

Moschus-H., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) trossula Lodd. γ) cruciformis Andr. (*denticulata lutescens* et *fastigiata lutea* Hort., *Callist. cuneiformis* et *Bedfordiana* G. Don). δ) nidiflora Salisb. ε) Bonplandiana Lodd. (*scoliostoma* Kl.).

nodiflora Kl., knotenblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

obovata Andr., topfblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

pallidiflora Salisb. (*pallida* Wendl. non Sal.), bleichblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

patula Kl. (*calycanthoides* Kl.), ausgebreitete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

pavettaeflora Salisb. (*infundibuliformis* Andr., *hypocrateriformis* Tausch), pavettablumige, ♀. t. Cap d. g. H.

\* Coventryana Andr. Lodd.

pectinata Kl., kammförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

pedicellata Kl., kurzgestielte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

polygalaefflora Kl., polygalablumige, ♀. t. Cap d. g. H.

β) major.

praecox Kl. (*Behen* E. Mey.), frühe, ♀. t. Cap d. g. H.

praestans Andr., vortreffliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

Hybrid.: *daphnoides* Lodd., *laxiflora* Lodd. (*praestans* Lodd.), *hyacinthoides* Andr., *Parmentieri* Lodd., *mirabilis* Lodd.

pycnantha Benth., schartenblumige, ♀. t. Cap d. g. H.

retorta L. fil. (*gorteriaefolia* Salisb.), zurückgedrehte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

rufescens Kl., fuchsrothe, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Russeliana Andr., Russel's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Savileana Andr. (*Savilliae* Lodd.), Saville's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Shannoniana Andr. (*Shannoni* Lodd.), Shannon's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Salisb. (*ferruginea* Andr.), sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnang.

Steinbergiana Wendl. fil., Steinberg's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

taxifolia Dryand. (*turgida* Lk. non Salisb.), taxusblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) major Andr.

tenuiflora Andr. (*cylindrica* Thbg. non Wendl. nec Andr.), dünnblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

\* carnea Andr. \* Cliffortiana Lodd. (*tenuiflora alba* Andr.).

tenuifolia L. (*oppositifolia rubra* Andr., *linifolia* Salisb.), dünnblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

teretiuscula Wendl. (*flagelliformis* Andr., *flagellaris* Lk., *struthiolaefolia* et ? *filiformis* Bartl.), rundliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.



## Erica

tetragona Thbg. Andr. (*pugionifolia* Salisb.), vierkantige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Thunbergii L. fil. (*medioliflora* Salisb.), Thunberg's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

trichroma Benth. (*tricolor* Niven), dreiständige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

ventricosa Thbg. (*venusta* Salisb.), bauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) praegnans Andr. \* densa Andr. (*glabra* Link).

Garten-Varietäten: a) coccinea, b) stellifera, c) carnea, d) alba, e) superba, f) erecta, g) nana, h) hirsuta.

venusta Bedf. (*dentata* Wendl., *pellucida* Salisb.), holdselige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

virginalis Kl., jungfräuliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Walkeriana Andr. (*pulchra* Salisb., *juliana* Salisb.),

Walker's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) platysepala Benth. (*fastigiata* Andr. non L.).

γ) rubra Andr. δ) ?grandiflora Benth.

Zeyheri A. Sogl., Zeyher's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

IV. Euerica s. Brevisflorae — *Brevisflorae* et *Calycinarum spec.* Dryand. — Erica, Pachysa, Ceramia, Lophandra, Octopera et Gypsocallis et Eurystegia D. et G. Don.

absinthoides L., wermuthähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

acrophya Fresen., abyssinische, ♀. t. Abyssinien.

acuta Andr. (*crossota* Sogl.), spitze, ♀. t. Cap d. g. H.

affinis Benth. (*Zeyheri* Bartl., *Bartlingiana* Kl.), ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

aggregata Wendl., angehäuften, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn. b) rubra.

albescens Kl., weißliche, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

andromedaefflora Andr. (*holosericea* Salisb., *pomifera* Hort.), andromedenblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

\* triumphans Lodd. (*andromedaefflora alba* Hort.).

angustata Bartl., verschmälerte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

arborea L. (*caffra* L., *scoparia* Thbg., *procera* Salisb.), baumartige, ♀. k. f. b. Griechenland, Süd- u. Westeuropa, Madeira.

b) stylosa Don. c) squarrosa Hort. d) minima Hort.

ardens Andr., funkelnde, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

argentea Kl., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

aristifolia Niven, grannenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

armata Kl., bewaffnete. ♀. t. Cap der guten Hoffn.

australis L., südliche, ♀. t. Westeuropa, Nordafrika.

axilliflora Bartl., achselblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

baccans L. (*bacciformis* Salisb.), beerenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

barbata Andr. (*pannosa* Salisb.), bärtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Bergiana L. (*quadriflora* Andr., *lacunaefflora* Salisb.), Bergius's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

bicolor Thbg. (*calathiflora* Salisb., *concaua* Lodd.), zweifarbig, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

brachycentra Benth., kurzgrannige, ♀. t. Cap d. g. H.

brevifolia Salisb. (*callosa* Wendl., *obtusata* Lodd., *pachyphylla* Sogl.), kurzblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.

campanulata Andr., glockenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Erica**

*canaliculata* Andr., rinnenförmige, ♀. t. Cap d. gut. H.  
*capillaris* Bartl. (? *scariosa* Thbg.), haarförmige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

*carduifolia* Salisb. (*aprica* Kl.), distelblättrige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

*carinata* Kl., nachenförmige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

*catervaeiflora* Salisb. (*compacta* Bartl., *pubescens villosa* Thbg.), häufigblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

β) ? *glabrata* Benth. (*corymbosa* Bartl., *Sieberiana* Kl.).

? *cephalotes* Thbg., grofsköpfige, ♀. t. ? Cap d. g. H.

*cernua* L. fil., übergebogene, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

? *cerviciflora* Salisb., gabelblumige, ♀. t. ? Cap d. g. H.

*Chamissonis* Kl., Chamisso's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*chlamydiflora* Salisb. (*plumigera* Bartl.), dickbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*ciliaris* L., gefranzte, ♀. k. f. b. Westeuropa, England.

b) *alba*.

\* *Watsoni* Benth.

*cinerea* L. (*mutabilis* Salisb.), aschgraue, ♀. k. f. b. Westeuropa.

b) *atropurpurea* Lodd. c) *alba* Lodd. d) *pallida*

Lodd. e) *carnescens* Lodd. f) *prolifera* Lodd.

g) *stricta* Lodd.

β) *madeirensis* Benth., Madeira.

*coarctata* Wendl. (*axillaris* Soland., *brevipes* Bartl.), gedrüngene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) ? *longipes* Bartl.

*condensata* Benth., gedrängte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

*conica* Lodd., kegelförmige, ♀. t. ? Cap der gut. Hoffn.

*Constantia* Nois., *Constantia*-H., ♀. t. Cap d. gut. H.

*cordata* Andr. (*punctata* Bartl.), herzförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *angustifolia*.

*cornuta* Roxb. (*blanda* Salisb.), gehörnte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*coronifera* Benth., gekrönte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*crassifolia* Andr. (*complanata* Nois.), dickblättrige, ♀. t.

? Cap der guten Hoffnung.

*cristaeiflora* Salisb. (*melananthera* Thbg. non L.), kammblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*cubica* L. (*hottoniaeflora* Salisb.), cubische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*cumuliflora* Salisb. (*horizontalis* Andr., *tricolor* Spgl.), überfülltblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*cupressina* Bedf. (*turrigera* Salisb.), cypressenähnliche, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.

b) *major*.

*curvirostris* Salisb. (*declinata* Lodd.), gekrümmtschnabellig, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*cymosa* E. Mey., afterdoldige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

*decipiens* Spgl. (*Constantia* H. Angl.), täuschende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*decora* Andr. (*viscaria* Bauer), verzierte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*deflexa* Bedf., herabgebeugte, ♀. t. ? Cap d. gut. Hoffn.

*deliciosa* Wendl. (*umbellata* Bartl.), beliebte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

## Erica

demissa Kl. (*globuliflora* Kl.), niedrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

depressa L. (*humilis* Salisb., *rupestris* Andr.), niedergedrückte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dilatata Wendl. fil. (*hirta* Wendl. non Thbg.), erweiterte, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.

diosmaefolia Salisb. (*serrulata* Bedf.), göttergeruchblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dioetaeflora Salisb., feinstielige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

distorta Bartl., verdrehte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

dumosa Andr. (*longipedunculata* Lodd.), heckige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dysantha Benth., haarkronige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

elegans Andr., zierliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

empetrifolia L. (et *malleolaris* Salisb.), rauschbeerenblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

\* intertexta Lodd.

empetrioides Andr. (*empetrifolia glauca* Wendl., *pyxidiflora* Salisb.), rauschbeerenähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

exigua Salisb., kleinste, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
β) inermis Kl.

fabrilis Salisb. (*confertifolia* Wendl., *montana* Bedf.), dichtblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

fausta Salisb., glückliche, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

filiformis Salisb. (*divergens* Wendl., *flavida* et *connivens* Kl.), fadenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

filipendula Benth., fadenhängende, ♀. t. Cap d. g. H.

fimbriata Andr. Lodd., gefranzte, ♀. t. Cap d. gut. H.

flacca E. Mey., schlaffe, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

flavicans Kl., gelbliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

flavicoma Bartl., gelbschopfige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

flocciflora Benth., flockigblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

floccosa Bartl., flockige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

floribunda Lodd. (*sparsa* Lodd., *galiiflora* Bartl., *macrostoma* Kl.), blüthenreiche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

β) micrantha Kl. (*nemorosa* Kl.).

florida Thbg. (*Bergiana* Wendl.), schönblühende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) parviflora Kl. (*campylophylla* Speg.).

formosa Thbg. (*quadrata* Lodd., *grandinosa* G. Don), schöne, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

fragrans Andr., feinriechende, ♀. t. ? Cap d. gut. Hoffn.

fucata Kl., geschminckte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

genistaefolia Salisb. (*sessiliflora* Wendl.), ginsterblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

gibbosa Kl., höckerige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

gigantea Kl., riesenhafte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Gillii Benth., Gilli's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

glauca Andr., blaugrüne, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

globosa Andr. (*perlata* Lee), kugelblumige, ♀. t. Cap d. g. H.

glumaefflora Kl. (*leucosepala* Kl.), spelzenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) setula Kl.

gnaphalodes Thbg. (*gnaphaliiflora* Salisb., *calycina minor* Andr., *paniculata* Lodd.), ruhrkrautähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

hirta Thbg. (*urceolaris* Salisb.), kurzhaarige, ♀. t. C. d. g. H.



## Erica

- hirtiflora Curt. (*pubescens* Andr., *pubesc. major* Hort., *ovata* Lodd., *mitraeformis* Salib.), rauhblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) minor (*pubescens* Lodd., *pubesc. pilosa* Wendl., *tardiflora* Salib., *puberula* Bartl., *grisea* Kl.).
- humifusa Salib., niedergestreckte, ♀. t. Cap d. g. H.
- inclusa Wendl. fil., eingeschlossene, ♀. t. Cap d. g. H.
- incompta Kl., angeputzte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- inconspicua Bartl., unansehnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
- incurva Thbg., einwärtsgekrümmte, ♀. t. Cap d. g. H.
- intervallaris Salib. (*alopecuroides* Lodd. non Wendl.), zwischenräumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- irregularis Benth. (*rupestris rubra* Andr.), unregelmäßige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ixanthera Benth., fadenbeutelige, ♀. t. Cap d. g. H.
- Lachnaea Andr. (*lachnaeaeifolia* Salib., *Pohlmanni* Lodd.), lachnaeablätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lactiflora Lodd. (*lactea* et *Kennedyana* Kl.), milchweißblumige, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.
- laeta Bartl., freudige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lasciva Salib. (*exserta* Hort. non Bedf., *pachycephala* Kl.), üppige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lateralis W. (*guttaeflora* Salib., *incarnata* Andr. Lodd., *rubens humilis* Wendl., *fibula* Lk., *pedunculata* Wendl.), seitenständige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) arbuscula Lodd.
- latifolia Andr. (*suaveolens* Lodd., *crassifolia* Kl.), breitblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lavandulaefolia Salib. (*monticola* Kl., lavendelblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- laxa Andr. (*rigens* Bartl.), lockere, ♀. t. Cap d. g. H.
- leiophylla Benth., leichtblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- leptopus Benth. (*patula* E. Mey.), schlankstielige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- leucantha Kl. Hort. (*leucanthera* Andr., *luteo-alba* Bedf.), weißblumige, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnng.
- leucanthera L. fil. (*spiraeaeiflora* Salib.), weißbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- leucodesmia Benth., weißliche, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- longiaristata Benth., langgrannige, ♀. t. Cap d. g. H.
- longipes Kl., langgestielte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- β) parviflora.
- lucida Salib. (*rigidifolia* Wendl., *nitens* Bartl.), glänzende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Mackayi Hook., Mackay's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- macroloma Benth., großsäumige, ♀. t. Cap d. g. H.
- macrophylla Kl., großblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- margaritacea Sol. Wendl. (*obesa* Salib.), perlfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- marifolia Soland., gamanderblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- β) helianthemifolia Salib.
- media Kl., mittlere, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- melanthera L. (*lysimachiaeiflora* Salib., *Mundtiana* Kl.), schwarzbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ? β) adenophylla Benth.
- minutissima Kl., aller kleinste, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- mira Kl., seltsame, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- modesta Salib. (*leucophylla* Kl.), bescheidene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

## Erica

- mollis* Andr. (*modesta* Bedf., *pubescens* Sbr., *albiflora* Kl.), weiche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*moschata* Andr. (*florida* Lodd., *anthina* Spgl.), moschusduftende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*mucosa* L. (*pilulifera* Andr., *pilularis* Lod.), schleimige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *mucosoides* Lodd. γ) *crenata* E. Mey.

- mucronata* Andr., weichspitzige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*multiflora* L. (*multifl. longipedunculata* Wendl., *peduncularis* Presl., *vagans* DC.), vielblumige, ♀. k. Westeuropa.

- nidularia* Lodd., nistende, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*nigrita* L. (*volutaeflora* Salisb., *laricina* Berg., *nitidula* Hort., *Gypsocallis nigricans* G. Don), schwärzliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *Niveni* Benth. γ) *acutangula* Lodd. δ) *lyri-gera* Salisb. (*ochroleuca* Wendl. fil.). ε) *marginata* Andr. ζ) *melanthera* Lodd.

- nitida* Andr. Lodd. (*fragulifera* Salisb.), schimmernde, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- nivalis* Andr. (*peziza* Lodd.), Schnee-H. ♀. t. C. d. g. H.  
*nivea* Bedf., schneeweiße, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*nudiflora* L. (*floribunda* Wendl., *alopecuroides* Lodd., *microstoma* Berg., *sertiflora* Salisb.), nacktblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- obliqua* Thbg., schiefe, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

- odorata* Andr., gutriechende, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

\* *suaveolens* Andr. \* *Beaumontiana* Andr. \* *Willmoreana* Knowl.

- opulenta* Wendl., reichlichblühende, ♀. t. Cap d. g. H.  
*ovina* Kl., Schaf-H., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*oxycoccifolia* Salisb., moosbeerenblättrige, ♀. t. C. d. g. H.  
*palustris* Andr. Lodd. (*cyrillaeiflora* Salisb.), sumpfliebende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- paniculata* L. (*sodalis* Kl.), rispige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*parilis* Salisb., gleichmäßige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *flava* Andr. (*festae* Salisb.). γ) *parviflora* Benth. (*fallax* Salisb.).

- parviflora* L. (*pubescens* Bot. mag. Wendl., *pubescens minima* Andr., *tubiuscula* Lodd., *tardiflora* Salisb.), kleinblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- Passerinae* L. fil., Spatzenstrauch-H., ♀. t. Cap d. g. H.

- patens* Andr. Wendl. (*expansa* Hort.), abstehende, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.

- peduncularis* Salisb. (? *rubens* Thbg.), kurzstielige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- peltata* Andr. (*Actaea* Lk., *exserta* Bedf.), schiedförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- pelviformis* Salisb. (*persoluta* Bot. mag., *regerminans* Andr., *multumbellifera* Hort.), beckenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- periplocaeflora* Salisb., periplocablumige, ♀. t. C. d. g. H.  
*perlata* Bedf. (*barbata minor* Andr.), Perl-H., ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

- persoluta* L., ausgebreitete, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

α) *assurgens* Lk. (*subdivaricata* Berg., *prolifera* Salisb., *congesta* Wendl., *strigosa* Wendl., *cafra* Andr., *regerminans* Hortul., *murina*, *exserens* et *pallidiflora* Kl., *setacea* Dreg.). β) *laevis* Andr.

## Erica

- (*caffra* Lod., *cyathiformis* Salisb., *paniculata alba* Wendl., *persoluta major* Wendl.).  $\gamma$ ) ? *subcarnea* Benth. (*regerminans* Lodd., *persoluta* var. Hortul.).
- petraea* Benth., Felsen-H.,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der gut. Hoffn.
- physodes* L. (*sequax* Salisb.), blasige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.  
\* *Lambertiana* Andr.
- physophylla* Benth., blasenblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- pilulifera* L. (*nudicaulis* Berg., *pilulaeformis* Salisb., *pedunculata* Andr., *unica* Spgl.), pillenförmige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- planifolia* L. (*thymifol.*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Salisb.), plattblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- plumosa* Andr. Lodd. (*amoena* Wendl., *nolaeiflora* Salisb., *Scholliana* Lodd.), federige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. Hoffn.
- podophylla* Benth., stielblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- polyantha* Kl., zahlreichblühende,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- polycodon* Benth., schönblumige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- polycoma* Benth., vielschopfige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. Hoffn.
- polytrichifolia* Salisb. (*codonodes* Lindl., *lusitanica* Rudolph.), haarmoosblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Westeuropa.
- procumbens* Lodd., liegende,  $\frac{1}{2}$ . t. ?
- propendens* Andr. Lodd., herabhängende,  $\frac{1}{2}$ . t. C. d. g. H.
- pubescens* L. Thbg. (*pallida* Salisb., *pura* Lodd., *incana* Wendl., *purialis* Hortul.), weichhaarige,  $\frac{1}{2}$ . t. C. d. g. H.
- pubigera* Salisb. (*praeusta* Bartl.), wenighaarige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- pulchella* Houtt. Andr. (*articularis* Thbg., *retroflexa* Wendl., *caduceifera* Salisb., *phylicoides* W.), schöne,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- pumila* Andr. (*coniflora* Kl.), kleine,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- pusilla* Salisb. (*villosiuscula* Lodd., *canescens* Wendl.), niedrige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- pyramidalis* Soland. (*obpyramidalis* Salisb.), pyramidale,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.  
 $\beta$ ) *vernalis* Lodd.
- pyramidiformis* Wendl., pyramidenförmige,  $\frac{1}{2}$ . t. C. d. g. H.
- quadraeflora* Salisb. (*corusca* Lichtenst.), vierseitigblumige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- racemosa* Thbg. (*flexilis* Salisb., *hispida* Andr.), traubige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- ramentacea* L. (*granulata* L., *multumbellifera* et *pilularis* Berg., *bullularis* Salisb.), ausschlagschuppige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- recurvata* Andr., zurückgekrümmte,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.
- reflexa* Lk. Andr. (*glomiflora* Salisb., *nitida* var. Kl.), zurückgebogene,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- regerminans* L. (*uncifolia* Salisb., *Smithiana* Lodd., *Lichtensteinii* Kl., *racemifera* Andr., *juncea* Bartl.), sprossende,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- Roxburghii* Benth., Roxburgh's,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. Hoffn.
- rubens* Andr. (*pendula* Lodd., *nutans* G. Don), rötliche,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- rupicola* Kl., Gestein-H.,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffn.
- sagittata* Kl., pfeilbeutelige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der gut. Hoffn.
- salax* Salisb., üppige,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.
- scabriuscula* Lodd., schärfliche,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. Hoffn.
- scoparia* L. (*fucata* Thbg. et Wendl., *virgulata* Wendl.), besenförmige,  $\frac{1}{2}$ . k. Süd-Westeuropa, Madeira.



## Erica

- β) *parviflora* Benth., Azoren, Portugal.  
*selaginifolia* Salish., selagoblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*seriphiifolia* Salish. (*cubica minor* Andr., *bella* Spgl.),  
 seriphiumblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*setacea* Andr. (*asperifolia* Salish.), borstenblätterige, ♀.  
 t. Cap der guten Hoffnung.  
*setosa* Bartl., borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*setulosa* Benth., feinborstige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*sicaefolia* Salish. (*pygmaea* Andr., *sanguinolenta* Lodd.),  
 dolchblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*sitiens* Kl., trockene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*Solandriana* Andr., Solander's, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*spectabilis* Kl., ansehnliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*sphaerocephala* Wendl., kugelblumige, ♀. t. ? C. d. g. H.  
*squamosa* Andr. (*tegulaefolia* Salish.), schuppige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*staminea* Andr. (*thalictrifolia* Lodd.), langfadige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*stenantha* Kl., schmalkronige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*stenophylla* Benth., schmalblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*stricta* Don, Andr. (*pendula* Wendl., *multicaulis* Salish.,  
*ramulosa* Viv., *corsica* DC.), steife, ♀. k. Süditalien,  
 Spanien, Irland, Orient.  
*strigosa* Soland. (*arborea* Thbg., *axillaris* Salish., *prae-*  
*cox* Lodd., *pilulifera* Wendl., *lasiophylla* Spgl., *sca-*  
*briuscula* Drege), striegelige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*subterminalis* Kl., endständige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*subulata* Wendl., pfriemenförmige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*tenella* Andr., zarte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*tenuicaulis* Kl., feinstengelige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*tenuis* Salish. (*divaricata* Bedf., *longifolia* Kl.), feine,  
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*Tetralix* L., Moor-H., ♀. t. Europa, Surinam.  
 b. *carnea* Loud. c. *alba* Hort. Woburn.  
 β) *Martinesii* Lagasc. Spanien.  
*tetrathecoides* Benth., breatkronige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*thymifolia* Andr. (*planifolia* Wendl., *distans* Spgl. fil.),  
 thymianblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*tomentosa* Salish. (*velutina* Bartl.), filzige, ♀. t. C. d. g. H.  
*trichophora* Benth. (*pilifera* Kl.), haartragende, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*trichophylla* Benth., haarblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*triflora* L. (*pyrolaeflora* et *fugax* Salish.), dreiblumige,  
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*triphylla* Lk., dreiblätterige, ♀. t. ? Cap d. g. Hoffn.  
*tristis* Bartl., traurige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*turbiniiflora* Salish., kreiselblumige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*turgida* Salish. (*mellifera* Lk., *Gypsocallis Bedfordiana*  
 Don), aufgedunsene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*umbellata* L. (*lentiformis* Salish.), doldige, ♀. t. C. d. g. H.  
*umbelliflora* Kl., doldenblumige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*unibracteata* Kl., eindeckblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*unilateralis* Kl., einseitige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*urceolaris* Berg. (*pentaphylla* L., *cassra* L., *lamellaris*  
 Salish.), becherförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*vagans* L. (*manipuliflora* Salish., *didyma* Stokes, *verti-*  
*cillata* Forsk., *multiflora* DC.), zerstreute, ♀. k.  
 West-, Süd- und Osteuropa, Levante.

## Erica

varia Lodd. (*Cassonii* et *Caroliniana* Hort., *muricata* Wendl. fil.), bunte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 variabilis Kl. (*holocalycina* et *cumulata* Kl.), veränderliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

velutaria Salisb., scharmuzirende, ♀. t. Cap d. g. H.  
 β) rigidior Benth. (*hemisphaeria* Kl.).

verecunda Salisb. (*cernua* Andr. Lodd.), schamhafte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) lanceolata Wendl. (*ignorata* Kl.).

verniciiflua Salisb., firnifsgebende, ♀. t. Cap d. g. H.

vernix Andr. (*resinosa* Hortul., *blenna* Salisb.), Firnifs-H., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

vesicularis Salisb. (*conacea* Hort.), kleinblasige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

vespertina L. fil. (*calycina* Thbg., *gnidiaefolia* Salisb., *Dickensoniana alba* Bedf.), abendliche, ♀. t. C. d. g. H.

viscaria L. (*viscida* Salisb.), schmierige, ♀. t. Cap d. g. H.

Ungewisse: *adenophora* Spgl. *Aphanes* Spgl. *appressa* Spgl. *caduca* Thbg. *cinerascens* W. *cistifolia* Lk. *flexicaulis* Dryand. (*glandulosa* Andr.).

*lachnaeoides* G. Don. *nitens* Bedf. *pilifera* Thbg.

*protrudens* Lk. *sphaerantha* Spgl. *teucrifolia* Spgl.

*V. Eremia* D. Don.

*Bartlingiana* Kl. (*totta* Bartl., *ferox* Salisb.), Bartling's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*brevifolia* Benth., kurzblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

*lanata* Benth. (*xeranthemifolia* Salisb.), wollige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*totta* Thbg. (*pectinata* Bartl.), kammförmige, ♀. t. C. d. g. H.

*tubercularis* G. Don (*notabilis* Wendl.), kleinwarzige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

VI. *Grisebachia* Klotzsch.

*ciliaris* Kl. (*E. plumosa* Thbg.), wimperige, ♀. t. C. d. g. H.

*hispida* Kl. (*E. hirsuta* Salisb., *Blaeria Thunbergii* G. Don), hackerige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*plumosa* Kl. (*E. nodiflora* Salisb., *Blaeria nodiflora* G. Don), federige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*arctica* Waitz. (*coerulea* W.) v. *Phyllodoce taxifolia*.

*articulata* Thbg. v. *Syndesmanthus articulatus*. *Blaeria*

Thbg. etc. v. *Blaeria ericoides*. *Bruckenthalii* Spgl.

(*spiculiflora* Salisb.) vid. *Bruckenthalia spiculiflora*

Nachtr. *Daboecia* L. v. *Daboecia polifolia*. *embolifera*

Salisb. (et *expromta* Spgl.) vid. *Simocheilus depressus*.

*exilis* Salisb., *fasciculata* Thbg. v. *Syndesmanthus scaber* et *fascicul.*

*labialis* Salisb. v. *Symbieza capitellata*. *sicula* Guss. v. *Pentapera sicula*.

*vulgaris* L. v. *Calluna vulgaris*.

## Erigeron L., Flöhkraut (Berufskraut), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*acris* L., scharfes, ♂. f. Europa.

β) *serotinus* Weihe.

*alpinus* L., Alpen-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.

β) *glabratus* Hoppe. γ) *grandiflorus* Hoppe.

*angulosus* Gaud. (*acris angustatus* Hort.), kantiges, ♂. f. Schweiz, Tyrol.

*armeriaefolius* Fisch., grasnelkenblättriges, 4. f. Baical, *asper* Nutt., rauhes, 4. f. Nordamerika.

**Erigeron**

- bellidifolius W. (*Serpentarius* Banks), maßliebenblättriges, 4. f. Nordamerika.  
 bonariensis L., bonarisches, ☉. f. Südamerika, Westind.  
 canadensis L., canadisches, ☉, f. Nordamerika, Westindien, Europa.  
 carolinianus L., karolinisches, 4. f. Nordamerika.  
 caucasicus Stev., kaukasisches, 4. f. Caucasus.  
 chinensis Jacq., chinesisches, ☉. f. China.  
 ciliatus Ledeb., gefranztes, ☉. f. Sibirien.  
 compositus Pursh, zusammengesetztes, 4. f. Nordamer.  
 contortus Dsf., gedrehtes, ♂. f. ?  
 divaricatus Mchx., aufgesperartes, ♂. f. Nordamerika.  
 elongatus Ledeb., verlängertes, ☉. f. Sibirien.  
 glabellus Nutt., kahles, 4. f. Nordamerika.  
 glaucus Ker, blaugrünes, 4. t. Buenos-Ayres.  
 gramineus L., grasblättriges, 4. f. Sibirien.  
 graveolens L., starkkriechendes, ☉. f. Südfrankr., Kleinasien.  
 humilis Grah., niedriges, 4. f. Nordamerika.  
 jamaicensis L., westindisches, ☉. w. Jamaica.  
 involucratu Lk., umhülltes, 4. w. Brasilien.  
 laevigatus Rich., glattes, ♂. w. Cayenne.  
 Lehmanni Spgl., Lehmann's, 4. f. ?  
 longifolius Dsf., langblättriges, 4. f. Nordamerika.  
 maximus Otto, größtes, 4. k. f. b. Mexico.  
 montevidensis Spgl., montevidensisches, ☉. f. Montevideo.  
 nudicaulis Mchx., nacktstengeliges, 4. f. Nordamerika.  
 philadelphicus L., philadelphisches, 4. f. Nordamerika.  
 podolicus Bess. (? *dröbachensis* Retz, ? *asteroides* Lk.),  
 podolisches, ♂. f. Nordeuropa.  
 pulchellus DC. (*alpinus* β. *criocalyx* DC.), schönes, 4. f. Caucasus, Dahurien.  
 purpureus Ait., purpurfarbiges, 4. f. Nordamerika.  
 pusillus Nutt., zwergiges, ☉. f. Nordamerika.  
 speciosus DC., prächtiges, 4. f. Californien.  
 strigosus W. (*australis* Hornem.), striegeliges, ♂. f. Nordamerika.  
 uniflorus L., einblumiges, 4. f. Europäische Alpen.  
 Villarsii Bell. (*atticum* Vill., *rupestris* Hoppe, *intermedium* Trachs.), Villar's, 4. f. Kärnthen, Schweiz, Piemont, Dauphiné.  
*delphinifolius* W. v. *Polyactidium* delph. *heterophyllus* W. v. *Stenactis* annua. *viscosum* L. v. *Pulicaria viscosa*.

**Erinus** L., Leberbalsam, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

- alpinus L., Alpen-L., 4. f. Schweiz, Pyrenäen.  
 hispanicus P., spanischer, 4. f. k. Spanien.  
*fragrans* Ait., *gracilis* Lehm., *Lychnidea* Thbg. etc.  
 v. *Nycterinia fragrans* etc.

**Eriobotrya** Lindl., Wolltraube, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

- elliptica Lindl., elliptische, 5. k. t. Nepal.  
 japonica Lindl., japanische, 5. k. t. Japan.

**Eriocalia** Sm., Wolldolde, V. II., Umbelliferae.

- major Sm., große, 4. t. Neuholland.  
 minor Sm., kleine, 4. t. Neuholland.

**Eriocaulon** L., Wollstengel, III. III. (XXI. III.), Restiaceae.



**Eriocaulon**

decangulare L. (*serotinum* Walt.), zehnkantiger, 4. f. k. Nordamerika.

septangulare With., siebenkantiger, 4. f. k. Schottl.

sexangulare L., sechskantiger, 4. w. t. Ostindien.

**Eriocephalus** Dill., Wollkopf, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

africanus L., afrikanischer, 5. k. Cap der guten Hoffn.

decussatus Burch., kreuzständiger, 5. k. Cap d. g. H.

purpureus Burch., purpurfarbiger, 5. k. Cap d. g. H.

racemosus L., traubiger, 5. k. Cap der guten Hoffn.

spinescens Burch., stacheliger, 5. k. Cap d. gut. Hoffn.

**Eriochilus** RB., Wolllippe, XX. i., Orchideae.

autumnalis RB., Herbst-W., 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Eriocoma** H. B. K., Wollschopf, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.

fragrans D. Don, wohlriechender, 5. k. t. Mexico.

floribunda H. B. K., blüthenreicher, 4. k. t. Mexico.

heterophylla Schrad., verschiedenblättriger, 4. 5. k. t. Mexico.

**Eriodendron** DC., Wollbaum, XVI. viii., Malvaceae-Bombaceae.

anfractuosum DC., gewundener, 5. w. Ostindien.

caribaeum Hook., caribäischer, 5. w. Westindien.

guineense G. Don, guineischer, 5. w. Guinea.

leiantherum DC., schmalbeuteliger, 5. w. Brasilien.

**Eriodesma** Don v. Erica.**Eriogonum** Mchx., Wollknöterig, IX. i. (ii.), Polygoneae.

compositum Dougl., ästiger, 4. f. Nordamerika.

longifolium Nutt., langblättriger, 4. f. Nordamerika.

pauciflorum Pursh, wenigblumiger, 4. f. Louisiana.

sericeum Pursh (*flavum* Fras.), seidenhaariger, 4. f. Nordamerika.

tomentosum Mchx., filziger, 4. f. b. k. Carolina, Neuspanien.

**Eriolaena** DC., Wollkelch, XVI. viii., Malvaceae-Dombeyaceae.

Candollii Wall., DeCandolle's, 5. w. Ostindien.

Wallichii DC., Wallich's, 5. w. Ostindien.

**Eriopappus paniculatus** Hort. v. *Eupatorium paniculatum*.**Eriophorum** L., Wollgras, III. i., Cyperaceae.

A. *Trichophorum* Rich. P.

alpinum L., Alpen-W., 4. f. Europa.

cyperinum L., cypergrasähnliches, 4. f. Nordamerika.

Lockharti G. Don, Lockhart's, 4. w. Trinidad.

montevidense Lk., montevidensisches, 4. w. Monde-Video.

B. *Eriophorum* Rich. P.

gracile Koch (*triquetrum* Hoppe), schlankes, 4. f. Europa.

latifolium Hoppe (*pubescens* Sm., *vulgare* P.), breitblättriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

polystachyum L. (*angustifolium* Roth), vielähriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *longifolium* Hoppe.

Scheuchzeri Hoppe (*capitatum* Host.), Scheuchzer's, 4. f. Europäische Alpen.

**Eriophorum**

*vaginatum* L. (*caespitosum* Host), scheidiges, 4. f. Europa, Nordamerika.

*virginicum* L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

**Eriophyllum** Lagasc., Wollblatt, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*caespitosum* Lagasc., rasenartiges, 4. f. Nordamerika.

*oppositifolium* Nutt., gegenblättriges, 4. f. Nordamer.

**Eriospermum** Jacq., Wollsame, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*Bellendeni* Swt. (*latifolium* a Bot. Mag.), Bellenden's, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*folioliferum* Ker, blattrreicher, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*lanceaefolium* Jacq., lanzettblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*lanuginosum* Jacq., ächter, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*latifolium* Jacq., breitblättriger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*paradoxum* Jacq., wunderbarer, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*parvifolium* Jacq., kleinblättriger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*pubescens* Jacq., weichhaariger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

**Eriosphaera** Less., Wollimmortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*Oculus cati* Less., Katzenaugen-W., 5. t. Cap d. g. H.

**Eriostemum** Sm., Wollfaden, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

*buxifolius* Sm., buchsbaumblättriger, 5. t. Neuholland.

*cuspidatus* Cunn., langspitziger, 5. t. Neuholland.

*ericifolius* Mack. Cat., heideblättriger, 5. t. Neuholland.

*glaucescens* Ait., blaugrüner, 5. t. ? Neuholland.

*gracilis* Grah., schlanker, 5. t. Neuholland.

*lanceolatus* G., lanzettblättriger, 5. t. Neuholland.

*linearifolius* DC., gleichbreitblättriger, 5. t. Neuholland.

*myoporoides* Sm. DC., myoporumähnlicher, 5. t. Neuholl.

*neriifolius* Sbr., oleanderblättriger, 5. t. Neuholland.

*obovatus* Cunn., verkehrteiförmiger, 5. t. Neuholland.

*salicifolius* Sm., weidenblättriger, 5. t. Neuholland.

*dentatus* Coll. v. *Dicera dentata*. *salsoloides* Sm.

v. *Philotheca australis*. *squameus* LaBill. v. *Phebalium* Billardieri.

**Eriosynaphe** DC., Banddolde, V. II., Umbelliferae.

*longifolia* DC., langblättrige, ♂. f. Südrussland.

*tortuosa* Fisch. et Mey., gewundene, ♂. f. Natolien.

**Erisma** Rudg., Erisma, I. I., Lythriariae-Vochysieae.

*floribundum* Rudg., blüthenreiches, 5. w. Guiana.

**Erithalis** L., Lederkrapp, V. I., Rubiaceae.

*fruticosa* L. (*odorifera* et *inodora* Jacq.), strauchiger, 5. w. Westindien.

*Timon* Spgl., amboinischer, 5. w. Amboina.

**Ernodea** Sm., Aströthe, IV. I., Rubiaceae.

*montana* Sm., Berg-A., 5. k. Sicilien, Calabrien, Creta.

**Erodendron** Salisb. v. Protea.**Erodium** L'Her., Reiherschnabel, XVI. II., Geraniaceae.

*alpinum* L'Her., Alpen-R., 4. f. Italien.

*anthemifolium* MB., kamillenblättriger, 4. f. Georgien.

*arborescens* W., strauchartiger, 5. k. Nordafrika.

*bipinnatum* W., doppeltgefiederter, ♂. f. Numidien.

**Erodium**

*Botrys* Bertol., traubiger, ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.

*Bovei* H. Monsp., Bove's, ☉. f. Sinai.

*caucalifolium* Swt. (*alpinum* Dsf.), haftdoldenblättriger, 4. f. Frankreich.

*chamaedryoides* L'Her. (*Reichardi* DC., *Bocconi* Salzm.), gamanderähnlicher, 4. k. Corsica, balearische Inseln.

*chium* W., griechischer, ☉. f. Griechenland.

*ciconium* W., langschnabeliger, ☉. f. Südeuropa.

*cicutarium* Sm. (*romanum* W.), gemeiner, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittelasien.

β) *pimpinellifolium* W. γ) *pilosum* Thuill. δ) *cicutaefolium* Thuill.

*crassifolium* Ait., dickblättriger, 4. k. Nordafrika, Cyprus.

*geoides* S. Hil., geumähnlicher, ☉. f. Südamerika.

*glandulosum* W. (*graveolens* Lapey., *macradenum* L'Her.), drüsiger, 4. k. Spanien.

*glaucophyllum* Ait., blaugrüner, ☉. f. Aegypten.

*gruinum* Ait., kandischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Nordafrika.

*Gussonii* Ten., Gussone's, 4. k. Neapel, Sicilien.

*hirtum* W., rauher, 4. k. Aegypten.

*hymenodes* L'Her. (*trilobatum* Jacq., *geifolium* Dsf.), dreilappiger, 4. k. Nordafrika.

*incarnatum* L'Her., fleischfarbiger, ♀. f. Cap d. g. H. *laciniatum* W., schlitzbilättriger, 4. k. Creta, Nordafrika, Portugal.

*litoreum* Lem. DC., Ufer-R., ♂. 4. k. Südfrankreich.

*malacoides* W., malvenähnlicher, ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika.

β) *ribifolium* Jacq.

*malopoides* W., malopaähnlicher, 4. k. Sicilien, Corsica, Nordafrika.

β) *corsicum* Lem.

*maritimum* Sm., Meerstrands-R., 4. f. England, Frankreich.

*melanostigium* H. Monsp., schwarznarbiger, 4. k. t. ?

*moschatum* Ait., moschusduftender, ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika, Südamerika.

*muricicum* L'Her., spanischer, ☉. f. Südspanien, Nordafrika.

*muricatum* Hort., weichstacheliger, ☉. f. ?

*petraeum* W., Felsen-R., 4. f. k. Südfrankreich.

*romanum* Ait., römischer, ♂. f. Italien.

*Salzmanni* H. Monsp., Salzmann's, ? ☉. f. Spanien, Südfrankreich.

*serotinum* Stev. (*ruthenicum* MB., *multicaule* Lk.), spätblühender, 4. f. k. Südrussland.

*stellatum* H. Monsp., sternförmiger, ? ☉. f. Südfrankr.

*Stephanianum* W. (*multifidum* Patr.), Stephan's, ☉. f. Dahurien.

*Steveni* MB., Steven's, ♂. 4. f. Kaukasus.

*stylatum* DC., langgriffeliger, ♂. 4. f. ?

**Erpetion** Swt., Erpetion, V. 1., Violaceae.

*hederaceum* G. Don, epheublättriges, 4. k. Neuholland.

*reniformis* Swt., nierenförmiges, 4. k. Neuholland.

**Eruca** T., Ranke, XV. III., Cruciferae,

*hispida* DC., hackerige, ☉. f. Neapel.



**Eruca**

*sativa* Lam., gemeine, ☉. f. Südeuropa.

b) *alboglabra*. c) *albopilosa*. d) *flavoglabra*. e) *turgida*. f) *erucoides*. g) *exotica*.

*vesicaria* Cav., blasige, ☉. f. Spanien.

*Erucastrum* Baung. v. *Brassica Erucastrum*.

**Erucaria** G., Räumling, XV. III., Cruciferae.

*aleppica* G., aleppischer, ☉. f. Levante.

*crassifolia* Delil., dickblättriger, ☉. f. Aegypten.

*tenuifolia* DC., feinblättriger, ☉. f. Spanien.

**Erucastrum** Rchb., Mauerrauke, XV. III., Cruciferae.

*arabicum* Fisch. et Mey., arabische, ☉. f. Arabien.

*incanum* Koch, weißgraue, ♂. f. Südeuropa.

*inodorum* Rchb. (*Pollichii* Schimp. et Spenn.), geruchlose, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*obtusangulum* Rchb., stumpfbuchtige, 4. f. Schweiz, Süddeutschland, Frankreich.

**Ervum** T., Erve, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*agrigentinum* Guss., sicilianische, ☉. Sch. f. Sicilien.

*Camelorum* Spgl., Kameel's, ☉. Sch. f. ?

*dispermum* Roxb., zweisamige, ☉. Sch. f. Ostindien.

*Ervilia* L., kleine, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

*gracile* DC. (*tenuifolium* Lag., *tenuissimum* P., *longifolium* Ten.), schlanke, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

*hirsutum* L., rauhhülsige, ☉. Sch. f. Europa.

*Hohenackeri* Fisch. et Mey., Hohenacker's, ☉. Sch. f. Nordpersien.

*Lens* L., Linse, ☉. Sch. f. Europa.

*Lenticula* Schreb. (*uniflorum* Ten.), schmalfrüchtige, ☉. Sch. f. Kärnten, Illyrien, Italien.

*Loiseleurii* MB., Loiseleur's, ☉. Sch. f. Frankreich, Taurien.

*monanthos* L., einblumige, ☉. Sch. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*nigricans* MB. (*lentoides* Ten.), schwärzliche, ☉. f. Istrien, Italien, Taurien.

*nigrum* Hort., schwarze, ☉. Sch. f. ?

*pubescens* DC., weichhaarige, ☉. Sch. f. Südfrankreich.

*punctatum* Bess., punktirte, ☉. Sch. f. Südrußland.

*sardoum* Moris, sardinische, ☉. Sch. f. Sardinien.

*subglobosum* Rchb., buntfrüchtige, ☉. Sch. f. ?

*tetraspermum* L., viersamige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*viciaeforme* Spgl. (*vicioides* Dsf.), wickenähnliche, ☉. Sch. f. Numidien.

*soloniense* L. v. *Vicia lathyroides*. *volubile* Walt. v. *Galactia glabella*.

**Eryngium** T., Mannstreu, V. II., Umbelliferae.

*alpinum* L. (*rigidum* Lam.), Alpen-M., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*amethystinum* L. (? *azureum* Dsf.), amethystblaue, 4. f. Tyrol, Krain, Croatien, Sicilien.

*Andersonii* Lag., Anderson's, 4. f. ?

*aquaticum* L., Wasser-M., 4. Wa. f. Nordamerika.

*Aquifolium* Cav. (*ilicifolium* Brot.), stechlülsenblättrige, 4. f. b. k. Südspanien, Portugal.

*asperifolium* Laroche, rauhlättrige, 4. f. ?

*Bourgati* Gouan (*amethystinum* Lam.), Bourgati's, 4. f. Südfrankreich.

**Eryngium**

- bromeliaefolium* Laroch., ananasblättrige, 4. w. Neuspan.  
*campestre* L., gemeine, 4. f. Europa.  
*Cervantesii* Laroch., Cervantes's, 4. t. k. Mexico.  
*coeruleum* MB., blaue, 4. f. Taurien.  
*comosum* Laroch., schopfige, 4. w. t. Neuspanien.  
*corniculatum* Lam., gehörnte, 4. k. f. b. Portugal.  
*dichotomum* Dsf., gabelästige, 4. k. Nordafrika.  
*dilatatum* Dsf., erweiterte, 4. f. b. k. Nordafrika, Portugal, Sicilien.  
*ebracteatum* Lam., hülllose, 4. w. t. Monte-Video.  
*foetidum* L., stinkende, ♂. t. w. Florida, Westindien, Surinam.  
*frutescens* Moris, strauchige, ♀. t. Chili.  
*galioides* Lam., labkrautähnliche, 4. f. b. k. Portugal.  
*giganteum* MB., riesenhafte, 4. f. Armenien, Caucasus.  
*glomeratum* Lam., knaulblumige, 4. f. Creta.  
*gracile* Laroch., schlanke, 4. w. Neuspanien.  
*longifolium* Cav., langblättrige, 4. w. Mexico.  
*macrophyllum* Hort., großblättrige, 4. f. ?  
*maritimum* L., Meerstrand's, 4. f. Europa, Nordafrika.  
*multifidum* Sm., vieltheilige, 4. f. b. Griechenland.  
*planum* L., flachblättrige, 4. f. Europa, Nordafrika.  
*pusillum* L. (? *odoratum* Lam.), kleine, 4. f. b. k. Spanien, Portugal, Nordafrika.  
*rigidum* Lam. (*Spinaalba* Vill.), starre, 4. f. Frankreich.  
*serratum* Cav., sägezahnige, 4. t. w. Neuspanien.  
*tenue* Lam., dünnhüllige, ♂. f. Spanien, Portugal, Nordafrika.  
*tricuspidatum* L., dreispitzige, ♂. f. Nordafrika, Sicilien, Griechenland.  
*triquetrum* Vahl, dreikantige, 4. f. b. k. Sicilien, Nordafrika.  
*virgatum* Lam. (*ovalifolium* Mchx., *integrifolium* Walt.), ruthenförmige, 4. f. Nordamerika.

**Erysimum** T., Hederich, XV. III., Cruciferae.

- I. *Cheirinia* Lk. (*Erysimastrum* DC.).  
*Andrzejowskianum* Bess. (*diffusum* MB.), Andrzejowski's, ♂. f. Taurien.  
*asperum* DC., rauher, ♂. f. Nordamerika.  
*aureum* MB., goldfarbiger, ♂. f. Caucasus.  
*bicolor* DC., zweifarbiger, ♂. f. ?  
*caespitosum* DC., rasenartiger, ♀. ♂. f. Nordpersien.  
*canescens* Roth (*diffusum* Ehrh.), graulicher, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.  
*cheiranthoides* L. (*parviflorum* P.), lackähnlicher, ♂. ♂. f. Europa.  
*collinum* Andrz., Hügel-H., ♂. f. Caucasus.  
*crassipes* Fisch. et Mey., dickstieliger, ♂. f. Nordpersien.  
*crepidifolium* Rchb. (*hieracifolium* DC.), crepisblättriger, ♂. f. Mitteldeutschland.  
*dubium* DC., zweifelhafter, ♂. f. ?  
*exaltatum* Andrz., hoher, ♂. f. Südpodolien.  
*helveticum* DC. (*pallens* P., *pumilum* Hornem.), schweizerischer, ♂. 4. f. Schweiz, Tyrol.  
    β) *rhaeticum* DC. γ) *ochroleucum* DC.  
*hieracifolium* L. (*strictum* Flor, Wett.), habichtskrautblättriger, ♂. f. Europa.  
*ibericum* DC., iberischer, ♂. f. Armenien.

**Erysimum**

- lanceolatum* RB. (*Cheiranthus* P., *firmum* Swt.), lanzettblättriger, ♂, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
*leptophyllum* Andr., schlankblättriger, ♂. f. Caucasus.  
*leptostylum* DC. (*grandiflorum* MB.), schlankgriffeliger, ♂. f. Caucasus.  
*longifolium* DC. (*grandiflorum* Dsf.), langblättriger, ♂. 4. k. Nordafrika.  
*odoratum* Ehrh., wohlriechender, ♂. f. Ungarn, Krain.

β) *carniolicum* Dollin.

- Perofskianum* Fisch. et Mey., Perofski's, ♂. f. Cabul.  
*Redowskii* Weinm., Redowski's, ♂. f. Sibirien.  
*repandum* L. (*ramosissimum* Crtz), ausgeschweifeter, ☉. f. Mitteleuropa, Mittelasien.  
*strigosum* DC., striegeliger, ♂. f. Sibirien.  
*suffruticosum* Spgl. (*virgatum* Lej.), halbstrauchiger, ♂. f. Spanien, Belgien.  
*versicolor* Andr., buntfarbiger, ♂. f. Caucasus.  
*virgatum* Roth (*durum* Presl, *altissimum* Lej.), ruthenförmiger, ♂. f. Mitteldeutschland, Schweiz.  
 β) *longisiliquosum* Schlchr.

**II. Syrenia Andr.**

- angustifolium* Ehrh., schmalblättriger, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.  
*cuspidatum* DC., langspitziger, ♂. f. Ungarn, Taurien, Kleinasien.  
*sessiliflorum* RB. (*cornutum* P.), stielloser, ♂. f. Sibirien, Taurien.  
*siculum* Spgl., sicilianischer, ♂. f. Sicilien.  
*siliculosum* DC., kleinschotiger, ♂. f. Caucasus, Taurien.  
**III. Conringia Lk. (*Coringia* P. DC.).**  
*austriacum* Baumg., österreichischer, ☉. f. Unterösterreich, Ungarn, Siebenbürgen.  
*orientale* RB. (*perfoliatum* Crtz), morgenländischer, ☉. f. Europa, Mittelasien.

*Alliaria* L. v. *Alliaria officin.* *Barbarea* L. (et *praecox* Sm.) v. *Barbarea vulgaris* etc. *officinale* L. v. *Sisymbrium officinale.* *quadricorne* Steph. (et *bicornae* Ait. v. *Notoceras quadricorn.* et *canariens.*

**Erythraea Rich., Tausendgüldenkraut, V. 1., Contortae-Gentianeae.**

- aggregata* Swt., angehäufter, ♂. t. Südeuropa.  
*Cachanlahuan* Mol., chilesisches, ☉. f. Chili.  
*Centaurium* P., gemeines, ♂. f. Europa.  
*conferta* P., dichtblumiges, 4. k. Spanien.  
*emarginata* W. K., ausgerandetes, ☉. f. Ungarn.  
*grandiflora* Bivon., großblumiges, ♂. f. Istrien, Italien.  
*latifolia* Sm., breitblättriger, ☉. f. England.  
*linariaefolia* P. (*angustifolia* Wallr., *uliginosa* W. K., *litoralis* Fr., *compressa* Hayn.), leinkrautblättriger, ☉. f. Europa.  
*lutea* Bertol., gelbes, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
*maritima* P., Meerstrand's, ♂. k. f. Südeuropa.  
*Massoni* Swt., Masson's, 4. k. Azoren.  
*pulchella* Fr. (*inaperta* Schltd., *ramosissima* P.), schönes, ♂. f. Europa.  
*spicata* P., ähriges, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.



**Erythrina L., Korallenbaum, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.**

- abyssinica Lam., abyssinischer, ♀. w. Abyssinien.  
 aculeatissima Dsf., starkstacheliger, ♀. w. ?  
 arborescens Roxb., baumartiger, ♀. w. Ostindien, Nepal.  
 australis Cunn., neuholländischer, ♀. w. Neuholland.  
 caffra Thbg., caffrischer, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 carnea Ait., fleischfarbiger, ♀. w. Südamerika,  
 Corallodendron L., ächter, ♀. w. Westindien.  
 Cristagalli L., Hahnenkamm-K., ♀. w. Brasilien.  
 enneandra DC. (*velutina* Jacq.), neunmänniger, ♀. w. ?  
 fulgens Hort., leuchtender, ♀. w. Ostindien.  
 fusca Lour., braunblumiger, ♀. w. Ostindien, Cochinch.  
 glauca W., blaugrüner, ♀. w. Caracas, Surinam.  
 herbacea L., krautartiger, ♀. 4. t. k. Carolina, Florida.  
 horrida DC., rauher, ♀. w. Mexico.  
 Humeana Spgl. (*caffra* Bot. reg.), Hume's, ♀. w. ?  
 Hunnemanni Hort., Hunnemann's, ♀. w. ?  
 incana W., weißgrauer, ♀. w. Ostindien.  
 indica Lam., indischer, ♀. w. Ostindien, Cochinchina.  
 laurifolia Jacq., lorbeerblättriger, ♀. 4. t. w. Südamer.  
 macrophylla DC., großblättriger, ♀. w. ? Teneriffa.  
 mitis Jacq., unbewehrter, ♀. w. Caracas.  
 nana Bowie, zwergiger, ♀. w. ?  
 ovalifolia Roxb., eiblättriger, ♀. w. Ostindien.  
 ovalis Wall., eiförmiger, ♀. w. Nepal.  
 picta L., bemalter, ♀. w. Ostindien.  
 piscidioides Hort., piscidiaähnlicher, ♀. w. Ostindien.  
 poeanthes Brot., grasblumiger, ♀. w. Südamerika.  
 portoricensis Dsf., portoricensischer, ♀. w. Porto Rico.  
 princeps Hort., fürstlicher, ♀. w. Ostindien.  
 resupinata Roxb., verkehrtblumiger, 4. ♀. w. Ostindien.  
 rubrinervia H. B. K., rothnerviger, ♀. w. Neugranada.  
 secundiflora Brot., einseitigblumiger, ♀. w. Brasilien.  
 spathacea DC., scheidiger, ♀. w. Westindien.  
 speciosa Andr., prächtiger, ♀. w. Westindien.  
 stricta Roxb., steifer, ♀. w. Ostindien.  
 suberosa Roxb., korkiger, ♀. w. Ostindien.  
 umbrosa H. B. K. (*arborea* Hort.), schattiger, ♀. w. Caracas.

*velutina* W., sammthaariger, ♀. w. Neugranada.

Ungewifs: *triacantha* W. E. suppl.

**Erythrolaena Swt., Rothkelch, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.**

*conspicua* Swt., ansehnlicher, ♂. f. b. k. Mexico.

**Erythronium L., Hundszahn, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.**

- album* Nutt., weißlicher, 4. Zw. f. b. Louisiana.  
*Dens Canis* L., gemeiner, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 β) *longifolium* Mill. a) *rubrum* Swt. b) *album* Swt.  
*giganteum* Lindl., größer, 4. Zw. f. b. Nordwestamerika.  
*grandiflorum* Pursh., großblumiger, 4. Zw. f. b. Nordamerika.  
*lanceolatum* P. (*americanum* Ker, *luteum* Hort.), lanzettblättriger, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

**Erythrophleum RB., Rothwasserbaum, X. I., Leguminosae-Mimosaceae.**

*guineense* G. Don, guineischer, ♀. w. Sierra Leone.

**Erythropogon** DC., Rothbart, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*imbricatum* DC., dachziegelförmiger, ♀. t. Cap d. g. H.

*umbellatum* DC., doldiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*Erythrorrhiza rotundifolia* Mchx. v. Galax aphylla.

**Erythroxylon** L., Rothholz, X. Itr., Caryophyllaceae-Erythroxyleae.

*havanense* Jacq., westindisches, ♀. w. Westindien.

*hypericifolium* Lam., johanniskrautblättriges, ♀. w. Mascarenas, Hispaniola.

*laurifolium* Lam., lorbeerblättriges, ♀. w. Mascarenas.

*monogynum* Roxb. v. *Sethia indica*.

**Escallonia** Mut. (Escallon, ein Spanier, welcher Südamerika bereiste), V. I., Grossularieae-Escallioneae.

*floribunda* H. B. K., blüthenreiche, ♀. k. t. Südamer.

*glandulosa* Sm., drüsige, ♀. k. f. b. Chili.

*illinita* Presl., geschminkte, ♀. k. f. h. Chili.

*montevidensis* DC. (*bifida* Lk. et Otto, ?*stenopetala* et *floribunda* Hort.), montevidensische, ♀. k. f. b. Südamerika.

*pulverulenta* P., bestäubte, ♀. k. f. b. Chili.

*rubra* P., rothe, ♀. k. f. b. Chili.

*Tubar* Mut. (*discolor* Vent.), verschiedenfarbige, ♀. k. f. b. Chili.

*viscosa* Lk. et Otto, schmierige, ♀. k. Mendoza.

**Eschscholtzia** Chamiss. (J. F. Eschscholtz, deutscher Naturforscher), XIII. IV., Papaveraceae.

*californica* Cham., californische, ♂. 4. f. Californien.

*compacta* (Lindl.), dichte, ♂. 4. f. Californien.

*crocea* Benth., safranfarbige, ♂. 4. f. Californien.

*fumariaefolia* Bot. mag., erdrauchblättrige, ♂. 4. f. b. k. Mexico.

**Ethulia** L., Ethulie, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

*brasiliensis* Lk., brasilianische, 4. w. Brasilien.

*conyzoides* L., dürrwurzähnliche, ☉. f. m. Aegypten, Ostindien.

a) *indica*. β) *africana*.

*divaricata* L., ausgespernte, ☉. f. m. Malabar.

*integrifolia* D. Don (*sinapifolia* Roxb.), ganzblättrige, ☉. f. Nepal.

*ageratoides* Spgl. v. *Alomia ageratoides*.

**Eucalyptus** L'Her., Schönmütze, XII. I., Myrtaceae.

*amygdalina* LaBill., mandelblättrige, ♀. k. t. Neuholl.

*angustifolia* Lk., schmalblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

*botryoides* Sm., traubige, ♀. k. t. Neuholland.

*capitellata* Sm., kopfblüthige, ♀. k. t. Neuholland.

*cordata* LaBill., herzblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

*cornuta* LaBill., gehörnte, ♀. k. t. Neuholland.

*cotinifolia* Lod., cotinusblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

*Cunninghamii* (*microphylla* Cunn.), Cunningham's, ♀. t. k. Neuholland.

*curvula* Sbr., gekrümmte, ♀. k. t. Neuholland.

*elongata* Lk., verlängerte, ♀. k. t. Neuholland.

*eugenoides* Sbr., eugenienähnliche, ♀. k. t. Neuholland.

*Globulae* LaBill., dickblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

*haemastoma* Sm., rothmündige, ♀. k. t. Neuholland.

*heterophylla* Swt., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

*hirsuta* Lk., rauhhaarige, ♀. k. t. Neuholland.

**Eucalyptus**

*hypericifolia* Dum. Cours., johanniskrautblättrige,  $\text{f. k. t.}$  Neuholland.

*incrassata* LaBill, verdickte,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*longifolia* Lindl. (*Lindleyana* H. Hügel.), langblättrige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*marginata* Sm., berandete,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*media* Lk., mittlere,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*microphylla*, kleinblättrige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*mucronata* Lk., weichspitzige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*multiflora* Poir (? *longifolia* Lk.), vielblumige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*myrtifolia* Lk., myrtenblättrige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*obliqua* Sm., schiefe,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*orbicularis* Lod., kreisförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*ovata* LaBill, eiförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*paniculata* Sm., rispige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*pauciflora* Sbr., wenigblumige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*persicifolia* Loud., pfirsichblättrige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*phillyreoides* Lodd., steinlindenähnliche,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*pilularis* Sm., pillenförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*piperita* Sm., pfefferähnliche,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*pulchella* Lod., hübsche,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*pulverulenta* Lk. (*cordata* Lodd., ? *perfoliata* Hort.), bestäubte,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*pulviger* Cunn., feinstäubige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*purpurascens* Lk., purpurfarbige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*resinifera* Sm., harzgebende,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*reticulata* Lk., netzförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*robusta* Sm., große,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*rostrata* Cav., schnabelförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*saligna* Sm., weidenähnliche,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*scabra* Nois., scharfe,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*stenophylla* Lk., gleichbreitblättrige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholl.

*stricta* Sbr., steife,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*tereticornis* Sm., rundhörnige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*triantha* Lk., dreiblumige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*viminalis* LaBill, gartenartige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

*virgata* Sbr., ruthenförmige,  $\text{f. t. k.}$  Neuholland.

Nachstehende unbestimmtere Abarten oder Arten findet man in den Gartenverzeichnissen: *albicaulis* Hort., *alpina* Hort., *alata* Hort., *coronata* H. Hügel., *discolor* H. Hügel., *gibbosa* H. Hügel., *glaucophylla* H. Hügel., *lanceolata* H. Hügel., *nervosa* H. Hügel., *populifolia* H. Hügel., *rotundifolia* H. Hügel., *tuberculata* Hort., *undulata* Hort., *variabilis* Hort., *verrucosa* Hort.

**Euchaetis** Bartl. et Wendl., Schönbart, V. 1., *Tricoccae-Rutaceae*.

*glomerata* Bartl. et Wendl., knaulblumiger,  $\text{f. t.}$  Cap der guten Hoffnung.

**Eucharidium** Fisch. et Mey., Schönkerze, IV. 1., *Onagrariae*.

*concinnum* Fisch. et Mey., nette, ©. f. Neucalifornien.

**Euchilus** RB., *Euchilus*, X. 1., *Leguminosae-Papilionaceae*.

*obcordatus* RB., herzförmiger,  $\text{f. t.}$  Neuholland.

**Euchroma** Nutt., *Euchroma*, XIV. 11., *Personatae-Rhinanthaeae*.



**Euchroma**

- coccinea* Nutt., scharlachfarbige, ☉. f. Nordamerika.  
*grandiflora* Nutt., großblumige, ☉. f. Nordamerika.

**Euclea** L., *Euclea*, XXII. x. (XI. II.), ?Aquifoliaceae, ?Euphorbiaceae.

- racemosa* L., traubige, ☿. k. t. Cap der guten Hoffn.  
*undulata* Thbg., wellenblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.

**Euclidium** RB., Schnabelschötchen, XV. I., Cruciferae.  
*syriacum* RB., syrisches, ☉. f. Osteuropa, Klein- und Mittelasien.

- tataricum* DC., tatarisches, ☉. f. Tatarei.

**Eucomis** L'Her., Schopflilie, VI. I., Coronariae-Asphodelaeae.

- bifolia* Jacq., zweiblättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
*nana* Ait., zwergige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
*punctata* L'Her., punktirte, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
*purpureo-caulis* Dryand., purpurstengelige, 4. Zw. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

- regia* Ait., königliche, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
*striata* H. Kew., gestreifte, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
*undulata* Ait. (*regia* Redout.), wellenförmige, 4. Zw. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

**Eucrosia** Ker, *Eucrosie*, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.  
*bicolor* Ker, zweifarbig, 4. Zw. w. t. Südamerika.**Eudesmia** KB., *Eudesmie*, XVIII. II., Myrtaceae.  
*tetragona* RB., vierseitige, ☿. t. Neuholland.**Eugenia** Mich. (Prinz Eugen v. Savoyen, berühmter Feldherr und Beschützer der Wissenschaften), XII. I., Myrtaceae.

- acuminata* Roxb., zugespitzte, ☿. w. Ostindien.  
*auriculata* Lodd., geöhrte, ☿. t. w. ?  
*axillaris* W., achselblumige, ☿. w. Jamaica, Südamerika.  
*balsamica* Jacq., balsamische, ☿. w. Jamaica.  
*baruensis* Jacq., baru'sche, ☿. w. Baru (Südamerika), Westindien.  
 ? *bracteata* Räusch., deckblättrige, ☿. w. Ostindien.  
*buxifolia* W., buchsbaumblättrige, ☿. w. Westindien.  
*cerasoides* Roxb., kirschähnliche, ☿. w. Ostindien.  
*elliptica* Sm., elliptische, ☿. k. t. Neusüdwallis.  
*floribunda* West, blüthenreiche, ☿. w. Westindien.  
*fragrans* W., wohlriechende, ☿. w. Jamaica.  
*glandulifera* Roxb., drüsige, ☿. w. Ostindien.  
*glauca* Fisch., blaugrüne, ☿. w. ?Südamerika.  
*gracilis* Lod., schlanke, ☿. w. Ostindien.  
*javanica* Lam., javanische, ☿. w. Java.  
*latifolia* Aubl., breitblättrige, ☿. w. Guiana.  
*ligustrina* W., ligusterähnliche, ☿. w. Hispaniola.  
*macrocarpa* Roxb., großfrüchtige, ☿. w. Ostindien.  
*Mini* Aubl., Mini-E., ☿. w. Guiana.  
*obovata* Poir., verkehrteiförmige, ☿. w. Mascarenas.  
*obtusifolia* Roxb., stumpfblättrige, ☿. w. Ostindien.  
*petalomoides* Lod., petalomaähnliche, ☿. w. Ostindien.  
*pulchella* Roxb., schöne, ☿. w. Ostindien.  
*rugosa* Lod., runzelige, ☿. w. Ostindien.  
*sinemariensis* Aubl., guianische, ☿. w. Guiana.  
*sumatrana* Lod., sumatranische, ☿. w. Sumatra.  
*ternifolia* Roxb., dreiblättrige, ☿. w. Ostindien.  
*uniflora* L. (*Michellii* Lam.), einblumige, ☿. w. Brasilien.

**Eugenia**

*aquea* Roxb. (et *amplexicaulis* Roxb.), *australis* Wendl. (*myrtifolia* Ker), *Jambos* L., *macrophylla* Lam., *malacensis* L. etc. v. *Jambosa aquea* etc. *caryophyllata* Roxb. v. *Calyptranthes caryoph.* *racemosa* L. v. *Stravadium racemos.* *zeylanica* W. v. *Syzygium zeylanic.*

**Eulophia** RB., Kammstendel, XX. I., Orchideae.

*barbata* Spgl. Lindl., bärtiger, 4. Kn. w. t. Cap der guten Hoffnung.

*ensata* Lindl., schwertförmiger, 4. Kn. w. t. Cap d. g. H.

*gracilis* Lindl., schlanker, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*guineensis* Ker, guineischer, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*longicornis* Spgl., langsporniger, 4. Kn. w. t. Cap der guten Hoffnung.

*lurida* Lindl., bleifarbig, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*macrostachya* Lindl., großsähriger, 4. w. Ceylon.

*streptopetala* Lindl., gedrehter, 4. Kn. w. t. Cap d. g. H.

*tristis* Spgl., trauriger, 4. Kn. w. t. Cap der gut. H.

*virens* Spgl., grünlicher, 4. Kn. w. t. Cap d. gut. H.

*crinita* Lindl., *Mackaiana* Lindl. et *maxillaris* Lindl. v. *Zygopetalum crinitum* etc.

**Eunomia** DC., Eunomie, XV. II., Cruciferae.

*oppositifolia* DC., gegenblättrige, 4. k. Syrien.

**Eupatorium** T., Walddost, XIX. I., Eupatorineae.

## I. Genuini.

*adenophorum* Spgl. (*glandulosum* H. B. K.), drüsen-tragender, 4. w. Mexico.

*ageratifolium* DC., ageratumbblätteriger, 4. w. Cuba.

*ageratoides* L., ageratumähnlicher, 4. f. Nord- und Südamerika.

*album* L., weißer, 4. f. Pensylvanien, Japan.

*altissimum* L., hoher, 4. f. Nordamerika.

*amoenum* Pursh, lieblicher, 4. f. Nordamerika.

*aromaticum* L., gewürzhafter, 4. f. Nordamerika.

*australe*, Bartl., südlicher, 4. w. t. Chili.

*Ayapana* Vent., *Ayapana-W.*, 4. w. Brasilien.

*baccharoides* H. B. K., *baccharis*ähnlicher, 4. w. Neu-Granada.

*Berterianum* Colla, Bertero's, 4. w. Westindien.

*canescens* Vahl, graulicher, 4. w. Westindien.

*cannabinum* L., hanfähnlicher (gemeiner), 4. f. Europa.

*ceanothifolium* W., säckelbaumblätteriger, 4. f. Nordamerika, Jamaica.

*chamaedryfolium* H. B. K., gamanderblätteriger, 4. w. Peru.

*coriaceum* Vahl, lederartiger, 4. w. Westindien.

*coronopifolium* W. (*compositifolium* Walt.), krähenußblätteriger, 4. f. Carolina.

*deltoidium* Jacq., deltablätteriger, 4. t. w. Mexico.

*falcatum* Mchx., sichelförmiger, 4. f. Nordamerika.

*floribundum* H. B. K., blüthenreicher, 4. w. Peru.

*foeniculaceum* W., fenchelblätteriger, 4. f. Nordamer.

*Fraseri* Poir., Fraser's, 4. f. Carolina.

*glandulosum* Mchx., drüsiger, 4. f. Carolina.

*hyssopifolium* L., ysoptblätteriger, 4. f. Nordamerika.

*iresinoides* H. B. K., iresinenähnlicher, 4. Sch. w. Neu-Granada.

*ivaefolium* L., ivablätteriger, 4. w. Westindien.

*lamiifolium* H. B. K., taubnesselblätteriger, 4. w. Quito.

**Eupatorium**

- lanceolatum W., lanzettblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 linearifolium Walt. (*crassifolium* Raf.), gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 macranthum Sw. (*atriplicifolium* Vahl, *triangulare* Poir.), großblumiger, ♀. w. Caribäen.  
 maculatum L., gefleckter, 4. f. Nordamerika.  
 Maximiliani Schrad., Maximilian's, ♀. w. Brasilien,  
 melissoides W. (*cordatum* Walt.), melissaähnlicher, 4. f. Nordamerika.  
 nepalense Spgl. (*acuminatum* D. Don), nepal'scher, ♀. w. t. Nepal.  
 nutans H. B. K., nickender, 4. w. Mexico.  
 odoratum L., riechender, ♀. w. Westindien, Brasilien.  
 paniculatum Schrad., rispiger, ☉. f. m. Brasilien.  
 parviflorum Sw. (*Dalea* Hort.), kleinblumiger, 4. ♀. w. Jamaica.  
 perfoliatum L. (*connatum* Mchx.), durchwachsener, 4. f. Nordamerika.  
 populifolium H. B. K., pappelblättriger, ♀. w. Mexico.  
 pubescens W., weichhaariger, 4. f. Nordamerika.  
 pulchellum H. B. K., schöner, ♀. w. Mexico.  
 punctatum W. (*dubium* Poir.), punktirter, 4. f. Nordamerika.  
 purpureum L., purpurfarbiger, 4. f. Nordamerika.  
 repandum W. (*atriplicifolium* Lam.), ausgeschweifter, ♀. w. Westindien,  
 rotundifolium L., rundblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 salvifolium H. B. K., salbeiblättriger, ♀. w. Südamer.  
 scandens Lk., kletternder, 4. Sch. w. ?  
 Schiedeanum Schrad., Schiede's, 4. ♀. t. w. Mexico.  
     β) virgatum Schrad. γ) diversifolium Schrad.  
 Schraderi DC. (*rugosum* Schrad.), Schrader's, 4. w. Südamerika.  
 sessilifolium L., stielloser, 4. f. Nordamerika.  
 sordescens DC. (*lamiifolium* W.), befleckter, 4. w. Südamerika.  
 squarrosus Cav., sparriger, 4. t. Mexico.  
 syriacum L., syrischer, 4. f. Macedonien, Syrien.  
 tetragonum Schrad., vierkantiger, 4. ♀. t. w. Mexico.  
 teucriifolium W. (*pilosum* Walt., *verbenaefolium* Mchx.),  
     teucriumblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 tomentellum Schrad., feinfilziger, 4. ♀. t. w. Mexico.  
 triflorum Aubl., dreiblumiger, ♀. w. Guiana.  
 trifoliatum L., dreiblättriger, 4. f. Virginien.  
 truncatum W., abgestutzter, 4. f. Nordamerika.  
 urticaefolium Mut., nesselblättriger, 4. t. w. Neugranada.  
 veronicaefolium H. B. K., ehrenpreisblättriger, ♀. t. w. Mexico.  
 villosus Sw., zottiger, 4. ♀. w. Westindien.  
 xalapense H. B. K., xalapischer, ♀. t. w. Mexico.  
 II. *Bulbostylis* DC.  
 pendulum Schrad. (*scariosum* Wallr.), hängender, ♀. t. w. Mexico.  
 III. *Conoclinium* DC.  
 coelestinum L. (*deltoideum* Rafin.), himmelblauer, 4. f. Nordamerika.  
 IV. *Hebeclinium* DC.



## Eupatorium

*macrophyllum* L. (*molle* Sw.), großblättriger, 4. w. Jamaica.

*ferrugineum* La Bill. (et *rosmarinifol.* La Bill.) v.  
*Ozothamnus ferrugin.* etc. *Houstoni* et *Gouani*  
Hort. v. *Salmea Eupatoria melissaefolium* Lam. v.  
*Nothites melissaefol.*

Hinsichtlich der übrigen s. *Mikania*.

**Euphorbia** L., Wolfsmilch, XI. III. (XXI. III.), *Tri-*  
*coccae-Euphorbiaceae*.

*achanocarpa* Guss., festkapselige, ☉. f. Sicilien.

*affinis* DC., ähnelnde, 4. f. Frankreich.

*agraria* MB. (*nitens* Trev.), Acker-W., 4. f. Taurien.

*aleppica* L., aleppische, 4. k. Griechenland, Syrien.

*ambigua* W. Kit., zweifelhafte, 4. f. Ungarn.

*amygdaloides* L. (*sylvatica* Jacq.), mandelähnliche, 4. f.  
England, Mittel- und Südeuropa.

b) *variegata*.

*Anacantha* L., dreizählige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*androsaemifolia* Schousb. (*isatidifolia* Lam.), androsae-  
mumblättrige, 4. k. Spanien, Portugal.

*angulata* Jacq., kantige, 4. f. Oesterreich, Mähren.

*angustifolia* Hamilt., schmalblättrige, 4. t. Nepal.

*antiquorum* L., wahre, ♀. w. Aegypten, Ostindien.

*aphylla* Brouss., blattlose, ♀. t. Teneriffa.

*Apios* L., knollige, 4. Kn. k. Griechenland.

*atlantica* P. (*bupleuroides* Dsf.), atlantische, 4. t. Nord-  
afrika.

*atropurpurea* Brouss., schwarzpurpurrothe, ♀. k. t.  
Teneriffa.

*balsamifera* Ait., balsamische, ♀. k. t. Canarische Inseln.

*bialata* Lk., zweiflügelige, ☉. f. ?

*biglandulosa* W., zweidrüsige, ♀. w. Mascarenas.

*biumbellata* Poir., zweidoldige, 4. k. Nordafrika.

Bojeri Hook. (? *Bryoni* Hort.), Bojer's, ♀. w. Madagascar.

*bracteata* Jacq., deckblättrige, ♀. w. ?

*brasiliensis* Lam., brasilianische, ☉. f. Brasilien.

*bupleurifolia* Jacq., hasenöhrchenblättrige, ♀. t. w. Cap  
der guten Hoffnung.

*canariensis* L., canarische, ♀. k. t. Canarische Inseln.

*Caput Medusae* L., Medusenhaupt-W., ♀. t. Cap der  
guten Hoffnung.

β) *humilis*.

*carniolica* Jacq., krainerische, 4. f. Krain.

*ceratocarpa* Ten., hornfrüchtige, 4. k. Neapel.

*cereiformis* L., fackeldistelähnliche, ♀. t. Südafrika.

*Chamaesyce* L. (*canescens* L.), grauliche, ☉. f. Südeuropa.

*Characias* L., Thal-W., ♀. k. Südeuropa.

*clandestina* Jacq., heimlichblühende, ♀. t. Cap d. g. H.

*Clava* Jacq., keulige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*coccinea* Roth, scharlachfarbige, 4. w. Ostindien.

*condensata* Fisch., dichtblättrige, ☉. f. Iberien.

*condylocarpa* MB., gliederfrüchtige, 4. Kn. f. Caucasus.

*congesta* W., gedrängte, 4. k. Spanien.

*coralloides* L. (*lanuginosa* Lam.), corallenähnliche, 4. k.  
f. b. Südeuropa, Nordafrika, Orient.

*Corderiana* DC., Corderi's, 4. f. Südeuropa.

*corifolia* Lam., corisblättrige, 4. ♀. t. Cap d. gut. H.

*corollata* L., kronenhüllige, 4. f. Nordamerika.

*cretica* Haw., cretische, 4. k. Creta.

**Euphorbia**

- crispa Haw., krause, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 crispata Hornem., krausblättrige, 4. f. ?  
 cruentata Grah., blutrothe, 4. t. St. Louis.  
 cyathophora Jacq., geigenblättrige, ♂. ♀. w. Westind.  
 Cyparissias L., cypressenartige, 4. f. Europa.  
 dendroides L. (*divaricata* Jacq.), strauchartige, ♀. k.  
 Italien, Sicilien, Creta.  
 dentata Mchx., gezähnte, ☉. f. Nordamerika.  
 denticulata Lam., gezähnelte, 4. k. Kleinasien.  
 dictyosperma Fisch. et Mey., netzsamige, ☉. f. Neu-  
 californien,  
 diversifolia P. (*heterophylla* Dsf.), verschiedenblättrige,  
 ☉. f. Nordafrika.  
 dulcis L., (*solisqua* Rchb.), süsse, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
 β) purpurata Thuill.  
 emarginata Ait., ausgerandete, 4. f. k. Italien.  
 enneagona Haw., neunkantige, ♀. t. ? Cap der gut. H.  
 epithymoides L., gelblättrige, 4. f. Oesterreich, Italien.  
 erosa Willd., ausgebissene, ♀. t. ?  
 Erythrina Lk., purpurrandige, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 Esula L., gemeine, 4. f. Europa.  
 exigua L., kleinste, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
 β) retusa Roth. γ) tricuspidata Lap. (*rubra* DC.,  
*diffusa* Jacq.).  
 falcata L., sichelförmige, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
 fragifera Jan., erdbeerfrüchtige, 4. f. k. Oesterreich-  
 isches Litorale.  
 Fructus-pini Haw., kieferfrüchtige, ♀. t. Cap d. g. H.  
 b) geminata Haw.  
 fulgens Karw. (*jacquiniaeflora* Hort.), leuchtende, ♀. w.  
 Mexico.  
 geminispina Haw., doppelstachelige, ♀. w. Mexico.  
 genistoides L. (*spartioides* Jacq.), ginsterähnliche, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 Gerardiana Jacq. (*Cajogala* Ehrh.), Gerard's, 4. f. Mit-  
 tel- und Südeuropa.  
 glareosa MB., kiesliebende, 4. f. Caucasus.  
 glaucophylla P., blaugrüne, ☉. w. Westafrika.  
 globosa Sims, kugelige, ♀. t. Südafrika.  
 grandidens Haw., grofszähnlige, ♀. t. Cap der gut. H.  
 grandifolia Haw., grofsblättrige, ♀. t. w. Sierra Leone.  
 granulata Forsk., körnige, ☉. f. Arabien.  
 hamata Haw., hackige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 Haworthii Swt., Haworth's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 helioscopia L., Sonnenzeiger-W., ☉. f. Europa.  
 heptagona L., siebenkantige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 heterophylla L., veränderlichblättrige, ♀. w. Westindien,  
 Südamerika.  
 hibernica Spgl. (*hiberna* L.), irländische, 4. f. h. k.  
 Irland, Pyrenäen.  
 hirta L. (*tomentosa* P.), rauhhaarige, ☉. w. f. Ost-  
 und Westindien, Westafrika.  
 humifusa W., niederliegende, ☉. f. ?  
 hypericifolia L., johanniskrautblättrige, ☉. f. Nordamer.  
 hyssopifolia L., ysopblättrige, ☉. f. w. Westindien.  
 Hystrix Jacq., igelstachelige, ♀. t. w. Südafrika.  
 imbricata Vahl, dachziegelförmige, 4. k. Nordafrika,  
 Portugal.

## Euphorbia

- Ipecacuanha* L., *Ipecacuanha*-W., 4. f. Nordamerika.  
*italica* Lam. (*seticornis* Poir., *provincialis* W.), italienische, ☉, f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.  
*juncea* Ait. (*pinifolia* W.), schlanke, 4. k. t. Madeira.  
*?juncoides* Haw., binsenförmige, ☉. w. ?  
*Kunzei* Lehm., Kunze's, ☉. f. ?  
*lactea* Haw., milchweisse, ☿. w. Ostindien.  
*laeta* Ait., freudige, ☿. k. t. ?  
*Lagascae* Spgl. (*terraccina* Lag.), Lagasca's, ☉. f. Spanien.  
*Lamarckii* Haw. (*virgata* P. non W. K.), Lamarck's, ☿. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*lanifera* Haw., wolltragende, ☿. w. Mexico.  
*Lathyris* L., kreuzblättrige, ♂. f. Mittel- u. Südeuropa.  
*laurifolia* Lam., lorbeerblättrige, ☿. w. Peru.  
*linarifolia* W. (*linifolia* Jacq.), linienblättrige, ☿. w. ?  
*linearis* Retz, gleichbreite, 4. w. Westindien.  
*linifolia* Vahl, leinblättrige. ☿. w. Westindien.  
*Lockharti* \* (*angustifolia* Lockh.), Lockhart's, ☿. w. Trinidad.  
*longifolia* Hamilt., langblättrige, 4. f. k. Nepal.  
*lophogona* Lam., saumkantige, ☿. w. Madagascar.  
*lucida* WK., spiegelnde, 4. f. Ungarn.  
 β) *pallida* W.  
*macroceras* Fisch. et Mey., grofshörnige, ☉. f. Karabagh.  
*maculata* L., gefleckte, ☉. f. Westindien, Nordamerika, Italien.  
*magnimamma* Haw., grofszitzige, ☿. w. Mexico.  
*mammillaris* L., Zitzen-W., ☿. t. Cap der guten Hoffn.  
*marginata* H. B. K., berandete, 4. t. w. Südamerika.  
*mauritanica* L., mauritanische, ☿. t. Mauritanien.  
*mellifera* Ait., honiggebende, ☿. k. Madeira.  
*meloniformis* Ait., melonenähnliche, ☿. t. w. Südafrika.  
*Mercurialis* Mchx., bingelkrautähnliche, 4. f. Nordamer.  
*micrantha* MB., kleinblumige, ☉. f. Nordpersien.  
*microphylla* Lam., kleinblättrige, ☉. f. Ostindien.  
*?multicorymbosa* Haw., vieldoldige, 4. f. ?  
*Myrsinitis* L. (*Baselisis* Ten.), immergrüne, 4. f. k. Südfrankreich, Italien, Taurien.  
*myrtifolia* L., myrtenblättrige, ☿. w. Jamaica.  
*neapolitana* Ten. (*?segetalis* L.), neapolitanische, ☉. f. Neapel.  
*neriifolia* Ait., oleanderblättrige, ☿. w. Ostindien.  
*nicaeensis* All. (*glaucescens* W., *oleaefolia* Gouan), südliche, 4. f. Süd- und Osteuropa, Caucasus.  
*nudiflora* Jacq. (*cymosa* Poir.), nacktblumige, ☿. w. Jamaica.  
*nummulariaefolia* W. (*pulchella* Brouss.), pfennigkrautblättrige, 4. ☿. k. Westeuropa, Nordafrika.  
*obscura* Lois., dunkle, ☉. f. Südfrankreich.  
*ocymoides* L., basilicumähnliche, ☉. w. Südamerika.  
*odontophylla* W., zahnblättrige, ☿. t. ? Cap d. gut. H.  
*officinarum* L., officinelle, ☿. t. w. Mittel- u. Südafrika.  
*ophthalmica* Commers., augenheilende, ☉. w. Südamer.  
*orientalis* L., morgenländische, 4. f. k. Medien.  
*Ornithopus* Jacq., Vogelfufs-W., ☿. t. Cap der gut. H.  
*palustris* L., Sumpf-W., 4. f. Europa.  
*Paralias* L. (*maritima* Berger), Meerstrands-W., ☿. 4. f. k. Südeuropa.  
 b) *suffruticosa*.



## Euphorbia

- parviflora L., kleinhüllige, ☉. w. Ceylon.  
 patula Mill., ausgebreitete, ☿. t. Cap der guten Hoffn.  
 pendula Haw., hängende, ☿. t. ?  
 pentagona Haw., fünfkantige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.  
 Peplis L., peplisähnliche, ☉. f. Südeuropa, England.  
 peplodes Gouan (*rotundifolia* Lois., *minima* Hort.),  
 rundblättrige, ☉. f. Südeuropa.  
 Peplus L., Garten-W., ☉. f. Europa.  
 petalioides Loud. (*rigida* Haw.), petalumähnliche, 4.  
 ☿. f. ?  
 petiolaris Sims, gestielte, ☿. w. Westindien.  
 picta Jacq., gemalte, ☉. ♂. w. f. Südamerika.  
 β) Humboldtii W.  
 pilosa L. (*carinthiaca* Traunf.), behaarte, 4. f. Kärn-  
 then, Ungarn, Taurien.  
 pilulifera L., pillentragende, ☉. f. w. Ost- u. Westind.  
 pinea L. (*caespitosa* et *linifolia* Tenor.), kieferähnliche,  
 4. f. k. Italien.  
 piscatoria Ait., Fischer-W., ☿. t. k. Canarische Inseln.  
 Pithyusa L., wachholderähnliche, 4. f. k. Süd- und  
 Westeuropa.  
 platyphyllos L. (*serrulata* Thuill., *subciliata* Bernh.),  
 breitblättrige, ☉. f. Europa.  
 β) literata Jacq. γ) ? truncata P.  
 ? plumosa Hort., federige, ☉. f. ?  
 polygona Haw., vielkantige, ☿. t. Südafrika.  
 polygonifolia L., knöterichblättrige, ☉. f. Nordamerika.  
 portlandica L. (*purpurascens* Schousb. Hornem., ? *Artau-*  
*diana* DC.), portlandische, 4. ☿. k. f. England,  
 Frankreich, Nordafrika.  
 portulacoides L., portulakähnliche, 4. k. t. Chili.  
 procera MB., hohe, 4. f. Podolien, Taurien, Caucasus.  
 procumbens DC. (*decumbens* W.), niederliegende, ☉. f.  
 Westindien.  
 prostrata Ait., gestreckte, ☉. f. w. Westindien.  
 prunifolia Jacq. (*geniculata* Orteg.), pflaumenblättrige,  
 ☉. w. Westindien.  
 pterococca Brot. (*stellulata* Salzm.), flügelkapselige, ☉. f.  
 Portugal.  
 pubescens Vahl, weichhaarige, ☉. f. Nordafrika.  
 pulcherrima Hort., schönste, ☿. w. Mexico.  
 pulverulenta Kit. Schult. (*pannonica* Host.), bestäubte,  
 4. f. Ungarn, Oesterreich.  
 punicea Sw., hochrothe, ☿. w. Jamaica,  
 pyrifolia Lam., birnblättrige, ☿. w. Mascarenas.  
 reflexa Spgl., zurückgebogene, 4. f. ?  
 repanda Swt., ausgeschweifte, ☿. w. Ostindien.  
 rigida MB., starre, 4. f. k. Taurien.  
 rosea Retz, rosafarbige, ☿. ☉. w. Ostindien.  
 salicifolia Host, weidenblättrige, 4. f. Ungarn, Süd-  
 frankreich.  
 saxatilis Jacq., Gesteins-W., 4. f. Ost-, Süd- und  
 Westeuropa.  
 scordifolia Jacq. (*mutans* Lagasc.), lauchkrautblättrige,  
 ☉. w. Westindien.  
 segetalis ? L., Saat-W., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.  
 β) taurica Bess.  
 serpens H. B. K., Schlangen-W., ☉. f. Südamerika,  
 Westindien.

**Euphorbia**

serpyllifolia P., quendelblättrige, ☉. f. Südamerika.  
 silenifolia Haw., silenienblättrige, ☿. t. Cap d. gut. H.  
 β) glauca Haw.

spathulaefolia Haw., spatelblättrige, ☿. t. ?

spathulata Lam., spatelförmige, ☉. w. f. Südamerika.

splendens Boj., schimmernde, ☿. w. Mascarenas.

spinosa L., dornige, ☿. k. Italien, Frankreich, Griechenland.

squarrosa Haw., sparrige, ☿. t. ?

stellaespina Haw., sternstachelige, ☿. t. Cap d. gut. H.

stricta L. (*dubia* Dierb.), steife, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

Szowitsii Fisch. et Mey., Szowits's, ☉. f. Nordpersien, Armenien.

tannensis Spgl., tannensische, ☉. w. f. Tanna.

taurinesis All. (*valentina* W., *diversifolia* W., *heterophylla* et *marginata* Hort.), turinische, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

tenuifolia Lam. (*leptophylla* P.), feinblättrige, ☉. f. Südeuropa.

terraccina L. (*obtusifolia* Lam.), italienische, ☉. f. Italien, Spanien.

tessellata Haw., würfelige, ☿. t. ?

tetragona Haw., vierkantige, ☿. t. ?

thymifolia L., thymianblättrige, ☉. f. Ostindien.

Tirucalli L., malabarische, ☿. w. Malabar.

toxicaria Afz., giftige, ☿. w. Guinea.

trigona Haw., dreikantige, ☿. w. Ostindien.

trigonacarpa Fisch., dreikantigfrüchtige, ☉. f. ? Südrussland.

tuberculata Jacq., höckerige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

tuberosa L., knollige, 4. Kn. t. Südafrika.

uncinata DC., spitzhackige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

undulata MB., wellenblättrige, 4. f. Caucasus.

uniflora Haw., einblumige, 4. Kn. t. w. Südamerika.

valerianaefolia Lam., baldrianblättrige, 4. f. k. Griechenland.

varians Haw., veränderliche, ☿. w. Ostindien.

variegata Sims, bunte, ☉. f. Louisiana.

verrucosa ? L. Lam., warzige, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
 β) flavicoma DC.

villosa W. K., zottige, 4. f. Ungarn.

virgata W. K., ruthenförmige, 4. f. Osteuropa, Taurien.  
 β) uralensis Fisch. Link.

Wulffeni Hopp. (*veneta* W.), Wulffen's, ☿. k. Oesterreichisches Litorale.

*canaliculata* Lam., *tithymaloides* L. etc. v. *Pedilanthus canalicul.* etc.

**Euphoria** Commers., Euphorie, VIII. 1., Sapindaceae.

Litchi Dsf. (*punicea* Lam.), schuppenfrüchtige, ☿. w. Ostindien, China.

Longan Lam., glattfrüchtige, ☿. w. China, Cochinchina.

Nephelium DC., mähenfrüchtige, ☿. w. Java, Cochinchina.

verticillata Bot. reg., wirtelförmige, ☿. w. Ostindien.

**Euphrasia** T., Augentrost, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.

alpina Lam. (*salisburgensis* Funk), Alpen-A., ☉. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) pectinata Tenor.

**Euphrasia**

*micrantha* Rchb., kleinblumiger, ☉. f. Europa.

*minima* Jacq., kleinsten, ☉. f. Alpen.

*nemorosa* Rchb. (*stricta* Host), Hain-E., ☉. f. Europa.

*officinalis* L., gemeiner, ☉. f. Europa.

*pratensis* Fries (*Rostkoviana* Hay.), Wiesen-A., ☉. f. Europa, Caucasus.

β) *mollis* Ledeb.

*tricuspidata* L., dreispitziger, ☉. f. Tyrol, Oberitalien.

*latifolia* L. v. *Trixago latifol.* *linifolia* L., *Odontites* L. etc. v. *Odontites linifolia* etc.

**Eupomatia** RB., Eupomatie, XII. III., ?Myristicaceae.

*laurina* RB., lorbeerblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Eurya** Thbg., Eurya, XI. I. (XXIII. I.), Ternstroemiaceae.

*chinensis* RB., chinesische, ♀. t. China.

*japonica* Thbg., japanische, ♀. t. Japan.

*multiflora* DC., vielblumige, ♀. t. Nepal.

*Euryale ferox* Salisb. v. *Anneslea spinosa*.

*Eurybia* Cass. v. Aster.

**Eurycles** Salisb., Eurycles, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

*amboinensis* Salisb., amboinische, 4. Zw. w. Amboina.

*australasica* G. Don, neuholländische, 4. Zw. w. Neuholland.

*Cunninghamii* Ait., Cunningham's, 4. Zw. w. Neuholl.

*nervosa* G. Don, nervige, 4. Zw. w. Ostindien.

*Eurylepis* D. et G. Don, *Euryloma* D. et G. Don (et *Eurystegia* D. et G. Don) v. Erica.

**Euryops** Cass., Euryops, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

*abrotanifolius* DC., stabwurzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*Athanasiae* DC., athanasienähnlicher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*lateriflorus* Less., seitenblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

*multifidus* DC., vieltheiliger, ♀. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*pectinatus* Cass., kammförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

*tenuissimus* Less., feiner, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*trifurcatus* Cass., dreigabeliger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

*Euryspermum frondosum* Salisb., *grandiflor.* Salisb. etc. v. *Leucadendron adscendens* etc.

**Eustachys** Desv., Schönähre, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

*distichophylla* N. E., zweizeiligblättrige, 4. w. Chili, Brasilien.

*petraea* Desv., Felsen-Sch., 4. t. Cap der guten Hoffnung, Westindien, Süd- und Nordamerika.

**Eustegia** KB., Schönkranz, V. II., Asclepiadeae.

*hastata* RB., spontonförmiger, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Eustephia** Cav., Eustephie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

*coccinea* Cav., scharlachfarbige, 4. Zw. t. w. ?Südamer.

**Eustoma** Salisb., Schönmund, V. I., Contortae-Gentianeae.

*silenifolium* Salisb., silenenblättriger, ☉. f. ?

**Eustrephus** RB., Schlingaffodile, VI. I., Asparagineae.

*angustifolius* RB., schmalblättrige, 4. Sch. t. Neuholl.



**Eustrephus**

*latifolius* RB., breitblättrige, 4. Sch. t. Neuholland.

**Eutaxia** RB., Hülseneibe, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*Baxteri* K. et W., Baxter's, 5. t. Neuholland.

*myrtifolia* RB., myrtenblättrige, 5. t. Neuholland.

*pungens* Swt., stechende, 5. t. Neuholland.

**Euterpe** G., Euterpe, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

*caribaea* Spgl., caribäische, 5. w. Westindien.

*globosa* G., kugelförmige, 5. w. Mauritius.

*oleracea* Mart., kohlgebende, 5. w. Brasilien.

*pisiformis* G., erbsenförmige, 5. w. Madagascar.

**Euthales** RB., Euthales, V. 1., Campanulaceae-Goodeniaceae.

*trinervis* RB., dreinervige, 4. t. Neuholland.

**Euthamia graminifol.** Nutt. et *tenuifolia* Nutt. v. *Solidago graminifol.* etc.**Eutoca** RB., Eutoca, V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

*divaricata* Benth., ausgespernte, ☉. f. Californien.

*Franklini* RB., Franklin's, ♂, f. Nordamerika.

*multiflora* Dougl., vielblumige, ☉. ♂. f. Californien.

*sericea* Grah., seidenhaarige, ♂. 4. f. Nordamerika.

*viscida* Benth., schmierige, ☉. f. Californien.

*Wrangeliana* Fisch. et Mey., Wrangel's, ☉. f. Neucalifornien.

*parviflora* RB. v. *Nemophila parviflora*.

**Euxenia** Chamiss., Euxenie, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

*grata* Chamiss., angenehme, 5. t. Chili, Brasilien.

*Mitiqui* DC., Mitiqui-E., 5. t. Chili.

**Evax umbellata** G. v. *Micropus pygmaeus*.**Evodia** Forst., Evodia, IV. 1., Tricoccae-Rutaceae.

*triphylla* DC., dreiblättrige, 5. w. Ostindien.

**Evolvulus** L., Faltenblume, V. II., Convolvulaceae.

*alsinoides* L., meyerähnliche, ☉. m. f. Ostindien, Neuholland.

*emarginatus* Burm., ausgerandete, ☉. w. Ostindien.

*gangeticus* L., Ganges-F., ☉. w. Ostindien.

*hirsutus* Lam., rauhaarige, ☉. w. Ostindien.

*incanus* P. (*sericeus* R. et P.), grauhaarige, ☉. w. f. m. Südamerika.

*latifolius* Ker, breitblättrige, 5. Sch. w. Brasilien.

*linifolius* L., leinblättrige, ☉. w. Jamaica.

*nummularius* L., pfennigkrautblättrige, ☉. w. Jamaica.

*Nuttallianus* Schult., Nuttal's, ☉. f. Nordamerika.

*sericeus* Sw., seidenhaarige, ☉. w. Westindien.

*villosus* R. et P., zottige, 4. w. Südamerika.

**Evonymus** T., Spindelbaum, V. 1., Evonymaceae.

*americanus* L., amerikanischer, 5. f. Nordamerika.

*angustifolius* Pursh, schmalblättriger, 5. f. Nordamer.

*atropurpureus* Jacq., schwarzpurpurrother, 5. f. Nordamerika.

*bullatus* Lodd., blasiger, 5. k. t. Nepal.

? *chinensis* Lou., chinesischer, 5. k. China.

*echinatus* Wall, stachelkapseliger, 5. k. Nepal.

*europaeus* L. (*vulgaris* Scop.), gemeiner, 5. f. Europa.

b) fol. varieg. c) leucocarpus.

*garciniaefolius* Roxb. (*lacerus* Hamilt., *caucasicus* Lodd.),

garcinienblättriger, 5. f. b. Nepal.

**Evonymus**

*grandiflorus* Wall., großblumiger, f. f. b. Nepal.

*grossus* Wall., dicker, f. f. b. Nepal.

*Hamiltonianus* Wall. (*atropurpureus* Hamilt.), Hamilton's, f. f. b. Nepal.

*japonicus* Thbg., japanischer, f. f. b. k. Japan.

b) *maculatus*. c) *variegatus*.

*indicus* Heyn., indischer, f. t. Ostindien.

*latifolius* Scop., breitblättriger, f. f. Mitteleuropa.

*lucidus* D. Don, glänzender, f. k. Nepal.

*micranthus* D. Don, kleinblumiger, f. k. Nepal.

*nanus* MB. (*pumilus* Hort.), zwergiger, f. f. Caucasus.

*obovatus* Nutt., verkehrteblättriger, f. f. Pennsylvanien.

*sarmentosus* Nutt. (*scandens* Hort., *americanus sarmentosus* DC.), starkwurzelter, f. f. Nordamerika.

*velutinus* Fisch. et Mey., sammethaariger, f. f. Nordpersien.

*verrucosus* Scop., warziger, f. f. Osteuropa.

*Colpoon* L. v. *Cassine Colpoon*. *Tobira* Thbg. v.

*Pittosporum Tobira*.

*Evosma albiflora* Andr. v. *Logania floribunda*.

**Evosmus** Nutt., *Evosme*, IX. 1. (XXII. VIII.), Laurineae.

*albida* Nutt., weisblättrige, f. f. Carolina.

**Exacum** L., Bitterblatt, IV. 1., Contortae-Gentianeae.

*pulchellum* Pursh, schönes, c. f. Nordamerika.

*sessile* L., sitzendes, c. 4. w. Ceylon.

*tetragonum* Roxb., vierkantiges, c. f. Nepal.

*aureum* L. (et *cordatum* L. suppl. et *guianense* Aubl.)

v. *Sebaea aurea* etc. *filiforme* W., *pusillum* DC. v.

*Microcale filiformis* etc. *hyssopifolium* W. (et *verticillatum* W. et *viscosum* Sm.) v. *Hippion hyssopifolium* etc.

*ramosum* Vahl etc. v. *Coutoubea ramosa*.

*vaginata* LaBill. v. *Logania latifolia*.

**Excoecaria** L., Blindbaum, XXII. XIII. (XVI. III.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*Agallocha* L., ceylonischer, f. w. Ostindien, Ceylon.

*glandulosa* Sw., drüsiger, f. w. Jamaica, Brasilien.

*serrata* H. Kew., sägezähniger, f. w. Chili.

**Exocarpus** LaBill., Nacktnuß, XXI. v. (V. 1.), Sandalaceae.

*cupressiformis* LaBill., cypressenähnliche, f. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

*humifusus* RB., niedergestreckte, f. t. Van-Diemens-L.

*latifolius* RB., breitblättrige, f. t. Neuholland.

*strictus* RB., steife, f. t. Neuholland, Van-Diemens-L.

**Exostemma** Humb. Bonpl., Fadenchina, V. 1., Rubiaceae.

*brachycarpon* R. et S., kurzfrüchtige, f. w. Jamaica.

*caribaeum* W., caribäische, f. w. Westindien.

*floribundum* W., blüthenreiche, f. w. Westindien.

*longiflorum* R. et S., langblumige, f. w. Hispaniola, Guiana.

**Faba** T., Buff(*Sau*)bohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*vulgaris* Mch., gemeine, c. f. Aegypten, Nordpersien.

b) *equina*. c) *purpurea*.

**Fabago** T. Ledeb., Bohnenkaper, X. 1., Zygophylleae.

*major* D. Don, große, 4. f. Syrien, Taurien, Nordafrika.

**Fabiana** R. et P., Fabiane, V. I., ?Personatae-Antirrhineae.

imbricata R. et P., schuppenblättrige, ♀. t. Chili.

**Fabricia** G. (J. C. Fabricius, berühmter dänischer Entomolog), XII. I., Myrtaceae.

laevigata Sm., glatte, ♀. k. t. Neusüdwallis.

myrtifolia G., myrtenblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

sericea Nois., seidenhaarige, ♀. k. t. Neuholland.

stricta Lodd., steife, ♀. k. t. Neuholland.

**Fagara** L. (arabischer Name), IV. I., Tricoccae-Zanthoxyleae.

microphylla Dsf., kleinblättrige, ♀. w. ?

australis Cun., *Budrunga* Roxb. (et *Pteroda* L. [lenticifol. W.] et *tragodes* Jacq.) v. *Xanthoxylum*

australe etc. *Elaphrium* W. v. *Elaphrium* glabrum.

triphylla Lam. v. *Evodia* triphylla.

**Fagelia** Neck., Fagelia, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

bituminosa Neck. DC., harzige, ♀. Sch. w. t. Cap der guten Hoffnung.

**Fagonia** T. (Fagon, berühmter Beförderer der Botanik), X. I., Zygophylleae.

arabica L., arabische, ♂. ♀. k. Arabien, Aegypten.

cretica L., cretische, ☉. ♂. k. Creta, Nordafrika.

glutinosa Delil., kleberige, ♂. k. Aegypten.

*Fagopyrum* T. v. *Polygonum*.

**Fagraea** Thbg. (J. T. Fagraeus, Freund d. Thunberg), V. I., Contortae-Loganieae.

fragrans Roxb., wohlriechende, ♀. w. Ostindien.

obovata Wall., verkehrteiförmige, ♀. w. Silhet.

zeylanica Thbg., zeylanische, ♀. w. Ceylon.

**Fagus** T., Buche, XXI. IX., Amentaceae.

antarctica Forst., Südpol-B., ♀. f. Feuerland.

betuloides Mirb., birkenähnliche, ♀. f. Feuerland.

Dombeyi Mirb., Dombey's, ♀. k. Chili.

dubia Mirb., zweifelhafte, ♀. f. Magellanische Strafe.

ferruginea Ait., rostfarbige, ♀. f. Nordamerika.

b) caroliniana Lodd. c) latifolia Lee.

obliqua Mirb., schiefblättrige, ♀. k. Chili.

sylvatica L., gemeine, Roth-B., ♀. f. Europa, Nordamer.

b) purpurea Ait. (*atrorubens du Roi*). c) cuprea

Lodd. d) foliis variegat. e) heterophylla Loud.

(*laciniata* Lodd., *asplenifolia* Lodd., *incisa* Hort.,

*salicifolia* Hort.). f) cristata Lodd. (*crispa* Hort.).

g) pendula Lodd. h) americana Loud. (*sylvestris* Mchx.).

*Castanea* L. etc. v. *Castanea vesca* etc.

**Falcaria** Dill., Sichelholde, V. II., Umbelliferae.

latifolia Koch, breitblättrige, ♂. f. Krain.

Rivini Host., Rivin's, ♂. f. Europa, Kleinasien, Sibirien.

**Falkia** L. (J. P. Falk, schwedischer Botaniker), V. II., Convolvulaceae.

repens L., kriechende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

**Farsetia** Turr. (Philip Farseti, venetianischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

aegyptiaca Turr. (*cheiranthoides* MB.), aegyptische, ♀. k. Nordafrika.

?cheiranthifolia DC., lackblättrige, ☉. f. Levante.



**Farsetia**

*clypeata* RB., schildige, ♂. f. Süditalien, Griechenland, Taurien, Kleinasien.

*eriocarpa* DC., wollfruchtige, ♀. k. Cypern.

*lunarioides* RB., lunarienähnliche, ♀. k. Griechenland.

*suffruticosa* DC., halbstrauchige, ♀. k. Persien.

*deltoides* RB. v. *Aubrietia deltoid.* *incana* RB. et

*mutabilis* RB. v. *Berteroa incana* etc.

**Fedia** Mch., Fedie, II. 1., Valerianeae.

*Cornucopiae* Vahl, fühlhornartige, ☉. f. Südeuropa.

Hinsichtlich der übrigen s. *Valerianella*.

**Fenzlia** Benth. (Dr. Fenzl, österreichischer Botaniker), V. t., Polemoniaceae.

*dianthiflora* Benth., nelkenblumige, ☉. f. Californien.

**Fernandezia** R. et P. (G. Garcias Fernandez, spanischer Botaniker), XX. 1., Orchideae.

*acuta* Lindl., spitze, 4. w. Trinidad.

*elegans* Lindl., nette, 4. w. Trinidad.

**Fernelia** Commers. (J. Fernel, Arzt Heinrich II. von Frankreich), IV. 1., Rubiaceae.

*buxifolia* Lam., buxusblättrige, ♀. w. Mascarenas.

*obovata* Lam., verkehrteiförmige, ♀. w. Mascarenas.

**Feronia** Corr., Feronie, X. 1., Hesperideae-Aurantiaceae.

*Elephanthum* Roxb., Elephanten-F., ♀. w. Ostindien.

**Ferraria** L. (J. B. Ferrari, italienischer Botaniker), III. 1. (XVI. 1.), Irideae.

*angustifolia* Swt., schmalblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*antherosa* Ker (*viridiflora* Bot. reg.), grünblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*atrata* Lodd., schwärzliche, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*divaricata* Swt., ausgespernte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*elongata* Grah., verlängerte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*Ferrariola* Thbg. (*minor* P.), kleine, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*obtusifolia* Swt., stumpfblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*uncinata* Swt., hackige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*undulata* L. (*punctata* P.), wellenförmige, 4. Zw. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*ixioides* W. v. *Libertia ixioides.* *tricuspis* W. v.

*Vieusseuxia tricusp.* *Pavonia* L. v. *Tigridia Pavonia.*

**Ferreola** *buxifolia* Roxb. v. *Maba buxifolia.***Ferula** T. (et *Ferulago* Koch), Steckenkraut, V. II., Umbelliferae.

*ammoniaca* Fisch., ammoniakgebendes, 4. f. Nordpers.

*Asa foetida* L., ächtes, 4. f. b. K. Persien.

*campestris* Bess., Feld-H., 4. Taurien.

*capillaris* Lk., haarförmiges, 4. f. b. k. Portugal.

*caspica* MB. (*cachryoides* Fisch.), kaspisches, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibirien.

*communis* L., gemeines, 4. f. Südeuropa.

*Ferulago* L. (*nodiflora* Jacq., *Ferulago galbanifera* Koch), kleineres, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

*glauca* L., blaugrünes, 4. f. b. k. Sicilien, Griechenl.

*meoides* L., meumähnliches, 4. f. Kleinasien.

*nodiflora* L. (*sulcata* Dsf.), knotenblumiges, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Ferula**

nuda Spgl., nacktes, 4. f. Sibirien.

obtusifolia Spgl., stumpfblättriges, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

orientalis T., morgenländisches, 4. f. b. k. Nordafrika, Griechenland, Kleinasien.

persica W. (*Asa foetida* Hope), persisches, 4. f. b. k. Persien.

seselioides C. A. Mey., seseliähnliches, 4. f. Caucasus.

sibirica Spgl., sibirisches, 4. f. Croatien, Bessarabien, Caucasus, Sibirien.

stricta Spgl., steifes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

sylvatica Bess., Wald-St., 4. f. Vollhynien, Podolien.

thyrsiflora Sm., straußblumiges, 4. k. Creta.

tingitana Herm., afrikanisches, 4. k. Nordafrika.

villosa Walt., zottiges, 4. f. Nordamerika.

*laevigata* Spgl. v. *Bubon laevig.* *longifolia* Fisch.

v. *Eriosynaphe longifol.* *Opopanax* Spgl. v. *Opopanax*

*Chironium. rablensis* Wulf. v. *Peucedanum rablense.*

**Festuca** L., Schwingel, III. II., Gramineae.

alpina Gaud., Alpen-S., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amethystina Host., amethystfarbiger, 4. f. Oesterreich, Ungarn.

arundinacea Schreb. (*elatior* Sm.), rohrähnlicher, 4. f. Europa.

aurata Gaud., goldfarbiger, 4. f. Schweiz.

coerulescens Dsf., bläulicher, 4. k. Nordafrika.

decolorans M. et Koch (*laxa* Gaud.), entfärbter, 4. f. Schweiz.

duriuscula L. (*intermedia* R. et S., *ovina* Schrad., *hirsuta* Host.), härlicher, 4. f. Europa.

β) *stricta* Host. γ) *nemoralis* M. et K. δ) *curvula* Gaud.

*elatior* L. (*pratensis* Huds.), hoher Wiesen-S., 4. f. Europa.

Fenas Lagasc. (*tenax* Lk.), spanischer, 4. f. Spanien.

flavescens Ball. (*xanthina* R. et S., *alpina* Host.), gelblicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

glabra Spgl., glatter, 4. f. Nordamerika.

glauca Lam. (*pungens* R. et S., *laevigata* Clairv., *pallens* Host., ? *caesia* Sm.), blaugrüner, 4. f. Europa.

grandiflora Lam., großblumiger, 4. f. Nordamerika.

Halleri All. (et *Gaudini* Kunth), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

heterophylla Lam., Haenk. (*duriuscula* L. syst. Schrad., *nemorum* Leyfs.), verschiedenblättriger, 4. f. Europa.

latifolia DC., breitblättriger, 4. f. ?

*laxa* Host., lockerer, 4. f. Krain.

*longifolia* Viv., langblättriger, 4. f. Ligurien.

*nigrescens* Lam. (*nigricans* Schlchr.), schwärzlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*ovina* L. spec. (*tenuifolia* Sibth., *paludosa* Gaud.), Schaf-Schw., 4. f. Europa.

β) *vivipara* Sm. γ) *capillata* Lam.

*pannonica* Wulf., ungarischer, 4. f. Ungarn.

*picta* Kit., schattirter, 4. f. Ungarn.

*pilosa* Hall. fil. (*rhactica* Sut., *poaeformis* Host.), haariger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*pubescens* Lk., weichhaariger, 4. f. Ungarn.

*pumila* Vill., kleiner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

**Festuca**

*rubra* L., rothlieber, 4. f. Europa.

β) *dumetorum* L. (*barbata* Schrk.). γ) *cinerea* DC. (*arenaria* Osb.).

*Scheuchzeri* Gaud. (*pulchella* Schrad., *nutans* Host.), Scheuchzer's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*spadicea* L., brauner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*spectabilis* Jan. (*spadicea* β. *nemorosa* Poll.), ansehnlicher, 4. f. Südtirol, Oberitalien.

*triflora* Dsf., dreiblümiger, 4. f. Nordafrika.

*vaginata* Kit., langescheidiger, 4. f. Ungarn, Süddeutschl.

*vallesiaca* Schlchr., Gaud. (*pallens* Panz., *guestfalica* Boenningh.), Walliser-Sch., 4. f. Deutschland, Schweiz.

*varia* Haenk. (*acuminata* Gaud.), bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *crassifolia* Koch (*Eskia* Ramond).

*violacea* Gaud., violetter, 4. f. Schweiz.

Zweifelhafte: *balearica* Guatt., *cambrica* Sin., *glomerata* Russ. (Aleppo), *Hemipoa* Delil. (Montpellier), *hordeiformis* Sin. (England).

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Brachypodium*, *Brizopyrum*, *Bromus*, *Corycarpus*, *Dactylis*, *Diplachne*, *Lolium*, *Nardurus*, *Schismus*, *Sclerchloa*, *Scolochloa* (et *Catapodium*), *Triticum*, *Vulpia*.

*Feuillaea pedata* Sm. v. *Jolifia africana*.

**Ficaria** Dill., Feigwarzenkraut, XIII. VI., Ranunculaceae.

*calthaefolia* Rchb., dotterblumenblättriges, 4. f. Kn. Dalmatien.

*verna* Huds. (*ranunculoides* Roth, Mch.), Frühlings-F., 4. Kn. f. Europa.

b) *plena*. c) *pallida*.

**Ficinia** Schrad. (H. *Ficinus*, Professor der Physik und Chemie zu Dresden), III. I., Cyperaceae.

*atrata* Schrad. N. E., schwärzliche, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*truncata* Schrad. N. E., abgestutzte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Ficus** T., Feigenbaum, XXIII. II. (XXI. I.), Urticaceae.

*acuminata* Hamilt. (*cerasiformis* H. Glasg.), zugespitzter, 5. w. Silhet.

*adhatodaefolia* Schott., adhatodablättriger, 5. w. Brasilien.

*Afzelii* G. Don, Afzelius's, 5. w. Sierra Leone.

*americana* Aubl., amerikanischer, 5. w. Guiana.

*aquatica* W. (*heterophylla* L. suppl.), wasserliebender, 5. w. Ostindien.

*arbutifolia* Lk., erdbeerbaumblättriger, 5. w. ?

*aspera* Forst., rauher, 5. w. Hebriden.

*astrifolia* H. Vindob., sternblättriger, 5. w. Brasilien.

*aurantiaca* Lodd., orangenähnlicher, 5. w. ?

*australis* W. (*rubiginosa* Dsf.), neuholländischer, 5. t. k. Neuholland.

*bengalensis* L., bengalischer, 5. w. Bengalen.

*Benamina* L., Benjamin's, 5. w. Ostindien.

*brasiliensis* Lk., brasilianischer, 5. w. Brasilien.

*Brassii* RB., Brass's, 5. w. Sierra Leone.

*calyculata* Mill., gekelchter, 5. w. Neuspanien.

*capensis* Thbg., kapischer, 5. t. k. Cap der gut. Hoffn.

*Carica* L., gemeiner, 5. f. b. k., Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.



**Ficus**

- cestrifolia Schott., hammerstrauchblättriger, f. w. Brasilien.  
 ciliolosa Lk. (*citrifolia*, *americana* Hortul.), gefranzter, f. w. ?  
 citrifolia Lam., citronblättriger, f. w. Neuspanien.  
 clusiaefolia Schott, clusiablättriger, f. w. Brasilien.  
 cotinifolia H. B. K., cotinusblättriger, f. t. w. Mexico.  
 cotoneaefolia Vahl (*indica* Lam.), mispelblättriger, f. w. Ostindien.  
 cordata Thbg., herzblättriger, f. w. Cap d. gut. H.  
 coriacea Ait., lederblättriger, f. w. Ostindien.  
 costata Ait., rippiger, f. w. Ostindien.  
 clethraefolia W., clethrablättriger, f. w. Caracas.  
 crassinervia Dsf., dicknerviger, f. w. Jamaica.  
 dumosa Lodd., Hecken-F., f. w. ?  
 elastica Roxb., elastischer, f. t. w. Ostindien.  
 elliptica H. B. K., elliptischer, f. w. Südamerika.  
 exasperata Vahl (*scabra* W., *glandulosa* Hort., *coronata* Spin.), scharfblättriger, f. w. Guinea.  
 eximia Schott, ausgezeichneter, f. w. Brasilien.  
 glabrata H. B. K., glatter, f. w. Südamerika.  
 glomerata Roxb., knaulförmiger, f. w. Ostindien.  
 heterophylla Lam., verschiedenblättriger, f. w. Ostind.  
 holosericea Schott, sammethaariger, f. w. Brasilien.  
 Hookeri Swt. (*nitida* Hook.), Hooker's, f. w. Westind.  
 indica Vahl, indischer, f. w. Ostindien.  
 laevigata Vahl, kahler, f. w. Caribäen.  
 lanceolata Roxb., lanzettlicher, f. w. Ostindien.  
 lasiophylla Lk. (*bengalensis* Hortul.), wollblättriger, f. w. ? Ostindien.  
 laurifolia Lam. (*virens* Ait., *martinicensis* W.), lorbeerblättriger, f. w. Westindien.  
 lentiginosa Vahl, fleckiger, f. w. Caribäen.  
 leucotoma Poir. (*leucosticta* Spgl., *venosa* W.), weispunktirter, f. w. Ostindien.  
 Lichtensteinii Link, Lichtenstein's, f. w. t. Cap der guten Hoffnung.  
 Loganii G. Don, Logan's, f. w. Caracas.  
 longifolia Schott, langblättriger, f. w. Brasilien.  
 lucens H. Vindob., leuchtender, f. w. Brasilien.  
 lucida Ait., glänzender, f. w. Ostindien.  
 lutescens Nois., gelblicher, f. w. ?  
 macrophylla Dsf., großblättriger, f. w. t. Neuholland.  
 microcarpa Vahl, kleinfrüchtiger, f. w. Guinea.  
 mollis Vahl (*mysorensis* Roth), weicher, f. w. Ostindien.  
 Muntia Lk., Muntia-F., f. w. Ostindien, Neuholland.  
 Murrayana H. Berol., Murray's, f. w. Südamerika.  
 myrtifolia Lk., myrtenblättriger, f. w. ?  
 nitida Thbg., schimmernder, f. w. Ostindien.  
 nymphaeaefolia L., nixblumenblättriger, f. w. Ostindien.  
 oblongata Lk., verlängerter, f. w. Cap der gut. Hoffn.  
 oblongifolia D. Don, langblättriger, f. w. t. Nepal.  
 obtusata Lk. (*mauritaniana* Hortul., *an* Lam.), stumpflicher, f. w. ?  
 obtusifolia H. B. K., stumpfblättriger, f. w. t. Mexico.  
 oppositifolia Roxb. (*hispida* Thbg., *scabra* Jcq.), gegenblättriger, f. w. Ostindien.  
 pedunculata Ait., gestielter, f. w. Caribäen.  
 pendula Lk., hängender, f. w. ?

## Ficus

- pertusa L. suppl., durchlöcherter, f. w. Surinam.  
 pisiformis Hort., erbsenfrüchtiger, f. w. ?  
 populifolia Vahl (*religiosa* Forsk.), pappelblättriger, f. w. Arabien.  
 populnea W., pappelähnlicher, f. w. Südamerika, Westindien.  
 pulchella Schott, schöner, f. w. Brasilien.  
 pumila L., kleiner, f. w. China, Japan, Molucken.  
 racemosa L., traubiger, f. w. Ostindien.  
 Radula W. (*anthelminthica* Rich.), raspeliger, f. w. Südamerika.  
 religiosa L., religiöser, f. w. Ostindien, Cochinchina.  
 repens W. Roxb., kriechender, f. w. Ostindien.  
 retusa L., abgestutzter, f. w. Ostindien.  
 rubrinervia Lk., rothnerviger, f. w. Brasilien.  
 rufa Schott., fuchsrother, f. w. Brasilien.  
 rugosa G. Don, runzlicher, f. w. Sierra Leone.  
 sagittata Vahl, pfeilförmiger, f. w. Ostindien.  
 salicifolia Vahl (*indica* Forsk., *speciosa* Hort.), weidenblättriger, f. w. Arabien.  
 scabra Forst. (*turbinata* W.), scharfer, f. w. t. Freundschaftsinseln.  
 Schottii H. Berol., Schott's, f. w. ? Brasilien.  
 stipulata Thbg. (*scandens* Lam.), zwischenblättriger, f. Sch. w. China, Japan.  
 superstitiosa Lk. (? *drupacea* Thbg.), abergläubischer, f. ? Ostindien.  
 Sycomorus L., ägyptischer, f. k. t. Aegypten.  
 terebrata W., durchbohrter, f. w. Mascarenas, ? Ostindien.  
 tinctoria Forst., färbender, f. w. Societätsinseln.  
 tomentosa Roxb., filziger, f. w. Ostindien.  
 ulmifolia Lam., ulmenblättriger, f. w. Java, Philippinen.  
 urophylla Wall., schlankblättriger, f. w. Ostindien.  
 umbellata Vahl, doldiger, f. w. Guinea.  
 venosa Ait. (*infectoria* W.), aderiger, f. w. Ostindien.  
 virgata Roxb., ruthenförmiger, f. w. Ostindien.  
 viscifolia Lod., schmierigblättriger, f. w. ?

**Fieldia** Cunn. (Baron Field, Oberrichter in Neusüdwallis), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

*australis* Cunn., südliche, f. t. Neuholland.

**Filago** L., Faden- (Filz-) kraut, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*arvensis* L. (*montana* L.), Acker-F., ☉. f. Europa, Sibirien.

β) *Lagopus* Steph. γ) *alpestris* Presl (*Cupaniana* Guss.).

*congesta* Guss., gedrängtes, ☉. f. Sicilien.

*gallica* L., französisches, ☉. f. Süddeutschland, Frankreich, Italien, England.

*germanica* L., deutsches, ☉. f. Europa.

β) *pyramidata* L. γ) *lanuginosa* Req. δ) *spatulata* Presl.

*minima* Fries (*arvensis* Wahlbg., *montana* Gaud.), kleines, ☉. f. Europa.

β) *supina* DC.

*neglecta* DC. (*Soy.* Willem.), übersehenes, ☉. f. Lothringen.

**Filago**

*acaulis* All. (*pygmaea* L.) v. *Micropus pygm. supina* Lam. v. *Micropus supinus*.

**Fimbristylis** Vahl, Franzengriffel, III. II., Cyperaceae.  
*angularis* Lk. (*Isolepis ang.* Schrad.), kantiger, 4. w. Ostindien.

*annua* R. et S., jähriger, ☉. f. Südeuropa.

*bromeliaefolia* A. Spgl. (*Rudg.*), ananasblättriger, 4. w. Surinam.

*complanata* Lk. (*Isolepis comp.* R. et S.), flachhalmiger, 4. w. Ostindien.

*dichotoma* Vahl, zweizinkiger, ☉. f. Südeuropa, Afrika, Ost- und Westindien.

*diphylla* Vahl, zweiblättriger, 4. f. Ostindien, Nepal.

*foliosa* Lk. (? *Isolepis curvifol.* Schrad.), blattreicher, 4. w. Ostindien.

*mezostachya* Lk. (*dichotoma* Hort.), langähriger, ☉. w. ?

*miliacea* Vahl, hirseähnlicher, ☉. w. Ostindien.

*pallescens* Lk., bleicher, ☉. w. Caracas.

*puberula* Vahl, feinhaariger, 4. f. Nordamerika.

*pubigera* Lk., haariger, ☉. f. Nordamerika.

*umbellata* Vahl, doldiger, 4. w. ?

**Fingerhuthia** Lehm. (C. A. Fingerhuth, deutscher Botaniker), III. II., Gramineae.

*africana* Lehm., afrikanische, ☉. f. Cap der gut. Hoffn.  
a) major. β) minor.

**Fischera** *buxifolia* Sw. v. *Leiophyllum thymifolium*.**Flacourtia** Commers. (Etienne de Flacourt, französischer Statthalter auf Madagascar), XXII. XII. (XIII. I.), Capparideae-Flacourtieae.

*cataphracta* Roxb., geharnischte, ♀. w. Ostindien.

*flavescens* W., gelbliche, ♀. w. Guinea.

*inermis* Roxb., unbewehrte, ♀. w. Ostindien, Molucken.

*Ramontchi* L'Her., Ramontchi-F., ♀. w. Madagascar.

*rhamnoides* Burch., wegdornähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*rotundifolia* Roxb., rundblättrige, ♀. t. w. Ostindien.

*sapida* Roxb., wohlgeschmeckende, ♀. w. Ostindien.

*sepiaria* Roxb., Zaun-F., ♀. w. Ostindien.

**Flagellaria** L., Peitschenstrauch, VI. III., Commelinaceae.

*indica* L., indischer, ♀. Sch. w. Ostindien, Molucken.

**Flaveria** Juss., Gelbling, XIX. v., Compositae-Corymbiferae,

*angustifolia* P., schmalblättriger, ☉. f. Mexico.

*Contrayerva* P., peruvianischer, ☉. f. m. Peru.

*maritima* H. B. K. (*linearis* Lag.), Seestrands-G., ☉. f. m. Cuba.

*repanda* Lagasc., ausgeschweiften, ☉. f. Südamerika.

**Flemingia** Roxb. (John Fleming, englischer Gelehrter), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*congesta* Roxb., gedrängtblumige, ♀. w. Ostindien.

*guineensis* G. Don, guineische, ♀. w. Guinea.

*lineata* Roxb., linirte, ♂. ♀. w. Ceylon.

*nana* Roxb., zwergige, ♀. w. Ostindien.

*procumbens* Roxb., niederliegende, 4. w. Ostindien.

*prostrata* Roxb., hingestreckte, 4. w. Ostindien.

*semialata* Roxb., halbflügelige, ♀. w. Nepal.



**Flemingia**

*stricta* Roxb., steife, 4. w. Ostindien.

*strobilifera* RB., zapfentragende, ♀. w. Ostindien.

**Flindersia** RB. (Capitain M. Flinders, berühmter Seefahrer), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

*australis* RB., neuholländische, ♀. t. Neuholland.

**Flüggea** W. (J. Flügge, deutscher Botaniker), XXII. v. (V. 1.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*Leucopyrus* W., weifsfrüchtige, ♀. w. Ostindien.

**Foeniculum** T., Fenchel, V. 11., Umbelliferae.

*officinale* All. (*vulgare* G.), gemeiner, ♂. 4. f. England, Südeuropa, Caucasus.

b) *dulce*.

*piperitum* (Bertol.), Pfeffer-F., ♂. f. Italien.

**Foetidia** Commers., Stinkholz, XII. 1., ? Onagrariae, ? Philadelphaeae.

*mauritiana* Lam., mascarenisches, ♀. w. Mascarenas.

**Fontanesia** LaBill. (Desfontaines, berühmter französ. Botaniker), II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

*phillyreoides* LaBill., steinlindenähnliche, ♀. k. Syrien.

**Forskolea** L. (Peter Forskol, schwedischer Botaniker). XXI. 1., Urticaceae.

*angustifolia* Retz, schmalblättrige, ☉. f. Teneriffa.

*candida* L. suppl. (*scabra* Retz), weisse, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*fruticosa* W., strauchige, ♀. k. Teneriffa.

*tenacissima* L. (*latifolia* Retz), zähe, ☉. f. Aegypten.

**Fothergilla** L. fil. (John Fothergill, Beförderer der Botanik), XIII. 11., ? Cunoniaceae, ? Hamamelideae.

*alnifolia* L. fil. (*Gardeni* Mchx.), erlenblättrige, ♀. k. f. b. Carolina.

a) *obtusa* Sims (*major* Lodd.). β) *acuta* Sims (*Gardeni* Jacq.). γ) *major* Sims. δ) *serotina* Sims.

**Fothergilla mirabilis** Aubl. v. *Diplochita* Fothergilla Nachtr.**Fragaria** T., Erdbeere, XII. 111., Rosaceae-Potentilleae.

*bonariensis* Juss., bonarische, 4. k. f. Buen. Ayres.

*canadensis* Mchx., canadische, 4. f. Canada.

*chilensis* Molin., chilesische, 4. f. Chili.

*collina* Ehrh. (*hispida* Duches.), Hügel-E., 4. f. Europa.

β) *pratensis* L. (*Breslingia* Duch.).

*elatior* Ehrh., hohe, 4. f. Europa.

*grandiflora* Ehrh., großblumige, 4. f. Surinam.

β) *calycina* Loisel.

*indica* Andr., indische, 4. k. t. Nepal.

*monophylla* Duches., einblättrige, 4. f. ?

*platanoides* Sering, platanusblättrige, 4. f. Nordamer.

*vesca*, L., gemeine, 4. f. Europa.

β) *majausa* Duch. γ) *semperflorens* Hey. (*alpina* P.). δ) *eflagellis* Duch. ε) *muricata*. ζ) *fruct. albo*.

*virginiana* Ehrh., virginische, 4. f. Nordamerika.

**Franciscea** Pohl (Franz II., Kaiser von Oesterreich, großer Beförderer der Botanik), XIV. 11., Solanaceae.

*uniflora* Pohl (*Hopeana* Hook), einblumige, ♀. w. Brasilien.

**Francoa** Cav. (F. Franco von Valencia, Beförderer der Pflanzenkunde, im XVI. Jahrh.), VIII. 1v., ? Saxifrageae.

**Francoa**

- appendiculata Cav., anhängselige, 4. k. Chili.  
 ramosa D. Don, ästige, 4. k. Chili.  
 sonchifolia Spgl., gänsedistelblättrige, 4. k. Chili.

**Frankenia** L. (J. Frankenius, Professor der Botanik zu Upsala), VI. 1., Cistineae-Frankeniaceae.

- corymbosa Dsf., traubendoldige, 4. k. Nordafrika.  
 ericaefolia C. Sm., heideblättrige, 4. k. Canarische Inseln.  
 fruticulosa DC., strauchige, 4. t. Neuholland.  
 hirsuta L., rauhhaarige, 4. k. Nordafrika.  
 hispida DC. (*hirsuta* Sibth.), hackerige, 4. f. k. Kleinasien, Sibirien.  
 intermedia DC., mittlere, 4. k. Nordafrika.  
 laevis L., glatte, 4. k. f. England, Südeuropa.  
 mollis MB., weiche, 4. f. Caucasus.  
 nodiflora Lam., knotenblumige, 4. k. Cap d. gut. H.  
 Nothria Thbg., Nothria-F., 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 pulverulenta L., bestäubte, 4. f. England, Südeuropa, Nordafrika, Taurien.

**Franseria** Cav. (A. Franser, ? spanischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Ambrosiaceae.

- ambrosioides Cav., ambrosiaähnliche, 4. t. Mexico.  
 artemisoides W., beifufsähnliche, 4. t. Peru.

**Fraseria** Walt. (J. Fraser, welcher in Nordamerika Pflanzen sammelte), IV. 1., Contortae-Gentianeae.

- carolinensis Walt. (*Walteri* Mchx.), karolinische, 4. f. Carolina, Virginien.

**Fraxinus** T., Esche, II. 1. (XXIII. 11.), Sapotaceae-Oleinae.

- acuminata Lam. (*concolor* Mchx.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.  
 alba Bosc. (*caroliniana* alba s. *americana* alba Hortul.), weisse, 4. Nordamerika.  
 americana L. (*alba* Bartr., *discolor* Mühlbg.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.  
 β) latifolia.  
 angustifolia Vahl, schmalblättrige, 4. f. Spanien, Portugal.  
 argentea Loisel., silberfarbige, 4. f. Corsica.  
 caroliniana Lam. (*serratifolia* Mchx., *lanceolata* Borkh.), karolinische, 4. f. Nordamerika.  
 chinensis Roxb., chinesische, 4. k. China.  
 cinerea Bosc., aschgraue, 4. f. Nordamerika.  
 elliptica Bosc., elliptische, 4. f. Nordamerika.  
 epiptera Mchx. (*canadensis* G., *lancea* Bosc.), lanzettblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.  
 excelsior L., gemeine, 4. f. Europa, Asien.  
 a) argentea. b) aurea. c) aurea pendula. d) crispa (*atrovirens* Dsf.). e) erosa. f) fungosa. g) horizontalis. h) jaspidea. i) Kincairniae. k) lutea. l) nana Lodd. (*humilis* Hort.). m) pendula Ait. n) purpurascens. o) verrucosa Dsf. p) verrucosa pendula. q) striata. r) verticillata. s) villosa.

- expansa W. (*caroliniana* Hort.), ausgebreitete, 4. f. Nordamerika.

- fusca Bosc., bräunliche, 4. f. Nordamerika.

**Fraxinus**

*heterophylla* Vahl (*simplicifolia* W., *monophylla* Dsf., *excelsior diversifolia* Ait.), verschiedenblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *variegata*.

*juglandifolia* Lam., nufsblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *subintegerrima* Vahl (*novae-Angliae* et *caroliniana* Mill.).

*lentiscifolia* Dsf. (*tamariscifolia* Vahl, *parvifolia* Lam.), pistacienblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Syrien.

$\beta$ ) *pendula*.

*longifolia* Bosc, langblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*macrophylla* Thouin, grofsblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. ?

*mixta* Bosc, gemischte,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*nana* Bosc (*polemoniifolia* Poir., *appendiculata* P.), Zwerg-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*nigra* Bosc, schwarze,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*ovata* Bosc, eiblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*oxycarpa* W. (*oxyphylla* W.), schmalfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  f. Taurien.

*pallida* Bosc, bleiche,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*pannosa* Vent., faserlappige,  $\frac{1}{2}$  f. Carolina.

*parvifolia* W., kleinblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Kleinasien, Nordafrika.

*platycarpa* Mchx., breitfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*pubescens* Walt. (*nigra* du Roi, *tomentosa* Mchx.), weichhaarige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *latifolia* W.  $\gamma$ ) ? *subpubescens* P. (? *subvillosa* Bosc).

*pulverulenta* Bosc, bestäubte,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*quadrangulata* Mchx. (*tetragona* Cels), vierkantige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *nervosa* Lodd.

*Richardi* Bosc, Richard's,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*rubicunda* Bosc, röthliche,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*rufa* Bosc, gelbrothe,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*sambucifolia* Lam. (*nigra* Mch.), fliederblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) *crispa* Lodd.

*Schiedeana* Schltld., Schiede's,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*triptera* Nutt., dreiflügelige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*viridis* Bosc (*virens* Lodd.), grünende,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamer.

b) *variegata*.

Unbestimmte: *amarissima* Lodd., *appendica* Lodd., *lucida* Lodd.

*floribunda* Wall., *Ornus* L. etc. v. *Ornus floribund. europaea* etc. *laevigata* H. Par. v. *Pterocarya caucasica*.

**Freziera** Sw. (A. F. Frezier, bereiste Peru und Chili), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

*theaeoides* Sw., theeähnliche,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

**Friesia** DC. (E. M. Fries, berühmter schwedischer Botaniker), XI. 1., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

*peduncularis* DC., gestielte,  $\frac{1}{2}$  t. Van-Diemens-Land.

*Friesia argentea* Spgl. v. *Crotonopsis linearis*.

**Fritillaria** T., Schachblume, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

I. *Genuina*.

*alba* Nutt., weisse, 4. Zw. f. Nordamerika.

*cuprea* Grah., kupferfarbige, 4. Zw. k. Mexico.



## Fritillaria

*lanceolata* Pursh (*camtschutensis* Hort.), lanzettliche, 4.

Zw. f. Kamtschatka, Nordamerika.

*latifolia* W., breitblättrige, 4. Zw. f. Caucasus.

*leucantha* Fisch., weißblumige, 4. Zw. f. Sibirien.

*lusitanica* Wickstr., portugiesische, 4. Zw. f. Portugal.

*lutea* MB. (*collina* Adam), gelbe, 4. Zw. f. Caucasus.

*macrophylla* D. Don, großblättrige, 4. Zw. f. Nepal.

*meleagroides* Fisch., ähnelnde, 4. Zw. f. Sibirien.

*Meleagris* L., gemeine, 4. Zw. f. Mittel- u. Südeuropa.

b) *multiplex*.

*messanensis* Rafin. (? *plantaginifolia* Lam.), sizilianische,

4. Zw. f. Sicilien.

*minor* Ledeb. (*meleagroides* Patr.), kleine, 4. Zw. f.

Altai.

*nervosa* W. (*latifolia*  $\beta$ , *minor* Bot. mag.), nervige, 4.

Zw. f. Caucasus.

*nigra* Bot. mag. (*pyrenaica* Bot. mag.), schwärzliche, 4.

Zw. f. Pyrenäen.

*obliqua* Bot. mag., schiefblättrige, 4. Zw. f. Caucasus.

*persica* L., persische, 4. Zw. f. Persien.

*praecox* Swt. (*meleagris*  $\beta$ , *alba* Hort.), frühe, 4. Zw. f.

Südeuropa.

b) *minima* Swt.

*pudica* Spgl., schamhafte, 4. Zw. f. Nordamerika.

*pyrenaica* L. (*racemosa* Bot. mag.), pyrenäische, 4. Zw. f.

Pyrenäen, Rußland.

*ruthenica* Wikstr. (*verticillata* MB., *pyrenaica* Pall., *per-*

*sica* S. G. Gmel.), russische, 4. Zw. f. Taurien,

Caucasus.

*tenella* MB. (*racemosa minor* Bot. mag.), zierliche, 4.

Zw. f. Illyrien, Istrien, Caucasus.

$\beta$ ) *montana* Hoppe.

*tulipifolia* MB. (*caucasica* Adam), tulpenblättrige, 4.

Zw. f. Caucasus.

*verticillata* W., wirtelblättrige, 4. Zw. f. Sibirien, Japan.

II. *Petilium* L. (*Imperialis* Juss. Dumont Cours.).

*Imperialis* L., Kaiserkrone, 4. Zw. f. Persien.

b) *lutea* (*flava*). c) *lutea plena*. d) *rubra plena*.

e) *aurantiaca*. f) *fol. variegat.*

*barbata* Kunth et *purpurea* Kunth v. *Cyclobothra*

*barbata* etc.

*Froelichia lanata* Mch. v. *Hoplotheca interrupta*.

*Frolovia* DC. (Frolow, russischer Botaniker), XIX. 1.,

Compositae-Cynarocephalae.

*lyrata* Ledeb., leierförmige, 4. f. Altai.

*Fuchsia* Plum. (et *Dorvalia* Commers. Hffmsg. et *Alo-*

*pecia* Hffmsg.), (L. Fuchs, berühmter deutscher Bo-

taniker), VIII. 1., Onagrariae.

*apetala* R. et P., kronenlose,  $\frac{1}{2}$  k. t. Peru.

*arborescens* Sess., baumartige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Mexico.

*bacillaris* Lindl., starkästige,  $\frac{1}{2}$  t. Mexico.

*coccinea* L., scharlachfarbige,  $\frac{1}{2}$  k. Chili, Patagonien.

b) *Groomiana* Hort.

*conica* Lindl., D. Don, kegelförmige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Chili.

*corymbiflora* R. et P., traubendoldige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Peru.

*cylindracea* Lindl., cylinderblumige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Mexico.

*decussata* R. et P., kreuzblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. Peru.

*denticulata* R. et P., gezähnelte,  $\frac{1}{2}$  t. Peru.

**Fuchsia**

*excorticata* L., rindenlose, ♀. t. Neuzeeland.

*fulgens* DC., feuerfarbige, ♀. t. Texas.

*gracilis* Lindl. (*decussata* Grah.), schlanke, ♀. k. t. Mexico.

b) *multiflora*.

*lycioides* Andr., bocksdornähnliche, ♀. k. t. Chili.

*macrostemma* R. et P., grobsfadige, ♀. k. t. Chili.

*microphylla* Kunth, kleinblättrige, ♀. k. t. Mexico.

b) *grandiflora*,

*ovalis* R. et P., eiförmige, ♀. t. Peru.

*parviflora* Lindl., kleinblumige, ♀. t. Mexico.

*serratifolia* R. et P., sägeblättrige, ♀. k. t. Peru.

*tenella* Loud., zarte, ♀. k. t. Chili.

*thymifolia* Kunth, thymianblättrige, ♀. k. t. Mexico.

*venusta* Kunth, liebliche, ♀. t. k. Mexico.

*virgata* Swt., ruthenförmige, ♀. k. t. Chili.

Hybriden: *elegans* Paxt., *eximia* Hort., *Fourgettii* Hort., *globosa* D. Don (et *major* Hort.), *Harrisonii* Hort., *grandiflora* Hort., *hybrida* Swt., *longiflora* Hort., *multiflora* Hort., *Thompsonii* Hort. *Youngii* Hort.

*involucrata* Sw. v. *Schradera cephalotes*.

**Fuirena** Rottb. (Georg Fuiren, dänischer Botaniker), III. 1., Cyperaceae.

*umbellata* Rottb., doldige, 4. w. Westindien, Neuholl.

**Fumaria** T., Erdrauch, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumarieae.

*capreolata* L., rankender, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

*densiflora* DC., dichtblumiger, ☉. f. Südfrankreich.

*officinalis* L., gemeiner, ☉. f. Europa, Asien etc.

β) *media* Loisel.

*parviflora* Lam, (*tenuifolia* Flor. Wett., *micrantha* Lag.), kleinblumige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

*spicata* L., ähriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*Vaillantii* Loisel., *Vaillant's*, ☉. f. Europa.

*acaulis* Wulf. etc. v. *Corydalis acaulis* etc. *Cucullaria* L. etc. v. *Dielytra Cucullaria* etc. *enneaphylla* L. v. *Sarcocapnos enneaphylla*. *fungosa* Ait. v. *Adlumia cirrhosa*. *vesicaria* L. v. *Cysticapnos africana*.

**Funkia** Spgl. (H. Funk, berühmter deutscher Mooskenner), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (*Hemerocallideae*).

*albo-marginata* Hook., weisrandige, 4. f. k. Japan.

*cucullata* Hort., kappenförmige, 4. k. f. Japan.

*lancifolia* Spgl. (? *lanceaefolia* Dens, *japonica* Hort.), lanzettblättrige, 4. k. f. Japan.

b) *fol. variegat*.

*ovata* Spgl. (*coerulea* Hort.), eiförmige, 4. f. Japan.

*Sieboldtiana* Dens, *Sieboldt's*, 4. f. k. Japan.

*subcordata* Spgl. (*alba* Hort.), herzblättrige, 4. f. Japan.

*undulata* J. C., wellenblättrige, 4. f. k. Japan.

b) *fol. variegatis*.

**Furcraea** Vent. (*Fourcroya* Auct., *Fourcroy*, berühmter französischer Chemiker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (*Bromeliaceae*).

*australis* Haw., neuholländische, 4. ♀. t. Neuholland.

**Furcraea**

Cantala Wall., Cantala-F., 4.  $\frac{1}{2}$ . t. China.  
 cubensis Haw., cubaische, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Cuba.  
 gigantea Vent. (*foetida* Hort.), riesenhafte, 4.  $\frac{1}{2}$ . w.  
 Südamerika.

longaeva Karw. et Zucc., langlebende, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Mexico.  
 madagascariensis Haw., madagascarische, 4.  $\frac{1}{2}$ . w.  
 Madagascar.

rigida Haw., starre, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.  
 tuberosa Haw., knollige, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.

**Fusanus** L., Spindelstrauch, IV. 1. (XXIII. II.), Sandalaceae.

compressus L., plattästiger,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Cap d. g. Hoffn.

**Gärtnera** Lam. (J. Gärtner, berühmter deutscher Botaniker), V. 1., Contortae-Loganieae.

vaginata Lam., scheidige,  $\frac{1}{2}$ . w. Mascarenas.

**Gärtnera obtusifolia** Roxb. et **racemosa** Roxb. v. **Hiptage obtusifol.** et **Madablota**.**Gagea** Salisb. (Sir Thomas Gage, englischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

arvensis R. et S. (*villosa* Loud., *stellaris* Salisb.), Acker-G., 4. Zw. f. Europa, Caucasus.

bohemica R. et S., böhmische, 4. Zw. f. Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.

bulbifera R. et S., vielzwiebelige, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

chlorantha (MB.), grünblumige, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

circinata (L.), kreisförmige, 4. Zw. f. Taurien, Caucas.

Liottardi R. et S. (? *glauca* Swt.), Liottardi's, 4. Zw. f. Mitteleuropäische Alpen.

lutea R. et S. (? *fascicularis* Salisb., *sylvatica* Loud.), gelbe, 4. Zw. f. Europa, Caucasus.

minima R. et S. (*Sternbergii* Hopp.), kleinste, 4. Zw. f. Europa, Mittel- und Nordasien.

podolica R. et S., podolische, 4. Zw. f. Podolien.

pratensis Koch, Wiesen-G., 4. Zw. f. Baireuth.

pusilla R. et S. (? *Clusiana* Tausch), niedrige, 4. Zw. f. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus, Sibirien.

pygmaea G. Don, Zwerg-G., 4. Zw. f. Spanien, Creta.

saxatilis Koch, Gesteins-G., 4. Zw. f. Mittel- und Westdeutschland, Schweiz.

spathacea R. et S. (? *bracteolaris* Salisb.), scheidige, 4. Zw. f. Norddeutschland.

stenopetala Rchb. (*pratensis* R. et S.), schmalkronige, 4. Zw. f. Europa.

β) *Schreberi* Rchb.

uniflora G. Don, einblumige, 4. Zw. f. Sibirien.

*serotina* Bot. mag. (*striata* Swt.) v. *Lloydia serotina*.

**Gagnebina** Neck., **Gagnebina**, X. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

axillaris DC., achselblumige,  $\frac{1}{2}$ . w. Mascarenas.

tamariscina DC., tamariskenähnliche,  $\frac{1}{2}$ . w. Mascarenas.

**Gahnia** Forst. (H. Gahn, schwedischer Botaniker), VI. 1., Cyperaceae.

procera Forst., hohe, 4.  $\frac{1}{2}$ . t. k. Neuzeeland.

**Gaillardia** Foug., Lam. (M. Gaillard de Marentonneau, Freund der Botanik), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.



**Gaillardia**

*aristata* Pursh, gegrannte, 4. f. Nordamerika.

*Drummondii* DC. (*bicolor Drummondii* Hook., *picta* D. Don, *coccinea* Hort.), Drummond's, ☉. ♂. f. k. Texas.

*lanceolata* Mchx. (*rustica* Cass., *bicolor* Ell.), lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.

*pulchella* Foug. (*bicolor* Lam., *amara* Rafin.), hübsche, 4. f. Carolina, Florida.

? *Richardsonii* Penny, Richardson's, 4. f. Nordamerika.

**Galactia** P. Br., Milhhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*glabella* Mchx., glatte, 4. Sch. f. Nordamerika.

*mollis* Mchx., weiche, 4. Sch. k. f. Nordamerika, Westindien.

*pendula* P., hängende, ♂. Sch. w. Westindien, Brasilien.

*sericea* P., seidenhaarige, ♂. Sch. w. Mascarenas.

*pinnata* P. v. *Barbieria polyphylla*.

**Galactites** Mch., Milchdistel, XIX. iii., Compositae-Cynarocephalae.

*australis* Swt., neuholländische, ☉. f. Neuholland.

*tomentosa* Mch., filzige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Galactodendron** H. B. K., Kuh (Milch)baum, XXIII. ii., Urticaceae.

*utile* H. B. K., nutzbarer, ♂. w. Südamerika.

**Galanthus** L., Schneeglöckchen, VI. i., Narcisseae (*Amaryllideae*).

*nivalis* L., gemeines, 4. Zw. f. Europa.

b) *flore pleno*.

*plicatus* MB., gefaltetes, 4. Zw. f. Caucasus, Mittelasien.

*Galatella* Cass. v. *Aster*.

**Galax** L., Milchblume, V. i., Saxifrageae.

*aphylla* L., blattlose, 4. f. Nordamerika.

**Galaxia** L., Galaxie, III. i. (XVI. i.), Irideae.

*ciliata* P. (*ovata* Andr.), gefranzte, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*graninea* Thbg., grasartige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*grandiflora* Andr. (*multiflora* Spgl.), großblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*mucronularis* Salisb., feinspitzige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*ovata* Thbg., eiförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*versicolor* Salisb., bunte, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*ixiaeflora* Red. v. *Ixia monadelphae*. *plicata* Jacq.

v. *Lapeyrousia fasciculata*. *ramosa* DC. v. *Ixia columellaris*.

*Galedupa uliginosa* Roxb. v. *Pongamia uliginosa*.

**Galega** T., Geißraute, XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*biloba* Swt., zweilappige, 4. f. ?

*officinalis* L., officinelle, 4. f. Mittel-, Süd- u. Westeuropa.

b) *alba*.

*orientalis* Lam. (*montana* Schult., *elatio* Hort.), morgenländische, 4. f. Caucasus, Kleinasien.

*persica* P., persische, 4. f. Persien.

b) *lilacina* Penny.

*tricolor* Hook., dreifarbig, 4. f. ?

*biflora* Poir., *caribaea* Jacq. etc. v. *Tephrosia biflora*, *caribaea* etc, *filiformis* Jacq. etc. v. *Sweetia filiformis* etc.

- Galenia** L. (C. Galenus, berühmter griechischer Arzt), VIII. II., ?Aizoideae.  
*africana* L. (*linearis* Thbg.), afrikanische, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Galeobdolon** Huds., Waldnessel, XIV. I., Labiatae.  
*luteum* Huds., gelbe, 4. f. Europa.  
 b) *variegatum*.
- Galeopsis** T., Hohlzahn, XIV. II., Labiatae.  
*bifida* Bönningh., zweispaltiger, ☉. f. Deutschland.  
*canescens* MB. (*grandiflora* Bl. et Finger.), graulicher, ☉. f. Osteuropa, Caucasus.  
*intermedia* Vill. (*parviflora* Lam., *Lad. β. latifolia parviflora* Koch), mittlerer, ☉. f. Frankreich, West-, Ost- und Norddeutschland.  
*Ladanum* L., *Ladanum*-H., ☉. f. Europa, Mittelasien.  
 β) *angustifolia* Ehrh.  
*ochroleuca* Lam. (*grandiflora* Ehrh., *villosa* Huds.) gelbweißser, ☉. f. West- u. Norddeutschland, Frankreich.  
*pubescens* Bess. (*Walterina* v. Schltld., *cannabina* Gmel.), weichhaariger, ☉. f. Deutschland, Galicien.  
*Tetrahit* L., gemeiner, ☉. f. Europa, Nordamerika.  
*versicolor* Curt. (*cannabina* Roth), bunter, ☉. f. Europa.  
*Galeobdolon* L. v. *Galeobdolon luteum*.
- Galinsoga** Cav. (M. M. Galinsoga, Inspector des Madrider botanischen Gartens), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*balbisoides* H. B. K., *balbisia*ähnliche, ☉. f. Mexico.  
*trilobata* Cav., dreilappige, ☉. f. Neuspanien.  
*parviflora* W. v. *Wiborgia* Acme. *discolor* Speg. v. *Verbesina atriplicifolia*.
- Galipea** Aubl. (guianischer Name), II. I., Tricoccae-Rutaceae.  
*odoratissima* Lindl., wohlriechende, f. w. Brasilien.  
*trifoliata* Aubl., dreiblättrige, f. w. Guiana.
- Galium** L. (*Gallium* et *Aparine* T.), Labkraut, IV. I., Rubiaceae.  
*anglicum* Huds., englisches, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, England.  
 β) *litigiosum* DC. (*parisiense* DC.). γ) *minutiflorum* Brot.  
*Aparine* L., klebendes, ☉. f. Europa, Asien, Afrika etc.  
 β) *Vaillantii* DC. (*infestum* W. K., *agreste* a Wallr.). γ) *spurium* L. (*hispidum* Roth), *agreste* β. Wallr.).  
*arenarium* Lois., Sand-L., 4. f. Westfrankreich.  
*aristatum* L. (*laevigatum* L.), gegranntes, 4. f. Südeuropa, Ungarn.  
 β) *linifolium* Lam.  
*articulatum* R. et S., gegliedertes, 4. f. Aegypten, Kleinasien.  
*Barrelieri* Hort., *Barrelier's*, 4. f. ?  
*boreale* L., nördliches, 4. f. Europa, Mongolei.  
 β) *hyssopifolium* Hoffm.  
*brachyphyllum* R. et S. (*brevifolium* Stev.), kurzblättriges, 4. f. Caucasus.  
*brevifolium* Sm., kleinblättriges, 4. k. f. Kleinasien.  
*campestre* Schousb., Feld-L., ☉. f. Nordafrika.  
*capillare* Cav., haarförmiges, ☉. f. Südspanien, Creta.

**Galium**

capillipes Rchb., haarstieliges, 4. f. Ungarn.  
 caucasicum Lagasc., caucasisches, 4. f. Caucasus.  
 chersonense R. et S., chersonisches, 4. f. Taurien.  
 cinereum All., aschgraues, 4. f. Oberitalien.  
 Cruciata Scop. (*cruciatum* Sm.), kreuzblättriges, 4. f. Europa.

Cucullaria R. et S., kappenförmiges, 4. f. Kleinasien.  
 debile W. (*helodes* Lk.), schwaches, 4. f. Spanien, Portugal.

diffusum Schrad., weitschweifiges, 4. f. Südeuropa.  
 divaricatum Lam., ausgesperartes, 4. f. Südfrankreich.  
 ellipticum W. Presl, elliptisches, 4. f. Sicilien, Spanien.  
 erectum Huds., aufrechtes, 4. f. England.  
 fragile Poir., zerbrechliches, 4. f. Südeuropa.  
 fruticosum W. (*junceum* Sm., *dichotomum* Lehm.), strauchiges, 4. k. Creta.

glabrum Thbg., glattes, 4. k. Cap der gut. Hoffnung.  
 graecum L., griechisches, 4. f. k. Griechenland.

granulatum Schrad., körniges, 4. f. ?

helveticum Weig. (*baldense* Spgl.), schweizerisches, 4. f. Schweiz, Tyrol, Oberitalien, Frankreich.

insubricum Gaud., mailändisches, 4. f. Südliche Schweiz, Oberitalien.

Jussieu Vill., Jussieu's, 4. f. Frankreich.

lithospermifolium Fisch., steinsamenblättriges, 4. f. Rußland.

lucidum All., glänzendes, 4. f. Südeuropa.

maritimum L., Seestrands-L., 4. f. Südfrankreich.

megalospermum All., großsamiges, 4. f. Oberitalien und französische Alpen.

microcarpum Vahl (*setaceum* Lam., *floribundum* Sm.), kleinfrüchtiges, 4. f. Nordafrika, Kleinasien, Corsica, Südfrankreich.

microspermum Dsf., kleinsamiges, 4. f. Nordafrika.

Mollugo L., weisses, 4. f. Europa.

β) tyrolense W.

murale All. (*minimum* R. et S., *verticillatum* Danth.), Mauer-L., 4. f. Südeuropa.

ochroleucum Kit., weißgelbes, 4. f. Ungarn.

palustre L., Sumpf-L., 4. f. Europa.

pedemontanum All. (*retrosum* DC.), piemontesisches, 4. f. Südeuropa, Ungarn.

pilosum Ait., haariges, 4. f. Nordamerika.

pumilum Lam. (*trichophyllum* All.), kleines, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

a) hypnoides Vill. β) pubescens DC. (*hirtellum* Gaud.). γ) majus Koch (? *austriacum* Jacq.).

purpureum L., purpurfarbiges, 4. f. Südeuropa.

reflexum Presl (*tauricum* R. et S.), zurückgebogenes, 4. f. Taurien, Sicilien.

rigidum Ait., starres, 4. k. ? Azoren.

rotundifolium L., rundblättriges, 4. f. Europa.

rubioides L., rötheähnliches, 4. f. Südeuropa.

rubrum L., rothblumiges, 4. f. Südeuropa.

β) obliquum Vill. (*mucronatum* Lam.).

rugosum DC., runzeliges, 4. f. ?

ruthenicum W., russisches, 4. f. Taurien, Vohlhynien, Georgien.



**Galium**

saccharatum All. (*verrucosum* Sm.), warziges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

saturejaefolium Trevir., satureiblätteriges, 4. f. Astrachan, Caucasus.

saxatile L. (*hercynicum* Weig., *montanum* Huds., *procumbens* Wither.), Gestein-L., 4. f. Europa.

scaberrimum Vahl, Hornem. (*hispidum* W. E.), scharfes, ☉. f. Aegypten.

sylvaticum L. (*laevigatum* Vill., *Schultesii* Vest), Wald-L., 4. f. Europa.

sylvestre Poll. (*pusillum* L., *multicaule* Wallr.), vielstengeliges, 4. f. Europa.

a) *glabrum* Schrad. (*umbellatum* Lam., *laeve* Thuill., *anisophyllum* et *montanum* Vill.). β) *hispidum* Schrad. γ) *pubescens* Schrad. (*Bocconi* All.), *umbellatum* β. Lam. *scabrum* P., *asperum* Schrb., *nitidulum* Thuill.). δ) *supinum* Lam. ε) *alpestre* Gaud. (*argenteum* Vill.).

tataricum Treviran., tatarisches, 4. f. Astrachan.

tenerum Schlchr., zartes, ☉. f. Schweiz.

tenuifolium All. (*corrudaefolium* Vill.), feinblätteriges, 4. f. Frankreich, Italien.

tenuissimum MB., feinstes, ☉. f. Taurien, Aegypten.

tinctorium L., färbendes, 4. f. Nordamerika.

tricornis Wither. (*spurium* Roth), dreihörniges, ☉. f. Europa.

trifidum L., dreispaltiges, 4. f. Steyermark, Norwegen, Lapland.

triflorum Mchx. (*suaveolens* Wahlbg.), dreiblumiges, ☉. f. Pennsylvanien, Nordschweden, Grönland.

uliginosum L. (*Witheringii* Sm., *montanum* Wither.), Morast-S., 4. f. Europa.

valantioides MB., valantiaähnliches, 4. f. Caucasus.

vernum Scop. (*Halleri* R. et S.), Frühlings-L., 4. f. Ost-, Mittel- und Süddeutschland, Schweiz, Italien.

β) *Bauhini* R. et S.

verum L., ächtes (gelbes), 4. f. Europa.

β) *intermedium* (*ochroleucum* Wolf non Kit., *hybridum* Auctor).

Villarsii Req., Villars's, 4. f. Frankreich, südl. Schweiz.

villosum Lam., zottiges, 4. f. Südfrankreich.

*campanulatum* Vill. (*glaucum* L. Jacq., *montanum* Poll.), *humifusum* MB., *rupestre* Visian. v. *Asperula galioides* etc.

**Galphimia** Cav. (Anagramm von *Malpighia*), X. III., *Malpighiaceae*.

*glaucum* Cav., blaugrüne, ♀. Sch. w. Mexico.

*hirsuta* Cav., rauhaarige, ♀. w. Mexico.

**Gamolepis** Less., *Gamolepis*, XIX. II., *Compositae-Corymbiferae*.

*Tagetes* DC. (*annua* Less.), sammetblumenähnliche, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

**Garcinia** L. (L. Garcin, welcher Indien bereiste), XI. I., *Guttiferae-Garcinieae*.

*Cambogia* Desr., Gutti-G., ♀. w. Ostindien.

*cornea* L., hornartige, ♀. w. Molucken.

*Cowa* Roxb. (*dioeca* Sm.), Cowa-G., ♀. w. Ostindien.

*Mangostana* L., Mangosta-G., ♀. w. Molucken.

**Gardenia Ellis** (A. Garden, englischer Naturforscher),  
V. 1., Rubiaceae.

- amoena Ker, liebliche, ♀. w. China, Ostindien.  
angustifolia Lodd., schmalblättrige, ♀. w. ?  
armata Sw., bewaffnete, ♀. w. Westindien.  
campanulata Roxb., glockige, ♀. w. Ostindien.  
dumetorum Retz, Hecken-G., ♀. Ostindien.  
florida L., blüthenreiche, ♀. t. w. Ostindien, Molucken.

b) flore pleno.

- fragrans Roxb., wohlriechende, ♀. w. Ostindien.  
grandiflora Lour., großblumige, ♀. w. Cochinchina.  
latifolia Ait., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.  
longispina Spgl., langdornige, ♀. w. Ostindien.  
lucida Roxb., glänzende, ♀. w. Ostindien.  
mexicana Loud., mexicanische, ♀. w. Mexico.  
micrantha Thbg., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.  
montana Roxb., Berg-G., ♀. w. Ostindien.  
Mussaenda L., mussaendaähnliche, ♀. w. Südamerika.  
nutans Spgl., überhängende, ♀. w. Ostindien.  
pannea Lindl., tuchige, ♀. w. Südamerika.  
Pavetta Fisch., Pavetta-G., ♀. w. Ostindien.  
propinqua Lindl., verwandte, ♀. w. Ostindien.  
pubescens Roth, weichhaarige, ♀. w. Ostindien.  
radicans Thbg., starkwurzelnende, ♀. t. w. Japan, China.  
Rothmannia L., Rothmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
spinosa Thbg., dornige, ♀. t. w. Ostindien, China.  
theobromaefolia Fisch., kakaoblättrige, ♀. w. Südamer.  
Thunbergia L., Thunberg's, ♀. t. w. Cap d. gut. Hoffn.  
uliginosa Retz, Sumpf-G., ♀. w. Ostindien.  
    *esculenta* Spgl. v. *Genipa esculenta*. *multiflora* W.  
    et *Randia* Sw. v. *Randia longiflora* et *aculeata*.  
    *tubiflora* Andr. v. *Oxyanthus speciosus*.

**Gardoquia R. et P.** (D. Diego Gardoqui, spanischer Edelmann), XIV. 1., Labiatae.

- betonicoides Lindl., betonienähnliche, 4. t. k. Mexico.  
discolor H. B. K., verschiedenfarbige, 4. ♀. t. w. Neugranada, Peru.  
Gilliesii Grah., Gillies's, ♀. t. Chili.  
Hookeri ?Benth., Hooker's, ♀. t. Chili.  
multiflora R. et P., vielblumige, ♀. t. Chili.

**Garidella T.** (P. Garidel, französischer Botaniker), X. 11., Ranunculaceae.

- Nigellastrum L., schwarzkümmelähnliche, ☉. f. Südfrankreich.

**Garrya Lindl.** (Nicholas Garry, Secretair der Hudsonsbay-Compagnie), XXII. 11., Garryaceae.

- elliptica Lindl., elliptische, ♀. k. Neucalifornien.

**Garuga Roxb.** (indischer Name), X. 1., Amyrideae.

- pinnata Roxb., gefiederte, ♀. w. Ostindien.

**Gasteria Duv.**, Haw. v. Aloe.

**Gastonia Commerz. Juss.** (Gaston de Bourbon, Sohn Heinrich's IV., Gönner der Botanik), XI. v., Araliaceae.

- palmata Roxb., handförmige, ♀. w. Ostindien.

**Gastridium P. B.**, Bauchspelze (Nüschengras), III. 11., Gramineae.

- australe P. B., südliche, ☉. f. Südeuropa.  
muticum Spgl. (*scabrum* Presl, *siculum* Trin.), unbewehrte, ☉. f. Sicilien.

- Gastrocarpha runcinata* D. Don v. *Moscaria pinnatifida*.
- Gastrochilus** Wall., D. Don, Bauchlippler, I. 1.  
(?XX. 1.), Scitamineae, ?Orchideae.  
pulcherrimus Wall., schönster, 4. w. Ostindien.
- Gastrodia** RB., Zahnstendel, XX. 1., Orchideae.  
sesamoides RB., schuppiger, 4. w. Neuholland.
- Gastrolobium** RB., *Gastrolobium*, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.  
bilobum RB., zweilappiges, ♀. t. Neuholland.  
retusum Lindl., abgestutztes, ♀. t. Neuholland.
- Gastronema** Herb., Sims, Bauchfaden, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.  
clavatum Herb., Sims, keulenförmiger, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.
- Gatyna** Cass., *Gatyna*, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.  
globulifera Cass., kugelblumige, ☉. f. Südeuropa.
- Gaudichaudia** H. B. K. (Ch. Gaudichaud, französischer Naturforscher), V. 1., Malpighiaceae.  
cynanchoides H. B. K., cynanchumähnliche, ♀. Sch. w. Mexico.
- Gaudinia** P. Beauv. (Gaudin, schweizerischer Botaniker), III. 11., Gramineae.  
fragilis P. Beauv., spröde, ☉. f. Südeuropa.
- Gaultheria** L. (Gaulthier, französischer Arzt und Naturforscher), X. 1., Ericaceae.  
anastomosans H. B. K., aderige, ♀. t. Südamerika.  
antipoda Forst., südliche, ♀. t. k. Neuzeeland.  
erecta Vent., aufrechte, ♀. t. Peru.  
fragrantissima Wall. (*fragrans* D. Don), wohlriechende, ♀. t. Nepal.  
procumbens L., niederliegende, ♀. f. Nordamerika.  
rigida H. B. K., starre, ♀. t. Südamerika.  
rupestris DC., Felsen-G., ♀. t. k. Neuzeeland.  
Shallon Pursh, Shallon-G., ♀. f. k. Nordamerika.  
*serpyllifolia* Pursh v. *Phalerocarpus hispidulus*.
- Gaura** L., Prachtkerze, VIII. 1., Onagrariae.  
angustifolia Mchx., schmalblättrige, ♂. f. Nordamerika.  
biennis L., zweijährige, ♂. f. Nordamerika.  
coccinea Fras., scharlachfarbige, 4. f. Louisiana.  
fruticosa Jacq., strauchige, ♀. w. Südamerika.  
mutabilis Cav., veränderliche, ♂. k. Neuspanien.  
oenotheraeflora Zucc., oenotherablumige, ♂. k. Südamer.  
parviflora Doug., kleinblumige, ♂. f. Nordamerika.  
tripetala Cavan., dreikronige, ☉. f. Mexico.
- Gazania** G., Gazanie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.  
heterophylla Hort., verschiedenblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
pavonia RB., Pfauen-G., 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
rigens RB., starre, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
subulata RB., pfriemenförmige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.  
uniflora Ker., einblumige, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- Geblera** Fisch. et Mey. (Gebler, welcher als Botaniker Rußland bereiste), ?XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
suffruticosa Fisch. et Mey., halbstrauchige, 4. ♀. k. f. Dahurien.
- Geissomeria** Lindl., Ziegelkelch, XIV. 11., Acanthaceae.



**Geissomeria**

*longiflora* Lindl., langblumiger, ♂. w. Brasilien.

**Geissorrhiza** Ker, Dachzwiebel, III. 1., Irideae.

*ciliaris* Salisb., gefranzte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*excisa* Ker, ausgeschnittene, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*hirta* Ker, rauhe, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*humilis* Ker, niedrige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*imbricata* Ker, ächte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*juncea* (Lk.), simsenförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*obtusata* Ker, stumpfblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*Rochensis* Ker (*Larochei* R. et S.), La Roche's, 4. Zw.

k. t. Cap der guten Hoffn.

*secunda* Ker, einseitige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*setacea* Ker, borstige, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*sublutea* Ker, gelbliche, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*vaginata* Swt., scheidige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

**Geitonoplesium** Cunn., Südaaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*asperum* Cunn., rauhe, 4. t. Neuholland.

*cymosum* (RB.), afterdoldige, 4. Sch. t. Neusüdwallis.

*montanum* (RB.), Berg-S., 4. t. Neuholland.

**Gela lanceolata** Lour., *oblongifolia* Cunn. v. *Cyminosma pedunculata*, *oblongifolia*.**Gelonium** Roxb. (? indischer Name), XXII. XI., *Tricoccae-Euphorbiaceae*.

*bifarium* Roxb., zweireihiges, ♂. w. Ostindien.

*fasciculatum* Roxb., büschelförmiges, ♂. w. Ostindien.

*lanceolatum* Roxb., lanzettblättriges, ♂. w. Ostindien.

**Gelsemium** Juss., Jasmin-Bignonié, XIV. II. (V. 1.), *Personatae-Bignoniaceae*.

*sempervirens* P. (*nitidum* Mchx.), immergrüne, ♂. Sch. f. b. k. Virginien, Carolina.

**Genipa** T. (guianischer Name), V. 1., *Rubiaceae*.

*americana* L., amerikanische, ♂. w. Südamerika.

*edulis* Rich., genießbare, ♂. w. Guiana.

*Merianae* Rich., Merian's, ♂. w. Guiana.

*oblongifolia* R. et P., länglichblättrige, ♂. w. Südamer.

*esculenta* Lour. v. *Randia triflora*.

**Genista** L., Ginster, XVII. IV. (XVI. VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

*aetnensis* Spgl., DC., Aetna-G., ♂. f. b. k. Sicilien.

*anglica* L., englischer, ♂. f. England, Dänemark, Deutschland.

*angulata* Rafin., kantiger, ♂. f. Nordamerika.

*aphylla* DC., blattloser, ♂. f. Sibirien.

*arcuata* Koch, bogenförmiger, ♂. f. Oesterreichisches Litorale.

*biflora* Spgl., DC., zweiblumiger, ♂. k. Nordafrika.

*bracteolata* Lk., deckblättriger, ♂. k. ?

*canariensis* L., canarischer, ♂. k. Canarische Inseln.

*candicans* L., weiflicher, ♂. k. f. Südfrankreich, Italien.

*cinerea* DC. (*scoparia* Vill.), aschgrauer, ♂. f. b. Dauphiné, Italien.

*clavata* Poir., keulförmiger, ♂. k. Mauritanien.

*congesta* DC., gedrängter, ♂. k. Teneriffa.

*corsica* DC., corsischer, ♂. k. Corsica.

*Cupani* Guss., cupanischer, ♂. f. b. k. Sicilien.

*dalmatica* Bartl., dalmatischer, ♂. f. b. k. Dalmatien.

*depressa* MB., niedergedrückter, ♂. f. Südtaurien.

## Genista

diffusa W. (*humifusa* Wulff.), weitschweifiger, ♀. f. Südösterreich, Illyrien.

ephedroides DC., ephedraähnlicher, ♀. f. b. k. Sardinien.  
exaltata Lk. (*polygalaeophylla* Brot., *polygalaeifolia* DC.),  
hoher, ♀. f. b. Portugal.

ferox Poir., wilder, ♀. k. Nordafrika.

florida L., blüthenreicher, ♀. f. Spanien.

germanica L., deutscher, ♀. f. Deutschland, Frankreich.

b) inermis DC.

Halleri Reyn. (*prostrata* Lam., *pedunculata* L'Her., *decumbens* W.), Haller's, ♀. f. Frankreich, westliche Schweiz.

hirsuta Vahl, rauhhaariger, ♀. f. b. k. Spanien, Portugal.

hispanica L., spanischer, ♀. f. Spanien.

horrida DC. (*erinacea* Gilib.), abschreckender, ♀. f. Pyrenäen.

humifusa L., niedergestreckter, ♀. f. k. Thracien.

?italica Lodd., italienischer, ♀. f. Italien.

linifolia L., leinblättriger, ♀. f. b. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.

Lobelii DC., Lobel's, ♀. f. b. Südfrankreich, Corsica.

lusitanica L., portugiesischer, ♀. f. b. Westeuropa.

mantica Poll., veronesischer, ♀. f. Oberitalien.

microphylla DC., kleinblättriger, ♀. f. b. Spanien.

monosperma Lam., einsamiger, ♀. k. Spanien, Sicilien, Aegypten.

ovata W. K., eiförmiger, ♀. f. Ungarn, Illyrien, Italien, Schweiz.

β) nervata Kit.

parviflora Broter., kleinblumiger, ♀. f. b. k. Portugal, Mauritanien.

patens DC., abstehender, ♀. f. b. Spanien.

patula MB., ausgebreiteter, ♀. f. Caucasus.

pilocarpa Lk., haarhülsiger, ♀. k. ?

pilosa L., behaarter, ♀. f. Europa.

procumbens W. K., niederliegender, ♀. f. Mähren, Oesterreich, Ungarn.

purgans L., reinigender, ♀. f. Frankreich.

radiata Scop., strahliger, ♀. f. Krain, Ungarn, Italien.

sagittalis L., pfeilförmiger, ♀. f. Deutschland, Illyrien, Schweiz, Frankreich.

b) minor DC.

scariosa Viv. (*januensis* Bertol, *genuensis* P., *triquetra* WK., *triangularis* W.), trockenhäutiger, ♀. f. Ungarn, Untersteiermark, Krain, Italien.

β) anxantica Tenor.

Scorpius DC., Scorpion-G., ♀. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.

sericea Wulf., seidenhaariger, ♀. f. b. Oesterreichisches Litorale.

sibirica L. (*virgata* W.), sibirischer, ♀. f. Sibirien, österreichisches Litorale, Ungarn.

sphaerocarpa Lam., kugelfrüchtiges, ♀. f. b. k. Griechenland, Italien, Spanien.

sylvestris Scop. (*hispanica* Wulf.), Wald-G., ♀. f. b. k. Krain, österreichisches Litorale.

tetragona Bess., vierkantiges, ♀. f. Podolien.

**Genista**

*tinctoria* L., färbender, ⚔. f. Europa, Mittelasien.

b) *flore pleno*. c) *latifolia* DC. d) *hirsuta* DC.  
(? *pubescens* Lang). e) *pratensis* Poll.

*triacantha* Broter. (*ericetorum* Hoffm. nsg.), dreistacheliger,  
⚔. f. b. k, Portugal.

β) *interrupta* DC.

*triquetra* Lam., dreiseitiger, ⚔. k. Corsica, Calabrien.  
*umbellata* DC., doldiger, ⚔. k. Nordafrika.

β) *capitata* DC.

*virgata* DC. (*gracilis* Poir.), ruthenförmiger, ⚔. k.  
Madeira.

*buxifolia* Burm. v. *Cyclopia latifolia*, *divaricata* Lk.

v. *Adenocarpus parvifolius*. *juncea* Scop. v. *Spartium junceum*. *scoparia* Lam. vid. *Sarothamnus scoparius*.

**Gentiana** T., Enzian, V. II., Contortae-Gentianeae.

*acaulis* L. (*angustifolia* Vill.), stengelloser, 4. f. Europa, Sibirien.

*adscendens* Pall. (*decumbens* L.), aufsteigender, 4. f. Sibirien, Karpathen.

*algida* Pall., häutiger, 4. f. Sibirien, Kamtschatka.

*altaica* Pall. (*longiflora* Lam., *grandiflora* Lam.), altaischer, 4. f. Sibirien.

*Amarella* L., bitterer, ☉. f. Europa.

β) *uliginosa* W.

*angulosa* MB. (*aestiva* R. et S., *verna* β. *angulosa* Wahlbg.), kantiger, 4. f. Osteuropa, Caucasus, Altai.

*angustifolia* Mchx., schmalblättriger, 4. f. Nordamer.

*asclepiadea* L., schwalbenwurzartiger, 4. f. Mitteleuropa, Voralpen, Caucasus.

b) *major*. c) *ochroleuca*.

*aurea* L. (*quinquefolia* Flor. dan.), goldfarbiger, 4. f. Lappland, Norwegen, Island.

*barbata* Fröl. (*detonsa* Rottb., *ciliata* B. M., *serrata* Gunn.), bärtiger, 4. f. Sibirien, Island, Norwegen.

*bavarica* L. (*prostrata* Wahlbg.), baierischer, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *rotundifolia* Hoppe (*imbricata* Schlchr. non Fröl.).

*biloba* DC., zweilappiger, 4. f. Französische Alpen.

*brachyphylla* Vill. (? *tergloviensis* Hacq.), kurzblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*Burseri* Lapeyr., Burser's, 4. f. Pyrenäen.

β) *punctata*.

*campestris* L., Feld-E., ☉. f. Europa.

*carpathica* Kit., karpthischer, 4. f. Karpathen.

*Catesbaei* Walt., Nutt, Catesbaei's, 4. f. Nordamerika.

*caucasica* MB., caucasischer, ♂. f. Caucasus.

*chloraefolia* N. E., chlorablättriger, ☉. f. Mitteldeutschland.

*ciliata* L., gewimperter, ☉. ♂. f. Europa.

*clavata* Bot. mag., keulförmiger, 4. f. ?

*crinita* Fröl. (*fimbriata* Bot. Rep.), bemähter, ♂. f. k. Nordamerika.

*Cruciata* L., kreuzblättriger, 4. f. Europa, Sibirien.

b) *major* Hortul.

*excisa* Presl. (*acaulis* Vill.), ausgeschnittener, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *alpina* Vill.



**Gentiana**

*fimbriata* W. (*ciliata* MB.), gefranzter, ♂. f. Caucasus.  
*frigida* Hänk., kalter, 4. f. Steyermark, krainer, karpathische und dinarische Alpen.

*Frölichii* Jan., Hladnik. (*carnica* Welw., *Hladnikiana* Host.), Fröhlich's, 4. f. Krain.

*Gebleri* Ledeb., Gebler's, 4. f. Imaus.

*gelida* MB., eisiger, 4. f. Caucasus.

*germanica* W. (*uniflora* W.), deutscher. ☉. f. Deutschl.

*glacialis* Vill. (*tenella* Fröl.), Gletscher-E., ☉. f. Europäische Alpen.

*humilis* MB., niedriger, ☉. f. Caucasus.

*hybrida* Schlchr. (*Thomasii* Hall. fil., *rubra* Clairv.),

Bastard-E., 4. f. Schweizer und französische Alpen.

*imbricata* Fröl., dachziegelförmiger, 4. f. Tyrol, Krain.

*incarnata* Sims, fleischfarbiger, 4. f. Nordamerika.

*intermedia* Sims, mittlerer, 4. f. Nordamerika.

*linearis* Fröl. (*puberula* Mchx.), gleichbreiter, 4. f. Nordamerika.

*lutea* L., gelber (*ächter*), 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

*macrophylla* Pall., großblättriger, 4. f. Sibirien.

*nana* Wulf., Zwerg-E., ☉. f. Norische u. karnische Alpen.

*nivalis* L., Schnee-E., ☉. f. Europäische Alpen, Nordamer.

*obtusifolia* W. (*spathulata* Bartl., *montana* N. E., *pyramidalis* N. E.), stumpfblättriger, ☉. f. Deutschland.

*ochroleuca* Fröl., weißgelber, 4. f. Nordamerika.

*pannonica* Scop., ungarischer, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen.

*plebeja* Ledeb., gemeiner, 4. f. Sibirien.

*Pneumonanthe* L., schmalblumiger, 4. f. Nordeuropa, Asien und Amerika.

b) *alba*. c) *guttata*.

*pratensis* Fröl., Wiesen-E., ☉. f. Sibirien.

*pumila* Jacq., kleiner, 4. f. Oesterreich, Steyermark, krainer Alpen.

*punctata* L., punktirter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *concolor* Koch (*campanulata* Jcq.).

*purpurea* L., purpurfarbiger, 4. f. Nordeuropäische, Schweizer-Alpen etc.

*pyrenaica* L., pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen.

*quinqueflora* Lam. (*amarelloides* P. Mchx.), fünfblumiger, 4. f. Nordamerika.

*Saponaria* L., seifenkrautblättriger, 4. f. Nordamerika.

b) *flore albo*.

*septemfida* Pall., siebentheiliger, 4. f. Caucasus, Ost-russland.

b) *guttata*.

*triflora* Pall., dreiblumiger, 4. f. Ostsibirien.

*umbellata* MB., doldiger, 4. f. Caucasus.

*utriculosa* L., schlauchiger, ☉. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

*verna* L., Frühlings-E., 4. f. Europa, Asien.

b) *flore albo* A. P.

*carinthiaca* Froel. v. *Lomatogonium carinthiac.* *fili-formis* L. v. *Microcale filiform.* *viscosa* Ait. v. *Hippion viscosum.* Hinsichtlich der übrigen siehe *Erythraea*.

**Geodorum** Jacks., Erdstendel, XX, 1, Orchideae.

*citrinum* Andr., citrongelber, 4. w. Ostindien.

**Geodorum**

dilatatum RB., verbreiteter, 4. w. Ostindien.

fucatum Lindl., geschminkter, 4. w. Ceylon.

purpureum RB., purpurfarbiger, 4. w. Ostindien, Neuholland.

*pictum* Lk. v. *Angraecum maculatum* Nachtr.

**Geoffroya** Jcq. (E. F. Geoffroy, französischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

spinosa L., dornige, 5. w. Südamerika.

violacea P., violette, 5. w. Guiana.

*inermis* Sw., *racemosa* Poir. v. *Andira inermis* et *racemosa*.

**Geonoma** W., Erdpalme, XXII. VI. (VI. I.), Palmae.

acaulis Mart., stammlose, 5. 4. w. Brasilien., Guiana.

macrostachya Mart., großkolbige, 5. 4. Südamerika.

pinnatifrons W., fiederwedelige, 5. w. Peru, Caracas.

Schottiana Lod. C., Schott's, 5. w. Brasilien.

simplicifrons W., einfachwedelige, 5. w. Trinidad.

Spixiana Mart., Spix's, 5. w. Südamerika.

**Geophila** D. Don, Erdröthe, V. I., Rubiaceae.

reniformis D. Don, nierenförmige, 4. w. Ostindien.

**Georgina** W. (*Georgia* Spgl.), (J. G. Georgi, Akademiker zu Petersburg, der als Botaniker das Uralgebirge bereiste), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Cervantesii (Lagasc.), Cervante's, 4. Kn. f. b. k. Mexico,

coccinea W. (*crocata* Lagasc., *frustranea* DC.), scharlachfarbig, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

scapigera Hort., schafttragende, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

variabilis W. (*rosea* et *purpurea* W., *superflua* DC.), veränderliche, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

Gartenvarietäten und Hybriden: a) *anemoneflora*.

b) *globiflora*. c) *nana*. d) *striata* etc.

**Geranium** T., Storchschnabel, XVI. VI., Geraniaceae.

aconitifolium L'Her. (*rivulare* Vill.), sturmhutblättriger, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

albiflorum Ledeb., weißblumiger, 4. f. Sibirien.

altaicum Hort., altaischer, 4. f. Altai.

anemonefolium L'Her. (*palmatum* Cav.), anemonenblättriger, 4. 5. k. Madeira.

β) *glandulosum*.

angulatum Curt. (*venosum* P.), kantiger, 4. ?

argenteum L., silberfarbiger, 4. f. b. k. Krain, Italien, Frankreich.

asphodeloides Burm. (*subcaulescens* L'Her.), affodilähnlicher, 4. f. b. k. Griechenland, Kleinasien.

batrachioides Cav., rauhhaariger, 4. f. Südeuropa.

bifolium Patr., zweiblättriger, 4. f. Dahurien.

bohemicum L., böhmischer, 4. f. Böhmen, Schlesien, Lausitz, Schweiz.

canescens L'Her., graulicher, X. k. Cap d. gut. Hoffn.

carolinianum Jacq., karolinischer, 4. f. Nordamerika.

β) *lanuginosum* Jacq.

coeruleum Patr., blauer, 4. f. Dahurien.

collinum Steph., Hügel-St., 4. f. Ukraine, Taurien, Sibirien.

columbinum L., feintheiliger, 4. f. Europa.

cristatum Stev. (*albanum* MB.), kammiger, 4. f. Caucasus.

dahuricum DC., dahurischer, 4. f. Dahurien.

## Geranium

dissectum L., schlitzbliätteriger, ☉. f. Europa, Nordamer.  
divaricatum Ehrh. (*Winterli* Roth), ausgesperrter, ☉. f.

Deutschland, Schweiz, Ungarn, Caucasus, Sibirien.

eriosomon Fisch., haarfadiger, 4. f. Dahurien.

β) pallidum Swt.

gymnocaulon Stev., nacktstengeliger, 4. f. Caucasus.

ibericum Cav., iberischer, 4. f. Caucasus.

incanum L., weisgrauer, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

?inodorum Pursh, geruchloser, ☉. f. Nordamerika.

Lamberti Swt., Lambert's, 4. f. Nepal.

lanuginosum Lam, wolliger, ☉. f. Numidien.

lividum L'Her., Ait., braunblauer, 4. f. Schweiz,  
Frankreich.

Londesii Fisch. (*longipes* DC.), Londes's, 4. f. Süd-  
russland.

lucidum L., glänzender, ☉. f. Europa.

macrorrhizum L., großwurzeliger, 4. f. Südeuropa.

maculatum L., gefleckter, 4. f. Nordamerika.

mexicanum H. B. K. (*hirtum* W., *Hernandesii* Sess.),  
mexicanischer, 4. k. t. Mexico.

molle L., weicher, ☉. f. Europa.

multifidum D. Don, vieltheiliger, 4. t. k. Nepal.

nepalense Swt., nepal'scher, 4. f. k. Nepal.

nodosum L., knotiger, 4. f. England, Frankreich, Italien.

pallens MB., bleicher, ☉. f. Caucasus.

palustre L., Sumpf-St., 4. f. Europa, Nordasien.

parviflorum W., kleinblumiger, 4. k. t. Nördliches  
Neuholland.

phaeum L. (*fuscum* L.), brauner, 4. f. Europa.

pilosum Forst, haariger, 4. k. t. Neuzeeland.

platypetalum Fisch. et Mey., breitkroniger, 4. f.  
Georgien.

potentilloides L'Her., fingerkrautähnlicher, 4. k. t,  
Neuholland.

pratense L., Wiesen-St., 4. f. Europa.

b) flore albo. c) flore albo pleno. d) flore va-  
riegat. e) dauricum. f) flore pleno.

prostratum Cav. (*lancastriense* Wither.), hingestreckter,  
4. f. England, Schweden.

purpureum Vill., purpurfarbiger, ☉. f. Südeuropa.

pusillum L., niedriger, ☉. f. Europa.

pyrenaicum L. (*umbrosum* WK., *nemorosum* Tenor.),  
pyrenäischer, ♂. 4. f. England, Mittel-, Ost- und  
Südeuropa.

reflexum L., zurückgebogener, 4. f. Italien.

Richardsonii Fisch. et Mey. (*albiflorum* Hook.), Richard-  
son's, 4. f. Nordamerika.

Robertianum L., Robert's, ☉. f. Europa, Nordamerika.

b) flore albo (*Briceanum* Swt.).

rotundifolium L. (*viscidulum* Fr., *malvaceum* Wahlenbg.),  
rundbliätteriger, ☉. f. Europa.

sanguineum L., blutfarbiger, 4. f. Europa.

β) villosissimum DC.

sibiricum L., sibirischer, 4. f. Sibirien.

striatum L., gestreifter, 4. f. b. k. Italien.

sylvaticum L., Wald-St., 4. f. Europa.

tuberosum L., knolliger, 4. f. Süd- und Osteuropa.

varium L'Her. (*cinereum* Cavan.), bunter, 4. f. Pyre-  
näen, Italien.



**Geranium**

β) villosum Tenor.

Ulassovianum Fisch., Ulassow's, 4. f. Dahurien.

Wallichianum Swt., Wallich's, 4. k. f. b. Nepal.

Ungewiss: affine Loud. Cameron.

Hinsichtlich der übrigen s. *Erodium*, *Pelargonium* und *Sarcocaulon*.

**Gerardia** L. (John Gerard, alter englischer Botaniker, Louis Gerard, französischer Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

aphylla Nutt., blattlose, ♂. f. Carolina.

delphinifolia L., ritterspornblättrige, 4. w. Ostindien.

flava L., hellgelbe, 4. f. Nordamerika.

maritima Rafin. (*crinita* Eddy), Seestrands-G., ♂. f. Nordamerika.

purpurea L., purpurfarbige, ♂. f. Nordamerika.

quercifolia Pursh, eichenblättrige, 4. f. Nordamerika.

tenuifolia Vahl, feinblättrige, ♂. f. Nordamerika.

*Afzelii* Mchx. v. *Seymeria tenuifolia*. *glutinosa* L. v. *Rehmannia chinensis*.

**Gerbera** Gron. (*Gerberia* H. Cass.), T. Gerber, deutscher Gelehrter, welcher Rußland bereiste), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Burmanni DC., Burmann's, 4. t. Cap der gut. Hoffn. *crenata* Ker v. *Mairia crenata*.

**Gerontogea** Chamiss., *Gerontogea*, IV. I., Rubiaceae. *Deppeana* Lk. et Otto, Deppe's, ♂. t. w. Mexico.

**Geropogon** L., Graubart, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

calyculatus Jacq., gekelchter, 4. f. ?

glaber L. (*australis* Spgl.), glatter, ♂. f. Italien, Griechenland, Kleinasien, Aegypten.

hirsutus L. (*australis* Spgl.), rauhhaariger, ♂. f. Italien, Griechenland etc.

**Gesneria** Plum. (Conrad Gesner, berühmter schweizer. Naturforscher), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae (*Gesneriaceae*).

acaulis L., stengellose, 4. Kn. w. Jamaica.

aggregata Ker, gehäufte, 4. Kn. w. Brasilien.

allagophylla Mart., veränderlichblättrige, ♂. w. Brasilien.

barbata Mart., bärtige, 4. Kn. w. Brasilien.

bibracteata Loud., Camer. (? *tribracteata* Hort.), zweiblättrige, 4. Kn. w. ?

bulbosa Ker, knollige, 4. Kn. w. Brasilien.

calycina Sw., großkelchige, ♂. w. Jamaica.

Cooperi Paxt., H. Woburn. (*bulbosa* Hook.), Cooper's, 4. Kn. w. Brasilien.

corymbosa Sw., afterdoldige, ♂. w. Jamaica.

Douglassii Lindl., Douglas's, 4. Kn. w. Brasilien.

elongata Humb., verlängerte, ♂. w. Südamerika.

faucialis Lindl. (*fascialis* Hook.), großschlundige, 4. Kn. w. Brasilien.

hirsuta Humb., Bonpl., rauhhaarige, ♂. w. Cumana.

humilis L., niedrige, ♂. w. Cuba.

lateritia Lindl., ziegelfarbige, 4. Kn. w. Brasilien.

latifolia Mart., breitblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.

Lindleyi Hook. (*rutila atrosanguinea* Lindl.), Lindley's, 4. w. Brasilien.

macrostachya Lindl., großährige, 4. Kn. w. Brasilien.

**Gesneria**

- magnifica* Loud., prächtige, 4. Kn. w. Brasilien.  
*Marchii* Hook., March's, 4. Kn. w. Brasilien.  
*oblongata* Hort., längliche, 5. w. ?  
*prasinata* Ker, grünblumige, 5. w. Brasilien.  
*rupestris* Paxt., Felsen-G., 4. Kn. w. Jamaica.  
*rutila* Lindl., röthliche, 4. w. Brasilien.  
*Sceptrum* Mart., gelbliche, 5. w. Brasilien.

β) *ignea* Mart.

- Sellowii* Mart., Sellow's, 4. Kn. w. Brasilien.  
*spicata* Humb., ährige, 4. Kn. w. Südamerika.  
*Suttoni* Booth, Sutton's, 4. Kn. w. Brasilien.  
*tubiflora* Cav., röhrenblumige, 4. Kn. w. Südamerika.  
*ulmifolia* Humb., Bonpl. (*pendulina* Lindl.), ulmenblät-  
 terige, 4. w. Südamerika.  
*verticillata* Hook., wirtelblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.  
*odorata* Hort. v. *Coleus amboinicus*. *tomentosa* L.  
 v. *Rytidophyllum tomentosum*. *ventricosa* Sw. v.  
*Pentaraphia longiflora*.

**Gethyllis** L., Gethyllis, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae  
(? *Hypoxideae*).

- afra* Lindl., afrikanische, 4. Kn. k. t. Cap d. gut. H.  
*ciliaris* L., gefranzte, 4. Kn. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*lanceolata* L., lanzettliche, 4. Kn. k. t. Cap d. g. H.  
*spiralis* L., spiralförmige, 4. Kn. k. t. Cap d. gut. H.  
*villosa* L., zottige, 4. Kn. k. t. Cap der gut. Hoffn.

**Getonia** Roxb., Getonie, X. 1., Onagrariae-Com-  
bretaceae.

- floribunda* Roxb., blüthenreiche, 5. Sch. w. Ostindien,  
 Madagascar.  
*nutans* Roxb., nickende, 5. Sch. w. Ostindien.

**Geum** L., Nelkenwurz, XII. III., Rosaceae.

- agrimonoides* Pursh, odernennigähnliche, 4. f. Nordamer.  
*album* Gmel. (*canadense* Jcq.), weisse, 4. f. Nordamer.  
*atlanticum* Dsf. (*sylvaticum* Pour., *biflorum* Brot.), at-  
 lantische, 4. f. Südfrankreich, Nordafrika.  
*brachypetalum* Sering., kurzkrönige, 4. f. ?  
*chilense* Balb. (*Quellyon* Swt., *coccineum* Hort.), chile-  
 sische, 4. f. b. k. Chili.

- b) *grandiflorum* Hort. γ) *atrosanguineum* Hort.  
*ciliatum* Pursh, gefranzte, 4. f. Nordamerika.  
*coccineum* Sibth., Sm. (*Sadleri* Friwald.), scharlachfar-  
 bige, 4. f. Kleinasien, Rumelien.  
*hirsutum* Mühlbg., rauhhaarige, 4. f. Nordamerika.  
*hispidum* Fr., steifhaarige, 4. f. Südschweden.  
*intermedium* Ehrh. (? *hirtum* Wahlbg., *hederaefolium*  
 Gmel.), mittlere, 4. f. Nord- und Westdeutschland,  
 Schweden.

β) *rubifolium* Lej.

- macrophyllum* W. (*radiatum* Mchx.), großblättrige, 4. f.  
 Kamtschatka, Nordamerika.  
*nutans* Rafin., nickende, 4. f. Nordamerika.  
*Portenschlagianum* Tratt., Portenschlag's, 4. f. ?  
*pyrenaicum* Ramond (*inclinatum* Schlchr., *Tournefortii*  
 Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Sudeten, Schweiz,  
 Pyrenäen.  
*rivale* L. (*nutans* Crtz.), Wasser-N., 4. f. Europa,  
 Asien, Nordamerika.

β) *hybridum* Wulff.

**Geum**

*strictum* Ait. (*aleppicum* Jcq., *canadense* Murray, *heterophyllum* Hort., *intermedium* Fisch., *ranunculoides* Sering.), steife, 4. f. Nordamerika.

*urbanum* L., gemeine, 4. f. Europa, Asien.

*virginianum* L. (*geniculatum* Mchx.), virginische, 4. f. Nordamerika.

*potentilloides* Ait. v. *Coluria potentill.* Hinsichtlich der übrigen s. *Sieversia*. *Ghinia mutica* Sw. et *spinosa* W. (*verbenacea* Sw.) v. *Tamonea mutica* etc.

**Gilia** R. et P. (P. S. Gilio, spanischer Botaniker), V. I., Polemoniaceae.

I. *Dactylophyllum* Benth.

*liniflora* Benth., leinblumige, ☉. f. Californien.

*pharnaceoides* Benth., pharnaceumähnliche, ☉. f. Californien.

*pusilla* Benth., zwergige, ☉. f. Chili.

II. *Ipomopsis* Mchx.

*arenaria* Benth., Sand-G., ☉. f. Californien.

*Beyrichiana* Schldt., Beyrich's, ♂. f. b. k. Nordamer.

*coronopifolia* P. (*Ipomopsis elegans* Sm.), krähenfußblättrige, ♂. k. Carolina.

*crassifolia* Benth., dickblättrige, ☉. f.

*pulchella* Dougl. (*Ipomopsis elegans* Mchx., Lindl. *Gilia aggregata* D. Don), schöne, ♂. k. Nordwestliches Amerika.

*tenuiflora* Lindl., Benth., dünnblumige, ☉. f. Californien.

III. *Eugilia* Benth.

*achilleaefolia* Benth. (? *millefoliata* Fisch. et Mey.), garbenblättrige, ☉. f. Californien.

*capitata* Dougl., Hook., kopfförmige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

b) *albiflora*.

*inconspicua* Dougl. (*parviflora* Speg.), kleinblumige, ☉. f. Nordamerika.

*laciniata* R. et Pav., schlitzblättrige, ☉. f. Chili.

*multicaulis* Benth., vielstengelige, ☉. f. Californien.

*tricolor* Benth., dreifarbig, ☉. f. Californien.

b) *albida*.

*gracilis* Dougl. v. *Collomia gracilis*. *mucronata* Lehm. et *pungens* Dougl., Hook. v. *Aegochloa eryngioides* etc. Nachtrag.

**Gillenia** Mch., Gillenie, XII. II., Rosaceae-Spiraeaceae.

*stipulacea* Nutt., zwischenblättrige, 4. f. Louisiana.

*trifoliata* Mch., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

b) *major*.

**Gilliesia** Lindl. (Dr. Gillies, zu Conception in Chili), III. I. (XVI. III.), Coronariae-Gilliesiae.

*graminea* Lindl., grasblättrige, 4. Zw. k. t. Chili.

**Ginkgo** Thbg., Ginkgobaum, XXI. IX., Taxineae (? *Amentaceae*).

*biloba* Thbg., L., zweilappiger, 5. f. Japan.

**Giseckia** L. (P. D. Gisecke, dänischer Botaniker), V. v., Aizoideae.

*pharnaceoides* L., pharnaceumähnliche, ☉. w. m. f. Ostindien.

**Gladiolus** T., Siegwurz, III. I., Irideae.

*alatus* L., geflügelte, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *algoensis* Herb.



## Gladiolus

*angustus* L., schmale, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.  
*blandus* Ait. (*albidus* Jacq.), liebliche, 4. Zw. f. b. k.

Cap der guten Hoffnung.

β) *pictus* Bot. mag.

*Boucheanus* v. Schltdt. (? *palustris* Gaud.), Bouché's, 4.  
 Zw. f. Deutschland, Schweiz.

*byzantinus* Mill., orientalische, 4. Zw. f. Osteuropa.

*campanulatus* Andr., glockige, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*Cardinalis* Curt., scharlachrothe, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*carneus* Jacq. (*cuspidatus* Andr.), fleischfarbige, 4. Zw.  
 f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

*cochleatus* Swt., löffelförmige, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*Colvillii* Swt., Colville's, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

*communis* L., gemeine, 4. Zw. f. b. k. Mittel- und  
 Südeuropa.

*commutatus* Bouché, verwechselte, 4. Zw. f. Taurien.

*cuspidatus* L. (*undulatus* L.), langspitzige, 4. Zw. f. b. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

*debilis* Sims, schwache, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

*Ecklonii* Lehm., Ecklon's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

*edulis* Burch., essbare, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.

*elongatus* Thbg., verlängerte, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*flexuosus* Thbg., hin- und hergebogene, 4. Zw. f. b. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

*floribundus* Jcq. (*grandiflorus* Andr.), blüthenreiche, 4.  
 Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

*fragrans* Hort., wohlriechende, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

*gracilis* Jacq. (*setifolius* L., *laevis* Thbg., *liliaceus* Houtt.,  
 schlanke, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

*hastatus* Thbg., spontonförmige, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*hirsutus* L. (*roseus* Redout., *brevifolius* Jcq., *carneus*  
 Andr., *ambiguus* Lam.), rauhhaarige, 4. Zw. f. b. k.

Cap der guten Hoffnung.

β) *Merianellus* Thbg.

*hyalinus* Jacq., durchscheinende, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*illyricus* Koch, illyrische, 4. Zw. f. Krain, österreich-  
 isches Litorale.

*imbricatus* L. (*rossicus* P., *tenuis* MB., *neglectus* Schult.,  
*galiciensis* Bess.), schuppige, 4. Zw. f. Osteuropa.

*involutus* LaRoch., eingehüllte, 4. Zw. f. b. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*leucanthus* Bouché, weißblumige, 4. Zw. f. ?

*Milleri* Ker, Miller's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.

*Mortoni*us Herb., Morton's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

*namaquensis* Ker (*galeatus* Andr., *equitans* Vahl), nama-  
 quische, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

*pallidus* Bouché, bleiche, 4. Zw. f. ?

*permeabilis* LaRoch., schmalblättrige, 4. Zw. f. b. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

*psittacinus* Lindl. (*natalensis* Reinw.), papageifarbige,  
 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

*pudibundus* Swt., schamhafte, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

**Gladiolus**

- ramosus Hort., ästige, 4. Zw. f. b. k. Hybride.  
 recurvus L. (*carinatus* Ait., *punctatus* Jacq., *pingens* Andr.), zurückgekrümmte, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.  
 segetum Ker (*Ludoviciae* Jan., *italicus* Gaud., *communis* Sibth. et Sm.), italienische, 4. Zw. f. Südeuropa, Griechenland.  
 Spofforthianus Hort., Spofford's, 4. Zw. f. b. k. Hybride.  
 tenellus Jacq., zarte, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.  
 trichonemifolius Ker, haarblättrige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
 trimaculatus Vahl, dreifleckige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
 tristis L. (*concolor* Salib.), traurige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
 undulatus Jcq. (*striatus* Andr.), wellige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
     b) pallidus. c) carneus.  
 versicolor Andr., buntfarbige, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.  
     β) binervis Bot. mag. γ) tenuior Ker.  
 viperatus Ker (*alatus* Jcq., *orchidiflorus* Andr.), Nattern-S., 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
 Watsonia Thbg., Watson's, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.  
     *abbreviatus* Andr. (*quadrangularis* Ker) et *Cunonia* G. v. *Anisanthus quadrangularis* etc. *bicolor* Thbg. etc. v. *Sparaxis bicolor* etc. *excisus* Jcq. etc. v. *Geissorhiza excisa* etc. *flavus* Ait. etc. v. *Waitzia flava* etc. *fragrans* Jcq. etc. v. *Babiana disticha* etc. *galeatus* Jcq. etc. v. *Synnotia galeata* etc. *gramineus* L., Jacq. v. *Diasia gram.* *iridifolius* Jacq. etc. v. *Watsonia iridifol.* etc. *juncus* Thbg. v. *Anomatheca juncea.* *silenoides* Jacq. etc. v. *Lapeyrouisia silen.* etc.  
     *Glandulifolia umbellata* Wendl. et *uniflora* Wendl. v. *Adenandra umbellata* et β.

**Glaucium T., Hornmohn, XIII. 1., Papaveraceae.**

- elegans* Fisch. et Mey., zierlicher, ☉. f. Nordpersien.  
*Fischeri* Bernh., Fischer's, ♂. f. Persien.  
*luteum* Scop., Sm. (*flavum* Crtz.), gelber, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.  
     β) *fulvum* Sm.  
*phoeniceum* G. (*corniculatum* Curt.), hochrother, ☉. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.  
     β) *flaviflorum*.  
*rubrum* Sm., rother, ☉. f. Griechenland, Kleinasien.  
*tricolor* Bernh., dreifarbiger, ☉. f. Thüringen, Podolien.  
     *refractum* Stev. et *violaceum* Sm. v. *Roemeria refracta* et hybrida.

**Glaux T., Milchkraut, V. 1., ?Primulaceae, ?Portulacaceae.**

- maritima* L., Meerstrands-M., 4. f. Europa.  
     b) *alba*.

**Glechoma L., Gundermann, XIV. 1., Labiatae.**

- hederacea* L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.  
     β) *major* Gaud. γ) *heterophylla* Opitz. δ) *rosea* Dens. ε) *variegata* Dens.  
*hirsuta* W. K., rauhhaariger, 4. f. Ungarn.  
     *grandiflora* DC. v. *Stachys corsica*.

**Gleditschia** L. (J. G. Gleditsch, deutscher Botaniker),  
XXIII. II., Leguminosae-Caesalpinieae.

*brachycarpa* Pursh. (*triacantha* β. Mchx.), kurzhülsige,  
f. f. Nordamerika.

*chinensis* Lam. (*horrida* W., *indica* H. Par.), chinesische,  
f. f. China.

b) *inermis* Duh. (*japonica* Lodd.). c) *major* Hort.

d) *nana* Hort. e) *purpurea* Hort.

*ferox* Dsf. (*macracantha* W., *orientalis* Bosc.), wilde,  
f. f. China.

*macracantha* Dsf. (*ferox* Baudr.), grofsstachelige, f. f.  
China.

*monosperma* Walt. (*carolinensis* Lam., *aquatica* Marsh),  
einsamige, f. f. Carolina.

*triacantha* L. (*meliloba* Walt., *spinosa* Duh.), dreidornige,  
f. f. Nordamerika.

b) *inermis* DC. (*laevis* Hort.).

Gartenvarietäten oder unbestimmte Arten: *Boqui*  
Hort. *latisiliqua* Lodd. *micracantha* Lodd. *prae-*  
*cox* Hort.

*caspiica* Dsf. v. *Lagonychium* *Stephanianum*. *javanica*  
P. v. ? *Sesbana* *cannabina*.

**Gleichenia** Sm. (W. F. v. Gleichen, deutscher Natur-  
forscher), XXIV. I., Osmundaceae.

*flabellata* RB., fächerförmige, 4. t. w. Neuholland.

*microphylla* RB., kleinblättrige, 4. t. w. Neuholland,  
Van-Diemens-Land.

*pectinata* Presl, kammförmige, 4. w. Neugranada.

*pubescens* H. B. K., weichhaarige, 4. w. Westindien,  
Neugranada, Brasilien.

*Speluncae* RB., grubige, 4. t. w. Neuholland.

**Glinus** L., *Glinus*, XI. v., Aizoideae.

*lotoides* L., schotenkleeähnlicher, ☉. f. Süd- und West-  
europa, Indien.

**Globba** L., Roxb. (moluckischer Name), I. I., Scitami-  
neae-Amomeae.

*bulbifera* Roxb., zwiebeltragende, 4. w. Ostindien.

*Careyana* Roxb., Carey's, 4. w. Pegu.

*cuspidata* Mart., N. E., langspitzige, 4. w. Brasilien.

*Hura* Roxb. (*versicolor* Sm., *Königiana* Spgl.), bunte,  
4. w. Ceylon, Malacka.

*marantina* L., marantaähnliche, 4. w. Ostindien.

*orixensis* Roxb., orixensische, 4. w. Ostindien.

*pendula* Roxb., überhängende, 4. w. Ostindien.

*racemosa* Sm., traubige, 4. w. Nepal.

*saltatoria* Rose. (*subulata* Roxb., *radicalis* Roxb., *pur-*  
*purea* Andr.), purpurfarbige, 4. w. Ostindien.

*sessiliflora* Sims, stiellose, 4. w. Pegu.

*spathulata* Roxb., spatelförmige, 4. w. Silhet.

*erecta* Redout., DC. et *nutans* W. v. *Alpinia* *cal-*  
*carata* etc.

**Globularia** L., Kugelblume, IV. I., Globulariaceae.

*Alypum* L., dreizählige, f. k. Südeuropa.

β) *integrifolia*.

*bellidifolia* Tenor., malsliebenblättrige, f. k. Calabrien.

*bisnagarica* L., bisnagarische, f. w. Ostindien.

*cordifolia* L., herzblättrige, 4. f. f. Mittel- und süd-  
europäische Alpen.

*incanescens* Viv. (*punctata* Lapeyr.), weifsgrauliche, 4. f.  
b. k. Ober- und Mittelitalien, Pyrenäen.



**Globularia**

*linifolia* Lam. (*vulgaris* Brot.), gleichbreitblättrige, 4. k. Spanien, Portugal.

*nana* Lam., Zwerg-K., 5. k. Südfrankreich.

*nudicaulis* L., nacktstengelige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*salicina* Lam. (*longifolia* Ait.), weidenblättrige, 5. k. Madeira.

*spinosa* Mill., stachelige, 4. k. Südspanien.

*trichosantha* Fisch. et Mey., haarblumige, 4. f. b. k. Natolien.

*vulgaris* L., gemeine, 4. f. Europa.

*Globulea* Haw. v. *Crassula*.

**Gloriosa** L., Prachtlilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*nepalensis* G. Don (*simplex* D. Don), nepal'sche, 4. Kn. t. w. Nepal.

*simplex* L., einfache, 4. Kn. w. Senegal.

*superba* L., stolze, 4. Kn. Sch. w. Malabar.

*virescens* Lindl., grünliche, 4. Kn. Sch. w. Senegambien.

**Glossodia** RB., Zungendingel, XX. 1., Orchideae.

*major* RB., größer, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*minor* RB., kleiner, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Glossula** Lindl. (*Glossaspis* Spgl.), Züngelwurz, XX. 1., Orchideae.

*tentaculata* Lindl., randzaserige, 4. Kn. w. China.

**Glottidium** Desv., Züngelhülse, XVII. 1v. (v1.), Leguminosae-Papilionaceae.

*floridanum* Desv., floridanische, 6. f. m. Florida.

**Gloxinia** L'Her. (B. P. Gloxin, elsasser Botaniker), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

I. *Gloxinia* genuin. N. E. Lindl.

*antirrhinea* DC., löwenmaulblumige, 4. Kn. w. Mexico.

*caulescens* Lindl., stengelige, 4. Kn. w. Südamerika.

*gracilis* Mart., schlanke, 4. Kn. w. Brasilien.

*hirsuta* Lindl., rauhhhaarige, 4. Kn. w. Brasilien.

*macrophylla* N. E., Mart., großblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.

*maculata* L'Her., gefleckte, 4. Kn. w. Südamerika.

*speciosa* Lodd. (*formosa* Hort.), prächtige, 4. Kn. w. Brasilien.

Hybriden und Varietäten: a) *alba*, b) *alba maxima*

A. P. (*candida* Hort.), c) *hybrida* Hort. (? *maxima*

A. P., d) *Menziesii* A. P., e) *pallida maxima* A. P.,

f) *violacea* A. P., g) *Youngii*.

II. *Sinningia* N. E., Lindl. (W. Sinning, Universitäts-gärtner zu Bonn).

*calycina* Hort., breitkelchige, 4. 5. w. Jamaica.

*guttata* Mart., getropfte, 4. 5. w. Brasilien.

*Helleri* Mart. (*Schottii* Mik.), Heller's, 4. 5. w. Brasilien.

*velutina* Mart., sammethaarige, 4. 5. w. Brasilien.

*villosa* Mart., zottige, 4. 5. w. Brasilien.

**Glyceria** RB. (et *Catabrosa* P. B., *Reboulea* Kunth, *Hydrochloa* Hartm.), Süßgras, III. 11., Gramineae.

*aquatica* Presl (*airoides* Rchb.), Wasser-S., 4. Wa. f. Europa, Caucasus, Sibirien, Nordamerika.

*arundinacea* Kunth (*Poa arund.* MB.), rohrähnliches, 4. Wa. f. Caucasus.

*delawarica* \* (*Poa delaw.* Lk., *Festuca* Kunth), delawarisches, 4. f. Nordamerika.

**Glyceria**

*distans* Wahlenb. (*capillaris* Wahlbg.), entferntähriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

*festucaeformis* \*, schwingelähnliches, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Frankreich, Caucasus.

*fluitans* RB., schwimmendes (*ächt*es), 4. Wa. f. Europa, Caucasus, Amerika, Neuholland.

*humilis* \* (*Aira humilis* MB., *Colpodium bulbosum* Trin.), niedriges, 4. f. Caucasus.

*maritima* Mert. et Koch, Seestrands-S., 4. f. Europa, Sibirien.

β) *convoluta* Hartm.

*Michauxii* Kunth (*Poa striata* Mchx., *nervata* W., *lineata* P.), Michaux's, 4. f. Nordamerika.

*pennsylvanica* \* (*Reboulea gracilis* Kunth, *Koeleria* DC., *Aira* Spgl., *A. truncata* Mühlbg.), pennsylvanisches, 4. f. Nordamerika.

*spectabilis* Mert. et Koch (*aquatica* Whlbg., *Hydrochloa aquatica* Hartm.), ansehnliches, 4. Wa. f. Europa, Sibirien, Neuholland, Nordamerika.

*viridula* \* (*Catabrosa virid.* R. et S., *Aira virid.* Poir., *scabra* Hortul.), grünliches, 4. f. ?

**Glycine** L., *Glycine*, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*biloba* Lindl., zweilappige, ♀. Sch. t. Mexico.

*clandestina* Wendl., heimlichblühende, ♀. Sch. t. Neuholland.

*debilis* Ait., schwache, ♂. w. Ostindien.

*hedysaroides* W., hahnenkopfähnliche, ♀. w. Guinea.

*heterophylla* Thbg., verschiedenblättrige, 4, Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

*malacophylla* Spgl. (*mollis* Hook.), weichblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

*minima* W., kleinste, 4. Sch. t. Neuholland.

*parviflora* Lam., kleinblumige, ♂. Sch. w. Ostindien.

*secunda* Thbg., einseitige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

*striata* L. suppl., gestreifte, ♀. Sch. w. Südamerika.

*angustifolia* Jacq. (et *caribaea* Jacq. etc.) v. *Rhynchosia angustifol.* etc. *Apios* L. v. *Apios tuberosa*. *bituminosa* L. v. *Fagelia bituminosa*. *chinensis* Curt. etc. v. *Wistaria chinensis*. *comosa* L. etc. v. *Amphicarpa comosa* etc. *humifusa* W. v. *Rothia trifoliata*. *lignosa* Turp. v. *Sweetia lignosa*. *punctata* W. v. *Poiretia scandens*. *rubicunda* Curt. etc. v. *Kennedyia rubicunda* etc. *sagittata* Humb. v. *Rudolphia dubia*. *subterranea* L. v. *Voandzeja subterranea*. *vincentina* Ker v. *Chaetocalyx vincentina*.

**Glycosmis** Corr., Süßbaum, X. i., Hesperideae-Aurantiaceae.

*arborea* Corr., gezähnelter, ♀. w. Ostindien, Mascarenas.

*pentaphylla* Corr., fünfblättriger, ♀. w. Ostindien.

**Glycyrrhiza** T., Süßholz, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*asperima* L. suppl. (*aspera* Pall., *hispida* Pall.), rauhes, 4. f. Westsibirien.

*dubia* Bernh. (*foetida* H. Par., Jacq. non Dsf., *foetidissima* Tausch.), zweifelhaftes, 4. f. ?

*echinata* L., stachelhülsiges, 4. f. Italien, Taurien, Ungarn, Mittelasien.

**Glycyrrhiza**

- foetida Dsf., stinkendes, 4. f. Nordafrika.  
 glabra L., glattes, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
 glandulifera W. Kit. (?*laevis* Pall.), drüsiges, 4. f.  
 Ungarn, Siebenbürgen, Taurien, Mittelasien.  
 hirsuta L., rauhhaariges, 4. f. Caspisches Meer.  
 lepidota Pursh, schuppiges, 4. f. Nordamerika.  
 triphylla Fisch. et Mey., dreiblättriges, 4. f. Cas-  
 pisches Meer.  
 uralensis Fisch., uralisches, 4. f. Sibirien.

**Gmelina L.** (J. G. Gmelin, deutscher Naturforscher, welcher Sibirien bereiste), XIV. II., Verbenaceae.

- arborescens Roxb., baumartige, 5. w. Ostindien.  
 asiatica L., asiatische, 5. w. Ostindien.  
 parviflora Roxb. (*parvifolia* Speg.), kleinblumige, 5. w.  
 Ostindien.  
 speciosissima D. Don, prächtige, 5. w. t. Nepal.  
 villosa Roxb., zottige, 5. w. Ostindien.

**Gnaphalium Vaill.**, Ruhrkraut, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- albescens Sw., weißliches, 5. w. Jamaica.  
 americanum L., amerikanisches, 4. t. w. Jamaica.  
 cephaloideum W., köpfiges, 4. f. ?Neuholland.  
 coarctatum W. (*spicatum* Lam.), gedrängtes, 4. f.  
 Südamerika.  
 decurrens Jves, herablaufendes, 4. f. Nordamerika.  
 involucratum Forst., eingehülltes, 4. t. Neuholland.  
 luteo-album L., gelbweißes, 4. f. Europa, Aegypten.  
 norvegicum Gunn. (*sylvaticum* Sm., *sylvat. β. fuscum* Wahlbg., *fuscum* Lam.), norwegisches, 4. f. Euro-  
 päische Voralpen.  
 obtusifolium L. (*polycephalum* Pursh), stumpfblättriges,  
 4. f. Nordamerika, Westindien.  
 pennsylvanicum W. (*spatulatum* Lam., *obtusifolium* Hort.),  
 pennsylvanisches, 4. f. Nordamerika.  
 polycephalum Mchx., vielköpfiges, 4. f. Nordamerika.  
 purpureum L., purpurfarbiges, 4. f. Nordamerika.  
 sanguineum L., blutfarbiges, 4. f. b. k. Palästina, Syrien.  
 Schraderi DC. (*pellitum* Schrad.), Schrader's, 4. f.  
 ?Nordamerika.  
 sphaericum W. (?*hemisphaericum* Hornem.), kugeliges,  
 4. k. t. Neuholland.  
 stachydifolium Lam., stachysblättriges, 4. f. Südamer.  
 supinum L. (*pusillum* Haenk., *Omalotheca supina* DC.),  
 niedriges, 4. f. Europäische Alpen.  
 β) *fuscum* Scop. γ) *pusillum* W.  
 sylvaticum L. (*rectum* Sm.), Wald-R., 4. f. Europa.  
 uliginosum L., Sumpf-R., 4. f. Europa, Ostindien,  
 Cap der guten Hoffnung.  
 ?β) *nudum* Hoffm.

**undulatum L.**, wellenblättriges, 4. f. Afrika.

- alpinum* L. etc. v. *Antennaria alpina*. *asperum* Thbg. (*stenocladum* Schrk.) v. *Anaxetum asperum*.  
*candidissimum* MB., *crassifolium* L. etc. vid. *Helichrysum candidiss.* etc. *eximium* L. etc. v. *Helipterum eximium* etc. *fastigiatum* Thbg. etc. v. *Metalasia fastigiat.* *glomeratum* L. etc. v. *Leontonyx* (*Spiralepis* D. Don), glomerat. etc. *Leontopodium* L. vid. *Leontopodium alpinum*, *leysseroides* Dsf.



**Gnaphalium**

vid. *Leyssera capillifolia*. *Oculus cati* Thbg. v.  
*Eriosphaera* O. c.

Hinsichtlich der übrigen s. *Filago* und *Helichrysum*.

**Gnetum** Forsk., L. (ostindischer Name), XXI. 1., *Chloranthaeae*.

*Gnemon* L., ternatisches, ♀. w. Molucken.

**Gnidia** L., Gnidie, VIII. 1., *Thymeleaceae*.

*argentea* Thbg., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*biflora* Thbg., zweiblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*capitata* W., kopfförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*flava* Lodd. (*aurea* Hortul.), hellgelbe, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

*imberbis* Dryand. (*pinifolia* Wendl., *simplex* Andr.), un-  
 bärige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*imbricata* L. fil. (*denudata* Lindl.), dachblättrige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnug.

*juniperifolia* L. (*acerosa* Gmel.), wachholderblättrige, ♀.  
 t. Cap der guten Hoffnung.

*linoides* Wickström, flachsblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.  
*ochroleuca* Lodd., weißgelbe, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

*oppositifolia* L. (*laevigata* Thbg.), gegenblättrige, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.

*pinifolia* L. (*radiata* Wendl.), kieferblättrige, ♀. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

*sericea* L., seidenhaarige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*simplex* L., einfache, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.

*stricta* Wikstr., steife, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.

*tomentosa* L., filzige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*filamentosa* L. fil. v. *Lachnaea buxifolia*.

**Godetia** Spach, Godetie, VIII. 1., *Onagraceae*.

*lepida* Lindl., schilferige, ☉. f. Californien.

*rubicunda* Lindl., röthliche, ☉. f. Californien.

*vinosa* Lindl., weinige, ☉. f. Californien.

**Godoya** A. et P. (Emanuel de Godoy [Friedensfürst],  
spanischer Minister), XIII. 1., *Guttiferae*.

*gemmiflora* Mart., knospenblumige, ♀. w. Brasilien.

**Goldbachia** DC. (C. L. Goldbach, Botaniker zu Mos-  
kau), XV. 1., *Cruciferae*.

*laevigata* DC., glatte, ☉. f. Astrachan.

*torulosa* DC., höckerige, ♂. f. Persien.

**Goldfussia** N. E. (Goldfuss, Professor der Zoologie  
zu Bonn), XIV. 1., *Acanthaceae*.

*anisophylla* N. E., ungleichblättrige, 4. ♀. t. Nepal.

**Gomezia** RB. (Gomez, spanischer Apotheker), XX. 1.,  
*Orchideae*.

*recurva* RB., zurückgekrümmte, 4. w. Brasilien.

*recurva* Lodd. v. *Rodriguezia planifolia*. *tenuiflora*  
 Lodd. v. *Notylia punctata*.

**Gomphia** Schreb., Gomphie, X. 1., *Tricoccae-Ochnaceae*.

*Jabotapita* Sw., Jabotapita-G., ♀. w. Brasilien, Westind.

*laevigata* Lod., glatte, ♀. w. ?

*laurifolia* Sw., lorbeerblättrige, ♀. w. Jamaica.

*nitida* Sw., glänzende, ♀. w. Jamaica.

*obtusifolia* DC., stumpfblättrige, ♀. w. Madagascar.

*zeylanica* DC., zeylonische, ♀. w. Ceylon.

**Gomphocarpus** RB., Nagelfrucht, V. 11., *Asclepiadeae*.

*arborescens* RB., baumartige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Gomphocarpus**

- crispus* RB., krause, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*fruticosus* RB., strauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*longifolius* Spgl., langblättrige, 4. f. b. k. Carolina.  
*viridis* Spgl., grüne, 4. f. b. k. Florida.

**Gompholobium** Sm., Nagelhülse, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- aduncum* Cunn., hackige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*angustifolium* Ait., schmalblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*aristatum* Benth., grannige, ♀. t. Neuholland (Schwabenflufs).  
*barbigerum* DC. (*fimbriatum* Sbr.), bärtige, ♀. t. Neuholland.  
*capitatum* Cunn., kopfförmige, ♀. t. Neuholland.  
*glabratum* DC., glatte, ♀. t. Neuholland.  
*glaucescens* Cunn., blaugrüne, ♀. t. Neuholland.  
*grandiflorum* Sm., grofsblumige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*Knightianum* Lindl., Knight's, ♀. t. Neuholland.  
*lanatum* Cunn., wollige, ♀. t. Neuholland.  
*latifolium* Sm. (*fimbriatum* Sm., *psoraleaefolium* Salisb.), breitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*marginatum* RB., berandete, ♀. t. Neuholland.

β) *setifolium* Sbr.

- mirbelioides* Ma. C., mirbelienähnliche, ♀. t. Neuholl.  
*pedunculare* DC., gestielte, ♀. ♂. t. Neuholland.  
*pinnatum* Sm., gefiederte, ♀. ♂. t. Neuholland.  
*polymorphum* RB., vielgestaltige, ♀. t. Neuholland.  
*reticulatum* Ma. C., netzförmige, ♀. t. Neuholland.  
*tenellum* Ma. C., zarte, ♀. t. Neuholland.  
*tenue* Lindl., dünne, ♀. t. Neuholland.  
*tetrathecoides* Sieb., tetrathecaähnliche, ♀. t. Neuholl.  
*tomentosum* LaBill., filzige, ♀. t. Neuholland.  
*venulosum* Lindl., feinaderige, ♀. t. Neuholland.  
*venustum* RB., liebliche, ♀. t. Neuholland.  
*virgatum* Sieb., ruthenförmige, ♀. t. Neuholland.

*Celsianum* Hort. v. *Platychilum Celsianum*. *minus* Sm. v. *Burtonia minor*.

**Gomphrena** L., Kugelamaranth, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.

- amaranthoides* Roth, fuchsschwanzähnlicher, ♂. w. Ostind.  
*arborescens* L., baumartiger, ♀. w. Südamerika.  
*decumbens* Jacq., niederliegender, ☉. w. m. Mexico.  
*globosa* L., indischer, ☉. w. m. Ostindien.

b) *alba*.

- lanata* RB., wolliger, ☉. ♂. t. Neuholland.  
*perennis* L., ausdauernder, 4. w. Südamerika.

*brasiliensis* Jacq. v. *Mogiphanes Jacquini*. *floridana* Spgl., *lactea* DC. etc. v. *Hoplotheca floridana* etc.

**Gomutus** Rumpf. (malabarischer Name), Zuckerpalme, XIII. III., Palmae.

- saccharifer* Spgl., moluckische, ♀. w. Molucken, Cochinchina.

**Gongora** R. et P. (A. C. Gongora, ein Spanier, Freund des Mutis), XX. 1., Orchideae.

- atropurpurea* Hook., schwarzpurpurrothe, 4. w. Trinidad.  
*maculata* Lindl., gefleckte, 4. w. Demerara.  
*speciosa* Hook., prächtige, 4. w. Brasilien.  
*viridipurpurea* Hook. v. *Cirrhaea viridipurpurea*.

**Goniocarpus** Thbg., Kön., Kantennufs, V. I., Halorageae.

*micranthus* Thbg., kleinblumige, ☉. f. Japan, China.

**Gonolobus** Mchx., Ringelkranz, V. II., Asclepiadeae.  
*carolinensis* RB. (*hirsutus* Lodd.), karolinischer, 4. Sch. k. Carolina.

*crispiflorus* RB., krausblumiger, ♀. Sch. w. Südamer.  
*diadematus* Ker, gezierter, ♀. Sch. w. Mexico.

*discolor* R. et S., verschiedenfarbiger, 4. Sch. f. Nordamerika,

*echinatus* Lodd., igelstacheliger, ♀. Sch. w. ?

*grandiflorus* RB., großblumiger, ♀. Sch. w. Trinidad.

*hirsutus* Mchx., rauhhaariger, 4. Sch. f. Nordamerika.

*laevis* Mchx., glatter, 4. Sch. f. Nordamerika.

*macrophyllus* Mchx., Nutt., großblättriger, 4. Sch. f. Nordamerika.

*maritimus* RB., Seestrands-R., ♀. Sch. w. Neugranada.

*niger* RB., schwarzer, ♀. Sch. w. Mexico.

*Nuttallianus* Spgl. (*viridiflorus* Nutt.), 4. Sch. f. Nordamerika.

*obliquus* RB., schiefer, 4. Sch. f. b. Florida, Carolina.

*planiflorus* RB., ebenblumiger, ♀. Sch. w. Trinidad.

*prostratus* RB., gestreckter, 4. t. k. Mexico.

*racemosus* RB., traubiger, ♀. Sch. w. Neugranada.

*rostratus* RB., geschnabelter, ♀. Sch. w. Caribäen.

*undulatus* RB., wellenblättriger, ♀. Sch. w. Neugranada.

*uniflorus* H. B. K., einblumiger, ♀. Sch. w. Mexico.

*viridiflorus* Meyer, grünblumiger, ♀. Sch. w. Südamer.

**Gonospermum** Less., Kantensame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*elegans* DC., zierlicher, ♀. k. Canarische Inseln.

*fruticosum* Less., strauchiger, ♀. k. Canarische Inseln.

*multiflorum* DC., vielblumiger, ♀. k. Canarische Inseln.

**Gonostemon** Haw. v. *Stapelia*.

**Goodenia** Sm. (Dr. Goodenough, englischer Botaniker), V. I., Campanulaceae-Goodenovieae.

*bellidifolia* Sm., maßliebblättrige, 4. k. t. Neuholl.

*gracilis* RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.

*grandiflora* Sims, großblumige, ♀. k. t. Neusüdwallis.

*hederacea* Sm., epheuähnliche, 4. k. t. Neuholland.

*heterophylla* Sm., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Neuholl.

*ovata* Sm., eiförmige, ♀. k. t. Neusüdwallis, Van-Diemens-Land.

*paniculata* Sm., rispige, 4. ♀. k. t. Neuholland.

*albida* Sm., *calendulacea* Andr., *ramosissima* Sm. v. *Scaevola microcarpa suaveolens et hispida*.

**Goodia** Salisb. (Peter Good, Pflanzensammler für den Kew-Garten), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*lotifolia* Salisb., schotenkleeblättrige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*polysperma* DC. (*lotifolia* Hortul.), vielsamige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

*pubescens* Sims, weichhaarige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

**Goodyera** RB. (John Goodyer, wenig gekannter englischer Botaniker), XX. I., Orchideae.

*discolor* Ker, verschiedenfarbige, 4. w. Brasilien.

*procera* Hook., hohe, 4. w. Nepal.

*pubescens* RB., weichhaarige, 4. f. k. Nordamerika.



**Goodyera**

*repens* RB., kriechende, 4. f. Europa, Nordamerika.  
*tessellata* Lod., würfelige, 4. f. k. Nordamerika.

**Gordonia** Ell. (James Gordon, englischer Handeltgärtner), XVI. VIII., Theaceae (*Camelliaceae*, *Ternstroemiaceae*).

*Franklini* L'Her., Franklin's, ♀. f. b. Nordamerika.  
*Haematoxylon* Sw., Blutholz-G., ♀. w. Jamaica.  
*Lasianthus* L., filzkelchige (langstielige), ♀. f. b. Carolina, Florida.  
*pubescens* L., weichhaarige, ♀. f. b. Carolina, Georgia.  
*anomala* Spgl. v. *Polyspora axillaris*.

**Gorteria** L. (David Gorter, holländischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*ciliata* Thbg., gefranzte, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*personata* L., maskige, ♂. f. m. Cap der gut. Hoffn.  
 Hinsichtlich der übrigen s. *Gazania*.

**Gossypium** L., Baumwolle, XVI. VIII., Malvaceae.

*acuminatum* Roxb., zugespitzte, ♀. w. Ostindien.  
*arborescens* L., baumartige, ♀. w. Ostindien.  
*barbadense* L., barbadensische, ♂. w. Caribäen.  
*chinense* Fisch. (*Nanking* Auctor.), chinesische, ♂. ♀. w. China, Ostindien.  
*herbaceum* L., krautartige, ♂. ♂. w. Ostindien.  
*hirsutum* L., rauhhaarige, ♂. w. Westindien.  
*indicum* Lam. (*eglandulosum* Cav.), indische, ♂. w. Ostindien.  
*latifolium* Murr., breitblättrige, ♀. w. ?  
*micranthum* Cav., kleinblumige, ♂. t. w. Persien.  
*obtusifolium* Roxb., stumpfblättrige, ♀. w. Ostindien.  
*religiosum* L., heilige, ♀. w. Ostindien.  
*vitifolium* L., weinblättrige, ♂. ♀. w. Ostindien.

*Gothofreda cordifolia* Vent. vid. *Oxypetalum Gothofreda*.

**Gouania** L. (A. Gouan, Professor der Botanik zu Montpellier), V. I. (XXIII. II.), Rhamnaceae.

*cordifolia* Radd., herzblättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*domingensis* L., domingensische, ♀. Sch. w. Westindien.  
*integrifolia* Lam., ganzblättrige, ♀. Sch. w. ?  
*mauritiana* Lam., mascarenische, ♀. Sch. w. Mascarenas.  
*tiliaefolia* Lam., lindenblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien, Mascarenas.  
*tomentosa* Jacq., filzige, ♀. Sch. w. Westindien.

**Gouffeia** Robil. et Cast. (Gouffé de la Cour, Botaniker zu Marseille), V. II., Caryophyllaceae-Alsineae.

*holosteoides* Fisch. et Mey., spurrenähnliche, ♂. f. Südrussland.

**Govenia** Lindl. (J. R. Goven, englischer Pflanzencultivator), XX. I., Orchideae.

*Gardneri* Hook., Gardner's, 4. w. ? Südamerika.  
*liliacea* Lindl., lilafarbige, 4. Kn. w. Mexico.  
*superba* Lindl., aesehnliche, 4. w. Mexico.

**Grabowskia** Schlecht. (H. Grabowski, schlesischer Botaniker), V. I., Solanaceae.

*boerhaaviaefolia* Schlecht., boerhaavienblättrige, ♀. k. t. Peru.

*Grahamia* (*Graemia*) *aromatica* Hook. v. *Cephalophora glauca*.

- Grammanthes** DC., Schriftblumchen, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.  
dichotoma DC., zweizinkiges, ☉. f. m. Cap d, gut. H.
- Grammatophyllum** Blume, Schriftstendel, XX. 1., Orchideae.  
multiflorum Lindl., vielblumiger, 4. w. Manilla.  
speciosum Blume, prächtiger, 4. w. Ostindien.
- Grammitis** Sw., Schriftfarn, XXIV. 1., Pteroideae.  
Billardieri W. (*australis* RB.), Billardièr's, 4. w. Neuholland.  
elongata Sw., länglicher, 4. w. Jamaica.  
lanceolata Sw., lanzettlicher, 4. w. Mascarenas.  
*Ceterach* Sw. v. *Ceterach officinarum. heterophylla* LaBill. et *serrulata* W. vid. *Xiphopteris heterophylla* etc.
- Grangea** Adans., Juss., Grangea, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.  
cinerea Del., aschgraue, ☉. f. Aegypten.  
maderaspatana Lam., ostindische, ☉. f. Ostindien, Aegypten.  
*bicolor* Dsf. v. *Dichrocephala latifolia. chinensis* Lam.,  
*decumbens* Dsf., *minima* W. v. *Myriogyne minuta*.
- Grangeria** Commers. (N. Granger, welcher Aegypten und Judaea bereiste), XI. 1., Chrysobalaneae.  
borbonica Lam., borbonische, ♀. w. Mascarenas.
- Gratiola** L., Gnadenkraut, II. 1., Personatae-Antirrhineae.  
aurea Mühlbg., Pursh, goldfarbiges, 4. f. Nordamerika.  
latifolia RB., breitblättriges, 4. k. t. Neuholland.  
officinalis L., officinelles, 4. f. Europa.  
quadridentata Mchx., vierzähniges, 4. f. Carolina.  
virginica L., virginisches, 4. f. b. k. Virginien, Carolina, Westindien.  
*veronicaefolia* Retz v. *Bonnaya verticillata, viscosa* Hornem. v. *Tittmannia viscosa*.
- Grevillea** RB. (C. F. Greville et R. K. Greville, englische Botaniker), IV. 1., Proteaceae.  
acanthifolia Sbr., Cunn. (? *aquifolia* Lodd., Cat.), bärenklaublättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
acuminata RB., zugespitzte, ♀. t. Neusüdwallis.  
arenaria RB., sandliebende, ♀. t. Neusüdwallis.  
aspera RB., rauhe, ♀. t. Neusüdwallis.  
aspensifolia RB., milzfarnblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
Banksii RB., Bank's, ♀. t. Neuholland.  
Baueri RB., Bauer's, ♀. t. Neuholland.  
berberifolia Swt., berberizenblättrige, ♀. t. Neuholland.  
buxifolia RB., buchsbaumblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
Caley RB. (*blechnifolia* Cunn.), Caley's, ♀. t. Neuholl.  
canescens RB., grauliche, ♀. t. Neuholland.  
ceratophylla RB., hornblättrige, ♀. t. Nördl. Neuholl.  
cinerea RB., aschgraue, ♀. t. Neusüdwallis.  
collina Kn., Hügel-G., ♀. t. Neusüdwallis.  
concinna RB., nette, ♀. t. Neusüdwallis.  
Dryandri RB., Dryander's, ♀. t. Nördliches Neuholland.  
dubia RB., zweifelhafte, ♀. t. Neusüdwallis.  
Flindersii Cunn., Flinders's, ♀. t. Neusüdwallis.  
heterophylla Hort., verschiedenblättrige, ♀. t. Neuholl.  
juniperina RB., wachholderähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.  
linearis RB., gleichbreitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

**Grevillea**b) *alba* Lod. c) *incarnata* Bot. mag.

- Manglesii* Mack, C., *Mangles's*, f. t. Neuholland.  
*montana* RB., Berg-G., f. t. Neusüdwallis.  
*mucronulata* RB., stachelspitzige, f. t. Neusüdwallis.  
*phylicoides* RB., *phylica*ähnliche, f. t. Neuholland.  
*planifolia* RB. (*concinna* Lindl., *Seymouriae* Swt.), eben-  
 blätterige, f. t. Neuholland.  
*podaliriaefolia* Swt., *podalirien*blätterige, f. t. Neuholl.  
*podocarpifolia* Swt., *podocarpus*blätterige, f. t. Neuholl.  
*pubescens* Hook., weichhaarige, f. t. Neuholland.  
*punicea* RB., hochrothe, f. t. Neusüdwallis.  
*riparia* RB., Ufer-G., f. t. Neusüdwallis.  
*robusta* Cunn., rüstige, f. t. Neuholland.  
*rosmarinifolia* Cunn., *rosmarin*blätterige, f. t. Neusüdwallis.  
*sericea* RB., seidenhaarige, f. t. Neusüdwallis.  
*sphacelata* RB., brandige, f. t. Neuholland.  
*stricta* RB., steife, f. t. Neusüdwallis.  
*stylosa* Kn., langgriffelige, f. t. Neusüdwallis.  
*sulphurea* Cunn., schwefelgelbe, f. t. Neusüdwallis.  
*trifurcata* Swt., dreigabelige, f. t. Neuholland.  
*venusta* RB., liebliche, f. t. Neuholland.

**Grewia** L. (N. Grew, berühmter englischer physiologischer Botaniker), XIII. 1., Tiliaceae.

- affinis* Lindl., ähnelnde, f. w. China.  
*asiatica* L., asiatische, f. w. Coromandel, Mascarenas.  
*aspera* Roxb., rauhe, f. w. Ostindien.  
*bicolor* Juss., zweifarbige, f. w. Guinea.  
*bracteata* Roth, deckblätterige, f. w. Ostindien.  
*carpinifolia* P. B., hainbuchenblätterige, f. w. Guinea.  
*flava* DC., hellgelbe, f. t. w. Südafrika.  
*hirsuta* Vahl, rauhhaarige, f. w. Ostindien.  
*Mallococca* L., zottigfrüchtige, f. w. Freundschaftsins.  
*Microcos* L., kleinfrüchtige, f. w. Ostindien.  
*obtusifolia* W., stumpfblätterige, f. t. Cap d. gut. H.  
*occidentalis* L., westliche, f. t. Cap der guten Hoffn.  
*oppositifolia* Hamilt., gegenblätterige, f. t. Cap d. g. H.  
*orientalis* L., morgenländische, f. w. Ostindien.  
*ovalifolia* Juss., eiblätterige, f. w. Ostindien.  
*paniculata* Roxb., rispige, f. w. Ostindien.  
*pilosa* Lam. (*orientalis* Vahl), haarige, f. w. Ostindien.  
*Rothii* DC. (*bicolor* Roth), Roth's, f. w. Ostindien.  
*salvifolia* Roth, salbeiblätterige, f. w. Ostindien.  
*serrulata* DC., sägezähnige, f. w. Ostindien.  
*subinaequalis* DC., ungleiche, f. w. Ostindien.  
*terebinthinacea* DC., Terpentin-G., f. t. ?  
*tiliaefolia* Vahl (*arborea* Roxb.), lindenblätterige, f. w. Ostindien.

- tomentosa* Juss. (*hirsuta* Sm.), filzige, f. w. Java.  
*ulmifolia* Roxb., ulmenblätterige, f. w. Ostindien.  
*umbellata* Roxb., doldige, f. w. Ostindien.  
*villosa* Roxb., zottige, f. w. Ostindien.

**Grias** L., Stammpfirsiche, XIII. 1., Guttiferae.

- cauliflora* L., westindische, f. w. Jamaica.

**Grielum** L., *Grielum*, X. iv., ? Aizoideae.

- humifusum* Thbg., niederliegendes, 4. t. k. Cap d. g. H.  
*laciniatum* G., schlitzblätteriges, 4. t. k. Cap d. gut. H.  
*tenuifolium* L., feinblätteriges, 4. t. k. Cap d. gut. H.

**Griffinia** Ker, Herb. (W. Griffin, Esq., Freund der Botanik), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.



**Griffinia**

*hyacinthina* Herb., hyacinthenähnliche, 4. Zw. w. Brasilien.

*intermedia* Lindl., mittlere, 4. Zw. w. Brasilien.

*parviflora* Ker, kleinblumige, 4. Zw. w. Südamerika.

**Grindelia** W. (D. H. Grindel, Professor der Botanik zu Dorpat), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, 4. k. Mexico.

*arguta* Schrad., scharfzahnige, 4. k. f. b. Mexico.

*ciliata* Spgl., gefranzte, ♂. f. Nordamerika.

*coronopifolia* Lehm., krähensfußblättrige, 4. k. Mexico.

*Dunalii* Spgl. (*angustifolia* Dun.) Dunal's, 4. k. Mexico.

*glutinosa* Dun., klebrige, ♂. k. t. Mexico.

*integrifolia* DC., ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.

*inuloides* W. (*spathulata* Bernh.), alantähnliche, 4. ♂. k. t. Mexico.

*Lamberti* G. Don, Lambert's, ♂. k. t. Mexico.

*nitida* Bernh., glänzende, 4. f. ? Nordamerika.

*squarrosa* Dun., sparrige, ♂. k. Nordamerika.

*incisa* Spgl. v. Aster (*Calimeris*) *incisa*. *sibirica* Lk. v. ? Aster *conspicuus*.

**Grislea** Löffl. (G. Grisley, portugiesischer Wundarzt und Schriftsteller), VIII. I., Lythraeae.

*secunda* L., einseitige, ♂. w. Cumana.

*tomentosa* Roxb., filzige, ♂. w. Ostindien.

**Grobya** Lindl. (Lord Grey of Groby, Beförderer der Gartenkultur), XX. I., Orchideae.

*Amherstiae* Lindl., Amherst's, 4. w. Brasilien.

**Gronovia** L. (J. F. Gronow, holländischer Botaniker), V. I., Cucurbitaceae.

*Humboldtiana* R. et S., Humboldt's, ♂. Sch. w. Südamer.

*scandens* L., klimmende, ♂. Sch. w. Südamerika.

*Grossularia* T. v. *Ribes*.

**Guajacum** Plum., Guajackholz, X. I., Zygophylleae.

*arborescens* H. B. K., baumartiges, ♂. w. Südamerika, Trinidad.

*officinale* L., officinelles, ♂. w. Westindien.

*verticale* Ortega, scheitelrechtes, ♂. w. Südamerika, Westindien.

**Guarea** L. (westindischer Name), VIII. I. (XVI. v.), Hesperideae-Meliaceae.

*ramiflora* Vent. (*humilis* Berter.), astblumige, ♂. w. Porto Rico.

*Swarzii* DC. (*trichilioides* Sw.), Swarz's, ♂. w. Westind.

*trichilioides* L. (*grandiflora* DC.), großblumige, ♂. w. Westindien, Südamerika.

**Guatteria** R. et P. (J. B. Guatteria, Professor der Botanik zu Parma), XIII. VI., Anonaceae.

*cerasoides* Dun., kirschbaumähnliche, ♂. w. Coromandel.

*laurifolia* Dun., lorbeerblättrige, ♂. w. Westindien, Südamerika.

*rufa* Dun., fuchsrothe, ♂. w. Ostindien, China.

*suberosa* Dun., korkige, ♂. w. Coromandel.

*virgata* Dun., ruthenförmige, ♂. w. Jamaica, Cuba.

**Guazuma** Plum. (mexicanischer Name), XVIII. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

*polybotrya* Cav., vieltraubige, ♂. w. Südamerika, Caribäen.

**Guazuma**

tomentosa H. B. K., filzige,  $\frac{1}{2}$  w. Neugranada.

ulmifolia Lam., ulmenblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

**Güldenstaedtia** Fisch. (J. A. Güldenstaedt, ein Lief-  
länder, welcher als Botaniker die Caucasischen Gebirge  
bereiste), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.  
monophylla Fisch., einblättrige, 4. f. Sibirische Alpen.  
pauciflora Fisch., wenigblumige, 4. f. Ostsibirien.

*Günthera elongata* Andr. v. *Brassica elongata*.

*Guepinia Lepidium* Dsf. et *nudicaulis* Bat. vid. *Teesdalia*  
*Lepidium* et *nudicaulis*.

**Guettarda** L. (Etienne Guettard, französischer Bota-  
niker), V. i. (XXI. vi.), Rubiaceae.

hirsuta Poir., rauhhaarige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika, Hispaniola.

lucida R. et S., spiegelnde,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

odorata R. et S., wohlriechende,  $\frac{1}{2}$  w. Cuba, Jamaica.

rugosa Sw., runzelige,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

scabra Lam., scharfe,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

speciosa L., prächtige,  $\frac{1}{2}$  w. Java.

tomentosa R. et S., filzige,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

*coccinea* Aubl. v. *Isertia coccinea*.

**Guevina** Molin., Guevine, IV. i., Proteaceae.

Avellana Molin., nufstragende,  $\frac{1}{2}$  t. Chili.

**Guilandina** Juss. (M. Wieland [Guilandinus], ein  
Preulſe, welcher in naturhistorischer Hinsicht die  
Levante bereiste), X. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

Bonduc L., Bonduc-G.,  $\frac{1}{2}$  w. Ost- und Westindien.

Bonducella L., zweistachelige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*dioica* L. v. *Gymnocladus canadensis*.

**Guizotia** DC. (Guizot, französischer Staatsmann und  
Gelehrter), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

oleifera DC., ölige,  $\odot$   $\frac{1}{2}$  f. m. w. Ostindien, Abyssinien.

**Gundelia** T. (A. Gundelsheimer, ein Deutscher, welcher  
mit Tournefort den Orient bereiste), XIX. v., Com-  
positae-Echinopeae.

Tournefortii L., Tournefort's, 4. f. b. k. Levante.

**Gunnera** L. (E. Gunner, norwegischer Botaniker), II.  
i., Urticaceae.

perpensa L., nierenblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.

**Gustavia** L. (Gustav III., König von Schweden, Be-  
schützer des Linné), XVI. viii., Myrtaceae.

augusta L., herrliche,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana, Brasilien.

fastuosa L., schöne,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.

**Guzmania** R. et P. (A. Guzmán, ein Spanier, Sammler  
naturhistorischer Gegenstände), VI. i., Bromeliaceae.

tricolor R. et P., dreifarbig, 4. w. Südamerika.

**Gymnadenia** R. B., Rich., Händleinwurz, XX. i.,  
Orchideae.

albida Rich., weißliche, 4. Kn. f. Europa.

angustifolia Spgl., schmalblättrige, 4. Kn. f. Taurien,  
Caucasus.

conopsea Rich., fliegenartige, 4. Kn. f. Europa.

b) alba.

cucullata Rich., kappenförmige, 4. Kn. f. Galicien,  
Podolien, Sibirien.

odoratissima Rich., wohlriechende, 4. Kn. f. Europa.

ornithia Spgl., vogelartige, 4. Kn. f. Oesterreich,  
Calabrien.

**Gymnadenia**

*viridis* Rich., grüne, 4. Kn. f. Europa, Nordamerika.

**Gymnema** RB., Nacktkrone, V. II., Asclepiadeae.

*lactiferum* RB., milchende, 4. Sch. w. Ceylon.

*sylvestre* RB., Wald-N., 5. Sch. w. Ceylon.

*tenacissimum* Spgl., zähe, 5. Sch. w. Ostindien.

*tingens* Spgl., färbende, 5. Sch. w.

**Gymnocladus** Lam., Schusserbaum, XXII. IX. (X. I.),  
Leguminosae-Caesalpinieae.

*canadensis* Lam., canadischer, 5. f. Canada.

**Gymnogramma** Desv., Schriftfarn, XXIV. I., Pter-  
oideae (*Polypodiaceae*).

*asplenoides* Sw., strichfarnähnlicher, 4. w. Brasilien.

*Calomelanos* Kaulf., schwarzstieliger, 4. w. Westindien,  
Südamerika.

*chaerophylla* Dsf., kerbelblättriger, 4. w. Brasilien,  
Paraguay.

*chrysophylla* Kaulf., goldblättriger, 4. w. Westindien.

*distans* H. Berol., entferntfiederiger, 4. w. Brasilien.

*leptophylla* Desv., schlankblättriger, 4. k. f. b. Südeuropa.

*myriophylla* Sw., vielblättriger, 4. w. Brasilien.

*ochracea* Presl, ockerfarbiger, 4. w. Peru.

*pedata* Kaulf., fußförmiger, 4. w. Südamerika.

*peruviana* Desv. (*dealbata* Presl), peruvianischer, 4. w.  
Peru, Panama.

*polypodioides* Spgl. (*Raddiana* Bevis), tüpfelfarnähn-  
licher, 4. w. Brasilien.

*rufa* Desv., fuchsrother, 4. w. Südamerika.

*sulfurea* Desv., schwefelgelber, 4. w. Jamaica.

*tartarea* Desv., bestäubter, 4. w. Jamaica, Südamerika.

*tomentosa* Desv., filziger, 4. w. Brasilien.

*trifoliata* Desv., dreiblättriger, 4. w. Westindien,  
Südamerika.

*Ceterach* Spgl. v. *Ceterach* offic. *cordata* Hook. et  
Grev. et *cordata* Schlcht. v. *Ceterach* capensis et  
*cordata* Nachtr.

**Gymnoloma** H. B. K., Nacktsaum, XIX. III., Compo-  
sitae-Corymbiferae.

*connatum* Spgl., verwachsener, 5. w. Brasilien.

*maculatum* Ker, gefleckter, 5. w. Brasilien.

*triplinerve* H. B. K., dreinerviger, 5. w. Neugranada.

**Gymnostachys** RB., Nacktähre, IV. I., Aroideae.

*anceps* RB., zweikantige, 4. Kn. t. Neuholland.

**Gymnostichum** Schreb., Nacktspindel, III. II.,  
Gramineae.

*Hystrix* Schreb., struppige, ♂. 4. f. Orient, Nordamer.

*majus* (Fresen.), größere, 4. f. ? Nordamerika.

**Gymnostylis anthemifolia** Juss. etc. v. *Soliva anthemifol.* etc.**Gynandropsis** DC., Zwitterkapper, VI. I. (XV. III.),  
Capparideae.

*Candelabrum* Swt., kerzenartige, ☉. w. ?

*pentaphylla* DC., fünfblättrige, ☉. w. Ost- u. Westind.

*pulchella* Lindl., schöne, ☉. w. m. Südamerika.

*sessiliflora* DC., ungestielte, ☉. w. m. Westindien.

*speciosa* DC., prächtige, ♂. w. Südamerika.

*triphylla* DC., dreiblättrige, ☉. w. m. Westindien.

**Gynopogon Alyxia** Forst. v. *Alyxia* Forsteri.**Gypsocallis** Salisb., *carnea* D. Don, *multiflora* D. Don,  
*vagans* Salisb. etc. v. *Erica carnea* etc.



**Gypsophila** L., Gypskraut, X. II., Caryophyllaceae.

*acutifolia* Fisch., spitzblättriges, 4. f. Caucasus.

*adscendens* Jacq., aufsteigendes, 4. f. Südeuropa.

*altissima* L., hohes, 4. f. Sibirien.

β) *conferta*.

*capitata* Pall., kopfförmiges, 4. f. b. Mittelasien.

*collina* Stev., Hügel-G., 4. f. Podolien, Bessarabien.

*dichotoma* Bess. (*dubia* W. suppl.), zweizinkiges, 4. f. Galicien, Sibirien.

*elegans* MB., zierliches, 4. f. Caucasus.

*fastigiata* L., gipfelständiges, 4. f. Deutschland, Schweden, Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien.

β) *arenaria* WK.

*glauca* Stev. (*repens* MB., *Steveni* Fisch., *armerioides* Sering.), blaugrünes, 4. f. Caucasus, Armenien, Mittelasien.

*glomerata* Pall., knaulförmiges, 4. f. Taurien, Caucasus.

*Gmelini* Ledeb., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

*graminea* Sm., grasartiges, 4. f. Griechenland.

*grandiflora* Poir., großblumiges, 4. f. ?

*muralis* L., gemeines, 4. f. Europa.

β) *serotina* Hayn.

*paniculata* L., rispiges, 4. f. Mähren, Ungarn, Sibirien.

*perfoliata* L., durchwachsenes, 4. f. Kleinasien.

*prostrata* L., gestrecktes, 4. f. Mittelasien.

*pubescens* Ledeb., weichhaariges, 4. f. Sibirien.

*repens* L. (*prostrata* All.), 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien.

*rigida* L., starres, 4. f. Südfrankreich.

*Rokeika* Delil., ägyptisches, 4. f. Aegypten.

*sabulosa* Stev. (*scorzonerifolia* Dsf., *perfoliata* MB.), Sand-G., 4. f. Taurien, Caucasus.

*saligna* Schrad., weidenartiges, 4. f. ?

*Stevenii* Fisch., Steven's, 4. f. Caucasus, Armenien.

*Struthium* L., spanisches, 4. f. b. Spanien.

*tenella* Poir., zartes, 4. f. Südeuropa.

*tenuifolia* MB., feinblättriges, 4. f. Caucasus.

*trichotoma* Wender., dreizinkiges, 4. f. ?

*viscosa* Murr., schmieriges, 4. f. Kleinasien.

*compressa* Dsf., *cretica* Sm., *dianthoides* Sm., *illyrica* Sm., *ochroleuca* Sm., *Saxifraga* L., *stricta* Bunge v. *Tunica compressa* etc. *Vaccaria* Sm. v. *Vaccaria pyramidata*.

**Gyrenia** K. et W., Gyrenie, VI. I., ? Coronariae-Asphodeleae.

*biflora* K. et W., zweiblumige, 4. Zw. t. Mexico.

**Gyrocarpus** Jacq., Rundnufs, IV. I. (XXIII. I.), Onagrariae-Combretaceae.

*americanus* Jacq., amerikanische, 4. w. Westindien, Neugranada.

*asiaticus* W. (*Jacquini* Roxb.), asiatische, 4. w. Ostindien.

**Gyromia** virginica Nutt. v. *Medeola virginica*.**Gyrostemon** Dsf., Kreisfädler, XIII. VI. (XXII. XII.), ? Malvaceae-Tiliaceae.

*attenuatus* Hook., verschmälerter, 4. t. Westliches Neuholland.

*cotinifolius* Dsf., cotinusblättriger, 4. t. Westliches Neuholland.

*ramulosus* Dsf., ästiges, 4. t. Westliches Neuholland.

- Habenaria** W., RB., Zügelstendel, XX. 1., Orchideae.  
*alata* Hook., geflügelter, 4. Kn. w. Westindien.  
*Blephariglottis* Hook., weisblumiger, 4. Kn. f. Nordamer.  
*bracteata* RB., deckblättriger, 4. Kn. f. b. Nordamer.  
*ciliaris* RB., gefranzter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*cristata* RB., kammiger, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*dilatata* Hook., verbreiteter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*fimbriata* RB., gefranzter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*flava* RB., hellgelber, 4. Kn. f. b. k. Virginien.  
*gigantea* Don, größer, 4. w. Bombay.  
*goodyeroides* Don, goodyeraähnlicher, 4. w. Bombay.  
*gracilis* Hook., schlanker, 4. Kn. w. Ostindien.  
*Herbiola* RB., kleiner, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*hyperborea* RB., nördlicher, 4. Kn. f. Island, Grönland.  
*incisa* Spgl., eingeschnittener, 4. Kn. f. b. Nordamerika.  
*lacera* RB., zerrissener, 4. Kn. f. b. Carolina.  
*leptoceras* Hook., schlankhorniger, 4. Kn. w. ?  
*macroceras* W., grofshorniger, 4. Kn. w. Jamaica.  
*marginata* Hook., berandeter, 4. Kn. w. Ostindien.  
*ochroleuca* RB., weifsgelber, 4. Kn. w. Neuholland.  
*orbiculata* Hook., kreisförmiger, 4. Kn. f. b. Nordamer.  
*procera* Lindl., hoher, 4. w. Sierra Leone.  
*psychodes* Spgl., goldfarbiger, 4. Kn. f. b. Nordamer.  
*spectabilis* Spgl., ansehnlicher, 4. Kn. f. b. Nordamer.  
*Susannae* RB., asiatischer, 4. Kn. w. Amboina, Südchina.  
*tridentata* Hook., dreizahniger, 4. Kn. f. b. Nordamer.  
*virescens* Spgl., grünlicher, 4. Kn. f. b. Pennsylvanien.  
*albida* RB. (et *viridis* RB.) v. *Gymnadenia albida*  
 etc. *bifolia* RB. vid. *Platanthera bifolia*. *cordata*  
 Hook. v. *Herminium cordatum*.
- Hablizia** MB. (K. L. Hablizl, welcher Nordpersien und Taurien bereiste), V. 1., Aizoideae-Phytolacceae.  
*tamnoides* MB., schneerwurzähnliche, 4. Sch. f. Caucasus.
- Habranthus** Herb., Jugendblume, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.  
*Andersoni* Herb., Anderson's, 4. Zw. t. Montevideo, Texas.  
 β) *texanus* Herb.  
*angustus* Herb., schmale, 4. Zw. w. t. Brasilien.  
*Bagnoldi* Herb., Bagnold's, 4. Zw. k. t. Chili.  
*bifidus* Herb., zweispaltige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.  
*gracilifolius* Herb., schlankblättriger, 4. Zw. k. t. Südamerika.  
 β) *Boothianus* Herb.  
*lorifolius* Bot. Mag., riemenblättriger, 4. Zw. t. Südamer.  
*miniatus* D. Don, mennigrothe, 4. Zw. k. t. Chili.  
*pallidus* Bot. Cab., bleiche, 4. Zw. k. t. Valparaiso.  
*phycelloides* Herb., phycellähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.  
*pumilus* Herb., niedrige, 4. Zw. k. t. Chili.  
*robustus* Herb., kräftige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.  
*roseus* Swt., rosafarbige, 4. Zw. k. t. Chili.  
*spathaceus* Herb., scheidige, 4. Zw. t. k. Buenos Ayres.  
*versicolor* Herb., buntfarbige, 4. Zw. t. Südamerika.
- Haemadictyon** Lindl., Blutling, V. 1., Contortae-Apocynaeae.  
*venosum* Lidln., aderiger, 4. Sch. w. Ostindien.
- Haemanthus** L., Blutblume, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

**Haemanthus**

- amarylloides Jacq., amaryllisähnliche, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- carinatus Mill., nachenförmige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- carneus Ker, fleischfarbige, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- coarctatus Jacq., gedrängte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- coccineus L., scharlachfarbige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- crassipes Jacq., dickstielige, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- humilis Jacq., niedrige, 4. Zw. t. w. Cap d. gut. H.
- hyalocarpus Jacq., klarfrüchtige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- lanceaefolius Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- maculatus Jacq., gefleckte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- moschatus Jacq., moschusduftende, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- multiflorus L., vielblumige, 4. Zw. w. Sierra Leone.
- orbicularis Fisch, kreisförmige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- pubescens L. (*albiflos* Jcq.), weichhaarige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- Pumilio Jacq., kleine, 4. Zw. t. w. Cap der gut. H.
- puniceus Jacq., hochrothe, 4. Zw. t. w. Guinea, Cap der guten Hoffnung.
- quadrivalvis Jacq. (*pubescens* Thbg.), vierklappige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- rotundifolius Sims, rundblättrige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- sanguineus L., ächte, 4. Zw. t. w. Cap der gut. H.
- tigrinus Jacq., getigerte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- ciliaris* L., *falcatus* Thbg., *toxicarius* Ait. v. *Brunsvigia ciliaris* etc.

**Haematoxylon** L., Blutholz, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

campechianum L., Kampeche-B., 5. w. Südamerika.

**Haemodorum** Sm., Blutnarzisse, III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

planifolium RB., flachblättrige, 4. t. Neusüdwallis.

teretifolium RB., rundblättrige, 4. t. Neuholland.

**Hakea** Schrad. (Baron Hake, ein Deutscher, Gönner der Pflanzenkunde), IV. 1., Proteaceae.

acanthophylla Lk., stechende, 5. t. Neuholland.

acicularis RB. (*sericea* Schrad.), nadelblättrige, 5. t. Neusüdwallis.

amplexicaulis RB., stengelumfassende, 5. t. Neuholland.

angustifolia Mack. C., schmalblättrige, 5. t. Neuholl.

arborescens RB., baumartige, 5. t. Neuholland.

attenuata RB., verschmälerte, 5. t. Südl. Neuholland.

Baxteri RB., Baxter's, 5. t. Neuholland.

carduifolia Lodd., distelblättrige, 5. t. Neuholland.

ceratophylla BB., hornblättrige, 5. t. Neuholland.

cinerea RB. (*canescens* Lk.), aschfarbige, 5. t. Neuholl.

clavata La Bill., keulförmige, 5. t. Neuholland.

cristata RB., kammige, 5. t. Neuholland (Schwanenfl.).

cucullata Cunn., kappenförmige, 5. t. Neuholland.

cycloptera RB., rundflügelige, 5. t. Südliches Neuholl.

dactyloides Cav., genervte, 5. t. Neusüdwallis.

denticulata RB., gezähnelte, 5. t. Neuholland.



**Hakea**

- echinata* Mack. C., igelstachelige, ♀. t. Neuholland.  
*elliptica* RB., elliptische, ♀. t. Neuholland.  
*Epiglottis* La Bill., krummfrüchtige, ♀. t. Nördliches Neuholland.  
*ferruginea* Cunn., rostfarbige, ♀. t. Neuholland.  
*flexilis* RB., biegsame, ♀. t. Neuholland.  
*florida* RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.  
*gibbosa* Cav. (*pubescens* Schrad.), höckerige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*ilicifolia* RB., stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*Lamberti* Swt., Lambert's, ♀. t. Neusüdwallis.  
*lanigera* Ten., wollige, ♀. t. Neuholland.  
*latifolia* Lodd., breitblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*laurina* RB., lorbeerähnliche, ♀. t. Neuholland.  
*linearis* RB., gleichbreitblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*marginata* RB., berandete, ♀. t. Südliches Neuholland.  
*microcarpa* RB., kleinfrüchtige, ♀. t. Van-Diemens-Land.  
*myricaefolia* Ait., gabelblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*nitida* RB., glänzende, ♀. t. Neuholland.  
*nodosa* RB., knotige, ♀. t. Südliches Neuholland.  
*obliqua* RB., schiefe, ♀. t. Südliches Neuholland.  
*oleaefolia* RB., ölbaumblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*pachyphylla* Sieb., dickblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*parilis* Kn., gleichförmige, ♀. t. Van-Diemens-Land.  
*pectinata* Coll., kammförmige, ♀. t. Neuholland.  
*petrophiloides* Mack. C., petrophilaähnliche, ♀. t. Neuholland.  
*propinqua* Cunn., verwandte, ♀. t. Neusüdwallis.  
*prostrata* RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.  
*pugioniformis* Cav. (*glabra* Schrad.), dolchblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*rugosa* RB., runzelige, ♀. t. Neuholland.  
*ruscifolia* La Bill., mäusedornblättrige, ♀. t. Südliches Neuholland.  
*saligna* RB., weidenähnliche, ♀. t. k. Neuholland.  
*suaveolens* RB., feinriechende, ♀. t. Südliches Neuholl.  
*subulata* Cunn., pfriemenförmige, ♀. t. Neusüdwallis.  
*sulcata* RB., gefurchte, ♀. t. Neuholland.  
*trifurcata* RB., dreigabelige, ♀. t. Südl. Neuholland.  
*tuberculata* RB., kleinknötige, ♀. t. Neuholland.  
*ulicina* Cunn., ulexähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.  
*undulata* RB., wellenförmige, ♀. t. Südl. Neuholland.  
*varia* RB., verschiedenblättrige, ♀. t. Südl. Neuholl.  
*vittata* RB., verschleierte, ♀. t. Südliches Neuholland.  
 Unbestimmtere: *heterophylla*, *microsperma*, *notata*.  
*longifolia* Dum. (*rubricaulis* Hortul.) vid. *Stenocarpus salignus*.  
*pyriformis* Cav. vid. *Xylomelum pyriforme*.

**Halesia** L. (S. Hales, berühmter englischer Pflanzen-Physiolog), XI. 1. (XVI. VII.), Sapotaceae-Styraceae.  
*diptera* L., zweiflügelige, ♀. f. Nordamerika.  
*parviflora* Mchx., kleinblumige, ♀. f. Nordamerika.  
*tetraptera* L., vierflügelige, ♀. f. Nordamerika.

**Halimodendron** Fisch., Meerstrauch, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- argenteum* Fisch., silberfarbiger, ♀. f. Sibirien.  
 β) *brachysema* DC.  
*subvirescens* DC., G. Don, grünlicher, ♀. f. Sibirien.

**Halimus** Wallr., Meermelde, XXI. v., Aizoideae-Atripliceae.

pedunculatus Wallr., gestielte, ☉. f. Europa, Mittelasien.  
portulacoides Wallr., portulakähnliche, ☿. f. Europa, Nordafrika, Sibirien.

**Halleria** L. (A. v. Haller, berühmter Naturforscher), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

elliptica Thbg., elliptische, ☿. k. t. Cap der guten H.  
lucida L., schimmernde, ☿. k. t. Cap der guten Hoffn.

**Hallia** Thbg. (Berger Martin Hall, Zögling des Linné), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alata Thbg., geflügelte, ♂. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
Asarina Thbg., gundermanblättrige, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

cordata Thbg., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.

flaccida Thbg., schlaffe, ♂. k. t. Cap der gut. Hoffn.

imbricata Thbg., dachblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.

*monophylla* Desv. v. *Heylandia hebecarpa*, *sororia* W. v. *Eleiotis sororia*.

**Haloragis** Forst., Meernüfschen, VIII. IV., Halorageae.

Cercodia Ait. (*Tetragonia* L'Her., *alata* Forst.), sägeblättriges, ☿. k. Neuzeeland.

prostrata Forst., gestrecktes, ☿. k. Neucaledonien.

**Hamamelis** L., Zaubernufs, IV. II., Laurineae-Hamelideae.

chinensis RB., chinesische, ☿. k. China.

virginica L., virginische, ☿. f. Nordamerika.

β) *parvifolia* Nutt. γ) *macrophylla* Pursh.

**Hamelia** Jacq. (Duhamel du Monceau, französischer Botaniker), V. I., Rubiaceae.

axillaris Sw., achselblumige, ☿. w. Westindien.

chrysantha Sw., goldblumige, ☿. w. Westindien.

odorata W. (*suaveolens* H. B. K.), wohlriechende, ☿. w. Südamerika,

patens Jacq. (*coccinea* Sw.), abstehende, ☿. w. Südamerika, Westindien.

sphaerocarpa R. et P., kugelfrüchtige, ☿. w. Peru.

ventricosa Sw. (*grandiflora* L'Her.), bauchige, ☿. w. Jamaica.

rostrata Bartl., schnabelfrüchtige, ☿. w. t. Mexico.

**Hamiltonia** Mühlbg., W. (F. Hamilton, englischer Botaniker), V. I. (XXIII. II.), Sandalaceae.

oleifera Mühlbg., W., ölfrüchtige, ☿. k. Nordamerika.

*umbellata* Spgl. v. *Comandra umbellata*.

**Hapalostephium austriacum** D. Don, *grandiflorum* G. Don etc. v. *Crepis blattarioides* etc.

**Haplophyllum** Ad. Juss., Schmalraute, VIII. I. (X. I.), Tricoccae-Rutaceae.

Buxbaumii Juss. (Poir.), Buchsbaum's, 4. ☿. f. b. Taurien, Bessarabien, Kleinasien.

dahuricum Juss. (DC.), dahurische, 4. ☿. f. Nordasien.

linifolium Juss. (L.), linienblättrige, 4. ☿. k. Spanien, Nordafrika.

patavinum Juss. (L.), italienische, 4. ☿. f. b. k, Oberitalien.

pubescens Juss. (W.), weichhaarige, 4. ☿. k. Spanien.

suaveolens Juss. (DC.), starkriechende, 4. ☿. f. b. Taurien.

**Haplophyllum**

tuberculatum Juss., kleinhöckerige, 4.  $\frac{1}{2}$ . k. Aegypten.  
 villosum Juss. (MB.), zottige, 4.  $\frac{1}{2}$ . f. b. Caucasus,  
 Bessarabien.

**Hardenbergia monophylla** Benth. etc. vid. *Kennedyia monophylla*.

**Hardwickia** Roxb. (Hardwick, englischer General und Naturforscher in Ostindien), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

binata Roxb., zweizählige,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

pinnata Roxb., gefiederte,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.

**Haronga** A. P. Th. (madagascarischer Name), XVIII. 11., Hypericineae.

madagascariensis Choisy. (*paniculata* Lodd.), madagascarisches,  $\frac{1}{2}$ . w. Madagascar.

**Harpalice alba** D. Don etc. v. *Prenanthes alba* etc.

**Harpalium** Cass., *Harpalium*, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

rigidum Cass., starres, 4. f. Nordamerika.

**Harrachia speciosa** Jacq. fil. v. *Crossandra undulaefolia*.

**Harrisonia** Hook. (Harrison, englischer Botaniker), V. 11., Asclepiadeae.

loniceroides Hook., loniceraähnliche,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.

**Hartmannia** DC. (Hartmann, schwedischer Botaniker), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

ciliata DC., gefranzte,  $\odot$ . f. Neucalifornien.

corymbosa DC., traubendoldige,  $\odot$ . f. Neucalifornien.

**Hartogia** Thbg. (J. Hartog, holländischer Botaniker), IV. 1., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

capensis Thbg., capische,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der gut. Hoffn.

betulina Berg. v. *Barosma betulina*. capensis L. v.

*Agathosma hispida*. ciliata Berg. (*imbricata* L.)

etc. v. *Agathosma imbricata*.

**Hartwegia** Lindl. (Th. Hartweg, englischer Gärtner und Botaniker), XX. 1., Orchideae.

purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Mexico.

**Hasselquistia** L. (F. Hasselquist, ein Schwede, welcher Aegypten, Syrien etc. bereiste), V. 11., Umbelliferae.

aegyptiaca L., aegyptische,  $\odot$ . f. Aegypten.

cordata L., herzförmige,  $\odot$ . f. ?

**Hastingsia coccinea** Sm. et scandens Roxb. v. *Holmskioldia sanguinea* etc.

**Haworthia** Duv. v. Aloe. **Huxtonia argophylla** Caley, *foliosa* Hort. Bonn. etc. v. *Aster-Eurybia*, argophylla, aculeata etc.

**Haylockia** Herb. (Mattheu Haylock, Gärtner des Herrn Herbert), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

pusilla Herb., zwergige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.

**Hebenstreitia** L. (J. E. Hebenstreit, Professor der Botanik zu Leipzig), XIV. 11., Globulariaceae.

albiflora Lk. (? *alba* Jacq.), weißblumige,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Cap der guten Hoffnung.

capitata Thbg., kopfige,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Cap der gut. Hoffn.

chamaedryfolia Lk., gamanderblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Cap der guten Hoffnung.

ciliata L., gefranzte,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Cap der guten Hoffnung.

cordata L., herzblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Cap der gut. Hoffn.

dentata L., gezähnelte,  $\odot$ . f. m. Cap der gut. Hoffn.



**Hebenstreitia**

*erinoides* Thbg., erinusähnliche, ⚔. t. k. Cap d. g. H.  
*fruticosa* Thbg., strauchige, ⚔. t. k. Cap der gut. H.  
*integrifolia* L. (*aurea* Bot. Repos.), ganzblättrige, ⚔.  
 k. t. Cap der guten Hoffnung.

*scabra* Thbg., scharfe, ⚔. k. t. Cap der gut. Hoffn.

**Hedeoma** P., Zwergmünze, II. 1. (XIV. 1.), Labiatae.

*hispida* Pursh, steifhaarige, ☉. f. Nordamerika.

*pulegioides* P., poleiähnliche, ☉. f. Nordamerika.

*thymoides* P., thymianähnliche, ☉. f. Südfrankreich.

**Hedera** T., Epheu, V. 1., Araliaceae.

*Helix* L., gemeiner, ⚔. Sch. f. Europa, Mittelasien,  
 Japan.

b) *foliis argenteis*. c) *fol. aureis*. d) *hibernica*.

e) *arborescens* Lodd. (*poetica* C. Bauh.).

β) *canariensis* W. Teneriffa. γ) *digitata* Lodd.,  
 Ostindien. δ) *chrysocarpa* DC. (*Dionysias* J.  
 Bauh.). Nordindien.

*pendula* Sw., hängender, ⚔. w. Jamaica.

*aculeata* D. Don, *arborea* Sw. etc. vid. *Aralia acu-*  
*leata* etc. *quinquefolia* L. v. *Ampelopsis hederacea*.

**Hedwigia** Sw. (J. Hedwig, berühmter Kryptogamolog),  
 VIII. 1., Amyrideae.

*balsamifera* Sw., balsamgebende, ⚔. w. Westindien.

**Hedychium** Koen., Kranzblume, II. 1., Scitamineae-  
 Amomeae.

*acuminatum* Rosc., zugespitzte, 4. w. Ostindien.

*angustifolium* Roxb. (*coccineum* Wall.), schmalblättrige,  
 4. w. Ostindien.

*aurantiacum* Rosc. (*angustifolium* Bot. mag.), orange-  
 farbige, 4. w. Ostindien, Nepal.

*carneum* Carey, fleischfarbige, 4. w. Ostindien.

*coccineum* Sm. (*angustifolium* Bog. reg.), scharlachfarbige,  
 4. w. Ostindien, Nepal.

*coronarium* Koenig, gekrönte, 4. w. Ostindien.

*elatum* RB., hohe, 4. w. Nepal, Ostindien.

*ellipticum* Sm., elliptische, 4. w. Nepal.

*flavescens* Carey, gelbliche, 4. w. Ostindien.

*flavum* Roxb., Wall., hellgelbe, 4. w. Nepal, Ostindien.  
*Gardnerianum* Wall., Gardner's, 4. w. Nepal.

*glaucum* Rosc., blaugrüne, 4. w. Ostindien.

*gracile* Roxb., schlanke, 4. w. Ostindien.

*heteromallum* Ker, verschiedenwendige, 4. w. Ostindien.

*longifolium* Rosc., langblättrige, 4. w. Ostindien.

*maximum* Rosc., größte, 4. w. Ostindien.

*speciosum* Wall., prächtige, 4. w. Ostindien.

*spicatum* Sm., ährige, 4. w. Nepal.

*stenopetalum* Wall., schmalkronige, 4. w. Ostindien.

*thyrsiforme* Sm., straufsblumige, 4. w. Ostindien, Nepal.

*trilobum* Wall., dreilappige, 4. w. Nepal.

*urophyllum* Wall., schlankblättrige, 4. w. Ostindien.

*villosum* Wall., zottige, 4. w. Ostindien.

**Hedyotis** L., Ohrling, IV. 1., Rubiaceae.

*biflora* RB., zweiblumiger, ☉. w. m. Ostindien.

*mysorensis* Heyne, mysorischer, ☉. w. m. Ostindien.

*campanuliflora* Hook. v. *Lipostoma campanuliflora*.

*ciliolata* Torr. v. *Anotis ciliolata*. Hinsichtlich der  
 übrigen s. *Oldenlandia*.

**Hedypnois** T., Röhrléinkraut, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

arenaria DC., Sand-R., ☉. f. Mauritanien.

coronopifolia Tenor., krähenfußblätteriges, ☉. f. Südital.

cretica W., kretisches, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Persien.

β) tubaeformis Tenor. γ) persica Fisch.

pendula Balb., hängendes, ☉. f. Südeuropa.

β) pinnatifida.

rhagadioloides L. (*polymorpha* DC.), veränderliches, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

α) monspeliensis L. β) mauritanica W. γ) furfuracea Rchb. δ) crepidiformis Rchb. ε) caspica Hornem. ζ) sonchea H. Dresd. η) laciniiflora Viv.

*autumnalis* Huds. v. *Leontodon autumn.* *hirta* Sm. vid. *Thrinicia hirta*. *Taraxaci* Vill. vid. *Apargia Taraxaci*.

**Hedysarum** T., Hahnenkopf, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

alpinum L., Alpen-H., 4. f. Sibirien.

altaicum Fisch., altaischer, 4. f. Altai.

argenteum L., suppl., silberfarbiger, 4. f. Caucasus.

boreale Nutt., nördlicher, 4. f. Nordamerika.

brachysemum DC. (*obscurum altaicum* Fisch.), kurz-fahniger, 4. f. Nordamerika.

candidum MB. (*argenteum* W.), blendendweißser, 4. f. Taurien.

β) humile Habl.

carnosum Dsf., fleischiger, 4. f. Numidien.

caucasicum MB., caucasischer, 4. f. Caucasus.

consanguineum DC., verwandter, 4. f. Sibirien.

coronarium L., gekrönter, ♂. f. Italien.

b) albiflorum.

cretaceum Fisch., kreidiger, 4. f. Sibirien.

elongatum Fisch., verlängerter, 4. f. Sibirien.

flexuosum L., biegsamer, ☉. f. Kleinasien, Cyprus.

fruticosum Pall., strauchiger, ♂. f. Sibirien.

grandiflorum Pall. (*sericeum* MB.), großblumiger, 4. f. Caucasus.

humile L., niedriger, 4. f. Südfrankreich.

ibericum MB., iberischer, 4. f. Caucasus, Georgien.

lasiocarpum Ledeb. (*Ledebourei* Spgl.), wollfrüchtiger, 4. f. Sibirien.

obscurum L. (*alpinum* Jacq.), dunkler, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

pallidum Dsf., bleicher, ♂. f. b. Nordafrika.

Razumovianum Fisch., Razumovski's, 4. f. Sibirien.

roseum Sims, rosafarbiger, 4. f. Caucasus.

rytidocarpum DC., netzhülsiger, 4. f. Sibirien.

setigerum Turcz., borstiger, 4. f. Dahurien.

sibiricum Poir., sibirischer, 4. f. Sibirien.

spinosissimum L., stacheliger, ☉. f. Italien, Spanien.

splendens Fisch., schimmernder, 4. f. Sibirien.

tauricum Pall., taurischer, 4. f. Taurien.

varium W., bunter, 4. f. Armenien.

venustum Fisch., lieblicher, 4. f. Sibirien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Adesmia*, *Alhagi*, *Alysicarpus*, *Desmodium*, *Dicerma*, *Eleiotis*,

**Hedysarum**

Flemingia, Galactia, Lespedezia, Lourea, Nicolsonia, Onobrychis, Ormocarpum, Ototropis, Pueraria, Stylosanthes, Taverniera, Uraria et Zornia.

**Heimia** Lk. et Otto (Dr. Heim, berühmter Arzt zu Berlin), XI. 1., Lythriariae.

salicifolia Lk. et Otto, weidenblättrige, ♀. k. Mexico.

**Heisteria** L. (L. Heister, Professor der Medicin und Botanik zu Helmstädt), X. 1., Sapotaceae-Olacineae.

coccinea L., scharlachfarbige, ♀. w. Westindien.

**Helenium** L., Helenie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

autumnale L., herbstliche, 4. f. Nordamerika.

β) pubescens Ait.

canaliculatum Lam., rinnenförmige, 4. f. Nordamerika.

mexicanum Humb., mexicanische, 4. f. Mexico.

puberulum DC., feinhaarige, ☉. f. Californien.

pumilum W., kleine, 4. f. Nordamerika.

quadridentatum LaBill., vierzählige, ☉. f. Louisiana.

quadripartitum Lk., viertheilige, ♂. k. ?

varium Schrad., unbeständige, ☉. f. Mexico.

**Heleochoa** Host. vid. Crypsis.

**Heleocharis** Lestib. (*Eleocharis* RB. et *Eleogonus* N. E. et *Scirpidium* N. E.), Teichriet, Sumpfbinsen, III. 1., Cyperaceae.

acicularis RB., nadelförmiges, ☉. f. Europa, Nordamer.

acuta RB., spitziges, 4. k. t. Neuholland.

geniculata RB., geknietes, 4. k. t. Westindien.

glaucescens R. et S., blaugrünes, 4. f. Nordamerika.

multicaulis (Sm.), vielhalmiges, 4. f. England, Norddeutschland, Dänemark.

obtusata R. et S., stumpfes, 4. f. Nordamerika.

ovata RB., eiförmiges, ☉. f. Deutschland, Nordamerika.

palustris RB., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.

tenuis R. et S., feines, 4. f. Nordamerika.

uniglumis Lk., einspelziges, 4. f. Europa.

vivipara Lk., lebendiggebärendes, 4. w. ? Cap d. g. H.

**Helianthemum** T., Sonnenröschen, XIII. 1., Cistineae.

acuminatum P., zugespitztes, ♀. f. k. Oberitalien.

aegyptiacum Mill., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

algarviense Dun., algarbisches, ♀. k. Portugal.

alyssoideus Vent., steinkrautähnliches, ♀. f. b. k. Westfrankreich, Spanien.

Andersonii Swt., Anderson's, ♀. f. Südeuropa.

angustifolium P., schmalblättriges, ♀. f. ?

apenninum P., apenninisches, ♀. f. Italien.

arabicum P. (*viscidulum* Stev., *Savi* Bertol.), arabisches, ♀. f. Arabien, Taurien, Italien, Spanien.

asperum Lagasc., Dun., rauhes, ♀. f. Spanien.

atriplicifolium W., meldenblättriges, ♀. k. Spanien.

aureum P., goldfarbiges, ♀. k. f. b. Spanien, Südfrankreich.

barbatum P., bärtiges, ♀. k. f. b. Südfrankreich, Portugal.

Barrelieri Ten., Barrelier's, ♀. k. f. b. Neapel, Sicilien.

brasiliense P., brasilianisches, 4. ♀. t. Brasilien.

cahiricum Delil., cahirisches, ♀. k. Aegypten.

calycinum W., gekelchtes, ♀. k. f. b. Südeuropa.



**Helianthemum**

- canadense Mchx., canadisches, 4.  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.  
 canariense W., canarisches,  $\frac{1}{2}$ . k. Canarische Inseln.  
 candidum Swt., reinweißes,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Spanien.  
 canescens Swt. (*roseum* Jacq.), grauliches,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.  
 canum Dun., weißgraues,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Mittel- und Südeuropa.  
 carolinianum Mchx., carolinisches, 4.  $\frac{1}{2}$ . f. Carolina.  
 cheiranthoides P., lackähnliches,  $\frac{1}{2}$ . k. Portugal.  
 ciliatum P., gefranztes,  $\frac{1}{2}$ . f. b. Nordafrika, Spanien, Italien.  
 cinereum P., aschgraues,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 confertum Dun., gedrängtes,  $\frac{1}{2}$ . k. Teneriffa.  
 confusum Swt., verwechseltes,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.  
 crassifolium P., dickblättriges,  $\frac{1}{2}$ . k. Nordafrika, Spanien.  
 croceum P., safranfarbiges,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Spanien, Nordafrika.  
 denticulatum Thib., P. (*salicifolium* Gouan), gezähneltes,  $\odot$ . f. Südfrankreich.  
 dichotomum Dun., zweizinkiges,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 diversifolium Swt., verschiedenblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.  
 ellipticum P., elliptisches,  $\frac{1}{2}$ . k. Atlas.  
 elongatum P., verlängertes,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 ericoides Dun., heideähnliches,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Neapel.  
 eriocaulon Dun., wollstengeliges,  $\odot$ . f. Spanien.  
 eriosepalum Swt., wollkelchiges,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.  
 foetidum P., stinkendes,  $\frac{1}{2}$ . f. ?  
 formosum Dun., schönes,  $\frac{1}{2}$ . k. Portugal.  
 Fumana Mill., feinblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. Mittel- und Südeuropa.  
 glaucum P., blaugrünes,  $\frac{1}{2}$ . f. b. Spanien, Italien.  
 globulariaefolium P., kugelblumenblättriges, 4,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Portugal.  
 glomeratum Lagas., knaulförmiges,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Neuspanien.  
 glutinosum P., klebriges,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 grandiflorum DC., großblumiges,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.  
 guttatum Mill., getüpfeltes,  $\odot$ . f. Mitteleuropa.  
 halimifolium W., meermeldenblättriges,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Portugal.  
 hirtum P., rauhkelchiges,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Südfrankreich.  
 hispidum Dun., steifhaariges,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Portugal.  
 hyssopifolium Ten., ysopblättriges,  $\frac{1}{2}$ . Italien.  
     b) cupreum Swt. c) multiplex Swt. d) crocatum Swt.  
 inconspicuum P., Thib., unansehnliches,  $\odot$ . f. Spanien.  
 intermedium P., Thib., mittleres,  $\odot$ . f. Spanien.  
 involucratum P., eingehülltes,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Portugal.  
 italicum P., italienisches,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Italien.  
 juniperinum Lagasc., wachholderähnliches,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 laeve P., kahles,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 laevipes P., glattstieliges,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Südeuropa.  
 Lagascae Dun., Lagasca's,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien.  
 lanceolatum Swt., lanzettblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. Hybride.  
 lasianthum P., wollblumiges,  $\frac{1}{2}$ . k. Portugal.  
 lavandulaefolium P., lavendelblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. b. Süd- und Westeuropa.

**Helianthemum**

*ledifolium* Mill., porstblättriges, ☉. f. Südfrankreich, Portugal.

*leptophyllum* Dun., schlankblättriges, ☿. f. b. Spanien.

*Libanotis* W., rosmarinblättriges, ☿. k. Spanien, Portugal, Nordafrika.

*lignosum* Swt., verholzendes, ☿. f. ?

*lineare* P., gleichbreitblättriges, ☿. k. Spanien, Südfrankreich.

*Lippii* P., Lippii's, ☿. k. Aegypten.

*lucidum* Hornem., glänzendes, ☿. f. ?

*lunulatum* DC., mondfleckiges, ☿. f. Oberitalienische und französische Alpen.

*macranthum* Swt., schönblumiges, ☿. f. (Hybride).

b) *multiplex*.

*majoranaefolium* DC., majoranblättriges, ☿. f. b. Südfrankreich.

*marifolium* P., gamanderblättriges, ☿. f. England, Südeuropa, Taurien, Caucasus.

*microphyllum* Swt., kleinblättriges, ☿. f. (?Hybride).

*Milleri* Swt., Miller's, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

*molle* P., weiches, ☿. k. Spanien.

*mucronatum* Dun., weichspitziges, ☿. k. Teneriffa.

*mutabile* P., veränderliches, ☿. f. b. k. Spanien.

b) *roseum* Swt.

*niloticum* P., Nil-S., ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *majus* DC. γ) *procumbens* DC.

*nudicaule* Lag., Dun., nacktstengeliges, ☿. f. b. Spanien.

*nummularium* Mill., pfennigkrautblättriges, ☿. f. b. Südfrankreich, Italien.

*obovatum* Dun., verkehrteiförmiges, ☿. k. Spanien.

*obtusifolium* Dun., stumpfblättriges, ☿. k. Cypern.

*ocymoides* P. (*sampsucifol.* Clus.), basilicumähnliches, ☿. k. Spanien, Portugal.

*oelandicum* Wahlenb., oelandisches, ☿. f. Oeland.

*organifolium* P., dostenblättriges, ☿. k. Spanien.

*ovatum* Dun., eiförmiges, ☿. f. b. Italien.

*paniculatum* Dun., rispiges, ☿. k. Spanien.

*papyraceum* Swt., papierähnliches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

*penicillatum* Dun., pinselförmiges, ☿. f. b. Spanien.

*pilosum* P., haariges, ☿. f. Südfrankreich.

*plantagineum* P., wegrittblättriges, 4. f. b. k. Creta, Corsica, Spanien, Nordafrika.

*polifolium* P., poleiblättriges, ☿. f. England, Frankreich, Spanien.

*polygalaefolium* Swt., polygalablättriges, ☿. t. Brasilien.

*procumbens* Dun., niederliegendes, ☿. f. b. k. Südeuropa.

*pulchellum* Swt. (*alpestre* Spgl.), hübsches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

*pulverulentum* DC., bestaubtes, ☿. f. Frankreich.

*punctatum* W., punktirtes, ☉. f. Westfrankreich.

*racemosum* P., traubiges, ☿. k. Spanien, Nordafrika, Teneriffa.

*ramuliflorum* Mchx., astblumiges, 4. f. Carolina.

*rhodanthum* Dun., rothblumiges, ☿. f. Spanien.

*roseum* DC., rosafarbiges, ☿. f. Spanien.

b) *multiplex*.

*rotundifolium* Dun., rundblättriges, ☿. k. Spanien.

**Helianthemum**

*rugosum* Dun., runzeliges, ☿. k. Westfrankreich, Portugal.

*salicifolium* P., weidenblättriges, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*sampsucifolium* Mill., diptamblättriges, ☿. f. Frankreich.

*sanguineum* Lagasc. (*retrofractum* P.), blutfarbiges, ☉. f. Spanien.

*scabrosum* P., schärfliges, ☿. k. Portugal.

*serpyllifolium* Mill., quendelblättriges, ☿. f. Mittel- und Südeuropa.

*serratum* P., sägekroniges, ☉. f. Spanien.

*squamatum* P., schuppiges, ☿. k. Spanien.

*stoechadifolium* P., stoechasblättriges, ☿. k. f. b. Spanien, Portugal.

*stramineum* Swt., strohfarbiges, ☿. f. (Hybride).

b) *multiplex*.

*strictum* P., steifes, ☿. k. Spanien.

*sulfureum* W., schwefelgelbes, ☿. k. Spanien.

*surrejanum* Mill., schmalblumiges, ☿. f. England.

*tauricum* Fisch., taurisches, ☿. f. Taurien.

*thymifolium* P., thymianblättriges, ☿. k. f. b. Spanien.

*tomentosum* Dun., filziges, ☿. f. Schottland.

*Tuberaria* Mill., stumpfes, 4. f. Südeuropa.

*umbellatum* Mill., doldiges, ☿. k. Süd- u. Westeuropa.

β) *erectum* DC. γ) *subdecumbens* DC.

*variegatum* Swt., buntes, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

*venustum* Swt., liebliches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

*versicolor* Swt., verschiedenfarbiges, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

b) *flore pleno*.

*villosum* P., zottiges, ☉. f. Spanien.

*vineale* P., Weinbergs-S., ☿. f. Mitteldeutschland.

*violaceum* P., violettes, ☿. k. Spanien.

*virgatum* P., ruthenförmiges, ☿. k. Nordafrika.

*viride* Tenor., grünliches, ☿. k. Sicilien.

*vulgare* G., gemeines, ☿. f. Europa.

b) *flore pleno*. c) *fl. pleno major*. d) *sanguineum* (?*puniceum* Hort.). e) *fol. varieg.*

**Helianthus L., Sonnenrose, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.**

*altissimus* L., höchste, 4. f. Nordamerika.

*angustifolius* L., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

*annuus* L., jährige, ☉. f. Peru, Mexico.

b) *flore pleno*. β) *indicus* L. (*nanus* Hort.), Aegypten.

*atrorubens* L. (*asper* Hortul., *missuricus* Spgl., *diffusus* Sims), schwarzrothscheibige, 4. f. Nordamerika.

*cornifolius* H. B. K., hartriegelblättrige, 4. f. Mexico.

*decapetalus* L., zehnblättrige, 4. t. Nordamerika.

*divaricatus* L., sparrige, 4. f. Nordamerika.

*doronicoides* Lam. (*pubescens* Vahl non W., *mollis* W. non Lam.), genschwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

*giganteus* L. (*altissimus* Jacq.), riesenhafte, 4. f. Nordamerika.

*Hookeri* G. Don (*pubescens* Hook.), Hooker's, 4. f. ?

*laetiflorus* P. (*atrorubens* Lam., ?*luxurians* Hort.), schönblühende, 4. f. Nordamerika.

*lenticularis* Dougl. (?*grandiflorus* H. Marb.), linsenförmige, ☉. f. Nordamerika.



**Helianthus**

- linearis Cav., gleichbreitblättrige, 4. f. b. Mexico.  
 longifolius Pursh, langblättrige, 4. f. Nordamerika  
 (Georgien).  
 macrocarpus DC. (*hybridus* et *longicarpus* Hort., ? *Colossus* Hort.), großfrüchtige, ☉. f. ?  
 macrophyllus W., großblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 Maximiliani Schrad., Maximilian's, 4. f. Nordamerika.  
 mollis Lam. (*pubescens* W., *tomentosus* Mchx.), weich-  
 blättrige, 4. f. Nordamerika.  
 multiflorus L., vielblumige, 4. f. Virginien.  
     b) flore pleno.  
 orgyalis DC., kletterhohe, ☉. f. ?  
 ovatus Lehm., eiförmige, ☉. f. Mexico.  
 parviflorus Bernh., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.  
 patens Lehm., absteigende, ☉. f. Südamerika.  
 pauciflorus Nutt., wenigblumige, 4. f. Louisiana.  
 petiolaris Nutt. (? *asper* Roth), gestielte, ☉. f. m. Nord-  
 amerika (Arkansa).  
 procumbens P. (*prostratus* Dsf.), niederliegende, 4. f.  
 b. Peru.  
 prostratus W., gestreckte, 4. f. Nordamerika.  
 strumosus L., kropfige, 4. f. Nordamerika.  
 trachelifolius W., halskrautblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 trilobatus Lk., dreilappige, 4. f. b. k. Mexico.  
 tuberosus L., knollige, 4. Kn. f. Brasilien.  
 villosus Nutt., zottige, 4. f. Nordamerika.

*dentatus* Cav. vid. *Viguiera dentata*, *excelsus* W.  
 (*giganteus* Cav., *trinervis* Hort.) v. *Tithonia excelsa*.  
*laevis* L. v. *Heliopsis laevis*. *rigidus* Dsf. vid. *Har-*  
*palium rigidum*. *speciosus* Hook. v. *Leighia spe-*  
*ciosa*. *tubaeformis* Ortega. Jacq. vid. *Tithonia tu-*  
*baeformis*.

**Helichrysum** Vaill., Strohlume, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- acuminatum Swt. (Lk.), zugespitzte, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 affine D. Don, ähnelnde, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.  
 angustifolium DC. (*italicum* G. Don), schmalblättrige,  
 ♀. f. b. k. Süd- und Westeuropa.  
 apiculatum D. Don, kurzspitzige, 4. t. Van-Diemens-L.  
 arboreum D. Don (L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. H.  
 arenarium DC., Sand-St., 4. f. Europa, Mittelasien.  
     β) aurantiacum (*ignescens* Hortul.).  
 argenteum W., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 bicolor Lindl., zweifarbige, ☉. f. m. Van-Diemens-Land.  
 bracteatum W. (Vent.), deckblättrige, ☉. f. m. Neu-  
 holland.

## b) album.

- candidissimum D. Don (M. B.), reinweißse, 4. f. Caucasus.  
 cephalotes D. Don, großköpfige, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 congestum D. Don, gedrängte, ♀. t. Cap der gut. H.  
 conicum Swt. (W.), kegelförmige, ♀. t. ? Südeuropa.  
 crassifolium D. Don (L.), dickblättrige, ♀. t. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 crispum D. Don (L.), krause, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.  
 cylindricum D. Don, cylinderförmige, 4. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 cymosum D. Don (L.), afterdoldige, 4. t. Cap d. g. H.

**Helichrysum**

- dasyanthum Swt. (W.), haarblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- dealbatum Swt., weifliche, 4. t. Van-Diemens-Land.
- diosmaefolium Swt. (Vent.), göttergeruchblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- discolorum D. Don (L.), verschiedenfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- divaricatum D. Don (L.), sparrige, ♀. t. Cap d. g. H.
- ericaefolium DC. (L.), heideblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ericoides P. (Lam.), heideähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
- flaccidum G. Don (Weinm.), schlaffe, 4. t. Brasilien.
- foetidum Cass., stinkende, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.
- fruticans D. Don (L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. H.
- fulgidum W., glänzende, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.
- grandiflorum D. Don (L.), großblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- graveolens Swt. (MB.), starkkriechende, 4. t. Taurien, Caucasus.
- helianthemifolium D. Don (L.), sonnenröschenblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- herbaceum Swt. (*splendens* B. Mag.), krautartige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- ignescens D. Don, feuerfarbige, 4. k. Cap d. g. H.
- lasiocaulon Swt. (Lk.), wollstengelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- maritimum D. Don (L.), Meerstrands-St., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- microphyllum D. Don, kleinblättrige, ♀. k. Creta.
- milleflorum (Thbg.), vielblumige, ♀. t. Cap d. g. H.
- odoratissimum Swt. (L.), wohlriechende, 4. t. Cap der guten Hoffnung.
- orientale T. (L.), morgenländische, ♀. k. Creta.
- paniculatum Swt., rispige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- patulum D. Don (L.), ausgebreitete, ♀. t. Cap d. g. H.
- rigidum D. Don, starre, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- rutilans D. Don (L.), goldgelbe, 4. ♀. k. Cap d. g. H.
- scorpioides La Bill. (*macranthum* Benth.), vergiftsmeinnichtblättrige, ♂. m. Neuholland (Schwanenfluß).
- spirale W., spiralförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- Stäbelina W., stäbelinaähnliche, ♀. t. Cap d. gut. H.
- Stoechas DC., dickblättrige, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.
- tephrodes Swt. (Lk.), grauliche, ♀. t. Cap d. gut. H.
- teretifolium D. Don (L.), rundblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- vestitum W., bekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- β) lingulatum D. Don.
- canescens* W. etc. vid. *Helipterum canescens* etc.
- proliferum* W. v. *Phoenocoma prolifera*.

**Heliconia** L., Heliconie, V. 1., Scitamineae.

- Ballia Rich., Ballia-H., 4. w. Südamerika.
- bicolor Maund., zweifarbige, 4. w. Brasilien.
- Bihai Sw. (*luteo fusca* Jacq.), Bihai-H., 4. w. Westindien, Südamerika.
- brasiliensis Hook., brasilianische, 4. w. Brasilien.
- caribaea Lam., caribäische, 4. w. Caribäen.
- dealbata Lodd., weifliche, 4. w. Südamerika.

**Heliconia**

- hirsuta* L., suppl., rauhhhaarige, 4. w. Südamerika.  
*humilis* Jacq., niedrige, 4. w. Guiana, Caracas.  
*indica* Lam. (*buccinata* Roxb.), ostindische, 4. w. Molucken.  
*Psittacorum* L., Papageien-H., 4. w. Südamerika.  
*pulverulenta* Lindl., bestäubte, 4. w. Südamerika.  
*Swartziana* R. et S. (*psittacorum*  $\beta$ . Bot. mag.), Swartz's, 4. w. Jamaica.

**Helicta** Cass., Helicte, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- sarmentosa* Cass., wurzelrankige,  $\frac{1}{2}$ . w. ?

**Helicteres** L., Schraubenbaum, XVI. VII., Malvaceae-Bombaceae.

- baruensis* L., westindischer,  $\frac{1}{2}$ . w. Westindien.  
*carthagenensis* Jacq., carthagenischer,  $\frac{1}{2}$ . w. Neugranada.  
*elongata* H. C., verlängerter,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.  
*ferruginea* Lk., rostfarbiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.  
*guazumaefolia* H. B. K., guazumablätteriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.  
*jamaicensis* L., Jamaica-S.,  $\frac{1}{2}$ . w. Jamaica.  
*Isora* L., haselnufsblätteriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien, Molucken.  
*lanceolata* DC., lanzettlicher,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.  
*spicata* Coleb., ährenförmiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Ostindien.  
*verbascofolia* L'Her., Link, wollkrautblätteriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.

*apetala* Jacq. v. *Sterculia Helicteres*.

**Helio carpus** L., Sonnenfrucht, XI. I., Tiliaceae.

- americanus* L., amerikanischer,  $\frac{1}{2}$ . w. Neuspanien.

**Heliophila** L., Sonnenfreund, XV. III., Cruciferae.

- abrotanifolia* DC., stabwurzblätteriger,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.  
*amplexicaulis* L., stengelumfassender,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*arabioides* Sims (*pilosa*  $\beta$ . *incisa* DC.), arabisähnlicher,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*cleomoides* DC., cleomenähnlicher,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. g. H.  
*coronopifolia* L., krähennufsblätteriger,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*crithmifolia* W., meerfenchelblätteriger,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*diffusa* DC., weitschweifiger,  $\odot$ . f. Cap der gut. Hoffn.  
*digitata* L., fingerförmiger,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffn.  
*dissecta* Thbg., schlitzeblätteriger,  $\odot$ . f. Cap d. g. H.  
 $\beta$ ) *pinnata*.  
*filiformis* L., fadenförmiger,  $\odot$ . f. Cap der gut. Hoffn.  
*foeniculacea* RB., fenchelartiger,  $\odot$ . f. Cap d. gut. H.  
*incana* Ait., weißgrauer,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffn.  
*lepidioides* Lk., kressenähnlicher,  $\odot$ . f. Cap d. gut. H.  
*linearifolia* Burch., gleichbreitblätteriger,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der guten Hoffnung.  
*pectinata* Burch., kammförmiger,  $\odot$ . f. Cap d. gut. H.  
*Peltaria* DC., schildkrautähnlicher,  $\odot$ . f. Cap d. gut. H.  
*pendula* W., hängender,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffn.  
*pilosa* Lam. (*integrifolia* L.), haariger,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*platysiliqua* RB., breitschotiger,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap d. gut. H.  
*pusilla* L., zwergiger,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.  
*scoparia* Burch., besenförmiger,  $\frac{1}{2}$ . t. Cap der gut. H.



## Heliophila

*stricta* Sims, steifer, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.  
*suavissima* Burch., starkkriechender, ☿. t. Cap d. g. H.  
*trifida* Thbg. (*pinnata* L. fil.), dreitheiliger, ☉. f. Cap  
 der guten Hoffnung.

## Heliopsis P., Sonnengesicht, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*buphthalmoides* Dun., buphthalmumähnliches, 4. k. Peru.

*canescens* H. B. K. (*rugosa* H. Berol.), graues, 4. k. Peru.

*dubia* Dun., zweifelhaftes, ☉. f. Südamerika, Westindien.

*laevis* P., glattes, 4. f. Nordamerika.

*scabra* Dun. (*canescens* Don), scharfes, 4. f. Nordamer.

## Heliotropium T., Sonnenwende, V. I., Asperifoliaceae.

*anisophyllum* Beauv., ungleichblättrige, ☉. w. m. Guinea.

*brevifolium* Wall., kurzblättrige, ☿. w. Nepal.

*capense* Sw., Lehm., capische, ☉. m. f. Cap d. g. H.  
*chenopodioides* W., gänsefußähnliche, ☉. w. m. Südamerika.

*commutatum* R. et S., verwechselte, ☉. f. Südeuropa.

*coromandelianum* Retz, coromandelische, ♂. w. Ostind.

*corymbosum* R. et P. (*grandiflorum* Schrk.), traubendol-  
 dige, ☿. t. Peru.

*curassavicum* L., curassavische, ♂. w. Westindien.

*ellipticum* Ledeb., elliptische, ☉. f. Caspisches Meer.

*europaeum* L., europäische, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

*humile* Lam., niedrige, ☿. w. Südamerika.

*lasiocarpum* Fisch. et Mey., wollfrüchtige, ☉. f. Cas-  
 pisches Meer.

*linifolium* Lehm., leinblättrige, ☿. t. Cap der guten  
 Hoffnung, Ostindien.

*maroccanum* Lehm., maroccanische, ☿. t. Marocco.

*oblongifolium* Lk., länglichblättrige, ☉. f. Südeuropa.

*obovatum* Roxb., verkehrteiförmige, ☉. f. m. Nepal.

*parviflorum* L., kleinblumige, ♂. w. Ostindien.

*peruvianum* L., peruvianische, ☿. t. Peru.

### b) hybridum.

*prostratum* RB., gestreckte, ☉. m. f. Neuholland.

*suaveolens* MB., starkkriechende, ☉. f. Caucasus,  
 Nordpersien.

*supinum* L., liegende, ☉. f. Südeuropa, Cap d. g. H.

*undulatum* Vahl (*crispum* Dsf.), wellenblättrige, ☿. f.  
 Nordafrika.

*zeylanicum* Lam. (*fruticosum* Forsk.), zeylonische, ☿. w.  
 Ceylon.

*gnaphalodes* L. v. *Tournefortia gnaphalodes*. *indi-*  
*cum* L. v. *Tiaridium indicum*.

*Helleborine longipetala* Tenor. v. *Serapias longip.*

## Helipterum DC., Sonnenflügel, Immortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*canescens* DC., graulicher, ☿. t. Cap der guten Hoffn.  
 β) tricolor.

*Dregeanum* DC., Drege's, ☿. t. Cap der guten Hoffn.

*eximium* DC., vortrefflicher, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

*fasciculatum* DC., büschelförmiger, ☿. t. Cap d. g. H.

a) album. b) rubrum. c) versicolor.

*ferrugineum* DC., rostfarbiger, ☿. t. Cap der gut. H.

**Helipterum**

filiforme DC., fadenförmiger, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
 floribundum DC., blüthenreicher, ☉. m. f. Neuholland.  
 fragrans (Andr.), wohlriechender, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 gnaphalodes DC., ruhrkrautähnlicher, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

humile DC. (*Helichrys spectabile* Lodd.), niedriger, ♀. t.  
 Cap der guten Hoffnung.

imbricatum (W.), dachförmiger, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 incanum DC. (Hook.), weißgrauer, 4. ♀. Van-Die-  
 mens -Land.

β) tricolor.

phlomoides DC., wollkrautähnlicher, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung,

retortum W., rückwärtsgedrehter, ♀. t. Cap d. g. H.  
 sesamoides DC., sesamähnlicher, ♀. t. Cap d. gut. H.

β) pseudofasciculatum.

speciosissimum DC., prächtiger, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 variegatum DC., bunter, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Helleborus** T., Nieswurz, XIII. VI., Ranunculaceae.

atrorubens W. Kit., schwarzröthliche, 4. f. Croatien.

Bocconi Ten. (*dumetorum* Kit., *multifidus* Visian., *an-*  
*gustifolius* Host.), Boccone's, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

corsicus Viv., corsische, 4. k. Corsica.

cupreus Host., kupferfarbige, 4. f. Slavonien.

foetidus L., stinkende, 4. f. Mitteleuropa.

graveolens Host., starkriechende, 4. f. Ungarn.

laxus Host. (? *vernalis* D. Don), lockere, 4. f.  
 Slavonien.

lividus Ait. (*triphyllus* Lam., *argutifolius* Viv.), blei-  
 farbene, 4. k. Corsica.

β) integrilobus.

niger L., schwarze, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

a) humilifolius Hayn. β) altifolius Hayn.

odorus Kit., riechende, 4. f. Ungarn, Salzburg.

orientalis Lam. (*officinalis* Salish.), morgenländische, 4.  
 f. b. k. Griechenland, Kleinasien.

purpurascens Kit., purpurfarbige, 4. f. Südungarn,  
 Siebenbürgen, Galizien.

viridis L., grünliche, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa,  
*hyemalis* L. v. *Eranthis hyemalis*. *trifolius* L. v.  
*Coptis trifolia*.

**Hellenia** W. (C. N. Hellenius, Professor zu Abo), I. I.,  
 Scitamineae-Amomeae.

abnormis Lindl., abweichende, 4. w. China.

chinensis W., chinesische, 4. w. China.

coerulea RB., blaue, 4. w. Neuholland.

*Allughas* W. v. *Alpinia Allugh. grandiflora* Retz v.  
*Costus speciosus*.

**Helminthia** G. Juss., Wurmsalat, XIX. I., Compositae-  
 Cichoriaceae.

echioides G., natterkopffähnlicher, ☉. f. Mittel- und  
 Südeuropa, Taurien.

humifusa Trev., gestreckter, ☉. f. ?

spinosa DC. (*echioides* MB.), stacheliger, ☉. f. Süd-  
 europa, Taurien.

**Helonias** L., Schwindblume, VI. I., Coronariae-Colchi-  
 caceae (*Melanthaceae*).

angustifolia Mchx., schmalblättrige, 4. f. b. Carolina.

**Helonias**

*erythrosperma* Mchx. (*laeta* Sims), rothsamige, 4. f. b. Nordamerika.

*latifolia* Mchx. (*bullata* L.), breitblättrige, 4. f. Nordamerika.

*bracteata* Sims, *glaberrima* Sims v. *Zigadenus bracteatus* et *glaberrimus*. *lutea* Sims v. *Chamaelirium carolinianum*. *tenax* Pursh etc. vid. *Xerophyllum tenax*. *virginica* Sims v. *Leimanthium virginicum*.

*Helopus* Trin. v. *Oedipachne*.

**Helosciadium** Koch, Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

*Anmi* (L.), ammiähnliche, ☉. f. Südeuropa.

*bulbosum* (Thore), knollige, 4. Kn. f. Frankreich.

*crassipes* Spgl., dickstielige, 4. f. Corsica.

*inundatum* Koch, gemeine, 4. Wa. f. Nordeuropa.

*nodiflorum* Koch, knotenblumige, 4. Wa. f. Mittel- und Südeuropa.

*repens* Koch, kriechende, 4. f. Süddeutschland, England, Dänemark.

**Hemerocallis** L., Taglilie, VI. I., Coronariae-Hemerocallideae.

*disticha* D. Don, zweizeilige, 4. f. b. Nepal.

*flava* L., hellgelbe, 4. f. Südeuropa.

*fulva* L., rothbraune, 4. f. Südeuropa.

b) *variegata*. c) *plena*.

*graminea* Ait., grasartige, 4. f. Sibirien.

*alba* Andr. et *coerulea* Andr. etc. v. *Funkia subcordata*, *ovata* etc. *Lilium* L. vid. *Czackia Lilium*. *litoralis*  $\delta$ . *acutifolia* Bot. mag. v. *Pancratium acutifolium*.

**Hemiandra** RB., Halbbeutel, XIV. I., Labiatae.

*pungens* RB., stechender,  $\frac{1}{2}$ . t. Südliches Neuholland.

*rupestris* Benth., Felsen-H.,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholland (Schwanenflufs).

**Hemianthus** Nutt., Halbmaske, II. I., Personatae-Antirrhineae.

*micranthemoides* Nutt., kleinblumige, 4. Wa. k. t. Nordamerika, Jamaica.

**Hemiclidia** RB., Hemiclidie, IV. I., Proteaceae.

*Baxteri* RB., Baxter's,  $\frac{1}{2}$ . t. Neuholland.

**Hemidesmus** RB., Halbfaden, V. II., Asclepiadeae.

*indicus* RB., indischer,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Ceylon.

**Hemimeris** L., Halbblume, II. I. (XIV. II.), Personatae-Antirrhineae.

*montana* Thbg., Berg-H., 4. t. Cap der guten Hoffn. Hinsichtlich der übrigen s. Alonsoa.

**Hemionitis** L., Netzfarn, XXIV. I., Pteroideae.

*palmata* L., handförmiger, 4. w. Westindien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Antrophyum*, *Diplazium*, *Gymnogramma* et *Meniscium*.

**Hemisteptia** Bunge, Halbkrönchen, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

*lyrata* Bunge, leierförmiges,  $\frac{1}{2}$ . f. b. Nordchina.

**Hemitelia** RB., Hemitelie, XXIV. I., Pteroideae.

*capensis* RB., capische, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Cap der gut. Hoffn.

*multiflora* RB., vielblumige, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Jamaica.

*speciosa* Kaulf., prächtige,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.



**Henckelia** Spgl. (Graf Henckel von Donnersmark, deutscher Botaniker), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

Rexii\* Rex's, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.

**Hepatica** Dill., Leberkraut, XIII. VI., Ranunculaceae.

acutiloba DC., spitzlappiges, 4. f. Nordamerika.

americana Ker, amerikanisches, 4. f. Nordamerika.

b) alba J. Cree. c) rubra J. Cree.

angulosa (Lam.), (?pedata Rafin.), kantiges, 4. f. Nordamerika.

triloba Chaix (*nobilis* Volckam., Schreb.), gemeines, 4. f. Europa.

b) coeruleo plena. c) rubra. d) rubro plena.

e) alba. f) nivea.

**Heracantha lanata** Lk. etc. v. *Kentrophyllum lanatum* etc.

**Heracleum** L., Heilkraut (Bärenklau), V. II., Umbelliferae.

alpinum L., Alpen-H., 4. f. Südeuropäische Alpen.

angustifolium L. (*flavescens* Bess.), schmalblättriges, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

asperum MB. (*cordatum* Presl, *montanum* Schlchr., Gaud.), rauhes, ♂. f. Caucasus, Baiern, Tyrol, Schweiz, Sicilien.

aureum Sm., goldfarbiges, ♂. f. Griechenland.

austriacum L., österreichisches, 4. f. Oesterreich, Steyermark, Krain etc.

β) siifolium Rchb.

decipiens Fisch., täuschendes, ♂. f. Sibirien.

dissectum Ledeb., theilblättriges, 4. f. Altai.

flavescens W., gelbliches, 4. f. Oesterreich.

giganteum Fisch., riesenhaftes, ♂. f. Sibirien.

laciniatum Fisch., schlitzblättriges, ♂. f. Sibirien.

lanatum Mchx., wolliges, 4. f. Nordamerika.

ligusticifolium MB., liebstockelblättriges, ♂. f. Taurien.

marginatum Fisch., gerandetes, ♂. f. Sibirien.

nepalense D. Don, nepal'sches, ♂. 4. f. Nepal.

palmatum Baumg., handförmiges, ♂. f. Siebenbürgen, Salzburg.

Panaces L. (?setosum Lapeyr.), großes, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

pubescens MB. (*caucasicum* Stev.), weichhaariges, ♂. 4. f. Taurien, Caucasus.

pyrenaicum Cuss. (*amplifolium* Lapeyr., *gummiferum* W., *speciosum* Hoffm.), pyrenäisches, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa.

sibiricum L., sibirisches, 4. f. Taurien, Sibirien.

Sphondylium L., gemeines, 4. f. Europa.

β) longifolium Jacq. γ) elegans Jacq.

tauricum Fisch., taurisches, ♂. f. Taurien.

tomentosum Sm., filziges, ♂. f. Griechenland.

trachyloma Fisch. et Mey., rauhlappiges, ♂. f. Nordpersien.

verrucosum Stev., warziges, ♂. f. Taurien.

villosum Fisch., zottiges, ♂. f. Sibirien.

Ungewifs: caspicum Hort., persicum H. Par., subvillosum W.

absinthifolium Vent. v. *Zosimia absinthifolia*. *pumilum* Vill. v. *Peucedanum Vocontiorum*.

**Herbertia** Swt. (W. Herbert, englischer Botaniker), III. I. (XVI. I.), Irideae.

**Herbertia**

*pulchella* Swt., schöne, 4. Zw. k. Chili.

**Heritiera** Ait. (C. L. L'Heritier de Brutelle, franz. Botaniker), XVI. VI. (XXI. I.), Malvaceae-Herculiaceae.  
*litoralis* Ait., Strand-H., f. w. Ostindien.  
*minor* Lam., kleine, f. w. Ostindien.

**Hermannia** L. (Paul Hermann, Professor der Botanik zu Leyden), XVI. III. (II.), Malvaceae-Hermanniaceae.

*alnifolia* L., erlenblättrige, f. k. t. Cap der gut. H.

*althaeifolia* L. (*aurea* Jacq.), eibischblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*althaeoides* Lk. (*ferruginea* Hort.), eibischähnliche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*angularis* Jacq., kantige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*bipinnata* Burch., doppeltgefiederte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*bryonifolia* Burch., zaunrübenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*candicans* Ait., weisliche, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*coronopifolia* Lk., krähensfußblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*cuneifolia* Jacq., keilblättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*decumbens* W., niederliegende, f. k. t. Cap d. g. H.

*denudata* L., nackte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*disermaefolia* Jacq., wellenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*disticha* Schrad. (*rotundifolia* Jacq.), zweizeilige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*filifolia* L., suppl., fadenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*flammea* Jacq., flammenblumige, f. k. t. Cap d. g. H.

*fragrans* Wendl., Lk., wohlriechende, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*glandulosa* Lk., drüsige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*hirsuta* Schrad., rauhhaarige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*hispidula* Rehb., steifhaarige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*holosericea* Jacq., sammethaarige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*hyssopifolia* L., ysophlättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*inflata* Otto, aufgeblasene, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*involutrata* Cav., eingehüllte, f. k. t. Cap d. gut. H.

*lavandulifolia* L., lavendelblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*melochioides* Burch., melochiaähnliche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*micans* Schrad. (*latifolia* Jacq.), schimmernde, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*mollis* W., weiche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*multiflora* Jacq., vielblumige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*odorata* Ait., riechende, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*plicata* Ait. (*althaeifolia* Jacq.), faltenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*procumbens* Cav., liegende, f. k. t. Cap der gut. H.

*pulverata* Andr. (*argentea* Sm.), bestäubte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*salvifolia* L., salbeiblättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

*scabra* Cav. (*aspera* Wendl., *hirta* Sparrm.), scharfe, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*scordifolia* Jacq., gamanderblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Hermannia**

*tenuifolia* Sims, feinblättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. H.  
*trifoliata* L., dreiblättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*trifurcata* L., dreigabelige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*triphylla* Cav., dreizählige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*velutina* Burch., sammetartige, ⚥. k. t. Cap d. g. H.  
*glabrata* L. suppl., *grossulariaefolia* L. etc. v. Ma-  
*hernia glabrata*, *heterophylla* etc.

**Hermas** L., Stieldolde, V. II. (XXIII. 1.), Umbelliferae.  
*capitata* Thbg., kopfförmige, ⚥. t. k. Cap d. gut. H.  
*ciliata* Thbg., gefranzte, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.  
*gigantea* Thbg., riesenhafte, ⚥. t. k. Cap d. gut. H.  
*villosa* Thbg. (*depauperata* L.), zottige, ⚥. t. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

**Herminium** RB., Zwerg-Orche, XX. 1., Orchideae.  
*Monorchis* RB., einhodige, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.  
*cordatum* Lindl., herzblättrige, 4. Kn. k. t. Madeira,  
 Portugal.

**Hermione** Salisb. v. *Narcissus*.

**Hernandia** L. (F. Hernandez, spanischer Naturforscher),  
 XXI. III., Laurineae.

*guianensis* Aubl., guianische, ⚥. w. Guiana.  
*ovigera* L., eiertragende, ⚥. w. Ostindien, Mascarenas.  
*sonora* L., tönende, ⚥. w. Ost- und Westindien.

**Herniaria** T., Bruchkraut, V. II., Portulacaceae-Paro-  
 nychieae.

*alpina* Vill. (*alpestris* Lam.), Alpen-B., 4. f. Süd- und  
 Ostfrankreich.

*annua* Lag., jähriges, ☉. f. Spanien.

*cinerea* DC., aschfarbiges, ☉. f. Südfrankreich.

*fruticosa* L., strauchiges, ⚥. k. Südfrankreich, Aegypten.

*glabra* L., glattes, 4. f. Europa, Sibirien.

*hirsuta* L., haariges, 4. f. Europa.

*incana* Lam. (*millegrana* Bess., *Besseri* Hornem., *hirsuta*  
 MB.), weißgraues, 4. f. Südfrankreich, Volhynien,  
 Taurien.

*polygonoides* Cav. (*erecta* Dsf.), knöterichähnliches, ⚥. k.  
 Südfrankreich, Spanien, Nordafrika.

**Herpestes** G., Wassermaske, XIV. II., Personatae-  
 Antirrhineae.

*amplexicaulis* Pursh, stengelumfassende, 4. Wa. k. t.  
 Carolina.

*cuneifolia* Pursh, keilblättrige, 4. Wa. k. t. Carolina.

*Monniera* H. B. K., Monnier's, 4. Wa. w. Südamerika.

*portulacea* Sims, portulakähnliche, 4. Wa. w. Südamer.

*rotundifolia* Pursh, rundblättrige, 4. Wa. k. Nordamer.

*stricta* Schrad., steife, 4. w. ?

*micrantha* Pursh v. *Hemianthus micranthemoides*.

**Herreria** R. et P. (C. A. de Herrera, spanischer Agri-  
 culturist), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*parviflora* Bot. reg., kleinblumige, 4. Sch. w. Brasilien.

*stellata* R. et P., sternförmige, 4. Sch. w. Chili.

**Hesperantha** Ker, Abendschwertel, III. I., Irideae.

*angusta* Ker, schmaler, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*cinnamomea* Ker, Zimmt-A., 4. Zw. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

*falcata* Ker, sichelförmiger, 4. Zw. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.



**Hesperantha**

*graminifolia* Swt., grasblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*pilosa* Ker, haariger, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*radiata* Ker, strahliger, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

**Hesperis** T., Nachtviole, XV. III., Cruciferae.

*aprica* Poir., sonneliebende, 4. f. k. Sibirien.

*bicuspidata* Poir., DC., zweispitzige, ♂. f. k. Armenien.

*bituminosa* Savi, harzige, ♂. f. ?

*elata* Hornem. (*excelsa* Hort.), hohe, ☉. ♂. f. ?

*fragrans* Fisch., wohlriechende, ♂. f. Sibirien.

*grandiflora* Bot. mag., großblumige, 4. f. ?

*laciniata* All. (*hieracifolia* Vill., *suaveolens* Bess., *villosa* DC.), schlitzblättrige, ♂. f. Frankreich, Italien, Ukraine.

*matronalis* L., gemeine, ♂. f. Europa, Sibirien.

b) fl. albo. c) fl. albo pleno. d) fl. purpureo pleno. e) fl. pleno variegato. f) foliiflora.

β) *inodora* L. γ) *sibirica* L.

*nivea* Baumg., schneeweiße, ♂. f. Siebenbürgen.

*pulchella* DC., schöne, ☉. f. ? Syrien.

*ramosissima* Dsf., ästige, ☉. f. Nordafrika, Kleinasien.

*repanda* Lag., ausgeschweifte, ♂. f. Spanien.

*runcinata* W., Kit., schrotsägenförmige, ♂. f. Ungarn.

*tristis* L., traurige, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

*africana* L. etc. v. *Malcolmia africana* etc. *arabidi-*

*flora* DC. v. *Neuroloma arabidiflor.* *glandulosa* P.

etc. vid. *Andreoskia integrifolia* etc. *speciosa* Swt.

v. *Parrya integerrima.* *verna* L. v. *Arabis verna.*

**Hesperoscordum** Lindl., Abendaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*hyacinthinum* Lindl., hyacinthähnliche, 4. Zw. f. k. Nordamerika.

*lacteam* Lindl., milchweisse, 4. Zw. f. k. Californien.

**Heteracia** Fisch. et Mey., Wechselpippau, XIX. I., Cichoriaceae.

*Szovitsii* Fisch. et Mey., Szovits's, ☉. f. Nordpersien.

**Heteranthera** P. Beauv., Ungleichbeutel, III. I., Commelinaceae.

*acuta* W., spitzer, 4. Wa. k. Virginien.

*limosa* Vahl, schlammliebender, 4. Wa. k. Nord- und Südamerika, Westindien.

*reniformis* R. et P., nierenförmiger, 4. Wa. w. Südamerika.

**Heterocoma** DC., Wechselschopf, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

*albida* DC., weißlicher, ♀. w. Brasilien.

*bifrons* DC., zweiflügeliger, ♀. w. Brasilien.

**Heterolepis** Cass., Wechselschuppe, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

*decipiens* Cass., trügerische, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

**Heteropogon** P., Wechselbart, III. II. (XXI. III.), Gramineae.

*Allionii* P. Beauv. (*glaber* P.), Allione's, 4. k. Süd-europa, Nordafrika, Mexico.

*contortus* P. Beauv. (*hirtus* P.), gedrehtes, 4. w. Indien, Neuholland.

**Heteropteris** H. B. K., Flügelkapsel, X. III., Malpighiaceae.

**Heteropteris**

appendiculata DC., anhängselige, f. w. Südamerika.  
 brachiata H. B. K., armförmige, f. Sch. w. Westindien.  
 coerulea H. B. K., blaue, f. Sch. w. Westindien.  
 chrysophylla H. B. K., goldblättrige, f. Sch. w. Südamerika.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, f. w. Südamerika.  
 nitida H. B. K., glänzende, f. w. Südamerika.

β) rufa Lindl.

parvifolia DC., kleinblättrige, f. Sch. w. Westindien.  
 purpurea H. B. K., purpurfarbige, f. Sch. Westindien.

**Heterospermum** Cav., Wechselsame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

pinnatum Cav., fiederblättriger, ☉. f. Mexico.

**Heterostemon** Dsf., Ungleichfädler, XVII. II., Leguminosae-Caesalpinieae.

mimosoides Dsf., mimosenähnlicher, f. w. Brasilien.

**Heterotaxis** Lindl., Reihenstendel, XX. I., Orchideae.

crassifolia Lindl., dickblättriger, 4. w. Jamaica.

**Heterotheca inuloides** Cass. v. *Diplocoma villosa*.**Heterotropa** Morr., Wechselkraut, ?XI. I., Aristolochiae (*Asarineae*).

asaroides Morr., haselwurzähnliches, 4. k. t. Japan.

**Heterotrichum salsum** MB. v. *Saussurea salsa*.**Heuchera** L. (J. H. Heucher, Professor der Medicin zu Wittenberg), V. II., Saxifrageae.

americana L. (*viscida* Pursh, *Cortusa* Mchx.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

caulescens Pursh, stengelige, 4. f. Carolina.

cylindracea Lindl., cylinderförmige, 4. f. Nordamerika.

glabra Pall., glatte, 4. f. Nordamerika.

hispida Pursh, steifhaarige, 4. f. Virginien.

macrophylla Lodd., großblättrige, 4. f. Nordamerika.

micrantha Dougl., kleinblumige, 4. f. Columbia.

pilosissima Fisch. et Mey., vielhaarige, 4. f. Neu-Californien.

pubescens Pursh, feinhaarige, 4. f. Nordamerika.

Richardsonii RB., Richardson's, 4. f. Nordamerika.

villosa Mchx., zottige, 4. f. Carolina.

**Hevea guianensis** Aubl. v. *Siphonia elastica*.**Hexopea** Batem., Zellenstendel, XX. I., Orchideae.

crurigera Batem., schenkelförmiger, 4. w. Südamerika.

**Heylandia** DC. (M. Heyland, Freund des Herrn de Candolle), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

hebecarpa DC., rauhhülsige, 4. w. Ceylon.

leiocarpa DC., glatthülsige, 4. w. Ostindien.

**Heynea** Roxb. (Benj. Heyne, ein Deutscher, welcher in Ostindien Pflanzen sammelte), X. I., Hesperideae-Meliaceae.

quinquejuga Spgl., fünfjochige, f. w. Java.

trijuga Roxb., dreijochige, f. w. Nepal.

**Hibbertia** Salisb., Andr. (Georg Hibbert, englischer Pflanzensammler), XIII. III., Dilleniaceae.

cistifolia RB., cistusblättrige, f. t. Neuholland.

Cunninghamii Hook., Cunningham's, f. Sch. t. Neuholland.

dentata RB., gezahnte, f. Sch. t. Neuholland.

**Hibbertia**

- diffusa RB., weitschweifige, ♀. t. Neuholland.  
 flexuosa Cunn., biegsame, ♀. t. Neuholland.  
 grossulariaefolia Salisb. (*crenata* Andr.), stachelbeer-  
 blätterige, ♀. t. Neuholland.  
 hermanniaefolia DC., hermannienblätterige, ♀. t. Neu-  
 holland.  
 linearis RB., gleichbreitblätterige, ♀. t. Neuholland.  
 obtusifolia DC., stumpfblätterige, ♀. t. Van-Diemens-  
 Land.  
 pedunculata RB. (*corifolia* Sims), gestielte, ♀. t.  
 Neuholland.  
 saligna RB., weidenähnliche, ♀. t. Neuholland.  
 virgata RB., ruthenförmige, ♀. t. Neuholland.  
 volubilis Andr., windende, ♀. Sch. t. k. Neusüdwallis.

**Hibiscus** L. (et Abelsonschus Med., Ketmia T., Trio-  
 num Medic. etc.), Eibisch, XVI. VIII., Malvaceae.

Abelsonschus L., Bisam-E., ♀. w. Ost- und Westindien,  
 Aegypten.

abutiloides W. (*pernambucensis* Bertol.), abutilonähnlicher,  
 ♀. w. Westindien, Südamerika.

acerifolius DC., ahornblätteriger, ♀. w. Ostindien, China.

aethiopicus L., aethiopischer, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

aquaticus DC. (*palustris* Savi), Wasser-E., 4. Wa. f.  
 Etrurien.

Bammia Tozzett. (*esculentus* Cav.), Bammia-E., ☉. w. m.  
 Aegypten.

bifurcatus Cav., zweigabeliger, ♀. w. Südamerika.

borbonicus Lk., bourbonischer, ♀. w. Mascarenas.

Cameroni K. et W., Cameron's, ♀. w. Madagascar.

cancellatus Roxb., gegitterter, ♀. w. Ostindien.

cannabinus L. (*tripartitus* Fors.), hanfblätteriger, ♂. w.  
 Ostindien.

circinnatus W., kreisförmiger, ♀. w. Caracas.

clandestinus Cav., heimlichblumiger, ♀. w. Guinea.

clypeatus L., schildkapseliger, ♀. w. Westindien.

collinus Baxt. jun., Hügel-E., ♀. w. ?

crinitus Wall., bemähter, 4. ♀. w. Ostindien.

cuneiformis DC., keilförmiger, ♀. t. Neuholland.

digitatus Cav., fingerförmiger, ☉. w. Brasilien.

β) Kerianus DC.

diversifolius Jacq. (*ficulneus* Cav.), verschiedenblätteriger,  
 ♀. w. Ostindien.

elatus Sw., hoher, ♀. w. Westindien.

eriocarpus DC., wollfrüchtiger, ♀. w. Bengalen.

esculentus L., genießbarer, ☉. w. Ost- und Westindien.

ferrugineus Cav., rostfarbiger, ♀. w. Madagascar.

ficulneoides Lindl. (*mauritanus* Spgl.), feigenähnlicher,  
 ♀. w. Mascarenas, Ostindien.

ficulneus L. (*sinuatus* Cav.), feigenblätteriger, ♀. w.  
 Ceylon.

furcatus Roxb., W., gabelförmiger, ☉. w. m. Ostindien.

gangeticus W., Ganges-E., ♀. w. Ostindien.

Genevii Boj., Geneve's, ♀. w. Mauritius.

gossypinus Thbg., gossypiumähnlicher, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

grandiflorus Mchx., großblumiger, 4. k. Florida,  
 Louisiana.

guineensis DC., guineischer, ♀. w. Guinea.



**Hibiscus**

- heterophyllus* Vent. (*grandiflorus* Salisb., *flabellatus* Poir.),  
 veränderlichblättriger, ♀. t. w. Neusüdwallis.  
*hirtus* L., kurzsteifhaariger, ♀. w. Ostindien.  
*hispidus* Mill., steifhaariger, ♂. ♀. t. Cap d. gut. H.  
*Humboldtii* Mart., Humboldt's, ♂. f. m. Südamerika.  
*incanus* Wendl., weißgrauer, 4. t. k. Carolina.  
*Lampas* Cav., philippinischer, ♀. w. Philippinen.  
*lilacinus* Lindl., lilafarbiger, ♀. w. Neuholland.  
*liliflorus* Cav., lilienblumiger, ♀. w. Mascarenas.  
 b) hybridus.  
*Lindleyi* Wall., Lindley's, ♀. w. Ostindien.  
*longifolius* W., langblättriger, ♂. w. m. Ostindien.  
*lunarifolius* W., mondviolenblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*Macleyanus* Banc., Macley's, ♀. w. Westindien.  
*macrophyllus* Hornem., Roxb., großblättriger, ♀. w.  
 Ostindien.  
*maculatus* Bartl., gefleckter, ♀. w. Ostindien.  
*Manihot* L., schwefelgelber, ♂. w. Ost- u. Westindien.  
*membranaceus* Cav., dünnhäutiger, ♀. w. ?  
*micans* Cav., schimmernder, ♀. w. Java.  
*micranthus* L. (*rigidus* L. suppl.), kleinblumiger, ♀. w.  
 Ostindien.  
*militaris* L., glatter, 4. k. f. b. Louisiana.  
*Moscheutos* L., blattstielblüthiger, 4. k. f. b. Nordamer.  
*mutabilis* L., veränderlicher, ♀. w. Ostindien.  
 b) flore pleno.  
*obtusifolius* W., stumpfblättriger, ♀. ♂. w. Ostindien.  
*oxalidiflorus* Boj., sauerkleeblumiger, ♀. w. Mauritius.  
*palmatus* Cav., handförmiger, ♀. w. Südamerika,  
 Westindien.  
*palustris* L., Sumpf-E., 4. f. b. Nordamerika.  
*parviflorus* Weinm., schmalblumiger, ♀. w. Südamerika.  
*Patersonius* Andr., Paterson's, ♀. t. w. Norfolkinsel.  
*pedunculatus* Thbg., langstieliger, ♀. t. Cap d. gut. H.  
*phoeniceus* L., schönrother, ♀. w. Ost- u. Westindien.  
*pruriens* Roxb., juckender, ♂. w. Ostindien.  
*Pseudo-Manihot* DC., unächter gelber, ♀. ♂. w.  
 Mascarenas.  
*pulchellus* Lodd., schöner, ♀. w. Ostindien.  
*quinquefolius* Loud., fünfblättriger, ♀. w. ?  
*racemosus* Lindl., traubiger, ♀. w. Nepal.  
*radiatus* Cav., strahliger, ♂. w. m. Ostindien.  
*rhombifolius* Cav., rautenblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*Richardsonii* Swt., Lindl., Richardson's, ♂. m. f. Neuholl.  
*Rosa malabarica* Koen., malabarischer Rosen-E., ♀. w.  
 Ostindien.  
*Rosa sinensis* L., chinesischer Rosen-E., ♀. w. Ost-  
 indien, China.  
 b) fl. rubr. plen. c) fl. flav. plen. d) fl. carn.  
 plen. e) fl. variegat. plen. f) fl. luteo.  
*roseus* Thore, rosafarbiger, 4. f. Frankreich.  
*Sabdariffa* L., dreitheiliger, ♂. w. Ost- u. Westindien.  
*scaber* Mchx. (*aculeatus* Walt.), scharfer, 4. k. t. Ca-  
 rolina Florida.  
*scandens* Roxb., kletternder, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*senegalensis* Cav., senegambischer, ♀. w. Guinea.  
*setosus* Roxb., borstiger, ♀. w. Ostindien.  
*speciosus* Ait. (*coccineus* Walt.), prächtiger, 4. k. t.  
 Carolina.

**Hibiscus**

- spiralis* Cav., spiralförmiger, ♀. w. Mexico.  
*strigosus* Lindl., striegeliger, ♀. w. t. Peru.  
*surattensis* L., surattischer, ☉. w. m. Ostindien.  
*syriacus* L., syrischer, ♀. f. b. Syrien, Krain.  
     b) fol. variegat. c) flor. variegat. d) flor. pur-  
     pur. e) flor. purpureo plen. f) fl. rubro. g) fl.  
     albo. h) fl. albo plen. i) marginatus etc.  
*tetraphyllus* Roxb., Hornem., vierblättriger, ♂. w.  
     Bengalen.  
*tiliaceus* L., lindenblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*tricuspis* Cav., Banks (*hastatus* Forst.), dreispitziger, ♀.  
     w. Societätsinseln.  
*trilobus* Cav., dreilappiger, ♀. w. Westindien.  
*Trionum* L., Stunden-E., ☉. f. Süd- und Osteuropa,  
     Taurien, Afrika.  
     β) *ternatus* Cav. γ) *africanus* Roth.  
*tubulosus* Cav., röhriger, ♂. ☉. w. m. Ostindien.  
*unidens* Ker, Lindl. (? *monodous* Loud.), einzahniger,  
     ♀. w. Brasilien.  
*velutinus* DC., sammethaariger, ♀. w. Ostindien.  
*vesicarius* Cav., blasiger, ☉. f. m. Südafrika.  
*vitifolius* L., weinblättriger, ♂. w. Ostindien.

*cancellatus* L., *pentacarpus* L. etc. vid. *Pavonia*  
*cancellata* etc. *populneus* L. vid. *Thespesia*  
*populnea*.

**Hieracium** T. Vaill. (et *Pilosella* T. Vaill.), Habichtskraut (Mausöhrchen), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

1. *Pilosella* T. Vaill.

- angustifolium* Hoppe (*glaciale* Lachen., *Auricula* Sm.),  
     schmalblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*aurantiacum* L., orangefarbiges, 4. f. Europäische  
     Alpenwiesen.  
     β) *flavum* Schlchr., Gaud.  
*Auricula* L. (*dubium* Sm., *Lactucella* Wallr.), Triften-  
     H., 4. f. Europa.  
*Bauhini* Bess., Schult. (*sarmentosum* Hort.), Bauhin's,  
     4. f. Deutschland, Galicien.  
*hifurcum* MB. (*collinum* Bess., *pedunculatum* Wallr.,  
     ? *flagellare* W.), zweigabeliges, 4. f. Mittel-, Süd-  
     und Osteuropa, Taurien.  
     β) *brachiatum* Bertol. (*auriculaefolium* et *Pseud-*  
     *auricula* Tausch.).  
*breviscapum* DC. (*pumilum* Lapeyr., *Candollei* Monn.),  
     kurzschaftiges, 4. f. Schweiz, Pyrenäen.  
*collinum* Goch. (*Gochnati* Spgl., *cymosum* et *Auricula*  
     Auctor., *Zizianum* Tausch), Hügel-H., 4. f. Mittel-,  
     West- und Südeuropa.  
     a) *stoloniferum*. β) *astoloniferum* (*fallax* W.).  
*cymosum* L. (*Nestleri* Vill., *cymigerum* Rchb.), after-  
     doldiges, 4. f. Mittel- und Westeuropa.  
     β) *Vaillantii* Tausch (*angustatum* Tausch, *cymo-*  
     *sum* β. *longifolium* Rchb.).  
*echioides* Lumn., natterkopfähnliches, 4. f. Nord- und  
     Ostdeutschland, Ungarn.  
     β) *cinereum* Tausch.  
*fulgidum*\* (*aurantiacum speciosum* Hort.), leuchtendes,  
     4. f. ?

## Hieracium

- furcatum* Hoppe (*sphaerocephalum* Froel.), gabeliges, 4. f. Tyroler und schweizer Alpen, Dauphiné etc.  
      $\beta$ ) *alpicola* Schlchr., Tausch. ?  $\gamma$ ) *hybridum* Chaix.  
*fuscatum* Vill., braunes, 4. f. Schweiz, Dauphiné.  
*glaucescens* Bess. (? *densiflorum* Tausch), blaugrünes, 4. f. Ostdeutschland, Galicien.  
*Hoppeanum* Schult. (*pilosellaeforme* Hoppe, *Pilosella grandiflorum* DC.), Hoppe's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Illyrien.  
*incanum* MB., graugrünes, 4. f. Caucasus.  
*obscurum* Rchb. (*florentinum* Auctor.), dunkles, 4. f. Deutschland.  
*Peleterianum* Merat. (*Pilosella*  $\beta$ . *pilosissimum* Koch), Lepelet's, 4. f. Westdeutschland, Frankreich.  
*Pilosella* L., gemeines Mausöhrlein, 4. f. Europa.  
      $\beta$ ) *Pseudo-Pilosella* Tenor.  
*piloselloides* Vill. (*florentinum* All.), mausöhrleinähnliches, 4. f. Südeuropa.  
      $\beta$ ) *Michelii* Tausch.  
*praealtum* Vill. (*florentinum* W. Spgl., *elégans* Rchb.), hohes, 4. f. Mittel-, West- und Südeuropa.  
*pratense* Tausch. (*cymosum* et *Auricula* Auctor., *collinum* Bernh., *Besserianum* Spgl., ? *dubium* Wahlbg.), Wiesen-H., 4. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.  
      $\beta$ ) *repens* Hort., ? Willd.  
*Pseudauricula* \* (*radiocaulum* Tausch), unächt, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland.  
*sabinum* Sebast. et Mauri. (*cymosum* Vill., Rchb.), römisches, 4. f. Südeuropa.  
      $\beta$ ) *multiflorum* Schlchr.  
*scabrum* Mchx. (? *verruculatum* Lk.), scharfes, 4. f. Nordamerika.  
*setigerum* Tausch (*simplex* Tausch., *Rothianum* Wallr., *picridifolium* Hort., *cymosum* Spgl.), borstiges, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Kleinasien.  
*stoloniflorum* WK. (*bifurcum* Hort., ? *dubium* Tausch.), sprossenblumiges, 4. f. Deutschland, Ungarn.  
 II. *Hieracium* T. V. (*Aurella* Tausch).  
*alpinum* L., Alpen-H., 4. f. Europäische Alpen.  
      $\beta$ ) *tubulosum* (*inapertum* Köhl.).  $\gamma$ ) *pumilum* Hoppe.  
*amplexicaule* L., stengelumfassendes, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.  
      $\beta$ ) *pulmonarioides* Vill. (*petraeum* Hoppe).  
*anchusaefolium* Bertol. (*verbascifolium* Vill.), ochsenzungenblättriges, 4. f. Dauphiné, Italien.  
*andryaloides* Vill., wellenblättriges, 4. f. Spanien, Frankreich, Schweiz.  
      $\beta$ ) *undulatum* Ait.  
*auriculatum* Hornem. (? *bracteolatum* Lk.), gehörtes, 4. f. ?  
*bifidum* Kit., zweispaltiges, 4. f. Ungarn, Schweiz.  
*bupleuroides* Gmel. (*polyphyllum* W., *glaucum* Wahlbg.), hasenöhrleinblättriges, 4. f. Mittel- und osteuropäische Voralpen.  
*calcareum* Bernh. (*humifusum* Hort., ? Spgl.), kalkliebendes, 4. f. Krain, Friaul.



## Hieracium

canadense Mchx., canadisches, 4. f. Nordamerika.  
cerinthoides L., wachsblumenblättriges, 4. f. Südfrankreich.

compositum Lapeyr., vielästiges, 4. f. Pyrenäen.

corymbosum P., traubendoldiges, 4. f. ?

cydoniaefolium Vill., quittenblättriges, 4. f. Dauphiné.

dentatum Hoppe (*speciosum* Hornem., *speciosissimum* W.),  
gezahntes, 4. f. Kärnthner und tyroler Alpen.

denticulatum Sm., gezähneltes, 4. f. Schottland.

denudatum Lapeyr., nacktes, 4. f. Pyrenäen.

eriphorum St. Amans, wolliges, 4. f. Frankreich.

fasciculatum Pursh, büschelförmiges, 4. f. Nordamerika.

flexuosum Kit. (*speciosum* Hort.), gebogenes, 4. f.  
Croatien, Illyrien.

foliosum W., Kit., blattreiches, 4. f. Ungarn.

glabratum Hopp. (*flexuosum* DC., *trichocephalum* W.),  
glattes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

glanduliferum Hoppe, drüsiges, 4. f. Kärnthen,  
Schweiz,

Halleri Vill. (*atricapillum* Hoppe), Haller's, 4. f. Europäische Voralpen.

β) *nigrescens* W.

hirsutum Bernh., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa.

Jacquini Vill. (*humile* Host., *pumilum* Jacq.), Jacquin's,  
4. f. Mitteleuropäische Alpen.

intybaceum Jacq. (*albidum* Vill., *calyculatum* Hornem.),  
cichorienartiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *tubulosum*.

Kalmii L., Kalm's, 4. f. Nordamerika.

Lachenalii C. C. Gmel. (*vulgatum* Fr., *sylvaticum* Auctor.,  
*Mertini* Gmel., *diaphanum* Fr., *angustifolium* C. C.  
Gmel.), Lachenal's, 4. f. Europa.

β) *maculatum* Hortul. (*pictum* Schlchr.).

laevigatum W., glattes, 4. f. Deutschland.

β) *longifolium* Hortul. γ) *lanceolatum* Vill. δ)  
*canescens* Lk.

lanatum Vill. (*tomentosum* All., *verbascifolium* P.), wolliges,  
4. f. Schweiz, Oberitalien, Frankreich.

latifolium Froel. (*croaticum* Lapeyr.), breitblättriges,  
4. f. Pyrenäen.

Liottardi Vill. (*lanatum* Kit., *Waldsteinii* Tausch), Liottard's,  
4. f. Ungarn, Dauphiné.

longifolium Schlchr. (*flexuosum*, *speciosum* et *cerinthoides*  
Hort. et Auctor., *Milleri* Lk.), langblättriges, 4. f.  
Schweiz, Dauphiné.

β) *Mougeoti* Fröl. (*cerinthoides vogesianum* Kirschl.).

γ) *Lawsonii* Vill.

macrophyllum Pursh, großblättriges, 4. f. Canada.

murorum L., Mauer-H., 4. f. Europa.

β) *sylvaticum* L. γ) *rotundatum* Kit. δ) *incisum* Hoppe.

pallescens W. Kit., bleiches, 4. f. Ungarn, Schweiz etc.

paniculatum L., rispiges, 4. f. Nordamerika.

picroides Vill. (*ochroleucum* Sbhch.), picrisähnliches, 4.  
f. Schweiz, Dauphiné.

porrifolium L. Jacq., porreiblättriges, 4. f. Oesterreich,  
Oberitalien, Dauphiné.

**Hieracium**

- prenanthoides Vill. (*spicatum* All.), hasenlattichähnliches, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.  
 prostratum DC., gestrecktes, 4. f. Frankreich.  
 pulmonarium Sm. (*sylvaticum* Gouan), lungenkrautblät-  
 teriges, 4. f. England, Frankreich.  
 pusillum Pursh, zwergiges, 4. f. Labrador.  
 racemosum W. Kit., traubiges, 4. f. Ungarn.  
 ramosum W. Kit., ästiges, 4. f. Ungarn, Schweiz.  
 rigidum Hartm. (*asperum* Gaud., *affine* Tausch, *triden-  
 tatum* Fr.), starres, 4. f. Nord- und Mitteleuropa.  
 rupestre All., (*incisum*, *Liottardi*, *Lawsoni*, *flexuosum*  
 Auctor, *Schmidtii* Tausch), Felsen-H., 4. f. Mittel-  
 und Südeuropa.

β) saxatile Vill.

- sabaudum L. (*barbatum* Tausch, *virgatum* Hort.), Savo-  
 ysches, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
 saxatile Jacq., (*glaucum* All., *scorzonerifolium* Vill., *Al-  
 lionii* Monn.), Gesteins-H., 4. f. Ost-, Mittel- und  
 Südeuropa.

Schraderi Schlchr., Schrader's, 4. f. Mitteleuropäische  
 Alpen.

- sonchifolium MB., gänsedistelblättriges, 4. f. Caucasus.  
 staticefolium Vill. All., grasnelkenblättriges, 4. f. Mit-  
 teleuropäische Voralpen.  
 sudeticum Stbg. (*pulmonarioides* Presl.), Riesengebirgs-  
 H. 4. f. Sudeten.  
 sylvestre Tausch (*boreale* Fr., *nemorosum* Dierb., *saba-  
 dum* Auctor), Wald-H., 4. f. Mittel- und Nord-  
 europa.

β) maculatum Sm.

- umbellatum L. (*Ledebouri* Hornem.), doldiges, 4. f.  
 Europa.

β) coronopifolium Bernh. γ) Lactaris Bertol.

- villosum L. (*eriphyllum* W.), zottiges, 4. f. Mitteleu-  
 ropäische Alpen.

β) pilocephalum Lk.

- alpestre Jacq., aureum Scop., chondrilloides L., cro-  
 aticum W. K., (*molle* Jacq., *integrifolium* Hoppe,  
*Sternbergii* Hornem., *succisaefolium* All.), *incarna-  
 tum* Wulff., *lapsanoides* Gouan, *paludosum* L.,  
*paaemorsum* L., *prunellaefolium* Gouan etc. v.  
 Crepis alpest., aur., Jacquini, succisaefol., incarn.,  
 lapsan., paludos., praemors., pypmaea etc. *fruti-  
 cosum* W. etc. v. Tolpis (*Polychaetia*), frutic. etc.  
*stipitatum* Jacq. v. Willemetia apargioides.

**Hierochloa** Gmel. Pferdegras, III. 11., Gramineae.

alpina R. et S., Alpen-P., 4. f. Lappland.

australis, R. et S., südliches, 4. f. Mittel- und Süd-  
 europa.

borealis R. et S., (*odorata* Whlbg., *repens* P. B.), nörd-  
 liches, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa, Nord-  
 asien.

fragrans R. et S., gutriechendes, 4. f. Nordamerika.

**Hillia** Jacq. (J. Hill, engl. Botaniker), VI. 1., Rubiaceae.

longiflora Sw. (*parasitica* L.), langblumige, ♀. w. Ja-  
 maica, Brasilien.

tetrandra Sw., viermännige, ♀. w. Jamaica.

**Hippeastrum** Herb., Sternnarcisse, VI. 1., Narcisseae-  
 Amaryllideae.

**Hippeastrum**

- ambiguum* Herb. (*longiflorum* Hook.), zweifelhafte, 4.  
 Zw. w. Lima.  
*breviflorum* Herb., kurzblumige, 4. Zw. w. Buenos-Ayres.

**Hippia** L., Pferdechamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- frutescens* L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
*integrifolia* L. suppl., ganzblättrige, ☉. m. Ostindien.

**Hippion** Spgl., Kreuzwurz, V. I., Contortae-Gentianeae.

- hyssopifolium* Spgl., ysopblättrige, ♂. w. Ostindien.  
*verticillatum* Spgl., wirtelblüthige, ♂. w. Trinidad.  
*viscosum* Spgl., schmierige, ♂. ♀. k. t. Canarische Inseln.

**Hippocratea** L. (Hippocrates, berühmter griechischer Arzt), III. I., Evonymae-Hippocrateaceae.

- arborea* Roxb., baumartige, ♀. w. Ostindien.  
*indica* W., indische, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*obcordata* Lam. (*scandens* Jacq.), verkehrtherzblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*obtusifolia* Roxb., stumpfblättrige, ♀. Sch. w. Coromandel.  
*ovata* Lam. (*volubilis* L.), eiförmige, ♀. Sch. w. Westindien.

**Hippocrepis** L., Hufschote, XVII. IV., (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- balearica* Jacq., balearische, ♀. k. Balearische Inseln.  
*biflora* Jacq., zweiblumige, ☉. f. Südeuropa, Nordpersien.  
 β) *persica* Fisch et Mey.  
*ciliata* W. (*annua* Lag., *dicarpa* M. B.), gefranzte, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Taurien.  
*comosa* L. (*helvetica* G. Don.), schopfige, 4. f. Mitteleuropa.  
*glauca* Ten., blaugrüne, 4. f. Neapel, Sicilien.  
*multisiliqua* L., vielschotige, ☉. f. f. Südeuropa.  
*unisiliquosa* L. (*monocarpa* MB., *syriaca* Hort.), einschotige, ☉. f. Südeuropa, Caucasus.

**Hippomane** L., Mancinellenbaum, XXI. X., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- Mancinella* L., gemeiner, ♀. w. Westindien.  
*spinosa* L. v. *Sapium ilicifolium*.

**Hippomarathrum** Lk., Pferdefenchel, V. II., Umbelliferae.

- siculum* Lk., sicilianischer, 4. k. Südeuropa.

**Hippophaë** L., Sanddorn, XXII. IV., Elaeagneae.

- rharnoides* L., gemeiner, ♀. f. Mittel- u. Nordeuropa.  
 β) *angustifolia* Lodd.  
*salicifolia* D. Don, weidenblättriger, ♀. f. b. Nepal.  
*argentea* Pursh et *canadensis* L. v. *Shepherdia* argent. etc.

**Hippuris** L., Wasserwedel, I. I., Halorageae-Hippurideae.

- vulgaris* L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Amerika.  
 β) *maritima* Hell. (*lanceolata* Retz., *tetraphylla* L. suppl.)

**Hiptage** G., Hiptage, X. I., Malpighiaceae.

- Manablota* G., ostindische, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*obtusifolia* DC., stumpfblättrige, ♀. Sch. w. China.



- Hiraea** Jacq. (J. M. de la Hire, franz. Arzt und Naturforscher), X. III., Malpighiaceae.  
*glaucescens* Lodd., blaugrüne, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*indica* Roxb., indische, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*nutans* Roxb., nickende, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*oblongifolia* DC., länglichblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*odorata* W., riechende, ♀. Sch. w. Guinea.  
*reclinata* Jacq., rückwärts geneigte, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.
- Hirnellia-cotuloides** Cels. v. *Angianthus tomentosus* Nachtr.
- Hirtella** L., Haarbaum, V. I., Chrysobalanaceae.  
*racemosa* Lam. (*paniculata* Vahl, *americana* Aubl.), traubiger, ♀. w. Südamerika.  
*triandra* Sw. (*paniculata* Lam., *americana* Jacq.), dreimänniger, ♀. w. Westindien.
- Hoffmannseggia** Cav. (Graf v. Hoffmannsegg, ausgezeichnete deutscher Botaniker), X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.  
*Falcaria* Cav., sichelförmige, ♀. w. Chili, Buenos Ayres.
- Hohenackeria** Fisch. et Mey. (R. F. Hohenacker, ein Würtemberger, welcher die kaukasisch-georgischen Provinzen botanisch untersuchte), V. II., Umbelliferae.  
*bupleurifolia* Fisch. et Mey., hasenöhrchenblättrige, ♂. f. Sonchetia.
- Hoitzia** Juss. (mexicanischer Name), V. I., Polemoniaceae.  
*coccinea* Cav., scharlachfarbige, ♀. t. Mexico.  
*coerulea* Cav., blaue, ♀. t. Mexico.  
*glandulosa* Cav., drüsige, ♀. t. Mexico.  
*mexicana* Lam., mexicanische, ♀. t. Mexico.  
*linearis* Spgl. v. *Collomia linearis*.
- Holarrhena** RB., Röhrenbeutel, V. I., Contortae-Apocynaeae.  
*villosa* Ait., zottiger, ♀. w. Ostindien.
- Holcus** L., Honiggras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.  
*lanatus* L., wolliges, 4. f. Europa.  
*mollis* L., weiches, 4. f. Europa.  
*australis* Schrad. etc. v. *Hierochloa australis*. *avenaceus* Scop. etc. v. *Arrenatherum avenaceum*. *cernuus* W. etc. v. *Sorghum cernuum*. *Gryllus* RB. v. *Chrysopogon Gryllus*, *spicatus* L. vid. *Penicillaria spicata*.
- Holigarna** Buchan., Roxb. (ostindischer Name), V. III. (XXIII. I.), Amyrideae-Cassuvieae.  
*longifolia* Roxb., langblättrige, ♀. w. Ostindien.
- Holmskioldia** Retz (Th. Holmskiold, dänischer Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.  
*sanguinea* Retz, blutfarbige, ♀. w. Bengalen.  
*scandens* Swt., klimmende, ♀. Sch. w. Ostindien.
- Hologymne glabrata** Bartl. v. *Lasthenia californica*.
- Holoschoenus vulgaris** Lk. v. *Isolepis Holoschoenus*.
- Holosteum** L., Spurre, III. III., Caryophyllaceae-Alsineae.  
*diandrum* Sw., zweimännige, ♂. f. Jamaica.  
*sperguloides* Lehm., sparkähnliche, ♂. f. ?  
*umbellatum* L., doldige, ♂. f. Europa.

**Holosteum**

*cordatum* L. v. *Drymaria cordat. liniflorum* Stev.  
v. *Alsine glutinosa*.

**Homalium** Jacq., *Homalium*, XIII. III., Amygdalaceae-Homalineae.

*racemosum* Jacq., traubiges, ♀. w. Westindien.

**Homeria** Vent. (Homer, berühmter griechischer Dichter), III. I. (XVI. I.), Irideae.

*collina* Swt., Hügel-H., 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.  
*elegans* Swt., zierliche, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.  
*exaltata* Swt., hohe, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*flaccida* Swt., schlaffe, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.  
*flexuosa* Swt., gebogene, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.  
*lineata* Swt., linirte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*miniata* Swt., mennigrothe, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.  
*porrifolia* Swt., porreiblätterige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
*spicata* Swt., ährige, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*virgata* Swt., ruthenförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*Hookeria coronaria* Salisb. v. *Brodiaea grandiflora*.

*Hopkirkia scandens* Spgl. v. *Salmea scandens*.

**Hoplophyllum** DC., Stechblatt, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

*spinosum* DC., kapisches, ♀. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

**Hoplotheca** Nutt., Schlauchkelch, V. I., Aizoideae-Amarantheae.

*floridana* Nutt., floridanische, 4. k. Florida.  
*interrupta* Nutt., unterbrochene, ♂. w. Westindien.  
*lactea* Mart., milchweisse, ♀. w. Südamerika.  
*lanata* Mart., wollige, ♂. w. Südamerika.  
*sericea* Mart., seidenhaarige, ♂. w. Brasilien.

*Hoppea speciosa* Rchbch. v. *Ligularia speciosa*.

**Hordeum** T., Gerste, III. II., Gramineae.

*bulbosum* L. (*strictum* Dsf.), knollige, 4. f. Italien, Istrien, Orient, Nordafrika.

*capense* Thbg., capische, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*distichum* L., zweizeilige, ☉. f. Mitteleuropa, Tatarei.  
β) *nudum* Arduin. (*imberbe* R. et S.).

*hexastichon* L., sechzeilige, ☉. ♂. f. ?

*himalayense* Rittig (*nepalense* Swt.), Himalaya-G., ☉. f. Nepal.

*Hystrix* Roth, igelgrannige, ☉. f. Spanien.

*jubatum* L., mähnige, ☉. f. Nordamerika.

*maritimum* Wither. (*geniculatum* All., *rigidum* Roth), Seestrands-G., ☉. f. Europa.

*marinum* L., Mäuse-G., ☉. f. Europa, Orient, Südamerika, Cap.

β) *chilense* Brogn.

*nodosum* L. (*pratense* Huds., *secalinum* Schreb.), kno-  
tige, 4. f. Europa.

*vulgare* L., gemeine, ☉. f. Sicilien, Tatarei.

β) *coeleste* Viborg. γ) *nigrum* W.

*Zeocriton* L., Bart-G., ☉. f. Europa.

β) *complanatum* P. B.

**Horkelia** Chamiss. (J. Horkel, Professor zu Berlin), X. I., Rosaceae.

*congesta* Doug., gedrängte, 4. f. Nordamerika.

*fusca* Lindl., braune, 4. f. Nordamerika.

- Horminum** L., Scharlachkraut, XIV. i., Labiatae.  
*pyrenaicum* L., pyrenäisches, 4. f. Oesterreich, Tyrol, Schweiz, Pyrenäen.  
*virginicum* DC., virginisches, 4. f. Virginien.  
*caulescens* Orteg. v. *Lepechinia spicata*.
- Hornemannia** W. (Hornemann, Professor der Botanik zu Koppenhagen), XIV. ii., Personatae-Antirrhineae.  
*bicolor* W., zweifarbig, 4. f. m. Ostindien.  
*ovata* Lk. et *viscosa* W. v. *Tittmannia ovata* etc.
- Hortensia** *opuloides* Lam. (*speciosa* P.) vid. *Hydrangea hortensis*.
- Hosackia** Dougl. (Dr. Hosack, Arzt zu New York), XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.  
*bicolor* Dougl., zweifarbig, 4. f. Nordamerika.  
*Purshiana* Bot. reg., Pursh's, 4. Sch. f. Nordamerika.  
*stolonifera* Lindl., sprossende, 4. f. Nordamerika.
- Hostia** Jacq. (N. Th. Host, Arzt u. Botaniker zu Wien), II. i., Verbenaceae.  
*coerulea* Jacq., blaue, 4. w. Mexico,  
*longifolia* Humb., langblättrige, 4. w. Mexico.
- Hottonia** Boerh. (P. Hotton, Professor der Botanik zu Leyden), V. i., Primulaceae.  
*palustris* L., sumpfliebende, 4. Wa. f. Europa.
- Houstonia** L. (W. Houston, englischer Botaniker), IV. i., Rubiaceae.  
*albiflora* Grah., weisblumige, 4. k. f. h. Nordamerika.  
*ciliata* Loud., gefranzte, 4. k. Nordamerika.  
*coerulea* L., blaue, 4. k. f. b. Nordamerika.  
*longifolia* W., langblättrige, 4. k. f. b. Nordamerika.  
*purpurea* L. (*varians* Mchx., *pubescens* Rafin.), purpurfarbig, 4. k. f. b. Nordamerika.  
*coccinea* Andr. v. *Bouvardia Jacquini*.
- Houttuynia** Thbg. (D. Houttuyn, holländischer Naturforscher), III. iii., Aroideae.  
*cordata* Thbg., herzförmige, 4. w. Japan.  
*foetida* Hort., stinkende, 4. w. Japan.
- Hovea** RB. (W. How, alter englischer Botaniker, A. P. Hove, polnischer Botaniker nach Loudon), XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*apiculata* Cunn., kurzspitzige, 4. t. Neuholland.  
*Celsii* Bonpl., Cels's, 4. t. Neuholland.  
*crispa* Lindl., krause, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).  
*elliptica* DC., elliptische, 4. t. Neuholland.  
*lanceolata* Sims, lanzettliche, 4. t. Neuholland.  
*lanigera* Lodd., wollige, 4. t. Neuholland.  
*latifolia* Lodd., breitblättrige, 4. t. Neuholland.  
*linearis* RB., gleichbreitblättrige, 4. t. Neuholland.  
*longifolia* RB., langblättrige, 4. t. Neusüdwallis.  
*Manglesii* Lindl., Mangles's, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).  
*mucronata* Cunn., stachelspitzige, 4. t. Neuholland.  
*pannosa* Cunn., faserlappige, 4. t. Neuholland.  
*pungens* Hügel, stechende, 4. t. Neuholland.  
*purpurea* Swt., purpurfarbig, 4. t. Neuholland.  
*rosmarinifolia* Cunn., rosmarinblättrige, 4. t. Neuholl.  
*villosa* Lindl., zottige, 4. t. Neuholland.  
*chorizemaefolia* DC. et *ilicifolia* Cunn. v. *Plagiolobum chorizemaefol.* etc.



**Hovenia** Thbg. (D. v. der Hoven, Senator zu Amsterdam), V. 1., Rhamneae.

*dulcis* Th., süsse, f. t. Japan, Nepal,  
*inaequalis* DC. (*dulcis* D. Don, *pubescens* Swt., *acerba* Lindl.), ungleiche, f. t. Nepal.

**Hoya** RB. (T. Hoy, englischer Gärtner), V. 11., Asclepiadeae.

*carnosa* RB. (*crassifolia* Haw.), fleischige, f. Sch. w. Südasien, Neuholland.

*lanceolata* Wall., lanzettliche, f. Sch. w. Ostindien.

*pallida* Lindl. (*lanceolata* Hort., *acuta* Haw.), bleiche, f. Sch. ? China.

*Pottsii* Hort., Pott's, f. Sch. w. China.

*trinervis* Hort., dreinervige, f. Sch. w. China.

*viridiflora* RB., grünblumige, f. Sch. w. Ceylon.

**Hudsonia** L. (W. Hudson, englischer Botaniker), XI. 1., Cistineae.

*ericoides* L., heideähnliche, f. k. Nordamerika.

*Nuttalli* Swt., Nuttall's, f. k. Virginien.

*tomentosa* Nutt., filzige, f. k. Nordamerika.

**Hügelia** Rehb. (Baron v. Hügel, Director der botanischen Anstalten zu Wien), V. 11., Umbelliferae.

*cyanea* Rehb. (*coerulea* Hort.), kornblumenblaue, c. t. m. Neuholland.

*Hügelia densifolia* Benth. etc. vid. *Welwitschia densifolia* etc.

**Huernia** RB. (J. Huernius, Sammler von Cappflanzen), V. 11., Asclepiadeae.

*barbata* RB., bärtige, 4. f. t. w. Cap d. gut. Hoffn.

*campanulata* RB., glockige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*clavigera* Haw., keulige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*crispa* Haw., krause, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*guttata* RB., getüpfelte, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*humilis* RB., niedrige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*lentiginosa* RB., sommersprossige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

*ocellata* R. et S., Spgl., augenfleckige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

*reticulata* RB., netzförmige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

*tubata* RB., röhrlige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*venusta* RB., schöne, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

**Hugonia** L. (Dr. A. J. Hugo, ein Hannoveraner, Freund von Haller), XVI. vi., Malvaceae-*Dombeyaceae*.

*Mystax* L., bartige, f. w. Ostindien.

*serrata* Lam., sägezahnige, f. w. Mascarenas.

**Humea** Sm. (Lady Hume, Freundin der Pflanzenkunde), XIX. 1., Compositae-*Helichryseae*.

*elegans* Sm., zierliche, f. ♂. t. Neusüdwallis.

**Humulus** L., Hopfen, XXII. v., Urticaceae.

*Lupulus* L., gemeiner, 4. Sch. f. Europa, Nordamer.  
 b) *variegatus* J. Cree.

**Hunnemannia** Swt. (J. Hunnemann, englischer Botaniker), XIII. 1., Papaveraceae.

*fumariaefolia* Swt., erdrauchblättrige, 4. t. Mexico.

**Huntleya** Batem. (John Thomas Huntley, englischer Gartenfreund), XX. 1., Orchideae.

*meleagris* Lindl., schachblumenähnliche, 4. w. Brasilien.

**Huntleya**

violacea Lindl., violette, 4. w. ?Brasilien.

**Hura L.**, Sandbüchsenbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

brasiliensis W., brasilianischer, 5. w. Brasilien.

crepitans L., rauschender, 5. w. Südamerika.

strepens W., brausender, 5. w. Südamerika.

**Hutchinsia RB.** (Miss Hutchins, ireländische Kryptogamologin), XV. II., Cruciferae.

alpina RB., Alpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

brevicaulis Hoppe, kurzstengelige, 4. f. Kärnth., Salzburg, Tyrol.

calycina Desv., gekelchte, 4. f. Sibirien.

petraea RB., felsenliebende, ☉, f. Europa.

*cepeaefolia* DC. (et *rotundifolia* RB.) etc. v. *Thlaspi*

*cepeaefol.* etc. *procumbens* Desv. v. *Capsella procumbens*.

**Hyacinthus T.**, Hyacinthe, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

amethystinus L., amethystblaue, 4. Zw. f. Spanien.

brumalis Haw., Winter-H., 4. Zw. f. ?

orientalis L., morgenländische, 4. Zw. f. b. Klein- u. Mittelasien.

b. ruber. c. flavus. d. albus. e. multiplex. f. semiplenus.

paradoxus Fsch. et Mey., wunderbare, 4. Zw. f. Südrussland, (Garül).

*botryoides* L., *comosus* L. etc. v. *Muscari botryoides* etc., *dubius* Guss. (et *romanus* L.) v. *Bellevallia dubia* etc. *non scriptus* L. etc. v. *Scilla nutans* etc. *revolutus* L. v. *Drimia revoluta*, *viridis* L. v. *Zuccagnia viridis*.

**Hyaenanche Lamb.**, Giftstrauch, XXII. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

globosa Lamb., kugelig, 5. t. Cap der guten Hoffn.

**Hydrangea L.**, Wasserstrauch, X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

arborescens L. (*vulgaris* Pursh, *frutescens* Mönch), baumartiger, 5. f. Virginien.

β) *discolor* Ser.

cordata Mchx., herzblättriger, 5. f. b. Carolina.

heteromalla Wall., verschiedenwendiger, 5. k. f. b. Nepal.

hortensis Sm., Garten-W., (Hortensie), 5. l. k. b. China, Japan.

nivea Mchx. (*radiata* Walt., *glauca* Hortul.), schneeweiß, 5. f. b. Carolina, Louisiana.

β) *glabella* Ser.

quercifolia Bartr. (*radiata* Sm.), eichenblättriger, 5. k. f. b. Florida, Georgia.

**Hydrastis L.**, Sumpfranunkel, XIII. VI., Ranunculaceae.

canadensis L., canadische, 4. Kn. k. f. b. Canada.

**Hydrocharis L.**, Froschbiss, XXII. VIII., (IX. III.), Hydrocharideae.

Morsus ranae L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa.

*Hydrochloa aquatica* Hartm. etc. v. *Glyceria spectabilis* etc.

**Hydrocotyle T.**, Wassernabel, V. II., Umbelliferae.

americana L., amerikanischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

asiatica L. (*Thunbergiana* Speg., *natans* Thbg.), asiati-

**Hydrocotyle**

scher, 4. Wa. k. t. Ost- und Westindien, Cap der guten Hoffnung.

bonariensis Lam. (*multiflora* R. et P.), bonarischer, 4. t. w. Südamerika.

chinensis L., chinesischer, 4. t. China.

hirsuta Sw. (*spicata* Lam.), rauhhaariger, 4. w. Westindien.

natans, Cyrill., schwimmender, 4. Wa. k. Neapel.

nepalensis Hook., nepal'scher, 4. t. Nepal.

nitidula Rich., glänzender, 4. w. Java.

peduncularis RB., gestielter, 4. k. t. Neuholland.

plebeja RB., neuholländischer, 4. Wa. k. t. Neuholland.

prolifera Lk. et Otto, sprossender, 4. w. Brasilien.

ranunculoides L., ranunkelähnlicher, 4. k. Mexico.

reniformis Thbg., nierenförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

repanda P., ausgeschweiffter, 4. Wa. k. Nordamerika.

sibthorpioides Lam., sibthorpiaähnlicher, 4. w. Mascarenas.

triloba Thbg., dreilappiger, 4. t. Cap d. guten Hoffn.

umbellata L., doldiger, 4. k. f. Nordamerika, Westindien.

villosa L., zottiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

vulgaris L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika, Japan.

β) Schkuhriana Rchb.

*Spananthe* W. v. *Spananthe paniculata*.

*Hydroglossum hirsutum* W., *japonicum* W. etc. v. *Lygodium polymorphum japonicum* etc.

**Hydrolea** L., Wasserwinde, V. II., Convolvulaceae-Hydroleae.

quadrivalvis Walt. (*caroliniana* Mchx.), vierklappige, 4. k. Carolina.

spinosa L., dornige, 4. Wa. w. Südamerika.

**Hydropeltis** Mchx., Wasserschild, XIII. VI., Hydrocharideae-Hydropeltideae.

purpurea Mchx., purpurfarbiges, 4. Wa. k. Nordamerika.

**Hydrophyllum** L., Rinnenblume, (Wasserblatt), V. I., Hydrophyllaeae.

canadense L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

virginicum L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

*appendiculatum* Mchx. v. *Nemophila paniculata*.

*magellanicum* Lam. v. *Phacelia circinata*.

**Hydropyrum** Lk., Wasserkorn, VI. II., (XXI.), Gramineae.

esculentum Lk., genießbares, ④. Wa. f. Nordamerika.

fluitans Kunth, schwimmendes, ④. Wa. f. Nordamerika.

**Hydrotaria** Lindl., Wasserstendel, XX. I., Orchideae.

meleagris Lindl., schachblumenähnlicher, 4. w. Mexico.

**Hygrophila** RB., *Hygrophila*, XIV. II., Acanthaceae.

ringens RB., rachenförmige, 4. w. Ostindien.

**Hymenaea** L., Heuschreckenbaum, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

Candolleana, H. B. K., Candolle's, 4. w. Mexico.

Courbaril L., gemeiner, 4. w. Südamerika.

verrucosa G., warziger, 4. w. Madagascar.

**Hymenanthera** RB., Hautbeutel, V. I., Violaceae.

dentata RB., gezahnter, 4. t. Neuholland.



**Hymenocallis** Herb., Hautschwertel, VI. 1. Narcis-  
seae-Amaryllideae.

*Staplesii* Herbert, Staples's, 4. Zw. w. Mexico.

Hinsichtlich der übrigen s. *Pancratium*.

**Hymenocarpus** Savi, Hauthülse, XVII. IV. (VI.), Le-  
guminosae-Papilionaceae.

*circinatus* W. Lk., kieselnde, ☉. f. Spanien, Italien.

*numularius* W. Lk., pfennigkrautähnliche, ☉. f. Südeu-  
ropa, Aegypten.

*radiatus* W. Lk., strahlige, ☉. f. Italien.

**Hymenocrater** Fisch. et Mey., Hautlippler, XIV. 1.,  
Labiateae.

*bituminosus* Fisch. et Mey., harziger, ♂. k. Nordpersien.

**Hymenodictyon** Wall., Netzbaum, V. 1., Rubiaceae.

*excelsum* Wall., hoher, ♂. w. Ostindien.

*thyrsiflorum* Wall., straußblumiger, ♂. w. Ostindien.

**Hymenogyne** Haw., Hautgriffel. XII. II., Aizoideae-  
Ficoideae.

*glabra* Haw., kahler, ☉. m. f. Cap d. guten Hoffnung.

**Hymenopappus** L'Her., Hautfederchen, XIX. 1., Com-  
positae-Eupatorineae.

*pedatus* Lagasc., fußförmiges, ☉. f. Südamerika.

*scabiosaeus* L'Her., scabiosenähnliches, ☉. f. Carolina.

*tenuifolius* Pursh, feinblättriges, ☉. f. Louisiana.

*glaucus* Sogl. v. *Cephalophora glauca*, *integrifolius*

Sogl. v. *Polypteris integrifolia*.

**Hymenophyllum** Sm., Hautfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

*tunbridgense* Sw., kleiner, 4. k. f. Süd- und West-  
europa, Norwegen, Neuholland etc.

*Wilsoni* Hook., Wilson's, 4. k. f. England.

*alatum* Engl. botan. v. *Trichomanes brevisetum*.

**Hymenopyramis** Wall., Hautkräutel, XIV. II., Ver-  
benaceae.

*brachiata* Wall., armförmiges, ♂. w. Ostindien.

**Hymenospron** Sogl., Hauthülse, XVII. IV. (VI.), Le-  
guminosae-Papilionaceae.

*molle*\* (Jacq.), weiche, 4. Sch. w. ?

*sericeum* Sogl., seidenhaarige, 4. Sch. w. Neugranada.

**Hyoscyamus** T., Bilsenkraut. V. 1., Solanaceae.

*albus* L., weißes, ☉. f. Südeuropa.

*aureus* L., goldfarbiges, 4. k. Orient, Süditalien.

β) *auriculatus* Ten.

*Camerarii* Fisch. et Mey., Camerarius's, ☉. f. Nord-  
persien, Syrien.

*canariensis* Ker, canarisches, 4. ♂. k. Canarische Inseln.

*micranthus* Ledeb., kleinblumiges, ☉. f. Armenien.

*muticus* L. (*Datura* Forsk), unbewehrtes, ♂. ♂. k.  
Aegypten, Arabien.

*niger* L., schwarzes, ☉. ♂. f. Europa.

β) *agrestis* W. K. (*annuus*).

*orientalis* MB., morgenländisches, 4. f. Caucasus.

*pallidus* W. K., bleiches, ☉. f. Ungarn.

*physaloides* L., schlottenähnliches, 4. f. Sibirien.

*pusillus* L., kleines. ☉. f. Persien.

*reticulatus* L., netzförmiges, ☉. f. Kleinasien, Aegypten.

*Senecionis* W., kreuzkrautähnliches, 4. ♂. k. Aegypten.

*Scopolia* L. v. *Scopolia carniolica*.

**Hyoseris** Juss., Schweinesalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*arenaria* Schousb., Sand-S., ☉. f. Marocco.

*lucida* L., glänzender, 4. k. Sicilien, Aegypten.

*radiata* L., strahliger, 4. f. k. Südeuropa.

*scabra* L. (*microcephala* Cass.), scharfer, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*foetida* L. v. *Lapsana foetida*, *hispida* Schousb. v.

*Thrinia maroccana*, *virginica* L. etc. v. *Krigia virginica* etc. Hinsichtlich der übrigen s. *Hedypnois*.

**Hypecoum** T., Lappenblume, IV. 11., Papaveraceae.

*erectum* L., aufrechte, ☉. f. Sibirien.

*litorale* Wulf., Ufer-L., ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Mauritanien.

*pendulum* L., hängende, ☉. f. Südeuropa, Caucasus.

*procumbens* L., niederliegende, ☉. f. Südeuropa.

**Hyperanthera** *Moringa* Vahl. v. *Moringa pterygosperma*.

**Hypericum** T., Johanniskraut, XVIII. 11., Guttiferae-Hypericineae.

*aegyptiacum* L. (*creticum* Hort, *maritimum* Sbr.) aegyptisches, §. k. Aegypten, Creta.

*aethiopicum* Thbg., aethiopisches, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

*amoenum* Pursh, liebliches, §. 4. Carolina, Georgien.

*angulosum* Mchx., kantiges, 4. f. Carolina.

*Ascyron* L., sibirisches, 4. f. b. Sibirien.

b. fol. variegat.

*attenuatum* Fisch., verdünntes, §. f. Sibirien.

*axillare* Lam. (*fasciculatum* W., *Coris* Walt.), achselständiges, §. f. Nordamerika.

*balearicum* L., balearisches, §. k. Balearische Inseln.

*barbatum* Jacq., härtiges, 4. f. Oesterreich, Ungarn.

*calycinum* L., großblumiges, §. f. b. Irland, Thracien.

*canadense* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

*canariense* L., canarisches, §. k. Canarische Inseln.

*chinense* Lam. (*monogynum* L.), chinesisches, §. k. China.

*ciliatum* Lam., gefranztes, 4. k. Griechenland, Süditalien.

*cochinchinense* Lour., cochinchinesisches, §. t. China, Cochinchina.

*cordifolium* DC. Chois. (*bracteatum* D. Don), herzblättriges, §. t. Nepal.

*Coris* L., vierblättriges, §. k. Südeuropa.

*corymbosum* Mühlbg., traubendoldiges, §. f. Nordamerika.

*crispum* L., krauses, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.

*dentatum* Lois., gezahntes, 4. f. b. k. Südfrankreich.

*dolabriforme* Vent., hobelförmiges, 4. f. Nordamerika.

*elatum* Ait., hohes, §. f. b. ? Nordamerika, canarische Inseln.

*elegans* Stephani, (*Kohlianum* Spgl., *anagallidifolium* Presl.), zierliches, 4. Mitteldeutschland, Volhynien, Sibirien.

*elodes* L., Sumpf-J., 4. f. Deutschland, England, Frankreich, Sibirien.

*elongatum* Ledeb., verlängertes, 4. f. Sibirien.

*empetrifolium* W., rauschbeerenblättriges, §. k. Creta, Kleinasien.

*ericoides* L., heideähnliches, §. k. Spanien, Portugal.

*fasciculatum* Lam. (*aspalathoides* W.) büschelförmiges, §. f. b. k. Carolina.

**Hypericum**

- finbriatum* Lam. (*Richeri* Vill.), gefranztes, 4. f. Ungarn, Schweiz, franz., italienische Alpen.  
      $\beta$ ) *androsaemifolium* Vill. (*alpinum* W. Kit.), ?  
      $\gamma$ ) *calabricum* N. E.  
*floribundum* Ait., blüthenreiches,  $\frac{1}{2}$ . k. Canarische Inseln.  
*foliosum* Ait., blattrreiches,  $\frac{1}{2}$ . k. Azoren.  
*frondosum* Mchx., belaubtes, 4. f. Nordamerika.  
*galioides* Lam., labkrautähnliches,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Nordamerika.  
*Gebleri* Ledeb., Gebler's, 4. f. Altai.  
*glandulosum* Ait., drüsiges,  $\frac{1}{2}$ . k. Canarische Inseln.  
*glaucum* Mchx., blaugrünes,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Nordamerika (Georgien).  
*grandifolium* Chois., großblättriges,  $\frac{1}{2}$ . k. Canarische Inseln.  
*heterophyllum* Vent., verschiedenblättriges,  $\frac{1}{2}$ . k. Persien.  
*hircinum* L., stinkendes,  $\frac{1}{2}$ . f. Italien, Griechenland.  
     b. minus.  
*hirsutum* L., haariges, 4. f. Europa.  
*humifusum* L., niedergestrecktes, ♂. 4. f. Europa, Caucasus.  
      $\beta$ ) *Liottardi* Vill.  
*hyssopifolium* Vill., ysopblättriges, 4. f. Dauphiné, Caucasus.  
*japonicum* Thbg., japanisches, 4. f. b. Nepal, Japan.  
*involutum* Chois., eingerolltes, 4. k. t. Nördl. Neuholland.  
*Kalmianum* L., Kalm's,  $\frac{1}{2}$ . f. Virginien.  
*laevigatum* Ait., glattes, 4. f. Nordamerika.  
*macrocarpon* Mchx., (*ascyroides* W., *rostratum* Rafin), großfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.  
*marylandicum* Jacq. fil., marylandisches, 4. f. Nordamerika.  
*montanum* L., Berg-J., 4. f. Europa.  
*myrtifolium* Lam., myrtenblättriges, 4. f. Nordamerika.  
*nepalense* Chois. DC. (*pallens* D. Don), nepal'sches, 4. f. b. Nepal.  
*nervosum* D. Don (*elodeoides* Chois.), nerviges, 4. f. b. Nepal.  
*nudiflorum* Mchx., nacktblumiges, 4.  $\frac{1}{2}$ . f. b. Nordamerika.  
*nummularium* L., randblättriges, 4. f. b. k. Südfrankreich, Italien.  
*oblongifolium* Chois. (*uralum* Hamilt.), länglichblättriges,  $\frac{1}{2}$ . f. b. k. Nepal.  
*olympicum* L., olympisches,  $\frac{1}{2}$ . k. Kleinasien, Südchina.  
*orientale* T., morgenländisches, 4. k. Kleinasien.  
*paludosum* Chois., Sumpf-J., 4. f. Nordamerika.  
*patulum* Thbg., ausgebreitetes,  $\frac{1}{2}$ . k. Japan, Nepal.  
*perforatum* L., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.  
      $\beta$ ) *veronense* Schrk.  
*procumbens* Mchx., liegendes, 4. f. Nordamerika.  
*prolificum* L. (*Kalmianum* du Roi), sprossendes,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.  
*pulehrum* L., schönes, 4. f. Deutschland, Frankreich, England.  
*punctatum* Lam., punktirtes,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.  
*pusillum* Chois., kleines, 4. k. Nördliches Neuholland.



**Hypericum**

pyramidatum Ait. (*amplexicaule* Lam.), pyramidales, 4. f. Nordamerika.

quadrangulare L. (*delphinense* Vill., *maculatum* Crtz., All., *dubium* Leers), vierkantiges, 4. f. Europa.

quinquenervium Walt. (*parviflorum* W.), fünfnerviges, 4. k. Pennsylvanien, Carolina.

reflexum L., suppl., zurückgebogenes, 5. k. Teneriffa.

rosmarinifolium Lam. (*densiflorum* Pursh), rosmarinblättriges, 4. 5. k. Carolina, Virginien.

Salicaria Rchb., weiderichähnliches, 4. f. Sibirien.

serpyllifolium Lam., quendelblättriges, 5. k. Syrien, Persien.

setosum Ait., horstiges, 4. k. Carolina.

simplex Mchx., einfaches, ☉. f. Nordamerika.

tetrapterum Fries (*quadrangulare* Sm., *quadrialatum* Wahlbg.), vierflügeliges, 4. f. Europa.

tomentosum L., filziges, 4. k. Süd- und Westeuropa.

triplinerve Vent., dreinerviges, 4. f. Nordamerika.

undulatum Schousb., wellenblättriges, 4. f. Nordafrika.

verticillatum Thbg., wirtelblättriges, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

virgatum Lam., ruthenförmiges, 4. f. Nordamerika.

virginicum L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

*alternifolium* La Bill. vid. *Reaumuria hypericoides*.  
*Androsaemum* L. v. *Androsaemum officinale*. *guianense* Aubl. v. *Vismia guianensis*.

**Hypbaene** G., Lederpalme, XXII. VI. (VI. III.), Palmae..

coriacea G., ägyptische, 5. w. Oberägypten.

**Hypocalyptus** Thbg., Mützingenster, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

obcordatus Thbg., verkehrtherzblättriger, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

**Hypochaeris** Vaill., Ferkelkraut, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

arachnites Biv., spinnewebiges, ☉. f. Sicilien, Spanien.

Balbisii Loisel. (*intermedia* Richt.), Balbis's. ☉. f. Deutschland, Italien, Frankreich.

canescens Steven., grauliches, 4. f. Caucasus.

dimorpha Broter., änderndes, ☉. f. Portugal.

glabra L., glattes, ☉. f. Europa.

hispida W., hackeriges, ♂. 4. f. Südeuropa.

macrorrhiza Günth., großwurzeliges, 4. f. Calabrien.

maculata L., geflecktes, 4. f. Europa, Caucasus.

minima Dsf., kleinstes, ☉. f. Nordafrika.

radicata L., langwurzeliges, 4. f. Europa.

uniflora Vill. (*helvetica* Jcq.), einblumiges, 4. f. Mittel-europäische Alpen.

*pinnatifida* Cyril. v. *Robertia pinnatifida*.

**Hypoestes** Soland., Hüllklau, II. I., Acanthaceae.

fastuosa RB., prächtiger, 5. w. Ostindien.

involuta Spgl. (Roxb.), häutiger, 5. w. Calcutta.

purpurea RB., purpurfarbiger, 4. w. China.

serpens RB., kriechender, 4. w. Mascarenas.

**Hypolaena** RB., Hypolaene, III. I. (XXII. II.), Restiaceae.

exsulca RB., ausgefurchte, 4. k. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

**Hypolaena**

*fastigiata* RB., gipfelständige, 4. k. t. Neuholland.  
Van-Diemens-Land.

**Hypolytrum** Rich. (*Hypoelytrum* Auctor.), *Hypolytrum*, III. 1., Cyperaceae.

*argenteum* Vahl, silberfarbiges, 4. w. Ostindien, Westafrika, Südamerika.

*senegalense* Rich., senegal'sches, 4. w. Senegal.

**Hypoxis** L., Härtling, VI. 1., Narcisseae-Hypoxideae.

*alba* L., weißer, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*aquatica* L., Wasser-H., 4. Wa. k. t. Cap d. gut. H.

*breviscapa* H. B. K., kurzschäftiger, 4. t. w. Südamer.

*carolinensis* Mchx. (*filifolia* Ell.), carolinischer, 4. k. Carolina.

*decumbens* L., niederliegender, 4. w. Jamaica.

*elegans* Andr., zierlicher, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*erecta* L., aufrechter, 4. f. k. Nordamerika.

*gracilis* Lehm., schlanker, 4. Zw. t. k. Mexico.

*hygrometrica* La Bill., hygrometrischer, 4. k. t. Neuholl.

*juncea* Sm., simsenähnlicher, 4. k. Carolina.

*linearis* Andr., gleichbreiter, 4. k. t. Cap d. gut. H.

*multiflora* Rehb., vielblumiger, 4. k. t. Cap d. g. H.

*obliqua* Jacq., schieflätteriger, 4. k. t. Cap d. g. H.

*obtusa* Burch., stumpfkroniger, 4. k. t. Cap d. g. H.

*ovata* Thbg., eiförmiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*pratensis* RB., Wiesen-H., 4. k. t. Neuholland.

*ramosa* Lodd., ästiger, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

*scabra* Lodd., scharfer, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

*serrata* L., sägeblätteriger, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

*sobolifera* Jacq., wurzelsprossender, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*stellata* L., sternförmiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*stellipilis* Ker, sternhaariger, 4. k. t. Cap d. gut. H.

*veratrifolia* W. (*plicata* Jcq.), germerblätteriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*villosa* L., zottiger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Hyptis** Jcq., Linksblume, XIV. 1., Labiatae.

*albida* H. B. K., weißliche, 5. w. Mexico.

*brevipes* Poit. (*globifera* Meyer), kurzstielige, ☉. w. Südamerika.

*canescens* Humb., grauliche, ♂. w. Caracas.

*capitata* Jacq., kopfförmige, ♂. w. Westindien.

*Chamaedrys* W., gamanderblätterige, ♂. w. Cayenne, Guiana.

*ebracteata* RB. (*suaveolens* Poit.), deckblattlose, ☉. w. Westindien.

*inflata* Spgl., aufgeblasene, ♂. w. Brasilien.

*nepetoides* Fisch. (*persica* W.), katzenmünzenähnliche, 5. k. Persien.

*pectinata* Poit., kammförmige, 4. w. Westindien.

*Plumieri* Poit., Plumier's, ♂. w. Westindien.

*Pohliana* Jcq. fil., Pohl's, ☉. w. Brasilien.

*polyanthos* Poit. (*lamifolia* Weinm.), vielblumige, ♂. w. Südamerika.

*polystachya* H. B. K., vielährige, ♂. w. Mexico, Westindien.

*Pseudo-Chamaedrys* Poit., unächte Gamander-L., ♂. w. Westindien.

*radiata* W., strahlige, 4. k. Carolina, Mexico.

**Hyptis**

*recurvata* Poit., zurückgekrümmte, 4. w. Cayenne.  
*scoparia* Poit., besenartige, ☉. w. Westindien, Südamerika.

*spicata* Poit., ährige, ♂. w. Westindien.

*stachyoides* Lk., zistähnliche, ☉. w. Brasilien.

**Hyssopus** T., Ysop, XIV. 1., Labiatae.

*angustifolius* MB. (*orientalis* W.), schmalblättriger, ♀. f. Causasus.

*officinalis* L. (*Schleicheri* G. Don), officineller, ♀. f. Südeuropa, Sibirien.

b) *variegatus*. c) *flor. rubro*.

*anisatus* Nutt. (*discolor* Dsf.) et *Lophantus* L. etc.

v. *Lophantus anisatus* etc. *cristatus* Lam. et *ocymifolius* Lam. v. *Elsholtzia paniculata* et *cristata*.

**Iberis** Rupp., Dill., Schleifenblume, XV. II., Cruciferae.  
*amara* L., bittere, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *minor* Koch (*ruficaulis* Lej.).

*cappadocica* W., cappadocische, ♀. k. Kleinasien.

*carnosa* W. (*cepeaefolia* Pourr., *spathulata* DC., *rotundifolia* Lam.), fleischige, ☉. f. Pyrenäen.

*conferta* Lagasc., gedrängte, ♀. f. b. k. Spanien.

*contracta* P., dichtblumige, ♀. f. b. k. Spanien.

*corifolia* Bot. mag., corisblättrige, ♀. f. b. k. Südeuropa.

*coronaria* D. Don (*superba* Hort.), gekrönte, ☉. f. ?

*divaricata* Tausch, ausgesperrte, ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Westdeutschland.

*Garrexiana* All., oberitalienische, ♀. f. b. k. Oberitalien.

*gibraltarica* L., gibraltarische, ♀. k. Spanien.

*hispidula* Tenor., steifhaarige, ☉. f. Südeuropa.

*intermedia* Guers., mittlere, ☉. ♂. f. Frankreich.

*Lagascana* DC., Lagasca's, ☉. f. Spanien.

*linifolia* L., leinblättrige, ☉. f. Südeuropa.

*odorata* L., riechende, ☉. f. Creta.

*pinnata* L. (*crenata* Lam.), gefiederte, ☉. f. Südeuropa.

*Pruiti* Tin., sicilianische, 4. ♀. k. Sicilien.

*pubescens* W., weichhaarige, ♀. k. Spanien.

*saxatilis* L., Gesteins-Sch., ♀. k. f. b. Südeuropa.

*semperflorens* L., immerblühende, ♀. k. Sicilien.

*sempervirens* L., immergrüne, 4. k. f. b. Italien, Creta.

*Tenorii* DC. (*cepeaefolia* Tenor.), Tenore's, 4. f. b. k. Neapel.

*umbellata* L., doldige, ☉. f. Griechenland, Spanien, Italien.

*virginica* Fisch. et Mey., virginische, ☉. f. Virginien.

*violacea* RB., violette, ☉. f. ?

*cepeaefolia* Wulf (et *rotundifolia* L. et *stylosa* Ten.)

v. *Thlaspi cepeaefol.* et *rotundifol.* etc. *nudicaulis*

L. v. *Teesdalia nudicaulis*.

*Icacorea guianensis* Aubl. v. *Ardisia acuminata*.

**Ichnocarpus** RB., Sohlenfrucht, V. 1., Contortae-Apocynae.

*frutescens* RB., strauchige, ♀. w. Ostindien.

**Icica** Aubl. (guianischer Name), X. 1., Amyrideae.

*enneandra* Aubl., neunmännige, ♀. w. Guiana.

*guianensis* Aubl., guianische, ♀. w. Guiana, Brasilien.

*heterophylla* DC., verschiedenblättrige, ♀. w. Guiana.



*Ilex* L., Stechhölse, IV. III., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

*angustifolia* W. (*myrtifolia* Walt., *rosmarinifolia* Lam.), schmalblättrige, ♂. k. Carolina, Virginien.

β) *ligustrifolia* Pursh.

*Aquifolium* L., gemeine, ♂. ♂. f. b. Nordamerika, Europa.

b) *heterophyllum* Hort. c) *angustifolium* Hort.  
d) *latifolium* Hort. e) *altaclerense* Hort. f) *marginatum* Hort. g) *laurifolium* Hort. h) *ciliatum* Hort. i) *ciliatum minus* Hort. k) *recurvum* Hort. (*recurva* Lk., *myrtifolia* Hort., *serrata* Dsf.). l) *serratifolium* Hort. m) *crispum* Hort. n) *ferox* Hort. (*echinata* Mill.). o) *crassifolium* Hort. p) *senescens* Swt. q) *albo-marginatum* Hort. r) *aureo-marginatum* Hort. s) *albo-pictum* Hort. t) *aureo-pictum* Hort. u) *ferox argenteum* Hort. (*echinat. argent.*). v) *ferox aureum* Hort. w) *fructu luteo* Hort. x) *fructu albo*.

*balearica* Dsf. (*maderensis* W.), balearische, ♂. ♂. k. Balearische und canarische Inseln.

*canariensis* Poir., canarische, ♂. ♂. k. Canarische Inseln.

*Cassine* L., Ait. (*caroliniana* Mill., *cassinoides* Lk., *laurifolia* Hort.), lorbeerblättrige, ♂. k. Carolina.

b) *angustifolia*.

*cassinoides* Dum. Cours., cassinenähnliche, ♂. k. ?

*chinensis* Ker, Sims, chinesische, ♂. k. China.

*crocea* Thbg., safranfarbige, ♂. k. t. Cap d. gut. H. Dahoon Walt., Dahoon-St., ♂. k. Carolina.

β) *laurifolia* Nutt.

*laxiflora* Lam., lockerblumige, ♂. k. Carolina.

*myrtifolia* Lam., myrtenblättrige, ♂. w. Westindien.

*opaca* Ait. (*quercifolia* Meerb.), dunkle, ♂. f. b. k. Carolina.

b) *macrodon*. c) *latifolia*. d) *acuminata*. e) *globosa*.

*paraguaiensis* A. St. Hil., theegebende, ♂. f. w. Paraguay, Brasilien.

*Perado* Ait., *Perado*-St., ♂. k. Madeira.

*salicifolia* Jacq., weidenblättrige, ♂. w. Mascarenen.

*vomitaria* Ait. (*ligustrina* Jacq., *Cassena* Mchx., *religiosa* Bartr., *floridana* Lam.), brechennerregende, ♂. k. Carolina, Florida.

*aestivalis* Lam. (*prinoides* Ait., *decidua* Walt.) vid.

*Prinos deciduus. canadensis* Mchx. v. *Nemopantes*

*canadensis. myrsinites* Pursh vid. *Myginda myrtifolia*.

*Illecebrum* Rupp., Knorpelkelch, V. n., Portulacaceae-Paronychieae.

*diffusum* W., ausgebreiteter, 4. t. w. Südamerika.

*echinatum* Poir., stacheliger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*glomeratum* Hffg., knaulförmiger, 4. w. Brasilien.

*gomphrenoides* W., kugelamaranthähnlicher, ☉. m. f. Peru.

*leucurum* Lichtstn., weißschwänziger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

*verticillatum* L., wirtelförmiger, ☉. f. Europa.

Hinsichtlich der übrigen s. *Paronychia*, *Philoxerus* et *Polycarpaea*.

**Illicium** L., Anisbaum, XIII. VI., Magnoliaceae.

*anisatum* L., ächter, ♀. k. Japan, China.

*floridanum* L., floridanischer, ♀. k. Florida.

*parviflorum* Mchx., kleinblumiger, ♀. k. Florida.

**Imatophyllum** Aitoni Hook. v. *Clivea nobilis*.

**Impatiens** Riv., Springsame (Wolfskraut), V. I., Balsamineae.

*borealis* Swt., nördlicher, ☉. f. Dänemark.

*cristata* Wall., kammiger, ☉. f. Mongolei, China.

*discolor* DC., verschiedenfarbiger, ☉. f. Nepal.

*fulva* Nutt. (*biflora* W.), rothgelber, ☉. f. Nordamer.

*leptoceras* Wall. (*micrantha* D. Don, *longicornu* Wall.), schlanksporniger, ☉. f. Nepal.

*natans* W., schwimmender, ☉. Wa. f. t. Ostindien.

*Nolimetangere* L., gemeiner, ☉. f. Europa, Nordamerika, Mittelasien.

*pallida* Nutt., bleicher, ☉. f. Nordamerika, England.

*parviflora* DC., kleinblumiger, ☉. f. Mongolei, Südrussland.

*scapiflora* Heyn. (*bulbosa* Morn., *acaulis* Arn.), schaftblumiger, 4. Kn. w. Ostindien.

*triflora* L., dreiblumiger, ☉. f. m. Ceylon.

*tripetala* Roxb., dreikroniger, ☉. f. m. Ostindien.

Hinsichtlich der übrigen s. Balsamina.

**Imperata** Cyril. (Ferrante Imperati, neapolitanischer Botaniker), III. II., Gramineae.

*cylindrica* P. Beauv. (*arundinacea* Cyril.), cylinderförmige, 4. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika etc.

*Königii* P. Beauv., König's, 4. w. Ostindien.

*spontanea* P. Beauv., wilde, 4. w. Ostindien, Arabien.

**Imperatoria** T., Meisterwurz, V. II., Umbelliferae.

*angustifolia* Bell., schmalblättrige, 4. f. Schweiz, Oberitalien.

*mexicana* H. C., mexicanische, 4. f. Mexico.

*Ostruthium* L., ächte, 4. f. Europa, Cypern.

*Chabraei* Spgl. (*pimpinelloides* Bönningh. et *verticillaris* DC.) v. *Peucedanum Chabraei* etc. *montana* DC. (et *sylvestris* DC.) v. *Angelica montana* et *sylvestris*. *palustris* Bess. v. *Ostericum palustre*. *Seguieri* Spgl. v. *Ligusticum Seguieri*.

**Incarvillea** Juss., *Incarvillea*, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

*chinensis* Lam., chinesische, ♀. Sch. w. Südchina.

*grandiflora* Spgl., großblumige, ♀. w. k. China, Cap der guten Hoffnung.

*tomentosa* Spgl., filzige, ♀. t. Japan.

**Indigofera** L., Indigo, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*amoena* Ait., lieblicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*angulata* Rottl., kantiger, ☉. m. w. Ostindien.

*angustifolia* L., schmalblättriger, ♀. t. Cap d. gut. H.

*Anil* L., sichelfrüchtiger, ♀. w. Ost- und Westindien.

*arborea* Roxb., baumartiger, ♀. w. Ostindien.

*argentea* L., silberfarbiger, ♀. w. Ostindien, Arabien, Aegypten.

*aspalathioides* Vahl., witschenähnlicher, w. Ceylon.

*atropurpurea* Roxb. Hamilt., schwarzpurpurfarbiger, ♀. t. Nepal.

## Indigofera

australis W. (*speciosa* Hort.), südlicher, ♀. t. Neu-Südwallis.  
 candicans Ait., weifsllicher, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 coriacea Ait., lederartiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 cytisoides L. (*mucronata* Lam.), geißkleeähnlicher, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

denudata Thbg., entblößter, ♀. t. Cap der guten H.  
 diphylla Vent., zweiblättriger, ☉. m. f. Westafrika.

divaricata Jacq., ausgesperrter, ♀. t. ?

endecaphylla Jacq., elfblättriger, ☉. w. Guinea.

enneaphylla L., neunblättriger, ☉. w. m. Ostindien.

filifolia Thbg., fadenblättriger, ♀. t. Cap der gut. H.

filiformis Thbg., fadenförmiger, ♀. t. Cap. d. gut. H.

fragrans Retz., wohlriechender, ♀. w. Ostindien.

frutescens Thbg., strauchiger, ♀. t. Cap der guten H.

glabra L., kahler, ☉. w. m. Ostindien.

glandulosa Roxb., drüsiger, ☉. w. m. Ostindien.

Guatemala Lunan (*tinctoria* β. *brachycarpa* DC.), Guatimala-I., ♀. w. Westindien.

hedysaroides Lam., hahnenkopfähnlicher, ♂. w. Ostindien.

hirsuta L., rauhhaariger, ♀. w. Ostindien.

incana Thbg., weißgrauer, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

juncea Dum. Cours. (*filifolia* Ker, *aphylla* Lk.), simsenförmiger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

lateritia W. (*rufescens* Poir., *hirsuta* Jacq.), ziegelfarbiger, ☉. w. m. Guinea, Ostindien.

leptostachya DC., schlankästiger, ♀. w. Ostindien.

Leschenaultii DC., Leschenault's, ☉. w. m. Ostindien.

linifolia Retz. (*polygonoides* Wendl.), leinblättriger, ☉. w. Ostindien.

lotoides Lam., schotenkleeähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.

microphylla Lam., kleinblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.

nuda G. Don, nackter, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

procumbens L., niederliegender, 4. t. Cap d. guten H.

psoraleoides L., psoraleaähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.

pulchra W. Roxb., schöner, ♀. w. Ostindien.

rigida W., starrer, ♀. w. Ostindien.

sarmentosa Thbg., starkwurzelnder, 4. t. Cap d. g. H.

spinosa Forsk., dorniger, ♀. w. t. Arabien, Ostindien.

stipularis Lk., zwischenblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.

stricta Thbg., steifer, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

sylvatica Sbr. (*angulata* Lindl.), waldiger, ♀. t. Neuholl.

tinctoria L. (*coerulea* Roxb.), ächter, ♀. w. Ostindien.

trifoliata L., dreiblättriger, ♂. w. Ostindien.

trita L. fil., mehlig, ♂. w. Ostindien.

violacea Roxb., violetter, ♀. w. Ostindien.

virgata DC., ruthenförmiger, ♀. w. Ostindien.

viscosa Lam. (*graveolens* Wendl.), schmieriger, ☉. w. m. Ostindien.

**Inga** Marcg. (südamerikanischer Name), XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimoseae.

affinis DC., ähnelnde, ♀. w. Brasilien.

alba W., weiß, ♀. w. Cayenne.

anomala H. B. K., ungewöhnliche, ♀. w. Mexico.

bigemina W., zweipaarige, ♀. w. Ostindien.

Burgoni DC. (*marginata* W.), Bourgon's, ♀. w. Guiana

cinerea Humb., aschfarbige, ♀. w. Caracas.

circularis W., kreisförmige, ♀. w. Westindien.

comosa W., schopfige, ♀. w. Jamaica.



**Inga**

- dulcis W., süsse, *h.* w. Ostindien, Philippinen.  
 emarginata Humb., Bonpl., ausgerandete, *h.* w. Südamerika, Martinique,  
 fastuosa W., prächtige, *h.* w. Südamerika.  
 Feuilleei DC., Feuillee's, *h.* w. Lima.  
 filicina W., farnnblätterige, *h.* w. Brasilien.  
 foetida W., stinkende, *h.* w. Westindien.  
 Houstoni DC., Houston's, *h.* w. Mexico.  
 hymenoides (? *afzeloides* Lodd.), hymenaeaähnliche, *h.* w. Cayenne.  
 latifolia W., breitblätterige, *h.* w. Westindien.  
 laurina W., lorbeerähnliche, *h.* w. Westindien.  
 macrophylla Humb., Bonpl., großblätterige, *h.* w. Südamerika.  
 marginata W., berandete, *h.* w. Südamerika.  
 mellifera W., honiggebende, *h.* w. Arabien.  
 microphylla Humb., kleinblätterige, *h.* w. Cumana.  
 nodosa W., knotige, *h.* w. Ceylon.  
 pulcherrima Cav., schönste, *h.* w. Mexico.  
 punctata W., punktirte, *h.* w. Westindien, Südamerika.  
 purpurea W., purpurfarbige, *h.* w. Westindien.  
 quassiaefolia W., quassienblätterige, *h.* w. Brasilien.  
 rhoifolia W., rhusblätterige, *h.* w. Brasilien.  
 setifera DC., borstentragende, *h.* w. Guiana.  
 spectabilis W., ansehnliche, *h.* w. Südamerika.  
 splendens W., schimmernde, *h.* w. Brasilien.  
 spuria Humb., unächte, *h.* w. Südamerika.  
 Tapinhuana Jacq. fil., Tapinhuana-L., *h.* w. Südamer.  
 tergemina W., dreipaarige, *h.* w. Martinique.  
 Unguis cati W., Katzenklauen-L., *h.* w. Westindien.  
 velutina W., sammethaarige, *h.* w. Para.  
 vera W., wahre, *h.* w. Südamerika, Westindien.  
 xylocarpa DC., holzfrüchtige, *h.* w. Ostindien.  
 Zygia DC., Zygia-L., *h.* w. Jamaica.

**Inocarpus** Forst., Fasernufs, X. 1., Sapotaceae.

edulis Forst., genießbare, *h.* w. Molucken, Südseeinseln.

**Intybellia** Cass., Wegleuchte, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

purpurea DC. (*rosea* Cass., *taurica* Less.), purpurfarbige,  
 4. f. Taurien.

*incarnata* Monn., *praemorsa* Monn., *pulchra* Monn.  
 v. *Crepis incarnata* etc. *Intybus praemorsus* Fr. v.  
*Crepis (Geracium) praemorsa*.

**Inula** L., Alant, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

bifrons L., zweiflügeliger, 4. f. Südfrankreich, Italien,  
 Ungarn.

britannica L., britannischer, 4. f. Europa, Mittelasien.  
 β) *Oetteliana* Rchb.

Bubonium Jacq., knorpeliger, 4. f. Krain, Oesterreich,  
 Schweiz, Taurien.

calycina Spgl. (*montana* Biv.), gekelchter, 4. f. Sicilien.  
 campestris Bess., Feld-A., 4. f. Podolien. Taurien.

caspica Ledeb., caspischer, 4. f. Südrussland.

caucasica P., caucasischer, 4. f. Caucasus.

conyzoides Dsf., dürrwurzähnlicher, 4. f. Creta.

crithmoides L. (*crithmifolia* Wither.), meerfenchelähnlicher, 4. f. b. k. England, Süd- und Westeuropa, Griechenland, Caucasus.

## Inula

- ensifolia L., schwertförmiger, 4. f. Mittel-, Ost- und Süddeutschland, Galicien, Siebenbürgen, Taurien.  
 foetida L., stinkender, ☉. f. Malta.  
 germanica L., deutscher, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland.  
 glabra Bess., glatter, 4. f. Rußland.  
 glandulosa Muss., W. (*orientalis* Lam.), drüsiger, 4. f. Caucasus.  
 gossypina Mchx., wolliger, 4. f. b. Carolina, Florida.  
 graminifolia Mchx. (*argentea* P.), grasblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 grandiflora W., großblumiger, 4. f. Caucasus,  
 Helenium L., officineller, 4. f. Deutschland, England, Frankreich.  
 hirta L., rauher, 4. f. Europa.  
 hybrida Baumg., Bastard-A., 4. f. Oesterreich, Siebenbürgen, Podolien.  
 mariana L. (*glandulosa* Lam., *trichophylla* Nutt.), marianischer, 4. f. Nordamerika.  
 media MB., mittlerer, 4. f. Westdeutschland, Caucasus, Mittelasien.  
 mollis Bernh., weicher, 4. f. ?  
 montana L., Berg-A., 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.  
 multicaulis Fisch. et Mey., vielstengelig, 4. f. Caspisches Meer.  
 Oculus Christi L., weißblättriger, 4. f. Oesterreich, Croatien.  
 quadridentata Lagasc., vierzähliger, 4. f. Spanien.  
 salicina L., weidenblättriger, 4. f. Europa.  
 saturejoides Mill. (*Saturejæ* Spgl.), satureiähnlicher, ♂. w. Neuspanien.  
 squarrosa L. (*spiraeae* folia L. Lam.), sparriger, 4. f. Italien, Frankreich.  
 suaveolens Jacq., starkriechender, 4. f. Südeuropa.  
 Vaillantii Vill. (*cinerea* Lam.), Vaillant's, 4. f. Schweiz, Frankreich, Oberitalien.  
 verbascifolia Poir. (*thapsoides* Spgl.), wollkrautblättriger, 4. f. Caucasus,  
     *arabica* L., *dysenterica* L. etc. v. *Pulicaria arabica* etc. *saxatilis* Lam. et *tuberosa* Lam. vid. *Jasonia glutinosa* et *tuberosa*.

## Ipomoea L., Trichterwinde, V. 1., Convolvulaceae.

- acuminata Vahl (*eustachiana* Jacq.), zugespitzte, 4. Sch. w. Westindien.  
 Aitoni Lindl., Aiton's, 4. Sch. w. ?  
 angularis W., kantige, ☉. Sch. w. Ostindien.  
 angustifolia Jacq., schmalblättrige, ☉. w. f. Ostindien.  
 armata R. et P. (*muricata* Cav. non Jacq.), bewaffnete, ♂. t. Mexico.  
 barbigera Swt., bärtige, ☉. Sch. f. Nordamerika.  
 Batatas Poir., R. et S., Bataten-T., 4. Kn. w. Südamerika.  
 bicolor Swt. (Vahl), zweifarbige, ♂. Sch. w. Ostindien.  
 bignonioides Sims, bignonienähnliche, 4. Kn. w. Cayenne.  
 blanda Swt. (Roxb.), liebliche, ♂. Sch. w. Ostindien.  
 Bona nox L., stachelige, ☉. Sch. w. m. Westindien, Neuspanien.

**Ipomoea**

- bonariensis Hook. (*Batatas bonariensis* Lindl.), bonarische, 4. Kn. w. Buenos Ayres.
- brasiliensis Mey., brasilianische, 4. w. Südamerika.
- cairica Swt. (*palmata* Forsk.), ägyptische, ♀. Sch. w. Aegypten.
- campanulata L., glockige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
- candicans Bot. mag., weißliche, 4. Sch. k. Nordamer.
- capitata (Vahl), kopfförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.
- carnea Jacq., fleischfarbige, ☉. Sch. w. Südamerika.
- carolina L., carolinische, 4. Sch. f, k. Carolina.
- Cavanillesii R. et S. (*pentaphylla* Cav. non Jacq.), Cavanille's, ♀. Sch. w. Mexico.
- chryseides Ker, goldfarbige, 4. Sch. w. China.
- coccinea L., scharlachfarbige, ☉. m. f. Südamerika.
- coerulea Ker, blaue, ☉. Sch. m. w. Ostindien.
- coerulescens Roxb., bläuliche, 4. Sch. w. Ostindien.
- commutata R. et S., verwechselte, ☉. Sch. f. Nordamer.
- corymbosa Roth, traubendoldige, ♀. Sch. w. Westindien.
- cuspidata P., langspitzige, ☉. Sch. m. f. Südamerika.
- dasyperma Jacq. (*tuberculata* Ker, *senegaleusis* Lam.), rauhsamige, ☉. Sch. w. m. Ostindien, Westafrika.
- denticulata RB., gezähnelte, ☉. Sch. w. m. f. Ostindien, Neuholland.
- digitata L., fingerförmige, 4. Sch. w. Westindien.
- Dillenii Desf., Dillen's, ☉. Sch. w. m. Guinea.
- discolor Jacq., verschiedenfarbige, ☉. Sch. f. ?
- dissecta W., RB., schlitzblättrige, 4. Sch. w. Guinea, Neuholland.
- eriosperma Bert., wollsamige, 4. ☉. Sch. w. Brasilien, Westindien.
- fastigiata Swt. (Roxb.), gipfelständige, 4. Sch. w. Ostindien.
- filiformis Jacq., fadenförmige, ♂. Sch. w. Antillen.
- gangetica Swt. (Roxb.), Ganges-T., ♀. 4. Sch. w. Ostindien.
- glaucofolia L., blaugrünblättrige, 4. Sch. w. Mexico.
- gossypifolia W. (*insignis* Ker), baumwollenblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- grandiflora L., großblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- hastigera H. B. K., spontonförmige, ♀. Sch. w. Mexico.
- hederacea L., Jacq. (*barbata* Roth), epheuähnliche, ☉. Sch. f. Nordamerika.
- hederaefolia L., epheublättrige, ☉. Sch. m. w. Westindien.
- hepaticaefolia Burm., L., leberkrautblättrige, ☉. Sch. f. Ostindien.
- heterophylla Orteg., W., verschiedenblättrige, 4. Sch. w. Westindien.
- hispida (Vahl), steifhaarige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
- Horsfalliae Hook., Horsfall's, 4. Sch. w. Afrika.
- Jalapa Bot. mag. (*Jalapa* β. *rosea* Bot. Reg.), Jalapa-T., 4. Kn. w. Südamerika.
- involucrata P. B., hüllige, ☉. Sch. w. m. Guinea.
- lacunosa L., grubichte, ☉. Sch. f. Nordamerika.
- latiflora Desf., breitblumige, ♀. Sch. w. Westindien.
- laurifolia Swt., (Roxb.), lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- leucantha Jacq., weißblumige, ☉. Sch. m. w. Südamer.
- longiflora H. B. K., langblumige, 4. Sch. w. Südamer.



**Ipomoea**

- luteola* Jacq. (*angulata* R. et P.), gelbliche, ☉. Sch. f. Carolina, Südamerika.  
*macrorrhiza* (L.), großswurzelige, 4. Kn. Westindien, Guiana.  
*malabarica* (L.), malabarische, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*maritima* RB., Seestrand-T., 4. w. Ostindien.  
*Michauxii* Swt. (*Jalapa* a. Bot. reg., *macrorrhiza* Mchx.), Michaux's, 4. Kn. Georgien.  
*multiflora* Mill., vielblumige, ♂. Sch. w. Jamaica.  
*muricata* Jacq. (*bona nox* β. *purpurascens* Bot. Reg.), weichstachelige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.  
*mutabilis* Ker, veränderliche, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*Nil* P., himmelblaue, ☉. Sch. m. w. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.  
*noctiluca* Herb. (*latiflora* Bot. reg.), leuchtende, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*obscura* (L.), dunkle, ☉. Sch. w. m. Ostindien.  
*paniculata* RB. (*mauritiana* Jacq.), rispige, 4. Kn. w. Ostindien, Neuholland.  
*pandurata* Bot. Reg. [(L.), geigenförmige, 4. Sch. f. Nordamerika.  
*parviflora* Vahl, kleinblumige, ☉. Sch. w. m. Westind.  
*pendula* RB., herabhängende, ♀. t. w. Neusüdwallis, Neucaledonien.  
*pentaphylla* Jacq. (*pilosa* Cav.), fünfblätterige, ☉. Sch. w. m. Westindien.  
*Pes tigridis* L., fußförmige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.  
*pilosa* Swt. (Roxb.), haarige, 4. Sch. w. Ostindien.  
*platanifolia* (Vahl), platanusblätterige, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.  
*platensis* Ker, Plata-T., 4. Sch. w. Südamerika.  
*polyanthes* R. et S., vielblumige, ♀. Sch. w. Südamer.  
*pseudomuricata* Bernh., unächte weichstachelige, ☉. Sch. w. ?  
*pudibunda* Bot. reg., schamrothe, 4. Sch. w. Westind.  
*punctata* R. et S., punktirte, 4. Sch. w. m. Südamer.  
*Purga* Wender. (*Schiedeana* Zucc.), purgirende, 4. Sch. k. f. b. Mexico.  
*purpurea* Lam., purpurfarbige (gemeine Garten-T.), ☉. f. Sch. Südamerika.  
     b) *incarnata*. c) *varia*. d) *leucantha*.  
*Quamoclit* L., gefiederte, ☉. Sch. w. m. Ost- und Westindien.  
     b) *flore albo*.  
*quinqueloba* (Vahl), fünflappige, 4. Sch. w. Westindien.  
*repanda* Jacq., ausgeschweifte, ☉. Sch. w. Westindien.  
*reptans* (L.), kriechende, 4. w. Ostindien.  
*Roxburghii* Swt. (*multiflora* Roxb.), Roxburgh's, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*rubro-coerulea* Hook., rothblaue, ☉. 4. Sch. w. Mexico.  
*sagittaeifolia* Pursh, Ker, pfeilblätterige, 4. Sch. f. b. Carolina.  
*sagittata* Poir. (*Convolvulus Wheleri* Vahl), pfeilförmige, 4. Sch. f. Spanien, Nordafrika.  
*salicifolia* Roxb., weidenblätterige, 4. Sch. w. Ostind.  
*sanguinea* Vahl, blutrothe, ♀. Sch. w. Westindien.  
*scabra* Gmel., Cav. (*scabrida* R. et S., *hirsutula* Hort. Gorenk., Hornem.), scharfe, ☉. Sch. w. Südamerika.

**Ipomoea**

- Schiedeana* Hamilt., Schiede's, 4. Sch. t. k. Mexico.  
*Sellowii* Penny, Sellow's, 5. Sch. t. w. Brasilien.  
*senegalensis* Lam., senegalische, 4. Kn. w. Guinea.  
*sepiaria* Roxb., Zaun-T., 5. Sch. w. Ostindien.  
*setosa* Ker, borstige, ①. Sch. w. Brasilien.  
*sibirica* Jacq., sibirische, ①, Sch. f. Sibirien.  
*sinuata* Orteg., buchtige, 4. Sch. k. t. Florida.  
*solanifolia* W., nachtschattenblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.  
*sphaerocephala* D. Don, kugelblumige, ♂. Sch. w. Westindien, Nepal.  
*splendens* G. Don, schimmernde, 4. Kn. w. Guinea.  
*stans* Cav., steife, 4. Sch. t. f. b. Mexico.  
*stipulacea* Swt. (Roxb.), zwischenblättrige, 4. w. Ostindien.  
*strigosa* Roth, striegelige, ①. Sch. w. m. Ostindien.  
*tamnifolia* L., schmeerwurzblättrige, ①. Sch. f. Westindien, Carolina.  
*ternata* Jacq., dreizählige, 5. Sch. w. Brasilien.  
*ternifolia* Cav., dreiblättrige, ①. m. w. Neuspanien.  
*tridentata* Roth, dreizähnige, ①. Sch. w. m. Ostindien.  
*triloba* L., dreilappige, ①. Sch. w. Westindien, Südamerika.  
*triquetra* (Vahl), dreiseitige, 5. Sch. w. Westindien.  
*tuberculata* Desr. (*stipulacea* Jacq.), kleinhöckerige, 5. Sch. w. Mascarenas.  
*tuberosa* L., knollige, 4. kn. w. Westindien.  
*Turpethum* (L.), Turbeth-T., 4. Sch. w. Ostindien, Neuholland.  
*tyrianthina* Lindl., purpurblumige, 4. ? Kn. t. Mexico.  
*varia* Roth, bunte, 4. Sch. w. Westindien.  
*venosa* (Vahl), aderige, 5. Sch. w. Mascarenas.  
*villosa* R. et P., zottige, ①. Sch. w. m. Peru.  
*violacea* L., violette, ①. Sch. w. m. Südamerika, Westindien.  
*vitifolia* Swt. (L.) weinblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.  
*speciosa* P. v. *Argyrea speciosa*.

*Ipomopsis elegans* Mchx. etc. (*Ipomeria eleg.* Nutt.) v. *Gilia pulchella* etc.

**Iresine** Pat. Br., Iresine, V. I., cxxii. v. Aizoideae-Amaranthaceae.

- celosioides* L., hahnenkammähnliche, ①. f. Nordamerika.  
*diffusa* W., weitschweifige, 4. k. t. Südamerika.  
*elator* Rich., höhere, ①. f. m. Westindien, Südamerika.  
*elongata* Humb., verlängerte, 4. t. Südamerika.  
*flavescens* W., gelbliche, 4. t. Südamerika.

**Iris** T., Schwertel, III. I. Irideae.

- acuta* W., spitzer, 4. Kn. f. ?  
*aequiloba* Ledeb. (*longiflora* Ledeb.), gleichlappiger, 4. Kn. f. Taurien.  
*alata* Lam. (*microptera* Vahl., *transtagana* Brot.), geflügelter, 4. Zw. k. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.  
*arenaria* W. Kit., Sand-S. 4. Kn. f. Ungarn.  
*biflora* L., zweiblumiger, 4. Kn. f. Portugal, Sibirien, Caucasus.  
*bicolor* Lindl., zweifarbiger, 4. Kn. f. ?  
*biglumis* Vahl (*spuria* Pall., *Pallasii* Fisch., *longispatha*

## Iris

- Bot-mag., *haematophylla* Lk. Ledeb.), zweispelziger, 4. Kn. f. Sibirien.
- Blondowii Ledeb., Blondow's. 4. Kn. f. Altai.
- bohémica Schm. (*Fieberi et nudicaulis* Auctor.), böhmischer, 4. Kn. f. Böhmen, Schlesien.
- caricifolia Pall., riedgrasblättriger, 4. Kn. f. Sibirien.
- caucasica MB. Hoffm., caucasischer, 4. Zw. f. Caucasus.
- chinensis Curt. (*fimbriata* Vent.) chinesischer, 4. Kn. k. China.
- clandestina Lehm., heimlichblühender, 4. Kn. w. Brasilien.
- coelestina Swt., himmelblauer, 4. Kn. f. k. Nordamerika.
- crassifolia Lodd., dickblättriger, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung,
- cristata Ait. (*verna* Walt.), kammförmiger, 4. Kn. f. Virginien.
- cuprea Pursh. (*fulva* Sims.), kupferfarbiger, 4. Kn. f. b. Nordamerika, (Georgien).
- deflexa K. et W., herabgebogener, 4. Kn. k. t. Nepal.
- dichotoma Pall. (*pomeridiana* Fisch.), zweizinkiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- elegans P., zierlicher, 4. Kn. f. ?
- ensata Thbg., schnalblättriger, 4. Kn. k. Japan.
- flavescens Redout., gelblicher, 4. Kn. f. ?
- flavissima Pall., hochgelber, 4. Kn. f. Sibirien, Altai.
- florentina L., florentinischer, 4. Kn. f. Italien, Cyprien.
- b. minor.
- foetidissima L., stinkender, 4. Kn. f. b. k. England, Westeuropa.
- b. fol. variegat.
- furcata M. B., gabelförmiger, 4. Kn. f. Caucasus.
- germanica L. (*nostras* Hort.), deutscher, 4. Kn. f. Europa.
- b. alba.
- glaucescens Bunge, blaugrüner, 4. Kn. f. Altai.
- graminea L., grasartiger, 4. Kn. f. Oesterreich.
- Güldenstädtiana Lepech, Güldenstädt's, 4. Kn. f., Taurien, Caucasus, Sibirien.
- β) ochroleuca MB. (*spuria* Bot. mag.) γ. diluta MB. δ) stenogyna DC. ε) aurea Lk. (*ochroleuca* Bot. mag.) ζ) heterophylla H. Par. (*atomaria* Hort.)
- halophila Pall. (*salsa* Pall.), salzliebender, 4. Kn. f. Sibirien, Altai.
- Hookeri Penny, Hooker's (*tripetala* Bot. mag. non Walt.), Hooker's, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Humei G. Don (*nepalensis* Bot. mag.), Hume's, 4. Kn. f. Nepal.
- humilis MB., niedriger, 4. Kn. f. Caucasus, Sibirien.
- hungarica WK., ungarischer, 4. Kn. f. Ungarn.
- japonica Thbg., japanischer, 4. Kn. h. Japan.
- iberica Stev., iberischer, 4. Kn. Iberien.
- laevigata Fisch., glatter, 4. Kn. f. Dahurien.
- livida Tratt., braunblauer, 4. Kn. f. b. k. Levante.
- longifolia Swt., langblättriger, 4. Kn. f. ?
- longiflora R. et S., langblumiger, 4. Kn. f. ?
- lusitanica Ker (*junceae* Brot.), portugiesischer, 4. Zw. f. b. Portugal.
- lutescens Lam., gelblicher, 4. Kn. f. Schweiz, Frankreich.



## Iris

- mauritanica Clus. (*juncea* Dsf.), mauritanischer, 4. Zw.  
f. b. k. Nordafrika.
- Monnierii DC. Monnier's, 4. Kn. f. Griechenland.
- neglecta Hornem., übersehener, 4. Kn. f. ?
- nepalensis Wall. D. Don, nepal'scher, 4. Kn. k. Nepal.
- notha MB. (*halophila* Ker, W.), verwechselter, 4. Kn.  
f. Caucasus.
- nudicaulis Lam., (*aphylla* Vahl), nacktstengeliger, 4. Kn.  
f. Caucasus.
- pallida Lam. (*odoratissima* Jacq.), bleicher, 4. Kn. f.  
Italien, Griechenland.
- paradoxa Stev., wunderbarer, 4. Kn. f. Iberien.
- persica L., persischer, 4. Zw. f. b. k. Persien.
- plicata Lam., (*amoena* Redout.), gefalteter, 4. Kn. f. ?  
β) major (*plicata* Red).
- prismatica Pursh (*Boltoniana* R. et S., *gracilis* Bigel.  
Bolt.), prismatischer, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Pseudacorus L., Wasser-S., 4. Kn. Wa. f. Europa,  
Sibirien, Carolina.  
b. fol. variegat. c. pallida.
- pumila L., kleiner, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa,  
Taurien.  
a. alba. b. albo-coerulea. c. coerulea. d. vio-  
lacea Swt.
- reticulata MB., netzförmiger, 4. Zw. f. Iberien.
- ruthenica Ker (*caespitosa* Pall.), russischer, 4. Kn. f.  
Sibirien, Dahurien.
- sambucina L., fliederduftender, 4. Kn. f. Südeuropa.  
β) lurida Ait.
- scariosa W., trockenhäutiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- setosa Pall. (*brachycuspis* Fisch., *brevicuspis* Schul.),  
horstiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- sibirica W. (*pratensis* P. Red., *flexuosa* Vahl), sibirischer,  
4. Kn. f. Europa, Nordasien.  
b. alba. c. flore pleno (*missouriensis* plen. Hort.)  
β) sanguinea Don, (*haematophylla* Fisch. non  
Lk., *nertschinskia* Lodd., *orientalis* Vahl).
- sordida W., schmuziggelber, 4. Kn. f. ?
- spuria L. (*spathulata* Lam.), unächter, 4. Kn. f. Ost-,  
West- und Süd-Deutschland, Frankreich.
- squalens L., gelbbunter, 4. Kn. f. Süd- u. Osteuropa.
- subbiflora Brot., zweiblumiger, 4. Kn. f. Portugal.
- susiana L., prächtiger, 4. Kn. f. b. k. Persien.
- Swerti Lam., Swert's, 4. Kn. f. ?
- tangerica H. C., tanger'scher, 4. Kn. f. Nordafrika.
- taurica Lodd., taurischer, 4. Kn. f. Taurien.
- tenax Dougl., zäher, 4. Kn. f. Californien.
- Tigridia Bunge, getigelter, 4. Kn. f. Altai.
- tridentata Pursh. (*tripetala* Ell.), dreizahniger, 4. Kn.  
f. b. Carolina.
- triflora, Balb. Red., dreiblumiger, 4. Kn. f. Italien.
- tuberosa L., knolliger, 4. Kn. f. b. k. Südeuropa,  
Griechenland.
- variegata L., bunter, 4. Kn. f. Oesterreich.  
b. De Berg H. Belg. c. Van de Will H. Belg.
- ventricosa Pall., bauchiger, 4. Kn. f. Sibirien, Dahurien.
- verna Pursh., Frühlings-S., 4. Kn. f. Virginien.
- versicolor L., verschiedenfarbiger, 4. Kn. f. Nord-  
amerika.

## Iris

- virescens* DC. Red., grünlicher, 4. Kn. f. ?  
*virginica* L., virginischer, 4. Kn. f. Nordamerika.  
*xiphoides* Ehrh. (*anglica* Hortul.), englischer, 4. Zw. f.  
 Spanien, Frankreich.

b. fl. pleno.

- Xiphium* L. (*variabilis* Jacq., *hispanica* Hort.), spanischer, 4. Zw. f. Spanien, Portugal.

*angusta* Tbg., (et *bituminosa* Tbg., *ciliata* Tbg., *longifolia* Andr., *Sisyrinchium* L. etc.) v. *Moraea angusta* etc.  
*bicolor* Lindl. (et *moraeoides* Ker.), v. *Dietes bicolor* et *iridioides*, *Northiana* P. v. *Cipura Northiana*, *pavonia* L., *tricuspis* Tbg. etc. v. *Vieusseuxia pavonia* etc.

*Iroucana guianensis* Aubl. v. *Caseria ramiflora*.

- Isachne* RB., Gleichspelze, III. II., Gramineae.  
*australis* RB., neuholländische, 4. k. Neuholland.

- Isanthus* Mchx., Gleichlippler, XIV. I., Labiatae.  
*coeruleus* Mchx., blauer, ☉. f. Nordamerika.

- Isatis* T., Waid, XV. I., Cruciferae.

- aleppica* Scop., aleppischer, ☉. f. Kleinasien.  
*alpina* All., Alpen-W., 4. Italienische Alpen.  
*armena* L., armenischer, ☉. f. Armenien, Caucasus.  
*banatica* Lk., banatischer, ☉. f. Banat.  
*canescens* DC. (*iberica* Stev.), graulicher, ♂. f. Süd-europa, Iberien.  
*costata* C. A. Mey, gerippter, ♂. f. Caucasus.  
*dasycarpa* Ledeb., rauhfrüchtiger, ♂. f. Sibirien.  
*hebecarpa* DC. Fisch., zottigfrüchtiger, ♂. f. Taurien.  
*latisiliqua* Stev. (*cappadocica* Desv.), breitfrüchtiger, ♂. f. Kleinasien, Caucasus.  
*litoralis* DC., strandiger, ♂. f. Taurien.  
*lusitanica* Brot. (*glauca* W.), portugiesischer, ☉. f. Portugal.  
*megacarpa* Fisch., großfrüchtiger, ♂. f. Persien.  
*oblongata* DC., langfrüchtiger, ♂. f. Sibirien.  
*orientalis* W., morgenländischer, ☉. f. Kleinasien.  
*tinctoria* L., gemeiner, ♂. f. Mittel-, Süd- und Ost-europa, Taurien.  
 β) *campestris* Steven, γ) *praecox* Kit., δ) *Villarsii* Gaud. (*alpina* Vill.), ε) *heterocarpa* Andr., ζ) *taurica* MB.

*variegata* Ledeb., bunter, ♂. f. Sibirien.

- Ischaemum* L., Blutgras, III. II., (XXIII. I.), Gramineae.

- aristatum* L., gegranntes, 4. w. Ostindien, China.  
*australe*, RB., südliches, 4. w. t. Neuholland.  
*rugosum* Salisb., runzeliges, ☉. m. w. Ostindien.

- Isertia* Schreb. (P. E. Isert, dänischer Wundarzt auf der Guinea-Küste), VI. I., Rubiaceae.

*coccinea* Vahl, scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.

- Ismelia* Cass., Ismelie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*madeirensis* D. Don, madeirensische, ♀. k. Madeira.

- Ismene* Salisb. Herb., Ismene, VI. I., Marcissee-Amaryllideae.

*Amancaës* Herb., Amancaës-I., 4. Zw. w. Peru.

**Ismene**

*calathina* Herb., becherförmige, 4. Zw. w. Brasilien.

b. *sulphurea* Herb. (*Amancaes-calathina*) Engl.  
Hybride.

*Knightii* K. et W., Knight's, 4. Zw. w. Florida.

*Macleana* Herb., MacLean's, 4. Zw. w. Lima.

*nutans* Herb., nickende, 4. Zw. w. Brasilien.

**Isnardia** L. (A. T. D., d'Isnard, französischer Botaniker),  
IV. 1., Onagrariae.

*palustris* L., Sumpf-I., 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

*hastata* R. et P., v. *Ammannia hast.*

**Isocarpha** RB., Gleichboder, XIX. 1., Compositae-Cor-  
ymbiferae.

*oppositifolia* RB., gegenblätteriger, ♂. w. Westindien.

**Isochilos** RB., Gleichstendel, XX. 1., Orchideae.

*graminifolium* H. B. K., grasblättriger, 4. w. Neu-  
Granada, Jamaica.

*lineare* RB., gleichbreitblättriger, 4. w. Westindien.

*proliferum* RB., sprossender, 4. w. Westindien.

**Isoëtes** L., Brachsenkraut, XXIV. 1., Marsiliaceae.  
(*Rhizocarpace.*)

*lacustris* L., Teich-B., 4. Wa. f. Europa, Asien, Nord-  
amerika.

**Isolepis** RB. (et *Eleogiton* Lk. et *Holoschoenus* Lk.),  
Zartriet, III. 1., Cyperaceae.

*antarctica* R. et S., südliches, 4. k. t. Cap d. g. H.

*atrovirens* (Lk.), schwarzgrünes, 4. f. Nordamerika.

*Eckloniana* Schrad. (*Saviana* Hort.), Ecklon's, 4. k.  
Cap der guten Hoffnung.

*fluitans* RB. (*Eleogiton fluitans* Lk.), fließendes, 4. Wa.  
f. Europa, Neuholland.

*Holoschoenus* RB., knopfgrasartiges, 4. f. Mittel-, Süd-  
und Westeuropa, Asien, Afrika.

α) *Linnaei* Rchb. (*Holoschoenus vulgaris* Lk.),

β) *exserens* Rchb., γ) *filiformis* Rchb., δ) *austra-*  
*lis* Rchb. (*Scirpus romanus* L.)

*marginata* (Thbg.), berandetes, 4. k. Cap d. g. H.

*nodosa* RB., knotiges, 4. k. Neuholland.

*prolifera* RB., sprossendes, 4. k. Cap der guten Hoff-  
nung, Neuholland.

*Saviana* R. et S. (*sicula* Presl.), Savi's, ☉. f. Italien,  
Sicilien.

*setacea* RB., borstiges, ☉. f. Europa, Neuholland.

*supina* RB., niedriges, ☉. f. Europa, Afrika, Ostindien,  
Neuholland.

*tenuissima* D. Don, feines, ☉. f. Nepal.

*angulata* Schrad., *complanata* R. et S., *curvifolia*

Schrad. v. *Finbristylis angulata*, *complanata* et fo-  
*liosa*, *Micheliana* R. et S. v. *Dichostylis Micheliana*.

**Isoplexis** Lindl., Prachtfingerhut, XIV. 1., Personatae-  
Antirrhinae.

*canariensis* Lindl., canarischer, ♀. k. t. Canarische  
Inseln.

*Sceptrum* Lindl., scepterförmiger, ♀. k. t. Madeira.

**Isopogon** RB., Gleichbart, IV. 1., Proteaceae.

*anemonifolius* RB., anemonenblättriger, ♀. t. Neu-  
holland.

*anethifolius* RB., fenchelblättriger, ♀. t. Neuholland.



**Isopogon**

- attenuatus RB., verdünnter,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 axillaris RB., achselständiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 Baxteri RB., Baxter's,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 buxifolius RB., buchsbaumblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 ceratophyllus RB., hornblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 cuneatus RB., keulförmiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 divaricatus RB., ausgesperrter,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 formosus RB., schöner,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 longifolius, RB., langblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 Loudoni Baxt., Loudon's,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 polycephalus RB., vielköpfiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 propinquus Cunn., verwandter,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 spathulatus RB., spathelförmiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
      $\beta$ ) linearis RB.  
 teretifolius RB., rundblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 trilobus RB., dreilappiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Isopyrum** Hall., Doltocke, XIII.  $\text{v. r.}$ , Ranunculaceae.

- grandiflorum Fisch., großblumige, 4. f. b. k. Imaus.  
 thalictroides L. (*aquilegioides* L.) wiesenrautenähnliche,  
 4. f. Ost- und Südeuropa.

*fumarioides* L. v. *Leptopyrum fumarioides*.

**Isotoma** RB., Gleichsäumler, V.  $\text{r.}$ , Campanulaceae-Lo-  
belieae.

- axillaris Lindl., achselblumiger, 4. k. Neuholland.  
 longiflora Presl., langblumiger, 4. w. Westindien.

**Itea** L., Itea, V.  $\text{r.}$ , Corniculatae-Cunoniaceae.

- virginica, L., virginische,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nordamerika.

*Cyrillá* Sw. v. *Cyrilla antillana*.

**Iva** L. Iva, XIX.  $\text{v.}$ , Compositae-Ambrosiaceae.

- annua L., jährige,  $\odot$ . m. f. Südamerika.  
 ciliata W., gefranzte,  $\odot$ . f. Nordamerika.  
 frutescens L., strauchige,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Nord- und Süd-  
 amerika.

*xanthiifolia* Nutt. v. *Cyclachaena xanthiifolia*.

**Ixeris** Cass., Ixeris, XIX.  $\text{r.}$ , Compositae-Cichoriaceae.

- versicolor DC., verschiedenfarbige,  $\odot$ . f. Nordchina,  
Dahurien.

**Ixia** L., Ixie, III.  $\text{r.}$ , Irideae.

- aristata Thbg., gegrannte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 aulica Ait. (*phlogiflora* Red.), Büschel-I., 4. Zw. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 capillaris L. (*lancea* Jacq., *rapunculoides* Red.), haar-  
 förmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
 capitata Andr., kopfförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 coccinea Thbg., scharlachfarbige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 columellaris Ker, säulenförmige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 conica Salisb. (*dubia* Vent.), kegelförmige, 4. Zw. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 craterioides Ker (*speciosa* Andr.), großschlundige, 4.  
 Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
 crispa Thbg., krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
 erecta L. Berg., aufrechte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
     b. incarnata. c. lutea.  
 flexuosa L. (*polystachya* Red., *patens* W.), gebogene.  
 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
 fucata Ker, geschminkte, 4. Zw. k. Cap d. guten H.

**Ixia**

*hybrida* Ker, Bastard-I., 4. Zw. k. Cap der guten H.  
*incarnata* Jacq. (*capillaris* Bot. mag.), fleischfarbige, 4.

Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*linearis* L. (*capillaris* Auctor., *gracillima* Ker), gleichbreitblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*maculata* L., gefleckte, 4. Zw. k. Cap der guten H.

β) *viridiflora* Lam. γ) *ochroleuca*.

*monadelpha* la Roche, einbrüderige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *curta* Andr.

*odorata* Hort., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*ovata* Andr., eiförmige, 4. Zw. k. Cap der guten H.

*patens* Ait. (*filiformis* Vent., *leucantha* Jacq., *candida* Red.), abstehende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

β) *punicea* Spgl.

*retusa* Salisb. (*polystachya* Jacq.), abgestutzte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*scillaris* L. (*pentandra* Thbg., *reflexa* Andr.), scillaähnliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*venosa* Lk., aderige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

*amoena* Lk. etc. v. *Watsonia amoena* etc., *angusta* Vahl. (*linearis* Jacq.) etc. v. *Hesperantha angusta* etc., *aristata* Ait. (*grandiflora* Curt.) etc. v. *Sparaxis grandiflora* etc., *bicolor* Bot. Mag. v. *Synnotia bicolor*, *Bulbocodium* L. et *coelestina* Bartr. etc. v. *Trichonema Bulbocodium* etc., *corymbosa* Thbg. etc. v. *Lapeyrousia corymbosa* etc. *crocata* L. etc. v. *Waitzia crocata* etc., *excisa* Thbg. etc. v. *Geissorhiza excisa* etc. *fugacissima* L. v. *Galaxia graminea*, *thyrsiflora* La Roch. v. *Aristea major*, *villosa* Ait. etc. v. *Babiana villosa*

**Ixodia** RB., Ixodie, XIX. 1., Compositae-Helichryseae.

*achilleoides* RB., garbenähnliche, f. t. Neuholland.

*Ammobium* Spgl. v. *Ammobium alatum*.

**Ixora** L. (malabarischer Name), IV. 1., Rubiaceae.

*arborea* Roxb. (*Pavetta* Andr.), baumartige, f. w. Ostindien.

*Bandhuca* Roxb. (*coccinea* L., *arborea* Lodd.), *Bandhuca*-I., f. w. Ostindien.

*barbata* Roxb., bärtige, f. w. Ostindien.

*blanda* Ker (*alba* Roxb.), weiße, f. w. Ostindien.

*brachiata* Roxb., armförmige, f. w. Brasilien.

*crocata* Ker, Lindl. (*chinensis* Lam.), safranfarbige, f. w. Ostindien, China.

*cuneifolia* Roxb., keilblättrige, f. w. Ostindien.

*flava* Lodd., gelbe, f. w. Ostindien.

*fulgens* Roxb. (*lanceolata* Lam., *longifolia* Sm.), leuchtende, f. w. Ostindien.

*grandiflora* Ker (*coccinea* L.), großblumige, f. w. Ostindien.

*incarnata* DC. Roxb., fleischfarbige, f. w. Ostindien.

*obovata* Roth (*purpurea* Fisch.), verkehrteiförmige, f. w. Ostindien.

*parviflora* Vahl, kleinblumige, f. w. Ostindien.

*rosea* Wall., rosafarbige, f. w. Ostindien.

*sessilis* Wall., sitzende, f. w. Ostindien.

*stricta* Roxb. (*coccinea* Curt., *speciosa* W.), steife, f. w. China, Ostindien.

## Ixora

- undulata* Roxb., wellige, f. w. Ostindien.  
*americana* Jacq. v. *Bouvardia Jacquini. americana* Sw. v. *Tetramerium odoratissimum. fasciculata* Sw. (et *spinosa* Lam.) v. *Chomelia fasciculata et spinosa. paniculata* Lam., *Pavetta* Roxb. v. *Pavetta indica*.
- Jaborosa** Juss. (arabischer Name), V. 1., Solanaceae.  
*integrifolia* Lam., ganzblättrige, f. t. w. Buenos Ayres.  
*runcinata* Lam., schrotsägenförmige, f. t. Südamerika.
- Jacaranda** Juss. (brasilianischer Name), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.  
*bahamensis* Bot. mag., bahamische, f. t. Bahamische Inseln.  
*brasiliana* P., brasilianische, f. w. Brasilien.  
*Copaja* D. Don (*procera* Spgl.), *Copaja-J.*, f. w. Guiana.  
*filicifolia* D. Don (*rhombofolia* Mey.), farrnblättrige, f. w. Westindien, Surinam.  
*mimosaeifolia* D. Don, Ker (*ovalifolia* RB.), mimosenblättrige, f. w. Brasilien.  
*pubescens* Lodd., weichhaarige, f. w. ?  
*tomentosa* RB., filzige, f. w. Brasilien.
- Jacksonia** RB. (G. Jackson, englischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.  
*scoparia* RB., besenartige, f. t. Neusüdwallis.  
*spinosa* RB., dornige, f. t. Neuholland.  
*Sternbergiana* Hügel, Sternberg's, f. t. Neuholland.  
*thesioides* Ait., thesiumähnliche, f. t. Neuholland.
- Jacobaea* Auctor. v. *Senecio*.
- Jacquinia** L. (N. J. v. Jacquin, berühmter österreichischer Botaniker), V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.  
*arborea* Vahl, baumartige, f. w. Westindien.  
*armillaris* Jacq., bewaffnete, f. w. Westindien.  
*linearis* Jacq., gleichbreitblättrige, f. w. Westindien.  
*macrocarpa* Cav. (*aurantiaca* Ait.), grofsfrüchtige, f. w. Mexico.  
*ruscifolia* Jacq., mäusedornblättrige, f. w. Westindien.
- Jaegeria abyssinica* Spgl. v. *Guizotia oleifera. calendulacea* Spgl. v. *Wedelia calendulacea*.
- Jaltomata** Schtdl., Jaltomata, V. 1., Solanaceae.  
*edulis* Schtdl., geniefsbare, ? ♂. m. f. Mexico.
- Jambolifera odorata* Lour. et *pedunculata* Lour. v. *Cymnasma odorata* etc.
- Jambosa** Rmph., Jambusenbaum, XII. 1., Myrtaceae.  
*amplexicaulis* DC., stengelumfassender, f. w. Ostindien.  
*aquea* DC. (Roxb.), wässriger, f. w. Ostindien.  
*macrophylla* DC. (Lam.), grofsblättriger, f. w. Ostindien.  
*malaccensis* DC., malackischer, f. w. Ostindien.  
*myrtifolia* (Ker), myrthenblättriger, f. k. Neuholland.  
*vulgaris* DC., gemeiner, f. w. t. Ostindien.
- Janipha** H. B. K. (brasilianischer Name), XXI. 1., Triococcae-Euphorbiaceae.  
*aesculifolia* H. B. H., kastanienblättrige, f. w. Neuspanien.  
*angustifolia* Pohl, schmalblättrige, f. w. Brasilien.  
*foetida* H. B. K., stinkende, f. w. Neuspanien, Mexico.  
*Löfflingii* H. B. K., Löffling's, f. w. Südamerika.



## Janipha

Manihot H. B. K., Cassava-J.,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien, Südamerika.

*Jantha pallidiflora* Hook. v. *Jonopsis utricularioides*.

**Jasione** L., Schafrapunzel, V. 1., Campanulaceae.

*montana* L., gemeine,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.

*perennis* Lam., ausdauernde,  $\frac{1}{2}$  f. Süd- und Westeuropa.

$\beta$ ) *humilis* P.

**Jasminum** T., Jasmin, II. 1., Sapotaceae-Jasmineae.

*acuminatum* RB., zugespitzter,  $\frac{1}{2}$  Sch. t. k. Neuholl.

*angustifolium* W. (*triflorum* P.), schmalblättriger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*arborescens* Roxb. (*multiflorum* Roth), baumartiger,  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  w. Bengalen.

*auriculatum* Vahl, geöhrt,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Mascarenas.

*azoricum* L., azorischer,  $\frac{1}{2}$  k. Azoren.

*bracteatum* Roxb., deckblättriger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostind.

*campanulatum* Lk., glockiger,  $\frac{1}{2}$  w. ?

*capense* Thbg. (*angulare* Vahl), kapischer,  $\frac{1}{2}$  t. Cap der guten Hoffnung.

*dispermum* Wall., zweisamiger,  $\frac{1}{2}$  t. Nepal.

*divaricatum* RB., ausgesperrter,  $\frac{1}{2}$  Sch. t. Neuholland.

*elongatum* Vahl, verlängerter,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*flexile* Vahl (*mauritianum* W.), gebogener,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*fruticans* L., strauchiger,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Südeuropa.

*glaucum* Ait. (*rivulare* Salisb.), blaugrüner,  $\frac{1}{2}$  t. Cap der guten Hoffnung.

*gracile* Andr. (*geniculatum* Vent.), schlanker,  $\frac{1}{2}$  t. Norfolkinsel.

*grandiflorum* L., großblumiger,  $\frac{1}{2}$  Sch. k. t. Ost- und Westindien.

*heterophyllum* Wall. (Roxb.), verschiedenblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Nepal.

*hirsutum* L. (*pubescens* W., *multiflorum* Andr.), rauhaariger,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien, China.

*humile* L., niedriger,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Südeuropa.

*Lanceolaria* Roxb., lanzettlicher,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*latifolium* Roxb., breitblättriger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*laurifolium* Roxb., lorbeerblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*lineare* RB., gleichbreitblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

*odoratissimum* L., feinriechender,  $\frac{1}{2}$  k. Madeira.

*officinale* L., officineller,  $\frac{1}{2}$  Sch. f. b. k. Südeuropa, Ostindien.

*paniculatum* Roxb., rispiger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Südchina.

*pubigerum* D. Don (*Wallichianum* Lindl.), feinhaariger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Nepal.

*revolutum* Sims (*chrysanthemum* Roxb., *triumphans* Hort.), zurückgerollter,  $\frac{1}{2}$  Sch. k. t. Nepal.

*Sambac* L., arabischer,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien, Arabien.

b) *flore pleno*. c) *trifoliatum*.

*scandens* Vahl, klimmender,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

*simplicifolium* Forst., einfachblättriger,  $\frac{1}{2}$  Sch. t. Südseeinseln.

*stenopetalum* Lindl., schmalkroniger,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*tortuosum* W. (*flexile* Jacq.), gewundener,  $\frac{1}{2}$  Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

*trinerve* Vahl, dreinerviger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

**Jasminum**

- tubiflorum Roxb., röhrenblumiger,  $\text{f. w.}$  Malacka.  
 undulatum W., wellenförmiger,  $\text{f. Sch. w.}$  China.  
 zeylanicum Mack. C., zeylonischer,  $\text{f. Sch. w.}$  Ceylon.

**Jasonia** Cass., Jasonie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- glutinosa Cass., DC., klebrige, 4. f. Südeuropa.  
 tuberosa DC. (*radiata* Cass.), knollige, 4.  $\text{f. Kn. f. b. k.}$  Südfrankreich.  
 sicala DC., sicilianische,  $\odot \text{ } \text{f.}$  West- und Südeuropa, Creta, Syrien, Nordafrika.  
 a) discoidea.  $\beta$ ) radiata.

**Jatropha** L., Brechnuss, XXI. x. (XVI. VI.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

- australis Lodd., neuholländische,  $\text{f. w. t.}$  Neuholland.  
 coccinea H., Cels., Lk., scharlachfarbige,  $\text{f. w. ?}$  Cuba.  
 Curcas L., schwarze,  $\text{f. w.}$  Cuba, Neugranada.  
 glandulosa Vahl, drüsige,  $\text{f. w.}$  Arabien.  
 gossypifolia L., baumwollenblättrige,  $\text{f. w.}$  Südamer.  
 integerrima Jacq., ganzblättrige,  $\text{f. w.}$  Cuba.  
 multifida L., vieltheilige,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
 panduraefolia Andr. (*hastata* Jacq., *acuminata* Lam.),  
 geigenblättrige,  $\text{f. w.}$  Cuba.  
 peltata H. B. K., schildförmige,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
*elastica* L. v. *Siphonia elastica*. *fragrans* H. B. K.  
 etc. v. *Cnidoscolus fragrans* etc. *Janipha* L. etc.  
 v. *Janipha Löfflingii* etc.

**Jaumea linearis** P. v. *Kleinia linearifolia*.**Jeffersonia** Bartr. (T. Jefferson, Präsident der vereinigten Staaten), VIII. I., Papaveraceae.

- diphylla Bartr., zweiblättrige, 4. f. Nordamerika.

**Johnia** Roxb. (John, dänischer Missionär zu Tranquebar), III. I., Evonymaceae-Hippocrateaceae.

- coromandeliana Roxb., coromandelische,  $\text{f. Sch. w.}$  Coromandel.

- salacioides Roxb., salaciaähnliche,  $\text{f. w.}$  Bengalen.

**Joliffia** Boj. (Joliff, Freund von Bojer), XXII. XIII., Cucurbitaceae.

- africana Del., afrikanische, 4. Sch. w. Zanguebar.

**Jonesia** Roxb. (William Jones, Richter in Bengalen und Pflanzenforscher), VII. I., Leguminosae - Caesalpinieae.

- Asoca Roxb. (*pinnata* W.), gefiederte,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
 scandens Roxb., klimmende,  $\text{f. Sch. w.}$  Ostindien.

**Jonidium** Vent., Strauchveilchen, V. I., Violaceae.

- capense R. et S., capisches,  $\text{f. t.}$  Cap der gut. Hoffn.  
 heterophyllum Vent., verschiedenblättriges,  $\text{f. t. w.}$  China.

- polygalaefolium Vent. (*verticillatum* R. et S.), polygalablättriges,  $\text{f. 4. t.}$  Mexico.

- Sprengelianum R. et S., Sprengel's, 4. k. Pensylvanien.  
 strictum Vent., steifes, 4. w. Westindien.

- verbenaceum H. B. K., verbenaähnliches,  $\text{f. 4. f. t. w.}$  Mexico.

- Hybanthus* R. et S. vid. *Corynostyles Hybanthus*.

- Ipecacuanha* Vent. v. *Pombalia Ipecac. longifolium* R. et S. v. *Noisetia longifolia*.

**Jonopsis** Kunth, Veilchenstendel, XX. I., Orchideae.

**Jonopsis**

tenera Lindl., zarter, 4. w. Cuba.

teres Lindl., runder, 4. w. Westindien.

utricularioides Lindl., utriculariaähnlicher, 4. w. Westindien.

**Josephinia** Vent. (Josephine, Kaiserin der Franzosen, großmüthige Beförderin der Botanik), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

Imperatricis Vent., kaiserliche, ♂. t. Neuholland.

**Jossinia** Commers., Jossinia, XII. I., Myrtaceae.

orbiculata DC., kreisförmige, 5. w. Mascarenas.

pinnata Hort., gefiederte, 5. w. ?Brasilien.

**Juannulloa parasitica** R. et P. v. Ulloa parasitica.

**Juglans** L., Wallnufs, XXI. IX., Juglandaceae.

cinerea L., aschfarbige, 5. f. Nordamerika.

nigra L., schwarze, 5. f. Nordamerika.

regia L., gemeine, 5. f. Griechenland, Kleinasien, Persien.

b) maxima. c) tenera. d) serotina. e) laciniata.

*fraxinifolia* Lam. (*pterocarpa* W.) vid. *Pterocarya caucasica*. Hinsichtlich der übrigen s. *Carya*.

**Juncus** T., Simse, VI. I., Juncaceae.

acutus L., spitzige, 4. f. England, Südeuropa, Nordamerika.

alpinus Vill. (*fuscoater* Schrbr., *ustulatus* Hoppe, *nodulosus* Wahlbg., *geniculatus* Schrk., *alpestris* et *rariflorus* Hartm.), Alpen-S., 4. f. Europäische Alpen.

arcticus W. (*acuminatus* Balb.), nördliche, 4. f. Lappland, Island, tyroler und schweizer Alpen.

aristulatus Mchx. (*aristatus* P., *marginatus* Mühlbg.), grannige, 4. f. Nordamerika.

balticus Dethar. (*helodes* Lk.), baltische, 4. f. Nord- und westeuropäische Meerufer.

biglumis L., zweispelzige, 4. f. Nordeuropa.

bufonius L., Kröten-S., ☉. f. Europa.

β) fasciculatus Koch (*hybridus* Brot.).

capensis Thbg., capische, 4. k. Cap der guten Hoffn.

capitatus Weig. (*ericetorum* Poll., *gracilis* Roth, *triandrus* Gouan), kopfförmige, ☉. f. Europa.

castaneus Sm. (*triceps* W.), kastanienbraune, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen, Sibirien.

compressus Jacq. (*bulbosus* L.), flachhalmige, 4. f. Europa.

conglomeratus L., knaulförmige, 4. f. Europa.

diffusus Hoppe, weitschweifige, 4. f. Deutschland, Schweiz.

effusus L., weitrispige, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

filiformis L., fadenförmige, 4. f. Europa.

Gerardi Lois. (*bottnicus* Wahlenb., *consanguineus* Koch et Ziz., *coenosus* Bichen.), Gerard's, 4. f. Europa.

Gesneri Sm. (*gracilis* E. Bot., *tenuis* Hook.), Gesner's, 4. f. Schottland.

glaucus Ehrh., blaugrüne, 4. f. Europa, Asien, Amerika.

Jacquini L. (*atratus* Lam., *biglumis* Jacq.), Jacquin's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

lamprocarpus Ehrh. (*adscendens* Host, *articulatus* β. L.), glanzfrüchtige, 4. f. Europa.



## Juncus

β) fluitans Koch.

maritimus Lam. (*rigidus* Dsf.), Strand-S., 4. f. England, Südeuropa, Nordafrika, Nordamerika.

monanthos Jacq. (*Hostii* Tausch), einblumige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

nigritellus D. Don (*polycephalus* Hook.), schwärzliche, 4. f. Schottland, Westdeutschland.

obtusiflorus Ehrh. (*bifolius* Hoppe, *retroflexus* Rafn, *divergens* Koch, *Neesii* Hell.), stumpfblumige, 4. f. Europa.

paniculatus Hopp., rispige, 4. f. Oesterreichisches Litorale.

pauciflorus RB., wenigblumige, 4. k. Neuholland.

planifolius RB., flachblättrige, 4. k. Neuholland.

plebejus RB., gemeine neuholländische, 4. k. Neuholl.

polycephalus Mchx., vielköpfige, 4. f. Nordamerika.

pygmaeus Thuill., zwergige, 4. f. Dänemark, Frankreich.

squarrosus L., sparrige, 4. f. Europa.

stygius L., langfadige, 4. f. Scandinavien, Tyrol, Kärnthen.

supinus Mchx. (*uliginosus* Roth, *verticillatus* P., *subverticillatus* Wulff., *fluitans* Lam., *setifolius* Ehrh.), niedrige, 4. f. Europa, Nordamerika.

sylvaticus Reich. (*acutiflorus* Ehrh., *subnodulosus* Schrk.), Wald-S., 4. f. Europa.

β) melananthos Rchb. (*brevirostris* N. E.).

Tenageja Ehrh., Teich-S., 4. f. Mittel- u. Nordeuropa.

tenuis W. (*aristatus* Lk.), feine, 4. f. Nordamerika, Süddeutschland.

trifidus L., dreispaltige, 4. f. Europäische Alpen.

triglumis L., dreispaltige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

vaginatus RB., scheidige, 4. f. Neuholland.

valvatus Lk., klappige, 4. f. Portugal.

Hinsichtlich der übrigen s. Luzula.

## Juniperus T., Wachholder, XXII. XIII., Coniferae.

barbadensis L., westindischer, 5. k. t. Florida, Westindien.

bermudiana L., bermudischer, 5. k. Bermudische Inseln.

chinensis L., chinesischer, 5. k. China.

β) Smithii Loud.

communis L., gemeiner, 5. f. Europa, Mittelasien.

b) suecica Mill. c) oblonga Hort. d) oblonga pendula Hort. e) canadensis Lodd. f) depressa Pursh.

drupacea La Bill., steinfruchtartiger, 5. k. f. b. Syrien.

excelsa MB., hoher, 5. f. Sibirien, Nepal.

macrocarpa Sibth. (*Oxycedrus* Auctor.), großfrüchtiger, 5. f. b. Griechenland, Illyrien.

nana W. (*daurica* et *alpina* Hort., *sibirica* Burgsd., *communis* γ. *montana* Ait., *communis* γ. *alpina* Gaud.), zwergiger, 5. f. Mittel- und Ostdeutschland, Schweiz, Mittel- und Nordasien.

nepalensis Hort., nepal'scher, 5. f. b. Nepal.

oblonga MB., länglicher, 5. f. Caucasus.

Oxycedrus L., spanischer, 5. k. f. b. Südeuropa, Caucasus.

phoenicea L., dichtnadeliger, 5. f. Südeuropa, Mittelasien, Südsibirien.

β) lycia L.

**Juniperus**

*prostrata* Mchx. (*repens* Nutt.), gestreckter, ♂. f. Nordamerika.

*recurva* Hamilt., zurückgekrümmter, ♂. f. b. Nepal.

*Sabina* L., stinkender (Sadebaum), ♂. f. Süd- und Westeuropa, Sibirien.

a) *cupressifolia* Ait. (*lusitanica* Mill.). b) *tamariscifolia* Ait. c) fol. variegat. d) *alpina* Lodd.

*squamata* D. Don, Lamb., schuppiger, ♂. f. b. Nepal.

*thurifera* L. (*hispanica* Lam.), Weihrauchgebender, ♂. f. b. k. Spanien, Portugal.

*uvifera* D. Don, traubiger, ♂. f. b. Feuerland.

*virginiana* L. (*caroliniana* du Roi), virginischer, ♂. f. Nordamerika.

b) *humilis* Lodd.

**Jurinea** Cass. (Jurine, französischer Naturforscher), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

*alata* Cass., geflügelte, 4. f. Sibirien.

*cyanoides* DC., kornblumenähnliche, 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) *Pollichiana* DC., Deutschland.

*elegans* (Stev.), zierliche, 4. f. Sibirien.

*humilis* DC., niedrige, 4. k. Nordafrika.

*linearifolia* DC., gleichbreitblättrige, 4. f. Sibirien.

*mollis* Rchb., weiche, 4. f. Oesterreich, Illyrien, Tau-rien, Sibirien, Griechenland.

*polyclonos* DC., sparrige, 4. f. Caucasus, Sibirien.

*spectabilis* Fisch. et Mey., ansehnliche, ♂. f. Süd-rußland.

*subacaulis* Fisch. et Mey., stengellose, 4. f. Nordpersien.

**Jussieua** Houst., L. (Familie v. Jussieu, berühmte französische Botaniker), VIII. 1. (X. 1.), Onagrariae.

*erecta* L. (*angustifolia* Lam.), aufrechte, ☉. f. Ost- und Westindien, Virginien, Carolina.

*grandiflora* Mchx., großblumige, 4. k. Carolina.

*hirta* L., kurzhaarige, ♂. ♂. w. Westindien.

*leptocarpa* Nutt., schlankfrüchtige, ☉. ♂. f. Nordamer.

*linifolia* Vahl, leinblättrige, ♂. w. Südamerika.

*natans* Humb., Bonpl., schwimmende, 4. Wa. w. Neu-Granada.

*octonervia* Lam. (*octovalvis* Sw.), achternervige, ♂. w. Westindien.

*ovalifolia* Sims, eiblättrige, ♂. w. Ostindien, Madagascar.

*pubescens* L., weichhaarige, ♂. ♂. w. Südamerika.

*repens* L., kriechende, 4. w. Ostindien.

*revolutifolia* Bernh., zurückgerollte, ☉. f. ?

*sagittata* Poir., pfeilblättrige, ♂. w. Westindien.

*scabra* W. (*acuminata* Sw.), scharfe, 4. Wa. w. Westindien, Brasilien.

*suffruticosa* L. (*villosa* Lam.), strauchige, 4. ♂. w. Ostindien.

*variabilis* Mey., veränderliche, ♂. w. Guiana.

**Justicia** L. (J. Justice, schottischer Gärtner und Botaniker), II. 1., Acanthaceae.

I. *Adhatoda* Herm. N. E.

*Adhatoda* L., malabarische, ♂. k. t. Ostindien.

*Betonica* L. (*pseudo-Betonica* Roth, *ochroleuca* Blume), Betonien-J., ♂. w. Ostindien.

## Justicia

ramosissima Roxb., ästige, ♀. w. Coromandel.

II. Andrographis Wall.

echioides L., natterkopfähnliche, 4. w. Ostindien.

paniculata Burm., rispige, ☉. ♀. w. Ostindien.

III. Beloperone N. E.

oblongata Lk. et Otto (*nodosa* Hook.), verlängerte, ♀. w. Brasilien.

plumbaginifolia Jacq., plumbagoblätterige, ♀. w. Brasil.

IV. Cryptophragmium N. E.

venusta Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

V. Gendarussa Rmph.

furcata Jacq. (*peruviana* Cav.), gabelige, ♀. w. Peru, Neuspanien.

Gendarussa L., weidenblätterige, ♀. w. Ostindien.

β) Dohona Hamilt.

ventricosa Wall., bauchige, ♀. w. Ostindien.

VI. Graptophyllum N. E.

picta L., geschmückte, ♀. w. Ostindien.

b) lurido sanguinea.

VII. Hemiadelpsis N. E.

polysperma Roxb., vielsamige, ☉. ♂. w. Bengalen.

VIII. Justicia genuina N. E.

alba Roxb., weiße, ♀. w. Ostindien.

amabilis Hook., liebliche, ♀. w. ?

bracteolata Jacq., deckblätterige, ♀. w. Caracas.

caracasana Jacq., caracasanische, ♀. w. Caracas.

carnea Lindl., fleischfarbige, 4. ♀. w. Brasilien.

carthagenensis Jacq., carthagenische, ♀. w. Carthagen, Martinique.

ciliaris L. (*ciliata* Jacq.), gefranzte, ☉. w. m. Westind.

coccinea Aubl., scharlachfarbige, ♀. w. Guiana.

comata L., Sw., schopfige, 4. w. Westindien.

cuspidata Vahl, langspitzige, ♀. w. Arabien.

Echbolum L., grünblühende, ♀. w. Ostindien, Arabien.

elongata Vahl, verlängerte, 4. w. Ostindien.

eustachiana Jacq., eustachische, ♀. w. Antillen.

formosa W., schöne, ♀. w. ?

geniculata Sims, gegliederte, ♀. w. Caribäen.

hispida W., steifhaarige, ♀. w. Sierra Leone.

humilis Mchx., niedrige, 4. k. Südcarolina.

hyssopifolia L., ysopblätterige, ♀. k. Canarische Inseln.

Keriana Swt. (*eustachiana* Bot. reg.), Ker's, ♀. w. Ostindien.

ligustrina Vahl, ligusterähnliche, ♀. w. Ostindien.

lithospermifolia Jacq., steinsamenblätterige, ♀. w. Peru.

lucida Andr., spiegelnde, ♀. t. Barbados.

maculata Lodd., gefleckte, ♀. t. Ostindien.

nemorosa Sw., Hain-J., 4. w. Westindien.

nigricans Lour., schwärzliche, ♀. w. Cochinchina.

nitida Jacq. (*brachiata* Rich.), glänzende, ♀. w. Südamerika.

orchiodes L., orchisähnliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

pectoralis Jacq., geharnischte, 4. ♀. w. Antillen.

pedunculosa Mchx. (*americana* Vahl, *ensiformis* Ell.), schwerblätterige, 4. k. Nordamerika.

periplocaefolia Jacq., periplocablätterige, ♀. w. Caracas.

polysperma Roxb., vielsamige, ☉. w. m. Bengalen.



**Justicia**

- polystachya Lam., vielährige,  $\text{f. w.}$  Guiana.  
 pumila Diet., kleine,  $\text{f. t. ?}$   
 quadrangularis Hook., vierkantige,  $\text{4. w.}$  Mascarenas.  
 quadrifida Vahl (*coccinea* Cav.), vierspaltige,  $\text{f. k.}$   
 Neuspanien.  
 reflexiflora Rich., zurückgebogene,  $\text{4. f. w.}$  Westindien.  
 salicina Juss., weidenähnliche,  $\text{f. w.}$  Peru.  
 salviaefolia H. B. K., salbeiblätterige,  $\text{f. t.}$  Mexico.  
 secunda Vahl, einseitige,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
 speciosa Roxb., prächtige,  $\text{4. f. w.}$  Bengalen.  
 vitellina Roxb., dottergelbe,  $\text{f. w.}$  Ostindien.

**IX. Peristrophe N. E.**

- bicalyculata Vahl, doppelkelchige,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 Lanceolaria Roxb., lanzettliche,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 Roxburghiana R. et S. (*tinctoria* Roxb.), Roxburgh's,  
 $\text{4. f. w.}$  Ostindien.

**X. Phlogacanthus N. E.**

- asperula Wall., rauhe,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
 curviflora Wall., krummblumige,  $\text{f. w.}$  Ostindien.  
 guttata Wall., getüpfelte,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 thyrsoflora N. E., straußblumige,  $\text{f. w.}$  Bengalen.  
 tubiflora Hamilt., röhrenblumige,  $\text{f. w.}$  Ostindien.

**XI. Rhinacanthus.**

- nasuta L., schnabelförmige,  $\text{f. w.}$  Ostindien.

**XII. Rostellaria N. E.**

- diffusa Vahl (*Vahlia* R. et S.), weitschweifige,  $\text{f. w.}$   
 Ostindien.  
 procumbens L., niederliegende,  $\odot. f.$  Ostindien.

**XIII. Schaueria N. E.**

- calycotricha Lk. et Otto (*flavicomma* Lindl.), schönkelchige,  
 $\text{f. w.}$  Brasilien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: Apher-  
 landra, Barleria, Crossandra, Dicliptera, Elytraria,  
 Eranthemum, Hypoestes.

**Kaempferia L. (E. Kaempfer, ein Deutscher, berühmt als Reisender und Naturforscher), I. 1., Scitamineae-Amomeae.**

- angustifolia Sm. (*undulata* Lk.), schmalblätterige,  $\text{4. w.}$   
 Ostindien.  
 diversifolia Lk., verschiedenblätterige,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 elegans Wall., zierliche,  $\text{4. w.}$  Pegu.  
 Galanga L., Galanga-K.,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 latifolia Don, breitblätterige,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 marginata Carey, berandete,  $\text{4. w.}$  Ostindien.  
 ovalifolia Roxb., eiblätterige,  $\text{4. w.}$  Malacka.  
 pandurata Roxb. (*ovata* Rosc.), geigenförmige,  $\text{4. w.}$   
 Ostindien.

Roscoeana Wall., Roscoe's,  $\text{4. w.}$  Nepal.

rotunda L., rundliche,  $\text{4. w.}$  Ostindien.

**Kageneckia R. et P., Kageneckie, XXII. XI., Rosaceae.**

- crataegifolia Lindl. (*oblonga* D. Don), weißdornblätterige,  
 $\text{f. k. ?}$  Chili.

**Kalanchoë Adans (chinesischer Name), VIII. IV., Cor-niculatae-Crassulaceae.**

- acutiflora Haw., spitzblumige,  $\text{f. t.}$  Ostindien.  
 aegyptiaca DC., ägyptische,  $\text{f. t.}$  Aegypten.

**Kalanchoë**

- ceratophylla Haw., hornblättrige, ♀. t. China.  
 crenata DC., gekerbte, ♀. t. Westafrika.  
 laciniata DC., schlitzbilättrige, ♀. t. Ostindien.  
 rotundifolia Haw., rundblättrige, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 spathulata DC., spatelförmige, ♀. t. China.

**Kalmia** L. (P. Kalm, ein Schwede, welcher Nordamerika hereis'te), X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

- angustifolia L., schmalblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.  
 b. rubra. c. foliis variegatis. d. minima. e. nana.  
 f. rosea. g. pumila. h. ovata Pursh.  
 cuneata Mchx., keilblättrige, ♀. f. b. k. Carolina.  
 glauca Ait. (polifolia Wangenh.), blaugrüne, ♀. f. b.  
 Nordamerika.

β) rosmarinifolia Pursh.

- hirsuta Walt. (ciliata Bartr.), rauhhaarige, ♀. f. b. k.  
 Carolina.

- latifolia L., breitblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

**Kalosanthes** Haw., (*Dietrichia* Tratt.), Schöndickblatt,  
V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

- bicolor, Haw., zweifarbiges, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.  
 biconvexa Haw., doppeltgewölbt, ♀. t. Cap d. g. H.  
 coccinea Haw., scharlachfarbiges, ♀. t. Cap d. gut. H.  
 b. flore albo Brad.

- cymosa Haw., afterdoldiges, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.  
 flava Haw., gelbes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- jasminea Haw., jasminblumiges, ♀. t. Cap d. g. H.

- media Haw., mittleres, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- odoratissima Haw., wohlriechendes, ♀. t. Cap d. g. H.

- versicolor Haw., buntes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

**Kaulfussia** N. E. (G. F. Kaulfuss, Professor der Botanik zu Halle), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- amelloides N. E., amellusähnliche, ☉. f. Cap d. g. H.

**Kennedy** Vent. (Kennedy, englischer Handelsgärtner),  
XVII. 14., (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.**I. Genuinae.**

- dilatata Cunn., verbreiterte, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Marryattae Lindl., Marryatt's, ♀. Sch. t. Neuholland.

- nigricans Lindl., schwärzliche, ♀. Sch. t. Neuholland.

- prostrata RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.

b. minor.

- rubicunda Vent., dunkelrothe, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Stirlingi Lindl., Stirling's, ♀. Sch. t. Neuholland. (Schwanenflufs.)

**II. Hardenbergia** Benth.

- inophylla Cunn., nervenblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

- monophylla Vent. (*Glycine bimaculata* Curt.), einblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

β) longeracemosa Lindl.

- macrophylla Lindl., grofsblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland. (Schwanenflufs.)

- ovata Ker (*latifolia* Lindl.), eiförmige, ♀. Sch. t. Neuholland.

**III. Zichya** Hügel, Benth.

- coccinea Vent., scharlachfarbig, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Comptoniana Lk., Compton's, ♀. Sch. t. Neuholland.

- glabrata Lindl., glatte, ♀. Sch. t. Neuholland.

**Kennedy**

*heterophylla* Mack., verschiedenblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

*Molly Hügel, Molly's*, ♀. Sch. Neuholland (Schwanenfluß). *parviflora* Mack., kleinblumige, ♀. Sch. t. Neuholland.

IV. Dubiae.

*apetala* Lodd., blüthenlose, ♀. Sch. t. ?

*sericea* Cunn., seidenhaarige, ♀. Sch. t. Neuholland.

**Kentrophyllum** Neck., Stachelsaflor, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

*arborescens* Hook., baumartiger, ♀. k. Spanien.

*dentatum* DC. (*rubrum* Lk.), gezahnter, ☉. f. Griechenl.

*glaucum* Fisch. et Mey., blaugrüner, ☉. f. Caucasus.

*lanatum* DC., wolliger, ☉. f. Südeuropa.

*mareoticum* DC., mareotischer, ♀. k. Aegypten.

*tauricum* Fisch. et Mey., taurischer, ☉. f. Taurien.

**Keraudrenia** Gay., Keraudrenia, V. III., Malvaceae-Büttneriaceae.

*hermanniaefolia* Gay., hermanienblättrige, ♀. t. Westindien, Neuholland.

**Keria** DC. (*Kerria* Auctor.), (W. Ker, englischer Botaniker), XII. III., Rosaceae-Spiraeaceae.

*japonica* DC., japanische, ♀. f. Japan.

b) flore pleno.

**Kernera** Medick. (J. S. Kerner, deutscher Botaniker), XV. II., Cruciferae.

*saxatilis* Rchb., Gestein's-K., 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

β) *auriculata* Rchb.

**Kiggelaria** L. (F. Kiggelar, holländischer Botaniker), XXII. IX., Capparideae-Flacourtiae.

*africana* L., afrikanische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*integrifolia* Jacq., ganzblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

**Kirganelia** Juss. (malabarischer Name), XXI. I., Trioccae-Euphorbiaceae.

*elegans* Juss., zierliche, ♀. w. Mascarenas.

**Kitaibelia** W. (Paul Kitaibel, Professor der Botanik zu Pesth), XVI. VIII., Malvaceae.

*vitifolia* W., weinblättrige, 4. f. Ungarn.

**Kleinhovia** L. (M. Kleinhov, ehemaliger Director des botanischen Gartens zu Java), XVI. VII., Malvaceae-Büttneriaceae.

*hospita* L., gastliche, ♀. w. Ostindien.

**Kleinia** Jacq. (*Porophyllum* Vaill.), (J. H. Klein, deutscher Botaniker), XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

*colorata* H. B. K., farbige, ☉. m. f. Mexico.

*decumbens* (DC.), (*suffruticosa* Lodd.), niederliegende, 4. ♀. t. Mexico.

*Porophyllum* W., porenblättrige, ☉. f. m. Westindien, Südamerika.

*ruderalis* Jacq., schuttliebende, ☉. f. m. Westindien.

*suffruticosa* W., halbstrauchige, 4. ♀. t. Neuspanien, Brasilien.

*tagetoides* H. B. K., tagetesähnliche, ☉. m. f. Mexico.

*viridiflora* H. B. K., grünblumige, ♀. w. Mexico.

*linearifolia* Juss. v. *Kuhnia linearifolia*. *tomentosa*

Haw. v. *Cacalia canescens*.

**Knappia agrostidea** Sm. v. *Mibora verna*.



**Knautia** L., Coult. (*Scabiosa* L.), (C. Knaut, Arzt und Botaniker zu Halle), IV. i., Dipsaceae.

arvensis Coult. (L.), Acker-K., 4. f. Europa.

β) campestris (Bess.). γ) rigidiuscula (Hladn.).

ciliata Coult., DC. (Spgl.), (*pubescens* Wahlbg.), gefranzte, 4. f. Mähren, Oesterreich, Ungarn.

dipsacifolia (Schott.), kartenblättrige, 4. f. Oesterreich.

diversifolia (Baumg.), verschiedenblättrige, 4. f. Siebenbürgen.

hybrida Coult. (All.), Bastard-S., ☉. f. Südeuropa.

integrifolia (L.), ganzblättrige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

longifolia Koch (W. K.), langblättrige, 4. f. Oesterreichische und ungarische Alpen, Schweiz.

montana MB., Berg-K., 4. f. Caucasus.

orientalis L. (*propontica* L.), morgenländische, ☉. f. Kleinasien, Thracien.

pubescens (W. K.), weichhaarige, 4. f. Ungarn.

β) carpathica Fisch.

Salcedi (Lagasc.), Salced's, 4. f. Spanien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Ptercephalus*.

**Knightia** RB. (T. A. Knight, englischer Botaniker), IV. i., Proteaceae.

excelsa RB., hohe, ♀. k. t. Neuzeeland.

**Knowltonia** Salisb. (T. Knowlton, Vorsteher des botanischen Gartens zu Eltham), XIII. vi., Ranunculaceae.

daucifolia DC., möhrenblättrige, 4. t. Cap d. gut. H.

gracilis DC., schlanke, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

hirsuta DC., rauhhaarige, 4. t. Cap<sup>a</sup> der gut. Hoffn.

rigida Salisb., starre, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

vesicatoria Sims, blasenziehende, 4. t. Cap d. gut. H.

**Knoxia** L. (Robert Knox, englischer Reisender im Jahre 1681), IV. i., Rubiaceae.

corymbosa W., traubendoldige, ♀. w. Ostindien.

umbellata Sol., Banks, doldige, ♀. w. Ostindien.

zeylanica L., zeylanische, ♀. w. Ceylon.

**Kobresia** W. (v. Kobres, deutscher Gelehrter), XXI. iii., Cyperaceae.

caricina W., riedgrasähnliche, 4. f. Tyroler, schweizer Alpen etc.

**Kochia** Roth (Dr. Koch, berühmter deutscher Botaniker, Professor zu Erlangen), V. ii., Aizoideae-Atripliceae.

arenaria Roth, sandliebende, ☉. f. Ost- und Westdeutschland, Ungarn.

dasyantha Schrad., wollblumige, ☉. f. Ost- und Südrussland.

dentata W. (*Chenopod. radiatum* Schrad.), gezahnte, ☉. f. Nordamerika.

eriphora Schrad., wollige, ☉. f. Spanien.

hirsuta Nolte, rauhhaarige, ☉. f. Norddeutschland, Dänemark, Taurien, Gallien.

hyssopifolia Roth, Schrad., ysopblättrige, ☉. f. Ungarn, Taurien, Sibirien.

prostrata Schrad., gestreckte, 4. ♀. f. Süd- und Osteuropa, Mittelasien.

scoparia Schrad., besenförmige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

sedoides Schrad., sedumähnliche, ☉. f. Ungarn, Taurien.

**Kochia**

sericea Schrad., seidenhaarige, ♀. k. Cap der gut. H.  
*trigyna* Lk. v. *Schanginia trigyn*.

**Koeleria** P. (Koeler, Professor der Naturgeschichte zu Mainz), III. II., Gramineae.

*albescens* DC., weifslliche, 4. f. Frankreich.

*Alopecurus* N. E., Fuchsschwanz-K., 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*brachystachya* DC., kurzährige, ☉. f. Pyrenäen.

*cristata* P., kammige, 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.

β) *gracilis* Koch. γ) *pyramidata* Lam. (*lobata* Auctor.).

*dactyloides* Spgl., dactylisähnliche, ☉. f. ?

*glauc*a DC., blaugrüne, 4. f. Europa, Caucasus.

*grandiflora* Bertol. (*gracilis* Guss., *splendens* Presl.),  
 großährige, 4. f. Italien.

*hirsuta* Gaud., rauhaarige, 4. f. Schweiz, Tyrol.

*hispida* DC., steifhaarige, ☉. f. Nordafrika, Italien.

*intermedia* Fr., mittlere, 4. f. Schweden.

*laxa* Ehrenb., Lk. (*aegyptiaca* Jacq. fil.), lockere, ☉. f. Aegypten.

*macrantha* R. et S., großblumige, 4. f. Rußland.

*nitida* Nutt., glänzende, ☉. f. Nordamerika.

*phleoides* P., lieschgrasähnliche, ☉. f. Südeuropa, Taurien.

*pubescens* (Lk.), (*Linkii* Kunth), weichhaarige, 4. f. Südfrankreich.

*valesiaca* Gaud., wallisische, 4. f. Wallis, Frankreich, Italien.

β) *setacea* DC. (*tuberosa* P.).

*villosa* P. (*pubescens* P. B.), [zottige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*pensylvanica* DC. v. *Glyceria pensylvan*.

*Koellea hyemalis* Birea v. *Eranthis hyemalis*.

*Koelpinia linearis* Pall. v. *Rhagadiolus Koelpinia*.

**Koelreuteria** Laxm. (J. G. Kölreuter, deutscher Botaniker), VIII. I., Sapindaceae.

*paniculata* Laxm., rispige, ♀. f. China.

**Königia** L. (J. G. König, dänischer Botaniker, Samuel König, schweizerischer Mathematiker nach Loudon), III. III., Polygoneae.

*islandica* L., isländische, ☉. f. Island, Lappland.

**Kolbea** Schltdl. (P. Kolbe, ein Deutscher, welcher das Vorgebirge der guten Hoffnung bereiste), VI. III., Colchicaceae.

*Breyniana* Schltdl., Breyn's, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

**Koniga** RB. (C. König, englischer Gelehrter), XV. II., Cruciferae.

*dasycarpa* (Steph.), rauschötige, ☉. f. Sibirien.

*densiflora* (Dsf.), dichtblumige, ? ♂. f. Armenien.

*edentula* (WK.), zahnlose, ♂. f. Ungarn.

*halimifolia* (W.), meermeldenblättrige, ♀. k. Oberitalien.

*macrocarpa* (DC.), großfrüchtige, ♀. k. Frankreich.

*maritima* RB., Seestrands-K., ♂. ♀. k. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

b) *variegata*.

*nummularia* Bunge, rundblättrige, ♀. k. Südrußland.

*pyrenaica* (Lapeyr.), pyrenäische, ♀. k. Pyrenäen.

*rupestris* (Ten.), Felsen-K., ♀. k. Neapel.

**Koniga**

spinosa (L.), dornige, ♀. k. Westeuropa.

**Krameria** Löffl. (J. G. H. und W. H. Kramer, deutsche Botaniker), XIV. II., Polygalaceae.

pauciflora Sessé, wenigblumige, ♀. w. Mexico.

**Krigia** Schreb., Krigie, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

caroliniana Nutt., carolinische, ☉. f. Carolina.

Dandelion Nutt., knollige, 4. Kn. f. Virginien.

*amplexicaulis* Nutt. vid. *Cynthia virginica chilensis* N. E. (*pusilla* Hort., *pinnatifida* Bert.) v. *Microseris pygmaea virginica* Hort. vid. *Hyoseris scabra*.

**Kuhnia** L. (Adam Kuhn, ein Pensylvanier, Zögling des Linné), XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

Critonia W., Critonia-K., 4. f. Nordamerika.

eupatorinoides L., dostenähnliche, 4. f. Nordamerika.

**Kunthia** Humb. (C. S. Kunth, berühmter Botaniker zu Berlin), XXI. VI., Palmae.

montana Humb., bergliebende, ♀. w. Neu-Granada.

*xalapensis* H. Berol. v. *Chamaedorea Schiedeana*.

**Kydia** Roxb. (J. R. Kyd, erster Director des Gartens zu Calcutta), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

calycina Roxb., breitkelchige, ♀. w. Ostindien.

fraterna Roxb., verbrüderete, ♀. w. Ostindien.

**Kyllingia** L. fil., Rottb. (P. Kylling, dänischer Botaniker), III. I., Cyperaceae.

brevifolia Rottb., kurzblättrige, 4. w. Ost- und Westindien.

intermedia RB., mittlere, 4. w. Neuholland.

monocephala L., einköpfige, 4. w. Ost- und Westindien, Neuholland.

odorata Vahl, wohlriechende, 4. w. Südamerika.

pungens Lk., stechende, 4. w. ?

triceps L. (*nivea* P.), dreiköpfige, 4. w. Ost- und Westindien.

uncinata Lk., hackige, 4. w. Brasilien.

vaginata Lam., scheidige, 4. w. Südamerika.

*polycephala* Lk. v. *Mariscus polyceph.*

**Labichea** Gaudich. (M. Labiche, französischer Schiffsoffizier), II. I., Leguminosae-Papilionaceae.

lanceolata Benth., lanzettliche, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

**Lablab** Adans (*Lablavia* Loud.), (arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

bengalensis G. Don (*vulgaris* β. *albiflorus* DC.), bengalischer, ☉. Sch. w. Ostindien.

cultratus DC., messerförmiger, ☉. Sch. w. Japan.

leucocarpus Savi, weißfrüchtiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

microcarpus DC., kleinfrüchtiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

nankinicus Savi, chinesischer, ☉. Sch. w. China.

perennans DC., ausdauernder, 4. Sch. t. China.

purpureus G. Don (*vulgaris* γ. *purpureus* DC.), purpurfarbiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

*vulgaris* Savi, gemeiner, ☉. Sch. w. Ostindien.

**Lacathea florida** Salisb. v. *Gordonia pubescens*.



**Lachenalia** Jacq. (Werner de la Chenal, schweizer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*anginea* Swt., Schlangen-L., 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*angustifolia* Jacq., schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*bifolia* Ker, zweiblättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

*contaminata* Ait. (*orthopetala* Jacq.), fleckige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*flava* Andr., hellgelbe, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

*fragrans* Jcq., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*glauca* Bot. reg., blaugrüne, 4. Zw. k. Persien.

*glaucina* Jacq., meergrüne, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*hyacinthoides* Jacq., hyacinthähnliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*isopetala* Jacq., gleichkronige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*lanceaefolia* Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*liliflora* Jacq., lilienblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*lucida* Ker, schimmernde, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*luteola* Jacq., gelbliche, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

b) *maculata*.

*mutabilis* Lodd., veränderliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*nervosa* Ker, nervige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

*orchoides* Ait., orchisähnliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*pallida* Ait., bleiche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

β) *minor* Lindl.

*patula* Jacq., ausgebreitete, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

*pendula* Ait., hängende, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

b) *maculata*.

*punctata* Jacq., punktirte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*purpurea* Jcq., purpurfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*purpureo-coerulea* Jacq., purpurblaue, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*pusilla* Jacq., kleine, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

*pustulata* Jacq., blättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

*quadricolor* Jacq., vierfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

b) *colorata*.

*racemosa* Sims, traubige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

*rosea* Andr., rosafarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*rubida* Jacq., röthliche, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*sessiliflora* Andr., stiellosblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*tigrina* Jacq., getigerte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*tricolor* Jacq., dreifarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*unicolor* Jacq., einfarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*unifolia* Jacq., einblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*violacea* Jacq., violette, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

*reflexa* Andr. vid. *Drimia revoluta*. *serotina* L. et

*viridis* Thbg. v. *Uropetalum serotin.* etc,

**Lachnaea** L., Lachnaea, VIII. 1., Thymelaeaceae.

*buxifolia* Lam., buchsbaumblättrige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

*conglomerata* L., knaulblumige, 5. t. Cap der gut. H.

*eriocephala* L., Andr., wolköpfige, 5. t. Cap d. g. H.

**Lachnaea**

glauca Salisb., blaugrüne, ♂. t. Cap der guten Hoffn.  
 purpurea Andr., purpurfarbige, ♂. t. Cap der gut. H.

**Lachnanthes** Ell., Wollnarcisse, III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

tinctoria Ell., färbende, 4. k. Carolina,

**Lactuca** T., Salat, XIX. 1., Corymbiferae-Cichoriaceae.

acuminata Spgl., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.

altissima MB., hoher, ♂. f. Caucasus.

ambigua Schrad. (*virosa* Hayne), zweifelhafter, ♂. f. ?

augustana All., italienischer, ♂. f. Italien, Illyrien, Siebenbürgen, Aegypten.

canadensis L., canadischer, ♂. f. Canada.

Chaixii Vill., Chaix's, ♂. f. Dauphiné.

cretica Dsf., cretischer, ♂. f. Creta.

elongata Mühlbg., verlängerter, ♂. f. Pennsylvanien.

graminea Melx., grasartiger, ♂. f. Nordamerika.

indica L., indischer, ♂. m. Ostindien.

integrifolia Nutt., ganzblättriger, ♂. f. Nordamerika.

intybacea Jacq., endivienblättriger, ♂. m. f. ? Südamer.

maculata Hornem., gefleckter, ♂. f. ?

muralis Mey., DC., Mauer-L., ♂. f. Europa.

perennis L., dauernder, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

quercina L., eichenblättriger, ♂. f. Mittel- und Osteuropa.

β) stricta WK.

sagittata WK., pfeilblättriger, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen.

saligna L., weidenblättriger, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.

sativa L., zahmer, ♂. f. ?

a) capitata Bauh. β) crispa Bauh. γ) laciniata Roth (*palmata* W.). δ) plicata Balb.

Scariola L., wilder, ♂. f. Europa.

segusiana Balb., segusianischer, ♂. f. Oberitalien.

sonchoides Lapeyr. (*cichoriifolia* DC.), sonchusähnlicher, ♂. f. Pyrenäen.

tenerrima Pourr., zarter, 4. f. Spanien.

tuberosa Jacq. (*sonchifolia* W.), knolliger, 4. f. Taurien, Persien, Creta.

villosa Jacq., zottiger, ♂. f. ?

virosa L., giftiger, ♂. f. Europa.

viminea Presl. Lk. v. *Phoenixopus vimineus*.

**Laelia** Lindl., Jungfernstendel, XX. 1., Orchideae.

albida Lindl., weißlicher, 4. w. Mexico.

anceps Lindl., zweischneidiger, 4. w. Mexico.

b) Barkeriana.

autumnalis Lex., herbstlicher, 4. w. Mexico.

cinnabarina Batem., zinnoberfarbiger, 4. w. Brasilien.

grandiflora Hort., großblumiger, 4. w. ? Brasilien.

Perrinii Batem., Perrin's 4. w. Brasilien.

*Laelia cochlearioides* P. v. *Calepina* Corvini. *prostrata* P. v. *Muricaria* prostr.

**Laetia** L. (J. de Laet zu Antwerpen, Verfasser einer Geschichte von Amerika), XIII. 1., Bixaceae.

Thamnia Sw., westindische, ♂. w. Jamaica.

**Lagascea** Cav. (Lagasca, spanischer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

**Lagascea**

*helianthifolia* H. B. K. (*Noccaea rigida* Cav.), sonnen-  
rosenblättrige, ♀. t. w. Mexico.

*latifolia* Cerv., breitblättrige, ♀. t. Mexico.

*mollis* Cav., weiche, ♂. f. m. Cuba.

*rubra* H. B. K., rothe, ♀. t. Mexico.

*suaveolens* H. B. K., starkkriechende, ♀. t. w. Mexico.

**Lagenaria** Ser., Flaschenkürbis, XXI. x., Cucur-  
bitaceae.

*idololatrica* (W.), birnenfrüchtiger, ♂. Sch. m. f. Gui-  
nea, Ostindien.

*vulgaris* Ser., gemeiner, ♂. Sch. m. f. Tropenländer.

b) *Gourda* Ser. c) *depressa* Ser. d) *turbinata*

Ser. e) *clavata* Ser. f) *Courgourda* Ser.

**Lagenophora** Endl., Flaschenträger, XIX. II., Com-  
positae-Corymbiferae.

*Forsteri* Endl., Forster's, ♀. t. Neuzeeland.

**Lagerstroemia** L. (Magnus Lagerstroem, ein Schwede  
und Freund des Linné), XIII. I., Lythriariae.

*grandiflora* Roxb., großblumige, ♀. w. Ostindien.

*indica* L., indische, ♀. w. China, Cochinchina.

b) *rosea* Lodd.

*Münchhausia* W., Münchhausen's, ♀. w. China.

*parviflora* Roxb., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.

*Reginae* Roxb., königliche, ♀. w. Ostindien, Java.

**Lagetta** Juss. (jamaicaischer Name), VIII. I., Thyme-  
laeaceae.

*linteria* Juss., westindische, ♀. w. Westindien.

**Lagoecia** L., Federknopf, V. II., Umbelliferae.

*cuminoides* L., kümmelartiger, ♂. f. Griechenland.

**Lagonychium** MB., Fadenähre, X. I., Leguminosae-  
Mimoseae.

*Stephanianum* MB., Stephani's, ♀. f. b. k. Nordpersien,  
Caucasus.

**Lagoseris** MB., Less. (*Pterotheca* Cass., *Crepinia* Rehb.,  
*Trichocrepis* Vis.), Flügelpippau, XIX. I., Compositae-  
Cynarocephalae.

*bifida* Koch, zweispaltige, ♂. f. Istrien, Croatien, Dal-  
matien, Taurien.

β) *Marschalliana (nemausensis* MB.).

*nemausensis* Koch, südfranzösische, ♂. f. Südfrankreich.

*crepoides* et *taurica* MB. vid. *Intybellia purpurea*.

Hinsichtlich der übrigen s. *Barkhausia*.

**Lagunaea** Cav. (Andreas Laguna, ein spanischer Na-  
turforscher), XVI. VIII., Malvaceae.

*lobata* Cav., gelappte, ♂. w. m. Mascarenas.

*sinuata* Hornem. (*angulata* Hort.), buchtige, ♂. w.  
Ostindien.

*squamea* Vent. (*Patersonia* Sims) vid. *Hibiscus*  
*Patersonius*.

**Lagurus** L., Hasenschwanz, III. II., Gramineae.

*ovatus* L., eiförmiger, ♂. f. Südeuropa.

*cylindricus* L. v. *Imperata cylindr.*

**Lahaya** R. et S. v. *Polycarpaea*.

**Lalage** Lindl. (eine von Horaz besungene Dame), ?X.  
I., Leguminosae.

*ornata* Lindl., zierliche, ♀. t. Neuholland.

**Lamarckia** Rich., Poir. (J. B. de Lamarck, berühmter  
französischer Naturforscher), V. I., Solanaceae.



**Lamarckia**

coccinea Rich., scharlachfarbige, 4. w. Cayenne.

*Lamarckia aurea* Mch. DC. vid. *Chrysurus cynosuroides*.  
*dentata* Hortul. v. *Elaeodendrum australe*.

**Lambertia** Sm. (A. B. Lambert, berühmter englischer Botaniker) IV. 1., Proteaceae.

*echinata* RB., igelstachelige, ♀. t. Neuholland.

*ericifolia* RB., heideblättrige, ♀. t. Neuholland.

*formosa* Sm., schöne, ♀. t. Neuholland.

*inermis* RB., unbewehrte, ♀. t. Neuholland.

*longifolia* Lodd., langblättrige, ♀. t. Neuholland.

*ovalifolia* Camer., eiblättrige, ♀. t. Neuholland.

*propinqua* RB., verwandte, ♀. t. Neuholland.

*uniflora* RB., einblumige, ♀. t. Neuholland.

**Lamium** T., Bienensaug (Taubnessel), XIV. 1., Labiatae.

*album* L., weißer, 4. f. Europa.

*amplexicaule* L., stengelumfassender, ☉. f. Europa, Nordamerika.

*bifidum* Cyril., zweispaltiger, ☉. f. Neapel.

*flexuosum* Tenor., gebogener, 4. f. Neapel.

*garganicum* L., italienischer, 4. f. Italien, Griechenland, Kleinasien.

*hirsutum* Lam., rauhaariger, 4. t. Südeuropa.

*incisum* W. (*dissectum* Wither., *hybridum* DC., *gustaphalicum* Weih.), schlitzblättriger, ☉. f. Europa.

*intermedium* Fries, mittlerer, ☉. f. Nordeuropa.

*longiflorum* Tenor., langblumiger, 4. f. Südeuropa, England.

b) *album*.

*maculatum* L., gefleckter, 4. f. Europa.

a) *maculatum* Rchb. β) *laevigatum* Rchb. (*rubrum* Wallr., *rugosum* Ait.). b) *flore albo*. γ) *rugosum* Rchb.

*molle* Ait., weicher, 4. f. ?

*moschatum* Mill., moschusduftender, ☉. f. Kleinasien.

*multifidum* L., vielspaltiger, ☉. f. Klein- u. Mittelasien.

*Orvala* L. (*pannonicum* Scop.), großblumiger, 4. f. Süd- und Osteuropa.

*purpureum* L., purpurfarbiger, ☉. f. Europa.

b) *albidum*.

*tomentosum* W., filziger, ☉. f. Armenien, Caucasus.

*Lamprotis* D. et G. Don v. *Erica*.

**Lanaria** Ait., Wollnarcisse, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

*plumosa* Ait., federige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

**Lantana** L., Lantane, XIV. 11., Verbenaceae.

*aculeata* L., stachelige, ♀. w. Westindien.

*alba* Mill., weiße, ♀. w. Südamerika.

*annua* L., jährige, ☉. w. m. f. Südamerika.

*brasiliensis* Lk., brasilianische, ♀. w. Brasilien.

*Camara* L., veränderliche, ♀. w. Südamerika.

*canescens* H. B. K., grauliche, ♀. w. Neugranada.

*coccinea* Lodd., scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.

*crocea* Lk., safranfarbige, ♀. w. Jamaica.

*fucata* Ker, geschminkte, ♀. w. Brasilien.

*geminata* Spgl., paarige, ♀. w. Südamerika.

*hirta* Grah., kurzhaarige, ♀. w. Mexico.

*hispida* H. B. K., steifhaarige, ♀. w. Mexico.

**Lantana**

- horrida H. B. K., starkstachelige, ♀. w. Mexico.  
 involucrata L., hüllblättrige, ♀. w. Westindien.  
 lavandulacea L., lavendelblättrige, ♀. w. Südamerika.  
 Lockharti G. Don, Lockhart's, ♀. w. Trinidad.  
 melissaefolia Ait., melissenblättrige, ♀. w. Brasilien.  
 mixta L., bunte, ♀. w. Westindien.  
 mollis Grah., weiche, ♀. w. Mexico.  
 multiflora Hort., vielblumige, ♀. w. ?  
 nivea Vent., schneeweisse, ♀. w. Westindien.

β) mutabilis Hook.

- odorata L., wohlriechende, ♀. w. Westindien.  
 pilosa H. B. K., haarige, ♀. w. Cuba.  
 purpurea Hornem., purpurfarbige, ♀. w. Südamerika.  
 Radula Sw., raschelblättrige, ♀. w. Westindien.  
 recta Ait. (*parvifolia* Salisb.), gerade, ♀. w. Jamaica.  
 salviaefolia Jacq., salbeiblättrige, ♀. w. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 scabrida Ait., schärfliche, ♀. w. Westindien.  
 Sellowi Lk. (*speciosa et elegans* Hortul.), Sellow's, ♀. w.  
 Montevideo.  
 stricta Sw., steife, ♀. w. Jamaica.  
 trifolia L., dreiblättrige, ♀. w. Westindien.

**Lapeyrousia** Pourr., Ker (La Peyrouse, französischer  
 Seefahrer, Picot de Lapeyrouse, französischer Bota-  
 niker), III. 1., Irideae.

- aculeata Swt., stachelige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
 anceps Ker, zweischneidige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 corymbosa Ker, traubendoldige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung,  
 Fabricii Ker, Fabricius's, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
 falcata Ker, sichelförmige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
 fasciculata Ker, büschelförmige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 fissifolia Ker, spaltblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 silenoides Ker, silenähnliche, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

**Lappa** T., Klette, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.  
 major G. (*officinalis* All.), große, ♂. f. Europa.  
 minor DC., kleine, ♂. f. Europa.  
 tomentosa Lam., filzige, ♂. f. Europa.

**Lappago** Schreb., Klettengras, III. 11., Gramineae.  
 racemosa W., traubiges, ♂. f. Süd- und Osteuropa,  
 Orient, Nordafrika, Westindien etc.

**Lapsana** L., Rainkohl, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. Genuina.

- communis L., gemeiner, ♂. f. Europa.  
 β) pubescens Bernh.  
 crispa W., krauser, ♂. f. ?  
 grandiflora MB. (*lyrata* W.), großblumiger, ♂. f.  
 Taurien.  
 intermedia MB., mittlerer, ♂. f. Taurien, Caucasus.

II. Aposeris Neck.

- foetida Scop., stinkender, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 pusilla W. v. Arnoseris minima. Hinsichtlich der  
 übrigen s. Rhagadiolus et Zacyntus.

**Larrea** aquatica Ser. v. Malachium aquaticum, aquatica  
 St. Hilair v. Stellaria uliginosa. Larix T. v. Pinus.

**Larocha** P. (*Rochea* DC.), (De la Roche, französischer Botaniker), V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

*falcata* DC., sichelförmige, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.  
*perfoliata* Haw., durchwachsene, ♂. t. Cap d. gut. H.  
 b) *alba* Haw.

Hinsichtlich der übrigen s. *Kalosanthus*.

**Larrea** Cav. (J. A. H. de Larrea, spanischer Botaniker), X. 1., Zygophylleae.

*divaricata* Cav., ausgesperrte, ♂. t. Buenos Ayres.

*nitida* Cav., glänzende, ♂. t. Buenos Ayres.

**Laserpitium** T., Laserkraut, V. 11., Umbelliferae.

*alpinum* W. K. (*trilobum* L.), Alpen-L., 4. f. Krain, Ungarn.

*Archangelica* Wulf. (*Chironium* Scop.), angelicablätteriges, 4. f. Sudeten, Krain.

*Athamantae* Spgl., hirschwurzförmiges, 4. f. Sibirien.

*aureum* W. (*elegans* Clar.), goldfarbiges, 4. f. b. Kleinasien.

*caucasicum* MB. (*Cnidium carvifolium* MB.), caucasisches, 4. f. Caucasus.

*gallicum* T., französisches, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich.

*hirsutum* Lam. (*Panax* Gouan, *Halleri* All.), rauhhaariges, 4. f. Schweiz, Tyrol.

*latifolium* L., breitblättriges, 4. f. Europa.

a) *Libanotis* Lam. (*glabrum* Koch). β) *asperum* Crtz (*Cervaria* Gmel., *pubescens* Lag.).

*marginatum* W. Kit. (*Gaudini* Morett., *luteolum* Gaud.), herandetes, 4. f. Ungarn, Krain, Schweiz.

*meoides* Dsf., meumähnliches, 4. k. Nordafrika.

*peucedanoides* L. (*angustifolium* L.), peucedanumähnliches, 4. f. Krain, Tyrol, Schweiz etc.

*pilosum* W. (*hispidum* MB.), haariges, 4. f. Taurien, Caucasus.

*pruthenicum* L., preussisches, ♂. f. Europa.

*scabrum* Cav., scharfes, ♂. f. b. Südspanien.

*Siler* L., gebräuchliches, 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

β) *garganicum* Till., Ten.

*Stevensi* Fisch., Steven's, 4. f. ?

*triquetrum* Vent., dreikantiges, 4. f. Thracien.

*ulopterum* Trevir., krausflügeliges, ♂. f. Südfrankreich.

*aquilegifolium* Jacq. v. *Siler trilobum*. *ferulaceum*

L. vid. *Cachrys alata*. *gummiferum* Dsf. (et *thapsioides* Dsf.) vid. *Thapsia gummifera* et *Laserpitii*.

*lucidum* Ait. v. *Ligusticum ferulaceum*. *silaifolium* Jacq. v. *Cnidium apioides*.

**Lasiopetalum** Sm., Haarblume, V. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

*ferrugineum* Sm., rostfarbige, ♂. Neuholland.

*parviflorum* Rudge, kleinblumige, ♂. Neuholland.

*arborescens* Ait. v. *Seringia platyphylla*, *purpureum* Sims, *quercifolium* Andr. etc. vid. *Thomasia purpurea* etc.

**Lasiopus** D. Don, Wollfufs, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*sonchoides* D. Don, gänse-distelähnlicher, 4. f. Armenien.



- Lasiospermum** Lagas., Haarsame, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.  
*pedunculare* Lagasc., gestielter, ♂. k. Italien, Creta, Kleinasien.  
*radiatum* Trevir., strahliger, ♂. k. Cap der gut. Hoffu.  
**Lasiospora** Cass. (*Lasiospermum* Fisch.), v. Scorzonera.  
**Lasthenia** Cass., Lasthenie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*californica* DC. (*glaberrima* DC.), californische, ☉. f. Californien.  
*glabrata* Lindl., glatte, ☉. f. Californien.  
*obtusifolia* Cass., stumpfblättrige, ☉. f. Chili.  
**Latania** Commers., Bourbonpalme (afrikanischer Name), XXII. XIII. (XIII. III.), Palmae.  
*borbonica* Lam. (*chinensis* Jacq.), schirmförmige, ♀. w. Mascarenas.  
*glaucophylla* Lodd., blaugrünblättrige, ♀. w. Ostindien.  
*rubra* Jacq., rothe, ♀. w. Mascarenas.  
**Lathraea** L., Schuppenwurz, XIV. II., Personatae-Orobancheae.  
*Squamaria* L., gemeine, 4. f. Europa.  
**Lathyrus** T., Platterbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*altaicus* Ledeb., altaische, 4. Sch. f. Altai.  
*amphicarpos* L., cyprische, ☉. Sch. f. Cypern, Syrien.  
*angulatus* L., kantige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Taurien.  
     b) flore albo.  
*annuus* L., jährige, ☉. Sch. f. Südeuropa.  
*Aphaca* L., blattlose, ☉. Sch. f. Mittel- u. Südeuropa.  
*Armitageanus* Westc., Armitage's, ♂. t. Brasilien.  
*articulatus* L., gegliederte, ☉. Sch. f. Südfrankreich, Spanien.  
*auriculatus* Bertol. (*tenuifolius* Loisel., *alatus* Ten., *spurius* W., *cornutus* Spgl., *purpureus* Dsf., *tataricus* Schreb.), geöhrte, ☉. Sch. f. Italien, Griechenland.  
*bithynicus* Lam., bithynische, ☉. Sch. f. Italien, Griechenland, Kleinasien.  
     b) sessiliflorus Sering.  
*bruttius* Tenor., calabrische, ☉. Sch. f. Calabrien.  
*californicus* Lindl., californische, 4. Sch. f. Californien.  
*Cicera* L., Kiefern-P., ☉. Sch. f. Südeuropa.  
*ciliatus* Guss., gefranzte, ☉. Sch. f. Sicilien.  
*Clymenum* L., orientalische, ☉. Sch. f. Spanien, Nordafrika, Kleinasien.  
*decaphyllus* Pursh, zehnblättrige, 4. Sch. f. Nordamer.  
*ensifolius* Badarr., schwertblättrige, 4. Sch. f. Südfrankreich.  
*grandiflorus* Sibth., großblumige, 4. Sch. f. Griechenland.  
*Hallersteinii* Baumg., Hallerstein's, 4. Sch. f. Siebenbürgen, Banat.  
*heterophyllus* L. (*intermedius* Wallr.), verschiedenblättrige, 4. Sch. f. Europa.  
*hirsutus* L. (*hirtus* Lam.), rauhhülsige, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa, England.  
*inconspicuus* L. (*parviflorus* Roth), unansehnliche, ☉. f. Istrien, Südfrankreich, Kleinasien.  
*incurvus* W. (*curvus* Roth), einwärtsgekrümmte, 4. Sch. f. Caucasus.

**Lathyrus**

*italicus* Roth, italienische, ☉. Sch. f. Italien.

*latifolius* L., breitblättrige, 4. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

b) *albiflorus* Swt.

*leptophyllus* MB., schlankblättrige, ☉. f. Caucasus.

*longipedunculatus* Ledeb., langstielige, ☉. f. ?

*magellanicus* Lam., magellanische, 4. Sch. f. Feuerland.

*mexicanus* Wender., mexicanische, 4. Sch. f. Mexico.

*micranthus* Gerard, kleinblumige, ☉. f. Südfrankreich.

*mutabilis* Swt., veränderliche, 4. Sch. f. Sibirien.

*myrtifolius* Mühlbg. (*polymorphus* Nutt.). myrtenblättrige, 4. Sch. f. Nordamerika.

*Napoleonis* Wender., Napoleon's, ☉. Sch. f. ?

*Nissolia* L., einfachblättrige, ☉. f. Mitteldeutschland, England, Südeuropa.

*odoratus* L., wohlriechende, ☉. f. Sch. Sicilien, Ostindien.

b) *striatus*.

*palustris* L., sumpfliebende, 4. Sch. f. Europa, Canada.

*pisiformis* L., erbsenähnliche, 4. Sch. f. Vollhynien, Caucasus, Sibirien.

*pratensis* L., Wiesen-P., 4. Europa.

β) *sepium* Scop.

*purpureo-coeruleus* K. et W., purpurblaue, ? 4. Sch. k. Brasilien.

*roseus* Stev., rosafarbige, 4. Sch. f. West-Caucasus.

*rotundifolius* W., rundblättrige, 4. Sch. f. Taurien, Caucasus.

*sativus* L., gebaute, ☉. Sch. f. Südeuropa.

*setifolius* L. (*prostratus* Brign.), borstenblättrige, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.

*sphaericus* Retz (*coccineus* All., *axillaris* Lam.), kugelige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*stipulaceus* Lec., zwischenblättrige, 4. Sch. New York.

*sylvestris* L., Wald-P., 4. Sch. f. Europa.

*tenuifolius* Dsf., feinblättrige, ☉. Sch. f. Nordafrika, Sicilien.

*tingitanus* L., tanger'sche, ☉. Sch. f. Nordafrika.

*tuberosus* L., knollige, 4. Kn. Sch. f. Europa, Mittelasien.

*turgidus* Lam. (*tumidus* W.), aufgeschwollene, ☉. Sch. f. ?

*venosus* Mühlbg., W., aderige, 4. Sch. f. Pennsylvanien.

*humilis* Fisch. v. *Orobis humilis*. *monanthos* W.

v. *Ervum monanthos*, *Ochrus* DC. v. *Ochrus pal-*

*lida*. *Lauguieria hirsuta* R. et P. etc. vid. *Guettarda hirsuta* etc.

**Laurophyllus** Thbg., Lorbeerling, IV. 1. (XXIII. II.), ?Santalaceae.

*capensis* Thbg., kapischer, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

**Laurus** T., Lorbeer, IX. 1., Laurineae.

*aestivalis* L. (*enervia* Mill.), Sommer-L., ♂. f. b. k. Carolina, Virginien.

*aggregata* Sims, angehäufter, ♂. t. China, Ostindien.

*Benzoin* L. (*aestivalis* L., *Pseudo-Benzoin* Mchx.), Benzoin-L., ♂. f. Nordamerika.

*Borbonica* L., borbonischer, ♂. k. Nord- und Südamer.

**Laurus**

*bullata* Burch., blasiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*canariensis* W., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.  
*carolinensis* Catesb. (*axillaris* Lam.), carolinischer, ♀.  
 Carolina, Louisiana.

b) *glabra*. c) *pubescens*. d) *obtusa*.

*Catesbiana* Mchx., *Catesby's*, ♀. f. h. k. Carolina, Florida.

*Chloroxylon* L., Grünholz-L., ♀. w. Jamaica.

*coriacea* Sw., lederartiger, ♀. w. Westindien.

*crassifolia* Rich., Poir., dickblättriger, ♀. w. Cayenne.

*Diospyros* P. (*diospyroides* Mchx., *melissaefolia* Walt.),  
 diospyrosähnlicher, ♀. f. b. Carolina.

*exaltata* Sw., hoher, ♀. w. Jamaica.

*floribunda* Sw., blüthenreicher, ♀. w. Westindien.

*foetens* Ait. (*maderensis* Lam.), stinkender, ♀. k. Canarische Inseln.

*geniculata* Walt., Mchx. (*aestivalis* W.), geknieter, ♀.  
 f. b. Virginien.

*indica* L., indischer, ♀. k. Canarische Inseln, Japan.

*nivea* Lodd., schneeweiß, ♀. w. ?

*nobilis* L., edler, ♀. k. f. b. Süd-, West- und Osteuropa.

b) *undulata* Mill. c) *salicifolia* Swt. (*angustifolia* Lodd.). d) *variegata* Swt. e) *latifolia* Mill.

f) *crispa* Lodd. g) *flore pleno* Duham.

*patens* Sw., absteher, ♀. w. Westindien.

*pendula* Sw., überhängender, ♀. w. Jamaica.

*salicifolia* Sw., weidenblättriger, ♀. w. Westindien.

*Sassafras* L., *Sassafras*-L., ♀. f. Nordamerika.

*splendens* Loud., schimmernder, ♀. w. Ostindien.

*thyrsiflora* Poir., straußblumiger, ♀. w. Madagascar.

*Persea* L. vid. *Persea gratissima*. Hinsichtlich der  
 übrigen s. *Cinnamomum*.

**Lavandula** L., Lavendel, XIV. 1., Labiatae.

*abrotanoides* Lam., stabwurzähnlicher, ♀. k. Canarische Inseln.

*dentata* L., gezähnelter, ♀. k. Spanien, Nordafrika.

*formosa* Dietr., schöner, ♀. k. ?

*heterophylla* Viv., verschiedenblättriger, ♀. k. ?

*latifolia* Ehrh., L. (*Spica* DC., *Spica* β. L.), breitblättriger, ♀. f. Süd- und Westeuropa.

*multifida* L., vielspaltiger, ♂. ♀. k. Spanien, Nordafrika.

*pinnata* L., gefiederter, ♀. k. Madeira.

*Spica* L. W. (*vera* DC., *officinalis* Chaix., *angustifolia* Ehrh.), gebräuchlicher (Spike), ♀. f. Süd- und Westeuropa.

β) *pyrenaica* DC.

*Stoechas* L., schopfiger, ♀. k. Canarische Inseln.

*viridis* L'Her., grüner, ♀. k. Canarische Inseln.

*carnosa* W., v. *Anisochilus carnosa*.

**Lavatera** T. (Lavater, Freund des Tournefort), XVI. VIII., Malvaceae.

*acerifolia* Cav. (*phoenicea* W.), ahornblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

*ambigua* DC., zweifelhafte, ☉. f. Südfrankreich, Italien.

*arboorea* L., baumartige, ♂. ♀. f. k. England, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.



**Lavatera**

- biennis MB., zweijährige, ♂. f. Caspisches Meer.  
 cretica L., cretische, ☉. f. Creta, Sicilien.  
 flava Dsf. (*Empedoclis* Ucr., *agrigenina* Tin.), hellgelbe,  
 4. f. b. k. Nordafrika, Sicilien.  
 hispida Dsf., steifhaarige, ♀. k. Spanien, Nordafrika.  
 β) africana Cav.  
 lanceolata W., lanzettliche, ☉. f. ?  
 maritima Gouan (*rotundifolia* Lam.), Seestrands-L., ♀. k.  
 Südfrankreich, Spanien.  
 β) hybrida Hort.  
 micans L. (*lusitanica* L., *bryonifolia* et *undulata* Mill.),  
 schimmernde, ♀. k. Spanien.  
 olbia L., olbische, ♀. k. Südfrankreich.  
 phoenicea Vent., hochrothe, ♀. k. Canarische Inseln.  
 plebeja Sims (*australis* Weinm., ? *Weinmanniana* Bess.),  
 neuholländische, ♂. k. Neuholland.  
 punctata All., punktirte, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 salvitellensis Brign., salvitellensische, ♂. f. ?  
 sylvestris Brot. (*neapolitana* Ten., *sicula* Tin.), wilde,  
 ☉. ♂. f. Neapel, Sicilien, Portugal.  
 thuringiaca L., thüringische, 4. f. Mittel- u. Osteuropa.  
 triloba L. (*calycina* Poir.), dreilappige, ♀. k. Spanien.  
 trimestris L., Sommer-L., ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 b) alba.  
 undulata Dsf. (*Pseudo-Olbia* Poir.), wellenblättrige,  
 ♀. k. ?  
 unguiculata Dsf., nagelförmige, ♀. k. Griechenland.  
*Lavenia decumbens* Sw. et *erecta* Sw. v. *Adenostemma decumbens* et *viscosa*.  
**Lavradia** Vell. (Vandelli, Marquis von Lavradio, portugiesischer Botaniker), V. I., Violaceae.  
 montana Mart., bergige, ♀. w. Brasilien.  
**Lawsonia** L. (J. Lawson, ein Engländer, welcher Carolina bereiste), VIII. I., Lythriaceae.  
 inermis L., unbewehrte, ♀. w. Aegypten, Ostindien.  
 purpurea Lam., purpurfarbige, ♀. w. Ostindien.  
 spinosa L., dornige, ♀. w. Ostindien.  
**Laxmannia** RB. (E. Laxmann, ein Schwede, welcher in Sibirien botanisirte), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
 gracilis RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.  
**Lebeckia** Thbg. (Lebeck, wenig gekannter Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 contaminata Thbg., befleckte, ♀. k. t. Cap d. gut. H.  
 cytisoides Thbg., cytisusähnliche, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
 sepiaria Thbg., Zaun-L., ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 sericea Thbg., seidenhaarige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.  
 subnuda DC., halbnackte, ♀. k. t. Cap der gut. H.  
 subternata Lk., fast dreizählige, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
*contaminata* Ait. v. *Indigofera juncea*.  
**Lebetina** Cass., Lebetine, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
 cancellata Cass., gitterige, ☉. m. f. Mexico.  
**Lebretonia** Schrk. (Manuel le Breton, französischer Botaniker), XVI. VIII., Malvaceae.  
 coccinea Schrk., scharlachfarbige, ♀. w. Brasilien.  
 latifolia Mart., breithlättrige, ♀. w. Brasilien.  
**Lechea** L. (G. Leche, schwedischer Botaniker), III. III., Cistineae.

**Lechea**

- major Mchx. (*villosa* Ell.), grofse, 4. f. f. Nordamer.  
 minor Pursh, kleine, 4. f. Nordamerika.  
*racemulosa* Mchx. (? *minor* L.), traubige, f. 4. f.  
 Nordamerika.  
*thymifolia* Mchx. (? *juncifolia* Walt.), thymianblätterige,  
 f. 4. k. Carolina.

**Lechenaultia** RB. (Lechenault de la Tour, französischer Reisender und Botaniker), V. I., Campanulaceae-Goodenovieae.

- floribunda* Benth., blüthenreiche, f. t. Neuholland.  
*formosa* RB., schöne, f. t. Neuholland.  
*multiflora* Lodd. (*oblata* Swt., *formosa* Sims, *Baxteri*  
 G. Don), vielblumige, f. t. Neuholland.

**Lecythis** Löffl., Deckelmyrte, XIII. I., Lecythideae.

- amara* Aubl., bittere, f. w. Guiana.  
*bracteata* W., deckblätterige, f. w. Cayenne.  
*grandiflora* Aubl., grofsblumige, f. w. Guiana, Brasilien.  
*minor* Jacq., kleine, f. w. Südamerika.  
*parviflora* Aubl., kleinblumige, f. w. Guiana.

**Ledebouria** Roth (C. F. v. Ledebour, berühmter russischer Botaniker, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

- hyacinthina* Roth, hyacinthähnliche, 4. Zw. t. w. Ostind.

**Ledebouria pimpinelloides** Lk. v. *Tragium tauricum*.**Ledocarpon pedunculare** Lindl. v. *Balbisia peduncularis*.**Ledum** L., Porst., X. I., Ericaceae-Rhodoraceae.

- canadense* Lodd., canadischer, f. f. Canada.  
*latifolium* Ait. (*groenlandicum* Retz.), breitblättriger, f.  
 f. Nordamerika.  
*palustre* L., Sumpf-P., f. f. Mittel- und Nordeuropa,  
 Asien, Nordamerika.  
 β) *decumbens* Ait.  
*buxifolium* Berg. (*thymifolium* Lam., *serpyllifolium*  
 L'Her.) v. *Leiophyllum thymifolium*.

**Leea** L. (J. Lee, Vater und Sohn, berühmte englische Pflanzencultivateurs), V. I., Hesperideae-Leeaceae.

- aequata* L., gleiche, f. w. Ostindien.  
*crispa* L. (*pinnata* Andr.), krause, f. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
*macrophylla* Roxb., grofsblättrige, f. w. Ostindien.  
*robusta* Roxb., rüstige, f. w. Ostindien.  
*sambucina* W., fiederblättrige, f. w. Ostindien.  
*scabra* Roxb. (*hirta* Hornem.), scharfe, f. w. Ostindien.

**Leersia** Sw. (J. D. Leers, deutscher Botaniker), III. II., Gramineae.

- australis* RB., neuholländische, 4. Wa. t, k. Neuholl.  
*oryzoides* Sw., reifsartige, 4. Wa. f. Europa, Persien,  
 Nordamerika.  
*virginica* W., virginische, 4. Wa. f. Nordamerika.

**Leighia** Cass., Leighie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

- speciosa* DC., prächtige, ☉. 4. f. b. k. Mexico.

**Leimanthium** Mchx., W., Wiesenlilie, VI. I. (XXIII. I.), Coronariae-Colchicaceae.

- hybridum* Swt., Bastard-W., 4. f. Nordamerika.  
*monoicum* Swt., einhäusige, 4. f. Nordamerika.  
*virginicum* W., virginische, 4. f. Nordamerika.

**Leiophyllum** P., Quendelblatt, X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

prostratum Loud. (Sw.), (*Ammyrsine Lyoni* Sw.), gestrecktes, f. f. b. Nordamerika.

thymifolium P., thymianblättriges, f. f. b. Nordamer.

**Lemna** L., Wasserlinse (Entengrün), XXI. 11. (II. 1.), ?Aroideae.

arrhiza L., wurzellose, ☉. Wa. f. Italien, Frankreich.

gibba L., höckerige, ☉. Wa. f. Europa.

minor L., kleine, ☉. Wa. f. Europa, Amerika.

polyrrhiza L., vielwurzelige, ☉. Wa. f. Europa, Nordamerika.

trisulca L., dreifurchige (kreuzblättrige), ☉. Wa. f. Europa, Amerika etc.

**Leonotis** RB., Löwenohr, XIV. 1., Labiatae.

intermedia Lindl., mittleres, f. k. Cap d. gut. Hoffn.

Leonurus RB., prächtiges, f. k. Cap der gut. Hoffn.

nepetifolia RB., nepetablättriges, ☉. m. w, Ostindien, Cap der guten Hoffnung.

ovata Spgl., eiförmiges, f. k. Cap der guten Hoffn.

**Leontice** L., Löwenblatt, VI. 1., Berberideae.

altaica Pall., altaisches, 4. Kn. f. b. Sibirien, Bessarabien.

Chrysogonum L., goldwurzelige, 4. Kn. k. Griechenland, Kleinasien.

Leontopetalum L., ächtes, 4. Kn. f. b. Kleinasien, Griechenland, Neapel.

vesicaria Pall., blasiges, 4. Kn. f. b. Sibirien.

*thalictroides* L. v. *Caulophyllum thalict.*

**Leontodon** Juss. (et *Oporinea* D. Don), Pfaffenröhrlein (Löwenzahn), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. *Apargia* Auctor.

asperum Rchb. (WK.), rauhes, 4. f. Ungarn, Oberitalien, Westphalen etc.

Berinii Rchb., Berini's, 4. f. Friaul.

biscutellaefolium DC., biscutellablättriges, 4. f. Süditalien, Taurien.

Brumati Schied., Brumati's, 4. f. Istrien, Friaul.

caucasicum Fisch., caucasisches, 4. f. Caucasus.

coronopifolium DC., krähenußblättriges, 4. f. k. Nordafrika.

crispum Vill., krauses, 4. f. Illyrien, Italien, Frankreich.

β) saxatile Rchb. (Tenor.).

croceum Haenk., safranfarbiges, 4. f. Ungarn, Krain etc.

β) aurantiacum (W. K.).

dubium Rchb., zweifelhaftes, 4. f. Mittel- und Süddeutschland.

β) hyoserioides (Welw.).

hastile L. (*danubiale* Jacq., Scop.), spontonförmiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

hispidum L. (*caucasicum* Hort.), steifhaariges, 4. f. Europa.

incanum Schrk., weißgraues, 4. f. Mittel-, Ost-, Süd- und Westeuropa.

lucidum DC. (Ten.), starkglänzendes, 4. f. Süditalien.

Rosani DC. (Ten.), Rosani's, 4. f. Neapel.

squamosum Lam. (*pyrenaicum* Gouan, *alpinum* Jacq.), schuppiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.



**Leontodon**

*tenuiflorum* (Gaud.), dünnblumiges, 4. f. Südliche Schweiz, Friaul etc.

*Villarsii* Lois. (*hirtum* Vill.), Villars's, 4. f. Frankreich.

II. *Oporinea* D. Don.

*autumnale* L., Herbst-P., 4. f. Europa.

β) *pratense* (Lk.).

*aureum* L. etc. vid. *Crepis aurea*. *hirtum* L. etc.

vid. *Thrinchia hirta*. *Taraxaci* Lois. vid. *Apargia*

*Taraxaci*. *Taraxacum* L. etc. vid. *Taraxacum*

*officinale* etc.

**Leontonix** Cass., Löwenschüppchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*declinatus* (L.), niedergebeugtes, 4. k. t. Cap d. gut. H. *glomeratus* DC. (W.), knaulförmiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*modestus* (Hook.), hübsches, 4. k. t. Cap d. gut. H.

*squarrosus* DC. (L.), sparriges, 4. k. t. Cap d. g. H.

**Leontopodium** P., RB., Löwenpfötchen (Edelweiss), XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*alpinum* Cass. (*helveticum* D. Don, *vulgare* RB.), Alpen-L., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

**Leonurus** L., Löwenschwanz (Wolfstrapp), XIV. I., Labiatae.

*altaicus* Spgl., altaischer, ♂. f. Altaigebirge.

*Cardiaca* L., gemeiner, 4. f. Europa, Kleinasien, Nordamerika.

b) *alba*.

*condensatus* Hornem., gedrängter, ♂. f. Sibirien.

*crispus* Murr., krauser, 4. f. Sibirien.

*heterophyllus* Swt., verschiedenblättriger, ☉. f. Südamerika.

*lacerus* Lindl., schlitzblättriger, 4. f. k. Nepal.

*Marrubiastrum* L. (*Chaiturus Marrubiastr.* Ehrh.), andornblättriger, ♂. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.

*multifidus* Dsf., vielspaltiger, ♂. f. ?

*neglectus* Schult., übersehener, ♂. f. Südeuropa.

*sibiricus* L., sibirischer, ♂. f. Sibirien.

*supinus* L., niedriger, 4. f. Sibirien.

*tataricus* L., tatarischer, ♂. f. Mittelasien.

*villosus* Dsf., zottiger, ♂. f. Taurien.

*lanatus* P. v. *Panzeria lanata*.

**Leopoldina** Mart. (Leopoldine, Kaiserin von Brasilien), XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

*pulchra* Mart., schöne, 4. w. Brasilien.

**Lepanthes** Sw., Rindenstendel, XX. I., Orchideae.

*tridentata* Sw., dreizahniger, 4. w. Jamaica.

**Lepechinia** W. (Iwan Lepechin, russischer Botaniker), XIV. I., Labiatae.

*clinopodifolia* W., wirbeldostenblättriger, 4. f. Sibirien.

*spicata* W., ährige, 4. f. k. Mexico.

*Lepicaune* Lapeyr. v. *Crepis*.

*Lepicephalus* Lagasc. v. *Succisa*.

**Lepidagathis** W., Schuppenklau, XIV. II., Acanthaceae.

*cristata* W., kammiger, 4. w. Ostindien.

**Lepidium** T., Kresse, XV. II., Cruciferae.

*affine* Ledeb., ähnelnde, 4. f. Sibirien.

**Lepidium**

- africanum* DC., afrikanische, ⚥. k. Cap d. gut. Hoffn.  
*amplexicaule* W., stengelumfassende, 4. f. Sibirien.  
*bonariense* L., bonarische, ☉. f. Südamerika.  
*campestre* RB., Feld-K., ♂. f. Europa.  
*Cardamines* L., spanische, ♂. f. Spanien.  
*chalepense* L., syrische, ☉. f. Syrien.  
*cordatum* W., herzblättrige, 4. f. Sibirien.  
*coronopifolium* Fisch., krähenußblättrige, 4. f. Sibirien.  
*crassifolium* W. K., dickblättrige, 4. f. Ungarn.  
*Cumingianum* Fisch. et Mey. (*chilense* H. Par.), Cuming's, ♂. ⚥. k. Chili.  
*cuneifolium* DC., keilblättrige, ☉. f. Neuholland.  
*diffusum* DC., weitschweifige, ☉. f. Italien.  
*divaricatum* Ait., ausgespernte, ⚥. k. Cap der gut. H.  
*Draba* L., herzschröte, ♂. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
*Ecklonii* Schrad., Ecklon's, ☉. f. Cap der gut. Hoffn.  
*glastifolium* Dsf., waidblättrige, ☉. f. Nordafrika.  
*Gussoni* Schrad., Gussone's, ♂. f. Sicilien.  
*hirtum* Sm., Hook., kurzhaarige, ♂. f. England, Südeuropa.  
*hyssopifolium* Dsf., ysoptblättrige, ☉. f. Neuholland.  
*Iberis* L., iberisähnliche, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.  
     β) *graminifolium* L.  
*incisum* Roth (*Pollichii* Roth), schlitzblättrige, ☉. f. Caucasus, Bessarabien.  
*latifolium* L., breitblättrige, 4. f. Europa.  
*lineare* DC., gleichbreitblättrige, ⚥. k. Spanien.  
*lyratum* L., leierblättrige, ☉. f. Armenien.  
*Menziesii* DC., Menzies's, 4. f. Nordamerika.  
*micranthum* Ledeb. (*densiflorum* Schrad., *incisum* MB.), kleinblumige, ☉. f. Caucasus etc.  
*oleraceum* Forst., Gemüß-K., ☉. f. Neuzeeland.  
*perfoliatum* P., durchwachsene, ☉. f. Spanien, Oesterreich, Siebenbürgen, Persien, Syrien.  
*Piscidium* Forst., Fischgift-K., ☉. f. Australien.  
*ruderales* L., Stink-K., ☉. f. Europa.  
*sativum* L., gebaute, ☉. f. Persien, Syrien, Aegypten, Mittel- und Südeuropa.  
     β) *crispum*. γ) *latifolium* C. Bauh.  
*spinosum* L., stachelige, ☉. f. Griechenland.  
*subulatum* L., pfriemenförmige, ⚥. k. Spanien.  
*suffruticosum* L. (*graminifolium* Cav.), halbstrauchige, ⚥. k. Spanien.  
*virginicum* L., virginische, ☉. f. Nordamerika.  
     *alpinum* L. etc. v. *Hutchinsia alpina* etc. *didymum* L. v. *Senebiera pinnatifida*, *nudicaule* L. v. *Teesdalia Lepidium*, *oppositifolium* La Bill. v. *Eunomia oppositifolia*.

*Lepidonema chilense* Fisch. et Mey. v. *Microseris pygmaea*.

**Lepidophorum** Neck., Schuppenträger, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*repandum* DC., ausgeschweifert, ☉. f. Spanien, Portugal.

**Lepidosperma** La Bill., Schuppennüßchen, III. I., Cyperaceae.

*gladiatum* La Bill., schwertförmiges, 4. k. Neuholland.

*Lepidostephanus madioides* Bartl. vid. *Achyrachaena mollis* Nachtr.

**Leptismium** Pfeiff., Schuppenfackeldistel, XII. 1., Cactaeae.

commune Pfr. (*Cereus squamulosus* Salm, *elegans* Hort.), gemeine, ⚔. w. Brasilien.

*Knightii* Pfr., Knight's, ⚔. w. Brasilien.

*Myosurus* Pfr. (Salm), (*Cereus tenuispinus* Haw.), mäuseschwanzähnliche, ⚔. w. Brasilien.

*paradoxum* Salm (*pterocaulis* Hort.), wunderbare, ⚔. w. Brasilien.

**Leptaleum** DC., Fadenblatt, XV. III., Cruciferae.

*filifolium* DC., sibirisches, ☉. f. Kasan, Sibirien.

*Leptandra sibirica* Nutt. et *virginica* Nutt. vid. *Veronica sibirica* et *virginica*.

**Leptanthus** Mchx., Schlankblümchen, III. 1., Comelinaceae.

*gramineus* Mchx., grasartiges, 4. Wa. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. *Heteranthera*.

**Leptocarpaea** DC., Schlankschote, XV. III., Cruciferae.

*Loesellii* DC., Loesel's, ♂. f. Mittel-, Nord- und Ostdeutschland, Italien, Taurien, Griechenland.

**Leptocarpus** RB., Schlankknüfschen, XXII. III. (III. 1.), Restiaceae.

*dichotomus* RB., zweizinkiges, 4. k. t. Cap d. g. H.

*imbricatus* RB., deckblättriges, 4. k. t. Cap d. g. H.

*tenax* RB., zähes, 4. k. t. Neuholland.

**Leptochloa** P. B., Schlankspelze, III. II., Graminae.

*cynosuroides* R. et S., kammgrasähnliche, ☉. m. f. Ostindien.

*-domingensis* Lk., westindische, 4. w. Westindien, Mexico.

*filiformis* R. et S., fadenförmige, ☉. f. Ost- und Westindien.

*procera* N. E., hohe, 4. w. Brasilien.

*tenerrima* R. et S., zarte, ☉. f. China, Ostindien.

*virgata* P. Beauv., ruthenförmige, ☉. 4. w. Westindien.

**Leptomeria** RB., Südseethesie, V. 1., Sandalaceae.

*acida* RB., säuerliche, ⚔. t. k. Neuholland.

*Billardieri* RB., Billardiere's, ⚔. t. k. Neuholland.

**Leptopyrum** Rchb., Dünnsrüchchen, XIII. VI., Ranunculaceae.

*fumarioides* Rchb., erdrauchähnliches, ☉. f. Sibirien.

**Leptorhynchos** Less., Schlankkrachler, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*squamatus* Less., Benth., schuppiger, 4. t. Van-Diemens-Land, Neuholland.

**Leptosiphon** Benth., Dünnröhre, V. 1., Polemoniaceae.

*androsaceus* Benth., mannschildähnliche, ☉. f. Californien.

*densiflorus* Benth., dichtblumige, ☉. f. Californien.

b) *albiflorus*.

*grandiflorus* Benth., großblumige, ☉. f. Californien.

*luteus* Benth., gelbe, ☉. f. Californien.

b) *pallidus*.

*parviflorus* Benth., kleinblumige, ☉. f. Californien.



**Leptospermum** Forst., Südseemyrte, XX. 1., Myrtaceae.

arachnoideum Sm., spinnewebige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.  
 attenuatum Sm., verdünnte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.  
 baccatum Sm., beerentragende, ♂. ♀. t. k. Neuholland.  
 emarginatum Wendl., ausgerandete, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

ericalyx Sbr., wollhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.  
 flavescens Sm. (*Thea* W., *multiflorum* Cav.), gelbliche, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

flexuosum Lk. (*resiniferum* Bertol.), gebogene, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

grandifolium Sm., großblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.  
 imbricatum Sm., dichtblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

juniperinum Sm., wachholderähnliche, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lanigerum Sm., wollige, ♂. ♀. t. k. Neuholland, Van-Diemens-Land.

marginatum LaBill., randfranzige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

multicaule Cunn., vielstengelige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

obtusum Lodd., stumpfblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

ovatifolium Swt., eiblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

pendulum Sbr., hängende, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

persiciflorum Rchb. (? *grandiflorum* Lodd., *purpurascens* H. Berol.), pfirsichblüthfarbige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

porophyllum Cav., durchscheinendpunktirte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

pubescens Sm. (*canescens* Wendl.), weichhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

rubricaulis Vent., rothästige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

scoparium Forst., besenartige, ♂. ♀. t. k. Neuzeeland.

β) myrtifolium Wendl. γ) grandiflorum Hook.

sericeum LaBill., seidenhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

squarrosum Sbr., sparrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

stellatum Cav., sternförmige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

thymifolium Cunn., thymianblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

triloculare Vent., dreifächerige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

tuberculatum Poir., höckerige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

Ungewisse: acuminatum, affine, Celsianum, crataegifolium, ambiguum Sm. (punctatum Hort.) vid. Stenospermum corifolium, virgatum Forst. vid. Baeckea virgata.

**Leptostelma** D. Don, Schlankkrone, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

maximum D. Don, grofse, 4. k. t. Mexico.

**Leptotes** Lindl., Schlankstendel, XX. 1., Orchideae.

bicolor Lindl., zweifarbig, 4. w. Brasilien.

**Lepturus** RB., Dünnschwanz, III. 11., Gramineae.

I. Lepturus genuin. Trin.

cylindricus Trin. (subulatus Kunth), cylinderförmiger,

⊙. f. Südeuropa, Cap der guten Hoffnung.

filiformis Trin., fadenförmiger, ⊙. f. Südeuropa.

incurvatus Trin., gekrümmter, ⊙. f. West- und Südeuropa, Orient, Nordafrika.

II. Pholiurus Trin.

pannonicus Kunth, ungarischer, ⊙. f. Ungarn, Südrussland.

- Lepyrodia** RB., Schuppenrestie, XXII. III. (III. III.),  
Restiaceae.  
*gracilis* RB., schlanke, 4, k. t. Neuholland.
- Leria** DC., Lerie, XIX. II., Compositae-Eupatorineae.  
*albicans* DC., weißliche, ☉. m. f. w. Westindien.  
*nutans* DC., nickende, ♂. w. Westindien.  
*pumila* DC., kleine, ♂. w. Jamaica.
- Lespedeza** Mchx. (Lespedez, Gouverneur von Florida,  
Beförderer der Botanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-  
Papilionaceae.  
*angustifolia* Nutt., Torr., schmalblättrige, 4. f. Nord-  
amerika.  
*capitata* Mchx., kopfförmige, 4. f. Nordamerika.  
*divergens* Pursh, divergirende, 4. f. Nordamerika.  
*eriocarpa* DC., wollfrüchtige, 4- k. Nepal.  
*fruticosa* P., strauchige, ♀. f. b. k. Virginien, Sibirien.  
*glomerata* Horn., knaulförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.  
*hirta* Horn. (*villosa* P.), haarige, 4. f. Nordamerika.  
*juncea* P., simsensförmige, ☉. 4. f. Sibirien, Tatarei.  
*polystachya* Mchx., vielährige, 4. f. Nordamerika.  
*procumbens* Mchx., niederliegende, 4. f. Nordamerika.  
*prostrata* Pursh, gestreckte, 4. f. Nordamerika.  
*reticulata* P., netzförmige, 4. f. Nordamerika.  
*sessiliflora* Mchx., Nutt., stiellose, 4. f. Nordamerika.  
*Stuvei* Nutt., Stuve's, ☉. f. Nordamerika.  
*violacea* P., violette, 4. f. Nordamerika.
- Lessertia** DC. (Benjamin de Lessert, ein Franzose,  
berühmt als Freund und Gönner der Botanik), XVII.  
IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*annua* DC., jährige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffn.  
*annularis* Burch., ringförmige, ♀. t. k. Cap d. gut. H.  
*brachystachya* DC., kurzährige, ♀. t. k. Cap d. g. H.  
*diffusa* RB., weitschweifige, ☉. f. m. Cap d. gut. H.  
*falciformis* DC., sichelförmige, ♀. t. k. Cap d. g. H.  
*fruticosa* Bot. reg., strauchige, ♀. t. k. Cap d. g. H.  
*perennans* DC., ausdauernde, 4. t. k. Cap der gut. H.  
*pulchra* Bot. mag., schöne, ♀. t. k. Cap der gut. H.
- Lestibudesia** A. P. Th., RB., (F. J. et Them. Lesti-  
boudois, belgische Botaniker), V. I., Aizoideae-Ama-  
rantheae.  
*paniculata* RB., rispige, ♂. w. Westindien.  
*trigyna* RB., dreiweibige, ♂. w. Westafrika.  
*virgata* RB., ruthenförmige, ♀. w. Westindien.
- Lettsomia** R. et P. (J. Cockley Lettsom, englischer  
Naturforscher), XIII. I., Ternstroemiaceae.  
*tomentosa* R. et P., filzige, ♀. w. Peru.  
*bona nox* Roxb., *cuneata* Roxb. etc. vid. *Argyrea*  
*bona nox* etc.
- Leucadendron** Boerh., Silberbaum, IV. I. (XXII. IV.),  
Proteaceae.  
*abietinum* RB., tannenartiger, ♀. ♀. t. Cap d. gut. H.  
*aemulum* RB., ähnelnder, ♀. ♀. t. Cap der guten H.  
*angustatum* RB., verschmälerter, ♀. ♀. t. Cap d. g. H.  
*argenteum* RB., ächter, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*adscendens* RB., aufsteigender, ♀. t. Cap der gut. H.  
*buxifolium* RB., buchsbaunblättriger, ♀. ♀. t. Cap  
der guten Hoffnung.  
*cartilagineum* RB., knorpelartiger, ♀. ♀. t. Cap der  
guten Hoffnung.

**Leucadendron**

- caudatum Lk., geschwänzter, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 cinereum RB., aschfarbiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.  
 comosum RB., schöpfiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.  
 concinnum RB., netter, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 concolor RB., einfärbiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 corymbosum Berg., traubendoldiger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 crassifolium RB., dickblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 decorum RB., zierlicher, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 decurrens RB., herablaufender, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 ericaefolium RB., heideblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 floridum RB., blüthenreicher, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 fusciflorum RB., braunblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.  
 glabrum RB., kahler, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 Globularia RB., kugelblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.  
 grandiflorum RB., großblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 imbricatum RB., ziegeldachiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.  
 inflexum Lk., eingebogener, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 Levisanus Berg., quendelblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 linifolium RB., leinblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 marginatum Lk., berandeter, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 ovale RB., eiförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 platyspermum RB., breitsamiger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 plumosum RB., federiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 pubescens RB., weichhaariger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 retusum RB., abgestutzter, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.  
 salignum RB., weidenähnlicher, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.  
 scabrum RB., scharfer, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 sericeum RB., seidenhaariger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 spathulatum RB., spathelblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 squarrosus RB., sparriger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.  
 stellatum Swt., sternförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 strictum RB., steifer, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 tortum RB., gedrehter, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.  
 uliginosum RB., sumpfliebender, ⚥. ⚥. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 venosum RB., aderiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.  
 virgatum RB., ruthenförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.  
 Ungewisse: *flavescens*, *polygaloides*, *undulatum*.  
*thymelaeoides* Berg. v. *Mimetes thymelaeoides*.

**Leucanthemum** T. DC. v. **Chrysanthemum**.

**Leucas** RB., Weislippe, XIV. 1., Labiatae.

- aspera Lk., rauhe, ☉. m. f. Südpersien.  
 biflora RB. (*procumbens* Dsf.), zweiblumige, ♂. w.  
 Ceylon.  
 cephalotes Spgl. (*capitata* Dsf.), kopfförmige, ☉. m. f.  
 Ostindien.  
 chinensis RB., chinesische, ☉. m. f. China.  
 flaccida RB., schlaffe, ☉. m. f. Neuholland.  
 indica RB., indische, ☉. m. f. Ostindien.  
 linifolia Spgl., leinblättrige, ☉. m. t. Ostindien.



**Leucas**

*martinicensis* RB., martiniquische, ☉. m. f. Westindien.

*Pluknetii* Spgl., Pluknet's, ☉. m. f. Ostindien.

*zeylanica* RB., zeylonische, ☉. m. f. Ceylon.

*Leuceria senecioides* D. Don v. *Trixis senecioides*.

**Leucocarpus** D. Don, Weisfrucht, XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

*alatus* D. Don (*Conobea alata* Grah.), geflügelte, ☉. m. f. Vera-Cruz.

**Leucocoryne** Lindl., Weisknöpfchen, III. I., *Coronariae-Asphodeleae*.

*alliacea* (Miers), lauchähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

*ixioides* (Sims), ixiaähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

*odorata* Lindl., wohlriechende, 4. Zw. k. t. Chili.

**Leucojum** Rupp., Knotenblume, VI. I., *Narcisseae*.

*aestivum* L., Sommer-K., 4. Zw. f. Süd- und Osteuropa, England.

*pulchellum* Salisb., schöne, 4. Zw. f. ?

*vernum* L., Frühlings-K., 4. Zw. f. Europa.

b) *multiplex* Penny. β) *carpathicum* Bot. mag.

*autumnale* L. etc. v. *Acis autumnalis* Nachtr. etc.

**Leucopogon** RB., Weisbart, V. I., *Epacrideae*.

*amplexicaulis* RB., stengelumfassender, ♂. t. Neuholl.

*appressus* RB., angedrückter, ♂. t. Neuholland.

*collinus* RB., Hügel-W., ♂. t. Van-Diemens-Land.

*ericoides* RB., heideähnlicher, ♂. t. Neuholland.

*fastigiatus* Sbr., gipfelständiger, ♂. t. Neuholland.

*juniperinus* RB., wachholderähnlicher, ♂. t. Neuholl.

*lanceolatus* RB., lanzettblättriger, ♂. t. Neusüdwallis.

*microphyllus* RB., kleinblättriger, ♂. t. Neuholland.

*obovatus* RB., verkehrteiförmiger, ♂. t. Neuholland.

*Richei* RB. (*parviflorus* Lindl.), Riche's, ♂. t. Neuholl.

*setiger* RB., borstiger, ♂. t. Neuholland.

*striatus* RB., gestreifter, ♂. t. Neuholland.

*verticillatus* RB., wirtelblättriger, ♂. t. Neuholland.

*virgatus* RB., ruthenförmiger, ♂. t. Neuholland.

*Leucosceptrum canum* Sm. vid. *Clerodendrum Leucosceptrum*.

**Leucospermum** RB., Weißsamen, IV. I., *Proteaceae*.

*attenuatum* RB., verdünnter, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

*candicans* Bot. Reg., weißlichblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*conocarpum* RB., kegelfrüchtiger, ♂. t. Cap d. gut. H.

*ellipticum* RB., elliptischer, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

*formosum* Kn., schöner, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

*grandiflorum* RB., großblumiger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*hypophyllum* RB., unterblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*lineare* RB., gleichbreitblättriger, ♂. t. Cap d. gut. H.

*medium* RB., mittlerer, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*parile* Kn., gleichmäßiger, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

*patulum* RB., ausgebreiteter, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

*puberum* RB., feinhaariger, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

*spathulatum* RB., spatelblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*tomentosum* RB., filziger, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

*tottum* RB., hottentottischer, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

*Leucostemma vestitum* D. Don v. *Helichrysum vestitum*.

**Leucothöe** D. Don, *Leucothöe*, X. 1., Ericaceae.

*acuminata* G. Don, zugespitzte, ♀. ♀. k. f. b. Georgien, Florida.

*axillaris* D. Don, achselblumige, ♀. f. b. Nordamerika.

β) *longifolia* Pursh.

*buxifolia* DC., buchsbaumblättrige, ♀. t. Mascarenas.

*coriacea* DC., lederartige, ♀. k. Carolina, Florida.

b) *rubra* Lodd.

*coriifolia* DC., corisblättrige, ♀. k. Japan.

*eucalyptoides* DC. (Schltdl.), eucalyptusähnliche, ♀. w. t.

Südamerika.

*ilicifolia* DC. (P.), ilexblättrige, ♀. t. Peru.

*Mariana* DC., marilandische, ♀. f. b. Nordamerika.

β) *oblonga* Swt.

*nummularia* Schltdl., rundblättrige, ♀. w. t. Südamer.

*revoluta* DC. (Spgl.), zurückgerollte, ♀. w. t. Brasilien.

*salicifolia* DC. (Commers.), weidenblättrige, ♀. t.

Mascarenas.

*secunda* DC. (Mch.), einseitige, ♀. f. b. Nordamerika.

*spinulosa* G. Don, feinstachelige, ♀. f. b. Carolina.

*floribunda* D. Don, *spicata* Wats. v. *Zenobia floribunda* et *racemosa*.

**Leuzea** DC. (DeLeuze, ein Freund Decandolle's), XIX.

III., Compositae-Cynarocephalae.

*altaica* Lk., Fisch., altaische, 4. f. Altai.

*australis* Swt., südliche, 4. k. Neuholland.

*carthamoides* DC., saflorähnliche, 4. f. Sibirien.

*conifera* DC., kegelförmige, ♂. 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa, kanarische Inseln.

*salina* Spgl., salzige, ♂. 4. f. Sibirien.

*serratuloides* Fisch. et Mey., schartenähnliche, 4. f. b. Persien.

**Levisticum** Koch, Liebstöckel, V. II., Umbelliferae.

*officinale* Koch (*vulgare* Rchb.), officinelles, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Siebenbürgen.

**Lewisia** Pursh (Capit. M. Lewis, welcher Nordamerika bereiste), XIII. 1., Portulacaceae.

*rediviva* Pursh, ausdauernde, 4. f. Nordamerika.

**Leycesteria** Wall. (W. Leycester, Justizchef in Bengalen), V. 1., Rubiaceae.

*formosa* Wall., schöne, ♀. w. Nepal.

**Leyssera** L. (F. W. v. Lèysser, deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*capillifolia* DC. (*discoidea* Spgl.), haarblättrige, ☉. f. Nordafrika.

*ciliata* Thbg., gefranzte, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*gnaphalioides* L., ruhrkrautähnliche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*polifolia* Thbg., poleiblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

*ericoides* Berg. vid. *Relhania paleacea squarrosa* Thbg. v. *Helipterum gnaphalioides*.

**Liabum** Adans, *Liabum*, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*Brownei* Cass., Brown's, 4. w. Jamaica.

**Liatris** G., Prachtscharte, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

*bellidifolia* Mchx., maßliebenblättrige, 4. k. f. b. Nord-Carolina.

**Liatris**

- borealis Paxt., nördliche, 4. f. Nordamerika.  
 corymbosa Nutt., draubendoldige, 4. f. b. Nordamer.  
 cylindracea Mchx., cylinderförmige, 4. f. Nordamerika.  
 elegans W., zierliche, 4. f. b. Carolina.  
 gracilis Mchx., schlanke, 4. f. b. k. Südcarolina.  
 graminifolia W., grasblättrige, 4. Kn. k. f. b. Südcarolina.  
 heterophylla W., verschiedenblättrige, 4. f. b. Südcarolina.  
 intermedia Lindl., mittlere, 4. f. Nordamerika.  
 odoratissima W., wohlriechende, 4. k. f. b. Carolina.  
 paniculata W., rispige, 4. k. f. b. Virginien, Carolina.  
 pilosa W., haarige, 4. f. Nordamerika.  
 pycnostachya Mchx., dichtährige, 4. f. Nordamerika.  
 resinosa Nutt., harzige, 4. f. b. k. Carolina.  
 scariosa W., trockenhäutige, 4. f. Nordamerika.  
 sphaeroidea Mchx., kugelblumige, 4. f. Virginien, Carolina.  
 spicata W., ährige, 4. f. Nordamerika.

β) macrostachya Mchx. (pumila Lodd.). γ) racemosa DC. (pilosa Botan. Reg., turbinata Swt.).

tenuifolia Nutt., dünnblättrige, 4. k. f. b. Carolina.

**Libanotis** Crtz., Weihrauchwurz, V. II., Umbelliferae.  
 athamantoides DC., athamantaähnliche, ♂. f. Krain, Pyrenäen.

condensata L., gedrängte, ♂. 4. f. Sibirien.

montana All., Berg-W., ♂. f. Europa.

sibirica Koch (L.), (athamantoides C. A. Mey.), sibirische, ♂. f. Nordeuropa, Sibirien.

villosa Turcz., zottige, ♂. 4. f. Tatarei.

**Libertia** Spgl. (Madem. M. A. Libert in Malmedy, belgische Botanikerin), III. I., Irideae.

formosa Grah., schöne, 4. k. t. Chili.

grandiflora (RB.), großblumige, 4. k. Neuzeeland.

ixioides Spgl., ixiaähnliche, 4. k. t. Neuzeeland.

paniculata Spgl., rispige, 4. k. t. Neuholland.

pulchella Spgl., hübsche, 4. k. t. Neuholland.

**Libertia arduennensis** Lej. v. Bromus arduennensis.

**Lichtensteinia** W. (H. Lichtenstein, Professor zu Berlin, berühmt als Reisender und Zoolog), VI. III., Colchicaceae.

laevigata W., glatte, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

undulata W., wellenblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

**Licuala** Thbg. (ostindischer Name), VI. I., Palmae.

peltata Roxb., schildförmige, ♂. w. Ostindien.

spinosa Thbg., dornige, ♂. w. Ostindien, Cochinchina.

**Lidbeckia** Berg. (E. G. Lidbeck, schwedischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

lobata Thbg., gelappte, ♂. k. Cap der guten Hoffn.

pectinata Berg., kammförmige, ♂. k. Cap d. gut. H.

turbinata Thbg. v. Cenia turbinata.

**Lightfootia** L'Her. (J. Lightfoot, schottischer Botaniker), V. I., Campanulaceae.

lanceolata Lk., lanzettliche, 4. k. t. Cap der gut. H.

Loddigesii A. DC. (tenella Lodd.), Loddiges's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

muscosa Lk., moosartige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.



**Lightfootia**

- oxycoccoides L'Her., moosbeerenähnliche, 4. ♂. k. t.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 subulata L'Her., pfriemenförmige, ♂. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

**Ligularia** Cass., Bandblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- altaica DC., altaische, 4. f. Altai.  
 macrophylla DC., großblättrige, 4. f. Sibirien.  
 sibirica Cass., sibirische, 4. f. Böhmen, Ungarn, Caucasus, Sibirien.  
 β) vulgaris DC. γ) araneosa DC. δ) speciosa  
 Fisch. et Mey.

**Ligusticum** T., Möhrenwurz, V. II., Umbelliferae.

- actaeae-folium Mchx., actaeablättrige, 4. f. Nordamer.  
 alatum Spgl. (*Cnidium myrrhifolium* MB.), geflügelte,  
 4. f. Caucasus.  
 alpinum Spgl., Alpen-M., 4. Kn. f. Ungarn, julische  
 Alpen, Neapel.  
 candicans Ait., weißliche, 4. f. ?  
 ferulaceum All., ferulaähnliche, ♂. f. Schweiz, Ober-  
 italien.  
 longifolium L., langblättrige, 4. f. Sibirien.  
 obtusifolium Hornem., stumpfblättrige, 4. f. h. k.  
 Nordafrika.  
 pyrenaicum Gouan, pyrénaische, 4. f. Pyrenäen.  
 scoticum L., schottische, 4. f. Nordeuropa, Canada.  
 Seguieri Koch, Seguier's, 4. f. Oberitalien, Krain,  
 Tyrol.  
 splendens Lapeyr. (*tenuifolium* Ram.), schimmernde, 4.  
 Kn. k. f. Pyrenäen.

*apioides* Lam. v. *Cnidium apioides*. *arenarium* Lk.  
 etc. vid. *Meum sibiricum* etc. *athamantoides* Spgl.  
 v. *Libanotis athamant*. *austriacum* L. v. *Pleuro-  
 spermum austriacum*. *balearicum* L. vid. *Brignolia  
 panacifolia*. *carniolicum* Host. v. *Hladnickia gola-  
 censis* Nachtr. *Cervaria* Spgl. vid. *Peucedanum  
 Cerv.* *cornubiense* L. (*aquilegifolium* W.) v. *Phy-  
 sospermum commutatum*. *Gmelini* Cham. (*vagina-  
 tum* Spgl.) v. *Conioselinum Gmelini* Nachtr. *Le-  
 visticum* L. vid. *Levisticum officinale*. *nodiflorum*  
 Vill. v. *Trochiscanthes nodiflora*. *peloponnesiacum*  
 L. v. *Molopospermum cicutarium*. *peregrinum* L.  
 vid. *Petroselinum peregrin.* *simplex* All. v. *Gaya  
 simplex* Nachtr.

**Ligustrum** T., Rheinweide (Liguster), II. I., Sapotaceae-Oleinae.

- japonicum Thb., japanische, ♂. ♂. k. Japan.  
 lucidum Ait., glänzende, ♂. ♂. k. China.  
 β) floribundum Donald's.  
 spicatum Hamilt., D. Don (*nepalense* Wall.), ährige, ♂.  
 ♂. k. Nepal.  
 vulgare L., gemeine, ♂. f. Europa.  
 b) leucocarpum. c) xanthocarpum. d) chloro-  
 carpum. e) sempervirens (*italicum* Mill.). f) va-  
 riegatum. g) angustifolium.

**Lilium** T., Lilie, VI. I., Coronariae (*Liliaceae*).

- atrosanguineum Sieboldt (*fulgens* Hort.), blutrothe, 4.  
 Zw. f. b. k. Japan.

## Lilium

- bulbiferum L., Feuer-L., 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa.  
 b) fl. pleno. c) minus. d) variegatum. e) umbellatum.
- Buschianum Lodd.; Busch's, 4. Zw. f. Sibirien.
- canadense L., canadische, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 b) rubrum.  
 β) penduliflorum Red.
- candidum L., weisse, 4. Zw. f. Südeuropa, Kleinasien.  
 b) striatum. c) spicatum. d) variegatum. e) plenum.
- carniolicum Bernh. (*chalcedonicum* Auctor.), krainerische, 4. Zw. f. Krain, österreichisches Litorale.
- carolinianum Mchx. (*autumnale* Lodd., *Michauxii* Poir.), carolinische, 4. Zw. f. b. Carolina.
- Catesbaei Curt. (*carolinianum* Lam., *spectabile* Salisb.), Catesby's, 4. Zw. f. b. Carolina.
- chalcedonicum L., chalcedonische, 4. Zw. f. Kleinasien.
- concolor Salisb., einfarbige, 4. Zw. f. b. China.
- coruscans Hort., schimmernde, 4. Zw. f. ?
- croceum Bernh. (? *aurantiacum* Haw.), safranfarbige, 4. Zw. t. ?
- dauricum Ker (*spectabile* Lk., *pensylvanicum* Bot. mag.), dahurische, 4. Zw. f. Dahurien.
- eximium Sieboldt (*speciosissimum* et *longiflorum* Hort.), ausgezeichnete, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- japonicum Thbg., japanische, 4. Zw. f. b. k. Japan, Nepal.
- lancifolium Thbg., lanzettblättrige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- latifolium Lk., breitblättrige, 4. Zw. f. ?
- longiflorum Thbg., langblumige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- maculatum Thbg., gefleckte, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- Martagon L., Türkenbund-L., 4. Zw. f. Europa.  
 a) pubescens. β) glabrum Spgl.  
 b) fl. pleno. c) fl. albo. d) fl. albo pleno.
- monadelphum MB., einbrüderige, 4. Zw. f. Caucasus.
- nepalense Wall., nepal'sche, 4. Zw. f. b. k. Nepal.
- peregrinum Mill. (*candidum* var. L., *byzantinum* Swt.), fremde, 4. Zw. f. Levante.
- philadelphicum L., philadelphische, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 β) andinum Nutt. (*umbellatum* Pursh).
- pomponium L., pomponische, 4. Zw. f. Spanien, Sibirien.  
 b) flore pleno.
- pyrenaicum Gouan, pyrenäische, 4. Zw. f. Südfrankreich.  
 b) flore pleno.
- sibiricum W., sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.
- speciosum Thbg. (*superbum* Thbg., *lancifolium* Hort.), prächtige, 4. Zw. f. b. k. Japan.  
 β) punctatum (*lancifolium roseum* Paxt.).
- superbum Lam., stolze, 4. Zw. f. b. Nordamerika.
- tenuifolium Fisch., Hornem. (*pumilum* Redout.), feinblättrige, 4. Zw. f. b. Dahurien.
- Thunbergianum R. et S. (*aurantiacum* Sieboldt, *bulbiferum* Thbg.), Thunberg's, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- tigrinum Ker, getigerte, 4. Zw. f. b. China.  
*camtschatcense* L. et *pudicum* Pursh vid. *Fritillaria lanceolata* et *pudica*.

**Limeum** L., Pestling, VII. II., Portulacaceae.

*africanum* L., afrikanischer, 4. k. Cap der gut. H.

**Limnanthus** RB., Sumpflblume, X. I., Geraniaceae-Limnantheae.

*Douglasii* RB., Douglas's, ☉. m. f. Californien.

**Limnætis** *cynosuroides* P., *pungens* P. etc, v. *Spartina cynosuroides* etc.

**Limncharis** Humb., Bonpl., Sumpfffreund, XIII. VI., Alismaceae-Butomeae.

*Humboldtii* Rich., Humboldt's, 4. Wa. w. Südamerika.

*Plumieri* Rich., Plumier's, 4. Wa. w. Westindien, Neu-Granada.

**Limnochloa** P. B. Rchb., Schlammbinse, III. I., Cyperaceae.

*Baeothryon* Rchb. (Ehrh.), (*Scirpus pauciflorus* Lightf.), gemeine, 4. f. Europa.

β) *campestris* Roth.

*caespitosa* Rchb., rasenartige, 4. f. Europa, Nordamerika.

*parvula* Rchb. (*Scirpus nanus* Spgl.), kleine, ☉. f. Mannsfeld, Lauenburg.

**Limodorum** T., Dingel, XX. I., Orchideae.

*abortivum* Sw., violetter, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.

*altum* Jacq. (*tuberosum* Jacq.) etc. v. *Bletia acutipetala* etc.

**Limonia** L., (arabischer Name), X. I., Hesperideae-Aurantiaceae.

*acidissima* L., sauere, 5. w. Ostindien.

*australis* Cunn., neuholländische, 5. t, Neuholland.

*citrifolia* W., citronenblättrige, 5. t. China.

*crenulata* Roxb., gekerbte, 5. w. Ostindien.

*parviflora* Sims, kleinblumige, 5. t. China.

*scandens* Wall., klimmende, 5. Sch. w. Ostindien.

Hinsichtlich d. übrigen s. die Gattungen: *Atalantia*, *Clausena*, *Glycosmis* et *Triphasia*.

**Limosella** L., Schlammling, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

*aquatica* L., gemeiner, ☉. f. Europa.

**Linanthus** Benth., Flachsblümchen, V. I., Polemoniaceae.

*dichotomus* Benth., zweizinkiges, ☉. f. Californien.

**Linaria** T., Frauenflachs, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

*acutiloba* Fisch., spitzlappiger, 4. f. Sibirien.

*aegyptiaca* Dsf., ägyptischer, ☉. f. Aegypten.

*aequitriloba* Spgl., dreilappiger, 4. k. f. Corsica, Sardinien.

*alpina* Mill., Alpen-F., ☉. f. Mitteleuropäische Alpen.

*alsinefolia* Spgl., alsinenblättriger, ☉. f. Corsica.

*amethystina* Spgl., amethystfarbiger, ☉. f. Portugal, Spanien.

*arenaria* DC., sandliebender, ☉. f. Frankreich.

*arvensis* Dsf., Acker-F., ☉. f. Europa.

*bipartita* W. (*speciosa* Jacq. fil.), zweitheiliger, ☉. f. Nordafrika.

*bipunctata* Spgl., doppeltpunktirter, ☉. f. Italien, Spanien, Portugal.



# Linaria

- canadensis* Spgl., canadischer, ☉. 4. f. Nordamerika.  
*caucasica* Muss., caucasischer, ☉. f. Caucasus.  
*chalepensis* Mill. (*alba* Mch.), weißer, ☉. f. Südeuropa.  
*chloraefolia* Rchb., chlorablättriger, ♂. 4. f. Sachsen.  
*circinata* D. Don, kreiselnder, ☉. f. Nordafrika.  
*cirrhusa* W., wickelrankiger, ☉. f. Aegypten.  
*commutata* Bernh., verwechselter, ☉. f. Istrien.  
*cretacea* Fisch., kriedeliebender, ☉. f. Sibirien.  
*Cymbalaria* Mill., Cymbelkraut-F., 4. f. Europa.  
*dalmatica* Buchsb., dalmatischer, ♂. 4. f. Dalmatien, Armenien.  
*dealbata* Lk., weißlichblättriger, ☉. f. Portugal.  
*delphinioides* Gay., ritterspornähnlicher, ? ☉. f. ?  
*diffusa* Lk., weitschweifiger, ☉. f. Portugal, Spanien.  
*Elatine* Mill., liegender, ☉. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.  
*elatinoides* Dsf., elatineähnlicher, ☉. f. Nordafrika.  
*flava* Dsf., hellgelber, ☉. f. Nordafrika.  
*flexuosa* Dsf., gebogener, ☉. f. Nordafrika.  
*fruticans* Spgl., strauchiger, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.  
*genistaefolia* Mill., ginsterblättriger, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Sibirien.  
*glauca* W., blaugrüner, ☉. f. Kleinasien.  
*heterophylla* Dsf., verschiedenblättriger, 4. k. Nordafrika.  
*hians* Spgl., klaffender, ☉. 4. f. Südeuropa.  
*hirta* W., kurzhaariger, ☉. f. Spanien, Portugal.  
*incarnata* Spgl., fleischfarbiger, ☉. f. Spanien, Portugal.  
*italica* Trev. (*angustifolia* Rchb., *paniculata* Auctor., *linifolia* Roch.), italienischer, 4. f. Süd- und Osteuropa.  
*juncea* DC., simsensförmiger, ? 4. ☉. f. Spanien.  
*lanigera* Dsf., wolliger, ☉. f. Portugal, Nordafrika.  
*latifolia* Dsf., breitblättriger, ☉. f. Nordafrika.  
*linifolia* W. (*Biebersteinii* Bess.), schmalblättriger, 4, f. Italien, Taurien, Podolien.  
*litoralis* Bernh., Seestrands-F., ☉. f. Süd- u. Osteuropa.  
 β) *pterospora* Fisch. et Mey.  
*Löselii* Schweig. (*juncea et maritima* Auctor), Lösel's, 4. f. Preußen, Taurien.  
*lusitanica* T., portugiesischer, ☉. f. Portugal.  
*macroua* Lk. (*stricta* Hornem.), großsähriger, 4. f. Südrufland.  
*marginata* Dsf., berandeter, 4. k. f. b. Nordafrika.  
*micrantha* Spgl., kleinblumiger, ☉. f. Spanien.  
*minor* Dsf. (*viscida* Mch.), kleiner, ☉. f. Europa.  
*multicaulis* Spgl., vielstengelig, ☉. f. Sicilien, Portugal, Nordafrika.  
*organifolia* DC., dostenblättriger. 4. k. Westeuropa.  
*Pelisseriana* DC., Pelisser's, ☉. f. Frankreich, Italien.  
*pilosa* DC., haariger, 4. f. Italien, Pyrenäen.  
*procera* DC., hoher, 4. f. ?  
*pubescens* Presl, weichhaariger, 4. f. b. k. Neapel, Sicilien.  
*purpurascens* Hornem., röthlicher, ♂. f. Südeuropa.  
*purpurea* Mill., purpurrother, 4. f. Süditalien.  
*pyramidata* T. (*silenifolia* Lk.), pyramidal, 4. f. Armenien.  
*pyrenaica* DC., pyrenäischer, ☉. f. Frankreich, Pyrenäen.

**Linaria**

- reflexa* Dsf., zurückgebogener, ☉. f. Nordafrika.  
*reticulata* Dsf., netzförmiger, 4. k. Nordafrika.  
*rubrifolia* DC., rothblättriger, ☉. f. Südfrankreich.  
*saxatilis* DC., Gesteins-F., 4. f. Westeuropa.  
*simplex* DC., einfacher, ☉. f. Frankreich, Caucasus.  
*spartea* Spgl., pfriemenförmiger, ☉. f. Spanien, Nordafrika.  
*spuria* Mill., unächter, ☉. f. Europa.  
*striata* DC. (*repens* W.), gestreifter, 4. f. England, Belgien, Schweiz, Frankreich, Italien.  
*supina* Dsf., niedriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.  
*thymifolia* DC., thymianblättriger, ☉. f. Südfrankreich.  
*transtagana* Spgl., Tajo-F., ☉. f. Portugal, Spanien.  
*triornithophora* W., langsporniger, 4. k. Portugal, Spanien.  
*triphylla* W., dreiblättriger, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.  
*tristis* Mill., trauriger, ♂. k. Spanien.  
     b) *lutea* Penny.  
*versicolor* Mönch, buntfarbiger, ☉. f. Südfrankreich.  
*villosa* Spgl., zottiger, 4. k. Spanien.  
*virgata* Dsf., ruthenförmiger, ☉. f. Nordafrika.  
*viscosa* Spgl., schmieriger, ☉. f. Spanien.  
*vulgaris* Bauh., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.  
     β) *Peloria* (L.).

**Linconia** L., Linconie, V. II., Corniculatae-Cunoniaceae (Bruniaceae).

- alopecuroides* L., fuchsschwanzähnliche, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
*cuspidata* Sw., feinspitzige, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.  
*thymifolia* Sw., thymianblättrige, ♂. t. Cap d. gut. H.

**Lindernia** L. (F. B. v. Lindern, elsasser Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrheae.

- Pyxidaria* L., All., büchsenkapselige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
*japonica* Thbg. v. Hornemannia bicolor.

**Lindsaea** Dryand. (Lindsay, englischer Botaniker), XXIV. I., Pteroideae.

- falcata* Dryand., sichelförmige, 4. w. Westindien, Südamerika.  
*linearis* Sw., schmalwedelige, 4. w. Neuholland.  
*media* RB., mittlere, 4. w. Neuholland.  
*microphylla* Sw., kleinblättrige, 4. w. Neuholland.  
*trapeziformis* Dryand., trapezenförmige, 4. w. Westindien, Brasilien.

**Linnaea** Gronov (C. v. Linné, bekannter berühmter Naturforscher), XIV. II., Caprifoliaceae.

- borealis* Gronov, L., nördliche, 4. ♂. f. Europa, Nordamerika.

    b) *americana*. c) *australis* Hffmsg.

**Linociera** Sw. (G. Linocier, ein französischer Arzt), II. I., Sapotaceae-Oleinae.

- compacta* RB., dichtblumige, ♂. w. Westindien.  
*cotinifolia* Vahl, cotinusblättrige, ♂. w. Ceylon.  
*ligustrina* Sw., ligusterähnliche, ♂. w. Antillen.

**Linum** T., Lein (Flachs), V. v., Hypericineae-Lineae.

- I. *Adenolinum* Rchb.  
*alpicola* Rchb., Voralpen-L., 4. f. Kärnthien.

## Linum

- alpinum Jacq., Alpen-L., 4. f. Oesterreich.  
 b) album A. P.  
 altaicum Fisch., altaischer, 4. f. Altai.  
 anglicum Mill. (*perenne* Sm.), englischer, 4. f. England.  
 b) album A. P.  
 angustifolium Huds., schmalblättriger, 4. f. England, Südeuropa.  
 austriacum L., österreichischer, 4. f. Oesterreich, Siebenbürgen.  
 decumbens Dsf. (*rubrum* Rafin.), niederliegender, 4. f. b. Nordafrika, Sicilien.  
 marginatum Poir. (*angustifolium* W.), berandeter, 4. f. Südeuropa.  
 montanum Schlch., DC., Berg.L., 4. f. Schweiz, Frankreich.  
 nervosum W. Kit., nerviger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.  
 pallescens Ledeb., bleicher, 4. f. Sibirien.  
 perenne L., ausdauernder, 4. f. Sibirien, Westdeutschland.  
 pyrenaeum DC. (*narbonense* Lapeyr.), pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen.  
 reflexum Ait., zurückgebogener, 4. f. Südeuropa.  
 sibiricum DC., sibirischer, 4. f. Sibirien.  
 squamulosum Rud. (*austriacum* MB.), schuppiger, 4. f. Taurien.

### II. Cathartolinum Rchb.

- agreste Brot., Acker-L., ☉. f. Portugal.  
 Berendieri Hook. (*Plotzii* Hook.), Berendier's, ☉. ♂. k. Spanien.  
 bicolor Dsf., Schousb. (*tenuifolium* β. P.), zweifarbiger, ☉. f. Nordafrika.  
 catharticum L. (*C. pratense* Rchb.), Purgir-F., ☉. f. Europa.  
 corymbulosum Rchb. (*aureum* DC.), traubendoldiger, ☉. f. Oesterreichisches Litorale.  
 gallicum L. (*aureum* W. K.), französischer, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 inaequale Presl, ungleicher, ☉. f. Sicilien.  
 rigidum Pursh, starrer, ☉. f. Nordamerika.  
 salsoloides L., pfriemenförmiger, ♂. k. Spanien, Frankreich.  
 sardoum Mill., sardinischer, ☉. f. Sardinien.  
 strictum L. (*liburnicum* Scop.), steifer, ☉. f. Italien, Frankreich, Griechenland.  
 suffruticosum L., strauchiger, ♂. k. Spanien.  
 tenuifolium L., feinblättriger, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 virginianum L., virginischer, ♂. f. Nordamerika.

### III. Hololinum \*

- monogynum Forst., einweibiger, ♂. t. Neuzeeland.

### IV. Linopsis Rchb.

- africanum L., afrikanischer, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.  
 Cumingi Lod., Cuming's, ♂. t. Chili,  
 maritimum L. (*heterophyllum* Mch.), Meerstrands-L., 4. f. Südeuropa.  
 quadrifolium L., vierblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.



**Linum****V. Linum** Rchb.

*ascyrisfolium* Sims, *ascyrumblättriger*, 4. f. Portugal.  
*dahuricum* Schult. (*africanum* Rchb.), *dahurischer*, 4. f. Dahurien.

*diffusum* Schrad. (*pallens* Hort.), *weitschweifiger*, 4. f. ?  
*grandiflorum* Dsf., *großblumiger*, 4. k. Nordafrika.

*hirsutum* L., *rauhhaariger*, 4. f. Oesterreich, Tatarei.  
*humile* Mill., *niedriger*, ☉. f. Südeuropa.

*hypericifolium* Sal., *johanniskrautblättriger*, 4. f. Caucasus.

*laeve* Scop., *glatter*, 4. f. Krain, Litorale.

*Lewisii* Pursh, *Lewis's*, 4. f. Nordamerika.

*monadelphum* Mart., *einbrüderiger*, ☉. f. ?

*narbonense* L., *südfranzösischer*, 4. f. Südfrankreich.

*usitatissimum* L. (*asiaticum* Mart.), *gebräuchlicher*, ☉. f. Europa.

β) *crepitans* Schübl. et Martens (*grandiflorum* Hort.). γ) *fasciculatum* Mart.

*viscosum* L., *schmieriger*, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

**VI. Macrolinum** Rchb.

*trigynum* Roxb., Sm., *dreiweibiger*, ♀. t. Ostindien.

**VII. Xantholinum** Rchbch.

*arboreum* L., *baumähnlicher*, ♀. k. Creta.

*campanulatum* L., *glockiger*, 4. f. k. Spanien, Südfrankreich.

*capitatum* Kit., *kopfförmiger*, 4. f. Croatien, Illyrien.

*flavum* L. (*monopetalum* Steph.), *gelber*, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

*luteolum* MB., *gelblicher*, ☉. f. Taurien, Caucasus.

*nodiflorum* L., *knotenblumiger*, ♂. f. Italien, Griechenland.

*tauricum* W. (*campanulatum* MB.), *taurischer*, 4. f. Taurien.

*Radiola* L. v. *Radiola linoides*.

**Liparia** L., *Liparie*, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*sphaerica* L., *kugelblumige*, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*capitata* Thbg. etc. v. *Priestleya capitata* etc.

*Liparis bituberculata* Lindl. etc. v. *Sturmia bituberculata* etc.  
*priochilus* Bot. Cab. v. *Microstylis versicolor*.

**Lipostoma** D. Don. *Mundkapsel*, IV. i., Rubiaceae.

*campanuliflora* D. Don, *glockenblumige*, 4. w. Brasil.

**Lippia** L. (Augustin Lippi, französischer Arzt und Naturforscher, welcher Abyssinien bereiste), XIV. ii., Verbenaceae.

*dulcis* Hort., *süße*, 4. ♀. w. Westindien.

*purpurea* Jacq., *purpurfarbige*, ♀. w. Mexico.

*nodiflora* Rich. et *stoechadifolia* H. B. K. v. *Zapania nodiflora* etc.

**Liquidambar** L., *Amberbaum*, XXI. ix., Amentaceae-Myricaceae b. *Styracifluae*.

*orientale* Mill., Ait. (*imberbe* W.), *morgenländischer*, ♀. f. b. Kleinasien.

*Styraciflua* L., *ahornblättriger*, ♀. f. b. Nordamerika.

*asplenifolium* L. (*peregrinum* L.) vid. *Comptonia asplenifolia*.

**Liquiritia officinalis** Mch. v. *Glycyrrhiza glabra*.

*Lipochaeta* (*Lipotriche* Less.) *monocephala* DC. v. *Zexmenia monocephala*.

**Liriodendron** L., Tulpenbaum, XIII. VI., Magnoliaceae.

*Tulipifera* L., gemeiner, ♀. f. Nordamerika.

β) *obtusiloba* Mchx. (*integrifolia* Hort.). γ) *acutifolia* Mchx. δ) *flava* Hort.

**Liriope** Herb., Liriope, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.  
*ringens* Herb., rachenförmige, 4. Zw. w. Peru.

**Lisianthus** P. Br., Kahlblume, V. I., Contortae-Gentianeae.

*acutangulus* R. et P., spitzkantige, 4. w. Peru.

*alatus* Aubl., geflügelte, ♂. w. Mexico.

*angustifolius* H. B. K., schmalblättrige, ♀. w. Südamerika.

*cordifolius* L., herzblättrige, ♀. w. Jamaica.

*exsertus* Sw., langfadige, ♀. w. Jamaica.

*glaucifolius* Jacq., blaugrünblättrige, ♀. w. Westindien.

*grandiflorus* Aubl., großblumige, ♂. w. Guiana.

*latifolius* Sw., breitblättrige, ♀. w. Jamaica.

*longifolius* L., langblättrige, ♀. w. Jamaica.

*Russelianus* Hook. (*glaucifolius* Nutt. non Jcq.), Russel's, ♂. ♂. f. Mexico.

*umbellatus* Sw., doldige, ♀. w. Jamaica.

**Lissanthe** RB., Glattblume, V. I., Epacrideae.

*ciliata* RB., gefranzte, ♀. t. Neuholland.

*daphnoides* RB., seidelbastähnliche, ♀. t. Neuholland.

*sapida* RB., wohlschmeckende, ♀. t. Neuholland.

*strigosa* RB., stiegelige, ♀. t. Neuholland.

*subulata* RB., pfriemenförmige, ♀. t. Neuholland.

**Lissochilus** RB., Glatstendel, XX. I., Orchideae.

*luteus* Swt., gelber, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

*parviflorus* Lindl., kleinblumiger, 4. w. Algoa Bay.

*speciosus* RB., prächtiger, 4. w. Cap der gut. Hoffn.

**Listera** RB. (Martin Lister, englischer Naturforscher), XX. I., Orchideae.

*cordata* RB., herzblättrige, 4. f. Nord- und Mitteleuropa, Nordamerika.

*ovata* RB., eiblättrige, 4. f. Europa.

**Lithospermum** T., Steinsame, V. I., Asperifoliaceae.

*apulum* L., apulischer, ♂. f. Südeuropa.

*arvense* L., Acker-St., ♂. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika.

*canescens* Lehm., grauer, 4. f. Nordamerika.

*dispermum* L., zweisamiger, ♂. f. Spanien, Griechenland, Taurien, Sibirien.

*distichum* Orteg., zweireihiger, 4. t. w. Cuba.

*fruticosum* L., strauchiger, ♀. k. Südeuropa.

*graminifolium* Viv., grasblättriger, ♀. k. Ligurien, Sicilien.

*hirtum* Lehm., kurzhaariger, 4. f. Nordamerika.

*latifolium* Mchx., breitblättriger, 4. f. Nordamerika.

*lineatum* Lehm., linirter, ♂. f. ? Griechenland.

*longiflorum* Spgl. (*incisum* Lehm.), langblumiger, 4. f. Nordamerika.

*officinale* L., officineller, 4. f. Europa.

*orientale* Vahl, morgenländischer, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

*prostratum* Lapeyr. (*diffusum* Lag.), gestreckter, 4. k. Südfrankreich, Spanien.

**Lithospermum**

- purpureo-coeruleum L., purpurblauer, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 rosmarinifolium Tenor., rosmarinblättriger, 5. k. Capri.  
 scabrum Thbg., scharfer, 4. k. Cap der gut. Hoffn.  
 setosum Fisch. et Mey., borstiger, ①. f. Caucasus,  
 strigosum MB., striegeliger, 4. f. Taurien.  
 tenuiflorum L., dünnblumiger, ①. f. Aegypten, Cypern.  
 tinctorium DC., färbender, 4. f. Südeuropa.  
 villosum L., zottiger, 4. k. f. b. Südfrankreich, Calabrien.

*cornutum* Ledeb. (*decumbens* Vent.) vid. *Arnebia*  
*cornuta* Nachtr. *davuricum* Lehm., *denticulatum*  
 Lehm., *maritimum* Lehm., *paniculatum* Lehm. etc.  
 v. *Platynema davuricum* etc.

**Litorella** L., Uferling, XXI. iv., Plantagineae.

*lacustris* L., grasblättriger, 4. Wa. f. Europa.

**Litsea** *Cervantesii* H. B. K., *chinensis* Lam. etc. v. *Tetranthera Cervantesii*, *laurifolia* etc.**Littaea** Brignol. v. *Agave*.**Livistonia** RB. (Patrik Murray von Livistone, schottischer Gelehrter), VI. iii., Palmae.

*humilis* RB., niedrige, 5. t. w. Neuholland.

*inermis* RB., unbewehrte, 5. t. w. Neuholland.

**Lagunoa** R. et P., *Lagunoa*, XX. ix. (VIII. i.), Sapindaceae.

*nitida* R. et P., glänzende, 5. w. Peru.

**Lloydia** Salisb., *Lloydie*, VI. i., Coronariae-Asphodeleae.

*serotina* Salisb., spätblühende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, England, Sibirien.

**Loasa** Adans., *Loasa*, XVIII. ii. (XIII. i.), Loasaceae.

*acanthifolia* Juss., bärenklaubblättrige, ①. m. f. w. Chili.

*acerifolia* Juss., ahornblättrige, ①. m. f. w. Peru.

*grandiflora* Lam., großblumige, ①. m. f. w. Peru.

*hispida* L. (*ambrosiaefolia* Juss.), steifhaarige, ①. m. f. w. Peru.

*incana* Grah., weißgraue, 4. t. w. Peru.

*lateritia* Hook., ziegelfarbige, ♂. Sch. t. w. Chili.

*nitida* Lam., Juss. (*Placei* et *acanthifolia* Bot. reg.),  
 schimmernde, ①. m. f. w. Peru.

*patula* Grah., ausgebreitete, ①. m. f. w. Chili.

*tricolor* Ker, dreifarbige, ①. m. f. w. Chili.

*volubilis* Juss., windende, ①. Sch. t. w. Chili.

*palmata* Spgl. v. *Blumenbachia insignis*. *volubilis*  
 Hort. v. *Scyphanthus grandiflorus*.

**Lobelia** L. (Matth. Lobel, alter berühmter belgischer Botaniker), V. i., Campanulaceae-Lobeliaeae.

I. *Centropogon* Presl. (*Siphocampylus* G. Don).

*surinamensis* L., surinamische, 5. w. Südamerika etc.  
 b) *rubra*.

II. *Dobrowskia* Presl. (*Parastranthus* G. Don).

*unidentata* Ait. fil. (*bidentata* Don, *scapigera* W.), ein-  
 zähnige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

III. *Enchysia* Presl.

*erinoides* L. (*Monopsis inconspicua* Salisb.), erinusäh-  
 liche, ①. ♂. f. k. Cap der guten Hoffnung.

*repens* Thbg. (*secunda* L. fil., *pubescens* W. non Ait.)  
 kriechende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.



# Lobelia

b) alba.

- IV. *Isolobus* A. DC. (*Pratia* G. Don).  
*campanuloides* Thb. (*japonica* Diet.), glockenblumen-  
 ähnliche, 4. t. Japan.  
*concolor* RB., einfarbige, 4. k. t. Neuholland.  
*corymbosa* Grah., traubendoldige, 4. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
*Kerii* DC. (*campanuloides* Ker), Ker's, 4. t. China.  
*Roxburghiana* A. DC. (*radicans* Roxb. non Thbg.), Rox-  
 burgh's, 4. t. w. China.

V. *Laurentia* Mich. (*Solenopsis* Presl.).

- Laurentia* L. (*Gasparrini* Tin., *Salzmanniana* Presl),  
 italienische, ☉. f. Nordafrika, Italien, Frankreich.  
*micrantha* A. DC. (*minuta* Thbg.), kleinblumige, ☉. f.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*minuta* L., kleine, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

β) minima Sims.

- tenella* Bivon. (*Laurentia* β. W., *setacea* Sm., *Solenopsis*  
*Bivoneana* Presl), zierliche, 4. k. Griechenland,  
 Süd- und Westeuropa.

VI. *Lobelia genuina* (*Rapuntium* T. Presl.).

- algoensis* A. DC., Algoa-L., ☉. f. m. Südafrika.  
*amoena* Mchx., liebliche, 4. f. b. Virginien, Caro-  
 lina, Texas.  
*anceps* Thbg. (*decumbens* Sims, *rhizophyta* Spgl., *belli-  
 difolia* Ait., *rupicola* Berter.), zweischneidige, 4. k.  
 t. Cap der guten Hoffnung, Neuholland, Westindien,  
 Südamerika.

β) *alata* LaBill., RB. γ) *cuneiformis* LaBill.

- bellidifolia* Thbg., maßliebenblättrige, ☉. f. m. Cap  
 der guten Hoffnung.  
*bicolor* Sims (*Erinus* Thbg.), zweifarbig, 4. k. t. Cap  
 der guten Hoffnung.  
*bracteolata* A. DC., deckblättrige, 4. k. ?  
*campanulata* Lam., glockige, ☉. f. m. Südafrika.  
*cardinalis* L., scharlachfarbig, 4. f. b. k. Nordamer.

β) *Milleri* A. DC. (Hybride).

- chinensis* Lour., chinesische, ☉. f. China.  
*Cliffortiana* L., Clifford's, ☉. f. Nordamerika, Westind.  
*coelestis* Nutt., himmelblaue, 4. f. Nordamerika.  
*coerulea* Hook., blaue, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*colorata* Swt. (*hortensis* A. DC.), schönfarbig, 4. f. b.  
 Nordamerika.

- coronopifolia* L. (*Thunbergii* Swt.), krähensfußblättrige,  
 4. k. Cap der guten Hoffnung.

- crenata* Thbg., gekerbte, 4. Sch. k. Cap der gut. H.  
*cuneifolia* Lk, et Otto, keilblättrige, 4. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

- decurrens* Cav., herablaufende, 4. f. w. t. Chili.

β) *foliosa* H. B. K. (*decurrens* Swt.).

- dentata* Cav., gezahnte, ☉. f. Neuholland.  
*Dortmanna* L. (*puludosa* Nutt.), Dortmann's, 4. Wa. f.  
 West- und Nordeuropa, Nordamerika.

- Erinus* L., *Erinus*-L., ☉. f. k. Cap der gut. Hoffn.  
*fenestralis* Cav. (*spicata* Mocin., *crispa* Grah.), kraus-  
 blättrige, 4. f. b. k. Mexico.  
*fulgens* W., funkelnde, 4. f. b. k. Mexico.  
*glandulosa* Walt. (*crassiuscula* Mich.), drüsige, 4. Wa.  
 f. k. Nordamerika.

## Lobelia

- globosa RB., kugelförmige, 4. k. t. Neuholland.  
 gracilis Andr. (*dentata* Sbr.), schlanke, ☉. f. m. Cap  
 der guten Hoffnung, Neuholland.  
 graminea Lam., grasartige, 4. k. Peru.  
 hederacea H. Kew. (*arguta* Hortul.), epheuähnliche,  
 4. k. ?  
 heteramolla Jacq., verschiedenwendige, 4. t. ?  
 heterophylla La Bill., verschiedenblättrige, ☉. f. m.  
 Neuholland.  
 hirsuta L., rauhaarige, 4. ♀. k. t. Cap der gut. H.  
 inflata L., aufgeblasene, ☉. f. Nordamerika.  
 inundata RB., überschwemmte, 4. Wa. t. Neuholland.  
 Kalmii L., Kalm's, ♂. 4. f. Nordamerika.  
 Kraussii Grah., Kraus's, 4. w. Westindien.  
 laxiflora H. B. K. (*Cavanillesiana* R. et S., *Siphocampylus*  
*bicolor* D. Don), lockerblumige, 4. ♀. k. Mexico.  
     β) *angustifolia* A. DC., (*persicifolia* H. B. K.,  
     *Cavanillesii* Hortul.).  
 linearis Thbg., gleichbreitblättrige, ♀. k. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 maculata Penny, gefleckte, 4. t. k. Neuzeeland.  
 Michauxii Nutt. (*Cliffortiana* Mchx.), Michaux's, ☉. f.  
 Nordamerika.  
 mollis Grah., weiche, 4. w. Westindien.  
 nicotianaefolia Roth, tabakblättrige, ♂. w. Ostindien.  
 Nuttalliana R. et S. (*gracilis* Nutt.), Nuttall's, 4. f.  
 Nordamerika.  
 Ottoniana A. DC., Otto's, ☉. f. ?  
 pauciflora H. B. K. (*commutata* R. et S.), wenigblumige,  
 4. k. t. Mexico.  
 pinifolia L., kieferblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.  
 propinqua Hort., verwandte, 4. k. Hybride.  
 puberula Mich., feinhaarige, 4. f. b. k. Nordamerika.  
     β) *glabella* Hook.  
 pubescens Ait. (*alysifolia* Salisb., *hirsuta* Andr.), weich-  
 haarige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 purpurascens RB., purpurfarbige. 4. k. t. Neuholland.  
     β) *ilicifolia* Sims.  
 pyramidalis Wall., pyramidale, 4. k. Nepal.  
 ramosa Benth., (*tenuis* Benth.), ästige, 4. k. t. Neu-  
 holland.  
 rugulosa Grah., runzelige, 4. k. t. Neuzeeland.  
 Schiedeana \* Schiede's, 4. f. b. k. Texas, Mexico.  
 scutellarioides Hortul., schildkrautähnliche, 4. k. ?  
 setacea Thbg., borstige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 simplex Thbg., einfache, 4. ♂. f. k. Cap der gut. H.  
 Simsii Swt. (*pedunculata* Sims non RB., *recurvifolia*  
 Spgl.), 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 spicata Lam. (*Claytoniana* Mchx., *goodenioides* W., *pal-*  
*lida* Mühlbg.), ährige, 4. f. b. k. Nordamerika.  
 splendens Humb., schimmernde, 4. f. b. k. Mexico.  
 syphilitica L., antivenerische, 4. f. Nordamerika.  
     b) *alba*.  
     β) *maculata*. γ) *Ludoviciana*. δ) *hybrida* Hook.  
     (*speciosa* Swt.).  
 texensis Rafin. (*cardinalis* Hort., *Drummondii* Hort.,  
*atrosanguinea* Hort.), texanische, 4. f. b. k. Texas.

## Lobelia

tomentosa L., filzige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

β) multiflora A. DC.

trialata Hamilt. (*micrantha* Hook.), dreiflügelige, ♂. f. m. Nepal.

triquetra L., dreiseitige, ♂. ♂. f. k. Cap der gut. H.

β) comosa A. DC. (*corymbosa* Berg.).

urens L. (*serrulata* Schott., *Farsetia* Vand.), brennende, ♂. ♂. f. Frankreich, Spanien, Madeira, England.

xalapensis H. B. K. (*mollis* Grah.), xalapische, ♂. f. Mexico, Westindien.

zeylanica L., ceylonische, 4. t. w. Ostindien.

Hybriden von *cardinalis*, *fulgens*, *splendens*, *syphilitica*, *texensis* etc. erzogen: *atrocoerulea* A. P., *atrosanguinea* Loud., *coerulea grandiflora* Hort., *grandis* A. P., *longifolia* A. P., *stellata* A. P., *violacea* A. P. etc.

VII. *Monopsis* Salisb.

debilis L. suppl., schwache, ♂. f. m. Cap d. gut. H.

*Speculum* Andr. (*M. conspicua* Salisb.), *specularia*ähnliche, ♂. f. Cap der guten Hoffnung.

VIII. *Parastranthus* G. Don.

lutea L., gelbe, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

variifolia Sims, verschiedenblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

IX. *Piddingtonia* A. DC.

nummularia Lam. (*begonifolia* Wall., *obliqua* Hamilt.), schieflättrige, 4. t. w. Nepal, Java.

X. *Pratia* Gaudich.

serpyllacea Presl (*hederacea* Cham.), quendelähnliche, 4. t. w. Südamerika.

β) odorata Grah. (*hederacea* Hook.).

XI. *Siphocampylus* Pohl.

biserrata Cav., doppeltsägezähne, 4. ♂. k. t. Peru.

Caoutschouc H. B. K., gummielasticumgebende, ♂. w. Südamerika.

gigantea Cav. (*Tupa* Don), riesenhafte, ♂. w. Südamerika.

umbellata H. B. K., doldige, ♂. w. t. Peru.

verbascifolia Presl, kerzblättrige, ♂. t. w. Peru.

XII. *Tupa* G. Don.

acuminata Sw., zugespitzte, ♂. w. Westindien.

assurgens L., aufstrebende, 4. ♂. t. w. Westindien.

blanda D. Don, liebliche, 4. k. t. Chili.

Bridgesii Hook., Bridges's, ♂. t. Chili.

mucronata Cav., stachelspitzige, 4. ♂. t. Chili.

β) Hookeri A. DC. (*mucronata* Hook.).

persicaefolia Lam., pfirsichblättrige. 4. ♂. w. Westind.

polyphylla Hook. et Arn., vielblättrige, 4. ♂. t. k. Chili.

β) angustifolia Hook. γ) latifolia A. DC.

purpurea Lindl. (*Poeppigiana* Kunze), purpurrothe, ♂. t. k. Chili.

racemosa Sims, traubige, ♂. w. Antillen.

robusta Grah., starke, 4. ♂. w. St. Domingo.

salicifolia Swt. (*Tupa* Ait., *gigantea* Sims, *Brandtii* H. Par., *arguta* Lindl., *neriifolia* Moris), weidenblättrige, ♂. t. k. Chili.

stricta Sw., steife, ♂. w. Westindien.



**Lobelia**

*Tupa* L. (*T. Feuillei* G. Don), giftige, 4. k. f. b. Chili.  
*bulbosa* L. etc. v. *Cyphia bulbosa* etc. *hypocrateri-*  
*formis* RB. v. *Isotoma Brownii* Nachtr. *Plumieri*  
 L. v. *Scaevola Plumieri. senecioides* Sims v. *Iso-*  
*toma axillaris. tenella* L. vid. *Lightfootia oxycoc-*  
*coides*.

*Lobularia maritima* Desv. v. *Koniga maritima*.

*Lockhartia elegans* Hook. v. *Fernandezia elegans*.

**Loddigesia** Sims (C. Loddiges, berühmter englischer  
 Handelsgärtner), XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-  
 Papilionaceae.

*oxalidifolia* Sims, sauerkleeähnliche, ♀. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

**Lodoicea** Commers., *Lodoicea*, XXII. xii. (XIII. iii.),  
 Palmae.

*Sechellarum* La Bill., Sechellen-L., ♀. w. Sechellen.

**Loeflingia** L. (P. Loefling, schwedischer Botaniker),  
 III. i., Portulacae-Paronychieae.

*hispanica* L., spanische, ☉. f. Spanien.

*pentandra* Cav., fünfmännige, ☉. f. Südspanien.

**Logania** RB. (Jakob Loghan, englischer Botaniker), V.  
 i., Contortae-Loganieae.

*floribunda* RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

*latifolia* RB., breitblättrige, ♀. t. Neuholland.

*ligustrina* Cunn., ligusterähnliche, ♀. t. Neuzeeland.

*revoluta* RB., zurückgerollte, ♀. t. Neuholland.

**Loiseleuria** Desv. (Loiseur Deslongchamps, fran-  
 zösischer Botaniker), (*Chamaeledon* Lk., *Chamaecistus*  
 Gray.), V. i., Ericaceae-Rhododaceae.

*procumbens* Desv., niederliegende, ♀. f. Europa, Nord-  
 amerika.

**Lolium** L., Lolch (Raigras), III. ii., Gramineae.

*arvense* Wither. (*remotum* Hoffm.), Acker-L., ☉. f.  
 Europa.

*Boucheanum* Kunth, Bouché's, 4. f. Italien.

*canadense* Mchx., canadischer, ☉. f. Nordamerika.

*complanatum* Schrad. (*asperum* W.), verflachter, ☉. f.  
 Südeuropa.

*festucaceum* Link. (*Festuca elongata* Ehrh., *F. loliacea*  
 Huds.), schwingelähnlicher, 4. f. Mittel-, Süd- und  
 Westeuropa, Nordafrika.

*multiflorum* Lam., vielblumiger, ☉. f. Süd- und West-  
 europa.

*perenne* L., gemeiner, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

b) *tenue* L. (*Halleri* Gmel.). c) *compositum* R.

et S. d) *ramosum* R. et S. e) *Russelianum*

Sin. f) *Whitwortii* Sin. g) *Stickneyanum* Sin.

h) *paniculatum* Sin. i) *monstrosum* Sin. k) *vi-*

*viparum* R. et S. l) *humile* R. et S.

*rigidum* Gaud. (*strictum* Presl), starrer, ☉. f. Schweiz,  
 Italien.

*speciosum* Steven (? *maximum* W.), ansehnlicher, ☉. f.  
 Mittel-, Süd- und Osteuropa, Iberien.

β) *robustum* Rehb.

*temulentum* L., betäubender, ☉. f. Europa, Japan,  
 Neuholland etc.

**Lomandra longifolia** La Bill. et *rigida* La Bill. v. *Xerotes*  
*longifol.* etc.

- Lomaria** W., Saumfarn, XXIV. 1., Pteroideae.  
 acrostichoides Kaulf., acrostichumähnlicher, 4. w. Mascarenas.  
 attenuata W., verdünnter, 4. w. Mascarenas.  
 falcata Spgl., sichelförmiger, 4. w. t. Van-Diemens-L.  
 lanceolata Spgl., lanzettlicher, 4. w. t. Van-Diemens-L.  
 longifolia Kaulf., langblättriger, 4. w. Westindien.  
 nuda W., nackter, 4. w. t. Van-Diemens-Land.  
 Patersonii Spgl., Paterson's, 4. w. t. Van-Diemens-L.  
 procera Spgl., hoher, 4. w. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.  
 Spicant Desv., nördlicher, 4. f. Europa, Canarische Inseln.
- Lomatia** RB., Lomatie, IV. 1., Proteaceae.  
 dentata RB., gezähnelte, 5. t. Chili.  
 ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, 5. t. Neuholland.  
 longifolia RB., langblättrige, 5. t. Neuholland.  
 silaifolia RB., silausblättrige, 5. t. Neuholland.  
 tinctoria RB., färbende, 5. t. Van-Diemens-Land.
- Lomatolepis** Cass., Saumschuppe, XIX. v., Compositae-Cichoriaceae.  
 glomerata Cass., knaulförmige, 6. f. Aegypten.
- Lomatophyllum** W., Saumblatt, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.  
 borbonicum W., borbonisches, 5. w. Mascarenas.  
 Jacquini Spgl., Jacquin's, 5. w. ?  
 macrum Lk. (Haw.), dünnblättriges, 5. w. Mascarenas.  
 rufocinctum (Sw.), rothrandiges, 5. w. Ostindien.
- Lonas** Adans., Lonas, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.  
 inodora G., geruchlose, 6. f. Südfrankreich, Nordafrika.
- Lonchitis** L., Lanzenfarn, XXIV. 1., Pteroideae.  
 hirsuta L., haariger, 4. w. Westindien.  
 pedata L., fußförmiger, 4. w. Jamaica.
- Lonchocarpus** H. B. K., Lanzenhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 domingensis DC., St. Domingo-L., 5. w. St. Domingo.  
 latifolius H. B. K., breitblättrige, 5. w. Westindien.  
 macrophyllus H. B. K., großblättrige, 5. w. Südamer.  
 pubescens DC., weichhaarige, 5. w. Südamerika.  
 pyxidarius DC., büchsenförmige, 5. w. Cuba.  
 roseus DC., rosafarbige, 5. w. Südamerika.  
 sepium DC., Zaun-L., 5. w. Westindien.  
 sericeus H. B. K., seidenhaarige, 5. w. Westindien.  
 violaceus H. B. K., violette, 5. w. Carthagera.
- Longchampsia capillifolia** W, v. Leyssera capillifolia.
- Londesia** Fisch. et Mey. (F. W. Londres, ein Deutscher, Arzt und Botaniker zu Moskau), V. 1. (XXI. v.), Aizoideae-Atriplicineae.  
 eriantha Fisch. et Mey., wollblumige, 6. f. Caspisches Meer.
- Lonicera** L. (A. Lonicer, alter deutscher Botaniker), V. 1., Caprifoliaceae.  
 I. Caprifolium T., Geißblatt (Jelängerjelier).  
 Caprifolium L., italienisches, 5. Sch. f. Südeuropa.  
 b) pallida Host. c) rubra Hort. d) fol. variegato.  
 ciliosa Poir. (Pursh), feinfranziges, 5. Sch. f. Nordamerika.

**Lonicera**

*confusa* DC. (*japonica* Andr.), verwechselte, ♀. Sch. k. Japan.

*cyrenaica* Viv., cyrenaische, ♀. Sch. f. b. Nordafrika.

*Douglasii* DC. (Lindl.), Douglas's, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*etrusca* Santi, etrusische, ♀. Sch. f. Südeuropa.

*flava* Sims (*Caprifolium Fraseri* Pursh), hellgelbe, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*grata* Ait. (*virginiana* Marsh.), schöne, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*hispidula* Dougl., steifhaarige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*implexa* Ait., verflochtene, ♀. Sch. f. b. Istrien, Italien, Balearen.

β) *balearica* Viv.

*japonica* Thbg. (*chinensis* H. Kew., *flexuosa* Lodd. non Thbg., *glabrata* Roxb.), japanische, ♀. Sch. k. Japan.

*longiflora* DC. (*Caprifol. japonicum* D. Don, *nepalense* G. Don), langblumige, ♀. Sch. k. China, Nepal.

*occidentalis* Lindl., Hook. (? *pilosa* W., *Caprifol. ciliosum* Dougl.), westliche, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*parviflora* Lam. (*dioica* L., *media* Murr., *Caprifol. glaucum* Mch.), kleinblumige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*Periclymenum* L., gemeine deutsche, ♀. Sch. f. Mitteleuropa.

b) *serotinum*. c) *belgicum*. d) *quercifolium*. e) *variegatum*.

*prolifera* Booth C., sprossende, ♀. Sch. f. Nordamer.

*pubescens* Swt. (*hirsuta* Eaton, *Goldii* Spgl.), haarige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*sempervirens* L., immergrüne, ♀. Sch. f. Nordamerika.

b) *major* Ait. c) *minor* Ait. d) *semiplena* Booths C.

**II. Isika Adans..**

*alpigena* L., Alpen-L., ♀. f. Mitteleuropäische Voralpen, Sibirien.

β) *sibirica* Vest., DC.

*coerulea* L., blaue, ♀. f. Schweiz, Frankreich.

*iberica* MB., iberische, ♀. f. Iberien.

*microphylla* W. (*alpigena* Sievers), kleinblättrige, ♀. f. Altai.

*oblongifolia* Hook., länglichblättrige, ♀. f. Nordamer.

*orientalis* Lam. (*caucasica* Pall.), morgenländische, ♀. f. Iberien, Kleinasien.

*villosa* Mühlbg., zottige, ♀. f. Nordamerika.

**III. Xylosteum T., Heckenkirsche.**

*canescens* Schousb., (*biflora* Dsf.), grauliche, ♀. Sch. k. Nordafrika.

*ciliata* Mühlbg. (*canadensis* Bartr.), gefranzte, ♀. f. Nordamerika.

b) *alba*.

*flexuosa* Thbg., gebogene, ♀. k. f. b. Japan.

*hispida* Pall., steifborstige, ♀. f. Altai.

*involuta* Banks, hüllblättrige, ♀. f. Nordamerika.

*nigra* L., schwarze, ♀. f. Mitteleuropa.

*Pallasii* Ledeb. (*montana* Hort. angl., *altaica* Pall.), Pallas's, ♀. f. Sibirien.

b) *campaniflora* Lodd.

*punicea* Sims, braunrothe, ♀. f. Nordamerika.



**Lonicera**

*pyrenaica* L., pyrenäische, ♀. f. Pyrenäen.

*tatarica* L., tatarische, ♀. f. Sibirien, Tatarei.

β) *albiflora* DC. (*pyrenaica* W., *parvifolia* Hayn.).

γ) *rubriflora* DC. (*grandiflora* Lodd., *sibirica* Hort.). δ) *lutea* Lodd. ε) *latifolia* Lodd.

*Xylosteum* L., gemeine, ♀. f. Mitteleuropa, Caucasus.

β) *leucocarpa* DC. γ) *xanthocarpa* DC. δ) *melanocarpa* DC.

*Diervilla* L. v. *Diervilla canadensis*. *symphoricarpos*

L. v. *Symphoria glomerata*.

**Lopezia** Cav. (T. Lopez, spanischer Botaniker), I. 1., Onagrariae.

*cordata* Hornem., herzblättrige, ☉. f. m. Mexico.

*coronata* Andr. (*axillaris* Schweigg., *minuta* Lag.), gekrönte, ☉. f. m. Mexico.

*hirsuta* Jacq., rauhhaarige, ♂. ♀. t. Mexico.

*hispida* Swt., steifhaarige, ☉. f. m. Mexico.

*mexicana* Jacq. (*racemosa* Cav.), mexicanische, ☉. f. m. k. Mexico.

*miniata* Lag. (*frutescens* R. et S., *fruticosa* Schrk.), mennigrothe, ♀. t. Neuspanien.

*minima* Lag., kleinste, ☉. f. m. Mexico.

*pumila* Bonpl., niedrige, ☉. f. m. Mexico.

**Lophandra** D. et G. Don v. *Erica*.**Lophanthus** Benth., Büschelblume, XIV. 1., Labiatae.

*anisatus* Benth., anisduftende, 4. f. Nordamerika.

*nepetoides* Benth. (L.), nepetaähnliche, 4. f. Nordamerika.

*obtusifolius* \* (*Hyssop lophanthus* L.), stumpfblättrige, 4. f. Nordchina, Sibirien.

*rugosus* Fisch. et Mey., runzelige, 4. f. Nordchina.

*scrofularifolius* Benth. (W.), braunwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

*urticifolius* Dougl., nesselblättrige, 4. f. Nordamerika.

**Lophiola** Ker, Bartkrone, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

*aurea* Ker, goldfarbige, 4. f. h. k. Nordamerika.

**Lophira** Banks, *Lophira*, XII. 1., ?Rhizophoreae.

*africana* Banks, afrikanische, ♀. w. Sierra Leone.

**Lophospermum** D. Don, Schopfsame, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

*atrosanguineum* Zucc. (*Rhodochiton* D. Don), blutrother, ♀. Sch. k. t. Mexico.

*erubescens* D. Don, röthlicher, ♀. Sch. k. t. Jalapa.

*scandens* D. Don (? *mexicanum* Hort.), klimmender, ♀. Sch. k. t. Mexico.

**Lopimia** Mart., *Lopimie*, XVI. VIII., Malvaceae.

*malacophylla* Mart., weichblättrige, ♀. w. Brasilien.

**Loranthus** L., Riemenblume, VI. 1., Caprifoliaceae-Loranthaeae.

*europaeus* Jacq., europäische, ♀. f. Mähren, Oesterreich, Siebenbürgen.

*floribundus* LaBill. (*terrestris* Swt.), blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

**Lorentea atropurpurea** Orteg. v. *Sanvitalia procumbens*.**Lotus** T., Schotenklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

## Lotus

- ambiguus Bess., zweifelhafter, 4. f. Volhynien.  
 angustissimus L., schmaler, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa.  
     β) diffusus Soland. (*decumbens* Poir.). γ) gracilis W. K.  
 anthylloides Vent., anthyllisähnlicher, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung,  
 arabicus L., arabischer, ☉. f. Arabien.  
 arenarius Broter., sandliebender, ☉. f. Portugal, Nordafrika.  
 argenteus H. C., silberfarbiger, 4. k. ?  
     b) angustifolius.  
 aristatus DC. (*coimbricensis* Brot.), gegrannter, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 atropurpureus DC., dunkelpurpurfarbiger, ♂. Teneriffa.  
 corniculatus L., gemeiner, 4. f. Europa.  
     b) flore pleno.  
     β) ciliatus Tenor. γ) villosus Thuill. δ) tenuifolius Poll.  
 creticus L., cretischer, ♂. k. Creta, West- und Südeuropa.  
 cytisoides L., cytissusähnlicher, ♂. 4. k. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.  
 Dioscoridis All., Dioscorides's, ☉. f. Ligurien.  
 edulis L., genießbarer, ☉. f. Südeuropa.  
 flexuosus Desr., gebogener, 4. f. ?  
 Gebelia Vent., syrischer, 4- k. Syrien.  
 glaberrimus DC. (*coimbricensis* W.), glatter, ☉. f. Südfrankreich, Corsica.  
 glaucus Ait., blaugrüner, ♂. k. Madeira.  
 hispidus Dsf. (*pilosissimus* Poir.), steifhaariger, ☉. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.  
 Jacobaeus L., schwarzbrauner, ♂. k. Insel St. Jacob (Westafrika).  
     b) luteus.  
 indicus Desr., indischer, ☉. m. f. w. Ostindien.  
 lanuginosus Vent., wolliger, ♂. 4. k. Syrien.  
 major Scop. (*uliginosus* Schk.), großer, 4. f. Europa.  
 microphyllus Hook., kleinblättriger, ☉. f. k. Cap der guten Hoffnung.  
 odoratus Curt. (*suaveolens* P.), wohlriechender, 4. k. Südfrankreich, Nordafrika.  
 ornithopodioides L., vogelfußsähnlicher, ☉. f. Sicilien, Spanien.  
 palustris W., sumpfliebender, 4. k. f. Creta.  
 pedunculatus Cav., langstieliger, 4. k. f. Spanien.  
 peregrinus L. (*oligoceratus* Lam.), fremder, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.  
 pusillus Vivian., niedriger, ☉. ♂. f. k. Nordafrika.  
 sessilifolius DC., stiellosblättriger, ♂. k. Teneriffa.  
 spectabilis Choiss., ansehnlicher, ♂. t. Teneriffa.  
 strictus Fisch. et Mey., steifer, 4. f. k. Armenien.  
 tenuis WK. (*depressus* W., *decumbens* Forst., *Forsteri* Sw., *humifusus* W.), dünner, 4. f. Ungarn, England etc.  
 Wrangelianus Fisch. et Mey., Wrangel's, ☉. f. Neu-Californien.  
     australis Andr. (*arboreus* Forst.) vid. *Carmichaelia*  
     australis. *Dorycnium* L. v. *Dorycnium suffruticosum*

## Lotus

etc. *hirsutus* L. etc. v. *Bonjeania hirsuta* Nachtr.  
*pinnatus* Hook. et *sericeus* Pursh v. *Hosackia bicol-*  
*lor* et *Purshiana*. *Tetragonolobus* L. etc. vid. *Tetra-*  
*gonolobus purpureus* etc.

**Lourea** Neck., *Lourea*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*reniformis* DC., nierenförmige, ♂. w. China.

*vespertilionis* Desv., fledermausblättrige, ♂. w. China.

**Loureira** Cav. (J. de Loureiro, portugiesischer Missionair und Botaniker, welcher Cochinchina bereiste), XXII. XIII. (XVI. VI.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

*cuneifolia* Cav., keilblättrige, ♀. w. Mexico.

*glandulosa* Cav., drüsige, ♀. w. Mexico.

**Lowea** Lindl. (M. Lowe, englischer Gelehrter), XII. III., Rosaceae.

*berberifolia* Lindl. (Pall.), berberitzenblättrige, ♀. k. Persien.

**Lubinia** Vent. (M. de St. Lubin, Reisender in Ostindien), V. I., Primulaceae.

*atropurpurea* Lk., dunkelpurpurrothe, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*spatulata* Vent. (*mauritiana* Spgl.), spatelblättrige, ♂. t. Mascarenas.

**Luculia** Swt., *Luculie*, V. I., Rubiaceae.

*gratissima* Swt., angenehme, ♀. t. Nepal.

**Lucuma** Juss. (peruvianischer Name), V. I., Sapotaceae.

*Bonplandii* Kunth, Bonpland's, ♀. w. Cuba.

*mammosa* Juss., zitzenförmige, ♀. w. Ostindien.

*obovata* Kunth, verkehrteiförmige, ♀. w. Peru.

*salicifolia* Bonpl., weidenblättrige, ♀. w. Mexico.

**Ludia** Commers., *Ludie*, XIII. I., Bixaceae.

*heterophylla* Lam., verschiedenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

*sessiliflora* Lam. (*tuberculata* Jacq.), stiellosblumige, ♀. w. Mascarenas.

*heterophylla* Bory v. *Prockia theaeformis*.

**Ludolfia** W. (Ludolf, preussischer Staatsmann), III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

*glaucescens* W., blaugrüne, 4. ♀. w. Ostindien.

*macrosperma* W., großsamige, 4. ♀. k. Carolina.

**Ludovia** *funifera* Poit. v. *Carludovica funifera*.

**Ludwigia** L. (G. Ludwig, Professor der Medicin zu Leipzig), IV. I., Onagrariae.

*alternifolia* L. (*microcarpa* Mchx., *salicifolia* Poir., *uniflora* Rafn.), wechselblättrige, ☉. 4. f. Nordamer.

*hirsuta* Lam., Pursh (*pilosa* W.), haarige, ☉. 4. f. Nordamerika.

*parviflora* Roxb., kleinblumige, ☉. f. m. Bengalen.

*prostrata* Roxb., gestreckte, ☉. f. m. Pegu.

**Luehea** W. (C. Frhr. v. der Luehe, Freund und Gönner der Gartenkunst und Botanik in Oesterreich), XVIII. II., Tiliaceae.

*paniculata* Mart., rispige, ♀. Sch. w. Brasilien.

**Luffa** Cav. (arabischer Name), XXI. v., Cucurbitaceae.

*acutangula* Sering., spitzwinkelige, ☉. f. m. Ostindien.

*aegyptiaca* Mill., ägyptische, ☉. f. m. Ostindien, Aegypten,



**Luffa**

foetida Cav., stinkende, ☉. f. m. Ostindien.

**Luisia** Lindl., Luisia, XX. 1., Orchideae.

alpina Lindl., Alpen-L., 4. w. t. Khoseea Hills.

*Lumnitzera capitata* Spgl. v. *Acrocephalus capitatus*. *moschata* Spgl., *ocymoides* Jacq. v. *Moschosma Brownii* *ocymoides* etc.

**Lunaria** T., Mondviole, XV. 11., Cruciferae.

biennis Mch. (*annua* L.), zweijährige, ♂. f. West- und Südeuropa.

b) *albiflora*.

*rediviva* L., ausdauernde, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
*canescens* W., *graeca* W., *suffruticosa* Vent. v. *Farsesia clypeata*, *lunarioides* et *suffruticosa*.

*Lupinaster macrocephalum* Pursh, *pentaphyllum* Mch. etc.  
v. *Trifolium megacephalum*, *Lupinaster* etc.

**Lupinus** T., Wolfsbohne, XVII. 14. (XVI. 11.), Leguminosae-Papilionaceae.

*affinis* Ag. fil. (*nutkatensis* var.  $\beta$ . Hook.), ähnelnde, 4. f. Nordamerika.

*albifrons* Benth., weißliche, ♂. ♀. k. f. Californien.

*albus* L., weiß, ☉. f. Levante.

*angustifolius* L., schmalblättrige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland.

*arbores* W. (*fruticosus* Curt.). strauchige, ♀. k. ? Südamerika.

$\beta$ ) *odoratissimus*.

*arbustus* Dougl., buschige, ♀. k. Californien.

*argenteus* Pursh, silberfarbige, 4. f. Nordamerika.

*aridus* Dougl., trockene, 4. f. Nordamerika.

*aureus* Ag. fil., goldfarbige, ☉. ♂. k. f. Peru.

*bicolor* Lindl., zweifarbige, ☉. f. Nordamerika.

*bimaculatus* Desr., zweifleckige, 4. ♀. k. Peru, Texas.

*bracteolaris* Desr., deckblättrige, ☉. f. Monte Video.

*canaliculatus* Swt., rinnenförmige, ♂. ♀. k. Buenos Ayres.

*concinus* Ag. fil., nette, ☉. f. Californien.

*Cruikshanksii* Hook., Cruikshanks's, ☉. f. Peru.

*densiflorus* Benth., dichtblumige, 4. f. Californien.

*Douglasii* Ag. fil., Douglas's, 4. f. ? Californien, Columbia.

*elegans* H. B. K., zierliche, 4. f. Mexico.

*exaltatus* Loud., hohe, 4. f. ?

*flexuosus* Dougl., gebogene, 4. f. Nordamerika.

*glabratus* Hort., kahle, 4. f. ? Nordamerika.

*gracilis* H. B. K., schlanke, ♂. ♀. k. Peru.

*grandifolius* Don (? *macrophyllus* Benth.), großblättrige, 4. f. Nordamerika.

*hirsutissimus* Benth., sehr rauhe, 4. f. Californien.

*hirsutus* L., rauhhaarige, 4. f. Westeuropa, Griechenland, Aegypten.

*Hornemanni* Ag. fil., Hornemann's, 4. ♂. f. k. Peru.

*incanus* Grah., weißgraue, ♂. ♀. k. Buenos Ayres.

*latifolius* Lindl., breitblättrige, 4. f. Californien.

*laxiflorus* Dougl., lockerblumige, 4. f. Columbia.

*Lehmanni* Hortul., Lehmann's, 4. f. Hybride.

*lepidus* Dougl., schlüfrige, ♂. 4. f. Columbia.

*leptophyllus* Benth., schlankblättrige, 4. f. Californien.

**Lupinus**

*leucophyllus* Dougl. (? *leucopsis* Ag. fil.), weißblättrige,  
4. f. Columbia.

*Lindleyanus* Ag. fil., Lindley's, 4. k. Peru.

*linifolius* Roth, flachsblättrige, ☉. f. Westeuropa.

*litoralis* Dougl., Strands-W., 4. f. Columbia.

*litratus* Rchb., bestrichene, ☉. f. ?

*lucidus* Benth., spiegelnde, 4. f. Nordamerika.

*luteus* L., gelbe, ☉. f. Südfrankreich, Sicilien,

b) *semiuncialis*.

*Marshallianus* Swt., Marshall's, 4. f. Engl. Hybride.

*Menziesii* Ag. fil., Menzie's, ☉. f. Californien.

*mexicanus* Lagasc., mexicanische, ☉. ♂. f. k. Mexico.

*micranthus* Dougl., kleinblumige, ☉. f. Nordamerika.

*microcarpus* Sims, kleinfrüchtige, ☉. f. ?

*microphyllus* Desr., kleinblättrige, ♂. ♀. k. Peru.

*Milleri* Hort., Miller's, 4. f. Columbia.

b) *bicolor*.

*multiflorus* Desr., vielblumige, ♀. k. Monte Video.

*mutabilis* Swt., veränderliche, ☉. f. Bogota.

*nanus* Benth., zwergige, ☉. f. Californien.

*nootkatensis* Don, Sims (*nutcanus* Spgl., *variegatus* Poir.),

Nootkasund-W., 4. f. Westliches Nordamerika.

*ornatus* Dougl., geschmückte, ♂. 4. f. Columbia.

*perennis* L., ausdauernde, 4. f. Nordamerika.

*pilosus* L., haarige, ☉. f. Griechenland, Südeuropa.

*plumosus* Dougl., federige, 4. f. Californien.

*polyphyllus* Lindl., vielblättrige, 4. f. Columbia.

b) *albiflorus* Lindl. c) *pallidus* J. C.

*prostratus* Ag. fil., gestreckte, ☉. f. Peru.

*pulchellus* Swt., zierliche, ☉. ♀. f. k. Mexico.

*pusillus* Pursh, kleine, ☉. f. Nordamerika.

*rivularis* Lindl., Bach-W., 4. f. Californien.

*Sabinianus* Dougl., Sabine's, 4. f. Nordamerika.

*sericeus* Pursh, seidenhaarige, 4. f. Nordamerika.

*stipulatus* Ag. fil., zwischenblättrige, ♀. k. Mexico.

*subcarnosus* Hook. (? *succulentus* Lindl.), saftige, ☉. f.

Texas, Chili.

*Terminus* Forsk. (*prolifer* Desr.), sprossende, ☉. f. Aegypten, Sicilien.

*texensis* Hook., texanische, ☉. f. Texas.

*tomentosus* Lindl., filzige, 4. ♀. f. k. Peru.

b) *albidus*.

*tristis* Benth., traurige, 4. f. Nordamerika.

*varius* L. (*semiverticillatus* Desr.), scheckige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*versicolor* Lindl., buntfarbige, 4. f. Californien.

*villosus* W., zottige, 4. f. Carolina, Florida.

*trifoliatus* Cav. v. *Cyamopsis psoraleoides*.

**Luzula** DC., Astersimse, VI. 1., Juncineae.

*albida* DC., weißliche, 4. f. Europa.

β) *rubella* Hoppe (*cuprea* Roch.).

*arcuata* Sw., bogenförmige, 4. f. Schottland, Lappland.

*Berthelottii* N. E., Berthelott's, 4. k. Teneriffa.

*campestris* DC., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

*flavescens* Gaud. (*Hostii* Desv.), gelbliche, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

*Forsteri* DC., Forster's, 4. f. England, Süddeutschland, Schweiz, Frankreich.

**Luzula**

- glabrata Desv., Hoppe, kahle, 4. f. Steyermark, tyroler Alpen etc.
- lutea DC., gelbe, 4. f. Tyroler und schweizer Alpen, Pyrenäen.
- maxima DC., grofse, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Voralpen.
- melanocarpa Desv., schwarzfrüchtige, 4. f. Canada.
- multiflora Lej. (*erecta* Desv., *intermedia* Spenn.), vielblumige, 4. f. Deutschland, Schweden, Frankreich.
- $\beta$ ) congesta Lej.  $\gamma$ ) nigricans Desv. (*sudetica* DC.)
- nivalis Laestad., Schnee-A., 4. f. Lappland.
- nivea DC., schneeweifse, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- parviflora Desv., kleinblumige, 4. f. Nordschweden, Sibirien.
- pediformis DC., fufsförmige, 4. f. Dauphiné.
- pilosa W. (*vernalis* DC.), haarige, 4. f. Europa.
- spadicea DC., kastanienbraune. 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- spicata DC., ährenförmige, 4. t. Mitteleuropäische Alpen.
- Luzuriaga cymosa* RB. etc. v. *Geitonoplesium cymosum* etc.
- Lychnis** L., Lichtnelke, X. iv., Caryophyllaceae-Sileneae.
- I. Genuina.
- apetala L., kronenlose, ♂. 4. f. Sibirien, Lappland.
- brachypetala Fisch. (*inclusa* Lehm.), kurzkrönige, ♂. 4. f. Sibirien.
- Bungeana Fisch., Bunge's, 4. f. b. k. Südrufsland.
- chalconica L., chalconische (brennende Liebe), 4. f. Sibirien, Kleinasien.
- b) alba. c) alba plena Goldie. d) carnea. e) plena.
- Coeli rosa Desr., Himmelsröschen, ☉. f. Südeuropa, Levante.
- coronaria Desr., gekrönte, ♂. 4. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.
- b) alba. c) plena.
- corsica Loisel., corsische, ☉. ♂. f. Corsica.
- flos Jovis Desr., Jupitersröschen, 4. f. Südeuropa.
- fulgens Fisch., leuchtende, ♂. 4. f. b. k. Sibirien.
- grandiflora Jacq. (*coronata* Thbg.), gekrönte, 4. k. Japan, China.
- laeta Ait., angenehme, ☉. f. Portugal.
- media Hort., mittlere, ♂. 4. f. Hybride.
- nivalis Kit., Schnee-L., 4. f. Karpathen.
- pyrenaica Berg. (*nummularia* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- saxatilis Turcz., Gesteins-L., 4. f. Dahurien.
- sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien.
- II. Flos cuculi.
- Flos cuculi L., Kuckuksblümchen, 4. f. Europa.
- c) flore pleno. c) albiflora. d) fl. albo pleno.
- III. Melandrium Clus., Röhl.
- diurna Sibth. (*sylvestris* Hoppe, *dioica* a L.), Tag-L., 4. f. Europa.
- b) flore pleno. c) fl. albo.
- vespertina Sibth. (*alba* Mill., *dioica*  $\beta$ . L. *pratensis* Spgl., *arvensis* Schk.), Abend-L., 4. f. Europa.
- b) flore pleno.
- IV. Viscaria Riv.



**Lychnis**

*alpina* L., Alpen-L., 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen, Nordamerika.

β) *helvetica* G. Don (*alpina* Bot. mag.).

*Viscaria* L., Pech-L., 4. f. Europa.

b) *plena*. c) *alba* (*neglecta* G. Don).

*alpestris* L. et *quadridentata* Murr. vid. *Silene alpestris* etc. *Githago* Scop. v. *Agrostemma Githago*.

**Lycioserissa** R. et S., Bocksblatt, V. 1., Solanaceae.  
*capensis* R. et S., capisches, ♀. k. Cap der gut. H.

**Lycium** L., Bocksdorn, V. 1., Solanaceae.

*afrum* L., afrikanischer, ♀. k. Nordafrika, Palästina.

*barbarum* L., fremder, ♀. Sch. f. Südeuropa, Nordafrika.

*carolinianum* Pursh., karolinischer, ♀. f. Carolina.

*chinense* Mill., chinesischer (*ovatum* Duham., *barbarum* β. *chinense* Ait.), chinesischer, ♀. Sch. f. China.

*cinereum* Thbg., aschfarbiger, ♀. k. Cap der gut. H.

*europaeum* L. (*salicifolium* Mill.), gemeiner, ♀. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

b) *chrysocarpum*. c) *sphaerocarpum*.

*lanceolatum* Poir., lanzettblättriger, ♀. Sch. f. Südeuropa.

*rigidum* Thbg. (*carnosum* Duh., *italicum* Mill.), starrer, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*ruthenicum* Murr. (*tataricum* Pall.), russischer, ♀. Sch. f. Mittel- und Nordasien.

β) *caspicum* Pall. (*tenue* W., *microphyllum* Duh.).

*Shawii* R. et S., Shaw's, ♀. Sch. f. b. Nordafrika.

*tetrandrum* L. (*horridum* Thbg.), viermänniger, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*Trewianum* G. Don (*barbarum* Lam., *chinense* Duh.), Trew's, ♀. Sch. China.

*turbinatum* Duh. (*halimifolium* Mill.), aufgetriebener, ♀. Sch. f. China.

*arborescens* Spgl. v. *Atropa arborescens*. *boerhaaviaefolium* L. (*heterophyllum* Murr.), v. Grabowskia boerhaaviaefol.

**Lycopersicum** T., Liebesapfel, V. 1., Solanaceae.

*cerasiforme* Dun. (*Solanum pseudolycopersicum* Jacq.), kirschenförmiger, ☉. f. m. ? Südamerika.

b) *luteum*.

*esculentum* Mill., Dun., essbarer, ☉. f. m. Südamerika.

a) *erythrocarpum*. b) *chrysocarpum*. c) *leucocarpum*.

*Humboldtii* Dun. (W.), (*commutatum* Spgl.), Humboldt's, ☉. f. m. Südamerika.

*peruvianum* Mill., Dun., peruvianischer, 4. k. Peru.

*pimpinellifolium* Dun., pimpinellablättriger, ☉. f. m. Südamerika.

*procumbens* Dun., niederliegender, ☉. f. m. Südamerika.

*pyriforme* Dun., birnenförmiger, ☉. f. m. Südamerika.

*regulare* Dun., regelmässiger, ☉. f. m. ?

**Lycopodium** T., Bärlapp, XXIV. III., Lycopodiaceae.

*alopeuroides* L., fuchsschwanzähnlicher, 4. f. k. Nordamer.

*alpinum* L., Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Nordafrika.

*annotinum* L., wachholderblättriger, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

**Lycopodium**

- apodum L., kurzähriger, 4. k. w. Nordamerika, Westindien.  
 brasiliense Radd. (*apothecium* Bevis), brasilianischer, 4. w. Brasilien.  
 carolinianum L., carolinischer, 4. k. Carolina, Pennsylvania.  
 circinale L. (*tamariscinum* Desv.), kreisförmiger, 4. w. Ostindien, Nepal.  
 clavatum L., keilförmiger, 4. f, Europa, Asien, Nordamerika.  
 complanatum L., verflachter, 4. f. t. Europa, Asien, Nordamerika.  
 cordifolium Desv. (? *cordatum* H. Berol.), herzblättriger, 4. f. w. Westindien, Südamerika.  
 dendroideum Mchx., strauchartiger, 4. f. k. Nordamer.  
 densum La Bill., dichtblättriger, 4. f. w. Neuholland.  
 denticulatum L., gezählelter, 4. f. k. w. Südeuropa, Nordafrika.  
 depressum Sw., niedergedrückter, 4. w. Cap der guten Hoffnung.  
 helveticum L. (*radicans* Schrk.), schweizerischer, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 inundatum L., überschwemmter, 4. f. Europa, Nordamerika.  
 lucidulum Mchx., glänzender, 4. f. k. Nordamerika.  
 ornithopodioides L., ornithopusähnlicher, 4. f. w. Ostindien.  
 rupestre L., Felsen-B., 4. f. w. Nord- und Südasien, Amerika.  
 selaginoides L., Selagoähnlicher, 4. f. Europa, Nordamerika.  
 Selago L., tannenähnlicher, 4. f. f. Europa, Nordamerika.  
 stoloniferum Sw., sprossender, 4. f. w. Westindien, Südamerika.

**Lycopsis** L., Krummhals, V. 1., Asperifoliaceae.

- arvensis L., Acker-K., ☉. f. Europa, Nordamerika.  
 echioides L., natterkopffähnlicher, ☉. f. Armenien, Caucasus.  
 obtusifolia W., stumpfblättriger, ☉. f. Griechenland.  
 orientalis L., morgenländischer, ☉. f. Kleinasien, Belgien.  
 variegata Lehm. (*bullata* Cyrill.), bunter, ☉. f. Südeuropa, Griechenland.

*nigricans* Lam., *pulla* L. etc. v. *Nonnea nigricans* etc. *setosa* Lehm. v. *Lithospermum setosum*.

**Lycopus** T., Wolfsfuß, II. 1., Labiatae.

- australis RB., südlicher, 4, k. Neuholland.  
 europaeus L. (*vulgaris* P.), europäischer, 4. f. Europa.  
 exaltatus L., hoher, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Nordamer.  
 intermedius Schrad., mittlerer, 4. f. Europa, Hybride.  
 virginicus L. (*rubellus* Wendl.), virginischer, 4. f. Nordamerika.  
 β) *quercifolius*.

*Lycoris aurea* Herb. et *radiata* Herb. v. *Nerine aurea* et *radiata*.

**Lygeum** Loeßl., Bindgras (Nussgras), III. 1., Gramineae.

- Spartum* Loeßl., pfriemenförmiges, 4. f. Spanien, Nordafrika.

**Lygodium** Sw., Schlingfarn, XXIV. 1., Osmundaceae.  
*circinatum* Sw., kreisförmiger, 4. Sch. w. Molucken,  
 Philippinen.

*japonicum* Sw., japanischer, 4. Sch. w. China, Japan.  
*mexicanum* Presl, mexicanischer, 4. Sch. w. Mexico.

*palmatum* Sw., handförmiger, 4. Sch. w. k. Nordamerika.

*polymorphum* H. B. K., vielgestaltiger, 4. Sch. w.  
 Südamerika.

*venustum* Sw. (*Hydroglossum hastatum* W.), schöner, 4.  
 Sch. w. Brasilien.

*volubile* Sw., windender, 4. Sch. w. Westindien,  
 Guiana.

**Lygodysodea foetida** R. et P. etc. v. *Paederia foetida*.

**Lyonetia** Cass., DC. (P. Lyonet, französischer Natur-  
 forscher), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*abrotanifolia* Cass., DC., stabwurzblätterige, 4. f. Süd-  
 und Westeuropa.

*pusilla* DC., niedrige, ☉. f. Creta.

*tenuiloba* DC., feinsappige, ☉. f. Griechenland.

**Lyonia** Nutt. (J. Lyon, nordamerikanischer Botaniker),  
 X. 1., Ericaceae.

*fasciculata* G. Don, büschelförmige, ♀. w. t. Jamaica.

*ferruginea* Nutt., rostfarbige, ♀. f. b. k. Georgia,  
 Florida.

*frondosa* Nutt., belaubte, ♀. f. b. k. Nordamerika.

*jamaicensis* D. et G. Don, jamaicanische, ♀. t. w.  
 Jamaica.

*ligustrina* DC. (*paniculata* Nutt.), ligusterähnliche, ♀. f.  
 b. Nordamerika.

β) *capreaefolia* Wats. γ) *salicifolia* Wats.

*multiflora* Wats., G. Don, vielblumige, ♀. f. b. Carolina.

*rigida* Nutt., starre, ♀. f. b. k. Carolina.

*rubiginosa* G. Don, rostfarbige, ♀. w. t. Caribäen.

*arborea* D. Don v. *Oxydendrum arboreum*. *caly-*

*culata* Rchb. vid. *Cassandra calyculata*. *marginata*

D. et G. Don, *mariana* D. Don v. *Leucothae co-*

*riacea* et *mariana*. *racemosa* D. Don v. *Zenobia*

*racemosa*. *rhomboidalis* G. Don vid. *Leucothoe*

*coriacea*.

**Lyonsia** RB. (J. Lyons, englischer Botaniker), V. 1.,  
 Contortae-Apocynaeae.

*staminea* RB., langfadige, ♀. Sch. w. Neuholland.

**Lyperanthus** RB., Rachenstendel, XX. 1., Orchideae.

*ellipticus* RB., elliptischer, 4. Kn. w. Neuholland.

*nigricans* RB., schwärzlicher, 4. Kn. w. Neuholland.

*suaveolens* RB., wohlriechender, 4. Kn. w. Neuholland.

**Lysimachia** T., Gelbweidrich, V. 1., Primulaceae-  
 Lysimachieae.

I. Genuina.

*affinis* Penny, ähnlicher, 4. f. ?

*angustifolia* Mchx., schmalblätteriger, 4. f. Nordamer.

*atropurpurea* L., schwarzrother, 4. f. Kleinasien.

*azorica* Hornem., azorischer, 4. f. k. Azoren.

*ciliata* L., gefranzter, 4. f. Nordamerika, Belgien.

*dahurica* Ledeb., dahurischer, 4. f. Dahurien.

*dubia* Ait. (*atropurpurea* Murray), zweifelhafter, 4. f.  
 Caucasus, Orient.

*Ephemerum* L. (*salicifolia* Mill.), schlankblätteriger, 4.  
 f. Pyrenäen, Sibirien, Japan.



**Lysimachia**

*hybrida* Mchx. (*angustifolia* W.), Bastard-G., 4. f. Carolina.

*longifolia* Pursh (*quadriflora* Ait.), langblättriger, 4. f. Nordamerika.

*maculata* RB., gefleckter, 4. k. Neuholland.

*nemorum* L., Hain-G., 4. f. Europa.

b) *variegata*.

*Nummularia* L., rundblättriger, 4. f. Europa.

*punctata* L., punktirter, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

*quadrifolia* L., vierblättriger, 4. f. Nordamerika.

β) *hirsuta* Mchx.

*stricta* Ait. (*racemosa* Mchx.), steifer, 4. f. Nordamer.

*verticillata* Pall., wirtelblättriger, 4. f. Ungarn, Taurien.

*vulgaris* L., gemeiner, 4. f. Europa, Asien.

β) *paludosa* Baumg. γ) *guestphalica* Weihe.

II. *Thyrsanthus* Schrk. (*Nauenburgia* Mch.).

*capitata* Pursh, kopfförmige, 4. f. Nordamerika.

*thyrsiflora* L., straufsblumige, 4. Wa. f. Europa.

*Linum stellatum* L. v. *Asterolinon stellatum*.

**Lysinema** RB., Lysineme, V. 1., Epacrideae.

*ciliatum* RB., gefranzte, ♀. t. Neuholland.

*conspicuum* RB., ansehnliche, ♀. t. Neuholland.

*lasianthum* RB., wollblumige, ♀. t. Neuholland.

*pentapetalum* RB., fünfblättrige, ♀. t. Neuholland.

*pungens* RB., stechende, ♀. t. Neuholland.

β) *attenuatum* Lk. b) *roseum* (Lodd.). γ) *Sieberi* Benth.

*virgatum* DC. (Drummond), ruthenförmige, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

*ruscifolium* Sbr. v. *Epacris onosmaeflora*.

**Lythrum** L. (*Salicaria* T.), Weidrich, XI. 1., Lythraeae (*Salicariae*).

*alatum* Pursh (*Vulneraria* Hort.), geflügelter, 4. k. Nordamerika.

*diffusum* Swt. (*virgatum* Pursh), weitschweifiger, 4. f. Nordamerika.

*Gräfferi* Tenor., Gräffer's, ♂. f. Italien.

*Hyssopifolia* L., ysopblättriger, ♂. f. Europa.

*Kennedyanum* H. B. K., Kennedy's, ♀. t. Neuspanien.

*lineare* L., gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.

*myrtifolium* Lodd., myrtenblättriger, 4. f. Nordamer.

*nummularifolium* P., rundblättriger, ♂. f. Frankreich, Corsica.

*Salicaria* L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *gracile* DC. γ) *canescens* Koch (*tomentosum* DC., *pubescens* Hort., *dubium* Schult.).

*thesioides* MB., thesiumähnlicher, ♂. f. Caucasus.

*Thymifolia* L., thymianblättriger, ♂. f. Südeuropa, Südafrika.

*tomentosum* Mill., filziger, 4. f. Nordamerika.

*virgatum* L. (*acuminatum* W.), ruthenförmiger, 4. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

Gartenvarietäten: *densiflorum* Hort., *ramosum* Hort., *villosum* Hort.

*grandiflorum* Perrot., *multiflorum* Perr. et *ramosum* Perrot. vid. *Ammania dodecandra*, *senegalensis* et *auriculata*. *triflorum* L. vid. *Nesaea triflora*.

**Lythrum**

*verticillatum* L. v. *Decodon verticillatus*. *uniflorum* Perrot. v. *Ammannia elatinoides*.

**Maba** Forst. (ostindischer Name), XXII. VI. (VI. I.), Sapotaceae-Ebenaceae.

*buxifolia* P., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.

*laurina* RB., lorbeerähnliche, ♀. t. Neuholland.

**Macleya** RB. (A. Macleay, Secretair der Linné'schen Societät), XI. I., Papaveraceae.

*cordata* RB., herzblättrige, 4. f. Nordchina.

**Macluria** Nutt. (William Maclure, nordamerikanischer Geolog), XXI. IV., Urticaceae.

*aurantiaca* Nutt., orangenfarbige, ♀. f. Nordamerika.

*Plumieri* G. Don, Plumier's, ♀. w. Westindien.

*tinctoria* D. Don, färbende, ♀. w. Westindien, Südamerika.

**Macradenia** RB., Drüsendingel, XX. I., Orchideae.

*lutescens* RB., gelblicher, 4. w. Trinidad.

*mutica* Lindl., unbewehrter, 4. w. Trinidad.

*triandra* Lindl., dreimänniger, 4. w. Surinam.

*lutescens* Lodd. v. *Epidendrum odoratissimum*.

**Macrochilus** K. et W., Großlippe, XX. I., Orchideae.

*Fryanus* K. et W., Fry's, 4. w. Brasilien.

**Macrocnemum** L., Stengelblume, V. I., Rubiaceae.

*jamaicense* L., jamaicaische, ♀. w. Jamaica.

*strictum* Roxb., steife, ♀. w. Ostindien.

*tinctorium* Humb., färbende, ♀. w. Südamerika.

*coccineum* Vahl et *speciosum* Jacq. vid. *Mussaenda coccinea* et *speciosa*.

**Macrogynne convallariaefolia** Lk. v. *Aspidistra lurida*.

**Macrolobium bijugum** Coleb. v. *Outea bijuga*.

**Macropodium** R. Br., Langstieler, XV. III., Cruciferae.

*nivale* RB., schneeliebender, 4. f. Sibirien.

**Macrorhynchium** Rchbch. (*Macrorrhynchus* Less.), Schnabelsame, XIX. I., Cichoriaceae.

*aurantiacum* Fisch. et Mey., orangenfarbiger, ☉. ? 4. f. ?

*laevigatum* Fisch. et Mey., glatter, ☉. f. Chili.

*pterocarpum* Fisch. et Mey., flügelfrüchtiger, ☉. f. Chili.

**Macrostylis** Bartl. et Wendl., Langgriffel, V. I., Tricoccae-Rutaceae.

*barbiger* Bartl. et Wendl., bartiger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*lanceolata* Bartl. et Wendl., lanzettlicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*squarrosa* Bartl. et Wendl., sparriger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

**Macrotropis** DC., Großschiffchen, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

*foetida* DC., stinkendes, ♀. t. China.

**Macrotys racemosa** Rafin. v. *Cimicifuga Serpentaria*.

**Madaria** DC. v. *Madia*.

**Madaroglossa** DC., Glattzüngelchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*angustifolia* DC., schmalblättriges, ☉. f. Californien.

*heterotricha* DC., verschiedenhaariges, ☉. f. Californien.

**Madaroglossa**

hieracioides DC., habichtskrautähnliches, ☉. f. Californien.

**Madia** Molin. (chilesischer Name), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

## I. Genuina.

sativa Molin., gebaute, ☉. f. m. Chili.

a) mellosa Jacq. β) viscosa Cav.

stellata Fisch. et Mey., sternförmige, ☉. f. Chili.

## II. Madaria DC.

corymbosa DC. (? *quinqueradiata* Hort.), traubendoldige, ☉. f. Westliches Nordamerika.

elegans Dougl., zierliche, ☉. f. Californien.

**Maesa** Forsk. v. Baeobotrys.**Magnolia** L. (P. Magnol, Professor der Botanik zu Montpellier), XIII. VI., Magnoliaceae.

acuminata L., zugespitzte, ♀. f. b. Nordamerika.

b) Candolli Savi. c) maxima Lodd.

auriculata Lam., geöhrt, ♀. f. b. Nordamerika.

conspicua Salisb. (*precia* Correa, Yulan Dsf.), ansehnliche, ♀. f. b. k. China.

b) Soulangeana Hort. c) Alexandri Hort. d) speciosa Hort. e) citriodora Hort.

cordata Mchx., herzblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

fuscata Andr. (*anonaefolia* Salisb.), braune, ♀. k. China, Japan.

glauca L., blaugrüne, ♀. f. b. Nordamerika.

b) Thompsoniana Hort. (*major* Bot. mag.). c) longifolia Hort.

gracilis Salisb. (*Kobus* Kämpf., *tomentosa* Thbg.), schlanke, ♀. f. b. k. Japan.

grandiflora L., großblumige, ♀. k. f. b. Nordamerika.

b) obovata Ait. c) rotundifolia Swt. d) oxoniensis Hort. e) ferruginea Sims. f) lanceolata Ait. g) elliptica Ait. h) angustifolia Hort. i) praecox Hort. k) calyculata Hort. l) mayardienensis Hort. m) rugosa. n) stricta. o) semiplena. p) canaliculata Hort. etc.

macrophylla Mchx. (*Michauxii* Hort.), großblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

obovata Thbg. (*purpurea* Curt., *discolor* Vent., *denudata* Lam.), purpurrothe, ♀. k. f. b. Japan, China.

odoratissima Reinw., starkriechende, ♀. w. Java.

pumila Andr., kleine, ♀, t. k. China.

pyramidata Bartr., pyramidale, ♀. f. b. Nordamerika.

tripetala L. (*Umbrella* Lam., *frondosa* Salisb.), dreiblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

Hybriden: Norbertiana Hort., striatiflora Hort., speciosa Hort. triumphans Hort.

**Mahernia** L. (*Anagramm* v. *Hermannia*), XVI. II. (V. v.), Malvaceae-Hermanniaceae.

Burchellii Swt. (*grandiflora* Burch.), Burchell's, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

diffusa L., weitschweifige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

fragrans Rchb., wohlriechende, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

glabrata Cav. (*odorata* Andr.), kahle, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

grandiflora DC., großblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.



**Mahernia**

*heterophylla* Cav., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*incisa* Jacq., schnitzblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *oxalidisflora* Burch., oxalisblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*pinnata* L. (*bipinnata* DC.), gefiederte, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*pulchella* Cav., hübsche, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*resedaefolia* Burch., resedablättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*rutilla* Jacq., rothgelbe, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*seselifolia* DC., seseliblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*vernicata* Burch., firnifsartige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

*verticillata* L. (*diffusa* Jacq., ? *coronopifolia* Lk.), wirtelförmige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*vesicaria* DC., blasige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

**Mahonia** Nutt. (Bernard Mahon, nordamerikanischer Botaniker), VI. 1., Berberideae.

*Aquifolium* Nutt., stechhülsenblättrige, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

*diversifolia* Swt., verschiedenblättrige, ♀. t. Monte Video.

*fascicularis* DC., büschelförmige, ♀. k. t. Californien, Neuspanien.

*glumacea* DC., spelzige, ♀. f. b. k. Westl. Nordamer.

*japonica* DC., japanische, ♀. k. t. Japan.

*nepalensis* DC., nepal'sche, ♀. k. t. Nepal.

*nervosa* Nutt., nervige, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

*repens* G. Don, kriechende, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

*tenuifolia* Lindl., feinblättrige, ♀. t. Vera Cruz.

**Mairia** N. E., *Mairia*, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*crenata* N. E., gekerbte, ♂. 4. t. k. Cap d. gut. H.

*Majanthemum bifolium* DC. etc. v. *Smilacina bifolia* etc.

*Malabaila graveolens* Hoffm. etc. v. *Pastinaca graveolens* etc.

**Malachodendron** Mitch., Cav., Weichstrauch, XVI. VIII., Ternstroemiaceae.

*ovatum* Cav., eiförmiger, ♀. f. b. k. Virginien.

**Malachra** L., Weichmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

*alceaefolia* Jacq., eibischblättrige, ☉. m. f. Südamer.

*bracteata* Cav., deckblättrige, ☉. m. f. Südamerika.

*capitata* L. (*triloba* Poir.), kopfförmige, ☉. f. m. Westindien.

*cordata* Poir., herzblättrige, ☉. f. m. Westindien.

*fasciata* Jacq., bandirte, ☉. f. m. Caracas.

*heptaphylla* Fisch. (*fasciata* Bot. reg.), siebenlappige, ☉. f. Brasilien.

*radiata* L., strahlige, ☉. ♂. w. Westindien.

*rotundifolia* Schrank., rundblättrige, ☉. f. Brasilien.

**Malaxis** Sw., Weichorche, XX. 1., Orchideae.

*monophyllos* Sw., einblättrige, 4. Kn. f. Nordeuropa, mitteleuropäische Alpen.

*paludosa* Sw., sumpfliebende, 4. Kn. f. Nordeuropa.

*lilifolia* Sw., *Loeselii* Sw. v. *Sturmia lilifolia* et *Loeselii*.

**Malcolmia** RB. (W. Malcolm, englischer Botaniker), XV. 111., Cruciferae.

**Malcolmia**

*africana* RB., afrikanische, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *stenopetala* Bernh. γ) *divaricata* Fisch.

*arenaria* DC., sandliebende, ☉. f. Nordafrika.

*chia* DC., griechische, ☉. f. Griechenland.

*laxa* DC., lockere, ☉. f. Sibirien.

*litorea* RB., Ufer-M., ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*lyrata* DC., leierblättrige, ☉. f. Cypern.

*maritima* RB., Seestrands-M., ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*parviflora* DC., kleinblumige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

*taraxacifolia* DC., löwenzahnblättrige, ☉. f. Sibirien.

**Malesherbia** R. et P. (De Malesherbes, ein Franzose, Gönner der Botanik), XVI. II. (V. III.), Passifloreae-Malesherbieae.

*humilis* D. Don, niedrige, ☉. f. m. Chili.

*linearifolia* Poir. (*paniculata* D. Don, *coronata* G. Don), gleichbreitblättrige, ? ☉. f. t. k. Chili.

*Mallococca crenata* Forst. v. *Grewia Mallococca*.

*Malocchia* Savi v. *Canavalia*.

**Malope** L., Malope, XVI. VIII., Malvaceae.

*grandiflora* Hort., großblumige, ☉. f. m. Nordafrika.

*malacoides* L., malvenähnliche, ♂. k. Nordafrika.

*trifida* Cav., dreitheilige, ☉. f. m. Nordafrika, Spanien.

**Malpighia** Plum. (M. Malpighi, Professor der Medicin zu Bologna, berühmter Pflanzen-Anatom), X. III., Malpighiaceae.

*angustifolia* L. (*linearis* Jacq.), schmalblättrige, f. w. Südamerika.

*aquifolia* L., stechhülsenblättrige, f. w. Südamerika.

*biflora* Poir. (*punicifolia* Cav.), zweiblumige, f. w. Südamerika.

*coccifera* L., stachelblättrige, f. w. Westindien.

*cubensis* H. B. K., Cuba-M., f. w. Cuba.

*dubia* Cav., zweifelhafte, f. w. Jamaica.

*faginea* Sw., buchenblättrige, f. w. Caribäen.

*fucata* Ker (*macrophylla* Dsf.), geschminkte, f. w. ? Westindien.

*glabra* L., kahle, f. w. Südamerika.

*punicifolia* L., granatenblättrige, f. w. Cayenne.

*urens* L., brennende, f. w. Westindien.

*altissima* Aubl., *crassifolia* L., *macrophylla* Juss.

etc. v. *Byrsonima altissima*, *crassifol.*, *nervosa* etc.

*nitida* L. etc. v. *Bunchosia nitida* etc.

**Malus** T. v. *Pyrus*.

**Malva** T. (*Sphaeralcea* Hil.), Malve, XVI. VIII., Malvaceae.

*abutiloides* L., sidaartige, f. w, t. Bahamische Inseln.

*aegyptiaca* L., ägyptische, ☉. f. Aegypten.

*Alcea* L., schlitzblättrige, 4. f. Europa.

β) *italica* Poll.

*alchemillaefolia* H. Vratisl., frauenmantelblättrige, ☉. f. ?

*althaeoides* Cav., eibischähnliche, ☉. f. Spanien, Sardinien.

*americana* L., amerikanische, ☉. f. m. Westindien.

*amoena* Sims, liebliche, f. k. Cap der guten Hoffn.

*angulata* Penny, kantige, f. k. t. ?

## Malva

angustifolia Ait. (*Sphaeralcea angustifolia* Hil.), schmalblättrige, ♀. k. t. Mexico.

arvensis Presl, Acker-M., ☉. f. Sicilien.

asperrima Jacq., rauhe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

balsamica Jacq., balsamische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

betuloides Schrad., birkenähnliche, ♀. w. Java.

bonariensis Cav., bonarische, ☉. f. Buenos Ayres.

borbonica W., mascarenische, ♀. w. Mascarenas.

borealis Wallm., Liljebl. (*parviflora* Huds., *pusilla* Wither., *Henningii* Goldb., *rotundifolia* Fries), nördliche, ☉. f. Nordeuropa.

brasiliensis Desr., brasilianische, ☉. f. m. Brasilien.

bryonifolia L., zaunrübenblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

calycina Cav., großkelchige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

campanuloides Lodd., glockenblumige, 4. f. b. k. Nordamerika.

capensis L., capische, ♀. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

capitata Cav., kopfförmige, ♀. t. w. Peru.

caroliniana L., carolinische, ☉. ♂. f. Carolina, Südamerika.

β) decumbens W.

commutata Rchb., verwechselte, ☉. f. ?

concinna K. et W., nette, ♀. w. Südamerika.

Creeana Hook., Cree's, ♀. k. t. ?

cretica Cav., cretische, ☉. f. Creta.

crispa L., krause, ☉. f. Macedonien, Deutschland.

divaricata Andr., sparrige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

elegans Cav., zierliche, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

fastigiata Cav. (*Morenii* Poll., *ulceoides* Tenor., *decumbens* Host., *Bismalva* Bernh.), gipfelständige, 4. f.

Süd- und Westeuropa.

fragrans Jacq., wohlriechende, ♀. k. Cap der gut. H.

gangetica L., Ganges-M., ☉. f. m. Ostindien.

glabra Desr., kahle, ☉. f. China.

grossulariaefolia Cav. (*stricta* Jacq.), stachelbeerblättrige, ♀. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

hispanica L., spanische, ☉. f. Spanien.

lactea Ait. (*vitifolia* Cav.), milchweißse, ♀. k. t. Mexico.

leprosa Orteg., schorfige, ♀. w. Cuba.

limensis L., Lima-M., ☉. f. m. Peru.

mareotica Delil., mareotische, ☉. f. Aegypten.

mauritanica Spgl. (*mauritiana* L., *sinensis* Cav., *obtus* Mch.), mauritanische, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, China.

b) albiflora.

microcalyx Bernh., kleinkelchige, ☉. f. ?

miniata Cav., mennigfarbige. ♀. t. ? Mexico.

Monroana Dougl., Monro's, 4. f. b. k. Columbien.

b) major J. C.

moschata L., Moschus-M., 4. f. Europa.

b) undulata Sims. c) alba Hort.

Mülleri Hort., Müller's, ♂. f. Sardinien.

nicaeensis All., nicaeische, ☉. f. Oberitalien.

obtusiloba Hook., stumpflappige, 4. k. Chili.

ovata Cav., eiförmige, ♀. ♀. w. Westindien, Südamerika.

oxyacanthoides Hornem., weißdornblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.



**Malva**

- parviflora* L. (*microcarpa* Dsf.), kleinblumige, ☉. f. Nordafrika.  
*peruviana* L., peruanische, ☉. f. m. Peru.  
*polystachya* Cav., vielährige, ♀. ♀. w. Peru.  
*prostrata* Cav., gestreckte, 4. k. t. Südamerika.  
*pulchella* Bernh., hübsche, ☉. f. ?  
*purpurata* Lindl., purpurfarbige, 4. k. Chili.  
*retusa* Cav. (*triloba* Thbg.), abgestutzte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
*rotundifolia* L. (*vulgaris* Fr., *neglecta* Wallr.), gemeine rundblättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.  
*scaberrima* Lag., schärfste, ☉. f. Spanien.  
*scabra* Cav. (*scoparia* Jacq., *corchorifolia* Desr.), scharfe, ♀. ♀. w. Peru.  
*scoparia* L'Her., besenartige, ♀. ♀. w. Peru.  
*Sherardiana* L., Sherard's, 4. f. Kleinasien.  
*spicata* L., ährenförmige, ♀. w. Westindien.  
*stipulacea* Cav., zwischenblättrige, ☉. f. Spanien.  
*subhastata* Cav., spontanblättrige, ♀. w. Mascarenas, Südamerika.  
*sylvestris* L. (*vulgaris* Ten.), Wald-M., 4. f. Europa.  
     β) *albiflora* Presl.  
*tomentosa* L., filzige, ♀. ♀. w. Ostindien.  
*Tournefortiana* L., Tournefort's, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.  
*trachelifolia* Lk., halskrautblättrige, ☉. w. ?  
*tricuspidata* RB. (*coromandeliana* L., *americana* Cav., *carpinifolia* Desr., *domingensis* Spgl.), dreispitzige, ♂. w. Westindien.  
*tridactylides* Cav. (*reflexa* Andr.), dreifingerige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
*trifida* Cav., dreispaltige, ☉. f. Spanien.  
*verticillata* L. (*glomerata* Hort.), wirtelförmige, ☉. f. China.  
     β) *flexuosa* Hornem.  
*virgata* Murr., ruthenförmige, ♀. k. Cap der gut. H.  
*vitifolia* Cerv., weinblättrige, ♂. k. t. Mexico.  
*waltherifolia* Lk., waltherablättrige, 4. w. Java.  
     *coccinea* Nutt. v. *Cristaria coccinea*.
- Malvaviscus arboreus** Cav. etc. vid. *Achania Malvaviscus* etc.
- Mammea** L. (südamerikanischer Name), XIII. 1., Guttiferae.  
*americana* L., amerikanische, ♀. w. Südamerika, Westindien.  
     *asiatica* L. v. *Barringtonia speciosa*.
- Mammillaria** Haw., Zitzendistel, XII. 1., Cactaeae.  
*acanthophlegma* Lehm. (*geminispina* DC., *columnaris* Flor. mexic.), paarstachelige, ♀. w. Mexico.  
*acanthostephes* Lehm., strahlstachelige, ♀. w. Mexico.  
*aciculata* Otto, nadelstachelige, ♀. w. Mexico.  
*affinis* DC. (*cataphracta* Mart.), ähnelnde, ♀. w. Mexico.  
*albida* Haage (*confinis* Haage), weifsliche, ♀. w. Mexico.  
*angularis* H. Berol. (*compressa* DC.), kantige, ♀. w. Mexico.  
*bicolor* Lehm. (*geminispina* Haw.), zweifarbige, ♀. w. Südamerika.  
*brevimamma* Zucc., kurzwarzige, ♀. w. Mexico.

## Mammillaria

caespiticia DC., rasenartige, ♀, w. Mexico.

Caput Medusae Otto (*Sempervivi* DC.), Medusenhaupt-Z., ♀, w. Mexico.

carnea Zucc., fleischfarbige, ♀, w. Mexico.

centrispina Pfr., mittelstachelige, ♀, w. Mexico.

chrysacantha H. Berol., goldstachelige, ♀, w. Mexico.

cirrhiifera Mart., rankenförmige, ♀, w. Mexico.

columnaris Mart., säulenförmige, ♀, w. Mexico.

conica Haw., kegelförmige, ♀, w. ?

conoidea DC., kegelähnliche, ♀, w. Mexico.

cornifera DC., horntragende, ♀, w. Mexico.

coronaria Haw. (*Cactus coronatus* W.), gekrönte, ♀, w.

Südamerika.

crebrispina DC., dickstachelige, ♀, w. Mexico.

crinita DC., bemähnte, ♀, w. Mexico.

crucigera Mart., kreuzförmige, ♀, w. Mexico.

cylindracea DC., cylinderförmige, ♀, w. Mexico.

disciformis DC., scheibenförmige, ♀, w. Mexico.

discolor Haw. (*depressa* Haw., *pulchella* H. Berol., *canescens* Hort., *Cactus Spinii* Colla), verschiedenfarbige, ♀, w. Mexico.

divergens DC., divergirende, ♀, w. Mexico.

β) prolifera Pfr. (*Cact. pseudomammillaris* Salm.)

Dyckiana Zucc., Dyck's, ♀, w. Mexico.

echinata DC., borstenstachelige, ♀, w. Mexico.

β) densa Lk. et Otto (*caespitosa* Hort.).

elegans DC. (*supertexta* Hort.), zierliche, ♀, w. Mexico.

elongata DC., verlängerte, ♀, w. Mexico.

eriacantha H. Berol. (*eriantha* et *cylindrica* Hort.), wollstachelige, ♀, w. Mexico.

exsudans Zucc. (*curvata* H. Berol.), ausschwitzende, ♀, w. Mexico.

Fischeri Pfr., Fischer's, ♀, w. Mexico.

flavescens DC. (*C. stramineus* Spgl.), gelbliche, ♀, w. Südamerika.

fulvispina Haw., rothbraunstachelige, ♀, w. Brasilien, Mexico.

fuscata H. Berol., bräunliche, ♀, w. Mexico.

gibbosa Salm., höckerige, ♀, w. ?

gladiata Mart., degenförmige, ♀, w. Mexico.

glochidiata Mart. (*ancistroides* Lehm., *criniformis* DC.), widerhakige, ♀, w. Mexico.

glomerata DC., knaulförmige, ♀, w. St. Domingo.

grandiflora Otto (*canescens* H. Berol.), großblumige, ♀, w. Mexico.

Haageana Pfr. (*Perote* Hortul., *diacantha nigra* Haag.), Haage's, ♀, w. Mexico.

hamata Lehm., hackige, ♀, w. Mexico.

Helicteris DC. (Moç.), schraubenförmige, ♀, w. Mexico.

hexacantha Salm., sechsstachelige, ♀, w. Mexico.

Hystrix Mart., igelstachelige, ♀, w. Mexico.

intertexta DC., verwebte, ♀, w. Mexico.

irregularis DC., unregelmäßige, ♀, w. Mexico.

Karwinskiana Mart., Karwinski's, ♀, w. Mexiko.

lanifera Haw., wollige, ♀, w. Mexico.

latimamma DC., breitwarzige, ♀, w. Mexico.

Lehmanni H. Berol. (*leucacantha* DC., *octacantha* DC.), Lehmann's, ♀, w. Mexico.

**Mammillaria**

- longimamma DC., langwarzige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 loricata Mart. (*heteracantha* H. Berol., *Cact. canescens* fl. mexic.), bepanzerte,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 macrothele Mart., rothdrüsige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 magnimamma Haw. (*ceratophora* Lehm.), großwarzige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 mitis Mill., unbewehrte,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
 Mystax Mart., bartige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 nivea Wendl. (*Toaldoae* Lehm.), schneeweiße,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 nivosa Link (*tortolensis* H. Berol.), schneefarbige,  $\text{f. w.}$  Tortola.  
 nuda DC., nackte,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 parvimamma Haw. (*prolifera* Hort., *Cactus microthele* Spgl., *prolifer* W.), kleinwarzige,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
 Plaschnickii Otto, Plaschnick's,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 polyëdra Mart., vielseitige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 polythele Mart., vielwarzige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 prolifera Haw. (*Parmentieri* H. Par.), sprossende,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
 pusilla DC. (*stellaris* Hort., *Cactus stellatus* Lodd.), sternförmige,  $\text{f. w.}$  Westindien.  
 $\beta$ ) major.  
 pycnacantha Mart., dichtstachelige,  $\text{f. w.}$  Mexico,  
 quadrispina Mart., vier- bis sechsstachelige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 radians DC., strahlende,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 recurva Lehm. (*Lehmanni* Hort.), zurückgekrümmte,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 rhodantha Lk. et Otto (*atrata*, *aurata*, *hybrida* Hort.), rothblumige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 $\beta$ ) prolifera Pfr.  $\gamma$ ) Andreae Otto.  $\delta$ ) Wendlandii Pfr. (*erinacea* Wendl.).  $\epsilon$ ) neglecta H. Berol.  $\zeta$ ) rubens Pfr. (*pgramidalis* H. Berol.).  
 rutila Zucc., rothgelbe,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 Seitziana Mart., Seitz's,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 setosa Pfr., borstige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 simplex Haw. (*Cactus mammillaris* L.), einfache,  $\text{f. w.}$  Westindien, Südamerika.  
 spacelata Mart., brandige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 subangularis DC. (*cirrhiifera* spin. *fuscis* H. Mon.), wenig kantige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 subcrocea DC., hochgelbstachelige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 subpolyëdra Salm (*polygona* Zucc., *anisacantha*, *jalapensis* Hort.), vielkantige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 supertexta Mart., überwebte,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 tentaculata H. Berol. (*pulchra* Haw.), randzaserige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 tenuis DC., dünne,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 $\beta$ ) media DC. (*stella aurata* Mart.).  
 thelocamptos Lehm., bogenwarzige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 triacantha DC., dreistachelige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 uberiformis Zucc., fruchtbare,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 uncinata Zucc., hakiggekrümmte,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 vetula Mart., ältliche,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 villifera Otto (*Mystax* Hort.), zottige,  $\text{f. w.}$  Mexico.  
 vivipara Haw., lebendig gebährende,  $\text{f. w. k.}$  Louisiana.  
 Wildiana Otto (*glochidiata* var. *aurea* Hort.), Wild's,  $\text{f. w.}$  Mexico.



**Mammillaria**

Zuccariniana Mart., Zuccarini's, ♀. w. Mexico.

Noch sind folgende in Loudon's hortus britannicus aufgeführt:

ambigua G. Don (Gill.), zweifelhafte, ♀. w. Chili.

caudata G. Don (Gill.), geschwänzte, ♀. w. Chili.

coccinea G. Don (Gill.), scharlachfarbige, ♀. w. Chili.

floribunda Hook., blüthenreiche, ♀. w. Chili.

missouriensis Swt. (*Cactus mammillaris* Nutt.), missourische, ♀. w. k. Nordamerika.

quadrata G. Don (Gill.), viereckige, ♀. w. Chili.

solitaria G. Don (Gill.), einzeln stehende, ♀. w. Chili.

speciosa Cill., prächtige, ♀. w. Chili.

spinosa G. Don (Gill.), langstachelige, ♀. w. Chili.

**Mandragora** T., Alraunwurzel, V. 1., Solanaceae.

autumnalis Bertol., herbstliche, 4. f. Südeuropa, Griechenland.

neglecta G. Don, übersehene. 4. f. ?

vernalis Bertol. (*officinalis* Mill., *acaulis* G., *praecox* Swt.), Frühlings-A., 4. f. Südeuropa.

**Manettia** Mutis (X. Manetti, Professor der Botanik zu Florenz), IV. 1., Rubiaceae.

coccinea W., scharlachfarbige, ♀. w. Guiana.

cordifolia Hook. (? *glabra* S. et C.), herzblättrige, ♀. Sch. w. Buenos-Ayres.

Lygistum Sw., westindische, ♀. w. Westindien.

**Mangifera** L., Mangobaum, I. 1. (XXIII. 1.), Terebinthaceae.

indica L., indischer, ♀. w. Ostindien.

foetida Lour., stinkender, ♀. w. Cochinchina, Amboina.

*axillaris* Desr. v. *Buchanania angustifolia*. *glauca*

Rottb. v. *Elaeodendrum glaucum*. *pinnata* L. vid.

*Spondias mangifera*.

**Manglilla** Juss. (peruanischer Name), V. 1., Sapotaceae.

canariensis (W.), canarische, ♀. k. t. Teneriffa.

Milleriana P., Miller's, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

**Manicaria** G., Mützenpalme, XXI. 1x. (XIII. III.) Palmae.

saccifera G., sackförmige, ♀. w. Südamerika.

**Manihot** Adans v. Janipha.**Manisuris** L., Schweifgras, III. II., Gramineae.

granularis Sw., körniges, 4. w. West- und Ostindien, China, Afrika.

**Mantisia saltatoria** Roxb., *Curt.* et *spatulata* R. et S. v. *Globba saltatoria* etc.**Manulea** L., Handblume, XV. II., Personatae - Antirrhineae.

aethiopica Thbg., aethiopische, ♂. t. Südafrika.

alternifolia P., wechselblättrige, ♂. t. Neuholland.

angustifolia Lk. (? *incana* Tkg.), schmalblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

argentea Thbg., silberfarbige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

capensis Thbg. (*villosa* P.), kapische, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

capitata Thbg., kopfförmige, ♂. k. t. Cap d. gut. H.

Cheiranthus L., lackblumige, ♂. k. t. Cap d. gut. H.

**Manulea**

*cordata* Thbg., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.  
*crystallina* Weinm., crystallwarzige, ♂. 4. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

*foetida* W., stinkende, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.  
*hispida* Thbg. (*oppositifolia* Vent.), steifhaarige, ♀. k. t.  
 Cap der guten Hoffnung.

*linifolia* Thbg., leinblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.  
*pedunculata* Andr., langstielige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.  
*rhynchantha* Lk., schnabelblumige, ♀. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.

*rubra* Thbg., rothe, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
*tomentosa* L., filzige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

*violacea* Lk., violette, 4. w. ?

*viscosa* W., schmierige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

**Maranta** Plum. (B. Maranti, venetianischer Arzt), I. 1.,  
 Scitamineae-Cannaceae.

*angustifolia* Sims, schmalblättrige, 4. w. Westindien.

*arundinacea* L., rohrartige, 4. ♀. w. Westindien.

*bicolor* Ker, zweifarbige, 4. w. Brasilien.

b) minor.

*compressa* H. Berol., glatte, 4. w. ?

*cristata* N. E. et Mart., kammförmige, 4. w. Brasilien.

*cuspidata* Rosc., feinspitzige, 4. w. Sierra Leone.

*divaricata* Rosc., ausgespernte, 4. w. Brasilien.

*furcata* N. E. et Mart., gabelförmige, 4. w. Brasilien.

*gibba* Sm., höckerige, 4. ♀. w. Barbados.

*gracilis* Rudg., schlanke, 4. w. Guiana.

*indica* Tuss., Rosc. (*sylvatica* Sm.), indische, 4. ♀. w.  
 Westindien.

*lutea* Jacq. (*Jacquini* Schult.), gelbliche, 4. w. Süd-  
 amerika.

*malaccensis* W., malackaische, 4. w. Malacka.

*obliqua* Rudg., schiefblättrige, 4. w. Guiana.

*petiolata* Rudg., gestielte, 4. w. Guiana.

*purpurascens* Lk., purpurfarbige, 4. w. Brasilien.

*sylvatica* Rosc., Wald-M., 4. ♀. w. Barbados.

*Tonchat* Aubl., *Tonchat-M.*, 4. ♀. w. Guiana, West-  
 indien.

*comosa* L. fil., *secunda* Grah., *spicata* Aubl. vid.  
*Phrynium comosum*, *setosum*, *ellipticum*. *Zebrina*  
 Sims etc. v. *Calathea zebrina* etc.

**Marattia** Sm. (J. F. Maratti, italienischer Botaniker),  
 XXIV. 1., Osmundaceae.

*alata* Sm., geflügelte, 4. w. Jamaica.

*laevis* Sm., glatte, 4. w. Hispaniola.

*Marcelia aurea* Cass. v. *Anthemis aurea*.

**Marcgravia** Plum. (Georg Marcgraf, deutscher Natur-  
 forscher, welcher Brasilien bereiste), XIII. 1., Guttif-  
 erae-Marcgraviaeae.

*coriacea* Vahl, lederblättrige, ♀. ♀. w. Guiana.

*umbellata* L., doldenblumige, ♀. w. Südamerika.

**Margaranthus** Schtdl., Perlblume, V. 1., Solanaceae.  
*solanaceus* Schtdl., nachtschattenähnliche, ☉. f. m.  
 Mexico.

**Margyricarpus** R. et P., Perlfrucht, II. 1., Ro-  
 saceae.

*setosus* R. et P., borstige, ♀. w. Brasilien, Peru.

*Marica coelestis* Lehm., *coerulea* Ker etc. v. *Cipura coelestis* etc. *gladiata* Ker v. *Bobartia gladiata*. *plicata* Ker, *striata* Ker v. *Sisyrinchium plicatum* etc.

**Mariscus** Vahl, Bollsimse, III. 1., Cyperaceae.  
*aggregatus* W., angehäuften, 4. Wa. ? Südamerika.  
*conflexus* Lk., umgebogene, 4. w. Brasilien.  
*elatus* Vahl, hohe, 4. w. Caracas, Cayenne.  
*Jacquini* Kunth, Jacquin's, 4. w. Caracas.  
*laevis* RB., glatte, 4. k. Neuholland.  
*ovularis* Vahl, eiförmige, 4. k. w. Carolina, Georgien.  
*panicus* Vahl, fennichartige, 4. w. Ostindien, Arabien.  
*patulus* Schrad., ausgebreitete, 4. w. Südamerika.  
*polycephalus* Lk., vielköpfige, 4. w. Brasilien.  
*umbellatus* Vahl, doldige, 4. w. Ostindien.

**Marlea** Roxb. (bengalischer Name), VIII. 1., Hederaceae.  
*begoniaefolia* Roxb., begoniablätterige, 5. t. w. Bengalen, Südchina.

**Marrubium** L., Andorn, XIV. 1., Labiatae.  
*affine* Hornem. (*astracanicum* W.), ähnelnder, 4. f. ? Sibirien.  
*Alyssum* L., runzeliger, 4. f. Spanien.  
*astracanicum* Jacq., astrachanischer, 4. f. Astrachan, Caucasus.  
*candidissimum* L., weißlicher, 4. f. Kleinasien, Griechenland, Spanien.  
 β) *uncinatum* Hornem.  
*catariaefolium* Desr., münzenblättriger, 4. f. Levante, Caucasus.  
*creticum* Mill. (*peregrinum* Jacq.), cretischer, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Creta.  
*leonuroides* Desr., leonurusähnlicher, 4. f. Caucasus.  
*mollissimum* D. Don, weicher, 4. k. Nepal.  
*paniculatum* Desr. (*remotum* Kit., *pannonicum* Rchb., *peregrinum* Auctor.), rispiger, 4. f. Deutschland, Ungarn.  
*parviflorum* Fisch. et Mey., kleinblumiger, 4. f. Südrussland (Talüsch).  
*peregrinum* L., Rchb. (*candidissimum* L. Herb., Benth., Koch., *incanum* Desr., *supinum* Scop.), fremder, 4. f. Südeuropa, Kleinasien.  
*persicum* C. A. Mey., persischer, 4. f. Nordpersien.  
*propinquum* Fisch. et Mey., verwandter, 4. f. Südrussland (Talüsch).  
*supinum* L. (*setaceum* Desr.), niedriger, 4. f. Südeuropa.  
*vulgare* L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) *apulum* Tenor.

*acetabulosum* L. etc. v. *Beringeria acetabulosa* etc.

**Marsdenia** RB. (W. Marsden, Verfasser einer Geschichte von Surinam), V. 11., Asclepiadeae.

*erecta* RB., aufrechte, 5. t. w. Syrien.  
*flavescens* Cunn., gelbliche, 5. Sch. w. Neuholland.  
*suaveolens* RB., wohlriechende, 5. w. Neusüdwallis.

**Marshallia** Pursh (Humphrey Marshall, nordamerikanischer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.  
*angustifolia* Pursh, schmalblättrige, 4. k. Carolina.  
*caespitosa* Nutt., rasenartige, 4. k. Texas.



**Marshallia**

*lanceolata* Pursh, lanzettliche, 4. k. Carolina.

*latifolia* Pursh, breitblättrige, 4. k. Carolina.

**Marsilea** L. (Graf L. F. Marsigli, Stifter der Akademie der Wissenschaften zu Bologna), XXIV. iv., Marsileaceae.

*quadrifolia* L., vierblättrige, 4. Wa. f. Europa, Nordafrika, Mascarenas, Neuholland.

*natans* L. v. *Salvinia natans*.

**Marsypianthus hyptoides** Mart. v. *Hyptis inflata*.

**Martia campanulata** Sogl. v. *Hypericum virginicum*.

**Martynia** L. (John Martyn, Professor der Botanik zu Cambridge), XIV. ii., Personatae-Bignoniaceae.

*diandra* Glox. (*angulosa* Lam.), zweimännige, ☉. f. m. Mexico.

*longiflora* L. (*capensis* Glox.), langblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

*lutea* Lindl., gelbe, ☉. f. m. Brasilien.

*proboscidea* Glox. (*annua* L.), rüsselförmige, ☉. f. m. Nordamerika.

*Craniolaria* Sw. vid. *Craniolaria annua*. *perennis* L. v. *Gloxinia maculata*.

**Maruta** Cass., Stinkchamille, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

*fuscata* DC., bräunliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*Cotula* DC. (*foetida* Cass.), gemeine, ☉. f. England, Mittel- und Osteuropa.

**Masdevalia** R. et P. (Joseph Masdeval, spanischer Botaniker), XX i., Orchideae.

*infracta* Lindl., eingeknickte, 4. w. Brasilien.

**Massonia** L. (Franz Masson, englischer Botaniker und Reisender), VI. i., Coronariae-Asphodeleae.

*angustifolia* L. (*lanceolata* Thbg.), schmalblättrige, 4.

Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*breviscapa* Lehm., kurzschäftige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*candida* Burch., reinweißse, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

*cordata* Jacq., herzblättrige, 4. Zw. t. Cap d. gut. H.

*echinata* L., weichstachelige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

*ensifolia* Ker, schwertblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

?β) violacea Andr.

*grandiflora* Lindl., großblumige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*lanceaefolia* Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*latifolia* L. (*coronata* Jacq.), breitblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*longifolia* Jacq., langblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*muricata* Ker, stachelspitzige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*obovata* Jacq., verkehrteiförmige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*pauciflora* Dryand., wenigblumige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*sanguinea* Jacq., blutfarbige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

**Massonia**

*scabra* Andr. (*pustulata* Ker), scharfblättrige, 4. Zw.  
t. Cap der guten Hoffnung.  
*undulata* Thbg., wellenblättrige, 4. Zw. t. Cap der  
guten Hoffnung.

*corymbosa* Sims v. *Scilla corymbosa*. *lutea* Hort.  
v. *Daubenya aurea*.

**Matayba** Aubl. (guianischer Name), VIII. r., Sapindaceae.

*guianensis* Aubl., guianische, ♀. w. Guiana, Westindien.  
*Patrisiana* DC., Patris's, ♀. w. Guiana.

**Matricaria** T., Mutterkraut, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*capensis* L., capisches, ☉. ♂. f. k. Cap der guten H.  
*Chamomilla* L., Chamillen-M., ☉. f. Europa.

b) *flore pleno*.

*discoidea* DC., scheibenförmige, ☉. f. Californien.

*pusilla* W., kleine, ☉. f. ?

*suaveolens* L., starkriechende, ☉. f. Ostindien.

*maritima* L., *Parthenium* L. etc. v. *Pyrethrum maritimum*, *Parthenium* etc.

**Matthiola** RB. (P. A. Matthioli, italienischer Arzt und Botaniker), XV. III., Cruciferae.

*acaulis* DC., stengellose, ☉. f. Aegypten.

*annua* Swt., jährige (Sommer-Levkoje), ☉. f. Südeuropa.

b) *alba*. c) *fl. pleno* etc.

*arborescens* Sbr., strauchartige, ♀. ♂. k. Griechenland, Nordafrika.

*chenopodifolia* Fisch. et Mey., gänsefußblättrige, ☉. f. Caspisches Meer.

*fenestralis* RB., zwergige, ♂. k. ?

*glabra* DC., kahle, ♂. k. ?

b) *purpurea*. c) *flore pleno* etc.

*graeca* Swt., griechische, ☉. f. Griechenland.

*incana* RB. (Winter-Levkoje), weißgraue, ♂. ♀. k. England, Südeuropa.

b) *coccinea*. c) *alba*. d) *multiplex* etc.

*longipetala* DC. (*macropetala* Spgl.), langkronige, ☉. f. Bagdad.

*odoratissima* RB., wohlriechende, ♂. ♀. k. Taurien, Caucasus.

β) *fragrans* Fisch.

*oxyceras* DC., spitzhornige, ☉. f. Persien, Syrien.

*parviflora* RB. (*lunata* DC.), kleinblumige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

*saxatilis* Bernh., Gesteins-M., ☉. ♂. f. Portugal.

*sicula* Presl, sicilianische, ♂. f. Sicilien.

*simplicicaulis* Sw., einfachstengelige, ♂. f. k. ?

*sinuata* RB., buchtige, ☉. ♂. f. k. England, Südeuropa, Nordafrika.

*tatarica* DC., tatarische, ♂. f. Tatarei.

*torulosa* DC., aufgeschwollene, ♀. k. Cap der gut. H.

*tricuspidata* RB., dreispitzige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*tristis* RB., traurige, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

*varia* DC., bunte, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Oberitalien, Griechenland.

**Matthiola**

*scabra* L. v. *Guettarda scabra*. *Mattia umbellata* Schult. v. *Cynoglossum umbellatum*.

**Maurandia** Jacq. (*Maurandya* Loud.), [Maurandy, Pflanzenkennerin zu Carthagera], XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

*antirrhiniflora* Humb., löwenmaulblumige, ♀. Sch. k. t. Mexico.

*Barclayana* Lindl., Barclay's, ♀. Sch. t. k. Mexico.

*semperflorens* Jacq., immerblühende, ♀. Sch. k. t. Mexico.

**Mauritia** L. fil. (Moritz v. Nassau Siegen, Beschützer des Piso und Marcegraf), XXII. VI., Palmae.

*armata* Mart., bewaffnete, ♀. w. Brasilien.

*flexuosa* L. fil., gebogene, ♀. w. Surinam.

*vinifera* Mart., weingebende, ♀. w. Brasilien.

**Maxillaria** R. et P., Kerfstendel, XX. I., Orchideae.

*aromatica* Grah., gewürzhafter, 4. w. Mexico.

*atropurpurea* Lodd., dunkelpurpurrother, 4. w. Brasil.

*aureo-fulva* Hook., goldbrauner, 4. w. Südamerika.

*Barringtoniae* Lindl., Barrington's, 4. w. Westindien.

*Boothii* Lindl., Booth's, 4. w. Südamerika.

*ciliata* Lindl., gefranzter, 4. w. Südamerika.

*Colleyi* Batem., Colley's, 4. w. Südamerika.

*cristata* Lindl., kammförmiger, 4. w. Trinidad.

*crocea* Lindl., safranfarbiger, 4. w. Brasilien.

*decolor* Lindl., farbloser, 4. w. Jamaica.

*densa* Lindl., dichter, 4. w. Mexico.

*Deppei* Bot. Cab., Deppe's, 4. w. Neuspanien.

*foveata* Lindl., grubiger, 4. w. Demerara.

*galeata* Bot. Cab., halmiger, 4. w. Neuspanien.

*gracilis* Bot. Cab., schlanker, 4. w. Brasilien.

*graminea* Lindl., grasartiger, 4. w. Demerara.

*Harrisoniae* Lindl., Harrison's, 4. w. Südamerika.

*Henchmanni* Hook., Henchmann's, 4. w. Mexico.

*macrophylla* Pöpp. et Endl., großblättriger, 4. w. Peru.

*madida* Lindl., feuchter, 4. w. Brasilien.

*ochroleuca* Bot. Cab., weißgelber, 4. w. Brasilien.

*pallidiflora* Hook., bleichblumiger, 4. w. St. Vincent.

*Parkerii* Hook., Parker's, 4. w. Demerara.

*parvula* Hook., kleiner, 4. w. Brasilien.

*picta* Hook., bemalter, 4. w. Brasilien.

*platanthera* Hook., breitbeuteliger, 4. w. Brasilien.

*porrecta* Lindl., hervorgestreckter, 4. w. Brasilien.

*psittacina* Batem., papageifarbiger, 4. w. Mexico.

*pumila* Hook., niedriger, 4. w. Demerara.

*punctata* Bot. Cab., punktirter, 4. w. Brasilien.

*racemosa* Hook., traubiger, 4. w. Südamerika.

*Rollisonii* Lindl., Rollison's, 4. w. Brasilien.

*rufescens* Lindl. (*fuscata* Hort.), rothbrauner, 4. w. Trinidad.

*sinuosa* Batem., buchtiger, 4. w. Demerara.

*stapelioides* Lk. et Otto, stapelienblumiger, 4. w. Brasilien.

*Steelii* Hook., Steel's, 4. w. Demerara.

*tenuifolia* Lindl., feinblättriger, 4. w. Vera-Cruz.

*tetragona* Lindl., vierseitiger, 4. w. Brasilien.



**Maxillaria**

variabilis Lindl., veränderlicher, 4. w. Neuspanien (Vera-Cruz).

β) unipunctata Lindl.

viridis Lindl., grüner, 4. w. Brasilien.

vitellina Lindl., dottergelber, 4. w. Brasilien.

Warreana Lodd., Warre's, 4. w. Brasilien.

squalens Hook. vid. *Xylobium squalens*. *superba*

Lex. et Lallav. v. *Govenia superba*.

**Maximiliana** Mart. (Maximilian, König von Baiern, einer der großmüthigsten Beförderer der Pflanzenkunde, Maximilian, Fürst von Wied Neuwied, berühmt als Reisender und Naturforscher), VI. III. (XXIII. I.), *Palmae*.

insignis Mart., ausgezeichnete, 5. w. Brasilien.

regia Mart., königliche, 5. w. Brasilien.

**Maytenus** Feul. (chilesischer Name), II. I. (XXIII. II.), *Celastrineae*.

chilensis DC. (? *Boaria* Molin.), chilesischer, 5. k. t. Chili.

octogonus DC. (*Celastrus octog.* L'Her.), achtkantiger, 5. t. Peru.

verticillatus DC. (*Celastrus vert.* R. et P.), wirtelförmiger, 5. t. Peru.

**Mazus rugosus** Lour. v. *Hornemannia bicolor*.

**Meconopsis** Vig., DC., Mohnling, XIII. I., *Papa-veraceae*.

cambrica Vig., englischer, 4. f. England, Pyrenäen.

crassifolia Benth., dickblättriger, 5. 4. f. Californien.

heterophylla Benth., verschiedenblättriger, 5. 4. f. Californien.

**Medeola** L., Medeole, VI. III., *Sarmentaceae* (*Asparagineae-Smilaceae*).

virginica L., virginische, 4. Kn. f. Nordamerika.

asparagoides L. v. *Myrsiphyllum asparagoides*.

**Medicago** T., L., Schneckenklee, XVII. IV. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

aculeata W., stacheliger, 6. f. ? Südeuropa.

aegagrophila Loud., bockskrautblättriger, 6. f. ?

agrestis Ten., Acker-S., 6. f. Süditalien.

apiculata W., kleinspitziger, 6. f. Südeuropa.

β) confinis Koch.

arborea L., baumartiger, 5. 5. k. Süditalien, Griechenland.

brachycarpa Fisch., kurzschotiger, 6. f. Caucasus.

cancellata MB., gegitterter, 6. f. Caucasus.

carstiensis Jacq., krainerischer, 4. f. Untersteyermark, Krain, Litorale.

caspica Jacq., Fisch., caspischer, 6. f. Caspisches Meer.

catalonica Schrk., catalonischer, 6. f. Catalonien.

ciliaris W., gefranzter, 6. f. Südfrankreich.

coronata Desr., gekrönter, 6. f. Südfrankreich.

corymbosa H. Kil., traubendoldiger, ? 6. f. ?

cretacea MB. (*fruticans* Hornem.), kreideliebender, 4. 5. f. Taurien.

cylindracea DC., cylinderförmiger, 6. f. ?

denticulata W., gezähnelter, 6. f. Süddeutschland, Italien, Taurien, Caucasus.

**Medicago**

disciformis DC., scheibenförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Istrien, Dalmatien.

Echinus DC. (*intertexta* All.), igelförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Italien.

elegans Jacq. (*rugosa* Desr.), zierlicher, ☉. f. Sicilien.

falcata L., sichelförmiger, 4. f. Europa.

β) versicolor Wallr. (*media* P.). γ) procumbens Bess. (*intermedia* Schult.).

flexuosa Tenor., gebogener, ☉. f. Italien.

Gerardi W. Kit., Gerard's, ☉. f. Südeuropa, Ungarn.

β) villosa DC. (? *hirsuta* Thuill.).

glomerata Balb. (*annularis* Bess.), knaulförmiger, 4. f. Süd- und Osteuropa.

glutinosa MB., klebriger, 4. f. Caucasus, Taurien.

β) alpestris.

granatensis W., granadischer, ☉. f. Südspanien.

Helix W. (*laevis* Dsf.), schneckenförmiger, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

Hystrix Tenor., stachelfrüchtiger, ☉. f. Italien.

intertexta Desr., verwebter, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

laciniata Gouan, schlitzblättriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

lappacea Desr., klettenähnlicher, ☉. f. Südfrankreich.

litoralis Rohde (*arenaria* Tenor.), Strand-Sch., ☉. f. Südfrankreich, Istrien, Italien.

lupulina L., hopfenartiger, ☉. f. Europa, Nordamerika etc.

β) Willdenowii Merat. γ) unguiculata DC. (*mnio-carpa* Loud.). δ) nepalensis H. Pilln.

maculata W. (*cordata* Desr., *arabica* Brot.), gefleckter, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

marginata W. (*applanata* W.), berandeter, ☉. f. Südeuropa.

marina L., Meerstrands-L., 4. k. Süd- u. Westeuropa.

minima Desr., Lam., kleinsten, ☉. f. Europa, Nordafrika.

β) mollissima Spgl. (*graeca* Hornem.). γ) longiseta DC. δ) viscida Koch.

Murex W., kurzstacheliger, ☉. f. ?

muricata Desr., weichstacheliger, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa.

muricoleptis Tin., schuppenstacheliger, ☉. f. Sicilien.

nigra W., schwarzer, ☉. f. Südeuropa, Teneriffa.

Noccae Balb., Nocca's, ? ☉. f. Italien.

obscura Retz, dunkler, ☉. f. ? Südeuropa.

olivaeformis H. Par., olivenfrüchtiger, ☉. f. ?

orbicularis Desr., kreisförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

ovata H. Erf., eiförmiger, ☉. f. ?

pentacycla DC., fünfwindiger, ☉. f. Südfrankreich.

praecox DC., früher, ☉. f. Südfrankreich.

prostrata Jacq., gestreckter, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

pubescens DC., weichhaariger, ☉. f. Südfrankreich, Nizza.

recta Dsf., gerader, ☉. f. Nordafrika.

rupestris MB., Felsen-Sch., 4. f. Taurien.

sativa L., gebauter, 4. f. Europa.

β) versicolor.

saxatilis MB., Gesteins-L., 4. f. Taurien.

**Medicago**

*scutellata* L., schildförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*sibirica* DC., sibirischer, ☉. f. Sibirien.

*sphaerocarpa* Bertol. (*globulifera* Dsf.), kugelfrüchtiger ☉. f. Italien.

*spinulosa* DC. (*apiculata* Bat.), feinstacheliger, ☉. f. Frankreich.

*striata* Bat., gestreifter, ☉. f. Frankreich.

*strumaria* H. Erf., kropfiger, ☉. f. ?

*suffruticosa* Ram., halbstrauchiger, ☿. f. k. Pyrenäen.

*Tenoriana* Spgl. (*cancellata* Ten.), Tenore's, ☉. f. Neapel.

*Terebellum* W. (*aculeata* G., *muricata* Lej.), bohrtförmiger, ☉. f. Südeuropa.

*tornata* Desr., gedrechselter, ☉. f. Südfrankreich, Spanien, Nordafrika.

*tribuloides* Desr., bürzeldornartiger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

β) *Hornemanniana* DC. (*pubescens* Hornem.). γ)

*rigida* Desr. δ) *truncatula* G. (*tentaculata* W.)

*tuberculata* W., höckeriger, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

*turbinata* W., kreiselförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Italien.

*uncinata* W. (*distans* Poir.), hackiger, ☉. f. Südeuropa.

*circinata* L. etc. v. *Hymenocarpus circinatus* etc.

**Medinilla** Gaudich., *Medinilla*, ? X. 1., Melastomaceae.

*erythrophylla* Lindl., rothblättrige, ☿. w. Ostindien.

**Megacarpaea** DC., Großschötchen, XV. 11., Cruciferae.

*laciniata* DC., schlitzblättriges, ♂. f. b. k. Südsibirien.

**Megaclinium** Lindl., Aehrenstendel, XX. 1., Orchideae.

*falcatum* Lindl., sichelförmiger, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*maximum* Lindl., größter, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*oxypterum* Lindl., schmalflügeliger, 4. Ln. w. Sierra Leone.

**Megasea ciliata** Haw. etc. v. *Saxifraga ligulata* etc.**Megastachya rigida** P. B. v. *Sclerochloa rigida*. Hinsichtlich der übrigen s. *Eragrostis*.**Melaleuca** L., Kajeputbaum, XVIII. 11., Myrtaceae.

*armillaris* Sm. (*alba* Hortul., *ericaefolia* Andr., W.), ringförmiger, ☿. k. t. Neuholland.

*Cajuputi* Roxb. (*minor* Auctor.), ächter, ☿. w. Ostind.

*calycina* RB., gekelchter, ☿. ☿. k. t. Neuholland.

*cuticularis* La Bill., lockerrindiger, ☿. k. t. Neuholland.

*decussata* RB. (*tetragona* Hortul., *parviflora* Otto), kreuzblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

*densa* RB., dichtblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

*diosmaefolia* Andr. (*decussata* W., *chlorantha* Hortul.), diosmablättriger, ☿. k. t. Neuholland.

*discolor* Rchb., verschiedenfarbiger, ☿. k. t. Neuholland.

*dumosa* Lodd., buschiger, ☿. k. t. Neuholland.

*elliptica* La Bill. (*rotundifolia* Hort.), elliptischer, ☿. ☿. k. t. Südliches Neuholland.

*ericaefolia* Sm. (*armillaris* W.), heideblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

*eriocephala* Sbr., wolkköpfiger, ☿. k. t. Neuholland.



## Melaleuca

- erubescens Otto (*tenuissima* Hort., *tenuifolia* Mack. Cat.), röthlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- euphorbioides Lodd., euphorbiaähnlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- Fraseri Hook., Fraser's, f. f. k. t. Neusüdwallis.
- fulgens RB. (*splendens* Hortul.), leuchtender, f. k. t. Neuholland.
- genistaefolia Sm., ginsterblättriger, f. f. k. t. Neusüdwallis.
- gibbosa LaBill., höckeriger, f. f. k. t. Nördliches Neuholland.
- globifera RB., kugelblumiger, f. f. k. t. Neuholland.
- ?grandis Fisch., größer, f. k. t. Neuholland.
- Huegelii Endl., Hügel's, f. f. k. t. Neuholland (Schwanenflufs),
- hypericifolia Sm., johanniskrautblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- imbricata Lk., dachziegelförmiger, f. k. t. Neuholland.
- incana RB. (*canescens* Otto, *tomentosa* Colla), grauer, f. f. k. t. Neuholland.
- lanceolata Otto, lanzettblättriger, f. f. k. t. Neuholl.
- lateritia H. Berol., ziegelfarbiger, f. k. t. Neuholland.
- Leucadendron L., weifsstämmiger, f. w. Ostindien.
- linarifolia Sm., frauenflachsblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- nodosa Sm., knotiger, f. f. k. t. Neuholland.
- Ottonis H. Berol., Otto's, f. k. t. Neuholland.
- paludosa RB., sumpfliebender, f. k. t. Neuholland.
- pendulina Lodd., hängender, f. f. k. t. Neuholland.
- pentagona LaBill., fünfkantiger, f. f. k. t. Neuholland.
- pulchella RB. (*fimbriata* Hortul.), schöner, f. k. t. Neuholland.
- scabra RB., scharfblättriger, f. f. k. t. Südliches Neuholland.
- squamea LaBill., schuppiger, f. f. k. t. Van-Diemens-Land.
- squarrosa Sm. (*myrtifolia* Vent.), sparriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- striata LaBill., gestreifter, f. f. k. t. Neuholland.
- stypelioides Sm. (*obliqua* Wendl.), schiefblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- taxifolia Schltdl., taxusblättriger, f. f. k. t. Neuholl.
- theaeformis Cunn., theeähnlicher, f. f. k. t. Neuholl.
- thymifolia Sm. (*gnidiaefolia* Vent., *coronata* Andr.), thymianblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- thymoides LaBill., thymianähnlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- trinervia Sm., dreinerviger, f. f. k. t. Neuholland.
- uncinata RB., hakenförmiger, f. f. k. t. Neuholland.
- uniflora Hortul., Sogl. (? *glauca* Hort.), einblumiger, f. k. t. Neuholland.
- viridiflora Sm., grünblumiger, f. t. Neuholland, Neucaledonien.
- Waeberi Rchb., Waeber's, f. k. t. Neuholland.

Noch findet man folgende unbestimmtere in den Pflanzenverzeichnissen: *agathosmaefolia* Hort., *epacridea* Hort., *glauca* Hort., *virgata* Hort., *vestita* Hortul.

**Melaleuca**

*fascicularis* La Bill. v. *Astartea fascicularis. neriifolia* Sims (*salicifolia* Andr.) v. *Tristania neriifolia. scoparia* Forst. et *Thea* Wendl. v. *Leptospermum scopar. et flavescens. virgata* Forst. vid. *Baeckea virgata*.

**Melampodium** L., Geißfußs, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

## I. Genuina.

*americanum* L., amerikanischer, ☉. f. m. Neuspanien.  
*diffusum* Cass., weitschweifiger, ☉. f. m. Südamerika.  
*Kunthianum* DC. (*sericeum* H. B. K.), Kunth's, ☉. f. m. Neuspanien.

*sericeum* Lag., seidenhaariger, ☉. f. m. Neuspanien.

II. Zarabellia Cass. (*Dysodium* Rich.).

*divaricatum* DC. (*paludosum* H. B. K., *ovalifolium* Richb.), ausgesperrter, ☉. f. m. Neuspanien, Südamerika.

*gracile* Less., schlanker, ☉. f. m. Mexico.

*heterophyllum* Lag. (*hispidum* H. B. K.), verschiedenblättriger, ☉. f. m. k. Mexico.

*humile* Sw., niedriger, ☉. f. m. Westindien.

*longifolium* Cav., Brouss., langblättriger, ☉. f. m. Neuspanien.

## III. Alcina Cav.

*perfoliatum* H. B. K., durchwachsener, ☉. f. m. Mexico.

**Melampyrum** T., Wachtelweizen, XIV. ii., Personatae-Rhinantheae.

*arvense* L., Acker-W., ☉. f. Europa.

β) *argyrocomum* Fisch.

*barbatum* W. K., bärtiger, ☉. f. Oesterreich, Ungarn, Litorale.

*cristatum* L., kammförmiger, ☉. f. Europa.

*nemosum* L., blauer, ☉. f. Europa.

*pratense* L. (*vulgatum* P.), gemeiner, ☉. f. Europa.

*sylvaticum* L. (*alpestre* P.), Wald-W., ☉. f. Europa.

**Melananthera** Rich., Schwarzbeutel, XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

*deltoides* Mchx., deltablättriger, ♂. w. Westindien.

*hastata* Mchx., spontonblättriger, ♂. 4. t. k. Carolina, Westindien.

β) *pandurata*.

**Melancranis** Vahl, Schwarzbinse, III. i., Cyperaceae.

*scariosa* Vahl, trockenhäutige, 4. k. Cap der gut. H.

**Melanopsidium** Coll., Schwarzguagave, XII. i., ? Myrtaceae (? *Rubiaceae*).

*nigrum* Coll., baumartige, f. w. ?

**Melanorrhoea** Wall., Schwarzfirnisbaum, XXIII. ii., Amyrideae-Terebinthaceae.

*usitata* Wall., gebräuchlicher, f. w. Ostindien.

**Melanthium** L., Braunblümchen, VI. iii., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

*ciliatum* Thbg., gefranztes, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*gramineum* Cav., grasartiges, 4. Zw. k. Nordafrika.

*juncum* Jacq. (*triquetrum* Thbg.), simsenförmiges, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*secundum* Lam., einseitiges, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Melanthium**

*sibiricum* L., sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.

*capense* L. (*aethiopicum* Thbg.) v. *Androcymbium leucanthum* Nachtr. *densum* Lam. v. *Chaemaelirium carolinianum* Nachtr. *bracteolatum* Desr. v. *Veratrum parviflorum*. *eucomoides* Jacq. vid. *Androcymbium eucom.* *hybridum* Walt. (*latifolium* Lam., *racemosum* Mchx.) etc. v. *Leimanthium hybridum* etc. *monopetalum* L. suppl. et *spicatum* Houtt. et *Wurmbeum* Thbg. vid. *Wurmbea campanulata*, *purpurea* et *longiflora*. *uniflorum* Jacq. v. *Kolbea Bryniana*. *viride* Thbg. v. *Ornithoglossum viride*.

*Melaspheerula graminea* Ker etc. vid. *Diasia graminifolia* etc.

**Melastoma** Burm., L., Schwarzsclund, X. 1., Lythrae-Melastomeae.

affine D. Don, ähnelnder, f. w. Ostindien.

*Azelianum* D. Don, Afzelius's, f. w. Sierra Leone.

*asperum* L., rauher, f. w. Ostindien.

*candidum* D. Don, reinweiß, f. w. Ostindien.

*corymbosum* Sims, traubendoldiger, f. w. Sierra Leone.

*cymosum* Wendl., afterdoldiger, f. w. Westindien, Südamerika.

*ecostatum* H. Kew., rippenloser, f. w. Jamaica.

*elongatum* D. Don, verlängerter, 4. Kn. w. Sierra Leone.

*grossum* Mut., breitblättriger, f. w. Südamerika.

*leonense* Lodd., guineischer, f. w. Sierra Leone.

*macrocarpum* D. Don (*malabathrica* Bot. mag.), großfrüchtiger, f. w. Ostindien.

*malabathricum* L., malabarischer, f. w. Ostindien.

*nepalense* Lodd., nepal'scher, f. t. Nepal.

*octandrum* L., achtmänniger, f. w. Ceylon.

*sanguineum* Ker, blutrother, f. w. China.

*Acinodendron* L. etc. v. *Miconia Acinodendron* etc.

*albicans* Sw. etc. v. *Diplochita albicans* etc. Nachtr.

*coerulea* Hort., *granulosa* Desr. etc. vid. *Pleroma*

*coerulea* etc. *discolor* L. vid. *Aciotis discolor*.

*elegans* Aubl. etc. v. *Clidemia elegans* etc. *osbeckioides* Ker v. *Osbeckia chinensis*. *Phisiphora* Vahl

(*Tococa* Desr.) vid. *Tococa Aubletii*. *villosa* Aubl.

v. *Rhexia hypericoides*.

**Melhania** Forsk., Melhanie, XVI. 11., Malvaceae-Dombeyaceae.

*Burchellii* DC., Burchell's, f. t. w. Cap der gut. H.

*Erythroxyton* RB., Rothholz-M., f. w. St. Helena.

*Melanoxyton* RB., Schwarzholz-M., f. w. St. Helena.

**Melia** L., Zedrach, XVI. VI. (X. 1.), Hesperideae-Meliaceae.

*australis* Swt., neuholländischer, f. t. Neusüdwallis.

*Azadirachta* L., ostindischer, f. w. Ostindien.

*Azedarach* L., glatter, f. k. Sicilien, Dalmatien, Syrien, Ostindien.

*composita* W., zusammengesetztblättriger, f. t. w. Ostindien, Teneriffa.

*guinensis* G. Don, guineischer, f. w. Guinea.

*robusta* Roxb., rüstiger, f. w. Ostindien.

*sempervirens* Sw., immergrüner, f. w. Jamaica.

*superba* Roxb., stolzer, f. w. Ostindien.



**Melianthus** T., Honigblume, XIV. II., Zygophylleae.  
 comosus Vahl, schuppiger, ♂. ♂. k. Cap der gut. H.  
 major L., großer, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.  
 minor L., kleiner, ♂. ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

**Melica** L., Perlgras, III. II., Gramineae.

altissima L. (*sibirica* Lam.), hohes, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.

aspera Dsf. (*ramosa* Vill, *pyramidalis* Lam., *minuta* Bertol.), rauhes, 4. f. Südfrankreich, Italien, Griechenland.

Bauhini All. (*setacea* P., *pyramidalis* Dsf.), Bauhin's, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

ciliata L., gefranztes, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien, Persien.

major Sm., großes, 4. f. ? Griechenland.

nutans L., nickendes, 4. f. Europa.

speciosa Mühlbg. (*altissima* β. W., *glabra* Mchx., *rari-flora* Schrbr.), prächtiges, 4. f. Nordamerika.

uniflora Retz (*Lobelii* Vill.), einblumiges, 4. f. Europa, Orient.

*coerulea* L. v. *Molinia coerulea*.

**Melichrus** RB., Honigstrauch, V. I., Epacrideae.

medius Cunn., mittlerer, ♂. t. Neuholland.

rotatus RB., radförmiger, ♂. t. Neuholland.

**Melicocca** L., Honigbeere, VIII. I., Sapindaceae.

bijuga L., zweipaarige, ♂. w. Westindien.

olivaeformis H. B. K., olivenähnliche, ♂. w. Westindien.

paniculata Juss., rispige, ♂. w. St. Domingo.

trijuga Juss., dreipaarige, ♂. w. Ceylon, Molucken.

**Melicope** Forst., Honigraute, VIII. I., Tricoccae-Rutaceae.

ternata Forst., dreizählige, ♂. t. k. Neuzeeland.

**Melilotus** T., Steinklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

arguta Rchb. (? *altissima* Hornem.), hoher, ♂. f. Mittel- und Westeuropa.

\* arborea Castagn., strauchartiger, ♂. f. Türkei.

Besseriana Sering. (*plicata* Stev.), Besser's, ♂. f. Taurien.

Boumeti Hornem., Boumeti's, ♂. f. ?

coerulea Desr., blauer, ♂. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.

β) connata Bernh. γ) procumbens Bess.

dentata P. (WK.), gezähnelter, ♂. f. Mittel- und Osteuropa, caspisches Meer.

β) Kochiana Hayne.

globulosa Stev., kugelförmiger, ♂. f. Osteuropa.

gracilis DC. (*neapolitana* Tenor.), schlanker, ♂. f. Frankreich, Italien.

hamosa MB. (*uncinata* Bess.), hakenförmiger, ♂. f. Caucasus.

indica Desr., indischer, ♂. f. Ostindien.

italica Lam. (*rotundifolia* Ten.), italienischer, ♂. f. Italien.

linearis Cav. P., gleichbreitblättriger, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

longifolia Tenor., langblättriger, ♂. f. Italien.

melanosperma Bess., schwarzfrüchtiger, ♂. f. Taurien.

**Melilotus**

messianensis Desr., sicilianischer, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

officinalis Lam., gebräuchlicher, ♂. f. Europa, Mittelasien, Afrika, Nordamerika.

β) macrorrhiza (WK.) γ) palustris (WK.)

pallida Bess., bleicher, ♂. f. Volhynien.

parviflora Dsf. (*Baumerti* Hortul.), kleinblumiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Caucasus.

β) rugulosa W.

Petitpierreana Hayne (*diffusa* Koch, *expansa* Hortul., *Kochiana* DC., *arvensis* Wallr.), Petitpierre's, ♂. f. Europa.

β) albiflora Koch (? *altissima* Thuill.).

polonica Desr., polnischer, ☉. f. Polen.

ruthenica MB. (*wolgica* Poir.), russischer, ☉. f. Südrussland.

segetalis Sering., Saat-St., ☉. f. Spanien.

suaveolens Ledeb., starkriechender, ♂. 4. f. Sibirien.

sulcata P. (*mauritanica* P.), gefurchter, ☉. f. Nordafrika.

taurica MB., taurischer, ♂. f. Taurien.

vulgaris W. (*alba* Thuill., *leucantha* Koch), gemeiner, ♂. f. Europa.

Ungewisse: *furcata* Hort., *imbricata* ? Bess.

*cretica* Dsf. vid. *Pocockia cretica*. *ornithopodioides* Lam. v. *Trigonella ornithopod.* *sibirica* Poir. vid. *Medicago sibirica*.

**Melissa T., Melisse, XIV. 1., Labiatae.**

altissima Sm., hohe, 4. f. Italien, Griechenland.

cordifolia P. (*hirsuta* Balb.), herzblättrige, 4. f. Südeuropa.

officinalis L., officinelle, 4. f. Südeuropa.

b) romana Hort.

? polyanthos Lodd., vielblumige, 4. f. ?

*Calamintha* L. etc. v. *Calamintha officinalis* etc.

**Melittis L., Immenblatt, XIV. 1., Labiatae.**

grandiflora Sm., großblumiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa, England.

Melissophyllum L., melissenblättriges, 4. f. Ost- und Südeuropa.

β) album.

**Melocactus C. Bauh., Melonendistel, XII. 1., Cactaeae.**

amoenus Hffgg. (*communis Jördensii* Otto, *rubens* Hort.), liebliche, ♀. w. Columbia.

atrosanguineus H. Berol., dunkelblutrothe, ♀. w. St. Thomas.

communis DC., gemeine, ♀. w. Westindien.

β) macrocephalus H. Berol. γ) oblongus H. Berol.

δ) viridis H. Berol. ε) laniferus H. Berol. ζ)

havannensis H. Berol. η) Grengelii H. Dresd.

θ) conicus Pfr.

curvispinus H. Berol., krummstachelige, ♀. w. Mexico.

macracanthus Salm, großstachelige, ♀. w. Westindien.

mammillariaeformis Salm, zitzenförmige, ♀. w. Mexico.

meonacanthus Lk. et Otto, gelbstachelige, ♀. w. Jamaica.

Miqueuli Lehm., Miquel's, ♀. w. Westindien.

placentiformis Lehm. (*Besleri* Lk. et Otto), kuchenförmige, ♀. w. Mittägliches Brasilien.

pyramidalis Salm, pyramidale, ♀. w. Caracas.

**Melocactus**

*rubens* Pfr., röthliche, ♀. w. Westindien.

*Salmianus* Otto, Salm's, ♀. w. Caracas.

*spatangus* H. Berol., langstachelige, ♀. w. Caracas.

*violaceus* Pfr., violette, ♀. w. Brasilien.

*ambiguus* Hort. (*elegans* Hort.) v. *Echinocactus leucanthus*. *Besleri affinis* Hort. v. *Echinocactus spiralis*. *Gilliesii* Hort. v. *Echinoc. formosus*. *ingens* Karw., *Langsdorffii* DC. vid. *Echinoc. ingens* et *Langsdorffii*. *latispinus* Hort. v. *Echinoc. cornigerus*. *monoclonos* Plum. vid. *Cereus monoclonos* Nachtr. *polyacanthus* DC., *Sellowii* DC. v. *Echinocactus polyac.* etc.

**Melocanna** Trin., Melonenrohr, VI. 1., Gramineae.

*bambusoides* Trin., bambusaähnliches, ♀. w. Ostindien.

*humilis* Trin., niedriges, ♀. 4. w. Amboina.

**Melochia** L. (arabischer Name), XVI. 11., Malvaceae-Hernandiaceae.

*parviflora* H. B. K., kleinblumige, ♀. w. Caracas.

*parvifolia* H. B. K., kleinblättrige, ♀. w. Südamerika, Trinidad.

*pyramidata* L., pyramidale. ♀. w. Westindien, Südamerika.

*tomentosa* L., filzige, ♀. w. Westindien.

β) *frutescens* Jacq.

*caracasana* Jacq. W. etc. v. *Riedleia caracasana* etc.

**Melodinus** Forst., Beerendrehler, V. 11., Contortae-Apocynae.

*monogynus* Carey, Roxb., einweibiger, ♀. Sch. w. Ostindien.

*scandens* Forst., windender, ♀. Sch. w. Neucaledonien.

**Melothria** L., Kümmerling, XXI. 11., Cucurbitaceae.

*foetida* Desr., stinkender, ☉. w. f. m. Guinea.

*pendula* L., hängender, ☉. Sch. f. m. Westindien, Nordamerika.

**Melvilla speciosa** Andr. v. *Cuphea Melvilla*.**Memecylon** L., Beerenbaum, VIII. 1., ? Melastomaceae-Memecyleae.

*capitellatum* L., kopfblumiger, ♀. w. Ceylon.

*edule* Roxb., genießbarer, ♀. w. Ostindien.

**Meniocus** Desv., Mondschötchen, XV. 11., Cruciferae.

*linifolius* Desv., DC., gleichbreitblättriges, ♂. f. b. k. Taurien, Caucasus.

**Meniscium** Schreb., Mondfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

*palustre* Radd., Sumpf-M., 4. w. Brasilien.

*proliferum* Sw., sprossender, 4. w. Ostindien.

*reticulatum* Sw., netzförmiger, 4. w. Westindien.

*sorbifolium* W., ebereschblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.

*triphylum* Sw., dreiblättriger, 4. w. Ostindien, China.

**Menispermum** T., Mondsame, XXII. x. (VI. 11.), Menispermeae.

*canadense* L., canadischer, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*davuricum* DC., dahurischer, ♀. Sch. f. Dahurien.

*Lyoni* Pursh, Lyon's, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*smilacinum* DC., smilaxähnlicher, ♀. Sch. k. Carolina.

*virginicum* L., virginischer, ♀. Sch. f. Nordamerika.



**Menispermum**

*Cocculus* W. vid. *Cocculus Pluknetii. fenestratum*  
 G. v. *Coscinium fenestratum. polycarpon* Roxb. v.  
*Tiliacora racemosa.*

**Menochilus** Fisch. et Mey., Stahlkraut, XIV. 1.,  
Verbenaceae.

*gloxinifolius* Fisch. et Mey., gloxinienblättriges, 4. w.  
 Brasilien.

**Menonvillea** DC., Menonvillea, XV. 11., Cruciferae.

*filifolia* Fisch. et Mey., fadenblättrige, ☉. f. Chili.

*linearis* DC., schmalblättrige, ☿. k. t. Peru, Chili.

**Mentha** T. (et *Pulegium* Bauh.), Münze, XIV. 1., La-  
biatae.

*acutifolia* Sm., spitzblättrige, 4. f. England, Deutschl.

*aquatica* L. (*palustris* Mill., *intermedia* et *purpurea* Host.),  
 Wasser-M., 4. f. Europa.

β) *hirsuta* L.

*arvensis* L. (*agrestis* Sol.), Acker-M., 4. f. Europa.

β) *gentilis* Sm. γ) *praecox* Sole.

*Auricularia* L., geöhrte, 4. w. Ostindien.

*australis* RB., neuholländische, 4. k. Neuholland.

*balsamea* W., balsamduftende, 4. f. Südeuropa.

*blanda* Wall., liebliche, 4. k. f. Nepal.

*borealis* Mchx., nördliche, 4. f. Nordamerika.

*brevispicata* Lehm., kurzährige, 4. f. Sibirien.

*canadensis* L., canadische, 4. f. Canada.

*cervina* L., Hirsch-M., 4. f. Südfrankreich.

*citrata* Ehrh. (*odorata* Sm., *adspersa* Mch.), citronen-  
 duftende, 4. f. England, Mittel- und Südeuropa.

*coccinea* Roxb., scharlachfarbige, 4. w. Ostindien.

*crenata* Beck., gekerbte, 4. f. Mitteldeutschland.

*crispa* L., krause, 4. f. Schweiz, Deutschland.

*crispata* Schrad. (*hercynica* Röhl.), gekräuselte, 4. f.  
 Deutschland.

*divaricata* Lagasc., ausgespernte, 4. f. Spanien.

*elegans* Lej., zierliche, 4. f. Belgien.

*emarginata* Rchb., ausgerandete, 4. f. Südeuropa.

*gentilis* L. (*rubra* Huds., *pratensis* Sole, *gracilis* Sm.),  
 Garten-M., 4. f. Mitteleuropa, England.

*gibraltarica* W., gibraltarische, 4. f. Spanien.

*glabrata* Vahl (*kahirina* Forsk.), kahle, 4. f. Aegypten.

*gratissima* Wigg. (*sapida* Tausch, *Halleri* Gmel.), an-  
 genehme, 4. f. Deutschland.

*hirta* W. (*longifolia* Morett., *dumetorum* Schult.), kurz-  
 haarige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*incana* W., weißsgraue, 4. f. Südeuropa.

*intermedia* N. E., mittlere, 4. f. Mitteldeutschland.

*laevigata* W., glatte, 4. f. ?

*lapponica* Wahlbg. (? *badensis* C. C. Gmel.), lappländische,  
 4. f. Lappland, ? Pfalz.

*lavandulacea* W. (*capensis* Thbg.), lavendelblättrige, 4.  
 f. Spanien, Cap der guten Hoffnung.

*nepetoides* Lej. (*aquatica sylvestris* Mey., *subspicata*  
 Beck), nepetaähnliche, 4. f. Belgien, Hannover etc.

*niliaca* Jacq., aegyptische, 4. f. Aegypten.

*organoides* Ten., dostenähnliche, 4. f. Neapel.

*Pimentum* N. E., gewürzhafte, 4. f. Mitteldeutschland.

*piperita* L., Pfeffer-M., 4. f. England.

**Mentha**

- pubescens* W. (*pyramidalis* N. E.), weichhaarige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
- Pulegium* L., Polei-M., 4. f. Europa.
- pyramidalis* Tenor., pyramidale, 4. f. Italien.
- Requieni* Benth., Requien's, 4. f. Corsica.
- rivalis* Sm., Bach-M., 4. f. England.
- rotundifolia* L. (*rugosa* Lam., Roth, *suaveolens* Ehrh.), rundblättrige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
- $\beta$ ) *macrostachya* Tenor.  $\gamma$ ) *neglecta* Tenor.
- sativa* L. (*palustris* Mch., *verticillata* Roth, *organifolia*, *tortuosa*, *maculata*, *serotina*, *nemorosa*, *longifolia*, *alata*, *carniolica*, *viridula*, *nitida*, *montana* et *sylvatica* Host.), gebaute, 4. f. Europa.
- $\beta$ ) *rubra* Sm.  $\gamma$ ) *dentata* Mch.  $\delta$ ) *parviflora* Schultz (*austriaca* Jacq.).
- sylvestris* L., Wald-M., 4. f. Europa.
- $\beta$ ) *canescens* Roth,  $\gamma$ ) *candicans* Crtz.  $\delta$ ) *velutina* Lej.  $\epsilon$ ) *mollissima* Borckh. (*chalepensis* Mill.)  $\zeta$ ) *nemorosa* W. (*serotina* Tenor., *reflexifolia* Opitz.).
- tenuis* Mchx. (*viridis* Walt.), dünne, 4. f. Nordamer.
- undulata* W. (*gratissima* Roth, *tomentosa* Hoppe, *foliosa* Op., *hybrida* Schlchr.), wellenförmige, 4. f. Südeuropa.
- urticaefolia* Tenor., nesselblättrige, 4. f. Neapel.
- villosa* Sm., zottige, 4. f. England.
- viridis* L., grüne, 4. f. Europa.
- blanda* Lindl. vid. *Aphanochilus incisus*. *pumila* Grah. et *quadrifolia* Roxb. v. *Dysophylla pumila* etc.
- Mentzelia** Plum. (C. Mentzel, Leibarzt des Churfürsten von Brandenburg), XII. 1., Loasaceae.
- aspera* L., rauhe, 4. f. w. Westindien.
- hispida* W., steifhaarige, 4. f. t. Mexico.
- oligosperma* Sims, wenigsamige, 4. Kn. t. k. Louisiana.
- stipitata* DC., gestielte, 4. t. Mexico.
- Menyanthes** T., Zottenblume, V. 1., Contortae-Gentianeae.
- americana* G. Don (*trifoliata* Mchx.), amerikanische, 4. Wa. f. Nordamerika.
- trifoliata* L., dreiblättrige (Fieberklee), 4. Wa. f. Europa.
- indica* L., *nymphoides* L. etc. v. *Villarsia indica* etc.
- Menziesia** Sm. (A. Menzies, schottländischer Botaniker und Reisender), VIII. 1., Ericaceae.
- ferruginea* Sm., rostfarbige, 4. f. b. Nordamerika.
- globularis* Salisb. (*Smithii* Mchx., *pilosa* Juss.), kugelblumige, 4. f. b. Nordamerika.
- Bruckenthalii* Baumg. v. *Bruckenthalia spiculiflora* Nachtr. *bryantha* Sw. v. *Bryanthus* Gmelini Nachtr. *coerulea* Sw. (et *empetriformis* Sm.) v. *Phyllodoce taxifolia* etc. *polifolia* Juss. (*Daboecia* DC.) vid. *Daboecia polifolia*.
- Merciera** A. DC., Merciere, V. 1., Campanulaceae.
- tenuifolia* A. DC., feinblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Mercurialis** T., Bingelkraut, XXII. VIII. (IX. II.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

**Mercurialis**

*ambigua* L. fil., zweifelhaftes, ☉. f. Spanien, Portugal.  
*annua* L., jähriges, ☉. f. Europa.

*elliptica* Lam., elliptisches, ♀. k. Balearen, Portugal, Madeira.

*ovata* Hoppe et Stbg., eiförmiges, 4. f. Oesterreich, Krain etc.

*perennis* L., dauerndes, 4. f. Europa.

*tomentosa* L., filziges, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.

**Merendera** MB., Michelsblume, VI. III., Colchicaceae.  
*caucasica* MB., caucasische, 4. Zw. f. Caucasus.

*sobolifera* Fisch. et Mey., sprossende, 4. Zw. f. Nordpersien.

*Bulbocodium* Ram. v. *Colchicum montanum*.

**Meriania** Sw. (M. S. Merian, berühmte Insecten- und Pflanzenmalerin), X. I., Melastomaceae.

*coccinea* Sw., scharlachfarbige, ♀. w. Jamaica.

*leucantha* Sw., weisblumige, ♀. w. Jamaica.

*purpurea* Sw., purpurrothe, ♀. w. Jamaica.

**Mertensia** H. B. K. (Mertens, Director der Handelsschule zu Bremen, ausgezeichnete Botaniker), V. II. (XXIII. I.), Urticaceae.

*iguanea* H. B. K., westindische, ♀. w. Jamaica.

*laevigata* H. B. K., glatte, ♀. w. Mexico.

*pulmonarioides* Roth v. *Platynema pulchrum*. Hinsichtlich der übrigen s. *Gleichenia*.

**Mesembrianthemum** Dill., Zaserblume (Mittagsblume), XII. II., Aizoideae-Ficoideae.

*abbreviatum* Haw., abgekürzte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*acinaciforme* L., säbelblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *longum* Haw.

*acuminatum* Haw., zugespitzte, ♀. k. Cap der gut. H.

*acutum* Haw., spitzige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*adscendens* Haw., aufsteigende, ♀. k. Cap der gut. H.

*aduncum* Haw., hakiggekrümmte, ♀. k. Cap d. gut. H.

*aequilaterum* Haw., gleichseitige, ♀. k. Cap d. gut. H.

*agninum* Haw., lammrachenartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *minus* Haw. γ) *erectiusculum* Haw.

*Aitoni* Jacq. (*papulosum* Ait.), Aiton's, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

*albicaule* Haw., weisstengelige, ♀. k. Cap der gut. H.

*albidum* L., weisliche, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*albinotum* Haw., weismarkirte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*albipunctatum* Haw., weispunktirte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*aloides* Haw., aloeähnliche, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

*alsinefolium* Hort., alsineblättrige, ☉. f. m. ? Neuholl.

*anatomicum* Haw., durchscheinendblasige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *fragile* Haw.

*anceps* Haw., zweischneidige, ♀. k. Cap der guten H.

β) *pallidum* Haw.

*angustum* Haw., schmale, 4. ♀. k. Cap der guten H.

β) *pallidum* Haw. γ) *heterophyllum* Jacq.

*anomalum* W., abweichende, ♀. k. Cap der guten H.



**Mesembrianthemum**

apetalum Ait. (*copticum* Jcq.), kronenlose, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

asperum Haw., rauhe, ♀, k. Cap der guten Hoffn.

β) *coerulescens* Haw.

attenuatum Haw., verdünnte, ♀, k. Cap der gut. H.

aurantium Haw., orangefarbige, ♀, k. Cap der gut. H.

aureum Ait., goldfarbige. ♀, k. Cap der guten Hoffn.

australe Ait. (*demissum* W.), neuseeländische, ♀, k.

Neuseeland.

barbatum L., bärtige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffn.

bellidiflorum L., maßliebenblumige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

β) *subulatum* Mill. γ) *viride* Haw.

bibracteatum Haw., paardeckblättrige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

bicolorum L., zweifarbige, ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

β) *patulum* Haw. γ) *minus* Haw.

bidentatum Haw., zweizähnige, ♀, ♀. Cap der gut. H.

β) *majus* Haw.

bifidum Haw., weispaltige, 4. ♀, k. Cap der gut. H.

bigibberatum Haw., zweihöckerige, ♀, k. Cap d. g. H.

blandum Haw., liebliche, ♀, k. Cap der guten Hoffn.

brachiatum Haw., armförmige, ♀, k. Cap der gut. H.

bracteatum L., deckblättrige, ♀, k. Cap der gut. H.

brevicaule Haw., kurzstengelige, ♀, k. Cap d. gut. H.

brevifolium Ait., kurzblättrige, ♀, k. Cap der gut. H.

bulbosum Haw., zwiebförmige, ♀, k. Cap der gut. H.

caducum Ait., hinfällige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

calamiforme L., federkielartige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

calendulaceum Haw., ringelrosenähnliche, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

calycinum Haw., langkelchige, ♀, k. Cap der gut. H.

canaliculatum Haw. (*repens* Salm.), rinnenförmige, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

candens Haw., weißglänzende, ♀, k. Cap der gut. H.

β) *viridius* Haw.

caninum Haw., hunderachenartige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

canum Haw., weißgraue, 4. ♀, k. Cap der guten H.

capitatum Haw., kopfförmige, ♀, k. Cap der guten H.

β) *ramigerum* Haw.

carinans Haw., kielförmige, 4. ♀, k. Cap der gut. H.

caulescens Haw., langstengelige, ♀, k. Cap der gut. H.

ciliatum Ait., gefranzte, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

clandestinum Haw., heimlichblühende, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

clavatum Jacq., keulstielige, ♀, k. Cap der guten H.

clavellatum Haw., keulblättrige, ♀, k. Neuholland.

β) *minus* Haw. γ) *aggregatum* Haw.

coccineum Haw. (*bicolorum* β. W.), scharlachfarbige, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

β) *acutius* Haw. γ) *minus* Haw.

compactum Ait., dichte, 4. ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

compressum Haw., plattstielige, ♀, k. Cap d. gut. H.

confertum Haw., gedrängte, ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

conspicuum Haw., ansehnliche, ♀, k. Cap der gut. H.

copticum L., coptische, ☉. f. m. Aegypten.

**Mesembrianthemum**

corallinum Thbg., korallenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cordifolium L., herzblättrige, ♂. ♀. k. Cap d. gut. H.

corniculatum L., gehörnte, 4. ♀. k. Cap der gut. H.  
β) isophyllum DC.

cornutum Salm., hornförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

coruscans Haw., schimmernde, ♀. k. Cap der gut. H.

crassicaule Haw., dickstengelige, ♀. k. Cap d. gut. H.

crassifolium L., dickblättrige, ♀. k. Cap der gut. H.

crassuloides Salm. (*crassulinum* Spgl.), crassulaähnliche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

croceum Jacq., safranfarbige, ♀. k. Cap der gut. H.

cruciatum Haw., kreuzblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

crystallinum L., krystallartige (Eiskraut), ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

cultratum Salm., messerförmige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

curtum Haw., kurze, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) majus Haw. γ) politum Haw. δ) minus Haw.  
curvifolium Haw. (*ceratophyllum* W.), gekrümmtblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cylindricum Haw., cylinderförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cymbifolium Haw., cymbelblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cymbiforme Haw., cymbelförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

debile Haw., schwache, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

decipiens Haw., täuschende, 4. ♀. Cap der guten H.

decumbens Haw., niederliegende, ♀. k. Cap d. gut. H.

deflexum Haw., herabgebogene, ♀. k. Cap der gut. H.

defoliatum Haw., entblättrte, ♀. k. Cap der gut. H.

deltoides Haw., deltablättrige, ♀. k. Cap der gut. H.

densum Haw., dichtblättrige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

denticulatum Haw., gezähnelte, 4. ♀. k. Cap d. g. H.  
β) glaucum. γ) candidissimum.

depressum Haw., niedergedrückte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) lividum Haw.

difforme L., ungleichförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

digitiforme Thbg. (*digitatum* Ait.), fingerförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

dilatatum Haw., erweiterte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

diminutum Haw., kleinliche, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

β) cauliculatum Haw.

diversifolium Haw., verschiedenblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung,

β) glaucius Haw. γ) brevifolium Haw. δ) laetevirens Haw. ε) atrovirens Haw.

dolabriforme L., hobelförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

dubium Haw., zweifelhafte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

echinatum L., igelstachelige, ♀. k. Cap der gut. H.

β) album Haw.

edule L., genießbare, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

elegans Jacq., zierliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

effusum Salm (*geminatum* Jacq., *bracteatum* W.), ergossene, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

elongatum Haw., verlängerte, ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.

β) minus Haw. γ) fusiforme Haw.

**Mesembrianthemum**

*emarginatum* L. (*roseum* W.), ausgerandete, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*erectum* Lk., aufrechte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*ermineum* Haw., hermelinrachenartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*expansum* L. (*tortuosum* DC.), ausgestreckte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*falcatum* L., sichelblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*falciforme* Haw., sichelförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

*fastigiatum* Haw., gipfelständige, ♀. k. Cap d. gut. H.

β) *reflexum* Haw.

*felinum* Lam., katzenrachenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*fibulaeforme* Haw., schnallenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*ficiforme* Salm., feigenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*filamentosum* L., fadige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*filicaule* Haw., fadenstengelige, ♀. k. Cap d. gut. H.

*fissum* Haw., gespaltene, 4. ♀. k. Cap der guten H.

*flavum* Haw., hellgelbe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*flexifolium* Haw., biegsamblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *laetevirens* Haw.

*flexile* Haw., biegsame, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*flexuosum* Haw., gebogene, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*floribundum* Haw. (*hispidum* β. W.), blüthenreiche, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

*foliosum* Haw., blattreiche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*forficatum* L., scheerenförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

*formosum* Haw., schöne, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*fragrans* Salm., wohlriechende, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*fulvum* Haw., gelbrothe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*furfureum* Haw., kleiige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*geminatum* Haw., gepaarte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

b) *albiflorum*.

*geniculiflorum* L., gelenkblumige, ☉, ♀. f. m, k. Cap der guten Hoffnung.

*gibbosum* Haw., höckerige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

*glaciale* Haw., Gletscher-Z., ☉. f. k. Cap der gut. H.

*glaucescens* Haw., blaugrünliche, ♀. k. Cap der gut. H.

*glaucinum* Haw., grünlichgraue, ♀. k. Cap der gut. H.

*glaucum* L., meergrüne, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

β) *crassum* Haw.

*glomeratum* L., knaulförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

*gracile* Haw. (*stellatum* Haw.), schlanke, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *gracilius* Haw.

*grandiflorum* Haw., großblumige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*graniforme* Haw., körnerförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*granulicaule* Haw., körnerstengelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*grossum* Ait., dickstengelige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*Haworthii* Donn, W., Haworth's, ♀. k. Cap d. gut. H.

*helianthoides* Ait. (*Candollii* Haw.), sonnenrosenähnliche, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.



**Mesembrianthemum**

heteropetalon W., verschiedenkronige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

heterophyllum Haw., veränderlichblättrige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

hirsutum Haw. (*stellatum* DC., *barbatum*  $\beta$ . W.), rauhaarige, 4.  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

hirtellum Haw., kurzhaarige,  $\S$ . k. Cap der gut. H.

hispidum L., steifhaarige,  $\S$ . k. Cap der gut. Hoffn.

$\beta$ ) platypetalum Haw.

hispidifolium Haw., hackerigblättrige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) roseum Haw.

horizontale Haw., horizontalblättrige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

humifusum Ait., niedergestreckte,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

hybridum Haw., Bastard-Z., 4.  $\S$ . k. Cap der gut. H.

imbricans Haw., ziegeldachblättrige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

imbricatum Haw., ziegeldachförmige,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) medium Haw.  $\gamma$ ) viride Haw.

inaequale Haw., ungleiche,  $\S$ . k. Cap der gut. Hoffn.

inclaudens Hnw., geöffnete,  $\S$ . k. Cap der gut. Hoffn.

incomtum Haw., ungezierte,  $\S$ . k. Cap der gut. Hoffn.

inconspicuum Haw., unansehnliche,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

incurvum Haw., einwärtsgekrümmte,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) dilatans Haw.  $\gamma$ ) pallidus Haw.  $\delta$ ) densifolium Haw.  $\epsilon$ ) roseum W.

inflexum Haw., eingebogene,  $\S$ . k. Cap der gut. H.

insititium W. (*purpureo-croceum* Haw.), safranrothe,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) flavo--croceum Haw.  $\gamma$ ) minus.

intonsum Haw., ungeschorene,  $\S$ . k. Cap der gut. H.

$\beta$ ) album Haw.

junceum Haw., simsensförmige,  $\S$ . k. Cap der gut. H.

lacerum Haw., Salm (*acinaciforme* DC., *gladiatum* Jacq., *dimidiatum* Haw., *carinatum* Vent.), zerschlitzte,  $\S$ . k.

Cap der guten Hoffnung.

laeve Ait., glatte,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

lanceolatum Haw., lanzettblättrige,  $\odot$ . f. m. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) roseum Haw.

latum Haw., breitblättrige, 4.  $\S$ . k. Cap der gut. H.

$\beta$ ) breve Haw.

laxum W., lockerstengelige,  $\S$ . k. Cap der guten H.

lepidum Haw., schülferige,  $\S$ . k. Cap der gut. Hoffn.

leptaleon Haw., schlanke,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffn.

limpidum Ait. (*cuneifolium* Jacq.), durchscheinendwarzige,  $\odot$ . f. m. Cap der guten Hoffnung.

lineolatum Haw., linirte,  $\S$ . k. Cap der guten Hoffn.

$\beta$ ) minus Haw.  $\gamma$ ) laeve Thbg.  $\delta$ ) nitens Haw.

linguaeforme L., zungenförmige, 4.  $\S$ . k. Cap der guten Hoffnung.

$\beta$ ) rufescens Haw.  $\gamma$ ) subcruciatum Haw.  $\delta$ ) prostratum Haw.  $\epsilon$ ) assurgens Haw.

**Mesembrianthemum**

- longispinulum Haw., langstachelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- longistylum DC. (*pallens* Jacq.), langgriffelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- longum Haw., langzungige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.  
 α) depressum Bot. mag. β) declive Haw. γ) angustatum Haw. δ) purpurascens Haw. ε) uncatum Haw. ζ) attollens Haw.
- loratum Haw., riemenblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.
- loreum L., riemenförmige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.  
 β) congestum Haw.
- lucidum Mill., Haw., spiegelnde, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- lunatum W., mondförmige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- lupinum Haw., wolfsrachenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- luteolum Haw., gelbliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- luteo-viride Haw., gelbgrüne, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.
- luteum Haw., gelbe, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- macrorrhizum Haw., grofswurzelige, ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
- maculatum Haw., gefleckte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- magnipunctatum Haw., grofspunktige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 β) unciale.
- marginatum Haw., berandete, ♀. k. Cap d. gut. H.
- maximum Haw., grölste, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- medium Haw., mittlere, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- micans L., schillernde, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- micranthum Haw. (*parviflorum* Jacq.), kleinblumige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- microphyllum Haw., kleinblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- Milleri W., Miller's, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- minimum Haw., kleinste, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
- minutum Haw., zwergige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
- molle Ait., weiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- moniliforme Thbg., armbandförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mucronatum Haw., weichspitzige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mucroniforme Haw., spitzenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- multiflorum Haw., vielblumige, ♀. k. Cap d. gut. H.  
 β) minus Haw. γ) rubrum Haw. δ) patens Haw. ε) nitens Haw.
- muricatum Haw., weichstachelige, ♀. k. Cap d. g. H.  
 β) minus Haw.
- murinum Haw., mäusezahnartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- musculinum Haw., kleinzahnige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mustelinum Haw., Salm, wieselzahnartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mutabile Haw. (*filamentosum* DC., *forficatum* Jacq.). veränderliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- nitidum Haw. (*pruinatum* Thbg., *brachiatum* DC.), glänzende, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- nobile Haw., edle, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

**Mesembrianthemum**

noctiflorum L., nachtblumige, ♀. k. Cap der gut. H.

β) stramineum Haw. γ) elatum Haw.

nodiflorum L., knotenblumige, ☉. f. m. Aegypten, Italien.

nuciforme Haw., nussförmige, 4. k. Cap d. gut. H.

obconellum Haw., verkehrtkegelförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obcordellum Haw., verkehrtherzförmige, 4. ♀. Cap der guten Hoffnung.

obliquum W. (*scalpratum* Haw.), schiefblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obsubulatum Haw., verkehrtpfriemenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obtusum Haw., stumpfblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

octophyllum Haw., achtblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) longiusculum. γ) roseum.

pallens Ait. (*expansum* DC.), bleichblumige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

pallescens Haw., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

parviflorum Haw., schmalblumige, ♀. k. Cap d. g. H.

parvifolium Haw., schmalblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.

patens W., abstehende, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

patulum Haw., weitabstehende, ♀. k. Cap d. gut. H.

perfoliatum Mill., Haw., durchwachsene, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) monacanthum Bradl.

perpusillum Haw., niedrige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

perviride Haw., dunkelgrüne, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

pilosum Haw., gelbhaarige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

pinnatifidum L., fiederspaltige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

pisiforme Haw., erbsenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

polyanthes Haw., häufigblumige, ♀. k. Cap d. gut. H.

polyphyllum Haw., vielblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

pomeridianum L., nachmittägige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

β) Andrewsii.

praepinque Haw., feiste, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

procumbens Haw., liegende, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

productum Haw., langkelchige, ♀. k. Cap d. gut. H.

pubescens Haw., weichhaarige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

puberulum Haw., feinhaarige, ♂. k. Cap der gut. H.

pugioniforme L., dolchblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

β) carneum Haw. γ) purpureum Haw. δ) bienne Haw.

pulchellum W. (*canescens* Haw.), schöne, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) revolutum Haw.

pulverulentum Haw., bestäubte, ♀. k. Cap der gut. H.

punctatum Haw., punktirte, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

puniceum Jacq., hochrothe, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

purpurascens Salm, purpurfarbige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

purpureo-album Haw., weißpurpurfarbige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

pustulatum Haw., blättrige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.



## Mesembrianthemum

pygmaeum Haw., zwergstrauchige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

quadrifidum Haw., vierspaltige, ⚭. k. Cap der gut. H.

radiatum Haw., strahlige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

ramulosum Haw., ästige, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

rectum Haw., gerade, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

reflexum Haw., zurückgebogene, ⚭. k. Cap d. gut. H.

relaxatum Haw., schlaffe, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

reptans Ait., kriechende, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

retroflexum Haw., zurückgeschlagene, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rigidicaule Haw., starrstengelige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

rigidum Haw., starre, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

robustum Haw., starke, 4. ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

roseum Haw., rosafarbige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

β) lineare Thbg. γ) album.

Rossi Haw., Ross's, ⚭. k. Van-Diemens-Land.

rostellum Haw., kleinschnabelige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rostratum Haw., schnabelförmige, 4. ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rubricaule Haw., rothstengelige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

β) densius Haw. γ) subvirens Haw.

rubrocinctum Haw., rothrandige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

β) compressum Haw. γ) tenerum Haw.

rufescens Haw., fuchsrothe, 4. ⚭. k. Cap der gut. H.

Salmii Haw., Salm's, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

β) semicruciatum Salm. γ) angustifolium Haw.

salmoneum Haw., lachsfarbige, ⚭. k. Cap der gut. H.

sarmentosum Haw., wurzelrankige, ⚭. k. Neuholland.

scabrum L., scharfe, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

β) purpureum Haw.

scapigerum Haw., schafttragende, 4. ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

Schollii Salm. (*aduncum* Jacq., *racemosum* Haw.), Scholl's, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

semicylindricum Haw., halbrundblättrige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

semidendatum Salm., halbgezahnte, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

serratum L., sägezähnige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

serrulatum Haw., feinzähnige, ⚭. k. Cap der gut. H.

β) viridius Haw.

sessiliflorum Ait., stiellosblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

β) album Haw.

simile Haw., ähnelnde, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

spathulatum W., spatelförmige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

speciosum Haw., prächtige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

spectabile Haw., ansehnliche, ⚭. k. Cap der gut. H.

spiniforme Haw., stachelästige, ⚭. k. Cap der gut. H.

β) subaduncum Haw.

spinosum L., dreistachelige, ⚭. k. Cap der guten H.

spinuliferum Haw. (*sordidum* DC.), blätterstachelige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

splendens L., glänzende, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

**Mesembrianthemum**

stelligerum Haw., sternbartige, ⚥. k. Cap der gut. H.  
 stenum Haw., schmale, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.  
 stipulaceum L., zwischenblättrige, ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

stramineum W. (*tricolor* Haw.), strohfarbige, ⚥. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

sriatum Haw., gestreifte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.  
 β) pallens.

strictum Haw., steife, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

strumosum Haw., kropfige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

subcompressum Haw., platte, ⚥. k. Cap der gut. H.

β) minus Haw.

subglobosum Haw. (*capillare* Thbg.), kugelblättrige, 4.  
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

subhispidum Haw., feinhakige, ⚥. k. Cap der gut. H.

subincanum Haw., grauhaarige, ⚥. k. Cap der gut. H.

subrostratum W. (*rostratoides* Haw.), schnabelblättrige,  
 4. ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

subulatum Haw. (*bellidiflorum* DC.), pfriemenförmige,  
 4. ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

sulcatum Haw., gefurchte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

surrectum Haw., aufgerichtete. ⚥. k. Cap der gut. H.

β) brevifolium Haw.

taurinum Haw., oxsenhörnige, ⚥. k. Cap der gut. H.

tenellum Haw., zärtliche, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tenue Haw., dünne, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

tenuiflorum Jacq., dünnblumige, ⚥. k. Cap d. gut. H.

tenuifolium L., dünnblättrige, ⚥. k. Cap der gut. H.

β) erectum Haw.

teretifolium Haw., rundblättrige, 4. ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

teretiusculum Haw., rundliche, 4. ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

testaceum Haw., scherbengelbe, ⚥. k. Cap der gut. H.

testiculare Ait., hodenförmige, 4. ⚥. k. Cap d. g. H.

tigrinum Haw., getigerte, 4. ⚥. k. Cap der gut. H.

torquatum Haw., gedrehte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tortuosum L., gewundene, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tricolorum W., dreifarbige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

Tripolium L., asterblättrige, ♂. ⚥. k. Cap der g. H.

truncatellum Haw., kurzstämmige, 4. ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

tuberculatum Mill., DC., kleinhöckerige, 4. ⚥. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

tuberosum L., knollige, ⚥. Kn. k. Cap der gut. H.

tumidulum Haw., angeschwollene, ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

β) minus Haw.

umbellatum L., doldige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

β) anomalum W.

umbelliflorum Jacq., doldenblumige, ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

uncinatum Haw., hakiggekrümmte, ⚥. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

uncinellum Salm, kurzhakige. ⚥. k. Cap der gut. H.

unidens Haw., einzahnige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

uvaeforme Haw., traubenförmige, 4. ⚥. k. Cap d. g. H.

vaginatum Haw., scheidige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

β) parviflorum Haw.

**Mesembrianthemum**

*unidens* Haw., einzahnige, f. k. Cap der gut. Hoffn.  
*variabile* Haw., veränderliche, f. k. Cap der gut. H.

β) *laevius* Haw.

*varians* Haw., ändernde, f. k. Cap der guten Hoffn.  
*verruculatum* L., kleinwarzige, f. k. Cap der gut. H.  
 β) *Candollii* Loud.

*versicolor* Haw., verschiedenfarbige, f. k. Cap der guten Hoffnung.

*villosum* L., zottige, f. k. Cap der guten Hoffn.

*violaceum* DC., violette, f. k. Cap der guten Hoffn.

*virens* Haw., grünende, f. k. Cap der guten Hoffn.

*virescens* Haw., grünliche, f. k. Cap der guten Hoffn.

*virgatum* Haw., ruthenförmige, f. k. Cap d. gut. H.

*viride* Haw., grünblättrige, f. k. Cap der gut. Hoffn.

*viridiflorum* Ait., grünblumige, f. k. Cap der gut. H.

*vulpinum* Haw., fuchsrachenartige, 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.

*glabrum* Ait. v. *Hymenogyne glabra*.

**Mespilus** T., Mispel, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

*germanica* L., gemeine, f. f. Europa, Mittelasien.

a) *sylvestris* Mill. β) *stricta* DC. γ) *diffusa* DC.

*Smithii* DC. (*grandiflora* Sm., *lobata* Poir.), Smith's, f. f. ? Levante.

*Amelanchier* L. (et *canadensis* L.) etc. v. *Amelanchier vulgaris*, *Botryapium* etc. *bengalensis* Hort. v. *Photinia dubia*. *Chamaemespilus* L. v. *Sorbus Chamaemespilus*. *Cotoneaster* L. etc. vid. *Cotoneaster vulgaris* etc. *cuneifolia* Ehrh. etc. v. *Crataegus punctata* etc. *Cuila* Hamilt. (et *japonica* Thbg.) v. *Eriobotrya elliptica* et *japonica*.

**Messerschmidia** L. (Messerschmid aus Danzig, welcher Sibirien in botanischer Hinsicht bereiste), V. I., Asperifoliaceae.

*hirsutissima* R. et S., rauhhaarige, f. w. Westindien.

*laurifolia* R. et S., lorbeerblättrige, f. Sch. w. Westindien.

*scandens* R. et S., kletternde, f. Sch. w. Peru.

*volubilis* R. et S., windende, f. Sch. w. Jamaica.

*Arguzia* L. v. *Tournefortia Arguzia*.

**Metalasia** RB., Metalasie, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*aurea* RB., goldfarbige, f. t. Cap der guten Hoffn.

*divergens* D. Don, divergirende, f. t. Cap d. gut. H.

*fastigiata* RB., gipfelständige, f. t. Cap der gut. H.

*mucronata* RB., stachelspitzige, f. t. Cap der gut. H.

*muricata* RB., weichstachelige, f. t. Cap der gut. H.

*phylicoides* D. Don, phylikaähnliche, f. t. Cap der guten Hoffnung.

*seriphioides* RB., seriphiumähnliche, f. t. Cap der guten Hoffnung.

**Metastelma** RB., Glockenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.

*parviflorum* RB., kleinblumiges, f. Sch. w. Westindien.

**Metrosideros** G., Eisenmaß, XII. I., Myrtaceae.

*angustifolius* Sm., schmalblättriges, f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*glomulifer* Sm., knäulförmiges, f. f. t. Cap der guten Hoffnung.



**Metrosideros**

verus Lindl., wahres,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*asperus* Mack. Cat. v. *Callistemon rugulosus. capitatus* Sm. (et *ciliatus* Sm., *corifolius* Vent. etc.) v. *Stenospermum capitatum* etc. *costatus* G. (et *hispidus* Sm. (*hirsutus* Andr., *anomalus* Vent.) v. *Angophora lanceolata* et *cordifolia* Nachtr. *floribundus* Sm. v. *Acmena floribunda*. Hinsichtlich der übrigen s. *Callistemon*.

*Metroxylon Sagus* Rottb. etc. v. *Sagus Rumphii* etc.

**Meum** T., Bärwurz, V. II., Umbelliferae.

*athamanticum* Jacq., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

*Mutellina* G., Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*sibiricum* Spgl., sibirische, 4. f. Sibirien.

*Bunius* Jacq. (*heterophyllum* Mch.) vid. *Ptychotis heterophylla*. *Foeniculum* Spgl. vid. *Foeniculum officinale. inundatum* Spgl. v. *Helosciadium inundatum*.

**Meyera** Schreb. (G. A. Meyer, wenig bekannter älterer deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*sessilis* Sw., ungestieltblumige, 4. w. Westindien.

*orientalis* D. Don v. *Caesulia axillaris*.

**Michauxia** L'Her. (A. Michaux, berühmter französischer Botaniker und Reisender), VIII. I., Campanulaceae.

*campanuloides* L'Her. (*strigosa* P.), glockenblumenähnliche, ♂. k. Syrien.

*laevigata* Vent., kahlstengelige, ♂. k. Persien.

*Michelaria bromoides* Dum. v. *Bromus arduennensis*.

**Michelia** L. (P. A. Micheli, berühmter italienischer Botaniker), XIII. VI., Magnoliaceae.

*Champaca* L., wohlriechende,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

**Miconia** R. et P. (D. Micon, spanischer Botaniker), X. I., Melastomaceae.

*Acinodendron* D. Don, großstrauchige,  $\frac{1}{2}$  w. Westind.

*angustata* D. Don, verschmälerte,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad.

*decussata* D. Don, kreuzständige,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.

*grandifolia* D. Don, großblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Trinidad.

*impetolaris* D. Don, stiellosblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Westind.

*laevigata* D. Don, geglättete,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*longifolia* G. Don, langblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*prasina* G. Don, grasgrüne,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.

*purpurascens* D. Don, purpurfarbige,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.

*rubescens* D. Don, rötliche,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*semicrenata* D. Don, halbgekerbte,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

*tenuifolia* D. Don, feinblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

*tetrandra* D. Don, viermännige,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

*trinervia* D. Don, dreinervige,  $\frac{1}{2}$  w. Jamaica.

**Micranthemum** Mchx., Kleinblümchen, II. I., Primulaceae.

*orbiculatum* Mchx., rundblättriges, 4. k. Carolina.

**Micranthes** Haw. v. *Saxifraga*.

**Micranthus** Poir., Schmalblümchen, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*cochinchinensis* Lour., cochinchinesisches, 4. Sch. w. China, Cochinchina.

*appositifolius* Wendl. v. *Phaylopsis parviflora*.

- Microcale** Lk. et Hffg., Genzianelle, IV. I., Contortae-Gentianeae.  
 filiforme Lk., fadenförmige, ☉. f. Nord- und Westdeutschland, Frankreich etc.  
 pusilla (DC.), niedrige, ☉. f. Westeuropa.
- Microchloa** RB., Schmalspelzchen, III. II., Gramineae.  
 setacea RB., borstenförmiges, ☉. 4. f. k. Ostindien, Neuholland.
- Microderis** DC., Kurzhals, XIX. I., Cichoriaceae.  
 rigens DC. (*Crepis rigens* Ait.), starrer, 4. k. Azoren.
- Microlaena** RB., Schmalrispe, IV. II., Gramineae.  
 stipoides RB., stipaähnliche, 4. k. t. Neuholland.
- Microloma** RB., Schuppenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.  
 lineare RB., gleichbreitblättriges, ☿. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 sagittatum RB., pfeilblättriges, ☿. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Micromeria Juliana** Benth, *Tencriffae* Benth etc. vid. *Satureja Juliana* etc.
- Micropera** Lindl., Säckelstendel, XX. I., Orchideae.  
 Banksii Hook., Bank's, 4. Kn. t. w. Neuzeeland.  
 media RB., mittlerer, 4. Kn. t. w. Neuholland.  
 parviflora RB., kleinblumiger, 4. Kn. t. w. Neuholland.
- Micropetalum lanuginosum** P. v. *Spergulastrum lanuginosum*.
- Micropus** L., Falzblume, XIX. IV., Compositae-Helichryseae.  
 bombycinus Lag. (*erectus* Guss., *discolor* P.), wollige, ☉. f. Spanien, Sicilien.  
 californicus Fisch. et Mey., californische, ☉. f. Neu-Californien.  
 erectus L., aufrechte, ☉. f. Südeuropa.  
 pygmaeus Dsf., zwergige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.  
 supinus L., liegende, ☉. f. Südeuropa.
- Microseris** D. Don, Hook., Zwergsalat, XIX. I., Cichoriaceae.  
 pygmaea Hook et Arn., chilesischer, ☉. f. Chili.
- Microstephium** Less., Kleinkrönchen, XIX. IX., Compositae-Corymbiferae.  
 niveum Less., schneeweisses, 4. ☿. k. Cap d. gut. H.
- Microstylis** Nutt., Kleingriffel, XX. I., Orchideae.  
 excavata Lindl., ausgehöhlter, 4. w. Mexico.  
 ophioglossoides Nutt., natterzungenähnlicher, 4. Kn. f. b. k. t. Nordamerika, Mexico.  
 β) mexicana Lindl.  
 versicolor Lindl., verschiedenfarbiger, 4. w. China.
- Microtea** Sw., Kleinachene, V. II., Aizoideae-Phytolacceae,  
 debilis Sw., schwache, ☉. w. m. f. Jamaica.  
 maypurensis G. Don, maypurische, ☉. w. m. f. Westindien, Südamerika.
- Microtis** RB., Kleinöhrchen, XX. I., Orchideae.  
 alba RB., weisses, 4. Kn. t. w. Neuholland.  
 pallida Lindl., bleiches, 4. w. Sylhet.  
 parviflora RB., kleinblumiges, 4. Kn. t. w. Neuholl.

**Microtis**

*pulchella* RB., schönes, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Miersia** Lindl., Miersie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Gilliesiae).

*chilensis* Lindl., chilesische, 4. Zw. t. Chili.

**Mikania** W. (J. Mikan, Professor der Botanik zu Prag), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*amara* W., bittere, 5. Sch. w. Guiana, Cuba.

*chenopodifolia* W., gänsefußblättrige, 4. Sch. w. Guiana.

*Guaco* Humb., Guaco-M., 4. Sch. w. Südamerika.

*hastata* W., spontanblättrige, 5. Sch. w. Jamaica, Cuba.

*Houstoni* W., Houston's, 5. Sch. w. Neuspanien, Jamaica.

*opifera* Mart., opiumgebende, 4. Sch. w. Brasilien.

*orinocensis* H. B. K., Orinoco-M., 5. Sch. w. Südamerika.

*scandens* W., klimmende, 5. Sch. t. Carolina, Westind.

*suaveolens* H. B. K., wohlriechende, 5. Sch. w. Südamer.

**Milium** L., Milisgras, III. 11., Gramineae.

*effusum* L., ausgebreitetes, 4. f. Europa, Sibirien.

β) *confertum* Mill.

*microspermum* Lag., kleinsamiges, 6. f. Mexico.

*vernale* MB., Frühlings-M., 4. f. Taurien, Caucasus.

*arundinaceum* Sm. (*frutescens* Sbr.), *coerulescens* Dsf.,

*multiflorum* Cav. (*microspermum* Hort.) etc. vid.

*Piptatherum frutescens* etc, *filiforme* Roxb. vid.

*Digitaria Roxburghii*. *gallecicum* R. et S. v. *Airopsis*

*Candollei*. *lendigerum* Schreb. v. *Gastridium*

*australe*. *punctatum* L. vid, *Oedipachne punctata*.

*tenellum* Cav. v. *Airopsis globosa*. *velutinum* DC.

v. ?*Digitaria ciliaris*. *villosum* Sw. vid. *Monachne*

*unilateralis*.

**Millea** Cav. (Julein Milla, Inspector des königl. Gartens zu Madrid), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*biflora* Cav., zweiblumige, 4. Kn. t. k. Mexico.

*uniflora* Grah., einblumige, 4. Zw. t. k. Buenos-Ayres.

**Milleria** L. (Phil. Miller, berühmter engl. Gärtner), XIX. 1v., Compositae-Corymbiferae.

*biflora* L., zweiblumige, 6. w. m. f. Südamerika.

*quinqueflora* L. (*dichotoma* Cav., *maculata* Mill.), fünfblumige, 6. w. m. f. Südamerika.

*angustifolia* Cav. et *Contrayerva* Cav. vid. *Flaveria angustifolia* etc.

**Millina** Cass., DC., Milline, XIX. 1., Cichoriaceae.

*hyoseroides* DC., hyoserisähnliche, 4. f. b. k. Creta.

*leontodontoides* Cass., löwenzahnähnliche, 4. f. b. k. Sicilien.

**Millingtonia** Roxb. (T. Millington, Professor zu Oxford), II. 1., ?Sapotaceae-Oleinae.

*pinnata* Roxb., gefiederte, 5. w. Ostindien.

*simplicifolia* Roxb., einfachblättrige, 5. w. Ostindien.

**Miltonia spectabilis** Lindl. v. *Macrochilus* Fryanus.**Mimetes** Salisb., RB., Mimenstrauch, IV. 1., Proteaceae.

*cucullata* RB., kappenförmiger, 5. t. Cap der gut. H.

*divaricata* RB., ausgesperrter, 5. t. Cap der guten H.

*Hartogii* RB., Hartog's, 5. t. Cap der guten Hoffn.

*Hibbertii* RB., Hibbert's, 5. t. Cap der guten Hoffn.



**Mimetes**

*hirta* RB., kurzhaariger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
*palustris* Kn., sumpfliebender, ♀. t. Cap der gut. H.  
*pauciflora* RB., wenigblumiger, ♀. t. Cap der gut. H.  
*purpurea* RB., purpurfarbiger, ♀. t. Cap der gut. H.  
*thymelaeoides* RB., thymelaeaähnlicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*vacciniifolia* Sw., heidebeerenblättriger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung,

**Mimosa** T., Sinnpflanze, VIII. 1. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

*abstergens* Roxb., dichtstachelige, ♀. w. Ostindien.

*asperata* L., rauhe, ♀. ♀. w. Westindien.

*Barclayana* Hort., Barclay's, ♀. w. ?

*brasiliensis* Spgl., brasilianische, ♀. w. Brasilien.

*canescens* W., weißgrauliche, ♀. w. Guinea.

*casta* L., keusche, ♀. w. Ostindien.

*ciliata* W., gefranzte, ♀. w. Brasilien.

*dormiens* H. B. K., schlafende, ♀. w. Südamerika.

*ferruginea* Rottl., rostfarbige, ♀. w. Ostindien.

*floribunda* W., blüthenreiche, ♀. w. Cumana.

*Habbas* Delil., ägyptische, ♀. ♀. w. Aegypten.

*hispidula* Humb., kackerige, ♀. w. Trinidad.

*latispinosa* Lam., breitedornige, ♀. ♀. w. Madagascar.

*marginata* DC. (*mexicana*, *prostrata* et *scandens* Hort.), herandete, ♀. w. Südamerika.

*microcephala* H. B. K., kleinköpfige, ♀. w. Südamerika.

*obtusifolia* W., stumpfblättrige, ♀. w. Brasilien.

*pigra* L., verschiedenstachelige, ♀. ♀. w. Westindien.

*polydactyla* Humb., vielfingerige, ♀. w. Brasilien.

*pudibunda* W., züchtige, ♀. w. Brasilien.

*pudica* L., schamhafte, ♀. ♂. ☉. w. Südamerika.

*rubicaulis* Lam., brombeerstengelige, ♀. ♀. w. Ostind.

*sensitiva* L., empfindsame, ♀. w. Brasilien.

*stipulata* H. C., zwischenblättrige, ♀. w. Ostindien.

*strigosa* W., striegelige, ♀. w. Südamerika.

*viscida* W., schmierige, ♀. w. Brasilien.

*viva* L., reizbare, ♂. 4. w. Jamaica.

*Entada* L. (et *polystachya* L. et *scandens* Sw. etc.)

vid. *Entada monostachya*, *polystachya*, *Gigalobium*

etc. *fagifolia* L., *fagifolia* Jacq. (et *Houstoni* L'Her.

et *Inga* L. etc. v. *Inga Bourgoni*, *laurina*, *Houstoni*,

*vera* etc.) *glandulosa* Mchx. v. *Darlingtonia glutinosa*.

*micrantha* Vahl v. *Lagonychium Stephanianum*.

*natans* Vahl etc. v. *Desmanthus natans* etc.

*piliflora* Sw. v. *Prosopis juliflora*. *pterocarpa* Lam.

vid. *Gagnebina axillaris*. *quadrivalvis* L. etc. vid.

*Schrankia aculeata* etc.

Hinsichtlich der übrigen s. *Acacia*.

**Mimulus** L., Gauklerblume, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

*alatus* Ait., geflügelte, 4. f. Nordamerika.

*andicola* H. B. K., Andes-G., 4. k. Peru, Chili.

*cardinalis* Dougl., scharlachrothe, ♂. 4. k. f. b. Nordwestliches Amerika, Chili.

*floribundus* Lindl., blüthenreiche, ☉. f. Nordamerika.

*glutinosus* Wendl. (*aurantiacus* Curt.), klebrige, ♀. k. t. ? Californien.

*guttatus* Fisch., DC. (*aureus* Nutt.), betropfte, 4. f. k. Nordwestliches Amerika, Mexico.

**Mimulus**

*lanatus* Pursh, wollige, 4. f. b. k. Nordamerika.

*Lewisii* Pursh, Lewis's, 4. f. Nordamerika.

*luteus* L., gelbe, 4. k. f. b. Chili.

b) *rivularis* Lindl. c) *Wilsoni* D. Don. d) *Younganus* Lodd.

*parviflorus* Lindl., kleinblumige, ☉. f. Chili.

*propinquus* Lindl., verwandte, 4. f. Nordamerika.

*ringens* L., blaublühende, 4. f. k. Nordamerika.

*roseus* Lindl., rosenrothe, 4. k. f. b. Neucalifornien, Chili.

*variegatus* Dougl., bunte, 4. k. Chili.

Hybriden von *luteus*, *variegatus*, *cardinalis* etc. erzogen: *bifrons*, *Harrisonianus* Paxton, *quinquevulnerus*, *roseo-cardinalis* Hens. (*Hodsoni* Hort. angl.) *Smithii* Lindl. etc.

*perfoliatus* Mut. v. *Leucocarpus alatus*.

**Mimusops** L., Spitzenblume, VIII. 1., Sapotaceae.

*cyanocarpa* Cunn., blaufrüchtige, ♀. ♀. w. t. Neuholl.

*dissecta* Spgl., schlitzkronige, ♀. w. Südseeinseln.

*Elengi* L., *Elengi-S.*, ♀. w. Ostindien, Molucken.

*hexandra* Roxb., sechsmännige, ♀. w. Ostindien.

*Kauki* L. (*obtusifolia* Lam.), *Kauki-S.*, ♀. w. Ostindien. Neuholland.

*parvifolia* RB., kleinblättrige, ♀. t. w. Neuholland.

**Minuartia** Loefl. (Minuart, ein spanischer Apotheker),

III. 11., Portulacaceae-Paronychieae.

*campestris* L., Feld-M., ☉. f. Spanien.

*dichotoma* L., zweizinkige, ☉. f. Spanien.

*montana* L., Berg-M., ☉. f. Spanien.

**Mirabilis** L., Wunderblume, V. 1., Nyctagineae.

*dichotoma* L., zweizinkige, 4. Kn. f. k. Mexico.

*hybrida* Lepellet, Bastard-W., 4. Kn. f. m. k. Neu-Granada.

*Jalapa* L., gemeine (Jalape), 4. Kn. f. m. k. Ost- und Westindien.

a) *flava*. b) *alba*. c) *rubro-alba*. d) *rubra*. e) *rubro-flava*.

*longiflora* L., langblumige, 4. Kn. f. m. Mexico.

b) *carnea* J. Cree. c) *violacea* J. Cree.

*odorata* Bernh., starkriechende, 4. Kn. f. m. ? Südamerika.

*suaveolens* Humb. B. K., lieblichriechende, 4. Kn. f. m. k. Mexico.

*aggregata* Cav. vid. *Allionia aggregata*. *corymbosa* Cav. etc. v. *Oxybaphus glabrifolius* etc.

**Mirbelia** Sm. (C. F. B. Mirbel, französischer Botaniker),

X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*Baxteri* Mack, Cat., Baxter's, ♀. t. Neuholland.

*dilatata* RB., verbreiterte, ♀. t. Neuholland.

*grandiflora* Bot. mag., großblumige, ♀. t. Neuholland.

*pungens* Cunn., stechende, ♀. t. Neuholland.

*reticulata* Sm., netzförmige, ♀. i. Neusüdwallis.

*speciosa* Sieb., prächtige, ♀. t. Neuholland.

*triternata* Hort. Hügel., dreifach dreizählige, ♀. t. Neuholland.

**Mitchella** L. (Mitchell, ein englischer Arzt und Botaniker, welcher Virginien bereiste), IV. 1., Rubiaceae.

*repens* L., kriechende, ♀. f. b. Nordamerika.

- Mitella** L., Bischofskapsel, X. II., Saxifrageae.  
*cordifolia* Lam., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.  
*diphylla* L., zweiblättrige, 4. f. Nordamerika.  
*nuda* L. (*reniformis* Lam.), nachtschattige, 4. f. Nordamerika.  
*pentandra* Hook., fünfmännige, 4. f. Nordamerika.  
*prostrata* Mchx., gestreckte, 4. f. Nordamerika.  
*trifida* Grah., dreispaltige, 4. f. Nordamerika.  
*grandiflora* Pursh. v. *Tellima grandiflora*.
- Mitrasacme** LaBill., Mitrasacme, IV. I., Contortae-Gentianeae.  
*canescens* RB., weißgrauliche, 4. t. Neuholland.  
*polymorpha* RB., vielgestaltige, 4. t. Neuholland.  
*serpyllifolia* RB., quendelblättrige, 4. t. Neuholland.
- Mniarum** Forst., Mooskraut, I. II., Portulaceae-Paronychieae (-Scleranthaeae).  
*biflorum* Forst., zweiblumiges, 4. k. Neuzeeland.
- Modecca** Jacq. (indianischer Name), XXII. v. (XVI. v.), Passifloreae.  
*dubia* Roxb., zweifelhafte, 5. Sch. w. Ostindien.  
*lobata* Jacq., gelappte, 5. Sch. w. Westafrika.  
*trilobata* Roxb., dreilappige, 5. Sch. w. Ostindien.  
*tuberosa* Roxb., knollige, 5. Sch. Kn. w. Ostindien.
- Möhringia** L. (P. H. G. Möhring, deutscher Arzt und Naturforscher), VIII. II., Caryophyllaceae-Alsineae.  
*muscosa* L., moosartige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
*β) sedoides* Balb.  
*polygonoides* M. et K., knöterichähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*Ponae* Fenzl, Pona's, 4. f. Südtirol.  
*villosa* Fenzl, zottige, 4. f. Oberkrain.  
*trinervia* Clairv. v. *Arenaria trinervia*.
- Moenchia** Ehr. (Conrad Mönch, Professor der Botanik zu Marburg, IV. IV., Caryophyllaceae-Alsineae.  
*cerastoides* Spgl., hornkrautähnliche, 6. f. Schottland.  
*erecta* G.M.S. (*quaternella* Ehrh., *glauca* P.), aufrechte, 6. f. Mitteleuropa, England.
- Mogiphanes** Mart., Drüsenamaranth, V. I., Aizoideae-Amaranthaeae.  
*Jacquini* Schrad., Jacquin's, 6. ♂. w. Brasilien.  
*virgata* Schrad. (*brasiliensis* Mart.), ruthenförmiger, 6. ♂. w. Brasilien.
- Mohria** Sw. (M. H. Mohr, berühmter Kryptogamolog, Professor zu Kiel), XXIV. I., Osmundaceae.  
*turifraga* Sw. (*crenata* Desv.), gekerbte, 4. w. Cap der guten Hoffnung, Mascarenas.
- Molina** *parviflora* R. et P. v. *Baccharis parviflora*.
- Molineria** Coll. (J. Molinerio, Director des botanischen Gartens zu Turin), VI. I., Narcisseae-Hypoxideae.  
*plicata* Coll., gefaltete, 4. w. Java.
- Molinia** Schrk. (J. J. Molina, ein Spanier, welcher Chili bereiste), III. II., Gramineae.  
*altissima* Lk. (*litoralis* Host., *Enodium sylvaticum* Lk.), hohe, 4. f. Europa.  
*coerulea* Mch. (*varia* Schrk.), blaue, 4. f. Europa.  
*canescens* Roxb. v. *Cupania canescens*. *capillaris* Hartm. v. *Glyceria distans*. *serotina* M. et K. v. *Diplachne serotina*.



*Mollia aristata* Ait. etc. v. *Polycarpaea aristata* etc.

**Mollugo** L., Weichling, III. II., Portulacaceae - Paronychieae.

*dichotoma* Schrk. (*Schrankii* Sering?), zweizinkiger, ☉. f. w. Brasilien.

*hirta* Thbg., kurzhaariger, 4. f. Cap der guten H.

*Linkii* DC. (*triphylla* Lk.), Link's, ☉. f. w. Brasilien.

*oppositifolia* L., gegenblättriger, ☉. f. w. Ostindien.

*verticillata* L., wirtelblättriger, ☉. f. Virginien.

**Molopospermum** Koch., Schwiendolde, V. II., Umbelliferae.

*cicutarium* DC. (*peloponnesiacum* Koch), cicutaähnliche, 4. f. Süd- und westeuropäische Alpen.

**Moluccella** L., Trichterkelch, XIV. I., Labiatae.

*laevis* L., glatter, ☉. f. Kleinasien, Syrien.

*Marrubiastrum* Steph., andornähnlicher, ☉. f. Südsibirien.

*tuberosa* Pall., knolliger, 4. Kn. f. Südsibirien.

*spinosa* L. v. *Chasmonia incisa*.

**Momordica** T., Balsamkürbis, XXI. X., Cucurbitaceae.

*Balsamina* L., gemeiner, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

*Charantia* L., gurkenartiger, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

*cylindrica* L., cylinderförmiger, ☉. Sch. w. m. China, Ceylon.

*dioica* Roxb., zweihäusiger, 4. Sch. w. Ostindien.

*mixta* Roxb., gemischter, 4. Sch. w. Ostindien.

*muricata* W., weichstacheliger, ♂. Sch. w. Ostindien.

*operculata* L., deckelfrüchtiger, ☉. Sch. w. m. Südamerika.

*senegalensis* Lam., senegal'scher, ♂. Sch. w. Westafrika, Brasilien.

*umbellata* Roxb., doldenblumiger, 4. Sch. w. Ostind.

*Elaterium* L. v. *Ecballion* *Elaterium* Nachtr.

*Luffa* L. v. *Luffa aegyptiaca*.

**Monachanthus** Lindl., Mönchsstendel, XX. I., Orchideae.

*discolor* Lindl., ungleichfarbiger, 4. w. Demerara.

β) *viridiflorus* Hook.

*fimbriatus* Gard., gefranzter, 4. w. Brasilien.

*viridis* Lindl., grüner, 4. w. Brasilien.

**Monachne** P. B., Monachne, III. II., Gramineae.

*unilateralis* P. B., einseitige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung, Westindien, Südamerika.

**Monanthes polyphylla** Haw. v. *Sempervivum monanthon*.

**Monarda** L. (N. Monardez, Arzt zu Sevilla im XVI. Jahrh.), II. I., Labiatae.

*affinis* Lk. (*clinopodia* W.), ähnelnde, 4. f. Nordamerika.

*altissima* W., hohe, 4. f. Nordamerika.

b) *pallida*.

*aristata* Nutt., gegrannte, 4. f. Nordamerika.

*Bradburyana* Beck., Bradbur's, 4. f. Nordamerika.

*ciliata* L., gefranzte, 4. f. b. Virginien.

*citriodora* Cervant., citronenduftende, 4. k. Mexico.

*clinopodia* L. (*glabra* Lam.), wirbelborstenähnliche, 4. f. Nordamerika.

**Monarda**

- didyma L. (*purpurea* Lam., *coccinea* Mchx.), scharlachrothe, 4. f. Nordamerika.  
 fistulosa L., röhrlige, 4. f. Nordamerika.  
     β) *menthaefolia* Grah. (*fistul. macul.* Hook.).  
 glabrescens Rchb., kahle, 4. f. Nordamerika.  
 gracilis Pursh, schlanke, 4 f. b. k. Südcarolina.  
 hirsuta Pursh (*ciliata* Mchx.), rauhhaarige, 4. f. b. Virginien.  
 involucrata Wender., großshüllige, 4. f. ?Hybride, Nordamerika.  
 Kalmiana Pursh, Kalm's, 4. f. Nordamerika.  
 lilacina Wender., lilafarbige, 4. f. ?Hybride, Nordamerika.  
 media W., mittlere, 4. f. Nordamerika.  
 mollis W., weiche, 4. f. Nordamerika.  
 oblongata Ait., langblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 punctata L. (*lutea* Mchx.), punktirte, 4. f. b. k. Nordamerika.  
 purpurea Pursh, purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.  
 rugosa Ait., runzelige, 4. f. Nordamerika.  
 Russeliana Nutt., Russel's, 4. f. b. Nordamerika.  
 scabra Beck., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 undulata Tausch, wellenblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 violacea Desf., violette, 4. f. Nordamerika.  
*Monerma monandra* P. B. v. *Psilurus nardoides*, *subulata* P. B. v. *Lepturus subulatus*.  
*Monesis grandiflora* Salisb. v. *Pyrola uniflora*.  
**Monetia** L'Her. (Monet de la Mark, berühmter franz. Naturforscher), IV. 1., ?Contortae-Apocynae.  
 barlerioides L'Her., barlerienähnliche, 5. w. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.  
**Monniera** Aubl. (M. Le Monnier, französischer Botaniker und Arzt), XVII. 1., Tricoccae-Rutaceae.  
 trifolia Löfl., dreiblättrige, 10. w. m. f. Südamerika.  
**Monnina** R. et P. (Monnino Graf von Flora Blanca, ein großer Beförderer der Botanik), XVII. III. (v.), Polygalaceae.  
 obtusifolia H. B. K., stumpfblättrige, 5. t. Peru.  
**Monodora** Dun., *Monodora*, XIII. VI., Anonaceae.  
 Myristica Dun., myristicaähnliche, 5. w. Jamaica.  
*Monopsis inconspicua* Salisb. v. *Lobelia erinoides*.  
**Monotaxis** Brogn., *Monotaxis*, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
 simplex Brogn., einfache, 5. t. Neuholland.  
**Monotoca** RB., *Monotoca*, V. 1., Epacrideae.  
 albens RB., weißliche, 5. Neuholland.  
 elliptica RB., elliptische, 5. Neusüdwallis.  
 lineata RB., feinstreifige, 5. Van-Diemens-Land.  
 scoparia RB., besenförmige, 5. Neuholland.  
**Monotropa** L., Ohnblatt, X. 1., Ericaceae-Monotropeae.  
 Hypopitys L., Fichten-O., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
 Hypophegea Wallr. (*Hypoxa* Spgl.), Buchen-O., 4. f. Europa.  
 uniflora Mchx., einblumiges, 4. f. Nordamerika.  
**Monsonia** L. fil. (Lady Anne Monson, eifrige Pflanzensammlerin, welche Ostindien bereiste, XVI. VII., Geraniaceae.

**Monsonia**

lobata Montin (*filia* L. suppl.), gelappte, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

ovata Cav. (*emarginata* L'Her.), eiförmige, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

pilosa W. (*speciosa* Auct.), haarige, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

β) Collae.

speciosa L., prächtige, 4. f. t. Cap der gut. Hoffn.

β) pallida Swt.

spinosa L'Her. v. Sarcocaulon L'Heritier.

**Montanoa** Lal. (Montano, mexicanischer Staatsmann), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

grandiflora Lal., großblumige, f. k. t. Mexico.

tomentosa Lal., filzige, f. k. t. Mexico.

**Montbretia** DC. (Gustave Coquebert de Montbret, französischer Botaniker), III. i., Irideae.

securigera DC., schwielige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

**Montezumea** M. et Sess. (Montezuma, ehemaliger Kaiser v. Mexico), XVI. vii., Malvaceae-Bombaceae.

speciosissima M. et Sess., prächtige, f. w. Mexico.

**Montia** L. (Joseph Monti, Professor der Botanik zu Bologna), III. iii., Portulacaceae.

fontana L., Quellen.M., ☉. 4. f. Europa.

a) minor Gmel. (*erecta* P.) β) rivularis Gmel. (*repens* P., *major* K.).

**Montinia** L. (L. Montin, schwedischer Botaniker), XXII. iv. (iv.), Portulacaceae-Polygoneae.

acris L. (*caryophyllacea* Auctor.), scharfe, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Moraea** Mill. L. (More of Shrewsbury, englischer Botaniker, Moraeus, schwedischer Arzt, Schwiegervater des Linné), III. i., Irideae.

angusta Ker, schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

barbigera Salisb., bärtige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

bituminosa Ker, harzige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

ciliata Ker, gefranzte, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

crispa Ker (*Gauleri* Spgl.), krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

edulis Ker, genießbare, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

longiflora Ker, langblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

longifolia (Andr.), (*edulis* γ. *lutescens* Bot. mag.), langblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

minuta Ker, kleine, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

papilionacea Ker, schmetterlingsförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

plumaria Ker, federige, 4. Zw. k. Cap der guten H.

polystachya Ker, vielährige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

ramosa Ker, ästige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

setacea Ker, borstenblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Sisyrinchium Ker, zweizwiebelige, 4. Zw. f. Südeuropa.

Tenoreana Swt., Tenore's, 4. Zw. f. Neapel.



**Moraea**

- tristis* Ker (*vegeta* L., *tricolor* Andr., *sordescens* Red.), traurige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
*viscaria* Ker, schmierige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
*catenulata* Lindl. (et *iridioides* L., *odora* Hook.), vid. *Diates catenulata* etc. *collina* Thbg. etc. vid. *Homeria collina* etc. *gladiata* Ker etc. vid. *Bobartia gladiata* etc. *Herberti* Lindl. vid. *Cypella Herberti*. *ixioides* Thbg. v. *Libertia ixioides*. *lurida* Ker (et *pavonia* Ker, *tenuis* Ker et *tricuspis* Ker etc.) v. *Vieusseuxia lurida* etc. *Northiana* Schneev. vid. *Cipura Northiana*. *plicata* Sw. vid. *Sisyrinchium plicatum*. *undulata* Thbg. vid. *Ferraria undulata*.

**Morenoa** Lal. (P. Moreno, mexicanischer Staatsmann), V. 1., Convolvulaceae.

- globosa* Lal., kugelförmige, 4. Sch. w. Mexico.  
*grandiflora* Lal., großblumige, 4. Sch. w. Mexico.  
*patula* Lal., ausgebreitete, 4. Sch. w. Mexico.

**Moricandia** DC. (Stefano Moricand, Botaniker zu Genf), XV. III., Cruciferae.

- arvensis* DC., Acker-M., ☉. ♂ f. Südeuropa, Nordafrika.

- hesperidiflora* DC., hesperisblumige, ☉. f. Aegypten.

**Morina** T. (Dr. Morin, französischer Arzt und Botaniker), II. 1., Labiatae.

- persica* L., persische, 4. f. b. k. Persien.

**Morinda** L., Morindastrauch, V. 1., Rubiaceae.

- angustifolia* Roxb., schmalblättriger, ♀. w. Ostindien,  
*bracteata* Roxb., deckblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*citrifolia* L., citronenblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*jasminoides* Cunn., jasminähnlicher, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Royoc* L., aufsteigender, ♀. w. Ost- und Westindien.

- umbellata* L., doldiger, ♀. w. Ostindien.

**Moringa** Burm., Lam. (malabarischer Name), X. 1., Tricoccae-Rutaceae-Moringeae.

- pterygosperma* DC., flügelsamige, ♀. w. Ostindien.

**Morisia** D. Don, Swt. (G. H. Moris, Professor der Botanik zu Turin), XV. II., Cruciferae.

- hypogaea* D. Don, Swt., erdschotige, 4. k. Sardinien.

**Morisonia** Plum. (R. Morison, Professor der Botanik zu Oxford), XVI. VIII., Capparideae.

- americana* L., amerikanische, ♀. w. Westindien, Südamerika.

**Mormodes** Lindl., Larvenstendel, XX. r., Orchideae.

- atropurpurea* Lindl., schwarzpurpurfarbiger, 4. w. Südamerika.

- pardina* Batem., pantherfleckiger, 4. w. Oaxaca.

**Morna** Lindl. (nordische Heldin), XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- nitida* Lindl., glänzende, 4. ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

- nivea* Lindl., schneeweisse, ☉. m. f. Neusüdwallis.

**Morphixia aulica** H. Berol. etc. v. *Ixia aulica* etc.**Morrenia** Lindl. (C. Morren, Professor der Botanik zu Lüttich), ? V. II., Asclepiadeae.

- odorata* Lindl., wohlriechende, ♀. Sch. t. Buenos Ayres.

- Morus** T., Maulbeerbaum, XXI. v. (IV. II.), Urticaceae.  
 alba L., weißer, *h. f.* Persien, Klein- und Mittelasien.  
 b) *multicaulis* Perrott. c) *Morettiana* Hort. d) *macrophylla* Lodd. (*latifolia* et *hispanica* Hort.).  
 e) *romana* Lodd. (*ovalifolia* Hort.). f) *nervosa* Lodd. (*subalba nervosa* Hort.). g) *italica* Hort.  
 h) *italica rubra* Lodd. i) *rosea* Hort. k) *columbassa* Lodd. l) *membranacea* Lodd. m) *siniensis* Hort. n) *pumila* Nois. (*nana* Hort.).  
*Calcar galli* Cunn., Hahnensporn-M., *h. t.* Neusüdwallis.  
*constantinopolitana* Poir. (*byzantina* Sieb.), türkischer, *h. f.* Thracien, Creta.  
*indica* L., indischer, *h. w.* Ostindien.  
*latifolia* Poir., breitblättriger, *h. w.* Mascarenas.  
*mauritiana* Jacq., mascarenischer, *h. w.* Mascarenas, Madagascar.  
*nigra* L., schwarzer, *h. f.* Persien.  
 β) *laciniata* Mill.  
*rubra* L. (*virginica* Pluk., *pensylvanica* Nois.), rother, *h. f.* Nordamerika.  
*scabra* W. (*canadensis* Poir.), scharfblättriger, *h. f.* Nordamerika.  
*tatarica* Pall., tatarischer, *h. f.* Tatarei.  
*papyrifera* L. v. *Broussonetia papyrifera*. *Plumieri* Brm. (*Broussonet. Plumieri* Spgl.) et *tinctoria* L. v. *Macluria Plumieri* etc.
- Morysia** Cass. (St. Morys, französischer Botaniker), XIX. I., Compositae-Corymbiferae.  
*dentata* DC., gezähnelte, *h. k.* Cap der guten Hoffn.  
*fasciculata* Less., büschelförmige, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
*longifolia* DC., langblättrige, *h. k.* Cap der gut. H.  
*pectinata* DC., kammförmige, *h. k.* Cap der gut. H.  
*pinnata* DC., gefiederte, *h. k.* Cap der guten Hoffn.
- Moscharia** R. et P., Moscharie, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.  
*pinnatifida* R. et P., fiederspaltige, *o. f. m.* Chili.
- Moschosma** Rchb., *Moschusbasilicum*, XIV. I., Labiatae.  
*Brownii*\*, Brown's, *o. m. f.* Neuholland.  
*ocymoides* Benth., langähriger, *o. w.* ?  
*polystachya* Rchb., vielähriger, *o. w.* Ostindien.  
*tenuiflora* (Spgl.), dünnblumiger, *o. ♂. w.* Ostindien.
- Mosigia pinnatifida* Spgl. v. *Moscharia pinnatifida*.
- Mouriria** Juss. (*Mouriri* Aubl.), [guianischer Name], X. I., Memecyleae.  
*guianensis* Aubl., guianische, *h. w.* Guiana.  
*myrtilloides* DC., heidelbeerähnliche, *h. w.* Westindien.
- Mozinna** *spathulata* Orteg. et *cordata* Orteg. v. *Loureira cuneifolia* et *glandulosa*.
- Mucuna** Marcg., Adans. (brasilianischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*altissima* DC., höchste, *h. Sch. w.* Martinique.  
*anguinea* Roxb., schlangenförmige, *h. Sch. w.* Ostind.  
*atropurpurea* Roxb., dunkelpurpurrothe, *h. Sch. w.* Ostindien.  
*bracteata* Roxb., deckblättrige, *h. Sch. w.* Ostindien.  
*gigantea* DC., riesenhafte, *h. Sch. w.* Ostindien.

**Mucuna**

- imbricata* DC., ziegeldachige, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*macroceratides* DC., langhornige, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*mitis* DC., milde, ♀. Sch. w. Peru.  
*monosperma* Roxb., einsamige, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*nivea* Roxb., schneeweiße, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*pruriens* DC., juckende, ♀. Sch. w. Ost- und Westindien.  
*urens* DC., brennende, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.

**Muehlenbergia** Schreb. (H. Mühlenberg, Prediger zu Lancaster in Pensylvanien, ein fleißiger Botaniker), III. II., Gramineae.

- aristata* P. (*erecta* Schbr.), langgrannige, 4. f. Nordamerika.  
*capillaris* Trin., haarförmige, 4. f. Nordamerika.  
*diffusa* W., weitschweifige, 4. f. Nordamerika.  
*elegans* Trin., zierliche, ♂. f. Quito.  
*erubescens* Schrad., röthliche, ♂. 4. f. w. Indien.  
*glomerata* Trin., knaulförmige, 4. f. Nordamerika.  
*microsperma* Trin., kleinsamige, ♂. f. Mexico.  
*Polypogon* Trin., dichtstielige, 4. f. Carolina.  
*Willdenowii* Trin. (*Agrostis tenuiflora* W.), Willdenow's, 4. f. Nordamerika.

**Müllera** L. fil. (O. F. Müller, berühmter dänischer Naturforscher), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- moniliformis* L. fil., armbandförmige, ♀. w. Surinam.

**Münchhausia speciosa** L. v. *Lagerstroemia Münchhausia*.**Mulgedium** Cass., Alpenlattich, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

- acuminatum* DC., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.  
*albanum* DC., albanischer, 4. f. Albanien.  
*alpinum* Less., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.  
*azureum* DC. (Ledeb.), azurblauer, 4. f. Sibirien.  
*cacaliaefolium* DC. (MB.), cacaliablättriger, 4. f. Iberien.  
*cyaneum* (D. Don), kornblumenblauer, 4. f. Nepal.  
*floridanum* DC. (*lyratum* Cass.), floridanischer, ♂. f. Nordamerika.

- leucophaeum* DC., weisbrauner, ♂. f. Nordamerika.  
*macrophyllum* DC., großblättriger, 4. f. Nordamerika.  
*Plumieri* DC., Plumier's, 4. f. Frankreich, Schweiz.  
*prenanthoides* DC., prenanthesähnlicher, 4. f. Caucasus.  
*sibiricum* Less., sibirischer, 4. f. Sibirien.  
*tataricum* DC., tatarischer, 4. f. Tatarei.

**Mundia** H. B. K., Mundie, XVII. III., Polygalaceae.

- spinosa* DC., dornige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 β) *angustifolia* DC.

**Muntingia** L. (Abraham Munting, Professor der Botanik zu Gröningen), XIII. I., Tiliaceae.

- Calabura* L., westindische, ♀. w. Westindien, Südamerika.

**Muraltia** Neck. (J. von Muralt, schweizerischer Botaniker), XVII. III., Polygalaceae.

- alopecuroides* DC., fuchsschwanzähnliche, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*ciliaris* DC., gefranzte, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.  
*diffusa* Burch., weitschweifige, ♀. t. k. Cap d. gut. H.



**Muraltia**

- ericaefolia* DC., heideblättrige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*filiformis* DC., fadenförmige, ⚥. t. k. Cap der gut. H.  
*Heisteria* DC., Heister's, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.  
*humilis* Swt., niedrige, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.  
*juniperifolia* DC., wachholderblättrige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*linophylla* Burch., leinblättrige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*macroceras* DC., grofshornige, ⚥. t. k. Cap d. gut. H.  
*micrantha* (Thbg.), kleinblumige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*mixta* DC., heideartige, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.  
*squarrosa* DC., sparrige, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.  
*stipulacea* Burch., zwischenblättrige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.  
*virgata* Burch., ruthenförmige, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**Muricaria** Desv., Stachelnüsschen, XV. 1. Cruciferae.  
*prostrata* Desv., DC., gestrecktes, ☉. f. Nordafrika, Südeuropa.**Murraya** König (J. A. Murray, Professor der Botanik zu Göttingen), X. 1., Hesperideae.

- exotica* L., fremde, ⚥. w. Ostindien, China.  
*paniculata* DC., rispige, ⚥. w. Cochinchina, China, Molucken.

**Murucuja** T. (brasilianischer Name), XVI. 11., Passifloreae.

- ocellata* P., geäugelte, ⚥. Sch. w. Westindien.  
*perfoliata* Spgl., durchwachsene, ⚥. Sch. w. Westind.  
*adiantifolia* Swt. et *Herbertiana* Swt. v. *Disemina*  
*adiantifolia* etc.

**Musa** Plum., Pisang., Paradiesfeige, V. 1. (XXIII. 1.), Scitamineae (*Musaceae Bananeae*).

- coccinea* Andr., scharlachfarbiger, 4. w. China.  
*glauca* Roxb. (? *nepalensis* Wall.), blaugrüner, 4. w. Ostindien.  
*maculata* Jacq., gefleckter, 4. w. Mascarenas.  
*nepalensis* Wall., nepal'scher, 4. w. Nepal.  
*ornata* Roxb., geschmückter, 4. w. Ostindien.  
*paradisiaca* L., gemeiner, 4. w. Ostindien.  
*rosacea* Jacq., rosenrother, 4. w. Mascarenas.  
*sapientum* L., Bananen-P., 4. w. Ost- u. Westindien.  
*superba* Roxb., stolzer, 4. w. Ostindien.  
*sylvestris* Rumph., wilder, 4. w. Molucken etc.

**Muscari** T., Muscat-(Trauben-)Hyacinthe, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

- botryoides* W., steifblättrige, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 b) *pallidum*. c) *album*.  
*ciliatum* Ker, gefranzte, 4. Zw. f. Süditalien, Podolien, Taurien, Kleinasien.  
*comosum* W., schopfge, 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa, Mittelasien.  
 β) *monstrosum* W.  
*glaucum* Bot. Reg., blaugrüne, 4. Zw. f. Persien.  
*macrocarpum* Swt. (*moschatum* β. *flavum* Bot. mag.), grofsfrüchtige, 4. Zw. f. Levante.

**Muscari**

- maritimum* Dsf., Meerstrands-M., 4. Zw. f. Nordafrika.  
*moschatum* W., feinriechende, 4. Zw. f. Kleinasien.  
*pallens* Fisch., Bess., bleiche, 4. Zw. f. Podolien,  
 Taurien, Caucasus.  
*parviflorum* Dsf., kleinblumige, 4. Zw. f. Nordafrika.  
*racemosum* W., gemeine, 4. Zw. f. Südeuropa.

b) minus.

**Mussaenda** Herm. (ceylanischer Name), V. 1., Rubiaceae.

- arcuata* Lam., bogenförmige, f. w. Mascarenas.  
*citrifolia* Lam., citronenblättrige, f. w. Madagascar.  
*chinensis* Lour., chinesische, f. t. China.  
*coccinea* Poir., scharlachfarbige, f. w. Westindien.  
*frondosa* L., belaubte, f. w. Ostindien.  
*glabra* Vahl, kahle, f. w. Ostindien.  
*Landia* Lam. (*latifolia* Poir.), breitblättrige, f. w. Mascarenas.  
*pubescens* Dryand., weichhaarige, f. w. China.  
*speciosa* Poir., prächtige, f. w. t. Südamerika.  
*Luculia* D. Don vid. *Luculia gratissima*. *spinosa* Jacq. et *tetracantha* Cav. vid. *Gardenia armata* et *tetracantha* Nachtr.

**Musschia** Dum., Musschia, V. 1., Campanulaceae.

- aurea* Dum., A. DC., goldfarbige, f. k. Canarische Inseln.  
 β) *angustifolia* A. DC. (*Campan. aurea* Jacq.).

**Mutisia** L. fil. (J. C. Mutis, ein thätiger Pflanzenforscher, welcher Südamerika durchreiste), XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.

- arachnoidea* Mart. (*speciosa* Hook.), prächtige, f. Sch. k. t. Brasilien.  
*ilicifolia* Hook., ilexblättrige, f. Sch. t. Chili, Peru.  
*latifolia* D. Don, breitblättrige, f. Sch. t. Chili.

**Myagrimum** T. L., Dotterkraut, XV. 1., Cruciferae.

- perfoliatum* L., durchwachsblättriges, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.  
*aegyptiacum* L. v. *Didesmus aegyptiacus*. *iberioides* Brot. v. *Calepina* Corvini. *orientale* L. etc. v. *Rapistrum orientale* etc. *paniculatum* L. vid. *Neslia paniculata*. *sativum* L. v. *Camelina sativa*. *saxatile* L. v. *Kerneria saxatilis*.

**Myanthus** Lindl., Fliegenblume, XX. 1., Orchideae.

- barbatus* Lindl., bärtige, 4. w. Demerara.  
 β) *labello albo* Hook. γ) *immaculatus* K. et W.  
*cernuus* Lindl., gebogene, 4. w. Brasilien.  
*deltoides* Lindl., deltaförmige, 4. w. Demerara.

**Mygalurus alopecuroides** Lk. etc. vid. *Vulpia alopecuroides* etc.**Myginda** Jacq. (Mygind, österreichischer Botaniker), IV. 11., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

- integrifolia* Lam., ganzblättrige, f. w. Westindien.  
*latifolia* Sw., breitblättrige, f. w. Westindien.  
*myrtifolia* Nutt., myrtenblättrige, f. f. b. Nordamer.  
*Rhacoma* Sw., *Rhacoma*-M., f. w. Westindien.  
*Uragoga* Jacq., harntreibende, f. w. Westindien, Südamerika.

**Mylocaryum ligustrinum** W. v. *Cliftonia ligustrina*.**Myoporum** Banks, Porenblatt, XIV. 11., Globulariaceae-Myoporineae.

**Myoporum**

- acuminatum RB., zugespitztes,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.  
 adscendens RB., aufsteigendes,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 crassifolium Forst., dickblättriges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuzeeland.  
 debile RB., schwaches,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.  
 diffusum RB., weitschweifiges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 ellipticum RB., elliptisches,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.  
 insulare RB., Insel-P.,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.  
 montanum RB., Berg-P.,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 oppositifolium RB., gegenblättriges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 parvifolium RB., kleinblättriges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 tuberculatum RB., kleinhöckeriges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 viscosum RB., schmieriges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Myoseris purpurea** Lk. v. *Intybellia purpurea*.

**Myosotis** Rupp. Dill., Vergifsmeinnicht (Mausöhrchen),  
 V. I., Asperifoliaceae.

## I. Genuina.

- arvensis Sibth., Rchb. (*stricta* Lk., *arenaria* Schrad.),  
 Acker-V.,  $\odot$  f. Europa.  
 caespitosa Schultz (*lingulata* R. et S., *uliginosa* Schrad.),  
 rasenartiges.  $\sigma$ . 4. f. Europa.  
 californica Fisch. et Mey., californisches,  $\odot$  f. Neu-  
 Californien.  
 hispida Schldl. (*arvensis* Lk., *collina* Auct.), steifhaa-  
 riges,  $\odot$  f. Europa.  
 intermedia Lk. (*arvensis* Lehm.), mittleres,  $\odot$   $\sigma$  f.  
 Europa.

## b) alba.

- involucrata Steven, hülliges,  $\odot$  f. Caucasus.  
 laxiflora Reichenb., lockerblumiges, 4. f. Deutschland.  
 palustris With. (*scorpioides*  $\beta$ . *palustris* L.), wahres, 4.  
 f. Europa, Asien, Nordamerika.

 $\beta$ ) repens Donn.  $\gamma$ ) strigulosa Rchb.

- peduncularis Trevir., langstieliges,  $\odot$  f. Astrachan.  
 pusilla Lois., zwergiges,  $\odot$  f. Corsica.  
 sparsiflora Mikan, zerstreutblumiges,  $\odot$  f. Nord-, Mit-  
 tel- und Osteuropa.  
 suaveolens Kit. (*lithospermifolia* Hornem.), wohlriech-  
 endes, 4. f. Osteuropäische Alpen.  
 sylvatica Ehrh. (*montana* Bess., MB., *decumbens* Host.),  
 Wald-V., 4. f. Europa.

 $\beta$ ) alpestris Schm. (*odorata* Poir., *rupicola* Sm.). $\gamma$ ) lactea Bönningh.

- tenuiflora Vivian., dünnblumiges,  $\odot$  f. Nordafrika.  
 versicolor P. (*scorpioides collina* Ehrh.), buntfarbiges,  
 $\odot$  f. Europa.

## II. Eritrichium Schrad.

- nana Vill. (*pauciflora* Vitm.), kleinstes, 4. f. Schweiz,  
 Frankreich.

- terglovensis Hacq. (*E. Hacquetii* Koch), terglou'sches,  
 4. f. Steyermark, Krain, Tyrol etc.

*barbata* MB. etc. v. *Echinosperrum barbatum* etc.

*fruticosa* L. vid. *Heliotropium linifolium*. *lutea* P.

v. ? *Lithospermum apulum*. *macrophylla* MB. vid.

*Anchusa myosotidiflora*. *obtusa* W. K. v. *Anchusa*  
 Barrelieri.

**Myosurus** Dill., Mäuseschwänzchen, V. VI., Ranun-  
 culaceae.

- minimus L., kleines,  $\odot$  f. Europa.



- Myrcia** DC., Myrcie, XII. 1., Myrtaceae.  
 acris DC., scharfe, f. w. Westindien.  
 pimentoides DC. (Lindl.), gewürzhafte, f. w. Westind.
- Myriactis** Less., Myriacte, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.  
 Gmelini DC., Gmelin's, 4. f. b, k. Persien.
- Myriadenus** Desv., Vieldrüsler, XVII. 1V. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 tetraphyllus Desv., vierblättriger, ♂. w. Jamaica.
- Myrica** L., Wachsmyrte, XXII. 1V. (IV. 11.), Amentaceae-Myricaceae.  
 aethiopica L. (? *capensis* Lodd. C.), aethiopische, f. k. Cap der guten Hoffnung.  
 cerifera L., wahre, f. f. Nordamerika.  
     β) *latifolia* Ait. (*cerif. media* Mchx., *carolinensis* Wangenh., *pensylvanica* Lam., *sempervirens* Hort.).  
     γ) *pumila* Mchx.  
 cordifolia L., herzblättrige, f. k. Cap der gut. H.  
 esculenta Hamilt., genießbare, f. t. k. Nepal.  
 Faya Ait., Faya-W., f. k. Azoren.  
 Gale L., Gagel-W., f. f. Europa, Nordamerika.  
 laciniata W., schlitzbilättrige, f. k. Cap der gut. H.  
 mexicana W., mexicanische, f. k. Mexico.  
 quercifolia L., eichenblättrige, f. k. Cap d. gut. H.  
     b) *hirsuta* Mill.  
 segregata Jacq., lanzettblättrige, f. t. Südamerika.  
 serrata Lam. (*banksiaefolia* Wendl.), sägeblättrige, f. k. Cap der guten Hoffnung.  
 Nagi Thbg, v. Nageja japonica.
- Myricaria** Desv., Myricarie, X. 111. (XVI. VI.), Aizoideae-Tamariscineae.  
 dahurica DC., dahurische, f. f. b. Ostsibirien.  
 germanica Desv., deutsche, f. f. b. Mitteleuropa, Caucasus.  
 herbacea Dsf., krautartige, 4. f. f. b. Nordpersien.  
 longifolia DC. (*linearifolia* Desv.), langblättrige, f. f. b. Ostsibirien.  
 squamosa Desv., schuppige, f. f. b. Dahurien.
- Myriogyne** Less., Vielweibler, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.  
 minuta Less., kleiner, ☉. f. Asien, Neuholland.
- Myriophyllum** Vaill., Federkraut (Wassergarbe), XXI. 1X., Haloragaceae.  
 alterniflorum DC., wechselblumiges, 4. Wa. f. Frankreich, Westdeutschland.  
 pectinatum DC., kammförmiges, 4. Wa. f. Mittel-, Ost- und Westeuropa.  
 spicatum L., ährenförmiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.  
 verticillatum L., wirtelförmiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.
- Myristica** L., Muskatennußbaum, XXII. XIII. (XVI. v.), Myristicaceae ? Laurineae.  
 fatua Sw. (*surinamensis* Roland.), unschmackhafter, f. w. Westindien, Surinam.  
 moschata Thbg. (*officinalis* L., *aromatica* Lam.), wahrer, f. w. Molucken.  
 sebifera Sw., talgebender, f. w. Südamerika.

**Myrodia** Schreb., Balsammalve, XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

turbinata Sw., kreiselförmige, f. w. Westindien.

**Myrosma comosa** Spgl. et *cannaefolia* L. fil. v. *Phrynium comosum* et *Myrosma*.

**Myrospermum** Jacq., Balsamholz, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

toluiferum Spgl., toluitanisches, f. w. Südamerika.

**Myrrhis** Scop., Gewürzkerbel, V. II., Umbelliferae.

odorata Scop., wohlriechender, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Chaerophyllum*.

**Myrsine** L., *Myrsine*, V. I. (XXIII. II.), *Myrsineae* (*Ardisiaceae*).

africana L., afrikanische, f. k. Cap der gut. Hoffn.

bifaria Wall., Roxb., zweireihige, f. t. Nepal.

capitellata Wall., Roxb., kopfblüthige, f. t. Nepal.

coriacea RB., lederblättrige, f. w. Jamaica.

ilicifolia Lodd., ilexblättrige, f. k. t. ?

melanophleos RB., schwarzrindige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

retusa Ait., abgestutzte, f. k. Azoren.

Samara RB., Samara-M., f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

semiserrata Wall., Roxb., halbsägezahnige, f. t. Nepal.

subspinosa D. Don, feinsägezahnige, f. t. Nepal.

variabilis RB., veränderliche, f. t. k. Neuholland.

venulosa Spgl., vieladerige, f. k. t. Cap der gut. H.

*canariensis* Spgl. v. *Manglilla canariensis*. *Heber-*

*denia* R. et S. v. *Ardisia excelsa*. *mitis* Spgl. v.

*Manglilla Milleriana*.

**Myrsiphyllum** W., Myrtenblatt, VI. III., *Sarmentaceae* (*Asparagineae*).

angustifolium W., schmalblättriges, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

asparagoides W., spargelähnliches, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

**Myrtus** T., Myrte, XII. I., *Myrtaceae*.

affinis Hort., ähnelnde, f. t. k. China.

biflora L., zweiblumige, f. w. Jamaica.

communis L., gemeine, f. f. k. Südeuropa.

a) romana Mill. β) tarentina Mill. γ) italica

Mill. δ) baetica Mill. ε) lusitanica Mill. ζ)

belgica Mill. η) mucronata Mill. θ) leucocarpa

DC. Gartenvarietäten: b) flore pleno. c) fol.

aureo variegat. d) fol. argenteo variegat. etc.

coriacea Vahl, lederblättrige, f. w. Westindien.

dumosa Vahl, buschige, f. f. w. Westindien.

Greggii Sw., Gregg's, f. f. w. Westindien.

lucida L., spiegelnde, f. f. w. Surinam.

melastomoides Cunn., melastomaähnliche, f. t. Neuholl.

obscura Bot. reg., dunkle, f. w. Südamerika,

tenuifolia Sm., dünnblättrige, f. t. k. Neuholland.

tomentosa Ait. (*canescens* Lour.), filzige, f. t. w. China.

trinervia Sm., dreinervige, f. t. Neuholland.

virgultosa Sw., ruthenförmige, f. f. w. Westindien.

*acris* Sm. (et *pimentoides* Lindl.) vid. *Myrcia acris*

etc. *australis* Bot. mag. vid. *Jambosa myrtifolia*.

*disticha* Sw. v. *Olythia disticha*. *Pimenta* L. v.

*Pimenta vulgaris*.

- Nageja** G. (Nagi, japanischer Name), XXII. IV. (IV. 1.), Amentaceae-Myricaceae.  
*japonica* W., japanische, ♀. k. Japan.  
*Putranjiva* Roxb., ostindische, ♀. w. Ostindien.
- Najas** L., Najade, XXI. v., Najadeae.  
*flexilis* Rostk. et Schm., biegsame, ☉. Wa. f. Pommern.  
*major* Roth, All. (*marina* a L., *monosperma* W.), grofse, ☉. Wa. f. Europa.  
*minor* All. (*fragilis* Rostk. et Schm.), kleine, ☉. Wa. f. Europa.
- Nandina** Thbg. (japanischer Name), VI. 1., Berberideae.  
*domestica* Thbg., Garten-N., ♀. ♀. k. China.
- Nanodes** Lindl., Zwergstendel, XX. 1., Orchideae.  
*discolor* Lindl., grünpurpurfarbiger, 4. w. Brasilien.
- Napaea** dioica L. et *laevis* L. (*hermaphrodita* L.) v. *Sida dioica* et *Napaea*.
- Naravelia** DC. (ceylanischer Name), XIII. VI., Ranunculaceae.  
*ceylanica* DC., ceylanische, ♀. Sch. w. Ceylon.
- Narcissus** T., Narzisse, VI. 1., Narcisseae (*Amaryllideae*).  
 1. *Ajax* Salisb., Haw.  
*albidus*\* (*albicans* Haw.), schmutzigweifse, 4. Zw. f. Spanien.  
*arcuatus*\* (*cernuus* Haw.), gebogene, 4. Zw. f. b. ? Spanien.  
*bicolor* L. (*tubiflorus* Salisb.), zweifarbige, 4. Zw. f. b. Spanien.  
*cambricus* Haw., cambrische, 4. Zw. f. England.  
*cyclamineus* Haw., cyclamenähnliche, 4. Zw. f. ?  
 b) *corolla-plena* Salisb.  
*grandiflorus* Haw., Salisb., großblumige, 4. Zw. f. ?  
*lobularis* Haw., gelappte, 4. Zw. f. ?  
 b) *amplicoronus*. c) *plenus*. d) *scoticus*.  
*lorifolius* Haw. (*bicolor* Bot. mag. non L.), riemenblät-  
 terige, 4. Zw. f. ?  
 b) *breviflos* Haw. c) *anceps* Haw.  
*major* Curt., grofse, 4. Zw. f. Spanien.  
*maximus* D. Don, größte, 4. Zw. f. ?  
*minimus* Haw., kleinste, 4. Zw. f. b. Spanien.  
*minor* L., kleine, 4. Zw. f. Spanien.  
 b) *angustus*.  
*moschatus* L., moschusduftende, 4. Zw. f. b. Südfrank-  
 reich, Spanien.  
 b) *patulus* Salisb.  
*nanus* Haw., zwergige, 4. Zw. f. ?  
*nobilis* Haw., edle, 4. Zw. f. ?  
*obvallaris* Salisb., umhüllte, 4. Zw. f. b. Spanien.  
*propinquus* Salisb., verwandte, 4. Zw. f. b. Spanien.  
*Pseudonarcissus* L. (*festalis* Haw.), gemeine (März-  
 becher), 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.  
 a) *pallidus*. b) *albus*. c) *luteus*. d) *plenus*.  
 e) *plenissimus*. f) *ryticarpus*.  
*pumilus* Salisb., Redout., kleine, 4. Zw. f. b. Spanien.  
 b) *fl. pleno*.  
*rugilobus* Haw., runzellappige, 4. Zw. f. ?  
*serratus* Haw., gesägte, 4. Zw. f. Südeuropa.  
 β) *suavis* Haw. γ) *radians*. δ) *praecox*.  
*spurius* Haw., unächte, 4. Zw. f. England.



## Narcissus

Telamonius Haw., Telamon's, 4. Zw. f. ?

b) grandiplenus. c) pleno-pallidus acuminatus.  
tortuosus Haw., gewundene, 4. Zw. f. b. Spanien.

## II. Assaracus Haw.

capax Salisb., fruchtbare, 4. Zw. f. b. ?

reflexus ? Brot., zurückgebogene, 4. Zw. f. b. ? Portugal.

## III. Chloraster Haw.

viridiflorus Schousb. (*fissus* Haw.), grünblumige, 4. Zw.  
f. b. k. Südsanien, Nordafrika.

β) integer Haw.

## IV. Corbularia Haw. (Vergl. pag. 217 und hier einzuschalten).

albicans Haw., weißliche, 4. Zw. f. b. k. Spanien.

aureus Haw., goldfarbige, 4. Zw. f. b. Spanien.

Bulbocodium L., aufrechte, 4. Zw. f. b. k. Spanien,  
Portugal.

cantabricus Haw., cantabrische, 4. Zw. f. b. Spanien.

conspicuus Salisb., Haw., ansehnliche, 4. Zw. f. b.

Westeuropa.

gigas Haw., riesenhafte, 4. Zw. f. b. ?

lobulatus Haw., schmallappige, 4. Zw. f. b. ?

obesus Haw., feiste, 4. Zw. f. b. ?

tardiflorus \* (*Corbul. serotina* Haw.), spätblumige, 4. Zw.  
f. b. k. Portugal.

tenuifolius Red., Sal., feinblättrige, 4. Zw. f. b. k.

Westeuropa.

## V. Diomedes Haw.

Macleai Lindl., MacLeay's, 4. Zw. f. b. k. Smyrna.

Parkinsoni Salisb., Parkinson's, 4. Zw. f. b. ?

Sabini Lindl., Sabine's, 4. Zw. f. b. ?

## VI. Ganymedes Haw.

concolor Haw., einfarbige, 4. Zw. f. ?

infundibularis Salisb., trichterförmige, 4. Zw. f. b. ?

nutans Haw. (*trilobus* Bot. mag.), nickende, 4. Zw. f.  
b. Südeuropa.

pulchellus Haw., schöne, 4. Zw. f. b. Spanien.

striatulus Haw., feinstreifige, 4. Zw. f. b. ?

β) parvicoronus.

## VII. Helena Haw.

croceo cinctus Haw., safranfarbige, 4. Zw. f. b. ?

gracilis Lindl., schlanke, 4. Zw. f. b. ?

humilis \* (*pumilus* Haw.), niedrige, 4. Zw. f. b. ?

planicoronus Haw., flachkronige, 4. Zw. f. b. ?

purpureocinctus Haw., purpursaumige, 4. Zw. f. b. ?

tenuior Curt., dünne, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

## VIII. Hermione Haw.

aperticoronus Haw., offenkronige, 4. Zw. f. b. Nordafrika.

auranticoronus Haw., orangefarbkronige, 4. f. b. ?

bifrons Sims, zweiflügelige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

biscrenatus Haw., doppelkerbige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

breviflorus Haw., kurzblumige, 4. Zw. f. b. ?

cerinus Haw., wachsfarbig, 4. Zw. f. b. ?

chrysanthus Haw., DC., hochgelbe, 4. Zw. f. b. ?

compressus Haw., platte, 4. Zw. f. b. Spanien.

crenulatus Sal., Haw., gekerbte, 4. Zw. f. b. Spanien.

crispicoronus Haw., krauskronige, 4. Zw. f. b. ?

Cypri Haw., cyper'sche, 4. Zw. f. b. Cypern.

b) semiplenus. c) plenus.

## Narcissus

decorus Haw., zierliche, 4. Zw. f. b. ?

deflexicaulis Haw., herabgebogene, 4. Zw. f. b. ?

β) plenus.

dubius Gouan, zweifelhafte, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

elegans Haw., nette, 4. Zw. f. b. ?

fistulosus Haw., röhrlige, 4. Zw. f. b. ?

flaveolus Haw., bläsgelbliche, 4. Zw. f. b. ?

flexiflorus Haw., bogenblumige, 4. Zw. f. b. ?

floribundus Salisb., blüthenreiche, 4. Zw. f. b. Spanien.

flos lactis Haw., milchweisse, 4. Zw. f. b. ?

intermedius Redout., mittlere, 4. Zw. f. b. Pyrenäen.

italicus Gawl. (*praecox* Ten.), italienische, Marseiller Tazette, 4. Zw. f. b. k. Italien, Südfrankreich.

b) semiplenus. c) plenus.

jasmineus Haw., jasminblumige, 4. Zw. f. b. ?

lacticolor flor. graec., milchfarbige, 4. Zw. f. b. Griechenland.

latifolius Haw., breitblättrige, 4. Zw. f. b. ?

longiflorus W. (*tereticaulis* Haw.), langblumige, 4. Zw. f. b. Neapel, Griechenland, Kleinasien.

Luna Haw., Mond-N., 4. Zw. f. b. ?

multiflorus Haw. (*Tazetta* Bot. mag.), vielblumige, 4. Zw. f. b. ?

b) aureus. c) floribus pallidioribus.

neglectus Tenor., übersehene, 4. Zw. f. Neapel.

obliteratus Haw., vergessene, 4. Zw. f. b. ?

obsoletus Haw., veraltete, 4. Zw. f. b. Spanien.

papyraceus Sims (*unicolor* Ten., *niveus* Lois.), papierähnliche, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

patulus Haw., abstehende, 4. Zw. f. b. ?

perluteus Haw., dunkelgelbe, 4. Zw. f. b. ?

polyanthos Haw., häufigblumige, 4. Zw. f. b. ?

praecox Haw., frühe, 4. Zw. f. b. ?

primulinus Haw., primelblumige, 4. Zw. f. b. Spanien.

rotularis Haw., radförmige, 4. Zw. f. b. ?

serotinus L. (? *Broussoneti* Lag.), späte. 4. Zw. f. b. k.

Sicilien, Spanien, Nordafrika.

solaris Haw., sonnenfarbige, 4. Zw. f. b. ?

stramineus Haw., strohfarbige, 4. Zw. f. b. ?

subcrenatus Haw., wenig gekerbte, 4. Zw. f. b. ?

subalbidus Haw., gelblichweisse, 4. Zw. f. b. ?

subluteus Haw., bleichgelbe, 4. Zw. f. b. ?

sulcicaulis Haw., gefurchtstengelige, 4. Zw. f. b. ?

sulphureus Haw., schwefelgelbe, 4. Zw. f. b. ?

Tazetta L., Tazetten-N., 4. Zw. f. k. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.

b) luteus Haw. (? *flavus* Lag.).

tenuiflorus Haw., dünnblumige, 4. Zw. f. b. ?

Trewianus Ker, Trew's, 4. Zw. f. b. Spanien.

trifidus Haw., dreispaltige, 4. Zw. f. b. ?

unicolor Haw., einfarbige, 4. Zw. f. b. ?

IX. Illus Haw.

cernuus Salisb. (*triandrus* Bot. mag.), geneigte, 4. Zw. f. b. ? Spanien.

triandrus L. (*Ganymedes albus* Salisb.), dreifädige, 4. Zw. f. b. Spanien.

X. Jonquilla Haw.

Jonquilla L. (*major* Salisb. Haw.), Jonquillen-N., 4. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.

## Narcissus

b) flore pleno.

β) media Salish. Haw. γ) minor Salish. Haw. (similis Haw.). δ) parvicorona Haw.

## XI. Narcissus Haw.

angustifolius Curt. (radiiflorus Salish.), schmalblättrige, 4. Zw. f. Südfrankreich.

β) spathulatus Haw. γ) albus Haw. δ) dianthos Haw.

biflorus Curt., zweiblumige, 4. Zw. f. England, Schweiz, Italien.

majalis Curt. (patellaris Salish.), Mai-N., 4. Zw. f. Südfrankreich.

b) flore pleno albo-croceo.

ornatus Haw., geschmückte, 4. Zw. f. ?

poeticus L., Poeten-N., 4. Zw. f. England, Südeuropa.

b) exsertus Haw. c) fl. pleno.

recurvus Haw., zurückgekrümmte, 4. Zw. f. Südeuropa.

stellaris Haw., sternförmige, 4. Zw. f. ?

triflorus Haw., dreiblumige, 4. Zw. f. ?

## XII. Oileus Haw.

abscissus Haw., kurzschäftige, ☉. Zw. f. b. Spanien.

β) hexangularis Haw. γ) minor Haw. δ) albus Haw. ε) pumilus Haw.

## XIII. Philogyne Haw.

Campernelli Haw., Campernellen-N., 4. Zw. f. Südeuropa.

heminalis Haw., halbkronige, 4. Zw. f. ?

b) pluriflorus.

interjectus Haw., untergelaufene, 4. Zw. f. ?

odorus L. (calathinus a Bot. mag.), wohlriechende, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

rugulosus Haw., runzelige, 4. Zw. f. b. ?

trilobus L. (tripartitus Hornem.), dreilappige, 4. Zw. f. b. Spanien.

β) calathinus Salish. γ) Curtisii Haw. δ) minor Haw. b) fl. pleno. c) fl. pleno majore. d) fl. pleno maxim.

## XIV. Queltia Salish. Haw.

albus Haw., weiß, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno niveo-aurant. (double Orange Phoenix).

aurantius Haw., orangefarbige, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno.

Gouani Roth, Gouan's, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

Haworthi G. Don (concolor Haw.), Haworth's, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno sulphureo.

incomparabilis Curt., unvergleichliche, 4. Zw. f. b. Italien, Südfrankreich, Portugal.

niveus Haw., schneeweiß, 4. Zw. f. b. ?

semipartitus Haw., halbtheilige, 4. Zw. f. b. ?

## XV. Schisanthes Haw.

orientalis L., morgenländische, 4. Zw. f. b. Levante. ? β) citrinus Haw.

## XVI. Tros.

galanthifolius Haw., galanthusblättrige, 4. Zw. f. b. ?

montanus Ker (Queltia poculiformis Salish.), Berg-N., 4. Zw. f. b. Portugal.

Nardosmia Cass. v. Petasites.



**Nardus** L., Borstengras, III. 1., Gramineae.

*stricta* L., steifes, 4. f. Europa.

*aristata* L. vid. *Psilurus nardoides*. *indica* L. vid. *Microchloa setacea*.

**Narthecium** Möhr., Sumpffaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*americanum* Ker, amerikanische, 4. f. Nordamerika.

*ossifragum* Huds., europäische, 4. f. Nordeuropa.

**Nasturtium** C. Bauh. (et *Brachyolobus* All.), Wasserkresse, XV. III., Cruciferae.

*amphibium* RB., gemeine, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

a) *indivisum* DC. β) *variifolium* DC. γ) *auriculatum* DC. (*riparium* Wallr.).

*anceps* Rchb., zweischneidige, 4. Wa. f. Europa.

*austriacum* Crtz., österreichische, 4. f. Osteuropa, Tau-rien, Caucasus, Sibirien.

*bengalense* DC., bengalische, ☉. f. Ostindien.

*bursifolium* DC., hirtentäschelblättrige, ☉. f. Kamtschatka.

*Camelinae* Fisch. et Mey., leindotterähnliche, ☉. ♂. f. Nordchina.

*ceratophyllum* DC., hornkrauthblättrige, ☉. f. Nordafrika.

*clandestinum* Spgl., heimlichblumige, ☉. f. Brasilien.

*coronopifolium* DC., krähenußblättrige, ☉. f. Nordafrika.

*erectum* Trevir. (*Mirbelii* Spgl., *chilense* H. Par.), aufrechte, ☉. f. Chili.

*globosum* Turcz., kugelfrüchtige, ☉. ♂. f. Dahurien.

*indicum* DC., indische, ☉. f. Ostindien, Java, China.

*lippizense* DC., illyrische, 4. f. Krain, österreichisches Litorale.

*micropetalum* Fisch. et Mey., kleinkronige, ☉. f. Nordamerika.

*microspermum* DC., kleinsamige, ☉. f. China.

*natans* DC., schwimmende, 4. Wa. f. Sibirien.

*officinale* RB., officinelle (Quellen-K.), 4. Wa. f. Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika.

β) *microphyllum* Rchb.

*palustre* DC. (*terrestre* RB.), Sumpf-K., ♂. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika.

*pyrenaicum* RB., pyrenäische, 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Frankreich.

*rivulare* Rchb., Bach-K., 4. Wa. f. Sachsen, Oesterreich.

*sagittatum* RB., pfeilblättrige, 4. Wa. f. Caspisches Meer.

*siifolium* Rchb., merkblättrige, 4. Wa. f. Sachsen.

*sylvestre* RB., Wald-K., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*quadricorne* DC. v. *Notoceras quadricorne*.

**Nastus latifolia** Spgl. v. *Guadua latifolia* Nachtr.

**Nauclea** L., Nauclea, V. 1., Rubiaceae.

*Cadamba* Roxb., Cadamba-N., ♂. w. Ostindien.

*cordifolia* Roxb., herzblättrige, ♂. w. Ostindien.

*orientalis* L., morgenländische, ♂. w. Ostindien.

*purpurea* Roxb., purpurfarbige, ♂. w. Ostindien.

*undulata* Roxb., wellenblättrige, ♂. w. Ostindien.

*Adina* Sm. v. *Adina globiflora*. *Gambir* Hunt. etc.

v. *Uncaria* Gambir etc.

**Nauenburgia guttata** Mch. v. *Lysimachia thyrsiflora*, *N. trinervata* W. v. *Flaveria repanda*.

*Navarretia pusilla* H. Par. vid. *Aegochloa eryngioides* Nachtr.

*Nectaroscordum* Lindl., Honiglauch, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

siculum Lindl., sicilianischer, 4. Zw. f. b. k. Sicilien.

*Negundo* Mönch (*Negundium* Rafin.), Eschenahorn, VIII. 1. (XXII. v.), Sapindaceae-Acerineae.

fraxinifolium Nutt. (*aceroides* Mch.), ahornähnlicher, 5. f. Nordamerika.

b) crispum G. Don. c) violaceum Booth.

*Neja* D. Don, *Neja*, XIX. 11., Compositae.

gracilis D. Don, schlanke, 4. k. Mexico.

*Nelitris* G., Myrtenbeere, XII. 1., Myrtaceae.

Jambosella G., jambosenähnliche, 5. w. Freundschaftsinseln.

*Nelsonia* RB. (D. Nelson, Begleiter des Capitain Cook), II. 1., Acanthaceae.

hirsuta R. et S., rauhhaarige, 5. w. Ostindien.

*Nelumbium* Juss. (*Nelumbo* T.), [ceylanischer Name] XIII. VI., Nymphaeaceae.

caspicum Fisch., caspisches, 4. Wa. w. Caspisches Meer.

jamaicense DC., westindisches, 4. Wa. w. Jamaica.

luteum W. (*codophyllum* Rafin.), gelbes, 4. Wa. w. Carolina.

speciosum W., prächtiges, 4. Wa. w. Mittel- und Süd- asien, Aegypten.

Tamara Rhee., malabarisches, 4. Wa. w. Malabar.

*Nematostigma paniculatum* A. Diet. etc. v. *Libertia paniculata* etc.

*Nemesia* Vent., Nemesie, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

bicornis P., zweihörnige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn. chamaedryfolia Vent., gamanderblättrige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

floribunda Lehm., Benth., schönblühende, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

foetens Vent., stinkende, 4. k. Cap der guten Hoffn.

*Nemopanthus* Rafin., Hainblume, XXII. v., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

canadensis DC. (*fascicularis* Rafin.), canadische, 5. f. b. Nordamerika.

*Nemophila* Bartr., Triftenfreund, V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

atomaria Fisch. et Mey., punktirte, ☉. f. m. Ca forn. aurita Lindl., geöhrte, ☉. f. m. Californien.

insignis Benth., ausgezeichnete, ☉. f. m. Californien.

paniculata Spgl., rispige, 4. f. Nordamerika.

parviflora Dougl., kleinblumige, ♂. 4. f. Nordamerika.

peduncularis Dougl., langstielige, ☉. f. Californien.

phacelioides Bartr., phaceliaähnliche, 4. f. Nordamerika.

*Neottia* L. Rich., Nestorche, XX. 1., Orchideae.

aphylla Hook., blattlose, 4. w. Trinidad.

grandiflora Hook., großblumige, 4. w. Brasilien.

Nidus avis Sw., ächte, 4. f. Europa.

adnata Sw. v. *Pelexia adnata*, *australis* RB. etc. v. *Spiranthes australis* etc. *calcarata* Sw. (et *speciosa* Jacq. vid. *Stenorrhynchos calcaratum* etc.

## Neottia

*cordata* Rich. etc. v. *Listera cordata* etc. *procera* Ker, *repens* Sw. vid. *Goodyera procera* et *repens*.  
*speciosa* Jacq. v. *Stenorrhynchos specios.*

Nepenthes L., Kannenträger, XXII. XIII. (XVI. VII.),  
? Aroideae-Nepentheae.

*destillatoria* L., ceylonischer, 5. w. Ceylon.

*Phyllamphora* W. (*destillatoria* Lodd.), moluckischer,  
5. w. Molucken, Cochinchina.

## Nepeta R. L., Katzenmünze, XIV. I., Labiatae.

*acinifolia* Spgl., acinusblättrige, 4. f. ?

*amethystina* Poir. (*paniculata* Mill.), amethystfarbige,  
4. f. Südeuropa.

*angustifolia* Vahl (*aragonensis* Lam.), schmalblättrige,  
4. f. Spanien.

*botryoides* Ait. (*annua* Pall., *bipinnata* Cav., *multifida*  
L. suppl.), traubige, 4. f. Sibirien.

*Cataria* L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *citriodora* Balb.

*coerulea* Ait., blaue, 4. f. ?

*crispa* W., krause, 4. f. Kleinasien.

*diffusa* Fisch., weitschweifige, 4. f. Ostsibirien.

*fissa* C. A. Mey. (*laxa* Benth.), gespaltene, 4. f.  
Caucasus.

*frutescens* Lk., strauchige, 5. w. St. Vincent.

*grandiflora* MB. (*colorata* W., *melissaefolia* P.), groß-  
blumige, 4. f. Caucasus.

*graveolens* Vill. (*lanceolata* Lam.), starkriechende, 4. f.  
Oberitalien, Südfrankreich.

*imbricata* Lagasc., dichtblumige, 4. f. Spanien.

*incana* Ait. (*cyanea* Stev.), weißgraue, 4. f. Caucasus.

*italica* L., italienische, 4. f. Italien.

*lamiifolia* W., taubnesselblättrige, 4. f. Armenien.

*lanata* Jacq., wollige, 4. f. Spanien.

*latifolia* DC. (*grandiflora* Lapeyr.), breitblättrige, 4. f.  
Pyrenäen.

*lavandulacea* L. suppl. (*multifida* L.), lavendelähnliche,  
4. f. Sibirien.

*longiflora* Vent. (*salviaefolia* P., *Mussini* MB.), lang-  
blumige, 4. f. Armenien, Caucasus, Persien.

β) *glabrescens* Hoffm.

*macroura* Ledeb., langspige, 4. f. Sibirien.

*marrubioides* W., andornähnliche, 4. f. ?

*melissaefolia* Lam., melissenblättrige, 4. f. Creta.

β) *planilabiata* Rchb.

*multibracteata* Dsf., vieldeckblättrige, 4. f. Nordafrika.

*Nepetella* All., kleine, 4. f. Südeuropa.

*nuda* L. (*ucranica* MB.), nackte, 4. f. Mittel- und  
Osteuropa, Mittelasien.

*pannonica* L., ungarische, 4. f. Ost- und Südeuropa,  
Sibirien.

*parviflora* MB., kleinblumige, 4. f. Podolien, Taurien,  
Caucasus.

*racemosa* Lam., traubige, 4. f. Kleinasien.

*reticulata* Dsf., netzförmige, 4. f. Nordafrika.

*Scordotis* L., scordiumähnliche, 4. f. Creta, Nordafrika.

*serpyllifolia* MB., quendelblättrige, 4. f. Taurien.

*sibirica* MB., sibirische, 4. f. Sibirien.

*supina* Stev., liegende, 4. f. Caucasus.



**Nepeta**

*teucriifolia* W., gamanderblättrige, 4. f. Armenien.  
*teucrioides* Lam., gamanderähnliche, 4. f. Kleinasien.  
*tuberosa* L., knollige, 4. Kn. f. Spanien, Portugal.  
*ucranica* L., ukrainische, 4. f. Podolien, Taurien, Caucasus.

*violacea* L., violette, 4. f. Südeuropa, Sibirien.  
*croatica* Spgl. v. *Calamintha alba*. *malabarica* L.  
 v. *Anisomeles malabarica*. *marifolia* Cav. vid. *Calamintha marifolia*. *pectinata* L. v. *Hyptis pectinata*. *versicolor* Trev. v. *Craniotome versicolor*.

*Nephelium lappaceum* L. v. *Euphoria Nephelium*.

*Nephrodium acrostichoides* Mchx. v. *Aspidium acrostichoides*. *asplenioides* Mchx. v. *Asplenium Athyrium*. *filix foemina* Mchx. v. *Asplenium Michauxii*.

**Nerine** Herb., Nerine, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*aurea* Swt., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap der gut. H.  
*corusca* Herb., schimmernde, 4. Zw. t. Cap d. gut. H.  
*curvifolia* Herb., krummblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*flexuosa* Herb., gebogene, 4. Zw. t. Cap der gut. H.  
*humilis* Herb., niedrige, 4. Zw. t. Cap der guten H.  
*pulchella* Herb., schöne, 4. Zw. t. Cap der guten H.  
*radiata* Swt., strahlige, 4. Zw. t. w. China.

*rosea* Swt., rosafarbige, 4. Zw. t. Cap der guten H.  
*sarniensis* Ker, japanische (*Guernsey-Lilie*), 4. Zw. k. t. Japan.

*undulata* Herb., wellenblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

*venusta* Herb., liebliche, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

b) *minor*.

*versicolor* Herb., bunte, 4. Zw. t. Hybride.

*laticoma* Ker v. *Brunsvigia lucida*.

**Nerium** T., Oleander, Lorbeerrose, V. 1., Contortae-Apocynae.

*divaricatum* Lour., ausgespreizter, 5. k. t. Cochinchina.

*flavescens* Spin., gelblicher, 5. k. ?

*odorum* Ait., wohlriechender, 5. k. t. Ostindien.

b) *carneum*. c) *plenum*.

Oleander L., gemeiner, 5. 5. k. Südeuropa.

β) *album*. γ) *splendens*. b) *pomponium*. c)

*multiflorum*. d) *atropurpureum*. e) *grandiflorum*.

f) *lutescens*. g) *fol. variegat.* h) *macrophyllum*.

i) *versicolor*. k) *striatum*. l) *aurantiacum* etc.

*thyrsiflorum* Paxt., strauchblumiger, 5. t. Nepal.

*antidysentericum* L. et *coccineum* Wall. (et *tinctorium* Roxb.) v. *Wrightia antidysenterica* etc. *coronarium* Ait. vid. *Tabernaemontana coronaria*. *tinctorium* Hort. v. *Alstonia scholaris*.

**Nesaea** Commers., Nesaea, XI. 1., Lythariae.

*triflora* H. B. K., dreiblumige, 4. k. Südamerika.

*salicifolia* H. B. K. vid. *Heimia salicifolia*. *verticillata* H. B. K. v. *Decodon verticillatus*.

**Neslia** Desv., Neslie, XX. 1., Cruciferae.

*paniculata* L., rispige, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittelasien.

**Nestlera** Spgl. (C. G. Nestler, Professor der Botanik zu Straßburg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*biennis* Spgl., zweijährige, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

**Neurocarpum** Desv., Nervenhülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

guianense Desv., guianische, ♀. w. Guiana.

simplicifolium Kunth, einfachblättrige, ♀. w. Südamer.

**Neurochlaena** RB., Nervenkelch, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

lobata RB., gelappter, ♀. w. Westindien.

**Neuroloma** Andr., Neuroloma, XV. III., Cruciferae.

arabidiflorum DC., arabisblumiges, 2. f. b. k. Ost-sibirien.

**Neurosperma** Rafin., Nervensame, XXI. x., Cucurbitaceae.

cuspidata Rafin., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.

**Nicandra** Adans. (Nicander, alter griechischer Arzt), V. I., Solanaceae.

indica R. et S., indische, ♂. f. Ostindien.

physaloides G., schlutenähnliche, ♂. f. Peru.

anomala Lk. v. Anisodus luridus.

**Nicolsonia** DC. (Nicolson, Bearbeiter der Naturgeschichte St. Domingo's), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

barbata DC., bärtige, ♀. w. Jamaica.

**Nicotiana** T., Tabak (J. Nicot, französischer Gesandter, welcher den Tabak 1564 zuerst nach Frankreich brachte), V. I., Solanaceae.

acuminata Grah., zugespitzter, ♂. f. m. Buenos Ayres.

alata Lk., geflügelter, ♂. f. m. Südamerika.

angustifolia R. et P., schmalblättriger, ♂. f. m. Chili.

bonariensis Lehm., bonarischer, ♂. f. m. Buenos Ayres.

brasiliensis Lk. et Otto, brasilianischer, ♂. f. Brasilien.

cerinthoides Hornem., wachsb Blumenähnlicher, ♂. f. m. Brasilien.

chinensis Fisch., chinesischer, ♂. f. m. China.

decurrens Ag. (*persica* Lindl.), herablaufender, ♂. f. m. Persien.

dilatata Lk., verbreiteter, ♂. f. m. ?

fruticosa L., strauchiger, ♀. k. t. Südchina, Cap d. g. H.

glauca Grah., blaugrüner, ♀. k. t. Buenos Ayres.

glutinosa L., kleberiger, ♂. f. m. Peru.

humilis Dsf., niedriger, ♂. f. m. Aegypten.

Langsdorfii Weinm., Langsdorf's, ♂. f. m. Brasilien.

longiflora Cav., langblumiger, ♂. f. m. Buenos Ayres.

micrantha W. H. B., kleinblumiger, ♂. f. m. ?

multivalvis Lindl., vielklappiger, ♂. f. m. Columbia.

nana Lindl., zwergiger, ♂. f. Nordamerika.

nepalensis Lk. et Otto, nepal'scher, ♂. f. m. Nepal.

noctiflora Hook., nachtblumiger, ♂. f. m. Chili.

paniculata L., rispiger, ♂. f. m. Peru.

petiolata Ag., gestielter, ♂. f. m. Südamerika.

plumbaginifolia Viv. (*acutifolia* Hilar.), plumbagoblättriger, ♂. ♂. f. m. k. Südamerika.

pusilla L. (*tenella* Cav.), kleiner, ♂. w. Mexico.

quadrivalvis Pursh, vierklappiger, ♂. f. Nordamerika.

repanda W. (*lyrata* Kunth.), ausgeschweiffter, ♂. f. m. Cuba.

rotundifolia Lindl., rundblättriger, ♂. f. m. Schwanenflufs.

rustica L., Bauern-T., ♂. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika, Amerika.

β) tatarica Schult.

sanguinea Lk. et Otto, blutrother, ♂. f. m. Brasilien.

**Nicotiana**

*scabra* Lagasc., scharfer, ☉. f. m. Südamerika.  
*suaveolens* Lehm. (*undulata* Vent. RB.), feinriechender,  
 ☉. 4. f. m. k. Neuholland.

Szovitsi ? Fisch., Szovit's, ☉. f. m. ? Persien.

*Tabacum* L., gemeiner, ☉. f. m. Amerika.

a) *attenuata* R. et S. b) *macrophylla* Spgl. c)  
*pallescens* R. et S. d) *alipes* R. et S. e) *sero-*  
*tina* R. et S. f) *gracilipes* R. et S. g) *Verdan*  
 R. et S. h) *lingua* R. et S.

*undulata* R. et P. (*pulmonarioides* Kunth.), wellenblät-  
 teriger, ☉. f. m. Peru.

*vincaeflora* Lag., *vincablumiger*, ☉. ♂. f. m. k. Süd-  
 amerika.

*viscosa* Lehm., schmieriger, ☉. f. m. Buenos Ayres.

*ybarrensis* H. B. K., Ybarra-T., ☉. f. m. Südamerika.

*nyctaginiflora* Lehm. et *parviflora* Lehm. v. *Petunia*  
*nyctaginiflora* etc.

**Nierembergia** R. et P. (J. E. Nieremberg, ein spa-  
 nischer Jesuit, schrieb über naturhistorische Gegen-  
 stände), V. 1., Solanaceae.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, ♀. t. Chili.

*aristata* D. Don, grannige, ☉. ♀. t. Parana.

*calycina* Hook., großkelchige, 4. t. Uruguay.

*filicaulis* Lindl., fadenstengelige, 4. t. Buenos-Ayres.

*gracilis* Hook., schlanke, ♀. t. Chili.

*linariaefolia* Grah., flachsblättrige, ☉. ♀. t. Uruguay.

*intermedia* Grah. v. *Petunia intermedia*.

**Nigella** T., Schwarzkümmel, XIII. v., Ranunculaceae.

*aristata* Sm., gegranter, ☉. ♂. f. Griechenland.

*arvensis* L., Acker-S., ☉. f. Europa.

*ciliaris* DC., gefranzter, ☉. f. Syrien.

*coarctata* Gmel., gedrungener, ☉. f. Südeuropa.

*corniculata* DC., gehörnter, ☉. f. ?

*damascena* L. (*coerulea* Lam.), Garten-S. (Braut in  
 Haaren), ☉. f. Südeuropa.

b. flore pleno.

*divaricata* DC., ausgesperrter, ☉. f. Aegypten.

*hispanica* L., spanischer, ☉. f. Spanien.

*orientalis* L., morgenländischer, ☉. f. Syrien, Caucasus.

*sativa* L., gebauter, ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *cretica* DC. γ) *citrina* DC. δ) *indica* DC.

*segetalis* MB. (*foeniculacea* DC.), Saat-S., ☉. f. Taurien.

**Nigritella** Rich., Schwarzstendel, XX. 1., Orchideae.

*angustifolia* Rich., schmalblättriger, 4. Kn. f. Euro-  
 päische Alpen.

*globosa* Richb., kugelblumiger, 4. Kn. f. Mittel- und  
 Südeuropa.

*suaveolens* Koch (*fragrans* Saut.), wohlriechender, 4. Kn.  
 f. Schweiz, Tyrol.

**Nintoa** *confusa* Swt. *japonica* Swt. *longiflora* Swt. vid.  
*Lonicera confusa* etc.

**Nipa** Rumph (moluckischer Name), XXI. x., Palmae.

*fruticans* Thbg., strauchige, ♀. w. Java, Molucken.

**Nipholobolus** Kaulf., Häufchenfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

*adnascens* Kaulf., angewachsener, 4. w. Ostindien.

*albicans* Blume, weißlicher, 4. w. Ceylon.

*confluens* Spgl., zusammenfließender, 4. w. Neuholl.

*lineare* G. Don, gleichbreiter, 4. w. Japan.

*Lingua* Spgl., zungenförmiger, 4. w. Japan.



**Nipobolus**

- pertusus* Spgl., durchbrochener, 4. w. China, Bengalen.  
*rupestris* Spgl., Felsen-H., 4. w. Neuholland.  
*sinensis* J. Bevis, chinesischer, 4. w. China.

**Nissolia** Jacq. (F. Nissole, franz. Botaniker), XVII. 1v.  
(vi), Leguminosae-Papilionaceae.

- aculeata* Spgl., stachelige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*fruticosa* Jacq. L., strauchige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*glabrata* Lk., kahle, ♀. w. ?  
*microptera* Poir., kleinflügelige, ♀. t. w. Teneriffa.  
*racemosa* DC., traubige, ♀. Sch. w. Westindien.  
*retusa* W., abgestutzte, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*robiniaefolia* DC., robinienblättrige, ♀. w. St. Vincent.

**Nitraria** L., Nitrarie, XI. 1., Aizoideae-Tamariscineae.  
*Schoberi* L., Schober's, ♀. f. b. Mittelasien, Sibirien.

α) *sibirica* Pall. β) *casica* Pall.

- tridentata* Dsf., dreizählige, ♀. k. Nordafrika.

**Nivenia** RB. (J. Niven, welcher auf dem Cap der guten Hoffnung Pflanzen sammelte), IV. 1., Proteaceae.

- crithmifolia* RB., meerfenchelblättrige, ♀. t. C. d. g. H.  
*Lagopus* RB., wollige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*media* RB., mittlere, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
*parvifolia* RB., kleinblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*Sceptrum* RB., scepterförmige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*spathulata* RB., spathelblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.  
*spicata* RB., ährenförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

**Noccaea** mollis Jacq., *rigida* Cav. etc. v. *Lagascea mollis*,  
*helianthifolia* etc. — *alpina* Rchb., *brevicaulis* Rchb.  
v. *Hutchinsia alpina et breviscaulis*, *cepeaefolia* Rchb.  
(et *rotundifolia* Rchb.) v. *Thlaspi cepeaefolium* etc.  
*procumbens* Rchb. v. *Capsella procumbens*.**Noisettia** H. B. K. (L. C. Noisette, berühmter Hand-  
delsgärtner zu Paris), V. 1., Violaceae.

- longifolia* H. B. K., langblättrige, ♀. w. Südamerika.  
*pyrifolia* Mart. v. *Anchietea pyrifolia*.

**Nolana** L., Zymbelblume, V. 1., Solanaceae.

- atriplicifolia* D. Don., meldenblättrige, ☉. f. m. Peru.  
*grandiflora* Lehm., großblumige, ☉. f. m. Chili.  
*paradoxa* Lindl., wunderbare, ☉. f. m. Chili.  
*prostrata* L., niederliegende, ☉. f. m. Peru.  
*tenella* Lindl., zarte, ☉. f. m. Chili.

**Nolina** Mchx. (P. C. Nolin, amerikanischer Botaniker),  
VI. 111., Colchicaceae.

- georgiana* Mchx., georgische, 4. f. b. k. Südcarolina,  
Georgien.

**Nonatelia** Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

- lutea* Aubl., gelbe, ♀. w. Guiana.  
*officinalis* Aubl., officinelle, ♀. w. Jamaica, Guiana.  
*racemosa* Aubl., traubige, ♀. w. Guiana.  
*violacea* Aubl., violette, ♀. w. Guiana.

**Nonnea** Medic. (J. P. Nonne, ehem. Prof. d. Botanik  
zu Erfurt), V. 1., Asperifoliaceae.

- ciliata* R. et S., gefranzte, ☉. f. Armenien.  
*flavescens* C. A. Mey., gelbliche, ☉. f. Südrussland.  
*lutea* DC., gelbe, ☉. f. Südeuropa.  
*nigricans* DC., schwärzliche, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.  
*picta* Swt., bemalte, ☉. f. Taurien.  
*pulla* DC., schwarzbraune, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.  
*rosea* Lk., rosafarbige, ☉. f. Caucasus, caspisches Meer.

**Nonnea**

- sordida Fisch. et Mey. (*heterotricha* Auct.), schmutzig-farbige, ☉. f. Caspisches Meer.  
 versicolor Swt., buntfarbige, ☉. f. Caucasus.  
 violacea DC., violette, ☉. f. Südeuropa.  
*arvensis* DC. *obtusifolia* R. et S. v. *Lycopsis arvensis* et *obtusifolia*.

**Norantea** Aubl. (Gonoro-Antegri, guianischer Name), XIII. 1., Guttiferae-Marcgraviaeae.

- brasiliensis Choix., brasilianische, ♀. w. Brasilien.  
 guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana.

**Notelaea** Vent., Südolive, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

- ligustrina Vent., ligusterähnliche, ♀. t. Van-Diemens-Land.  
 longifolia Vent. (*rigida* Dsf.), langblättrige, ♀. t. k. Neuholland.

ovata RB., eiförmige, ♀. t. k. Neuholland.

punctata RB., punctirte, ♀. t. k. Neuholland.

**Nothites** Cass., Abkraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

- melissaefolia DC. (*latifolia* Cass.), melissenblättriges, 4. w. Peru.

**Nothochlaena** RB., Wollfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

- distans RB. (*remota* Kaulf.), entferntblättriger, 4. w. Neuholland, Neucaledonien.

Eckloniana J. Bevis, Ecklon's, 4. t. w. Cap d. g. H.

lanuginosa Desv., ächter, 4. t. w. Griechenland, Spanien, Nordafrika.

Marantae RB., Maranta's, 4. k. t. Südeuropa, Teneriffa.

nivea Desv., schneeweißer, 4. w. Südamerika.

piloselloides Kaulf., pilosellaähnlicher, 4. w. Ostindien, Japan.

Pumilio RB., kleiner, 4. w. Neuholland.

sinuata Kaulf., buchtiger, 4. w. Neuspanien, Peru.

tenera Gill., zarter, 4. w. Mendoza.

*cheilanthoides* Spgl. v. *Cheilanthes microphylla*.

**Notobasis** Cass., Hülldistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

- syriaca Cass., syrische, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Syrien, Nordafrika.

**Notoceras** RB., Hornschote, XV. 111., Cruciferae.

canariense RB., canarische, ☉. f. Canarische Inseln.

hispanicum DC., spanische, ☉. f. Spanien.

quadricorne DC., vierspitzige, ☉. f. Sibirien.

**Notylia** Lindl., Schwielenorche, XX. 1., Orchideae.

Barkeri Lindl., Barker's, 4. w. Mexiko.

incurva Lindl., einwärtsgekrümmter, 4. w. Trinidad.

micrantha Lindl., kleinblumiger, 4. w. Demerara.

punctata Lindl., punctirter, 4. w. Trinidad.

tenuis Lindl., dünner, 4. w. Demerara.

**Nunnezia fragrans** W. v. *Chamaedorea fragrans*.**Nuphar** Sm. (*Nenuphar* Hayne), Neufar, arabischer Name für Nymphaea, XIII. 1. Nymphaeaceae.

advenum Ait., dreifarbige, 4. Wa. f. Nordamerika.

Kalmianum Ait., Kalm's, 4. Wa. f. Nordamerika.

luteum Sm., gelbe, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamer.

pumilum Sm. (*minima* Sm.), kleine, 4. Wa. f. Nordeuropa.

sagittaeifolium Pursh, pfeilblättrige, 4. Wa. f. k. Carolina, Georgia.

sericeum Lang, seidenhaarige, 4. Wa. f. Ungarn.

**Nuphar**

Spennerianum Gaud., Spenner's, 4. Wa. f. Süd-  
deutschland.

**Nuttallia** Dick. (Thomas Nuttall, Professor der Bo-  
tanik zu Philadelphia), XVI. VIII., Malvaceae.

cordata Lindl., herzblättrige, 4. f. b. k. Nordamerika.

digitata Dick., Hook. (*grandiflora* Paxt., ? *speciosa* Hort.),  
fingerförmige, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

malvaeflora Fisch. et Mey., malvenblumige, 4. f. b. k.  
Columbia.

Papaver Grah., mohnartige, 4. f. b. k. Louisiana.

pedata Dick., Nutt., fußförmige, 4. Kn. f. b. k. Nord-  
amerika.

**Nyctanthes** L., Nachtblume, II. I., Sapotaceae-  
Jasmineae.

arbor tristis L., baumartige, 5. w. Ostindien.

**Nycterinia** D. Don, Nachtlarvler, XIX. II., Personatae-  
Antirrhineae.

fragrans D. Don, wohlriechender, 5. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.

lychnidea D. Don, lychnisähnlicher, 5. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.

tristis D. Don, dunkelblumiger, 5. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.

**Nycterisition** R. et P., Fledermausbaum, V. I.,  
Sapotaceae.

ferrugineum R. et P., rostfarbiger, 5. w. Südamerika.

**Nycterium** Vent., Nachtkraut, V. I., Solanaceae.

amazonium Lk. (*Lamberti* Swt.), Amazonen-N., 5. t.  
Mexico.

cordifolium Vent. (*Vespertilio* Lk.), herzblättriges, 5. t.  
Canarische Inseln.

cornutum Lk., gehörntes, 5. t. Mexico.

Fontanesianum Dun., Desfontaine's, 6. f. m. ? Brasilien.

heterandrum \* (*lobatum* Swt.) verschiedenbeuteliges,  
6. f. Louisiana.

heterodoxon Dun., veränderliches, 6. f. m. Mexico.

rostratum Lk., schnabelförmiges, 6. f. m. Mexico.

**Nymphaea** T., Seerose, XIII. I., Nymphaeaceae.

alba L., weiße, 4. Wa. f. Europa, Canada.

β) canadensis.

ampla DC. (*Rudgeana* Mey.), große, 4. Wa. w. West-  
indien, Aegypten.

blanda Mey., liebliche, 4. Wa. w. Surinam.

coerulea Savign. (*stellata* var. Bot. mag.), blaue, 4.  
Wa. w. Unterägypten.

cyanea Roxb. (*caklara* Donn), kornblumenblaue, 4.  
Wa. w. Ostindien.

edulis DC., genießbare, 4. Wa. w. Bengalen.

Lotus L., Lotus-S., 4. Wa. w. Aegypten.

minor DC. (*odorata* β. *minor* Sims), kleine, 4. Wa. f.  
Nordamerika.

nitida Sims (*odorata* W.), glänzende, 4. Wa. f.  
Sibirien.

odorata Ait., wohlriechende, 4. Wa. f. Nordamerika.

pubescens W., weichhaarige, 4. Wa. w. Ostindien.

pygmaea Ait., zwergige, 4. Wa. w. China.

reniformis Walt., nierenförmige, 4. Wa. k. Carolina.



**Nymphaea**

*rubra* Roxb., rothe, 4. Wa. w. Ostindien.

β *rosea* Bot. mag.

*scutifolia* DC. (*coerulea* Andr.), schildblättrige, 4. Wa. w. Cap der guten Hoffnung.

*stellata* W., sternförmige, 4. Wa. w. Malabar.

*thermalis* DC. (*Lotus* W. K.), ungarische, 4. Wa. w. Ungarn.

*versicolor* Roxb., buntfarbige, 4. Wa. w. Bengalen.

*advena* Ait. etc. v. *Nuphar advenum*. *Nelumbo* L.

v. *Nelumbium speciosum*.

**Nyssa** L., Tupelobaum, V. I. (XXIII. II.), Sandalaceae.

*aquatica* L. (*biflora* Mchx., *caroliniana* Poir.), Wasser-T., f. f. b. Nordamerika.

*candicans* Mchx. (*capitata* Walt., *coccinea* Bartr.), weislicher, f. f. b. Nordamerika.

*denticulata* Ait. (*grandidentata* et *angulisans* Mchx., *angulosa* Poir., *uniflora* Wangenh.), gezähnelter, f. f. b. k. Carolina.

*tomentosa* Mchx., filziger, f. f. b. Nordamerika.

*villosa* Mchx. (*sylvatica* et *montana* Hort., *multiflora* Wangenh., *integrifolia* Ait.), zottiger, f. f. b. Nordamerika.

*Obeliscaria columnaris* DC., *pinnata* Cass. etc. vid. *Rudbeckia columnaris* etc.

**Oberonia** Lindl., Oberonie, XX. I., Orchideae.

*recurva* Lindl., zurückgekrümmte, 4. w. Bombay.

**Obesia** Haw. v. *Stapelia*.**Obione** *muricata* G. v. *Atriplex sibirica*.**Ochna** L., Ochne, XIII. I., Tricoccae-Ochnaceae.

*arborea* Burch., baumartige, f. t. w. Cap der gut. H. *atropurpurea* DC., schwarzpurpurrothe, f. t. Cap der guten Hoffnung.

*lucida* Lam. (*squarrosa* Rottb.), schimmernde, f. w. Ostindien.

*mauritiana* Lam., mascarenische, f. w. Mascarenas.

*multiflora* DC., vielblumige, f. w. Sierra Leone, Ostindien.

*nitida* DC., glänzende, f. w. Ostindien.

*obtusata* DC. (? *squarrosa* L.), stumpfblättrige, f. w. Ostindien.

*zeylanica* Lam. v. *Gomphia zeylanica*.

**Ochroma** Sw., Bleichwolle, XVI. II., Malvaceae-Bombaceae.

*Lagopus* Sw., hasenfußförmige, f. w. Westindien.

*tomentosum* W., filzige, f. w. Südamerika.

**Ochrosia** Juss., Bleichholz, V. I., Contortae-Apocynae.

*borbonica* Juss., borbonisches, f. w. Mascarenas.

**Ochrus** P., Bleicherbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*pallida* P., südliche, ☉. Sch. f. Südeuropa, Griechenl.

**Ochthodium** DC., Warzennüßchen, XV. I., Cruciferae.

*aegyptiacum* DC., ägyptisches, ☉. f. Aegypten, Syrien, Griechenland.

**Ocotea turbacensis** H. B. K. v. *Laurus exaltata*.**Octomeria** RB., Octomerie, XX. II., Orchideae.

*gracilis* Lodd., schlanke, 4. w. Brasilien.

**Octomeria**

graminifolia RB., grasblättrige, 4. w. Westindien.

serratifolia Hook., sägeblättrige, 4. w. Brasilien.

spicata D. Don, ährige, 4. w. Nepal.

teretifolia Batem., rundblättrige, 4. w. Brasilien.

**Ocymum** T., Basilienkraut, XIV. 1., Labiatae.

album L., weisses, ☉. f. m. w. Ostindien, Java.

americanum L., amerikanisches, ☉. f. m. w. Südamer.

Basilicum L., gemeines, ☉. f. m. Ostindien, Persien.

β) crispum. γ) latifolium. δ) maximum (*bullatum*). ε) nigrum.

canum Sims, weisßgraues, ☉. f. m. China.

caryophyllatum Roxb., nelkenduftendes, 4. w. Ostind.

cordifolium Boj., herzblättriges, ♀. w. ? Mauritius.

crispum Thbg., krauses, ☉. f. m. Japan.

febrifugum Ker, Lindl., fiebertreibendes, ♀. w. Sierra Leone.

grandiflorum L'Her., großblumiges, ♀. w. Abyssinien, Arabien.

gratissimum L., angenehmes, ♀. w. Ostindien.

inodorum Lam., geruchloses, ☉. f. m. Ostindien.

menthoides L., münzenähnliches, ☉. f. m. Ostindien.

micranthum W., kleinblumiges, ☉. f. m. ?

minimum L., kleinstes, ☉. f. m. Ceylon.

b) nigrum.

pilosum W., haariges, ☉. f. m. ?

sanctum L., heiliges, ☉. f. m. Ostindien.

suave W. (*urticaefolium* Roth), lieblichriechendes, ♀. w. ?

thyrsiflorum L., straufsblumiges, ☉. ♂. w. Ost- und Westindien.

villosum Roxb., zottiges, 4. w. Ostindien.

viride W. (*viridiflorum* Roth), grünes, ♀. w. ?

*capitellatum* L. vid. *Acrocephalus capitatus*. *molle*

Ait., *monachorum* L. (et *scutellarioides* L.) vid.

*Plectranthus mollis* etc. *polycladum* Lk., *poly-*

*stachyon* L. etc. v. *Moschosma ocymoides* etc.

*Odontarrhena Marshalliana* C. A. Mey. etc. vid. *Alyssum Marshallianum* etc.

**Odontites** Hall., Zahntrost, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.

linifolia Rehb., flachsblättriger, ☉. f. Italien, Südfrankreich.

lutea Rehb., gelber, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

serotina Rehb., spätblumiger, ☉. f. Südeuropa.

verna Rehb., Frühlings-Z., ☉. f. Europa.

**Odontoglossum** H. B. K., Zahnstendel, XX. 1., Orchideae.

cordatum Lindl., herzförmiger, 4. w. Mexico.

**Oeceoclades** Lindl., Aststendel, XX. 1., Orchideae.

falcata Lindl., sichelförmiger, 4. w. China.

maculata Lindl., gefleckter, 4. w. Afrika.

**Oedera** L. (G. C. Oeder, dänischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

prolifera L., sprossende, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*aliena* L. fl. Jacq. v. *Heterolepis decipiens*.

**Oedipachne** Lk., Haarspindel, III. 11., Gramineae.

punctata Lk., punktirte, 4. w. Westindien, Südamerika, Westafrika, Neuholland.

**Oenanthe** T., Rebendolde, V. II., Umbelliferae.

*apiifolia* Broter., sellerieblättrige, 4. Kn. f. Portugal.  
*crocata* L., safranfarbige, 4. Kn. f. England, Galicien.  
*fistulosa* L., röhrlige, 4. f. Europa.

β) *Tabernaemontani* Gmel.

*globulosa* L. (*diffusa* Lag.), kugelfrüchtige, 4. Kn. f.  
 b. k. Südeuropa, Nordafrika.

*inebrians* Thbg., trunkenmachende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*interrupta* Thbg., unterbrochene, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*involuta* Cav., hüllige, 4. f. b. Spanien.

*Lachenalii* Gmel. (*rhenana* DC., *megapolitana* W., *mi-chelfeldensis* Lach., *gymnorrhiza* Brignol.), Lachenal's, 4. f. Nord- und Süddeutschland, Italien, Frankreich, Nordamerika.

*nodiflora* Schousb., knotenblumige, 4. ♂. f. Nordafrika.

*peucedanifolia* Poll. (*Pollichii* Gmel., *filipenduloides* Thuill.), haarstrangblättrige, 4. Kn. f. Mitteleuropa, Nordamerika.

β) *approximata* Merat.

*pimpinelloides* L. (*chaerophylloides* Pour.), bibernellblättrige, 4. Kn. f. Mittel- und Westeuropa.

β) *rapacea* Koch (β. *pimpinellaefolia* DC., *vir-gata* Poir.).

*prolifera* L., sprossende, 4. Kn. f. b. Süditalien, Creta, Kleinasien.

*silaifolia* MB. (*virgata* Hort., *prolifera* Host.), silausblättrige, 4. Kn. f. England, Krain, Taurien.

*tenuifolia* Thbg., feinblättrige, 4. k. Cap der gut. H.

**Oenocarpus** Mart., Weinfrucht, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

*Batava* Mart., Batava-W., h. w. Südamerika.

**Oenoplia volubilis** R. et S. v. *Berchemia volubilis*.**Oenothera** L. (*Onagra* T.), Nachtkerze, VIII. I., Onagrariae.

*acaulis* Cav. (*taraxucifolia* Swt. et Hort.), stengellose, 4. k. Chili.

*albicans* Lam., weißliche, ♂. f. k. Peru.

*albicaulis* Fras., weißstengelige, ♂. f. Nordamerika.

*ambigua* Nutt. (*canadensis* Gold.), zweifelhafte, 4. f. b. Nordamerika.

*anisoloba* Swt., ungleichlappige, 4. k. Chili.

*biennis* L., gemeine, ♂. f. Nordamerika, Europa.

β) *gauroides* Hornem.

*bifrons* D. Don, zweiflügelige, ♂. k. Texas.

*caespitosa* Sims (*scapigera* Pursh), rasenartige, 4. f. Nordamerika.

*chilensis* H. Par., chilesische, ♂. f. Chili.

*clavata* Kunth, keulförmige, ♂. f. Mexico.

*corymbosa* Lam., traubendoldige, ♂. 4. f. k. Mexico.

*cruciata* Nutt., kreuzblumige, ♂. f. Nordamerika.

*decumbens* Dougl., niederliegende, ♂. f. Westliches Nordamerika.

*densiflora* Lindl., dichtblumige, ♂. f. Neucalifornien.

*Drummondii* Hook., Drummond's, 4. k. Texas.

*erosa* Hornem., ausgebissene, ♂. f. ?



**Oenothera**

*Fraseri* Pursh (*tetragona* Roth, *mollis* Goldie), Fraser's,  
4. f. Nordamerika.

b) *variegata* J. C.

*fruticosa* L., strauchige, 4. f. Nordamerika.

*glauca* Mchx., blaugrüne, 4. f. Nordamerika.

b) *variegata* Hort.

*globularis* H. C., kugelförmige, ♂. f. ?

*gracilis* Schrad. (*riparia* Nutt.), schlanke, ♂. 4. f.  
Nordamerika.

*grandiflora* Ait. (*suaveolens* P.), großblumige, ☉. f.  
Nordamerika.

β) *spectabilis* Hornem.

*humifusa* Nutt. (*concinna* D. Don), niedergestreckte, ☉.  
f. Florida.

*hybrida* Mchx., Bastard-N., 4. f. Nordamerika.

*incana* Bart., greisgraue, ♂. f. Nordamerika.

*Lindleyana* Dougl., Lindley's, ☉. f. Westl. Nordamer.

*linearis* Mchx., gleichbreitblättrige, 4. f. b. Nordamer.

*longiflora* Jacq., langblumige, ☉. ♂. f. Buenos-Ayres.

*macrocarpa* Pursh, großfrüchtige, 4. f. Nordamerika.

*media* Lk., mittlere, 4. f. b. k. Nordamerika.

*missouriensis* Sims (*alata* Nutt.), missourische, 4. f.  
Nordamerika.

*mollissima* L., weichblättrige, ♂. f. Buenos-Ayres.

*muricata* Murr., weichstachelige, ♂. f. Nordamerika.

*nervosa* Horn., nervige, ♂. 4. f. ?

*nocturna* Jacq., nächtliche, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

*odorata* Jacq. (*undulata* Dryand.), wohlriechende, ♂. f.  
Patagonien.

*parviflora* L., kleinblumige, ♂. f. Nordamerika.

*pinnatifida* Nutt., fiederspaltige, ☉. f. Nordamerika.

*pubescens* W., weichhaarige, ♂. f. k. Südamerika.

*pumila* L., kleine, 4. f. Nordamerika.

*purpurea* L., purpurfarbige, ☉. f. Westl. Nordamerika.

*pusilla* Mchx., zwergige, 4. f. Nordamerika.

*quadrivulnera* Dougl., vierfleckige, ☉. f. Westliches  
Nordamerika.

*Romanzovii* Ledeb., Romanzov's, ☉. f. Westliches  
Nordamerika.

*rosea* Ait., rosafarbige, 4. k. Peru.

*roseo-alba* Bernh. (*amoena* Hort.), weifs-rothe, ☉. f.  
Nepal.

*salicifolia* Dsf., weidenblättrige, ♂. f. ?

*Sellowii* Lk. et Otto, Sellow's, ♂. k. Monte-Video.

*serotina* Hort., spätblumige, ♂. 4. f. ?

*serrulata* Nutt., sägezähnige, 4. f. b. k. Nordamerika.

*sinuata* L. (*laciniata* Hill), buchtigblättrige, ☉. f.  
Nordamerika.

β) *minima* Hook.

*speciosa* Nutt., prächtige, 4. f. b. k. Louisiana.

b) *major* J. C.

*stricta* Ledeb. (*mutabilis* H. P.), steife, ☉. f. ?

*tenella* Cav., zarte, ☉. f. Chili.

*tenuifolia* Cav., dünnblättrige, ☉. f. Peru.

*tetraptera* Cav., vierflügelige, ☉. 4. f. k. Neuspanien.

*triloba* Bartr. (*rhizocarpa* Spgl.), dreilappige, 4. f.  
Nordamerika.

*verticillata* F. et Mey., wirtelförmige, ☉. f. ? Westliches  
Nordamerika.

**Oenothera**

*villosa* Thbg., zottige, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. Hoffn.  
*viminea* Dougl., gertenartige, ☉. f. Westl. Nordamerika.  
*virgata* R. et P., ruthenförmige, ☉. f. Peru.

*Chamissonis* Lk. (*dentata* Lindl.), *cheiranthifolia* Hornem., *contorta* Dougl., *hirta* Lk. (*micrantha* Hornem.), *minima* Pursh, *spiralis* Hook. v. *Sphaerostigma Chamissonis*, *cheiranthifolium*, *minutiflorum*, *hirtum*, *minimum* et *spirale*.

**Ohlendorffia** Lehm. (Ohlendorff, botanischer Gärtner in Hamburg), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

*procumbens* Lehm., niederliegende, ♀. k. t. Südafrika.

**Ola** L., Kelchnuß, III. I., Sapotaceae-Olacineae.

*imbricata* Roxb., dachblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.

*scandens* Roxb., schlingende, ♀. Sch. w. Ostindien.

**Oldenlandia** L. (H. B. Oldenland, dänischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.

*corymbosa* L., traubendoldige, ☉. f. m. Südamerika, Cap der guten Hoffnung.

*diffusa* Roxb., weitschweifige, ☉. f. m. Ostindien.

*herbacea* Roxb., krautige, ☉. f. m. Ostindien.

*lactea* Cham. et Schltdl. (*umbellata* Hort., *Hedyotis lactea* W., *cymosa* Spgl.), milchweisse, ☉. f. m. Ostindien.

*ramosissima* Fisch., ästige. ☉. 4. w. ?

*umbellata* L., doldige, ☉. ♂. f. m. w. Ost- und Westindien.

*Deppeana* Cham. et Schl. v. *Gerontogea Deppeana*.  
*repens* L. v. *Dentella repens*.

**Olea** T., Oelbaum, II. I., Sapotaceae-Oleaceae.

*americana* L., amerikanischer, ♀. k. t. Carolina.

*capensis* L., capischer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

*cernua* Vahl (*obtusifolia* Lam.), übergebogener, ♀. ♀. w. Mascarenas.

*chrysophylla* Lam. (*europaea ferruginea* Ait.), goldblättriger, ♀. k. ?

*dioica* Roxb., zweihäusiger, ♀. w. Ostindien.

*emarginata* Vahl, Lam., ausgerandeter, ♀. w. Madagascar.

*europaea* L. (*sativa* Lk.), gemeiner, ♀. k. Südeuropa, Orient.

β) *longifolia*, γ) *latifolia*. δ) *obliqua*. ε) *buxifolia*.

*excelsa* Ait. (*exasperata* Jacq.), hoher, ♀. k. t. Canarische Inseln.

? β) *arborea* Lodd.

*fragrans* Thbg., wohlriechender, ♀. k. t. China, Japan, Cochinchina.

*lancea* Lam. (*exasperata* W.), lanzettblättriger, ♀. w. Mascarenas.

*Oleaster* Lk. et Hoffg., wilder, ♀. k. Süd- und Westeuropa.

*paniculata* RB., rispiger, ♀. k. t. Neuholland.

*Roxburghii* Spgl. (*paniculata* Roxb.), Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

*undulata* Jacq., wellenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*verrucosa* Lk., warziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*apetala* Andr. v. *Notelaea longifolia*.

**Olearia dentata** Mch. etc. v. *Aster dent.* etc.

- Oligocarpus** Less., Kargfrüchtler, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.  
*calendulaceus* Less., calendulaähnlicher, 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.
- Olinia** Thbg., Olinie, V. i., Rhamneae.  
*cymosa* Thbg., afterdoldige, f. k. t. Cap der gut. H.
- Oliveria** Vent. (G. A. Olivier, französischer Naturforscher, welcher den Orient und Aegypten bereiste), V. ii., Umbelliferae.  
*decumbens* Vent., niederliegende, ☉. f. Bagdad.
- Olynthia** Lindl., Olynthie, XII. i., Myrtaceae.  
*disticha* Lindl., zweizeilige, f. w. Jamaica.
- Olyra** L., Olyra, XXI. iii. (III. ii.), Gramineae.  
*latifolia* L. (*paniculata* Sw.), breitblättrige, 4. w. Jamaica.  
*pauciflora* Sw. (*axillaris* Sw.), wenigblumige, 4. w. Jamaica, Cajenne.
- Omalanthus** Ad. Juss., Flachblumig, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*populifolius* Grah., pappelblättrige, f. w. t. Neuhol.
- Omalotheca** *supina* DC. v. Gnaphalium *supinum*.
- Omphalea** L., Omphalea (Nabelanthere), XXI. x. (XVI. i.), Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*diandra* L. (*cordata* Sw.), zweimännige, f. w. Westind.  
 β) *diversifolia*.  
*triandra* L. (*nucifera* Sw.), dreimännige, f. w. Westindien, Südamerika.
- Omphalobium** G., Nabelstrauch, XVI. vi., Amyrideae-Connaraceae.  
*africanum* DC., afrikanischer, f. w. Westafrika.  
*indicum* G., indischer, f. w. Ceylon, Molucken.  
*Schotia* Jcq. fil. v. *Schotia latifolia*.
- Omphalodes** T., Venusnabel, V. i., Asperifoliaceae.  
*amplexicaulis* Lehm. (*Cynoglossum brassicaefolium* Lag., *lusitanicum* Vahl), stengelumfassender, ☉. f. Spanien.  
*linifolia* Mch., flachsblättriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
*litoralis* Lehm., Strand-V., ☉. f. Westfrankreich.  
*myosotoides* Decaisne, mausöhrchenähnlicher, 4. k. Libanus, Creta.  
*nitida* Lehm. (Cynogl. *lusitanicum* Brot.), glänzender, 4. f. b. k. Portugal.  
*scorpioides* Schrk., Lehm., vergiftsmeinnichtähnlicher, 4. f. Böhmen, Mähren, Sachsen etc.  
*sempervirens* D. Don, immergrüner, 4. f. England, Südeuropa.  
*verna* Mch., Frühlings-V. (Garten-Vergiftsmeinnicht), 4. f. Südeuropa.
- Oncidium** Sw., Höckerstendel, XX. i., Orchideae.  
*altissimum* Sw., höchster, 4. w. Westindien.  
*ampliatum* Lindl., breitlippiger, 4. w. Südamerika.  
*barbatum* Lindl., bärtiger, 4. w. Südamerika.  
*bicornutum* Hook., zweihörniger, 4. w. Brasilien.  
*bifolium* Sims, zweiblättriger, 4. w. Südamerika.  
*carthagenense* Sw., carthagenischer, 4. w. Jamaica, Neu-Granada.  
*Cavendishianum* Batem., Cavendish's, 4. w. Guatimala.  
*Cebolleta* Sw., bauchblättriger, 4. w. Neu-Granada.



**Oncidium**

- ciliatum Lindl., gefranzter, 4. w. Brasilien.  
 citrinum Lindl., citronfarbiger, 4. w. Trinidad.  
 confragosum Lindl., rauher, 4. w. Mexico.  
 cornigerum Lindl., gehörnter, 4. w. Brasilien.  
 crispum Lodd., krauser, 4. w. Brasilien.  
 deltoideum Lindl., deltaförmiger, 4. w. Peru.  
 divaricatum Lindl., ausgesperrter, 4. w. Brasilien.  
 Donianum Batem., Don's, 4. w. Guatemala.  
 flexuosum Ker, gebogener, 4. w. Brasilien.  
 Forbesii Hook., Forbes's, 4. w. Südamerika.  
 Harrisonianum Lindl., Harrison's, 4. w. Brasilien.  
 hians Lindl., klaffender, 4. w. Brasilien.  
 intermedium Berter., mittlerer, 4. w. Jamaica.  
 iridifolium H. B. K., schwertelblättriger, 4. w. Surinam.  
 juncifolium Spgl., simsensblättriger, 4. w. Westindien.  
 Lanceanum Lindl., Lance's, 4. w. Südamerika.  
 Lemonianum Lindl., Lemon's, 4. w. Havana.  
 leucochilum Lindl., weifslippiger, 4. w. Demerara.  
 lunatum Lindl., mondförmiger, 4. w. Demerara.  
 luridum Lindl., graubrauner, 4. w. Südamerika.

β) guttatum Lindl. (*Boydii* Hort.).

- ornithorrhynchon H. B. K., vogelschnabelähnlicher, 4. w. Mexico.

- Papilio Lindl., schmetterlingsblumiger, 4. w. Trinidad.  
 puber Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.  
 pulchellum Hook., schöner, 4. w. Westindien.  
 pulvinatum Lindl., polsterförmiger, 4. w. Brasilien.  
 pumilum Lindl., kleiner, 4. w. Brasilien.  
 raniferum Lindl., froschlauchähnlicher, 4. w. Brasilien.

β) majus Hook.

- Russelianum Lindl., Russel's, 4. w. Brasilien.  
 stramineum Batem., strohfarbiger, 4. w. Vera-Cruz.  
 Tayleurii Batem., Tayleur's, 4. w. Mexico.  
 tetrapetalum W., vierkronenblättriger, 4. w. Westind.  
 triquetrum RB., dreiseitiger, 4. w. Jamaica.  
 variegatum Sw., bunter, 4. w. Westindien.

**Oncorhynchus** Fisch. et Mey., Schnabellippler, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

- tenellus Fisch. et Mey., zarter, ☉ ♂. f. k. Chili.

**Onobroma** G., Kreuzdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

- flavescens Spgl., gelbliche, ☉. f. Armenien.

*arborescens* Spgl. et *dentatum* Spgl. et *glaucum* Spgl. v. *Kentrophyllum arborescens* etc. *coeruleum* G. (et *mitissimum* Spgl., *monspeliense* Spgl. et *pinnatum* Spgl.) vid. *Carduncellus coeruleus* etc. *corymbosum* Spgl. vid. *Broteroa corymbosa*. *cynaroides* Spgl., *macrocephalum* Mey. v. *Cousinia cynaroides* etc. *salicifolium* Lk. vid. *Carlina salicifolia*.

**Onobrychis** T., Esparsette, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- alba Spgl., weisse, ♂. 4. f. Ungarn.

arenaria DC. (*carnea* Schlchr.), Sand-E., ♂. 4. f. Südliche Schweiz, österreichisches Litorale, Ungarn.

- Buxbaumiana Desv. (*Hedysarum Pallasi* W., *H. Buxbaumianum* Pall., *radiatum* Dsf.), Buxbaum's, 4. f. Armenien, Taurien.

**Onobrychis**

Caput galli Lam., Hahnenkopf-E., ☉. f. Süd- und Westeuropa.

carpathica (W. Kit.), carpathische, ♂. 4. f. Carpathen.

conferta Spgl., gedrängte, ♂. 4. f. Numidien, Caucasus.

cretica Desv., cretische, ♂. f. Creta, Süditalien.

crinita Spgl., mähnlige, ♀. w. Ostindien.

Crista galli Lam., Hahnenkamm-E., ☉. f. Südeuropa.

exaltata Fisch., hohe, ♂. 4. f. Taurien.

glabra Desv., kahle, ♂. 4. f. Taurien.

gracilis Bess., schlanke, ♂. 4. f. Podolien.

Hohenackeriana C.A.Mey., Hohenacker's, 4. f. Talüsch.

mareotica Stev., mareotische, ♂. 4. f. Osteuropa.

montana DC., Berg-E., ♂. f. Italienisch-franz. Alpen.

orientalis Desv. (*Hedysarum cornutum* L.), morgenländische, ♀. f. b. k. Armenien.

petraea Spgl. (*tanaitica* Spgl.), Felsen-E., ♂. 4. f. Caucasus.

picta Desv. (*Michauxii* DC.), buntfarbige, ♂. 4. f. Levante.

procumbens Stev., niederliegende, ♂. 4. f. Caucasus.

ptolemaica Spgl., ptolemäische, ♂. 4. f. b. k. Aegypten.

sativa Lam. (*viciaefolia* Scop.), gemeine, ♂. 4. f. Europa, Mittelasien.

saxatilis Lam., Gesteins-E., ♂. 4. f. Südfrankreich, Italien.

supina DC., niedrige, ♂. 4. f. Frankreich.

*sororia* Dsf. v. *Eleiotis sororia*.

**Onoclea** L., Fühlfarn (Rofsarn), XXIV. I., Pterideae.

obtusiloba Schk., stumpflappiger, 4. f. Pennsylvanien.

sensibilis L., virginischer, 4. f. Virginien.

*Spicant* Hoffm. v. *Lomaria Spicant*. *Struthiopteris*

Sw. v. *Struthiopteris germanica*.

**Ononis** T., Hauhechel, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides L., fuchsschwanzartige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

angustissima Lam., schmalblättrige, ♀. k. Spanien.

antiquorum L. (*spinosa* γ. *glabra* DC.), kahlstachelige, ♀. f. Südeuropa.

apula Ten., apulische, ♂. f. k. Apulien.

aragonensis Asso. (*dumosa* Lap.), aragonische, ♀. f. b. k. Spanien.

arborescens Dsf., großstrauchige, ♀. k. Numidien.

arenaria DC., sandliebende, ♀. k. Südfrankreich.

biflora Dsf., zweiblumige, ☉. f. Nordafrika.

brachycarpa DC., kurzhülsige, ☉. f. Spanien.

breviflora DC., kurzblumige, ☉. f. Südeuropa.

capensis L., capische, ☉. f. m. Cap der guten Hoffn.

capitata Cav., kopfblumige, 4. k. Südspanien.

cenisia L., cenisische, 4. ♀. f. b. k. Oberitalien, Pyrenäen.

β) *subaristata* DC.

cernua L., gebogenhülsige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

Cherleri L., Cherler's, ☉. f. Südeuropa.

Columnae All. (*parviflora* Lam., *subocculta* Vill., *minutissima* Jacq.), Columna's, ♂. 4. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika.

crispa L., krause, ♀. k. Spanien.

## Ononis

- cuspidata Dsf., feinspitzige, 4. k. Nordafrika.  
 Denhardtii Ten., Denhardt's, ♂. f. k. Neapel.  
 diffusa Ten., weitschweifige, ☉. f. Neapel, Sicilien.  
 emarginata Boj., ausgerandete, ♀. w. Mauritius.  
 falcata Viv., sichelförmige, ♀. k. Italien.  
 foetida Schousb., stinkende, ☉. f. Marocko.  
 fruticosa L., strauchige, ♀. f. b. Frankreich, Spanien.

## β) microphylla DC.

- geminata Ait. (? excisa Thbg.), zweiblumige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

- geminiflora Lag., paarblumige, ☉. f. Spanien.

- glabra Thbg., glättliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

- hircina Jcq. (altissima Lam., arvensis L. syst., foetens All.), bockduftende, 4. ♀. f. Nord-, Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Galicien, Italien.

- hispanica L., spanische, ♀. k. Spanien.

- hispida Dsf. (hirta Poir.), steifhaarige, 4. ♀. k. Nordafrika.

- longifolia W., langblättrige, ♀. k. Teneriffa.

- minutissima L. (saxatilis Lam., barbata Cav.), kleinste, ♂. k. Südeuropa.

- mitissima L., unbewehrte, ☉. f. Portugal, Sicilien, Griechenland.

- monophylla Dsf., einblättrige, ☉. f. Nordafrika.

- Natrix L., gelbe, 4. ♀. f. b. k, Südeuropa.

## β) pinguis L.

- oligophylla Tenor., wenigblättrige, ☉. f. Calabrien, Sicilien.

- ornithopodioides L., vogelfußsähnliche, ☉. f. Sicilien, Spanien.

- pallida Horn., bleiche, ☉. f. ?

- parviflora Berg., Thbg., kleinblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

- peduncularis Lindl., langstielige, ♀. k. Teneriffa.

- pendula Dsf., überhängende, ☉. f. Nordafrika, Sicilien.

- picta Dsf., bemalte, 4. ♀. k. Nordafrika.

- pubescens L. (calycina Lam., Morisonii Gouan, arthropodia Brot.), weichhaarige, ☉. f. Frankreich, Spanien, Portugal.

- ramosissima Dsf., ästige, ♀. k. Nordafrika, Sicilien, Creta.

- reclinata L., zurückgebeugte, ☉. f. Südfrankreich.

- repens L. (arvensis Sm., procurrens Wallr.), kriechende, 4. ♀. f. Europa.

## β) mitis Gmel.

- rotundifolia L., rundblättrige, 4. ♀. f. b. k. Süd- und westeuropäische Voralpen.

## β) aristata DC.

- sicula Guss., sicilianische, ☉. f. Sicilien.

- spinosa L. (campestris Koch et Ziz.), gemeine, 4. ♀. f. Europa.

## b) alba. β) macracantha Clark.

- striata Gouan (reclinata Lam., aggregata Asso), gestreifte, 4. k. Spanien.

- tribracteata DC., dreideckblättrige, 4. ♀. f. Südeuropa.

- tridentata L., dreizählige, ♀. k. Spanien.

- umbellata Thbg., doldige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

- vaginalis Vahl, scheidige, ♀. k. Aegypten, Nordafrika.



**Ononis**

- variegata L. (*aphylla* Lam.), bunte, ☉. f. Spanien.  
 villosa Thbg., zottige, 4. ♂. k. Cap der guten Hoffn.  
 viscosa L., schmierige, ☉. f. Frankreich, Spanien.

**Onopordum** V., Krebsdistel (Eselsdistel), XIX. 1.,  
Compositae-Cynarocephalae.

- Acanthium L., gemeine, ♂. f. Europa.  
 acaule L. (*pyrenaicum* DC.), stengellose, ♂. f. b. Pyrenäen.  
 arabicum L., arabische, ♂. f. Arabien, Griechenland, Westeuropa.  
 elatum Sibth., hohe, ♂. f. Creta.  
 graecum Gouan, griechische, ☉. f. Griechenland.  
 horridum Viv. (*macracanthum* d'Urv.), rauhe, ♂. f. Südeuropa, Griechenland.  
 illyricum L., illyrische, ☉. ♂. f. Südeuropa.  
 macracanthum Schousb., großstachelige, ♂. f. Nordafrika.  
 tauricum W., taurische, ♂. f. Taurien.  
     β) gratum Bess.  
 virens DC. (*viscosum* Schrad.), grünliche, ♂. f. Südfrankreich.

*cynaroides* Stev. v. *Cousinia cynaroides*. *deltoideum* Ait. v. *Rhaponticum atriplicifolium*. *rotundifolium* All. v. *Arctium lanuginosum*.

**Onoseris** W., Eselskraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

- appressa (Hook), angedrücktes, ♂. w. Peru.  
 salicifolia H. B. K. (? *Centroclinium reflexum* Hook), weidenblättriges, ☉. f. m. Peru.

**Onosma** L., Lotwurz, V. 1., Asperifoliaceae.

- albo-roseum Fisch. et Mey., weißrothe, ♂. k. Natolien.  
 angustifolium Lehm., schmalblättrige, ♂. f. b. k. Apulien.  
 arenarium W. Kit., sandliebende, ♂. f. b. Ungarn, Westdeutschland.  
 divaricatum Lehm., ausgesperrte, ♂. 4. f. b. Caucasus.  
 echiodes L., natterkopffartige, ♂. 4. f. b. Ost- und Südeuropa.  
 giganteum Lam., große, ♂. 4. f. b. k. Taurien, Kleinasien.  
 Gmelini Ledeb., Gmelin's, ♂. 4. f. b. Sibirien.  
 orientale L., morgenländische, ♂. 4. k. Levante, Aegypten.  
 polyphyllum Ledeb., vielblättrige, ♂. 4. f. b. Taurien.  
 rigidum Ledeb., starre, ♂. 4. f. b. Taurien.  
 rupestre MB., Felsen-L., ♂. 4. f. b. Caucasus.  
 sericeum MB., seidenhaarige, ♂. 4. f. b. Caucasus.  
 setosum Ledeb., borstige, ♂. 4. f. Südrussland.  
 simplicissimum MB. (*sibiricum* Lam.), einfache, ♂. 4. f. Ost- und Südrussland.  
 stellulatum W. K. (*tauricum* MB., *cinereum* Schreb.), sternförmige, ♂. 4. f. b. Croatien, Illyrien, Taurien, Griechenland.  
     β) montanum Sm.  
 tinctorium MB., färbende, ♂. 4. f. b. k. Taurien, Siebenbürgen.  
 tricerospermum Lag., dreihornsamige, ♂. 4. k. Spanien.

**Onosma**

*trinervium* Lehm. (*strigosum* H. B. K.), dreinervige, 4. w. Mexico.

**Onosmodium** Mchx., Eselszunge, V. 1., Asperifoliaceae.

*hispidum* Mchx., steifhaarige, ♂. 4. f. b. Virginien.

*molle* Mchx., weichhaarige, ♂. 4. f. b. k. Pennsylvania, Carolina.

**Onosuris Chamissonis** DC. v. *Sphaerostigma Chamissonis*.**Opercularia** G., Deckelkelch, IV. 1., Rubiaceae.

*aspera* G., rauher, 4. k. t. Neuzeeland.

*hispidula* Spgl. (*aspera* Juss.), hackeriger, ♂. k. t. Neuholland.

*ocymifolia* Juss., basilicumblättriger, 4. t. w. Ostindien, Neuholland.

*sessiliflora* Juss., stiellosblumiger, 4. k. t. Neuholland.

*umbellata* G., doldenblumiger, ♂. k. t. Neuholland.

*paleata* Young. v. *Cryptospermum* Youngii.

**Ophioglossum** T., Natterzunge, XXIV. 1., Osmundaceae-Ophioglosseae.

*bulbosum* Mchx., knollige, 4. Kn. k. t. Carolina.

*costatum* RB. (*pedunculatum* Desv.), gerippte, 4. w. Ostindien, Neuholland.

*gramineum* W., grasartige, 4. w. Ostindien, Neuholl.

*lusitanicum* L., portugiesische, 4. k. t. Portugal, Corsica, Neapel, Madeira.

*petiolatum* Hook., langstielige, 4. w. Westindien.

*reticulatum* L., netzförmige, 4. w. Westindien, Guiana.

*vulgatum* L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

**Ophiopogon** Ker, Natterzauke, VI. 1., Sarmientaceae (*Asparagineae*).

*japonicus* Ker, japanische, 4. k. f. b. Japan.

*Jaburan* Bot. Cab., Jaburan-N., 4. k. Japan.

*spicatus* Ker, ährige, 4. k. Japan, China, Nepal.

**Ophiorrhiza** Forsk., L., Schlangenzwurz, V. 1., Rubiaceae.

*Mungos* L., ächte, 4. ♂. w. Ostindien.

**Ophioxylon** Burm., Schlangenzholz, XXIII. 1., Convolvulaceae-Apocynaceae.

*serpentinum* L., ächtes, ♂. w. Ceylon, Java.

**Ophiurus filiformis** P. B. etc. v. *Lepturus filiformis* etc.**Ophrys** L., Ragwurz, XX. 1., Orchideae.

*apifera* Huds., bienenblumige, 4. Kn. f. b. Mittel- und Südeuropa, England.

*arachnites* All., spinnenartige, 4. Kn. f. b. Mittel- und Südeuropa.

*aranifera* Huds. (*fuciflora* Curt.), spinnenblumige, 4. Kn. f. b. Mittel-, Süd- und Westeuropa, England.

β) *limbata* Lindl.

*atrata* Lindl., schwärzliche, 4. Kn. k. Spanien, Italien.

*ciliata* Bivon., gefranzte, 4. Kn. k. Sicilien, Portugal.

*fusca* Lk., braune, 4. Kn. k. Portugal.

*lutea* Cav., gelbe, 4. Kn. k. Spanien.

*muscifera* Huds. (*myodes* Jacq.), fliegenblumige, 4. Kn. f. Europa.

*oestriifera* MB., bremsenblumige, 4. Kn. f. b. k. Illyrien, Italien, Taurien.

**Ophrys**

- Pseudo-Speculum DC., spiegelnde, 4. Kn. f. b. k.  
 Illyrien, Italien, Frankreich.  
 Scolopax Cav. (*Speculum* Biv.), schnabelförmige, 4. Kn.  
 f. b. k. Süd- und Westeuropa.  
 Speculum Bertol. (*Bertolonii* Morett.), Spiegel-R., 4.  
 Kn. f. b. k. Italien.  
 tenthredinifera W., blattwespenblumige, 4. Kn. k.  
 Süditalien, Kleinasien, Nordafrika.

β) minor Lindl.

*alpina* L. v. *Chamorchis alpina*. *anthropophora* L.  
 v. *Aceras anthropoph.* *Corallorrhiza* L. v. *Coral-*  
*lorrhiza innata*. *cordata* L. etc. v. *Listera cordata*  
 etc. *Monorchis* L. v. *Herminium Monorchis*. *Nidus*  
*avis* L. v. *Neottia Nidus avis*. *spiralis* L. v. *Spi-*  
*ranthes autumnalis*.

**Opismenus** P. B., Grannenbart, III. II., Gramineae.

- africanus* P. B., afrikanischer, ☉. f. m. Afrika.  
*Burmanni* P. B., Burmann's, ☉. w. f. m. Ost- und  
 Westindien.  
*colonus* H. B. K., rundspindeliger, ☉. f. m. Ostindien,  
 mittägliches Amerika.  
*compositus* R. et S., vielähriger. ☉. w. f. m. Ceylon,  
 Neuholland.  
*Crus galli* Kunth., Hühner-G., ☉. f. Europa, Asien,  
 Afrika, Amerika, Neuholland.  
 β) *commutatus* (R. et S.), [*Panicum stagninum*  
 Host]. γ) *intermedius* (R. et S.). δ) *erythro-*  
*spermus* (R. et S.). ε) *Crus corvi* (L.).

- dubius* Kunth, zweifelhafter, ☉. f. ?  
*echinatus* Kunth. (? *Echinochloa setigera* R. et S.), lang-  
 borstiger, ☉. f. Mittägliches Amerika.  
*frumentaceus* Kunth, genießbarer, ☉. f. m. Ostindien.  
*hirtellus* R. et S., kurzhaariger, ♂. w. Westindien,  
 Neuholland.  
*hispidulus* Kunth, hackeriger, ☉. f. m. Ostindien.  
*intermedius* Kunth, mittlerer, ☉. f. ?  
*loliaceus* P. B., lolchähnlicher, ☉. f. m. w. Cuba.  
*margaritaceus* Kunth, perlartiger, ☉. f. m. ?  
*stagninus* Kunth, Lachen-G., ☉. f. Ost- u. Westind. etc.  
*undulatifolius* Kunth, R. et S., wellenblätteriger, ☉. f.  
 Südeuropa, Caucasus, Ost- und Westindien.

**Oplotheca** Auct. v. *Hoplotheca*.**Opopanax** Koch, Kraftdolde, V. II., Umbelliferae.

- Chironium* Koch, Chiron's, 4. f. b. Südeuropa.  
*glabrum* Bernh., kahle, 4. f. b. k. ? Griechenland.

**Oporinea autumnalis** D. Don v. *Leontodon autumnalis*.**Opuntia** T., Opuntie (indianische Feige), XII. I., Cactei.

- albicans* Salm. (*Prate* Sab.), weißliche, ♀. w. Mexico.  
*Amyclaea* Tenor. (*maxima* Salm), amyclaeische, ♀. k. w.  
 Süditalien.  
*andicola* H. Angl. (*horizontalis* Gill.), Anden-O., 4. ♀.  
 w. Mendoza.  
*aurantiaca* Gill., orangefarbige, ♀. w. Chili.  
*brasiliensis* Haw. (*Cactus paradoxus* Hornem.), brasi-  
 lianische, ♀. w. Brasilien.  
*caespitosa* Nutt., rasenartige, ♀. k. w. Kentucky.



**Opuntia**

- candelabriformis H. Monac., candelaberförmige, *h.* w. Mexico.
- catocantha H. Berol., nadelstachelige, *h.* w. St. Thomas.
- clavarioides H. Berol. (*microthele* Hort.), keulförmige, *h.* w. Chili.
- coccinellifera Mill. (*mexicana* Hort.), Cochenill-F., *h.* w. Südamerika.
- corrugata H. Angl., runzelfaltige, *h.* w. ?
- crassa Haw., dicke, *h.* w. Mexico.
- $\beta$ ) major Pfr. (*glaberrima* H. Berol.).
- crinifera Salm (*senilis* Parm.), mähnentragende, *h.* w. Brasilien.
- $\beta$ ) lanigera Parm.
- curassavica Mill., curassavische, *h.* w. Curaçao, St. Thomas.
- $\beta$ ) media Haw.  $\gamma$ ) minor Haw.  $\delta$ ) longa Haw. (Brasilien).
- cylindrica DC., cylinderförmige, *h.* w. Peru.
- decipiens DC., trügerische, *h.* w. Mexico.
- $\beta$ ) minor H. Dyck.
- Decumana Haw. (*maxima* Mill., *Cact. elongatus* W.), größte, *h.* w. Südamerika.
- decumbens Salm (*repens* Karw., *irrorata* Mart.), niederliegende, *h.* w. Mexico.
- dejecta Salm (*diffusa*, *horizontalis* Hort.), niedergebeugte, *h.* w. Havannah.
- Dillenii DC. (*Tuna*  $\beta$ . Haw.), Dillen's, *h.* w. Südamer.
- elata H. Berol., hohe, *h.* w. Brasilien, Caracas.
- elatioer Mill., schwarzbraunstachelige, *h.* w. Südamerika.
- extensa Salm, ausgebreitete, *h.* w. ?
- exuviata DC. (*undulata* Hort., *decipiens major* H. Vindob.), ausgehäutete, *h.* w. Mexico.
- $\beta$ ) angustior DC.  $\gamma$ ) spinosior DC.
- ferox Haw. (*cruciata*, *dolabriformis* Hort.), wilde, *h.* w. Südamerika.
- Ficus indica Mill. (*vulgaris* Tenore), ächte, *h.* k. t. Südamerika, Italien, Sicilien etc.
- a) fructu lutescente. b) fructu albido. c) fructu sanguineo. d) fr. aspermo.
- foliosa Salm (*pusilla* Haw., *Hystrix* Hort.), blätterige, *h.* w. Südamerika.
- fragilis Haw. (*Sabinii* Hort.), spröde, *h.* k. Nordamer.
- fulvispina Salm (? *elongata* Haw.), gelbbraunstachelige, *h.* ? Südamerika.
- $\beta$ ) laevior Salm.
- glaucescens H. Berol., blaugrüne, *h.* w. Mexico.
- glaucophylla Wendl., blaugrünblätterige, *h.* w. ?
- glomerata Haw., knaulförmige, *h.* w. Mendoza.
- gracilis H. Monac., schlanke, *h.* w. Mexico.
- grandis H. Angl. (*glaucescens* Hort.), großstachelige, *h.* w. Mexico.
- Hernandezii DC., Hernandez's, *h.* w. Mexico.
- horrida Salm (*humilis* Haw.), rauhe, *h.* w. Italien.
- humifusa Nutt., niedergestreckte, *h.* k. Nordamerika.
- imbricata DC., ziegeldachförmige, *h.* w. Mexico.
- intermedia Salm, mittelständige, *h.* k. ? Süditalien, Dalmatien.
- Kleiniae DC., Klein's, *h.* w. Mexico.
- lanceolata Haw., lanzettliche, *h.* w. Südamerika.

# Opuntia

- lasiacantha* H. Vindob. (? *leucacantha* Salm), wollstachelige, f. w. ?  
*leptocaulis* DC. (*virgata* H. Berol.), schlankstengelige, f. w. Mexico.  
*leucacantha* H. Berol. (*subferox* Schott.), weisstachelige, f. w. Mexico.  
*leucosticta* Wendl., weifsbraunstachelige, f. w. Mexico.  
*leucotricha* DC., weifshaarige, f. w. Mexico.  
*longispina* Haw., langstachelige, f. w. Mendoza.  
*media* Haw., mittlere, f. k. Nordamerika.  
*megacantha* Salm (*mexicana* Hort.), dickstachelige, f. w. Mexico.  
*mesacantha* Nutt., büschelstachelige, f. k. Kentucky.  
*microdasys* Lehm., kleinstachelige, f. w. Mexico.  
     β) *minor* Salm (*pulvinata* DC.).  
*missouriensis* DC. (*polyacantha* Haw.), missourische, f. k. Nordamerika.  
*monacantha* Haw., einstachelige, f. w. Südamerika.  
*myriacantha* Hort., vielstachelige, f. w. Südamerika.  
*nigricans* Haw., schwärzliche, f. w. Südamerika.  
*oblongata* Wendl., verlängerte, f. w. Mexico.  
*orbiculata* Salm (*longispina* Hort., *sericea* β. *longispina* Hort. Dyck.), kreisförmige, f. w. Chili.  
*ovata* Pfr., eiförmige, f. w. Mendoza.  
*parvula* Salm (*glauca* Hort.), kleine, f. w. Chili.  
*Poeppigii* Otto, Poeppig's, f. w. Chili.  
*polyantha* Haw., vielblumige, f. w. Südamerika.  
*Pseudo-Tuna* Salm, unächte Tuna-F., f. w. Südamer.  
     β) *spinosior* H. Dyck. γ) *elongata* Salm.  
*puberula* H. Vindob., feinhaarige, f. w. Mexico.  
*pubescens* Wendl., haarige, f. w. Mexico.  
*pusilla* Salm., zwergige, f. w. Südamerika.  
*ramulifera* Salm, ästige, f. w. Mexico.  
*robusta* Wendl., starke, f. w. Mexico.  
*rosea* DC., rosafarbige, f. w. Mexico.  
*rubescens* Salm, röthliche, f. w. Brasilien.  
*Salmiana* Parment., Salm's, f. w. Brasilien.  
*sericea* Don (*coerulea* Gill.), seidenstachelige, f. w. Chili.  
*spinosissima* Mill., häufigstachelige, f. w. Westindien.  
*spinulifera* Salm (*oligacantha* H. Vind.), wenigstachelige, f. w. Mexico.  
*splendens* H. Angl., schimmernde, f. 4. ?  
*Stapelia* DC., stapelienähnliche, f. w. Mexico.  
*stricta* Haw., steife, f. w. Südamerika.  
*sulphurea* Gill., schwefelgelbe, f. w. Chili.  
*tomentosa* Salm, filzige, f. w. Südamerika.  
*triacantha* DC., dreistachelige, f. w. Südamerika.  
*tuberculata* Haw., kleinhöckerige, f. w. Südamerika.  
*tuberosa* H. Angl. (*alpina* Gill.), knollige, f. w. Mendoza.  
     β) *spinosa* Pfr. (*platyacantha* H. Angl.).  
*Tuna* Mill. (*coccinellifera* DC. pl. gr., *coccinea* Hort.), Tuna-F., f. w. Quito, Mexico.  
     β) *laevior* Salm (*flexibilis*, *Bonplandii* Hort.).  
*tunicata* H. Berol. (*furiosa* Wendl.), häutige, f. w. Mexico, Brasilien.  
*vulgaris* Mill. (? *italica* Tenore), gemeine, f. w. Amerika, Südeuropa.  
     β) *nana* DC. (β. *media* Salm).

## Opuntia

*articulata* H. Berol. (*polymorpha* H. Angl.). *Gil-liesii* H. Berol. (*ovata* H. Angl.). *platyacantha* H. Angl. v. *Cereus articulatus*, *ovatus* et *syringacanthus* Nachtr. *salicornioides* Spgl. vid. *Hariota salicornioides* Nachtr.

*Orbea* Haw. v. *Stapelia*.

*Orchis* T., Knabenkraut, Kukuksblume, XX. 1., Orchideae.

*acuminata* Dsf., zugespitztes, 4. Kn. k. Nordafrika, Portugal, Sicilien, Creta.

*coriophora* L., stinkendes, 4. Kn. f. Europa.

*cruenta* Retz, blutfarbiges, 4. Kn. f. Nordeuropa.

*fragrans* Poll., wohlriechendes, 4. Kn. f. Italien.

*fusca* Jacq., braunes, 4. Kn. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

*fuscescens* L., ?Pursh, bräunliches, 4. Kn. k. Pennsylvanien.

*latifolia* L. (*angustifolia* Wim. et Grab.), breitblättriges, 4. Kn. f. Mittel- und Nordeuropa.

b) *rosea*.

*longibracteata* Bivon. (*Robertiana* Lois., *foliosa* Mass.), langdeckblättriges, 4. Kn. k. Sicilien, Südfrankreich, Creta, Madeira.

*longicornu* Poir., langhorniges, 4. Kn. k. Nordafrika, Sicilien.

*maculata* L., geflecktes, 4. Kn. f. Europa.

*majalis* Rchb. (*latifolia* Auctor.), maiblühendes, 4. Kn. f. Europa.

b) *atropurpurea*.

*mascula* L., ächtes, 4. Kn. f. Europa.

β) *acutiflora* Koch. γ) *speciosa* Host.

*militaris* L., ansehnliches, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.

β) *Smithii* Swt. γ) *Rivini* Swt.

*moravica* Jacq., mährisches, 4. Kn. f. Mähren.

*morio* L., Salep-K., 4. Kn. f. Europa, Mittelasien.

b) *albicans*. c) *guttata*. d) *rosea*. e) *purpurea*.

*Nicodemi* Cyrill., *Nicodemus's*, 4. Kn. k. Neapel.

*pallens* L., bleiches, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

*palustris* Jacq., Sumpf-K., 4. Kn. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *laxiflora* Lam. (*Tabernaemontani* Gmel., *ensifolia* Vill.).

*papilionacea* L. (*rubra* Jacq.), schmetterlingsblumiges, 4. Kn. k. Italien, Griechenland, Spanien, Nordafrika.

*pauciflora* Tenor., wenigblumiges, 4. Kn. f. Italien.

*provincialis* Balb. (*Cyrilli* Tenor.), südfranzösisches, 4. Kn. k. Südfrankreich, Italien.

*pyramidalis* L., pyramidales, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus.

*quadripunctata* Tenor., vierpunktiges, 4. Kn. k. Neapel.

*romana* Sebast. (*pseudosambucina* Tenor.), römisches, 4. Kn. f. b. k. Italien.

*saccata* Tenor., sackförmiges, 4. Kn. k. Calabrien, Sicilien.

*sambucina* L., fliederduftendes, 4. Kn. f. Europa.

β) *incarnata* L. (*Schleicheri* Swt.).

*Simia* Lam. (*tephrosanthos* Vill.), wunderbarblumiges, 4. Kn. f. k. England, Südeuropa.



**Orchis**

Spitzelii Saut., Spitzel's, 4. Kn. f. Tyrol.

sulfurea Lk., schwefelgelbes, 4. Kn. k. Portugal.

β) densiflora Hook.

Traunsteineri Saut. (*haematodes* Rchb.), Traunsteiner's, 4. Kn. f. Tyrol.

undulatifolia Bivon., wellenblättriges, 4. Kn. k. Sicilien.

ustulata L., brandfarbiges, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.

variegata All., Jacq., buntfarbiges, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa.

*albida* Sw. et *angustifolia* M.B. (*iberica* W.), *conopsea* L. etc. v. *Gymnadenia albida* etc. *bifolia* L. vid. *Platanthera bifolia*. *foliosa* Sw. etc. v. *Habenaria alata* etc. *globosa* L. v. *Nigritella globosa*. *hircina* Scop. v. *Himantoglossum hircinum* Nachtr.

**Oreochloa** Lk., Felsengras, III. II., Gramineae.

disticha Lk., zweizeiliges, 4. f. Schweizer, tyroler und kärnthner Alpen etc.

**Origanum** T., Dosten, XIV. I., Labiatae.

aegyptiacum L., aegyptischer, 4. f. k. Aegypten.

benghalense Garc., bengalischer, f. k. t. Bengalen.

creticum L., cretischer, 4. f. k. Griechenland.

β) megastachyum Lk.

Dictamnus L., Diptam-D., f. k. Creta.

heracleoticum L., Winter-D., 4. f. b. k. Südosteuropa.

hirtum Lk., kurzhaariger, 4. k. Südeuropa, Orient.

humile Poir., niedriger, 4. f. ?

indicum Roth, indischer, ♂. f. m. k. Ostindien.

macrostachyon Lk., grofsähriger, 4. k. Portugal.

Majorana L., Majoran-D., ♂. f. m. k. Ostindien, Griechenland.

β) majoranoides W.

Maru L., Maru-D., 4. f. k. Creta, Palästina.

normale D. Don, ächter, 4. f. b. k. Nepal.

oblongatum Lk., verlängerter, 4. k. ?

Onites L., sicilianischer, 4. f. b. k. Sicilien.

paniculatum Koch, rispiger, 4. f. ? Südeuropa.

sipyleum L., sipylischer, f. k. Kleinasien.

smyrnaeum L., smyrnaischer, f. k. Griechenland, Syrien, Kleinasien.

syriacum L., syrischer, ♂. f. Syrien.

Tournefortii Ait., Tournefort's, f. k. Griechenland.

virens Lk., grünlicher, 4. k. Portugal.

vulgare L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) prismaticum Gaud.

**Orlaya** Hoffm., Orlaya, V. II., Umbelliferae.

grandiflora Hoffm., grofsblumige, ♂. f. Ost-, Mittel- und Südeuropa.

maritima Koch, Meerstrands-O., ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

platycarpus Koch, breitfrüchtige, ♂. f. Südeuropa, Taurien.

**Ormenis** H. Cass., Ormenis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

coronopifolia Less. (*mixta* DC., *bicolor* Cass.), krähensfußblättrige, ♂. f. Portugal, Spanien, Italien, Corsica.

**Ormocarpum** P. B., Armbandhülse, XVII. II. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

sennoides DC., sennaähnliche, ♀. w. Ostindien.

**Ormosia** Jacks., Ormosie, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

coccinea Jacks., scharlachfarbige, ♀. w. Guiana.

dasycarpa Jacks., filzige, ♀. w. Westindien.

**Ornithidium** Salisb., Vogelstendel, XX. I., Orchideae.

album Hook., weißer, 4. w. Trinidad.

coccineum Salisb., scharlachfarbiger, 4. w. Westindien.

**Ornithocephalus** Hook., Vogelkopforche, XX. I., Orchideae.

gladius Hook., schwertblättrige, 4. w. Trinidad.

trichorrhizus Batem., haarwurzelige, 4. w. Trinidad.

**Ornithogalum** T., Vogelmilch, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

I. Euornithogalum.

alliaceum Lodd., lauchähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

barbatum Jacq., bärtige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

biflorum D. Don, zweiblumige, 4. Zw. k. t. Peru.

bifolium Lodd., zweiblättrige, 4. Zw. k. t. Chili.

brachystachys Fisch., kurzährige, 4. Zw. f. Dahurien.

bulbiferum Pall., zwiebeltragende, 4. Zw. f. Südrussland, Caucasus, Sibirien.

caudatum Ait., geschwänzte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

chloroleucum Lindl., grünlichweißse, 4. Zw. k. t. Valparaiso.

ciliatum Thbg., gefranzte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

comosum L., schopfige, 4. Zw. f. Oesterreich, Illyrien, Siebenbürgen.

conicum Jacq., kegeltraubige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

corymbosum R. et P., traubendoldige, 4. Zw. k. t. Chili, Peru.

crenulatum Thbg., gekerbte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

elatum Andr., hohe, 4. Zw. k. Aegypten.

fimbriatum W., gefranzte, 4. Zw. f. Taurien.

fuscatum Jacq., bräunliche, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

geminiflorum Herb., paarblumige, 4. Zw. k. t. Lima.

juncifolium Jacq., simslenblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

lacteam Jacq., milchweißse, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

latifolium L., breitblättrige, 4. Zw. k. Aegypten, Arabien, Italien.

longebracteatum Jacq. (*bracteatum* Thbg.), langdeckblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

maculatum Thbg. (*secundum* Jacq.), gefleckte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

maritimum Brot. (*Squilla* Bot. mag.), Meerzwiebel-V., 4. Zw. k. Süd- und Westeuropa.

narbonense L., narbonische, 4. Zw. f. Südeuropa.

niveum Soland., schneeweißse, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

notatum R. et S. (*maculatum* Jacq.), bezeichnete, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

odoratum Jacq., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

**Ornithogalum**

ovatum Thbg., eiförmige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 pilosum Thbg., weichhaarige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 polyphyllum Jacq., vielblättrige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

prasinum Ker, lauchgrüne, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 pyramidale L., pyramidale, 4. Zw. f. Spanien,  
 Portugal.

pyrenaicum L., pyrenäische, 4. Zw. f. England, Süd-  
 und Osteuropa.

refractum W., zurückgekrümmte, 4. Zw. f. Ungarn,  
 Neapel.

β) exscapum Tenor.

revolutum Jacq., zurückgerollte, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

rupestre L., felsenliebende, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

scilloides Jacq., scillaähnliche, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

stachyoides Ait. (*pyrenaicum* Gouan), langtraubige, 4.  
 Zw. f. Süd- und Westeuropa.

suaveolens Jacq., feinriechende, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

tenellum Jacq. (*graminifolium* Thbg.), zarte, 4. Zw. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

tenuifolium Redout. (*rupestre* Rudolph., *Rudolphii* Jacq.),  
 feinblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

trigynum Redout., dreiweibige, 4. Zw. k. ?

umbellatum L., doldige, 4. Zw. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) montanum Tenor.

II. *Albucea* Rchb. (*Myogalum* Lk.).

arabicum L., arabische, 4. Zw. k. Nordafrika, Portugal.

aureum Curt., goldfarbige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

a) *miniaturum* Jacq. β) *flavescens* Jacq. γ) *fla-*  
*vissimum* Jacq.

coarctatum Jacq., dichttraubige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

concinnum Salish., nette, 4. Zw. k. Portugal.

hispidum Hornem. (*Bergii* Schltdl.), steifhaarige, 4. Zw.  
 k. Cap der guten Hoffnung.

ixioides Ait., ixiaähnliche, 4. Zw. k. Californien.

nutans L., nickende, 4. Zw. f. Europa.

thyrsoides Jacq., straufsblumige, 4. Zw. k. Cap der  
 guten Hoffnung.

a) *luteum*. β) *albidum*.

unifolium Bot. mag., einblättrige, 4. Zw. k. Gibraltar.

virens Lindl., grünliche, 4. Zw. k. Südafrika.

*altissimum* L. suppl. (*giganteum* Jacq.) vid. *Drimia*

*altissima*. *arvense* Pers. etc. v. *Gagea arvensis* etc.

*gramineum* Sims v. *Allium striatellum*. *paradoxum*

Jacq. vid. *Eriospermum paradoxum*. *striatum* MB.

v. *Lloydia serotina*.

*Ornithoglossum glaucum* Salish. (*viride* Salish.) et *undu-*  
*latum* Swt. v. *Lichtensteinia laevigata* et *undulata*.

**Ornithopus** L., Vogelfuß, XVII. iv. (vi.), Legumi-  
 nosae-Papilionaceae.

I. Genuin.

compressus L., platter, ☉. f. Süd- und Westeuropa,  
 Nordafrika.

perpusillus L., kleiner, ☉. f. Mitteleuropa.

β) *intermedius* Roth. γ) ? *nodosus* Mill.



**Ornithopus**

sativus Brot. (*roseus* Dufour), gebauter, ☉. f. Westeuropa.

II. *Arthrolobium* Desv.

durus Cav., harter, ☉. f. Spanien.

ebracteatus Brot. (*durus* DC., *pygmaeus* Viv., *nudiflorus* Lag., *exstipulatus* Thor.), deckblattloser, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

repandus Poir. (*heterophyllus* Brot., *lotoides* Viv.), ausgeschweiffter, ☉. f. Nordafrika, Portugal.

scorpioides L., großblättriger, ☉. f. Südeuropa.

*tetraphyllus* L. v. *Myriadenus tetraphyllus*.

*Ornitrophe Cominia* W. et *serrata* Roxb. vid. *Schmidelia Cominia* et *serrata*.

**Ornus** Scop., Blüthenesche, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

*americana* Pursh (*Fraxinus paniculata* Mill.), amerikanische, ♀. f. Maryland, Virginien.

*europaea* L., europäische, ♀. f. Südeuropa.

b) *globifera* Lodd.

*floribunda* G. Don, vielblumige, f. b. k. Nepal.

*rotundifolia* Lk. (*mannifera* Hort.), rundblättrige, ♀. f. Süd- und Osteuropa, Kleinasien.

*striata* Swt., gestreifte, ♀. f. ? Nordamerika.

**Orobanche** T., Sommerwurz (Hanfwürger), XIV. II., Personatae-Orobancheae.

*alba* Steph., weisse, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

*amethystea* Thuill. (*Eryngii* Dub.), amethystfarbige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*arenaria* Borkh. (*comosa* Wallr.), Sand-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*caryophyllacea* Sm. (*vulgaris* DC., *bipontina* Schultz), nelkenduftende, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *Galii* Dub. γ) *adenostemon* Rchb.

*coerulea* Vill. (*purpurea* Jacq.), blaue, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

*coerulescens* Steph., bläuliche, 4. f. Osteuropa, Sibirien.

*cruenta* Bertol. (*caryophyllacea* Viv.), blutfarbige, 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Italien.

*elatior* Sutt. (*rubens* Wallr., *medicaginis* Schultz), höhere, 4. f. England, Mitteleuropa.

*Epithymum* DC. (*rubra* Sm., *sparsiflora* Wallr.), Thymian-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*flava* Mart., hellgelbe, 4. f. Baiern.

*gracilis* Sm., schlanke, 4. f. Italien.

*laxiflora* Rchb., lockerblumige, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

*loricata* Rchb., bepanzerte, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

*lucorum* A. Braun, hainliebende, 4. f. Baiern.

*minor* Sutt., kleine, 4. f. England, Süd- u. Westeuropa.

*pallidiflora* Wim. et Grab., blafsblumige, 4. f. Schlesien, Sachsen etc.

*Picridis* F. W., Schultz, Bitterkraut-S., 4. f. Süddeutschland.

*procera* Koch, hervorragende, 4. f. Pfalz.

*pruinosa* Lapeyr., bereifte, ☉. 4. f. Süd- und Westeuropa.

*ramosa* L., ästige, ☉. f. Europa.

*Rapum* Thuill. (*major* DC.), Rüben-S., 4. f. Süd- und Westeuropa.

**Orobanche**

*Salviae* F. W. Schultz, Salbei-S., 4. f. Baiern, Salzburg.

*Scabiosae* Koch, Scabiosen-S., 4. f. Baiern, Tyrol.

*speciosa* DC., prächtige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
*strobiligena* Rchb., zapfenförmige, 4. f. Sachsen.

**Orobis T.**, Walderbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*albus* L. suppl. (*pannonicus* Jacq.), weiße, 4. Kn. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien, Frankreich.

*alpestris* W. K., Voralpen-W., 4. f. Croatien.

*angustifolius* L., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

*atropurpureus* Dsf., schwarzpurpurrothe, ♂. 4. f. b. Nordafrika, Sicilien.

β) *siculus* Rafin. (*Fischeri* Swt., *quadrangulus* Spgl.).

*aurantius* Stev., orangefarbige, 4. f. West-Caucasus.  
*canescens* L. suppl. (*filiformis* Lam.), weißgrauliche, 4. f. Südfrankreich.

*caucasicus* Spgl. (? *erectus* Poir.), caucasische, 4. f. Caucasus.

*Clusii* Spgl. (*vicioides* DC.), Clusius's, 4. f. Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn.

? *coccineus* Mill., scharlachfarbige, 4. f. ? Nordamerika.  
β) *uniguus* DC,

*divaricatus* Lapeyr., ausgesperrte, 4. f. Pyrenäen.

*formosus* Stev., schöne, 4. f. Caucasus.

*Gmelini* Fisch., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

*hirsutus* L. (*laxiflorus* Dsf.), rauhhaarige, 4. f. Griechenland, Taurien.

*humilis* Sering., niedrige, 4. f. Dahurien.

*lacteus* MB., milchweiß, 4. f. Podolien, Wolga, Caucasus.

*lathyroides* L., platterbsenähnliche, 4. f. Macedonien, Sibirien.

*luteus* L., gelbe, 4. f. Süd-, Ost- und Westeuropa, Kleinasien.

β) *laevigatus* W. K.

*niger* L. (*tristis* Lang), schwärzliche, 4. f. Nord- und Osteuropa.

*ochroleucus* W. K., weißgelbe, 4. f. Ungarn.

*pallens* MB., bleiche, 4. f. Taurien, Podolien, Bessarabien.

*pisiformis* Maund, erbsenförmige, 4. f. ? Südeuropa.

*pyrenaicus* L. (*Pluknetii* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

*saxatilis* Vent., Gesteins-W., ♂. f. Südfrankreich.

*stipulaceus* Hook., zwischenblättrige, 4. f. ? Nordamer.

*sylvaticus* L., haarstengelige, 4. f. Norwegen, England, Frankreich.

*Tournefortii* Lapeyr. (*pyrenaicus* T.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen.

*transylvanicus* Spgl. (*laevigatus* Baumg.), siebenbürgische, 4. f. Siebenbürgen.

*tuberosus* L., knollige, 4. Kn. f. Mittel- u. Nordeuropa.

β) *tenuifolius* Roth (*linifolius* Reich., *gracilis* Gaud., *setiformis* Schlchr.).

*variegatus* Tenor. (*multiflorus* Sbr., *rigidus* Lang, *pyre-*

**Orobis**

*naicus* Scop., *venetus* Clus. Rchb., *vernus* b. *latifolius* Roch.), buntfarbige, 4. f. Krain, Illyrien, Ungarn, Tyrol, Italien.

*venosus* W. (*pauciflorus* Hort.), aderige, 4. f. Sibirien.

*vernus* L., Frühlings-W., 4. f. Europa, Kleinasien.

b) *carneus* J. C.

*versicolor* Gmel. (*varius* Curt. Soland.), verschiedenfarbige, 4. Kn. f. Oesterreichisches Litorale, Italien.

*cyaneus* Stev. et *digitatus* MB. v. *Platystylis cyanea* et *digitata*.

**Orontium** L., Wasserähre, VI. 1., Aroideae-Orontiaceae. *aquaticum* L., nordamerikanische, 4. Wa. f. k. Nordamerika.

*japonicum* Thbg. (*cochinchinense* Lour.) v. *Rohdea japonica*.

**Orostachys Malacophyllum** Fisch. v. *Umbilicus Malacophyll.*

**Orsinia** Bertol. (Orsini, berühmte italienische Familie), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*Eupatoria* Bertol., walddostähnliche, 4. w. Brasilien.

**Ortegia** Loeßl. (C. G. de Ortega, spanischer Botaniker), III. 1., Portulacae-Paronychieae.

*dichotoma* All., zweizinkige, 4. f. k. Piemont.

*hispanica* L., spanische, 4. k. Spanien, Nordafrika.

**Orthoceras** RB., Hornorche, XX. 1., Orchideae.

*striatum* RB., gestreifte, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Orthopogon Burmanni** RB. etc. v. *Oplismenus Burmanni* etc.

**Orthrosanthes** Swt., Morgenblume, XVI. 1., Irideae.

*multiflora* Swt., vielblumige, 4. t. Neuholland.

**Orythya uniflora** G. Don v. *Gagea uniflora*.

**Oryza** L., Reifs, VI. 11., Gramineae.

*latifolia* Dsf., breitblättriger, ☉. w. m. Süd- und Nordamerika.

*nepalensis* G. Don, nepal'scher, ☉. w. m. Nepal.

*sativa* L., gemeiner, ☉. w. m. Ostindien, Afrika, Südeuropa.

β) *mutica* Lour. γ) *glutinosa* Lour. δ) *montana* Lour.

**Oryzopsis** Rich., Mchx., Reifsgras, III. 1., Gramineae.

*asperifolia* Rich., scharfblättriges, 4. f. Nordamerika.

a) *leucosperma* (Lk.). β) *melanosperma* (Lk.).

*mutica* Lk., unbewehrtes, 4. f. Nordamerika.

**Osbeckia** L. (Peter Osbeck, schwedischer Schiffsprediger und Naturforscher, welcher China und die ostindischen Inseln bereiste), X. 1. (VIII. 1.), Lythraeae-Melastomeae.

*canescens* Mey., weißgrauliche, 4. w. ? Südamerika.

*chinensis* L., chinesische, 4. w. China.

*glomerata* DC., knaulförmige, ♂. 4. w. Trinidad, Brasilien.

b) *albiflora* DC.

*nepalensis* Hook. (*speciosa* D. Don), nepal'sche, 4. w. Nepal.

β) *albiflora* Lindl.

*stellata* Hamilt., sternförmige, 4. w. Nepal.

*zeylanica* L., ceylanische, 4. w. Ceylon.

*grandiflora* Afzel. Sm. v. *Melastoma elongatum*.



**Osmites** L., Duftblümchen, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

**Bellidiastrum** L., maßliebenähnliches, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**camphorina** L., kampferriechendes, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**dentata** Thbg., gezahntes, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

**Osmothamnus** DC., Duftstrauch, V. I., Ericaceae.

**fragrans** DC., angenehmriechender, ⚥. f. b. k. Ostsibirien.

**pallidus** DC. (Turcz.), bleicher, ⚥. f. b. k. Baicalalpen.

**Osmunda** T., Traubenfarn, XXIV. I., Osmundaceae.

**cinnamomea** L., zimmtbrauner, 4. f. b. Nordamerika.

**Claytoniana** L., Clayton's, 4. f. b. Virginien.

**gracilis** Hort. Liverp., schlanker, 4. f. ?

**interrupta** Mchx., unterbrochener, 4. f. b. Nordamerika.

**palustris** Lk. et Otto, Sumpf-T., 4. w. Brasilien.

**regalis** L., königlicher, 4. f. Europa.

**spectabilis** W., ansehnlicher, 4. f. b. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Allosorus*, *Aneimia*, *Botrychium*, *Lomaria*, *Lygodium*, *Struthiopteris*, *Todea* et *Woodwardia*.

**Osteospermum** L., Beinsame, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

**coeruleum** Ait. (*pinnatifidum* Thbg.), blauer, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**corymbosum** L., traubendoldiger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**ilicifolium** L., stechhülsenblättriger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**incanum** Thbg., weißgrauer, ⚥. k. Cap der gut. H.

**moniliferum** L., perlschnurförmiger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**perfoliatum** L. suppl., durchwachsener, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**pisiferum** L., erbsenförmiger, ⚥. k. Cap der guten H.

**polygaloides** L., polygalaähnlicher, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**rigidum** Ait., starrer, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**spinescens** Thbg., dornigwerdender, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

**spinosum** L., dorniger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

*calendulaceum* L. suppl. vid. *Oligocarpus calendulaceus*. *niveum* L. suppl. vid. *Microstephium niveum*.

**Ostercicum** Hoffm., Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

**palustre** Bess. (*pratense* Hoffm.), Wiesen-S., 4. f. Thüringen, Galicien.

*verticillare* Rchb. v. *Peucedanum verticillare*.

**Ostrya** Michel., Hopfenbuche, XXI. IX., Amentaceae.

**carpinifolia** Scop. (*vulgaris* W.), carpinusblättrige, ⚥. f. Süd- und Osteuropa.

**virginica** W., virginische, ⚥. f. Nordamerika.

**Osyris** L., Osyris, XXI. III. (III. I.), Sandalaceae.

**alba** L., weißse, ⚥. k. Südeuropa.

**Otanthus** Lk., Ohrblümchen, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

**maritimus** Lk., Seestrands-O., 4. k. England, Süd- und Westeuropa.

**Othonna** L., Othonna, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

- arborescens L., baumartige, ♀. k. Cap der gut. H.  
 bulbosa L. (*tuberosa* Thbg.), knollige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 cacalioides Thbg., cacaliaähnliche, 4. ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 cheirifolia L., lackblättrige, 4. ♀. k. Nordafrika.  
 coronopifolia L., krähensfußblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 crassifolia L. (*Hertia crassifolia* Less.), dickblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 denticulata Thbg., gezähnelte, ♀. k. Cap der gut. H.  
 digitata Thbg., fingerförmige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 ericoides L., heideähnliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
 filicaulis Jacq., fadenstengelige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 frutescens L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
 heterophylla Thbg., verschiedenblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 Lingua Thbg., zungenblättrige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 linifolia Thbg., flachsblättrige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 parviflora L., kleinblumige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.  
 perfoliata Jacq., durchwachsene, 4. k. Cap der gut. H.  
 pinnata Thbg., gefiederte, 4. Kn. k. Cap der gut. H.  
 pinnatifida Thbg., fiederspaltige, 4. k. Cap d. gut. H.  
 retrofracta Jacq., zurückgeknickte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 Tagetes L., sammetblumenblättrige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.  
 virginea Thbg. (*flabellifolia* Bot. Cab.), jungfräuliche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
*abrotanifolia* L., *Athanasiae* Thbg., *lateriflora* Thbg., *multifida* Thbg., *pectinata* L., *tenuissima* L. (*speciosa* Hortul.) et *trifurcata* Thbg. vid. Euryops abrotanifol. etc.

**Ototropis** N. E., Hahnenstrauch, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

sambuenensis N. E., nepal'scher, ♀. w. t. Nepal.

**Ottelia alismoides** P. v. Damasonium indicum.**Outea** Aubl. (guianischer Name), III. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

bijuga DC., zweijochige, ♀. w. Ostindien.

guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana.

**Ovieda anceps** Spgl. etc. v. Lapeyrousia anceps etc.**Oxalis** L., Sauerklee, X. iv., Oxalideae.

Acetosella L., gemeiner, 4. f. Europa, Japan.

β) parviflora Lej.

alba D. Don, weißer, 4. f. k. ?Amerika.

ambigua Jacq., zweifelhafter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

americana Bigelow, amerikanischer, 4. f. Nordamerika.

arcuata Jacq., bogenförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

asinina Jacq., eselsohrblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

## Oxalis

Barrelieri L. (*campestris* Mart.), Barrelier's, 4. f. w. Südamerika.

bifida Jacq., zweispaltiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H. bipunctata Grah. (*spectabilis* Hort., *brasiliensis* Lodd.), doppelpunktirter, 4. Zw. k. t. Brasilien.

Bowiei Ait., Bowie's, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung (? Mexico).

breviscapa Jacq., kurzschäftiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Burmanni Jacq., Burmann's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

caprina Thbg. (*Pes caprae* L.), ziegenfußblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

carnosa Molin., fleischiger, 4. k. Chili.

cernua Thbg., übergebogener, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) minor.

chinensis Haw., chinesischer, 4. k. China.

ciliaris Jacq., gefranzter, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

Commersonii P. (*sexenata* Savign.), Commerson's, 4. Zw. k. t. Monte-Video.

compressa L., Thbg., plattstieliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

convexula Jacq., gewölbter, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

corniculata L. (*pusilla* Salish.), gehörnter, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) villosa MB.

crenata Jacq. (*Arracacha* G. Don), gekerbter, 4. Kn. k. Chili.

crispa Jacq., krauser, 4. Kn. k. Cap der gut. Hoffn.

cruentata Jacq., schweißsfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Cumingi Herb., Cuming's, 4. k. Chili.

cuneata Jacq., keilförmiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

cuneifolia Jacq., keilblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

cuprea Lodd., kupferfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Darwalliana Westc., Darwall's, 4. Zw. k. ?

dentata Jacq., gezahnter, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

Deppei Lk. et Otto, Deppe's, 4. Zw. Mexico.

Dillenii Jacq., Dillen's, 4. f. Carolina, Caribäen.

β) florida Salish.

disticha Jacq. (*ebracteata* Savign.), zweizeiliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

divergens Benth., divergirender, 4. Zw. k. Mexico.

elongata Jacq., verlängerter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) amoena Jacq.

fabaefolia Jacq., buffbohnenblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

fallax Jacq., trügerischer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

ferruginata Jacq., rostfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

filicaulis Jacq., fadenstengeliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

filifolia Jacq., fadenblättriger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

flabellifolia Jacq., fächerblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.



## . Oxalis

- flaccida Jacq., schlaffer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 flava L., hellgelber, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
 b) flore pleno.
- floribunda Lehm., blüthenreicher, 4. Zw. k. t. Brasil.  
 fruticosa Radd. (*rusciformis* Mikan.), strauchiger, 5. w. Brasilien.
- fulgida Lindl., funkelnder, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 furcata Lodd., gabelblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- fuscata Jacq., bräunlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 geniculata K. et W., geknieter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- glabra Thbg., kahler, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
 glandulosa Jacq., drüsiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 gracilis Jacq., schlanker, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 grandiflora Jacq., großblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- hirta L., kurzhaariger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
 β) hirtella Jacq.
- incarnata L., fleischfarbiger, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
 laburnifolia Jacq., bohnenbaumblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- laevigata W., glatter, ☉. f. m. ? Cap der gut. Hoffn.  
 lanata L., wolliger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
 lanceaefolia Jacq., lanzettblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- lateriflora Jacq., seitenblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- lepida Jacq., schülferiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 leporina Jacq., hasenohrblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- linearis Jacq., gleichbreitblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- livida Jacq., schlagblauer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 lobata Sims, gelappter, 4. Kn. k. Chili.
- lupinifolia Jacq., wolfsbohnenblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- luteola Jacq., gelblicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
 Lyoni Pursh, Lyon's, 4. f. b. k. Nordamerika.
- macrophylla Hornem., großblättriger, ☉. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- macrostylis Jacq., langgriffeliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- marginata Jacq., berandeter, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
 Martiana Zuccar. (*violacea* Savign., *urbica* Hil.), Martius's, 4. Kn. k. t. Brasilien.
- mauritiana Lodd., mascarenischer, 4. Zw. t. Mauritius.
- megalorrhiza Jacq., großwurzeliger, 4. Kn. k. t. Chili.
- microphylla Poir. (*rubens* Haw.), kleinblättriger, ☉. f. m. k. Neuholland.
- miniata Jacq., mennigfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- minuta L., kleinster, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
- monophylla L., einblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- multiflora Jacq., vielblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung,
- natans L., schwimmender, 4. Wa. k. t. Cap der guten Hoffnung.

## Oxalis

- obtusa Jacq., stumpfkelchiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- palustris Hil. (*papilionacea* W.), sumpfliebender, 4. w. Brasilien.
- pectinata Jacq., kammförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- pentaphylla Sims, fünfblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- perennans Haw., dauernder, 4. k. t. Neusüdwallis.
- Plumieri Jacq. (*umbraticola* Hilar, *frutescens* L.), Plumier's, 4. w. Westindien, Südamerika.
- polyphylla Jacq., vielblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- pulchella Jacq., schöner, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- punctata L. (*Piottae* Colla), punktirter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- purpurata Jacq., purpurblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- purpurea Jacq., purpurfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- β) laxula Jacq.
- pusilla Jacq., niedriger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- reclinata Jacq., niedergebeugter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- repens Thbg., kriechender, 4. k. t. Cap, Madagascar, Ceylon.
- reptatrix Jacq., wuchernder, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rigidula Jacq., starrlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rosacea Jacq., rosenartiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rosea Jacq. (*floribunda* Bot. reg. non Lehm.), rosafarbiger, 4. k. t. Chili.
- rostrata Jacq., schnabelförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- rubella Jacq., röthlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rubro-flava Jacq., rothgelber, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- sanguinea Jacq., blutrother, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- secunda Jacq., einseitigästiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- sericea L., seidenhaariger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- Simsii Swt. (*rosea* Sims), Sims's, 4. t. k. Chili.
- speciosa Jacq. (*purpurea* L. Thbg.), prächtiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- stricta L. (*corniculata* Auct.), steifer, ♂. ♂. f. Europa, Nordamerika.
- strumosa Jacq., kropfiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- sulfurea Jacq., schwefelgelber, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- tenella Jacq., zarter, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
- tenera Spgl., dünner, 4. Zw. t. Brasilien.
- tenuifolia Jacq., feinblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- tetraphylla Cav. (*esculenta* Hort.), vierblätteriger, 4. Kn. f. b. k. Mexico.
- tomentosa Thbg., filziger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- tortuosa Lindl., gewundener, 4. t. Chili.
- tricolor Jacq., dreifarbig, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- truncatula Jacq., abgestutzter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

**Oxalis**

tubiflora Jacq., röhrenblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) canescens Jacq.

undulata Jacq., wellenblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

variabilis Jacq., veränderlicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) grandiflora Jacq. γ) Simsii DC.

venosa Savign., aderiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

versicolor L., buntfarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

violacea L., violetter, 4. Zw. f. b. k. Nordamerika.

virginica Jacq., jungfräulicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Unbestimmtere: coerulea Hort., macrorrhiza Hort., palmata Hort., umbrosa Hort.

sensitiva L. v. Biophytum sensitivum.

**Oxleya** Cunn. (John Oxley, Gouverneur von Neusüdwallis), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

xanthoxylon Cunn., gelbholzige, ♀. t. Neuholland.

**Oxyadenia attenuata** Nutt. v. *Leptochloa filiformis*.

**Oxyanthus** DC., Spitzenblume, V. 1., Rubiaceae.

speciosus DC., prächtige, ♀. w. Sierra Leone.

**Oxybaphus** L'Her., Sauerwurz, III. 1., Nyctagineae.

Cervantesii Lag., Cervantes's, 4. k. Mexico.

chilensis Bert., chilesische, 4. k. Chili.

expansus Vahl, ausgebreitete, 4. k. Peru.

glabrifolius Vahl, kahlblättrige, 4. k. Neuspanien.

ovatus Vahl, eiförmige, 4. k. Peru.

prostratus Vahl, gestreckte, 4. k. Peru.

viscosus L'Her., schmierige, 4. k. Peru.

aggregatus Vahl, angustifolius Nutt., decumbens Nutt., hirsutus Nutt. (? pilosus Nutt.) et nyctagineus Nutt. vid. *Allionia aggregata*, linearis, decumbens etc.

**Oxycoccus** T., Moosbeere (Sauerbeere), VIII. 1., Ericaceae-Vaccinieae.

erythrocarpus P. (erectus Pursh), rothfrüchtige, ♀. f. b. k. Carolina.

macrocarpus P., großfrüchtige, ♀. f. b. k. Nordamer. b) foliis variegatis Hort.

palustris P. (vulgaris Pursh, europaeus Nutt.), gemeine, ♀. f. Europa, Nordamerika.

hispidulus P. v. *Phalerocarpus hispidulus*.

**Oxydendron** DC., Sauerstrauch, X. 1., Ericaceae.

arboreum DC., baumartiger, ♀. f. b. k. Nordamerika.

**Oxylobium** Andr., Schmalblatt, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

arborescens RB., baumartiges, ♀. t. Van-Diemens-Land.

capitatum Benth., kopfblumiges. ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

cordifolium Andr., herzblättriges, ♀. t. k. Neuholland.

ellipticum RB., elliptisches, ♀. t. Van-Diemens-Land.

ferrugineum Lod., rostfarbiges, ♀. t. Neuholland.

obtusifolium Swt., stumpfblättriges, ♀. t. Neuholland.

Pultenaeae DC., Pulteney's, ♀. t. Neuholland.

retusum RB., abgestutztblättriges, ♀. t. Neuholland.

spinosa DC., dorniges, ♀. t. Neuholland.



- Oxypetalum** RB., Spitzenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.  
 appendiculatum Mart., anhängseliges, ♂. Sch. w. Brasilien.  
 Gothofreda R. et S., Gothofred's, ♂. Sch. w. Neu-Granada.
- Oxyria** Hill, Säuerling, VI. II., Portulacaceae-Polygonaceae.  
 reniformis Hook. (*digyna* Campd.), nierenblättriger, 4. f. Europäische Alpen, Nordasien, Nordamerika.
- Oxystelma** RB., Spitzkränzchen, V. II., Asclepiadeae.  
 esculentum RB., genießbares, 4. Sch. w. Ostindien.
- Oxytropis** DC., Wirbelkraut (Kielschote), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 ambigua DC., zweifelhaftes, 4. f. b. Sibirien.  
 argyrea Fisch. et Mey. (*argyrophyllus* Hort.), perlmutterweißes, 4. f. b. Altai.  
 brevirostra DC. (*altaica* Pall.), kurzschnabeliges, 4. f. Sibirien.  
 campestris DC., gelblichblaues, 4. f. b. Europäische Alpen.  
     β) sordida Gaud. γ) coerulea Koch. δ) clovensis Loud.  
 coerulea DC., blaues, 4. f. b. Sibirien.  
 cyanea MB., himmelblaues, 4. f. b. Caucasus, Schweiz.  
 dealbata DC., weißliches, 4. f. b. Caucasus.  
 deflexa DC., herabgebeugtes, 4. f. b. Sibirien.  
 dichoptera DC., doppelflügeliges, 4. f. b. Sibirien.  
 Fischeri DC., Fischer's, 4. f. b. Altai.  
 foetida DC., stinkendes, 4. f. b. Schweiz, Piemont, Dauphiné.  
 glabra DC., kahles, 4. f. b. Dahurien.  
 grandiflora DC., großblumiges, 4. f. b. Sibirien.  
     β) leptoptera DC.  
 Lamberti Pursh, Lambert's, 4. f. b. Nordamerika.  
 lapponica Gaud., lappländisches, 4. f. b. Lappland, Schweiz.  
 leptophylla DC., schlankblättriges, 4. f. b. Sibirien.  
 longirostrata DC. (*Gmelini* Fisch.), langschnabeliges, 4. f. b. Sibirien.  
 microphylla DC., kleinblättriges, 4. f. b. Sibirien.  
 montana DC., Berg-W., 4. f. b. Ost- und mitteleuropäische Alpen.  
 myriophylla DC., vielblättriges, 4. f. b. Sibirien.  
 oxyphylla DC., spitzblättriges, 4. f. b. Sibirien.  
 Pallasii P., Pallas's, 4. f. b. Taurien.  
 pilosa DC., haariges, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 prostrata DC., gestrecktes, 4. f. k. Sibirien.  
 songarica DC., songarisches, 4. f. b. Sibirien.  
 sulphurea Fisch., schwefelgelbes, 4. f. b. Sibirien.  
 taurica P. (*filiformis* DC.), taurisches, 4. f. b. Taurien.  
 triflora Hoppe, dreiblumiges, 4. f. b. Krain, Tyrol, Schweiz.  
 uncata DC., hakiges, 4. f. b. Aleppo.  
 uralensis DC., ural'sches, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Schottland, Sibirien.  
     β) sericea DC.  
 verticillaris DC., wirtelförmiges, 4. f. b. Sibirien.

**Oxyura** DC., Spitzhülle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

chrysanthemoides DC., wucherblumenähnliche, ☉. f. Neucalifornien.

**Ozothamnus** RB., Strauchdosten, XIX. I., Compositae-Eupatorieae.

cinereus RB., aschfarbiger, ♀. k. t. Van-Diemens-Land.

terrugineus RB., rostfarbiger, ♀, k. t. Van-Diemens-L.

rosmarinifolius RB., rosmarinblättriger, ♀. k. t. Van-Diemens-Land.

**Pachidendron africanum** Haw., *angustifolium* Haw., *ferox* Haw., *principis* Haw., *pseudo-africanum* Haw., *pseudo-ferox* Haw. et *supralaeve* Haw. vid. *Aloe africana*, *stenophylla* etc.

**Pachynema** RB., Dickfädler, X. II., Dilleniaceae.

complanatum RB., plattästiger, ♀. t. k. Neuholland.

**Pachypodium succulentum** Lindl. et *tuberosum* Lindl. vid. *Echites succulenta* et *tuberosa*.

**Pachyrrhizus** Rich., Dickwurzler, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angulatus Rich., kantiger, ♀. Sch. Kn. w. Ostindien.

**Pachysandra** Mchx., Dickbeutler, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.

coriacea Hook., lederartiger, ♀. w. Nepal.

procumbens Mchx., niederliegender, 4. f. Nordamerika.

**Paederia** L., Knackbeere, V. I., Rubiaceae.

foetida L., stinkende, 4. ♀. w. Japan, Ostindien.

Lingun Boj., Lingun-K., ♀. w. Mauritius.

**Paederota** L., Alpenrodel, II. I., Personatae-Antirrhineae.

Ageria L. mant. (*lutea* L. fil., *urticifolia* Brign.), gelber, 4. f. b. k. Krain, Oberitalien.

β) *Zannichellii* Brignol.

Bonarota L. spec. (*coerulea* L. fil., *chamaedryfolia* Suffr.), blauer, 4. f. b. k. Kärnthen, Krain, Tyrol.

**Paeonia** T., Paeonie (Pfingstrose), XIII. II., Ranunculaceae.

albiflora Pall. (*edulis* Salisb.), weißblumige, 4. Kn. f. Sibirien, Tatarei, China.

a) *vestalis* Anders. b) *candida* Anders. c) *tatarica*. d) *sibirica*. e) *rubescens*. f) *uniflora*.

g) *Whitleji*. h) *Humei*. i) *fragrans*. k) *Pottsii* Sabin. l) *Reevesii* Sabin. m) *Richardsonii* J. C. n) *festu* Hort. (*Makoya* Hort.).

anomala L. (*laciniata* Pall.), unregelmäßige, 4. Kn. f. Sibirien.

arietina Anders., gehörnte, 4. Kn. f. Sibirien, ?Creta. b) *oxoniensis* (fl. albo).

Brownii Dougl., Brown's, 4. Kn. f. Nordamerika.

corallina Retz, Korallen-P., 4. Kn. f. England, Südeuropa, Griechenland, Bannat.

β) *bannatica* Roch.

cretica Lindl., cretische, 4. Kn. f. Creta.

decora Anders., geschmückte, 4. Kn. f. Thracien, Taurien.

a) *Pallasii*. b) *elatio*.

humilis Retz (*fimbriata* Hort.), niedrige, 4. Kn. f. Spanien.

b) *flore pleno*.

**Paeonia**

*mollis* Anders., weiche, 4. Kn. f. ? Sibirien.

*Moutan* Sims, Sm. (*arborea* Hort., *suffruticosa* Andr., *frutescens* W. E. suppl.), strauchartige, 5. f. b. k. Osttatarei, China, Japan.

a) *papaveracea* Andr. b) *Humei*. c) *rosea-semiplena*. d) *Rawesii*. e) *carnea plena*. f) *albida plena*. g) *variegata* D. Don. h) *lacera* Lindl. i) *punicea* D. Don (*phoenicea*). k) *speciosa*. l) *Banksiae*. m) *rosea*. n) *Anneslei*. o) *monstrosa*. p) *regia*. p) *rosa gallica*. r) *Delachii*. s) *alceiflora*. t) *purpurea plena*. u) *venosa*. v) *papilionacea* etc.

*officinalis* L. (*lobata* Dsf., *festiva* Tausch), 4. Kn. f. Süd- und Westeuropa.

b) *rosea*. c) *blanda*. d) *rubra*. e) *carnescens*. f) *albicans*. g) *anemoneflora*. h) *Baxteri* Sabin. i) *Sabini* (? *peregrina splendens* Hort.). k) *variegata* J. C. l) *multipetala* etc.

*paradoxa* Anders., wunderbare, 4. Kn. f. Levante, Südeuropa.

b) *fimbriata* (*tatarica* Mill.).

*peregrina* Mill. (*promiscua* Tausch), türkische, 4. Kn. f. Südeuropa, Griechenland, Türkei.

b) *Grevillii*. c) *compacta*.

*pubens* Sims, weichhaarige, 4. Kn. f. Südeuropa.

*Reevesiana* Paxt., Reeves's, 5. f. b. k. China.

*Russi* Bivon., Russ's, 4. Kn. f. Italien.

*tenuifolia* L., feinblättrige, 4. Kn. f. Taurien, Bannat, Sibirien.

b) *flore pleno* Goldie. β) *hybrida* Pall. (*laciniata* W., *latifolia* Hort.).

*triternata* Pall. (*daurica* Andr.), dreifach-dreizählige, 4. Kn. f. Sibirien.

*villosa* Swt. (*sessiliflora* Sims), zottige, 4. Kn. f. Südeuropa.

**Palafoxia** Lagasc. (Palafox, berühmter spanischer Patriot u. General), XIX. 1., Compositae-Eupatorieae.

*linearis* Lagasc., gleichbreitblättrige, 4. 5. t. Neuspanien.

**Palavia** Cav. (A. Paula y Verdera, ehemaliger Professor der Botanik zu Madrid), XVI. VIII., Malvaceae.

*malvaefolia* Cav., malvenblättrige, 6. f. m. Peru.

*moschata* Cav., moschusduftende, 6. f. m. Peru.

*rhombifolia* Grah., rautenförmige, 6. f. m. Lima.

**Palicourea** Aubl., Palicurie, V. 1., Rubiaceae.

*crocéa* R. et S., safranfarbige, 5. w. Westindien.

**Paliurus** T., Stechdorn, V. 1., Rhamnaceae.

*australis* G. (*aculeatus* Lam.), südeuropäischer, 5. f. b. k. Südeuropa.

*virgatus* D. Don, ruthenförmiger, 5. k. Nepal.

**Pallasia** *halimifolia* Ait. et *grandiflora* W. v. *Encelia canescens* et *halimifolia*.

**Pallenis** *spinosa* Cass. v. *Bupthalmum spinosum*.

**Panaetia** Cass., Panaetie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*fulva* Lindl., fahlgelbe, 6. f. m. Neuholland (Schwanenflufs).



- Panax** L., Kraftwurz, V. II. (XXIII. II.), Araliaceae.  
 aculeatus Ait., stachelige, f. t. w. China.  
 arboreus Forst., baumartige, f. t. Neuzeeland.  
 attenuatus Sw., verdünnte, f. w. Westindien.  
 chrysophyllus Vahl (*Morototoni* Anbl.), goldblättrige,  
 f. w. Westindien, Guiana.  
 conchifolius Roxb., muschelblättrige, f. w. Ostindien.  
 fruticosus L., strauchige, f. w. Molucken.  
 quinquefolius L., fünfblättrige, 4. f. k. Osttatarei,  
 Nordamerika.  
 ? rotundifolius Lk., rundblättrige, f. w. ?  
 trifolius L., dreiblättrige, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.  
*fragrans* Roxb. v. *Aralia fragrans*.
- Pancratium** L., Gilgen (Machtlilie), VI. I., Narcisseae-  
 Amaryllideae.  
 acutifolium Swt. (*mexicanum* Bot. reg.), spitzblättrige,  
 4. Zw. w. Mexico.  
 americanum Mill., amerikanische, 4. Zw. w. Jamaica.  
 amoenum Salisb., liebliche, 4. Zw. w. Guiana.  
 angustum Ker, schmale, 4. Zw. w. ? Südamerika.  
 biflorum Roxb., zweiblumige, 4. Zw. w. Ostindien.  
 canariense Ker, canarische, 4. Zw. t. Canarische Inseln.  
 caribaeum L. (*speciosum* Hort.), caribäische, 4. Zw. w.  
 Westindien.  
 crassifolium Herb., dickblättrige, 4. Zw. w. Südamer.  
 declinatum Jacq., niedergebogene, 4. Zw. w. Westind.  
 distichum Herb., zweireihige, 4. Zw. w. Südamerika.  
 Dryandri Ker, Dryander's, 4. Zw. w. ?  
 expansum Sims, ausgebreitete, 4. Zw. w. Westindien.  
 fragrans Salisb. (*caribaeum* Auct.), wohlriechende, 4.  
 Zw. w. Westindien.  
 guianense Ker, guianische, 4. Zw. w. Guiana.  
 illyricum L., illyrische, 4. Zw. f. b. k. Südeuropa.  
 litorale Jacq., Strands-M., 4. Zw. w. Südamerika.  
 longiflorum Roxb., langblumige, 4. Zw. w. Ostindien.  
 maritimum L., Meerstrands-M., 4. Zw. f. b. k. Süd-  
 europa, Nordafrika, Carolina, Ostindien.  
 β) *carolinianum* L.  
 mexicanum L., mexicanische, 4. Zw. w. Mexico.  
 ornatum Bouché, zierliche, 4. Zw. w. ? Südamerika.  
 ovatum Mill. (*amoenum* Andr.), eiförmige, 4. Zw. w.  
 Westindien.  
 parviflorum Red., kleinblumige, 4. Zw. w. ?  
 patens Red., abstehende, 4. Zw. w. Westindien.  
 pediale Lodd., fußslange, 4. Zw. w. Brasilien.  
 plicatum Livinst., gefaltete, 4. Zw. w. Macao.  
 rotatum Ker (*mexicanum* Walt.), radförmige, 4. Zw.  
 k. t. Carolina.  
 b) *biflorum* Bot. mag. (*disciforme* Redout.).  
 speciosum Salisb. (*formosum* Hort.), prächtige, 4. Zw.  
 w. Westindien.  
 undulatum Kunth, wellenblättrige, 4. Zw. Caracas.  
 verecundum Soland., schamhafte, 4. Zw. w. Ostindien.  
 Ungewiss: *triflorum* H. Angl.  
 zeylanicum L., zeylonische, 4. Zw. w. Ostindien.  
*Amancaës* Ker (et *calathinum* Ker) vid. *Ismene*  
*Amancaës* etc. *amboinense* L. (et *australasicum*  
 Ker) vid. *Eurycles amboinensis* etc. *incarnataum*  
 Kunth v. *Coburghia incarnata*, *luteum* Poir. vid.  
*Chlidanthus fragrans*.

- Pandanus** L. fil., Schraubenbaum, XXII. 1., Pandaneae.  
 albus Hort., weißer, f. w. Ostindien.  
 amaryllidifolius Roxb., amaryllisblättriger, f. f. w. Ostindien.  
 Candelabrum P. B., leuchterförmiger, f. w. Guinea.  
 edulis Thouars, essbarer, f. w. Madagascar.  
 fascicularis Lam., büschelförmiger, f. k. Ostindien.  
 foetidus Roxb., stinkender, f. w. Ostindien.  
 furcatus Roxb., gabelspaltiger, f. w. Ostindien.  
 humilis Rumph., niedriger, f. f. w. Ostindien, Mascarenas, Madagascar.  
 inermis Roxb., unbewehrter, f. w. Ostindien.  
 integrifolius Lour., ganzblättriger, f. w. Ostindien.  
 latifolius Hort., breitblättriger, f. f. w. Ostindien.  
 longifolius Lodd., langblättriger, f. w. Ostindien.  
 marginatus Roxb., berandeter, f. w. Ostindien, Mauritius.  
 odoratissimus L. fil., wohlriechender, f. w. China, Ostindien, Südseeinseln.  
 pedunculatus RB., langstieliger, f. w. Neuholland.  
 reflexus Hort., zurückgebogener, f. f. w. Ostindien.  
 sessilis Boj., stielloser, f. w. Mauritius, Ostindien.  
 spiralis RB., spiralförmiger, f. w. Neuholland.  
 turbinatus Lodd., kreiselförmiger, f. w. Ostindien.  
 utilis Bory, nutzbarer, f. w. Mascarenas, Madagascar.
- Pandera** Fisch. et Mey., Panderie, V. II. (1.), Aizoideae-Atripliceae.  
 pilosa Fisch. et Mey., haarige, ☉. f. Talüsch.
- Panicastrella capitata** Mch. v. *Echinaria capitata*.
- Panicum** L., Fennich, III. II., Gramineae.  
 altissimum Mey., höchster, ☉. f. m. Westindien.  
 anceps Mchx. (*rostratum* Mühlbg.), zweischneidiger, 4. f. Nordamerika.  
 arborescens L., baumartiger, 4. f. w. Ostindien.  
 arundinaceum Sw. (*patentissimum* Poir.), rohrartiger, 4. w. Westindien.  
 asperrium Lag., rauhester, ☉. f. ?  
 attenuatum W. (*coloratum* Hort., *proliferum* Lam., *Zéyeri* Hort., *dichotomiflorum* Mchx., *geniculatum* Mühlbg., *gongyloides* Jcq.), verdünnter, ☉. f. Nord- und Südamerika.  
 beckmanniaeforme Mikan, beckmanniaähnlicher, ☉. 4. w. Brasilien.  
 bicolor RB., zweifarbig, 4. w. Neuholland.  
 brevifolium L. (*filamentosum* P., *trichoides* Sw., *capillaceum* Lam.), kurzblättriger, ♂. 4. w. Westindien, Südamerika.  
 brizoides L. Juss., zittergrasähnlicher, ♂. w. Ostindien.  
 capillare L., haarförmiger, ☉. f. Ost- und Westindien, Nordamerika, Osteuropa.  
 carthagenense Sw., carthagenischer, 4. w. Neu-Granada.  
 clandestinum L., heimlichblühender, 4. f. Nordamer.  
 coloratum L. (*virgatum* Mühlbg.), farbiger, ☉. f. Aegypten, Nordamerika.  
 compressum Bivon., flachhalmiger, ☉. ♂. f. Sicilien.  
 contractum W. et Arn., schmalrispiger, ? 4. w. Ostind.  
 costatum Roxb., gerippter, 4. w. Ostindien, Mascarenas.

## Panicum

- cruciforme Sibth., kreuzförmiger, ♂. 4. k. Griechenland (Samos).  
 decompositum RB. (*tenuissimum* Hornem.), weitschweifig-rispiger, ♂. w. Ostindien, Neuholland.  
 decumbens Flüggl., niederliegender, ♂. ♂. w. Westindien, Südamerika.  
 despiciens Lk., übersehener, ♂. f. m. w. ?  
 dichotomum L. (*strictum* Pursh), zweizinkiger, ♂. f. Nordamerika.  
 diffusum Sw., weitschweifiger, 4. w. Westindien.  
 divaricatum L., ausgespreizter, 4. w. Jamaica.  
 fasciculatum Sw. (*fusco-rubens* Lam.), büschelförmiger, 4. w. Westindien, Südamerika,  
 flavidum Retz (*granulare* Lam., *brizoides* Roxb.), gelblicher, ♂. w. Ostindien, Mascarenas.  
 fuscum Sw., brauner, 4. w. Jamaica.  
 heteranthum Lk., verschiedenblumiger, ♂. w. Brasilien.  
 indicum L., indischer, 4. w. Ostindien.  
 interruptum W., unterbrochenrispiger, 4. w. Ostindien.  
 jumentorum P. (*polygamum* Sw., *maximum* Jacq., *laeve* Lam.), Pferde-F., ♂. 4. w. Westindien, Südamerika, Afrika.  
 latifolium L., breitblättriger, 4. f. Nordamerika.  
 laxum Sw., lockerrispiger, ♂. f. m. w. Jamaica.  
 marginatum RB., berandeter, 4. w. Neuholland.  
 miliaceum L., Hirse-F., ♂. f. Ostindien, Europa.  
     h) rubrum.  
 molle Sw., weicher, ♂. f. m. w. Westindien.  
 muricatum Retz, weichstacheliger, ♂. f. m. Ostindien.  
 nervosum Roxb. (*nepalense* Spgl.), nerviger, 4. w. Ostindien, Nepal.  
 nitidum Lam., glänzender, ♂. f. Nordamerika.  
 numidianum Lam. (*muticum* Lk.), numidischer, ♂. f. Nordafrika.  
 oryzoides Sw., reifähnlicher, ♂. f. m. w. Jamaica.  
 patens L. (*radicans* Retz), absteher, ♂. w. Ostindien, Mascarenas.  
 plantagineum Lk., wegrittblättriger, ♂. f. ?  
 pleiophyllum Lk., dichtblättriger, 4. w. ?  
 plicatum Lam., gefalteter, 4. w. Ostindien.  
 repens L. (*arenarium* Brot.), kriechender, ♂. ♂. f. Süd- und Westeuropa, Mexico.  
 Sieberi Lk. (*prostratum* Sbr., *grossarium* R. et S.), Sieber's, ♂. ♂. f. m. w. Aegypten, Ost- und Westindien.  
 tenellum Lam., zarter, ♂. f. m. w. Westafrika.  
 uliginosum Roxb., sumpfliebender, ♂. f. m. w. Ostind.  
 villosum Lam., zottiger, ♂. f. m. w. Ostindien.  
 virgatum L., ruthenförmiger, 4. f. Nordamerika.  
     *aegyptiacum* Retz (et *ciliare* Retz etc.) v. *Digitaria aegyptiaca* etc. *alopecuroides* L. vid. *Pennisetum Linnaei*. *Burmanni* Retz (*hirtellum* Burm.) et *colonum* L., *Crus galli* L., *echinatum* W., *frumentaceum* Roxb. etc.) vid. *Oplismenus Burmanni* etc. *cylindricum* Lk. (et *germanicum* Bauh., *helvolum* L., *italicum* L., *indicum* Hort. etc.) vid. *Setaria macrostachya* etc. *Dactylon* L. vid. *Cynodon Dactylon*. *glauescens* Lam. (*arborescens* Hort.) vid. *Ludolfia glaucescens*. *holcoides* Roxb. et *orientale* W.



**Panicum**

(et *violaceum* Lam., *vulpinum* W. etc.) vid. Pennisetum holcoides, orientale, violaceum et cenchroides etc. *Teneriffae* Spgl. v. *Tricholaena Teneriffae*.

**Panzeria** Mönch (Dr. Panzer, Arzt, Botaniker und Entomolog zu Nürnberg), XIV. 1., Labiatae.

*lanata* (L.), (*multifida* Mch.), wollige, 4. f. b. Sibirien.

**Papaver** T., Mohn, XIII. 1., Papaveraceae.

*alpinum* L., Alpen-M., 4. f. b. Mittel- und osteuropäische Alpen.

β) *Burseri* Crtz.

*arenarium* MB., Sand-M., ☉. f. Caucasus.

*Argemone* L., Acker-M., ☉. f. Europa.

*armeniaceum* Lam., armenischer, ☉. f. Armenien.

*bracteatum* Lindl. (*pulcherrimum* Fisch.), deckblättriger, 4. f. Sibirien.

*caucasicum* MB., caucasischer, ☉. ♂. f. Caucasus.

*commutatum* Fisch. et Mey., verwechselter, ☉. f. Iberien.

*croceum* Ledeb., safranfarbiger, 4. f. b. Altai.

*dubium* L., zweifelhafter, ☉. f. Europa.

*floribundum* Dsf., blüthenreicher, ☉. ♂. f. Armenien.

*gariepinum* Burch., südafrikanischer, ☉. f. Südafrika.

*horridum* DC. (? *hispidum* Dsf.), steifborstiger, ☉. f. Neuholland.

*hybridum* L., Bastard-M., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

*laevigatum* MB., kahler, ☉. f. Taurien, Caucasus.

*microcarpum* DC., kleinfrüchtiger, 4. f. b. Kamtschatka.

*nudicaule* L., nacktstengeliger, 4. f. b. Norwegen, Grönland, Sibirien etc.

*obtusifolium* Dsf., stumpfblättriger, ☉. f. Nordafrika, Sardinien.

*officinale* Gml., officineller, ☉. f. Osteuropa, Aegypten.

*orientale* L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

b) *intermedium* H. Genev.

*persicum* Lindl., persischer, ☉. f. Persien.

*pyrenaicum* W. (*aurantiacum* Loisel.), pyrenäischer, 4. f. b. Pyrenäen, Tyrol etc.

b) *puniceum* DC.

*Rhoeas* L., Klatschrosen-M., ☉. f. Europa.

b) *maculatum*. c) *coccineum*. d) *carneum*. e) *album*. f) *variegatum*. g) *ranunculinum* (*flor. pleno*.)

β) *strigosum* Boenningh. γ) *Roubiaei* Vig. δ)

*trilobum* Wallr. ε) *intermedium* Beck.

*rubro-aurantiacum* Fisch. (? *miniatum* Rchb.), roth-orangefarbiger, 4. f. b. Dahurien.

*setigerum* DC., borstiger, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

*somniferum* L., Garten-M., ☉. f. Osteuropa, Aegypt. etc.

a) *nigrum*. b) *fimbriatum*. c) *rubro-plenum*.

d) *album*. e) *albo-plenum*. f) *variegatum*.

*turbinatum* DC., kreiselförmiger, ☉. f. Syrien.

Hybriden oder Gartenvarietäten: *sinense* Hort. *spectabile* Hortul.

*cumbricum* L. v. *Meconopsis cambrica*.

**Pappophorum** Schreb., Federgranne, III. 1., Gramineae.

*nigricans* RB., schwärzliche, 4. k. Neuholland.

*phleoides* Lag., lieschgrasähnliche, 4. w. Südamerika.

- Papyrus** Thouars, Papierstaude, III. 1., Cyperaceae.  
 antiquorum Lk., gebräuchliche, 4. w. Aegypten.  
 laxiflorus Spgl., lockerblumige, 4. w. Madagascar.  
 odoratus W., wohlriechende, 4. w. Westindien, Freundschaftsinseln.  
 tuberiferus Schrad., knollige, 4. Kn. w. Ostindien.
- Pardanthus** Ker., Pardelblume, III. 1., Irideae.  
 chinensis Ker., chinesische, 4. f. b. k. China.  
 nepalensis Swt., nepal'sche, 4. f. b. k. China.
- Pariana** Aubl. (guianischer Name), XXI. 1x. (XIII. 1.), Gramineae.  
 campestris Aubl., Feld-P., 4. f. w. Cayenne.
- Parietaria** T., Glaskraut, XXIII. 1. (IV. 1.), Urticaceae.  
 cretica L., cretisches, 4. f. Creta.  
 diffusa M. et K. (*judaica* Auct.), weitschweifiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa.  
 floridana Nutt., floridanisches, 4. f. Florida.  
 indica L., indisches, 4. w. Ostindien.  
 judaica L., israelitisches, 4. f. Süd- und Osteuropa.  
 lusitana L. (*ocymifolia* Poir.), portugiesisches, 4. f. Süd- und Westeuropa.  
 maderensis Rchb., madeirisches, 4. f. k. Madeira.  
 micrantha Ledeb., kleinblumiges, 4. f. Südrussland.  
 officinalis L. (*erecta* M. et K.), officinelles, 4. f. Europa.  
 pennsylvanica Mühlbg., pennsylvanisches, 4. f. Pennsylvan.  
 polygonoides W., knöterigähnliches, 4. f. Armenien.  
 prostrata Spgl., niedergestrecktes, 4. w. Südamerika.  
 urticaefolia L. suppl., nesselblättriges, 4. f. m. w. Mascarenas.
- Parinarium** Juss. (*Parinari* Aubl.), (guianischer Name), VII. 1., Chrysobalanaceae.  
 campestre Aubl., Feld-P., 4. f. w. Guiana.  
 excelsum G. Don, hohe, 4. f. w. Sierra Leone.  
 macrophyllum G. Don, großblättrige, 4. f. w. Sierra Leone.
- Paris** L., Einbeere, VIII. 1v., Sargentaceae (*Asparagineae*).  
 incompleta MB., unvollkommene, 4. f. Armenien, Iberien.  
 quadrifolia L., vierblättrige (gemeine), 4. f. Europa.  
 verticillata MB. (*polyphylla* Sm.), wirtelblättrige, 4. f. Ostsibirien, Nepal.
- Parivoo** Aubl. (guianischer Name), XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Caesalpinieae.  
 grandiflora Aubl., großblumige, 4. f. w. Guiana.
- Parkeria** Hook. (C. S. Parker, Entdecker dieser Gattung), XXIV. 1., Pterioideae.  
 pterioides Hook., saumfarnähnliche, 4. w. Guiana.
- Parkia** RB. (Mungo Park, berühmter Reisender in Afrika), XVI. vi., Leguminosae-Mimosaceae.  
 africana RB. (*biglobosa* G. Don), afrikanische, 4. f. w. Guinea.  
 uniglobosa G. Don, einkugelige, 4. f. w. Sierra Leone.
- Parkinsonia** Plum. (J. Parkinson, englischer Apotheker und Botaniker), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.  
 aculeata L., stachelige, 4. f. w. Westindien.
- Parnassia** T., Sumpfleberblume, V. 1v., ?Cistineae-Droseraceae.  
 asarifolia Vent., haselwurzblättrige, 4. f. b. Nordamerika.  
 caroliniana Mchx., carolinische, 4. f. b. k. Nordamerika.

**Parnassia**

- palustris L., gemeine, 4. f. Europa.  
 parviflora DC., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.  
 speciosa Hort. Angl. (? *grandifolia* DC.), prächtige, 4. f.  
 b. Nordamerika.

**Parochetus** Ham., Höckerbohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- communis Ham., gemeine, 4. k. Nepal.

**Paronychia** T. Juss., Nagelkraut, V. i., Portulacaceae-Paronychieae.

- alsinefolia Juss., alsinenblättriges, ☉. ♂. f. k.? Spanien.  
 bengalensis Juss., bengalisches, ☉. f. Bengalen.  
 brasiliana DC., brasilianisches, 4. k. t. Brasilien.  
 canariensis Juss., canarisches, 4. ♀, k. Teneriffa.  
 capitata Lam. (*cephalotes* MB.), kopfförmiges, 4. f. b. k.  
 Süd- und Osteuropa.  
 cymosa DC., afterdoldiges, ☉. f. Südeuropa.  
 hispanica DC. (*Illecebrum Paronychia* L., *I. narbonense* Schrad.), spanisches, 4. f. b. Süd- u. Westeuropa.  
 italica R. et S., italienisches, 4. k. Italien.  
 nivea DC., schneeweisses, 4. k. Südfrankreich, Sicilien.  
 polygonifolia Juss., knöterigblättriges, 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.  
 pubescens DC. (*maritima* Auct.), weichhaariges, 4. f. b. k. Frankreich.  
 serpyllifolia Juss., quendelblättriges, 4. f. b. k. Südfrankreich, Pyrenäen.  
 tenuifolia Lk., feinblättriges, ☉. f. ?

**Parrya** RB. (Capitain Parry, berühmter englischer Seefahrer), XV. iii., Cruciferae.

- arctica RB., nördliche, ☉. f. Melvilleinseln.  
 integerrima G. Don, ganzblättrige, 4. ♀. k. Sibirien.

**Parsonsia** RB. (Dr. Parsons, schottischer Botaniker), V. i., Contortae-Apocynae.

- corymbosa RB., traubendoldige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
 floribunda RB., blüthenreiche, ♀. Sch. w. Jamaika.

**Parthenium** L., Parthenie, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

- Hysterophorus L., feinblättrige, ☉. f. m. Westindien, Südamerika.

- incanum H. B. K., weißgraue, ☉. f. m. Mexico.  
 integrifolium L., ganzblättrige, ii. f. Nordamerika.

**Pascalialia** Orteg. (D. Pascal, Prof. der Medicin zu Parma), XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

- glauca Ort., blaugrüne, 4. k. Chili.

**Paspalum** L., Pfannengras, III. ii., Gramineae.

- ciliatifolium Mchx. (*pubescens* W., *setaceum* Mchx., *supinum* Bosc., *debile* Mchx., *infirmum* R. et S.), franzenblättriges, 4. w. Carolina, Hispaniola.  
 conjugatum Berg. (*tenue* G.), gepaartes, ☉. f. m. w. Südafrika.  
 debile Poir., schwaches, ☉. f. Nordafrika.  
 difforme Leconte, ungleichförmiges, ☉. f. Nordamerika.  
 dissectum L., zerschlitztes, ☉. f. m. w. Südamerika.  
 distichum Burm. (*longiflorum* P. B.), zweizeiliges, ♂. w. Ostindien, Mauritius.  
 dubium DC., zweifelhaftes, ♂. w. ?  
 elegans Flüg. (*tenellum* W., *pubescens* Hort.), zierliches, 4. w. Südamerika.



**Paspalum**

- ferrugineum* Trin. (*quadrifarium* Hort. Berol.), rostfarbiges, 4. w. Montevideo.  
*glabrum* Poir., kahles, 4. w. Westindien.  
*lanceolatum* Lk., lanzettblättriges, 4. w. Brasilien.  
*lanuginosum* N. E., wolliges, ☉. f. m. Brasilien.  
*lasiogonum* Lk., haarkantiges, ☉. w. f. m. ?  
*laxum* Lam. (*laeve* Mchx.), lockeres, ☉. 4. f. w. Nord- und Südamerika.  
*litorale* RB. (*Kora* Forst.), Strand-P., 4. w. Neuholland, Ostindien, Mauritius.  
*membranaceum* Lam., dünnhäutiges, 4. w. Peru.  
*notatum* Flüg., schwarzpunctirtes, 4. ☉. f. m. Westind.  
*platense* Spgl., la Plata-P., 4. w. Monte-Video.  
*pusillum* Vent. (*orbiculatum* Poir.), kleinstes, 4. w. Westind.  
*scrobiculatum* L. (*Kora* W.), raspelartiges, 4. w. Ostind.  
*singulare* Lk., einfaches, ☉. w. Brasilien.  
*stoloniferum* Bosc, (*racemosum* Jacq.), sprossendes, 4. k. w. Süd- und Nordamerika.  
*supinum* Hornem., niedriges, ☉. f. Nordamerika.  
*Swartzianum* Flüg. (*filiforme* Sw.), Swartz's, ☉. f. m. w. Westindien.  
*vaginatum* Sw., scheidiges, 4. w. Westindien, Afrika, Neuholland.  
*variegatum* Lk., buntes, 4. w. ?  
*villosum* Thbg., zottiges, ☉. f. m. Japan.  
*virgatum* L., ruthenförmiges, ☉. 4. f. m. w. Westindien.  
*filiforme* Flüg. *inaequale* Lk. etc. vid. *Digitaria filiformis* etc.

**Passerina** L., Spazenstrauch, VIII. 1., Thymelaeaceae.

- annua* Wikstr., jähriger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.  
*anthylloides* L. fil., anthyllisähnlicher, h. k. t. C. d. g. H.  
*calycina* DC., großkelchiger, ♀. k. Pyrenäen.  
*capitata* L., kopfförmiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*ciliata* L., gefranzter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.  
*corifolia* Wikstr., corisblättriger, ♀. w. Spanien.  
*dioica* Ram. (*empetrifolia* Lap.), zweihäusiger, ♀. k. Pyrenäen.  
*ericoides* L., heideähnlicher, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
*filiformis* L., fadenförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
*grandiflora* L. fil., großblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.  
*hirsuta* L., rauhhhaariger, ♀. k. Südeuropa.  
*laxa* L. fil., lockerästiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*linearifolia* Wickstr., gleichbreitblättriger, ♀. k. t. C. d. g. H.  
*rigida* Wickstr., starrer, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
*spicata* L. fil., ährenförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
*Stelleri* Wickstr., Steller's, ♀. k. Sibirien.  
*Tartouira* Schrad., silberblättriger, ♀. k. Südfrankreich, Italien.  
*tenuiflora* W., dünnblumiger, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.  
*thesioides* Wickstr., thesiumähnlicher, ♀. k. Spanien.  
*Thunbergii* Wickstr., Thunberg's, ♀. k. Cap d. g. H.  
*Thymelaea* DC., olivenblättriger, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.  
*uniflora* L., einblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.  
*villosa* L., zottiger, ♀. k. Südeuropa, Kleinasien.  
*conglomerata* Thbg. vid. *Lachnaea conglomerata*.  
*laevigata* L. *stricta* Thbg. v. *Gnidia oppositifolia* et *stricta*.

**Passiflora** L., Passionsblume, XVI. II., Passifloreae.

*Adiantum* W., frauenhaarblättrige, ♀. Sch. w. Norfolk-insel.

*alata* Ait., geflügelte, ♀. Sch. w. Westindien.

b) *alato-coerulea* Hybride.

*albicans* H. C., weißliche, ♀. Sch. w. Mexico.

*albida* Ker, weißse, ♀. Sch. w. Brasilien.

*Andersonii* DC., Anderson's, ♀. Sch. w. St. Lucia.

*angulata* Swt., kantige, ♀. Sch. w. Mexico.

*angustifolia* Sw. (*heterophylla* Ait., *longifolia* Lam.), schmalblättrige, ♀. Sch. w. Westindien.

*auriculata* H. B. K., geöhrte, ♀. Sch. w. Südamerika.

*bryonifolia* H. B. K., zaunrübenblättrige, ♀. Sch. w.

Mexico, Westindien.

*capsularis* L., kapselförmige, ♀. w. ?

*caracasana* L. (*rubricaulis* Jacq.), rothstengelige, ♀. Sch. w. Südamerika.

*Cavanillesii* DC., Cavanilles's, ♀. Sch. w. Caribäen.

*cephaleima* Bory, kopfförmige, ♀. Sch. w. Brasilien.

*chinensis* Swt., chinesische, ♀. Sch. t. k. China.

*ciliata* Ait., gefranzte, ♀. Sch. w. Jamaica.

*coccinea* Aubl., scharlachfarbige, ♀. Sch. w. Guiana.

*coerulea* L., blaue, ♀. Sch. k. f. b. Brasilien.

b) *coeruleo-racemosa*. c) *angustifolia*. d) *glaucophylla*. e) *Colvillii* Swt.

*cuneata* W. (*lyraefolia* Tussac.), keilförmige, ♀. Sch. w. Westindien.

*cuneifolia* Cav., keilblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

*cuprea* L., kupferfarbige, ♀. Sch. w. Bahama-Inseln.

*digitata* G. Don, fingerförmige, ♀. Sch. w. Trinidad.

*discolor* Lk. (*Maximiliana* Bory), verschiedenfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.

*edulis* Sabin. Ker, genießbare, ♀. Sch. w. Brasilien.

*filamentosa* Cav. (*palmata* Bot. Cab.), fadige, ♀. Sch. w. Südamerika.

*foetida* L., stinkende, ☉. Sch. w. Westindien.

*glabrata* H. B. K. (*hemicycla* Mey.), kahle, ♀. Sch. w. Neugranada, Surinam.

*glauca* Ait. (*stipulata* Aubl., *amethystina* Mik.), blaugrüne, ♀. Sch. w. Cayenne.

*gossypifolia* Desv. (*hibiscifolia* DC.), baumwollenblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

*gracilis* Jacq., schlanke, ☉. ♀. Sch. w. ? Brasilien.

*hederacea* L., epheublättrige, ♀. Sch. w. Westindien.

*heterophylla* Lam., verschiedenblättrige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

*hircina* Swt. (*foetida* Bot. mag. *hirsuta* Bot. Cab.), bockduftende, ♀. Sch. w. Brasilien.

*hirsuta* L., rauhhaarige, ♀. Sch. w. Westindien.

*holosericea* L., sammethaarige, ♀. Sch. w. Neuspanien.

*incarnata* L., fleischfarbige, 4. k. f. b. Carolina.

*kermesina* Lk. et Otto, karmoisinrothe, 4. ♀. Sch. w. Brasilien.

*laurifolia* L., lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Surinam.

*ligularis* Juss., bandförmige, ♀. Sch. w. Neugranada.

*Lockhartii* G. Don, Lockhart's, ♀. Sch. w. Trinidad.

*Loudoni* Atkins, Loudon's, 4. ♀. Sch. w. Hybride.

*lunata* Sm. (*biflora* Lam.), mondförmige, ♀. Sch. w. Jamaika, Mexico.

β) *acutiloba*.

**Passiflora**

*lutea* L., gelbe, ♂. Sch. w. Westindien, Carolina.  
*maculata* Donn (*peltata* Pursh), gefleckte, 4. Sch. k.  
 Nordamerika.

*maliformis* L., apfelfrüchtige, ♂. Sch. w. Westindien.  
*Mayana* Loud., May's, ♂. Sch. k. Hybride.

*mexicana* Juss., mexicanische, ♂. Sch. w. Mexico.

*minima* L., kleinblumige, ♂. Sch. w. Westindien.

*mucronata* Lam., weichspitzige, ♂. Sch. w. Brasilien.

*multiflora* L., vielblumige, ♂. Sch. w. Antillen.

*multiformis* Jacq. fil., vielgestaltige, ♂. Sch. w. ?

*nigelliflora* Hook., schwarzkümmelblumige, ♂. Sch. w.  
 Buenos-Ayres.

*normalis* L., schmallappige, ♂. Sch. w. Jamaica,  
 Mexico.

*oblongata* Sw., länglichblättrige, ♂. Sch. w. Jamaica.

*obscura* Lindl., dunkle, ♂. Sch. w. Westindien.

*pallida* L., bleiche, ♂. Sch. w. Hispaniola.

*palmata* Lk., handförmige, ♂. Sch. w. t. Brasilien.

*patula* Wendl., absteigende, ♂. Sch. w. ?

*pedata* L., fußförmige, ♂. Sch. w. Westindien.

*peltata* Cav., schildförmige, ♂. Sch. w. Westindien.

*picturata* Ker, bemalte, ♂. Sch. w. Brasilien.

*phoenicea* Loud., hochrothe, ♂. Sch. w. ?

*punctata* L., punktirte, ♂. Sch. w. Peru.

*quadrangularis* L., vierkantige, ♂. Sch. w. Westindien,  
 Südamerika.

*racemosa* Brot. (*princeps* Lodd.), traubige, ♂. Sch. w. t.  
 Brasilien.

*Raddiana* DC., Raddi's, ♂. Sch. w. Brasilien.

*rotundifolia* L., rundblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.

*rubra* L., rothe, ♂. Sch. w. Westindien.

*serrata* L., sägezahnige, ♂. Sch. w. Westindien.

*serratifolia* L., sägeblättrige, ♂. Sch. w. Südamerika.

*serrulata* Jacq., feingesägte, ♂. Sch. w. Südamerika.

*sexflora* Juss., sechsblumige, ♂. Sch. w. Hispaniola.

*suberosa* L., korkige, ♂. Sch. w. Westindien.

*Sulivani* Booth (*onychina* Lindl.), Sullivan's, ♂. Sch. w.  
 Buenos-Ayres.

*tiliaefolia* L., lindenblättrige, ♂. Sch. w. Peru.

*tinifolia* Juss., tinusblättrige, ♂. Sch. w. Cayenne.

*tripartita* Brot., dreitheilige, ♂. Sch. w. ?

*tuberosa* Jacq. (*punctata* Lodd.), knollige, ♂. Sch. Kn.  
 w. Südamerika.

*tucumanensis* Hook., tucumanische, ♂. Sch. w. Chili.

*ulmifolia* Ait., ulmenblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.

*vitifolia* H. B. K., weinblättrige, ♂. Sch. w. Südamer.

*adiantifolia* Ker et *Herbertiana* Ker vid. *Disemma*

*adiantifolia* et *Herbertiana*. *Murucuja* L. (et *per-*

*foliata* L.) v. *Murucuja* ocellata et *perfoliata*. *pe-*

*duncularis* Cav. v. *Tacsonia peduncularis*.

**Pastinaca** T., Pastinak, V. II., Umbelliferae.

*dissecta* Vent., schlitzblättriger, ♂. f. Syrien.

*Fleischmanni* Hladnik, Fleischmann's, ♂. f. Krain.

*foeniculacea* Spgl., fenchelähnlicher, 4. f. Nordamerika.

*graveolens* MB., starkkriechender, ♂. f. Taurien,  
 Podolien.

*lucida* Gouan, spiegelnder, ♂. f. b. k. Balearische  
 Inseln.



**Pastinaca**

- nudicaulis Spgl., nacktstengeliger, 4. f. Nordamerika.  
 opaca Bernh., dunkler, ♂. f. Illyrien.  
 pimpinellifolia MB., bibernellblättriger, ♂. f. Caucasus.  
 rigida Spgl., starrer, 4. f. Nordamerika.  
 sativa L., gemeiner, ♂. f. Europa.

*Anethum* Spgl. v. *Anethum graveolens*. *Opopanax*  
 L. v. *Opopanax Chironium*.

**Patagonula** L., *Patagonula*, V. 1., *Asperifoliaceae*.

*americana* L., amerikanische, ♀. t. w. Patagonien.

**Patersonia** RB. (W. Paterson, englischer Reisender und Botaniker), XVI. 1. (III. 1.), *Irideae*.

- glabrata* RB., kahle, 4. t. Neusüdwallis.  
*glauca* RB., blaugrüne, 4. t. Neusüdwallis.  
*lanata* RB., wollige, 4. t. Neusüdwallis.  
*longifolia* RB., langblättrige, 4. t. Neusüdwallis.  
*longiscapa* Swt. (*glauca* Bot. mag.), langschafte, 4. t. Neusüdwallis.

- media* RB., mittlere, 4. t. Neusüdwallis.  
*occidentalis* RB., westliche, 4. t. Neusüdwallis.  
*sericea* RB., seidenhaarige, 4. t. Neusüdwallis.

**Patrinia** Juss. (M. Patrin, welcher Sibirien bereiste), IV. 1., *Valerianeae*.

- coronata* Fisch., gekrönte, ♂. 4. f. Dahurien.  
*intermedia* Fisch., mittlere, ♂. 4. f. Sibirien.  
*nudiuscula* Fisch., kahlblättrige, ♂. 4. f. Sibirien.  
*rupestris* Juss., Felsen-P., ♂. 4. f. Sibirien.  
*scabiosaefolia* Fisch., scabiosenblättrige, ♂. 4. f. Dahurien.

- serratulifolia* Fisch., scharfenblättrige, ♂. 4. f. Sibirien.  
*sibirica* Juss., sibirische, ♂. 4. f. Sibirien.

*pyrifera* Rich. v. *Ryanea speciosa*.

**Paullinia** L. (S. Paulli, Professor der Arzneikunde zu Copenhagen), VIII. III., *Sapindaceae-Paullinieae*.

- barbadensis* Jacq., barbadensische, ♀. Sch. w. Caribäen.  
*bipinnata* Poir., doppeltgefiederte, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*caribaea* Jacq., caribäische, ♀. Sch. w. Caribäen, Südamerika.

*carthagenensis* Jacq., carthagenische, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.

- cauliflora* Jacq., stengelblumige, ♀. Sch. w. Südamer.  
*Cupania* H. B. K., *Cupani's*, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*curassavica* L., curassavische, ♀. Sch. w. Westindien.  
*Cururu* L., *Cururu-P.*, ♀. Sch. w. Westindien.  
*hispida* Jacq., steifhaarige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*meliaeifolia* Juss., meliablättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*pinnata* L., gefiederte, ♀. Sch. w. Westindien.  
*polyphylla* Schum., vielblättrige, ♀. Sch. w. Westind.  
*pubescens* H. B. K., weichhaarige, ♀. Sch. w. Südamerika.

- senegalensis* Juss., senegalische, ♀. Sch. w. Guinea.  
*sphaerocarpa* Rich., kugelschafte, ♀. Sch. w. Guinea.  
*tetragona* Aubl., vierseitige, ♀. Sch. w. Guiana.  
*Vespertilio* Sw., geflügelte, ♀. Sch. w. Caribäen.

**Pavetta** Rheed. (malabarischer Name), IV. 1., *Rubiaceae*.

- arenosa* Lour. (*indica* Bot. Reg.), sandliebende, ♀. ♀. w. Südchina.  
*caffra* Thbg., caffer'sche, ♀. ♀. w. Cap der gut. Hoffn.  
*indica* L., indische, ♀. ♀. w. Ostindien.

**Pavia** Boerh. (P. Paw, Professor der Botanik zu Leyden), VII. 1., Sapindaceae-Hippocastaneae.

*flava* DC. (*lutea* Poir.), gelbliche, f. f. Nordamerika.

*hybrida* DC. (*discolor* Swt.), verschiedenfarbige, f. f. Nordamerika.

*macrocarpa* Hort., großfrüchtige, f. f. ?

*macrostachya* Lois. (*alba* Poir., *edulis* Poit.), großsährige, f. f. Nordamerika.

*neglecta* G. Don, übersehene, f. f. ?

*rubra* Lam., rothblumige, f. f. Nordamerika.

β) *arguta* G. Don. γ) *sublaciniata* Wats. δ)

*humilis* G. Don. b) *humilis pendula* A. B. ε)

*flavescens* Hayn.

**Pavonia** Cav. (J. Pavon, spanischer Botaniker und Reisender), XVI. VIII., Malvaceae.

*Berterii* Spgl. (*Hibiscus pentaspermus* Hort.), Bertero's, f. w. Jamaica.

*cancellata* Cav., gitterhüllige, c. w. m. f. Caracas.

*ceylanica* Cav., ceylonische. c. w. m. f. Ostindien.

*coccinea* Cav., scharlachfarbige, f. w. St. Domingo.

*Columella* Cav. (*parviflora* Dsf.), Columella's, f. w. Mascarenas.

*corymbosa* W., traubendoldige, ♂. f. w. Südamerika, Westindien.

*leptocarpa* Cav., schlankkapselige, f. w. Surinam.

*odorata* W., wohlriechende, f. w. Ostindien.

*paniculata* Cav., rispenblumige, f. w. Südamerika.

*pentacarpa* Rchb. (*veneta* Spgl.), venetianische, 4. k. Friaul, Venedig.

*platanifolia* W. (*acerifolia* Lk.), platanusblättrige, 4. f. w. Ostindien.

*praemorsa* W. (*cuneifolia* Cav.), abgebissene, f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*racemosa* Sw. (*spicata* Cav.), traubige, f. w. Westind.

*sidoides* Hornem., sidaähnliche, ♂. f. w. Bengalen.

*Spinifex* Cav., stachelige, f. w. Westindien.

*Typhalaea* Cav., kopfblumige, f. w. Westindien.

*typhalaeoides* H. B. K., langgrannige, f. w. Neu-Granada.

*urens* Cav., brennende, f. w. Mascarenas.

*virginica* Spgl., virginische, 4. f. b. k. Virginien.

*latifolia* Spgl. et *Schrankii* Spgl. vid. *Lebretonia latifolia* et *coccinea*.

**Paxtonia** Lindl. (J. Paxton, englischer Botaniker und Pflanzen-Cultivateur), XX. 1., Orchideae.

*rosea* Lindl., rosafarbige, 4. w. Philippinen.

**Pectinaria articulata** Haw. v. *Stapelia articulata*.

**Pectidium** Less., Pectidie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*punctatum* Less., DC., punktirte, c. f. m. Hispaniola.

**Pectis** L., Kammfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*canescens* H. B. K., grauliches, c. f. m. Mexico.

*ciliaris* L., gefranztes, c. f. m. Hispaniola.

*humifusa* Sw., niederliegendes, c. f. m. Westindien.

*linifolia* L., flachblättriges, c. f. m. w. Westindien.

*prostrata* Cav., gestrecktes, c. f. m. Neuspanien, Martinique.

**Pectis**

*Swartziana* Less. (*punctata* Sw.), Schwartz's, ☉. f. m. Westindien.

*discoidea* Hornem. v. *Leyssera capillifolia*.

**Pedaliu** L., Pedalie, XIV. II., Personatae-Sesameae (*Pedalineae*).

*Murex* L., stachelfrüchtige, ☉. w. f. m. Ostindien.

**Pedicularis** T., Scepterkraut, XIX. II., Personatae-Rhinantheae (*Pedicularae*).

*acaulis* Scop., schaftloses, 4. f. b. Krain, Oberitalien.

*asplenifolia* Flörk., strichfarnblättriges, 4. f. b. Tyroler, kärnthner, salzburger, steyermärkische Alpen.

*atrorubens* Schlch., schwarzrother, 4. f. b. Schweizer Alpen.

*Barrelieri* Rchb. (*adscendens* Gaud.), Barrelier's, 4. f. b. Schweizer Alpen.

*canadensis* L., canadisches, 4. f. b. Nordamerika.

*comosa* L., schopfiges, 4. f. b. Süd-, west- und ost-europäische Alpen.

*compacta* W., dichtblumiges, 4. k. Sibirien.

*euphrasioides* Steph., euphrasiaähnliches, 4. k. Nord-sibirien, Labrador.

*fasciculata* Bell., büschelförmiges, 4. f. b. Südliche Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich.

*flammea* L., feuerfarbiges, 4. f. b. k. Nordeuropäische Alpen, Sibirien.

*flava* Pall., hellgelbes, 4. k. Sibirien, Kleinasien.

*foliosa* L., blattreiches, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*Friederici-Augusti* Tommas., Friedrich-August's, 4. f. b. k. Oesterreichisches Litorale.

*gyroflexa* Vill., ringförmiges, 4. f. b. Dauphiné.

*Hacquetii* Graf., Hacquet's, 4. f. b. Krain.

*incarnata* Jacq., fleischfarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*Jacquini* Koch (*rostrata* Jcq.), Jacquin's, 4. f. b. Tyrol, Oesterreich.

*myriophylla* Pall., vielblättriges, 4. k. Imaus.

*palustris* L., Sumpf-S., ♂. f. Europa.

*Portenschlagii* Saut., Portenschlag's, 4. f. b. Steyermark.

*recutita* L., beschnittenes, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Nordamerika.

*resupinata* L., schieflippiges, 4. k. Sibirien.

*rosea* Jacq., rosafarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*rostrata* L., schnabelförmiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*Sceptrum* Carolinum, Carl's, 4. f. b. Nord- und Osteuropa, Baiern etc.

*sudetica* W., Riesengebirgs-S., 4. f. b. Riesengebirge.

*sylvatica* L., Wald-S., ♂. f. Europa.

*tuberosa* L. (*gyroflexa* b. Vill., *adscendens* Hopp. Schlchr.), dickwurzeliges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*uncinata* Steph. (*incarnata* L.), hackiges, 4. k. Nord-sibirien.

*versicolor* Wahlbg. (*flammea* Wulf.), buntfarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*verticillata* L., wirtelförmiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.



**Pedilanthus** Neck., Schublume, XI. III. (XXI. III.),

Tricoccae-Euphorbiaceae.

*canaliculatus* Swt., rinnenförmige, ♀. w. Südamerika.*carinatus* Spgl., kielförmige, ♀. w. ?*cordatus* Spgl. (*cordellatus* Haw.), herzblättrige, ♀. w. Südamerika.*padifolius* Poit., traubenkirschenblättrige, ♀. w. Südamerika.*subcarinatus* (Haw.), gefaltzte, ♀. w. Südamerika.*tithymaloides* Poit. (*myrtifolius* Lk.), myrtenblättrige, ♀. w. Südamerika, Westindien.**Peganum** L., Harmelraute, XI. I., Tricoccae-Rutaceae.*Harmala* L. (*crithmifolium* Retz), gemeine, 4. f. Spanien, Südrufsländ.*dauricum* L. β. v. *Haplophyllum dahuricum*.*Pekea tuberculosa* Aubl. v. *Caryocar tomentosum*.**Pelargonium** L'Her., Kranichschnabel, XVI. IV., Geraniaceae,I. *Campylia* Swt.*blattarium* Jacq., mottenkrautähnlicher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*canum* P., weißgrauer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.*carinatum* Swt., kieliger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.*eristemon* Jacq., woffadiger, ♀. k. t. Cap d. gut. H.*holosericeum* DC., Swt., sammethaariger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*Oenotherae* Jacq., Nachtkerzen-K., 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.*verbasciflorum* Swt., königskerzenblumiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.II. *Chorisma* Lindl.*tetragonum* L'Her., vierseitiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.b) *variegatum*.III. *Ciconium* Swt. (*Pelurgium* DC.).*abrotanifolium* Jacq., stabwurzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*acerifolium* L'Her., ahornblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*acetosum* Ait., saurer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.a) *album*. b) *carneum*. c) *fol. variegat.**acugnaticum* Carm., Thouars, Acunna-K., ♀. k. t. Tristan d'Acunna.*adulterinum* L'Her., verschägerter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*alchemilloides* Ait., löwenfußblättriger, 4. k. Cap der guten Hoffnung.*alnifolium* W., erlenblättriger, ♀. k. t. Cap d. gut. H.*amplissimum* Wendl. (*distentifolium* Hort.), grofszahniger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.*anceps* Ait., zweischneidiger, 4. k. Cap der gut. Hoffn.*angulosum* Ait., kantiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.b) *plicatum* Hort. c) *minimum*.*asperum* W., rauher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.*augustum* Lk., herrlicher, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.*balsameum* Jacq., balsamischer, ♀. k. t. Cap d. gut. H. b) *latifolium*.*Barringtonii* W., Barrington's, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

## Pelargonium

- betulinum Ait., birkenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) incisum. c) latifolium. d) odoratum.
- bicolor Ait., zweifarbiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 b) lobatum. c) purpureum.
- brancaefolium\* (*heracleifolium* Swt.), bärenklaubblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- capitatum Ait., kopfförmiger, ♀. k. t. Cap der gut. H.  
 b) latifolium. c) suaveolens. d) fol. varieg.
- cardiifolium Swt., distelblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- cochleatum W. (*concauifolium* Wendl.), löffelblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- conduplicatum W. (*cordifolium* Hort.), zusammengefalteter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) crispum. c) variegatum.
- consanguineum W., verwandter, ♀. k. t. ?Hybride.
- cordatum Ait., herzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) fol. variegat.
- cortusaefolium L'Her., cortusablättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) album. c) kermesinum. d) rubrum. e) crispum.
- crassicaule Ait. (*mammillaricaule* s. *mammulosum* Hort.), dickblättriger, 4. ♀. k. t. Südafrika.  
 b) maculatum Swt.
- crenatum Andr., Swt., gekerbter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- crispum Ait., krauser, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.  
 b) minus.
- cucullatum Ait., kappenförmiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) striatiflorum Swt. c) majus Swt. d) grandiflorum Swt. e) parviflorum Swt.
- cuspidatum W. (*glaucophyllum* Wendl.), feinspitziger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- delphinifolium W., ritterspornblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- denticulatum Jacq., gezählter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) latifolium. c) lucidum.
- discipes Haw., dickstieliger, ♀. k. t. Cap der gut. H.
- diversifolium Wendl. (*tricuspidatum* et *paniculatum* Hort.), verschiedenblättriger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
- dondiaefolium Lk., dondiablättriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- echinatum Curt. (*hamatum* Jacq.), stacheliger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 b) purpureum.
- elegans W., zierlicher, 4. ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- exstipulatum Ait., zwischenblattloser, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- filipendulifolium Swt., filipendulablättriger, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- flavum Ait. (*daucifolium* W.), hellgelber, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
 β) daucoides Jcq.

**Pelargonium**

*formosissimum* P. (*formosum* Hort.), schöner, ♀. k. t.  
Cap der guten Hoffnung.

b) *lineatum* Swt, c) *rubrum*.

*Fothergillii* Swt., *Fothergill's*, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *purpureum* Swt.

*fragrans* W., wohlriechender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*fulgidum* Ait., leuchtender, ♀. k. t. Cap der gut. H.

*fuscum* Jacq., braungefleckter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *laevigatum*.

*gibbosum* Ait., höckeriger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

*glabellum* Lk., wenighaariger, ♀. k. t. ?Hybride.

*glaucum* L'Her., blaugrüner, ♀. k. t. Cap der gut. H.

b) *Tankervilliae* Hortul. γ) *lanceolatum* (Cav.).

*glomeratum* Donn, Jacq. (*australe* Swt., *aemulum* Hffmsg.), knaulförmiger, ♀. k. t. Neuholland.

*glutinosum* Ait. (*viscum* Hort.), klebriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *crispum*. c) *laciniatum*. d) *fol. variegat.*

*grandiflorum* W., großblumiger. ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *Barmanum* Hort. (*Burmanni* Hffmsg.).

*gratum* W. (*citriodorum* Hort., *citrosus* Voigt), citronenduftender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *latifolium*.

*graveolens* L'Her. (*terebinthaceum* Cav.), starkkriechender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *variegatum* Swt.

*grossularioides* Ait., stachelbeerblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*hepaticaefolium* Spgl., leberkrautblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*hermanniaefolium* Jacq., hermannienblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *majus* (*latifolium* Hort.).

*heterogamum* Ait., L'Her., verschiedenehiger, ♀. k. Hybride.

*hirtum* Jacq., haarstieliger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

*hispidum* W., steifhaariger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

*hybridum* Ait. (*coccineum* Ehrh.), Bastard-K., ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

a) *coccineum* Hort. b) *lucidum* Hort. c) *roseum* Ehrh. (*carneum* Voigt).

*ignescens* Swt., feuerfarbiger, ♀. k. t. ?Hybride.

*imbricatum* Swt., ziegeldachförmiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*incisum* W., eingeschnittener, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*inodorum* W., geruchloser, ♀. k. t. Neuholland.

*inquinans* Ait., befleckter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

b) *album*. c) *Bentinkianum*. d) *carneum*. e) *coccineum*. f) *parviflorum*. g) *obtusum* (*orbiculare*, *Blücherianum* Hort.). h) *zonale*. i) *purpureum* (*tomentosum* Hort.).

*laevigatum* W., glatter, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*lateripes* L'Her., seitenstieliger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.



# Pelargonium

- b) album. c) zonatum Swt. d) roseum. e)  
albo-marginatum DC.  
leptopetalum Swt. (*stenopetalum* Andr.), schlankkroniger,  
‡. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
litorale Hügel, Strand-K., 4. ‡. k. t. Neuholland.  
lobatum Ait., gelappter, 4. Kn. k. t. Cap der gut. H.  
malvaefolium Jacq., malvenblättriger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
millefoliatum Swt., garbenblättriger, 4. Kn. k. t. Cap  
der guten Hoffnung.  
monstrum Ait., ungestalteter, ‡. k. t. ?Hybride.  
nigrescens Swt., schwärzlicher, ‡. k. t. Cap der gut. H.  
nobile Diet., edler, ‡. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
nothum W., unächter, ‡. k. t. Hybride.  
obtusilobum W. (*obtusifolium* Swt.), stumpflappiger, ‡.  
k. t. Cap der guten Hoffnung.  
odoratissimum Ait., wohlriechendster, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
oxyphyllum Swt. (*miniatum album* Andr.), spitzblättriger,  
‡. k. t. Cap der guten Hoffnung.  
ovale L'Her., eiförmiger, 4. k. t. Südafrika.  
pallens Swt., bleichblumiger, 4. ‡. Kn. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
pallidum W., bleicher, ‡. k. t. ?Hybride.  
papilionaceum Ait., schmetterlingsblumiger, ‡. k. Cap  
der guten Hoffnung.  
patentissimum Wendl., weitabstehender, ‡. k. t. Cap  
der guten Hoffnung.  
patulum Jacq., abstehender, ‡. k. t. Cap der gut. H.  
pedicellatum Swt., kurzgestielter, 4. Kn. k. t. Cap  
der guten Hoffnung.  
peltatum Ait., schildförmiger, ‡. k. t. Cap der gut. H.  
b) variegatum Andr.  
penicillatum W., pinselförmiger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
b) carneum.  
pictum P. (*rubromaculatum* Poir.), bemalter, 4. Kn. k. t.  
Cap der guten Hoffnung.  
primulinum Swt., primelblumiger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
principissae Swt., fürstlicher, ‡. k. t. Cap der gut. H.  
pulchellum Curt. (*Curtisianum* Spgl.), schöner, 4. Kn.  
k. t. Cap der guten Hoffnung.  
pulverulentum Swt., bestäubter, 4. ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
pumilum W., kleiner, ‡. k. t. Cap der guten Hoffn.  
b) carneum.  
pustulosum Swt., blätteriger, ‡. k. t. Cap der gut. H.  
quercifolium Ait., eichenblättriger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
b) bipinnatifidum Swt. c) querceolatum H. Par.  
d) quercinum Hoffmsg.  
quinguelobum Coll., fünfflappiger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
quingevulnerum P., fünffleckiger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
Radula Ait., L'Her., raspelblättriger, ‡. k. t. Cap der  
guten Hoffnung.  
β) roseum W.

**Pelargonium**

- reniforme Curt., nierenförmiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap d. g. H.  
 ribifolium Jacq., johannisbeerblättriger,  $\text{f. k. t.}$  Cap  
 der guten Hoffnung.  
 rigidum Donn., starrer,  $\text{f. k. t.}$  Cap der guten Hoffn.  
 rubens W., röthlicher,  $\text{f. k. t.}$  Cap der guten Hoffnung.  
 rubro-cinctum Lk., rothrandiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap d. g. H.  
 rugosum Sw., runzeliger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der gut. H.  
 sanguineum Wendl., blutrother,  $\text{f. t. k.}$  Cap d. g. H.  
 saniculaefolium W., sanikelblättriger,  $\text{f. t. k.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 scabrum Ait. L'Her., scharfer,  $\text{f. k. t.}$  Cap d. g. H.  
     b) album. c) rubrum.  
 scandens Ehrh., kletternder,  $\text{f. k. t.}$  Cap d. gut. H.  
     b) roseum. c) fol. variegat.  
 scutatum Lk., wappenschildförmiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 schizopetalum Swt., spaltblättriger, 4. Kn. t. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 semitrilobum Jacq., halbdreilappiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 senecioides L'Her., kreuzkrautähnlicher,  $\odot. m. f.$  Cap  
 der guten Hoffnung.  
 sidaefolium W., sidablättriger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 sororium W., verschwisterter,  $\text{f. k. t.}$  Hybride.  
 speciosum W. (*speciosissimum* Hort.), prächtiger,  $\text{f. k. t.}$   
 Cap der guten Hoffnung.  
 spinosum W., dorniger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der guten Hoffn.  
 splendens W., schimmernder,  $\text{f. k. t.}$  Cap der gut. H.  
     b) laciniatum.  
 spurium W., falscher,  $\text{f. k. t.}$  ?Hybride.  
 staphisagrioides Swt., staphisagriaähnlicher,  $\text{f. k. t.}$   
 Cap der guten Hoffnung.  
 stenopetalum Ehrh., schmalkroniger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
     b) coccineum.  
 suaveolens Dietr. (*errans* Hort.), gutriechender,  $\text{f. k. t.}$   
 Cap der guten Hoffnung.  
 tabulare Ait., Tafelbergs-K., 4. k. t. Cap der  
 guten Hoffnung.  
 tenuifolium L'Her., feinblättriger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 ternatum Jacq., gedreiter,  $\text{f. k. t.}$  Cap der gut. H.  
 tomentosum Jacq., filziger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der gut. H.  
 Tormanni Wendl. (*Willdenowii* Dietr.), Tormann's,  $\text{f.}$   
 $\text{k. t.}$  Cap der guten Hoffnung.  
 tricuspidatum L'Her., dreispitziger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 tripartitum W. (*trifidum* Jacq.), dreitheiliger,  $\text{f. k. t.}$   
 Cap der guten Hoffnung.  
 triste Ait., trauernder, 4. Kn. k. t. Cap der gut. H.  
 unicolorum W., einfarbiger,  $\text{f. k. t.}$  ?Hybride.  
 uniflorum Sess., einblumiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
 variegatum W., buntblumiger,  $\text{f. k. t.}$  Cap der  
 guten Hoffnung.  
     b) albiflorum Spin. c) Bellardi Spin.  
 villosum Swt. (? *Collae* et *clandestinum* Spin.), zottiger,  
 $\text{f. k. t.}$  Cap der guten Hoffnung.

## Pelargonium

viscidum Dietr. (*dissectum* Hort.), schmieriger, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

viscosissimum Swt., schmierigster, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

vitifolium Ait., weinblättriger, ♀. k. Cap der gut. H.  
b) fol. variegat.

Watsoni Lk., Watson's, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Willdenowii Swt. (*pulchellum* W., *superbum* Dietr.),

Willdenow's, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

zonale Ait., gesäumter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

b) album. c) carneum. d) coccineum. e) kermesinum. f) miniatum. g) roseum. h) roseum fl. plen. i) fol. argenteo-variegat. (*marginatum* Lk.), fol. aureo-variegat. k) tricolor. l) umbellatum etc.

### IV. Cynosbata DC.

cynosbatifolium W., hagerosenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lateritium W., blafsmennigrother, ♀. k. t. ?

### V. Dimacria Lindl.

apiifolium Jacq. (Andr.), sellerieblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

aristatum Swt., langgranniger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

astragalifolium P., tragantblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

carneum Jacq., fleischfarbiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

coronillaefolium P., kronenwickenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

floribundum RB., blüthenreicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

foliosum Swt., blattreicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

heracleifolium Lodd., heilkrautblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

heterophyllum Jacq. (Andr.), verschiedenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

incrassatum Curt., verdickter, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

oxaloides W., sauerkleeähnlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

rumicifolium Swet., ampferblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

tenellum (Andr.), zarter, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.

viciaefolium L'Her., wickenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

### VI. Grenvillea Swt.

conspicuum Swt., ansehnlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

### VII. Hoarea Swt.

atrum L'Her., schwärzlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

auriculatum W. (*ciliatum* Jaq.), geöhrt, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

barbatum Jacq., bärtiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.

bubonifolium P., steineppigblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ciliatum L'Her., gefranzter. 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.



**Pelargonium**

- coluteaefolium* Swt., blasenstrauchblättriger, 4. Kn. t. k. Hybride.
- congestum* Swt., gedrängter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- corydaliflorum* Swt., kappenmohnblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- depressum* Jacq., niedergedrückter, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- dioicum* RB., zweihäusiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- fissifolium* P., spaltblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- hirsutum* Ait., rauhhaariger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- laciniatum* P. (Andr.), schlitzbilättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- Leeanum* Swt., Lee's, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- lineare* P. (Andr.), gleichbreitkroniger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- longiflorum* Jacq., langblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- longifolium* Jacq., langblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- luteum* (Andr.), gelber, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- melananthos* Jacq., schwarzblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- nervifolium* Jacq., nervenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- niveum* Swt., schneeweißser, 4. Kn. t. k. ? Hybride.
- nummularifolium* Salisb., pfennigkrautblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- nutans* DC., nickender, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- orobifolium* Swt., walderbsenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- ovalifolium* DC., eiblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- oxalidifolium* P., sauerkleeblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- penniforme* P., federförmiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- pilosum* W., haariger, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- punctatum* W., punctirter, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- purpurascens* P. (*centauroides* L'Her.), purpurfarbiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- radiatum* P. (Andr.), strahliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- radicatum* Vent., grofswurzeliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- rapaceum* Ait., rübenartiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- reflexum* P., zurückgebogener, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- reticulatum* Swt., netzförmiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- retusum* Swt., eingedrückter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- revolutum* P., zurückgerollter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- roseum* (Andr.), rosafarbiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- setosum* Swt., borstiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- spathulatum* P. (Andr.), spatelblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- β) affine Andr.
- Sweetianum* \* (*carinatum* Swt.), Sweet's, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- triphyllo* Jacq., dreiblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**Pelargonium**

*undulaeflorum* Swt., wellenblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*undulatum* RB., wellenförmiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*violaeflorum* Swt., veilchenblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*virgineum* P. (Andr.), jungfräulicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**VIII. Isopetalum Swt.**

*Cotyledonis* L'Her., nabelkrautartiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**IX. Jenkinsonia Swt.**

*bullatum* Swt., bauschiger ♀, k. t. Cap der gut. Hoffn.

*longicaule* Swt., langstengeliger, ♀, k. t. Cap d. g. H.

*pendulum* Swt., herabhängender, ♀, k. t. Cap d. g. H.

*quinatum* Curt., fünfzähliger, ♀, k. t. Cap der gut. H.

**X. Myrrhidium DC.**

*anemonefolium* Jacq., anemonenblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*canariense* W., canarischer, ♀, k. t. Cap der guten H.

*caucalisfolium* Jacq., caucalisblättriger, ♂, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*coriandrifolium* Ait., corianderblättriger, ♂, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*lacerum* Jacq., zeretzter, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

*multicaule* Jacq., vielstengeliger, ♂, k. t. Cap d. g. H.

*myrrhidium* Ait., kerbelblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

**XI. Otidia Lindl.**

*alternans* Wendl., abwechselnder, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*carnosum* Ait., fleischiger, ♀, k. t. Cap der gut. Hoffn.

*ceratophyllum* L'Her., hornblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*crithmifolium* Sm., meerfenchelblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*dasycaulon* Sims., höckerigstengeliger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

*laxum* Swt., lockerer, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

**XII. Peristera DC.**

*aethaeoides* L'Her., eibischblättriger, ♂, k. t. Cap d. g. H.

*australe* W., neuholländischer, 4. ♀, k. t. Neuholland.

*chamaedryfolium* Jacq., gamanderblättriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*columbinum* Jacq., feintheiliger, 4. k. t. Cap d. g. H.

*humifusum* W., niedergestreckter, ☉, f. m. k. Cap der guten Hoffnung.

**XIII. Phymatanthus Lindl.**

*coronopifolium* Jacq., krähenfufsblättriger, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

*elatum* Swt., hoher, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

*tricolor* Curt. (*violarium* Jacq.) dreifarbigiger, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

**XIV. Polyactium DC.**

*multiradiatum* Wendl., vielstrahliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**XV. Seymouria Swt.**

*asarifolium* Swt., haselwurzblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

## Pelargonium

dipetalum L'Her., zweikronenblättriger, 4. Kn. t. k.  
Cap der guten Hoffnung.

Hybriden und Gartenvarietäten: abutiloides Swt., acanthifolium Hffmsg., aceroides Swt. (*acerinum* et *palmatum* Hort), acetabulosum Swt., acidum Swt., acutidentatum Swt., acutilobum Swt., aemulum Swt., affluens Swt., alatum Swt., albinotum Swt., Alexanderianum Penny, Allenii Sw., Altensteinianum Hort., alutaceum Hffmsg., ambrosiacum Hffmsg., amicum Hffmsg., amoenum Swt., anacampton Swt., anisodonton Swt., anodaefolium Hffmsg. (*pavoninum* et *elegans* Hortul.), anosma Hffmsg., anthriscifolium Swt., Antonianum H. Vind., ardens Swt., ardescens Swt., argutum Swt., aromaticum Hffmsg., asperifolium Swt., astantiaefolium Hffmsg., atrofusum Swt., atropurpureum Swt., atrosanguineum Swt., augustissimum Hort., aurantiacum Swt., Avronianum Swt., bacchantum Hffmsg., Baileyanum Swt., Bakerianum Swt., Barclayanum Sw., Barnardianum Swt., basilicum Swt., Beadoniae Swt., Beaufortianum Swt., bellulum Swt., Besseri Hort., biflorum Swt., bipartitum Swt., bipinnatifidum Swt., Blandfordianum Swt., blandum Swt., Boyleae Swt., brachiatum Hort., Breesianum Swt., Brightianum Swt., Broughtoniae Swt., Brownii Swt., Brugmannianum v. Eed., bryonifolium Swt., Burnelianum Swt., calamistratum Swt., calliston Swt., calycinum Swt., calocephalon Swt., Cameronianum Penny, camphoratum Hffmsg., campyliaeflorum Swt., campylosepalum Swt., candidum Swt., carbasinum Swt., cardiifolium Swt., Carelesianum Penny, carnescens Swt., cartilagineum Swt., chaerophyllum Swt., Charlwoodii Swt., chelidonifolium Swt., chenopodifolium Swt., chrysanthemifolium Swt., clarum Swt., Clintoniae Swt., coarctatum Swt., coilophyllum Swt., Colvillianum Swt., commixtum Swt., compactum Swt., Comptoniae Swt., comptum Swt., concavum Swt., concinnum Swt., conclaum Swt., concolor Swt., concretum Swt., congestum Swt., cordiforme Swt., coruscans Swt., Cosmianum Swt., crataegifolium Swt., crenaeflorum Swt., crenulatum Swt., cruentum Swt., Cummingiae Swt., cuneatum Hffmsg. (*orphanum* Hffmsg.), cuneiflorum Swt., Darnleyanum Swt., Daveyanum Swt. (*Rowanium* Hffmsg.), Deburghae Swt., decorum Swt., delectabile Hffmsg. (*spectabile pulcherrium* v. Eed.), Dennisianum Swt., dentatum Andr., dependens Swt., diadematum Hort., b. coccineum, c. majus, d. superbum, dianthiflorum H. Cels, Diefenbachianum Hort., difforme Swt., dilatatum Swt., dimacriaeflorum Swt., dissectum Swt. (? Hffmsg.) dissimile Swt., distichum Hffmsg., divaricatum Diet., (*Felderi* Hort.), divergens Swt., diversifolium Swt., Dobreeanum Swt., dumosum Swt., egregium H. Belved., electum Swt., elegans Swt., emancipatum Hffmsg., eratinum Swt., erectum Swt., eriocaulon Swt., eriophyllum Swt., eriosepalum Swt., erythraeum Hffmsg. (*reniforme* Swt.), eximium Hffmsg., exornatum Swt., expansum Swt., Exsul Hffmsg., Fairliae Swt., flabellifolium Swt., flaccidum Swt.,



## Pelargonium

flagrans Swt., flexuosum Swt., floccosum Swt., floridum Swt., foliosum Swt., Folsjanbeae Swt., fragrantissimum Lk., fraternum Hffmsg., Friederi Guelmi Hort. Berol., frondosum Hort., fulgens Swt., glabrescens Swt., glabrifolium Swt., glaucifolium Swt., gloriosum Hffmsg. (*superbum rubrum* Hort.), Gowerii Swt., grandidentatum Swt., graphicum Swt., Grenvillianum Andr., Gurneyanum Swt., haemasticum Swt., Hammersleiae Swt., Haricortianum Hort., Harwoodiae Swt., hedysarifolium Swt., Heldianum H. Vindob., Helleri Hort., heteromallum Swt., hilare Hffmsg., Hillianum Swt., Hislopianum Penny, hoareaeflorum Swt., Hoareanum Swt., Hoffmannseggii Dietr., honestum Hffmsg. (*ciliatum* v. Eed.), Hornschuchianum Hort., Hospes Hffmsg., Huegelianum H. Vindob., Humei Swt., Huseyanum Swt., hypotrachys Hffmsg., illustre Swt. (*palmatum* v. Eed.), imbricatum Swt., imitans Hort., imperiale Hort. (*venustum* Hffmsg.), incanescens Swt., incarnatum Swt., incursum Swt., inscriptum Swt., insculptum Swt., insigne Hffmsg. (*speciosum* Cels), insignitum Swt., intertextum Swt., involucratum maximum Angl., Jannackii Hffmsg., Jacquinianum H. Vindob., Jenkinsonii Swt., jonquillinum Swt., Keglówichianum Hort., Kenrickae Swt., labyrinthicum Swt., laciniatum Swt., ladanosma Hffmsg., laeve Otto (*tripartitum* et *fragile* Hort.), Lamberti Swt., lasiocaulon Swt., latidentatum Swt., latifolium Swt., latilobum Swt., laxiflorum Swt., Lawrenceanum Swt., Leghkeckae Swt., Lemonianum Hort., leopoldinum Hort., lepidum Swt., lineatum Swt., Littleanum Swt., Loudonianum Swt., Lousadianum Swt., macranthum Swt., macrolobum Hffmsg., magnificum Hffmsg., magnifolium Swt., magnistipulatum Swt., malacophyllum Swt., Mathildinum Hort., Mattockianum Swt., maximum Hffmsg., megalanthum Swt., megaleion Swt., megalostictum Swt., melancholicum Penny, melanostictum Swt., melissinum Swt., Metternichianum H. Vindob., militare Hffmsg., mirabile Swt., mixtum Swt., modestum Swt., molle Hgmsg., b. fol. albo varieg., Mostynae Swt., multiflorum Swt., multinerve Swt., Murrayanum Swt., mutabile Swt., Nairnii Swt., nanum Swt., Napoleonum Hort., nervosum Swt., Newshamianum Swt., nodosum Sw., notatum Swt., nubilum Swt., nutans Swt., oblatum Swt., obovatum Swt., obscurum Swt., Obrienianum Swt., oenanthifolium Swt., olidum Hffmsg. (*hispidum* Hort.), olympicum Hort., optabile Swt., optimum Hffmsg., ornatum Swt., Ottonianum H. Berol., Palkii Swt., pannifolium Swt., papyraceum Swt., particeps Swt., patens Swt., paucidentatum Swt., pavoninum Swt., pectinifolium Swt., pedunculatum Swt., pelagium Hort., penastictum Swt., Pennyianum Young, peramplum Swt., Peytoniae Swt., phoenicum Swt., picturatum Swt., piligerum Hffmsg. (*piliferum* Dietr. *pilosum* Breit.), piperitum Dietr., placidum Hffmsg., planifolium Swt., platanifolium Swt., platypetalum Swt., platyphyllum Hffmsg. (*lappaceum* Hffmsg.), plectophyllum Swt.,

**Pelargonium**

poculifolium Swt., porphyreum Hort., Potteri Swt., praeclarum Swt., Princeanum Swt., profanum Hort., propugnatum Hffmsg., pruinatum Hoffmsg., psilophyllum Swt., pubescens Andr., pulcherrimum Swt., pulchrum Swt., pulverulentum Swt., puniceum Hffmsg., purum Swt., pyrethrifolium Swt., quadriflorum Swt., ramigerum Swt., ramulosum Swt., recurvatum Swt., recurvifolium Swt., regium Swt., Reinwardtianum Hffmsg. (*trilobum* v. Eed.), reticulatum Swt., rhodopetalum Swt., Richianum Swt., Richmondianum Penny, Riedelianum Hort., rigescens Swt., rigens Swt., Robinsoni Swt., Rosula Hffmsg., rotundifolium Swt., rubescens Swt., rugosum Andr., Russelianum Swt., saepeflorens Swt., salebrosum Swt., saturatum Swt., Saundersii Swt., scariosum Wendl., Scarboroughiae Swt., scintillans Swt., scitulum Swt., Scottii Swt., selectum Swt., selenifolium Swt., serratifolium Swt., Seymouriae Swt., Sidoniae Hort., siccifolium Hffmsg., sisynbrifolium Swt., Skelii Hffmsg., Smithianum Swt., Smithii Swt., symyriifolium Swt., solubile Swt., Southcotianum Swt., spectabile Swt. (*purpurascens* v. Eed.), sphaerocephalum Swt., sphondyliifolium Swt., Spinii Swt., spirans Hffmsg., Splenianum Hort., Stapletoni Swt., Stewartii Swt., striatum Swt., succulentum Swt., suffusum Swt., sulphureum Swt., Sweetianum Hort., Sylveri Hort., Synnoti Swt., tanacetifolium Swt., Tasmannianum Hort., Taylori Hort., tenebrosum Hort., ternatifidum Diet., thamnoides Hffmsg., Thynneae Swt., Tibbitsianum Swt., tigrinum Hort., tinctum Swt., torrefactum Swt., tortuosum Swt., trachyphyllum Hffmsg., translucens Swt., trilingue Hffmsg., trisectum Hffmsg., triumphans Hort., tumidum Hort., Tursilii Hort., tyrianthinum Swt., undatum Hffmsg., undulifolium Hffmsg., urbanum Swt., ustulatum Hffmsg., Vandesiae Swt., varium Swt., velutinum Hffmsg., veniferum Swt., veniflorum Swt., venosum Swt., venustum Swt., verbasciflorum Swt., verbenaeifolium Swt., verecundum Swt., versicolor Swt., vespertinum Swt., vestifolium Swt., vestitum Hffmsg., Victorianum Swt., villosum Swt., Volucris Hffmsg., (*cordatum varium* v. Eed.), vulneratum gallicum Hort., Wawerley Hort., Webbianum Penny, Wedellii Hort., Welsianum Swt., Yeatmanianum Swt., Yongii Swt., Zingiberinum Swt. etc. etc.

**Pelexia** Poit., Helmorche, XX. I., Orchideae.

adnata Spgl. (*spiranthoides* Lindl.), angewachsene. 4. w. Westindien.

falcata Spgl., sichelförmige, 4. w. Japan.

**Peliosanthes** Andr., Schlagblaublume, VI. I., Colchicaceae.

humilis Sims, kurzschäftige, 4. w. Ostindien.

Teta Andr., langschäftige, 4. w. Ostindien.

**Peltaria** L., Scheibenkraut, XV. II., Cruciferae.

alliacea L., knoblauchduftendes, 4. f. Oesterreichisches Siebenbürgen, Oberitalien.

glastifolia DC., waidblättriges, ☉. Syrien, Mesopotamien.  
*capensis* L. v. *Heliophila Peltaria*.

**Penaea** L. (P. Pena, ein Franzose, Mitarbeiter des Matthias de L'Obel), IV. 1. ? Thymelaeaceae (Penaeaceae).

formosa Thbg., schöne, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.  
 fruticulosa L., strauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 imbricata Grah., dachblättrige, ♀. l. Cap der gut. H.  
 lateriflora L., seitenblumige, ♀. t. Cap der guten H.  
 marginata L., berandete, ♀. t. Cap der guten Hoffn.  
 mucronata L., stachelspitzige, ♀. t. Cap der guten H.  
 myrtoides L., myrtenähnliche, ♀. t. Cap der guten H.  
 Sarcocolla Berg., Sarcocolla, P. ♀. t. Cap der g. H.  
 squamosa L. (*tetragona* Berg.), schuppige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

**Penicillaria** W., Pinselgras, III. 11., Gramineae.

Pluknetii Lk., Pluknet's, ☉. f. m. ? Ostindien.

spicata W., ährenförmiges, ☉. f. m. Ostindien, Aegypten.  
*ciliata* W. v. Pennisetum Linnaei.

**Pennisetum** Rich., Federhorstengras, III. 1. (11.), Gramineae.

asperum Lk., rauhes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.  
 aureum Lk., goldfarbiges, 4. w. ? Ostindien.

barbatum R. et S., bärtiges, ☉. f. m. Ostindien.

cenchroides Rich., cenchrusähnliches, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung, Nordafrika, Westindien.

dichotomum Delil., zweizinkiges, ♂. 4. k. Arabien, Aegypten.

erubescens Lk., röthliches, 4. w. Westindien.

holcoides R. et S., holcusähnliches, ☉. f. m. Ostindien.

Karwinskyi Schrad., Karwinsky's, ☉. f. m. Mexico.

Linnaei Kunth. (*alopecuroides* Spgl. *cylindroides* R. et S.), Linnee's, ☉. f. m. Cap der g. Hoffn., Ostindien.

nepalense Spgl., nepal'sches, ☉. f. m. Nepal.

orientale Rich., morgenländisches, ♂. 4. k. Kleinasien.

polystachyum R. et S., vielähriges, ☉. f. m. Ostindien.

purpurascens H. B. K. (*setosum* Rich.), purpurfarbiges, ♂. 4. w. Westindien, Mexico.

uniflorum H. B. K., einblumiges, ♂. 4. w. Mexico.

violaceum Rich., violettes, 4. w. Senegal.

*Alopecurus* Jacq. fil., *geniculatum* Jacq. fil., *macrohaetum* Jacq. fil. v. *Setaria macrostachya* etc., *typhoidum* P. v. *Penicillaria spicata*.

**Pentacrypta** Lehm., Purpurdolde, V. 11. (XXIII. 1.), Umbelliferae.

atropurpurea Lehm., mexicanische, 4. ♀. w. Mexico.

**Pentadesma** RB., Fünfbündler, (Butterbaum) XVIII. 11., Guttiferae.

butyracea RB., buttergebender ♀. w. Sierra Leone.

**Pentameris** P. B., Spaltgras, III. 11., Gramineae.

airoides N. E., schmielenähnliches, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

**Pentapetes** L., Scharlachmalve, XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

ovata DC., eiförmige, ♀. w. Neuspanien.

phoenicea L., ostindische, ☉. ♂. w. Ostindien.

*Pentaphyllum Lupinaster* P. etc. v. *Trifolium Lupinaster* etc.

**Pentaraphia** Lindl., Fünffahre, XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

longiflora Lindl., langblumige, ♀. w. Jamaica.



**Penthorum** L., Fünfspitzenkraut, X. iv., Corniculatae-  
Crassulaceae.

sedoides L., sedumähnliches, 4. f., Nordamerika.

**Pentstemon** L'Her., Bartfaden, XIV. ii., Personatae-  
Antirrhineae.

acuminatum Dougl., zugespitzter, 4. f. Nordamerika.

album Nutt. (*teretiflorum* Fras.), weißlicher, 4. f.  
Nordamerika.

angustifolium Pursh., (*coeruleum* Nutt.), schmalblätteri-  
ger, 4. f. Louisiana.

argutum J. B., spitzsägezähniger, 4. f. b. k. Columbien.

atropurpureum G. Don, dunkelpurpurrother, 4. k. Mexico.

attenuatum Dougl., verschmälelter, 4. f. Nordamerika.

Bradburii Pursh. (*grandiflorum* Fras.) Bradbur's, 4. f.  
Louisiana.

breviflorum Lindl., kurzblumiger, 4. f. Californien.

Cobaea Nutt., Cobaea-B., 4. k. Texas.

confertum Dougl., dichtblumiger, 4. f. Nordamerika.

crassifolium Lindl., dickblättriger, 4. f. Nordamerika.

Digitalis Nutt., fingerhutähnlicher, 4. f. Nordamerika.

eriantherum Pursh. (*cristatum* Fras.), kammiger, 4. f.  
Nordamerika.

gentianoides (H. B. K.) enzianähnlicher, 4. k. Mexico.

glaberrimum J. B., kahlster, 4. f. b. Columbien.

glabrum Pursh. (*eriantherum* Fras.), kahler, 4. w. Loui-  
siana.

glandulosum Dougl., drüsiger, 4. f. Nordamerika.

glaucum Grah., blaugrüner, 4. f. Nordamerika.

gracile Nutt., schlanker, 4. f. Nordamerika.

heterophyllum Lindl., verschiedenblättriger, 4. f. b.  
Californien.

hirsutum W., rauhaariger, 4. f. Nordamerika.

Kunthii G. Don (*Chelone angustifol.* H. B. K.) Kunth's  
4. k. Mexico.

laevigatum Ait., glättlicher, 4. f. Nordamerika.

Mackayanum K. et. W., Mackay's, 4. f. b. Ohio.

Murrayanum Hook., Murray's, 4. f. b. St. Felipe.

ovatum Dougl., eiförmiger, 4. f. Nordamerika.

procerum Dougl., hoher, 4. f. Nordamerika.

pruinatum Dougl., bereifter, 4. f. Nordamerika.

pubescens Ait., weichhaariger, 4. f. Nordamerika.

pulchellum Lindl. (*elegans* G. Don., ? *suffruticosum* Booth.),  
schöner, 4. ♀. Cuba, Neuspanien.

remotum Rchb., entferntblumiger, 4. f. Nordamerika.

Richardsonii Dougl., Richardson's, 4. f. b. Columbia.

roseum G. Don., rosafarbiger, 4. k. Mexico.

Scouleri Dougl., Scouler's, 4. f. Nordamerika.

speciosum Dougl. (? *Milleri* Hort.), prächtiger, 4. f.  
Nordamerika.

staticifolium Lindl., meernelkenblättriger, 4. f. b. Ca-  
lifornien.

triphyllum Dougl., dreiblättriger, 4. f. b. Californien.

**Pentzia** Thbg. (C. J. Pentz, Schüler des Thunberg)  
XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

flabelliformis W. (*crenata* Thbg.), fächelförmige, ♀. k.  
Cap der guten Hoffnung.

*Peperomia alata* R. et P. etc. v. *Piper alatum* etc.

**Peplis** L., Wasserportulak, VI. i., Lythriariae (*Salicariae*).  
alternifolia RB., wechselblättriger, ♂. f. Südrussland.  
occidentalis Spgl., westlicher. ♂. Wa. f. Westindien.

**Peplis**

Portula L., gemeiner, ☉. Wa. f. Europa.

*borysthénica* Befs. v. *Ammannia borysthénica*.

*Perdicium Anandria* RB. v. *Anandria Bellidiastrum chilense* W. v. *Chaetanthera chilensis*. *brasiliense* L. v. *Trixis brasiliensis*.

**Pereskia** Plum. (N. F. Peireskios, wenig gekannter französischer Botaniker) XII. I. Cactaceae.

*aculeata* Plum. Haw., stachelige, ♀. w. Westindien.

β) *rubescens* Pfr. γ) *rotundifolia* H. Dyck. (*acardia* Parm.) δ) *lanceolata* Pfr.

*Bleo* DC. (*cruenta* Hort.), blutfarbige, ♀. w. Neu-Granada, Mexico.

*glomerata* Pfr., knaulförmige, ♀. w. Peru.

*grandifolia* Haw. (*grandiflora* Hort.), großblättrige, ♀. w. Brasilien.

*horrida* DC. großstachelige, ♀. w. Brasilien.

*lychnidiflora* DC., lychnisblumige, ♀. w. Mexico.

*opuntiaeflora* DC., opuntiablumige, ♀. w. Mexico.

*Pititache* Karw., holzige, ♀. w. Mexico.

? *plantaginea* H. Gött., wegerichähnliche, ? ♀. w. ? Südamerika.

*portulacaefolia* DC., portulakblättrige, ♀. w. Caribäen.

*rotundifolia* DC., rundblättrige, ♀. ♀. w. Mexico.

*spathulata* H. Berol. (*crassicaulis* Zucc.), spatelblättrige, ♀. ♀. w. Mexico.

*zinniaeflora* DC., zinnienblumige, ♀. w. Mexico.

**Pergularia** L., Pergularie, V. II., Asclepiadeae.

*minor* Andr., kleine, ♀. Sch. w. Ostindien.

*odoratissima* Sw., wohlriechende, ♀. Sch. w. China, Ostindien.

*sanguinolenta* Lindl., blutfarbige, ♀. Sch. w. Sierra-Leone.

*glabra* L. v. *Vellaris Pergulanus*.

**Periballia** Trin., Wirtelschmiele, III. II., Gramineae.

*hispanica* Trin., spanische, ☉. f. Spanien.

**Pericallis** D. Don, Schönstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*Tussilaginis* D. Don, huflattichähnlicher, 4. k. Teneriffa.

**Perilla** L., Perille, XIV. I., Labiatae.

*fruticosa* D. Don, strauchige, ♀. k. t. Nepal.

*ocymoides* L., basilicumähnliche, ♀. k. Ostindien

**Perilomia** H. B. K., Perilomie, XIV. I., Labiatae.

*ocymoides* H. B. K., basilicumähnliche, ♀. k. Quito.

**Periploca** L., Schlinge, V. II., Asclepiadeae.

*angustifolia* LaBill. (*laevigata* Vahl, *rigida* Viv.), schmalblättrige, ♀. Sch. f. b. k. Griechenland, Nordafrika, Syrien.

*graeca* L., griechische, ♀. Sch. f. Südeuropa, Mittelasien.

*laevigata* Ait. (*punicaefolia* Cav.), glatte, ♀. Sch. k. Canarische Inseln.

*mauritiana* Poir. (*nigrescens* Afz.), mascarenische, ♀. Sch. w. Ostindien, Mascarenas, Guinea.

*tenuiflora* L. v. *Microloma lineare*.

**Periptera** DC., Röhrenmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

*punica* DC., hochrothe, ♀. w. Neuspanien.

**Peristeria** Hook., Taubenstendel, XX. I., Orchideae.

**Peristeria**

*Barkeri* Batem., Barker's, 4. w. Mexico.

*cerina* Lindl., wachsgelber, 4. w. Südamerika.

*elata* Hook., hoher, 4. w. Panama.

*guttata* K. et W., getropfter, 4. w. Südamerika.

*pendula* Hook., herabhängender, 4. w. Demerara.

*Peristrophe speciosa* N. E. etc. v. *Justicia speciosa* etc.

**Peritoma** DC., Cirkelkelch, VI. 1. (XV. III.),  
Capparideae.

*serrulatum* DC., sägezähniger, ☉. f. Nordamerika.

**Pernettya** Gaudich. (A. J. Pernetty, ein französischer  
Geistlicher, welcher die Falklandsinseln bereiste), X.  
Ericaceae.

*empetrifolia* Gaudich., rauschbeerenblättrige, ♀. k.  
Magellanische Meerenge.

*microphylla* Gaudich., kleinblättrige, ♀. k. Magella-  
nische Meerenge.

*mucronata* Gaudich., stachelspitzige, ♀. k. Magellanische  
Meerenge.

*phillyreaefolia* DC., steinlindenblättrige, ♀. t. Peru.

*pilosa* G. Don, haarige, ♀. t. Mexico.

*pumila* Gaudich., Hook., kleine, ♀. k. Magellanische  
Meerenge.

**Perotis** Ait., Zottengras, III. II., Gramineae.

*latifolia* Ait., breitblättriges, ☉. 4. w. Ostindien, Ja-  
pan, Cap der guten Hoffnung.

**Persea** G., Avogatobaum, IX. 1., Laurineae.

*gratissima* G., schmackhafter, ♀. w. Westindien.

*Cinnamomum* Sogl. etc. v. *Cinnamomum verum* etc.

**Persica** T. v. *Amygdalus*.

**Persoonia** Sm. (C. H. Persoon, einer der berühm-  
testen und bekanntesten Botaniker der neueren Zeit),  
IV. 1., Proteaceae.

*Chanaepithys* Cunn., kleine, ♀. t. Neuholland.

*ferruginea* Sm., rostfarbige, ♀. t. Neusüdwallis.

*flexifolia* RB., biegsamblättrige, ♀. t. Neuholland.

*hirsuta* P., rauhhaarige, ♀. t. Neusüdwallis.

*juniperina* La Bill. (*acerosa* Sbr.), wachholderblättrige,  
♀. t. Neusüdwallis.

*lanceolata* Andr., lanzettblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*latifolia* Andr., breitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*linearis* Andr., (*angustifolia* Sm.), schmalblättrige, ♀.  
t. Neusüdwallis.

*mollis* RB., weichblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*myrtilloides* Sbr., heidelbeerblättrige, ♀. t. Neu-  
südwallis.

*nutans* RB., nickende, ♀. t. Neuholland.

*pallida* Grah., bleiche, ♀. t. Neuholland.

*pinifolia* RB., kieferblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*pruinosa* Cunn., bereifte, ♀. t. Neusüdwallis.

*salicina* P., weidenblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*scabra* RB., scharfblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

*spathulata* RB., spatelblättrige, ♀. t. Neuholland.

*teretifolia* RB., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Perymenium** Schrad., Perymenie, XIX. II., Compo-  
sitae-Corymbiferae.

*discolor* Schrad., verschiedenfarbige, ♀. k. Mexico.

*verbesinoides* DC., verbesinenähnliche, ♀. k. Mexico.



- Pesomeria** Thou., Pesomerie, XX. 1., Orchideae.  
 tetragona Thou., vierkantige, 4. w. Mauritius.
- Petaloma Mouriri** Sw. et *myrtilloides* Sw. vid. *Mouriria guianensis* et *myrtilloides*.
- Petalostemon** Mchx., Kronenfaden, XVII. 1v. (XVI. 11.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 candidum Mchx., blendendweißer, 4. f. b. Nordamer.  
 carneum Mchx., fleischfarbiger, 4. f. b. Nordamerika.  
 corymbosum Mchx., traubendoldiger, 4. f. b. Nordamer.  
 violaceum Nutt., violetter, 4. f. b. Nordamerika.
- Petasites** C. Bauh., Pestilenzwurz, XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.  
 I. Genuinus.  
 albus G., weiße, 4. f. Europa.  
     b) foemin.: ramosus (Hoppe).  
 niveus Baumg., schneeweiße, 4. f. Mittel- und ost-europäische Alpen.  
     b) foem.: paradoxus (Retz).  
 officinalis Mchx. (*vulgaris* Dsf.), gemeine, 4. f. Europa.  
     b) foem.: hybridus (L.).  
 tomentosus DC., filzige, 4. f. Nordeuropa.  
     b) subfoemineus: spurius (Retz).  
 II. Nardosmia Cass. DC.  
 fragrans (Vill.), Rchb., wohlriechende, 4. f. Südfrankreich, Italien, Sicilien.  
 frigidus (L.), Hook. (*angulos.* Cass.), kalte, 4. f. Scandinavien, Sibirien, Canada.  
 laevigatus Rchb., glättliche, 4. f. Sibirien, Böhmen.  
     b) submasculus DC. (*Tussilago bohemica* Hoppe).  
 palmatus (Ait.), Hook., handförmige, 4. f. Labrador.  
 ?purpureus (H. Kew.), purpurfarbige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.  
 sagittatus (Pursh), Hook., pfeilblättrige, 4. f. Nordamer.
- Petiveria** Plum. (J. Petiver, englischer Apotheker und Botaniker), VII. 1., Aizoideae-Phytolacceae.  
 alliacea L., knoblauchduftende, 5. w. Westindien.  
 hexaglochin Fisch. et Mey., sechsspitzige, 5. w. Brasilien.  
 octandra Jacq., achtmännige, 5. w. Westindien.
- Petrea** L. (Lord Robert James Petre, ein Gönner der Botanik), XIV. 11., Verbenaceae.  
 erecta Hort., aufrechte, 5. w. Südamerika.  
 rugosa Humb., runzelige, 5. 5. w. Caracas.  
 Stapeliae Paxt., stapelienblumige, 5. Sch. w. ? Sudamer.  
 volubilis L., windende, 5. Sch. w. Westindien.
- Petrobium** RB., Felsenweizahn, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.  
 arboreum RB., baumartiger, 5. w. St. Helena.
- Petrocallis** RB., Felsenblümchen, XV. 11., Cruciferae.  
 pyrenaica RB., pyrenäisches, 4. f. b. Mittel- und west-europäische Alpen.
- Petrocarya campestris** W. v. *Parinarium campestre*.
- Petromarula** P. A.DC., Felsenrapunzel, V. 1., Campanulaceae.  
 pinnata P. A.DC., fiederblättrige, 4. k. Creta.
- Petrophila** RB., Felsenprotea, IV. 1, Proteaceae.  
 acicularis RB., nadelblättrige, 5. t. Südneuholland.  
 canescens Cunn., weißgrauliche, 5. t. Neuholland.  
 diversifolia RB., verschiedenblättrige, 5. t. Neuholland.  
 fastigiata RB., gipfelständige, 5. t. Neuholland.

**Petrophila**

- filifolia RB., fadenblättrige, ♀. t. Neuholland.  
 pedunculata RB., stielfrüchtige, ♀. t. Neuholland.  
 pulchella RB., schöne, ♀. t. Neusüdwallis.  
 rigida RB., starre, ♀. t. Neuholland.  
 sessilis Sbr., stiellosfrüchtige, ♀. t. Neuholland.  
 teretifolia RB., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.  
 trifida RB., dreispaltige, ♀. t. Neuholland.

**Petroselinum Hoffm., Petersilie, V. II., Umbelliferae.**

- peregrinum Koch, DC., fremde, ♂. f. Portugal.  
 sativum Hoffm., gebaute, ♂. f. Sardinien, Portugal.  
 segetum Koch, Saat-P., ☉. f. England, Frankr., Schweiz.

**Petunia Juss. (Petun, brasilianischer Name für Tabak), V. I., Solanaceae.**

- intermedia D. Don, mittlere, 4. ♀. t. Parama.  
 Mirabilis Rchb. (*phoenicea* D. Don, *violacea* Lindl.),  
 wunderblumenähnliche, 4. ♀. k. Buenos-Ayres.  
 nyctaginiflora Juss., weisblumige, 4. k. Rio de la Plata.  
 parviflora Juss., kleinblumige, ☉. 4. k. Rio de la Plata.  
 Hybriden: Atkinsiana D. Don, violacea major, purpurea major, hybrida bicolor, hybrida coerulescens, hybrida major, hybrida striata etc.

**Peucedanum T., Haarstrang, V. II., Umbelliferae.**

- album Hol., weißer, 4. f. Nordeuropa.  
 alpestre L., Voralpen-H., 4. f. Bessarabien.  
 alsaticum L., elsassischer, 4. f. Mittel-, Ost- und Westeuropa, Taurien.  
 arenarium W. K., sandliebender, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.  
 aureum Ait., goldfarbiger, 4. k. Teneriffa.  
 austriacum K. (*montanum* K.), österreichischer, 4. f. Süd- und Osteuropa.  
 baicalense K., baical'scher, 4. f. Ungarn, Sibirien.  
 Cervaria Lapeyr., hirschwurzförmiger, 4. f. Mittel- und Westeuropa.  
 Chabraei Rchb. (*carvifolium* Vill.), Chabraei's, 4. f. Ost- und Westdeutschland, Frankreich, Armenien, Caucasus.  
 coriaceum Rchb., lederartiger, 4. f. ?  
 dahuricum Ledeb., dahurischer, 4. f. Sibirien.  
 Fontanesianum K., Desfontaine's, 4. f. Südfrankreich.  
 gallicum T. (*officinale* Thuill., *parisiense* DC.), französischer, 4. f. Frankreich, österreichisches Litorale.  
 isetense Sgpl., sibirischer, 4. f. Sibirien.  
 italicum Mill., italienischer, 4. f. Südfrankreich, Italien.  
 longifolium W. K., langblättriger, 4. f. Banat.  
 officinale L., officineller, 4. f. Europa.  
 Oreoselinum Mch., Steinsilgen-H., 4. f. Europa, Caucasus.  
 paniculatum Lois., rispiger, 4. f. Frankreich,  
 petraeum K., Gesteins-H., 4. f. Oesterreich. Litorale.  
 rablense K., raibel'sches, 4. f. Kärnthen, Krain, Schweiz, Piemont.  
 ruthenicum MB. (*tauricum* MB.), russischer, 4. f. Südrussland.  
 Schottii Bess., Schott's, 4. f. Krain, Podolien.  
 venetum K., venetianischer, 4. f. Schweiz, österreich. Litorale, Oberitalien.  
 verticillare K., wirtelförmiger, 4. f. Krain, Oberitalien, südliche Schweiz, Frankreich.

**Peucedanum**

vocontiorum Spgl., kleiner, 4. f. b. Dauphiné.

*caspicum* Lk. (et *obtusifolium* Sm., *seselioides* Nutt. et *sibiricum* W.) v. *Ferula caspica* etc. *Matthioli* Spgl. (*tenuifolium* Poir., *serotinum* P.) et *Silaus* L. v. *Silaus Matthioli* et *pratensis*. *sylvestre* DC. v. *Thysselinum palustre*.

**Peumus** P. (chilesischer Name), XXII. XI., Monimieae. *fragrans* P., wohlriechender, 5. w. Chili.

**Peyrousia** Loud. v. *Lapeyrousia*.

**Phaca** L., Berglinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*alpina* Jacq., Alpen-B., 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.

*arenaria* Pall., Sand-B., 4. f. b. Ostsibirien.

*astragalina* DC., tragantähnliche, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*australis* L. (*Halleri* Vill.), südliche, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*baetica* L., spanische, 4. k. Spanien, Portugal, Griechenland.

*canescens* H. et A., grauliche, 4. k. Chili.

*chilensis* N. E., chilesische, 4. k. Chili.

*densifolia* Sm., dichtblättrige, 4. f. b. Californien.

*exaltata* Ledeb., hohe, 4. f. b. Altai.

*frigida* L., kalte, 4. f. b. Lappland, mittel- und osteuropäische Alpen.

*Gerardi* Vill. (*glabra* Clarim.), Gerard's, 4. f. b. k. Frankreich.

*lapponica* Wahlbg., lappländische, 4. f. b. Lappland.

*lutea* Ledeb., gelbe, 4. f. b. Sibirien.

*membranacea* Fisch., häutige, 4. f. b. Dahurien.

*oroboides* DC., orobusähnliche, 4. f. b. Norwegen, Lappland.

*sordida* Fisch., dunkelfarbige, 4. f. b. Sibirien.

*triangularis* Fisch., dreikantige, 4. f. b. Sibirien.

*campestris* Wahlbg. etc. vid. *Oxytropis campestris*.

*floridana* W. vid. *Glottidium floridanum*. *salsula*

Pall. v. *Sphaerophysa dahurica*. *triangularis* Zea

v. *Astragal. triangularis*.

**Phacelia** Mchx., Phacelie, V. I., Hydrophyllaeae.

*bipinnatifida* Mchx., doppeltfiederspaltige, 4. f. b. Nordamerika.

*circinnata* Jacq., kreiselförmige, ♂. f. Patagonien.

β) *californica* Cham. et Schtdl.

*congesta* Hook., dichtblumige, ♂. f. Texas.

*malvaefolia* Cham. et Schtdl., malvenblättrige, ♂. f. Californien.

*peruviana* Spgl. (*Aldeaea* R. et S.), peruvianische, 4. k. Peru.

*tanacetifolia* Benth., rainfarnblättrige, ♂. f. Californien.

*vitifolia* Paxt., weinblättrige, ♂. f. Texas.

*fimbriata* Mchx. v. *Cosmanthus fimbriatus*. *parvi-*

*flora* Pursh v. *Nemophila parviflora*.

**Phacocapnos** Bernh., Linsenmohn, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumariaeae.

*Cracca* Bernh., wickenähnlicher, ♂. Sch. f. Cap der guten Hoffnung.

**Phacosperma** Haw., Linsensame, XI. I., Aizoideae-Ficoideae.

*peruviana* Haw., peruvianischer, 4. w. Peru.



**Phagnalon** Cass., Filzstrauch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*rupestre* Cass., felsenliebender, ♀. k. Süditalien.

*saxatile* Cass., Gesteins-B., ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

*sordida* Cass., dunkelfarbiger, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

**Phajus** Paxt., Prachtstendel, XX. I., Orchideae.

*albus* Lindl., weißer, 4. w. Nepal.

*maculatus* Paxt., gefleckter, 4. w. Nepal.

**Phalacrodiscus** Fisch. et Mey., Scheibenblümchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*arvensis* Fisch. et Mey., Acker-S., ♂. f. Nordafrika.

**Phalaenopsis** Blum., Mottenstendel, XX. I., Orchideae.

*amabilis* Blume, lieblicher, 4. w. Manilla.

**Phalangium croceum** Mchx. etc. vid. *Anthericum croceum* etc. *virgatum* Lam. v. *Nolina georgiana*.

**Phalaris** L., Glanzgras, III. II., Gramineae.

1. *Genuina*.

*appendiculata* Schult. (*dentata* Sbr.), anhängseliges, ♂. f. Aegypten.

*aquatica* L. (*coerulescens* Dsf., *nitida* Presl., *bulbosa* Brot., *variegata* Spgl.), wasserliebendes, 4. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*brachystachya* Lk., kurzähriges, ♂. f. Portugal.

*canariensis* L., canarisches, ♂. f. Canarische Inseln, Südeuropa.

*microstachya* DC. (*intermedia* Bosc.), kleinähriges, ♂. f. Nordamerika.

*minor* Retz (*aquatica* Ait., *capensis* Thbg., *commutata* R. et S.), kleines, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

*nodosa* MB. (*aquatica* Sibth.), knotiges, 4. f. b. k. Griechenland, Orient.

*paradoxa* L., wunderbares, ♂. f. Südeuropa, Orient.

*pectinata* Roth, kammförmiges, ♂. f. ?

*quadri-valvis* Lagasc., vierspeliges, ♂. f. Spanien.

II. *Baldingera* G. M. S. (*Digraphis* Trin.).

*americana* Elliot, amerikanisches, 4. f. Nordamerika.

*arundinacea* L., rohrartiges, 4. f. Europa, Asien.

b) *variegata*.

*Ammophila* Lk. v. *Psamma arenaria*. *aspera* Retz (*paniculata* Ait.) etc. v. *Phleum asperum*. *bulbosa* L. (*cylindrica* DC.) vid. *Phleum tenue*. *semineutra* R. et S. v. *Aira semineutra*.

**Phalerocarpus** G. Don, Glanzbeere, VIII. I., Ericaceae.

*hispidulus* G. Don, seifhaarige, ♀. k. f. b. Nordamer.

**Phalocallis** Hook., Zapfenschwertel, XVI. I., Irideae.

*plumbea* Lindl., bleifarbig, 4. Zw. t. ?

**Pharbitis** Choix., Buntwinde, V. I., Convolvulaceae.

*diversifolia* Lindl., verschiedenblättrige, ♂. Sch. f. m. Mexico.

**Pharium** Herb., Pharium, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*fistulosum* Herb., röhriges, 4. Zw. k. t. Mexico.

**Pharnaceum** L., Pharnaceum, V. III., Portulacaceae-Paronychieae.

*Cerviana* L., doldenblüthiges, ♂. f. Südeuropa, Afrika, Mittelasien.

*cordifolium* L., herzblättriges, ♂. f. Cap der gut. H.

*dichotomum* Thbg., zweizinkiges, ♂. f. Cap d. gut. H.

glomeratum Thbg., knaulförmiges, ☉. f. Cap d. g. H.  
Hoffmannseggianum R. et S., Hoffmannsegg's, ☉. f. m.  
Brasilien.

incanum L., weißlichgraues, ♀. k. Cap der gut. H.  
lineare Thbg., gleichbreitblättriges, ♀. k. Cap d. g. H.  
Mollugo L., weichlingähnliches, ♀. w. Ostindien.

pruinosa Haw., bereiftes, ♀. k. Cap der guten H.  
spatulatum Sw. (*bellidifolium* Poir.), spatelblättriges,  
☉. f. m. w. Westindien.

sperguloides Poir., sparkähnliches, ♀. w. Ostindien.  
umbellatum Forsk., doldiges. ☉. f. m. Arabien.

*verticillatum* Spgl. v. *Mollugo verticillata*.

*Pharus* L., *Pharus*, XXI. vi. (VI. i.), Gramineae.

*latifolius* L., breitblättriger, 4. w. Jamaica, Guiana.

*Phaseolus* T., Bohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-  
Papilionaceae.

*aconitifolius* L. suppl., sturmhutblättrige, ☉. Sch. f.  
m. w. Arabien, Ostindien.

*alatus* L., geflügelte, ☉. Sch. f. m. ? Carolina.

*amoenus* Forst., liebliche, ☉. Sch. f. Societätsinseln.

*angulosus* Orteg., kantige, ☉. Sch. f. ?

*aureus* Zucc., goldfarbige, ☉. Sch. f. ?

*caesareus* Jacq. fil., kaiserliche, ☉. Sch. f. ?

*candidus* Hort., reinweißse, ☉. Sch. m. f. ?

*Caracalla* L., schneckenförmige, 4. w. Ostindien,  
Peru, Chili.

*chrysanthus* Savi, goldblumige, ☉. f. m. ?

*compressus* DC., platte, ☉. Sch. f. m. ?

*derasus* Schrk., kahle, ☉. Sch. w. m. Brasilien.

*diversifolius* P. (*trilobus* Mchx.), verschiedenblättrige,  
☉. f. Nordamerika.

*dolichoides* Roxb., dolichosähnliche, ☉. Sch. f. k.  
Ostindien.

*farinosus* L., mehliges, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

*gonospermus* Savi, kantensamige, ☉. Sch. f. m. ?

*haematocarpus* Savi, blutfarbiges, ☉. Sch. f. m. ?

*helvolus* L., blaßrothe, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*heterophyllus* H. B. K., veränderlichblättrige, ☉. Sch.  
m. f. w. Mexico.

*hirtus* Retz, steifhaarige, ☉. Sch. f. Cap der gut. H.

*inamoenus* L., unansehnliche, ☉. Sch. f. m. ? Afrika.

*lathyroides* L., platterbsenähnliche, ☉. m. w. Jamaica.

*lunatus* L., mondförmige, ☉. Sch. m. f. w. Ostindien.

*max* L., schnabelhülsige, ☉. f. Ostindien.

*mesoleucus* Schrk., mittelweißse, ☉. Sch. m. f. w.  
Brasilien.

*microspermus* Orteg., kleinsamige, ☉. m. f. w. Cuba.

*multiflorus* Lam. (*coccineus* Kniphof), vielblumige (Feuer-  
B.), ☉. 4. Sch. f. ? Südamerika.

b) *albus*.

*Mungo* L., rauhfürchtige, ☉. f. m. Ostindien.

*nanus* L., Zwerg-(Busch-)B., ☉. f. m. Ostindien.

*nigerrimus* Zucc., schwarze, ☉. f. m. ?

*oblongus* Savi, längliche. ☉. Sch. f. m. ?

*perennis* Walt. (*paniculatus* Mchx.), ausdauernde, 4.  
Sch. f. b. k. ?

*philadelphicus* Nestl., philadelphische, ☉. Sch. f.  
Nordamerika.

*radiatus* L., strahlige, ☉. f. m. Ostindien, China.

*saponaceus* Savi, seifenartige, ☉. Sch. f. m. ?

**Phaseolus**

- scaber Steud., scharfe, ☉. f. m. Ostindien.  
 semierectus L., halbaufrechte, ☉. Sch. w. m. f. Westind.  
 speciosus H. B. K., prächtige, ☉. Sch. w. m. f. Südamer.  
 sphaericus Savi, rundsamige, ☉. Sch. m. f. ?  
 stipularis Lam., zwischenblättrige, ☉. m. f. Peru.  
 subtrilobus Lk., wenigdreilappige, ☉. Sch. w. m. f. Brasilien.  
 sylvestris H. B. K., wilde, ☉. Sch. w. m. f. Mexico.  
 torosus Roxb., wulstige, ☉. m. f. Nepal.  
 trilobus Ait. (*stipulaceus* Lam.), dreilappige, ☉. w. m. f. Ostindien.

- tumidus Sav., aufgeschwollene, ☉. Sch. m. f. ?  
 violaceus Steud., violette, ☉. m. f. Afrika.  
 vulgaris L., gemeine, ☉. Sch. f. m. Ostindien.

b) fasciatus. c) variegatus.

- Xuaresii Zuccagn., Xuares's, ☉. Sch. m. f. Südamer.  
*vexillatus* L. v. *Dolichos vexillatus*.

**Phaylopsis** Juss., W., Phaylopsis, XIV. II., Acanthaceae.

- glutinosa G. Don, klebrige, 4. w. Guinea.  
 imbricata Sw., dachblättrige, 4. w. Arabien, Mascarenas, Ostindien.

- longifolia Sims, langblättrige, 5. w. Sierra Leone.

- parviflora W., kleinblumige, ☉. w. Ostindien.

**Phebalium** Vent., Myrtenraute, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

- aureum Cunn., goldfarbige, 5. t. Neuholland.  
 elatum Cunn., hohe, 5. t. Neuholland.  
 lachnaeoides Cunn., lachnaeähnliche, 5. t. Neuholland.  
 lineare Mack. Cat., gleichbreitblättrige, 5. t. Neuholl.  
 salicifolium Adr. Juss., weidenblättrige, 5. t. Neuholl.  
 squamulosum Vent., schuppige, 5. t. Neuholland.

**Phellandrium** T., Wasserfenchel, V. II., Umbelliferae.

- aquaticum L., gemeiner, ♂. Wa. f. Europa, Nordamer.

*Mutellina* L. v. *Meum Mutellina*.

**Philactis** Schrad., Philactis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- zinnioides Schrad., zinnienähnliche, 4. 5. t. k. Mexico.

**Philadelphus** L., Pfeifenstrauch, XII. I., Corniculatae-Philadelphaeae.

- coronarius L., gemeiner, 5. f. Südeuropa.

b) nanus Mill. c) flore pleno Lodd. d) variegatus Lodd.

- floribundus Schrad., blüthenreicher, 5. f. Nordamerika.

- Gordonianus Lindl., Gordon's, 5. f. Californien.

- grandiflorus W. (*inodorus* Hort.), großblumiger, 5. f. Nordamerika.

- hirsutus Nutt. (*villosus* Lodd.), rauhaariger, 5. f. Louisiana.

- inodorus Mill., L., geruchloser, 5. f. Carolina.

- latifolius Schrad. (*pubescens* Cels), breitblättriger, 5. f. Nordamerika.

- laxus Schrad. (*pubescens* Lodd., *humilis* Hort.), lockerer, 5. f. Nordamerika.

- Lewisii Pursh, Lewis's, 5. f. Westnordamerika.

- speciosus Schrad., prächtiger, 5. f. Nordamerika.

- tomentosus Wall. (*nepalensis* Lodd., ? *triflorus* Royle), filziger, 5. f. b. Nepal.

- trinervis Schrad., dreinerviger, 5. f. Nordamerika.

β) gracilis Lodd.



**Philadelphus**

*verrucosus* Schrad. (*grandiflorus* Lodd.), warziger,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

*Zeyheri* Schrad., Zeyher's,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

**Philibertia** H. B. K. (M. Philibert, französischer Botaniker), V. II., Asclepiadeae.

*gracilis* D. Don (*grandiflora* Hook.), schlanke, 4. Sch. k. f. b. Buenos-Ayres.

**Phillyrea** T., Steinlinde, II. I., Sapotaceae-Oleineae.

*angustifolia* L., schmalblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Südeuropa.  
 $\beta$ ) *lanceolata* Ait.  $\gamma$ ) *rosmarinifolia* Ait.  $\delta$ ) *brachiata* Ait.

*laevis* W. (*latifolia* Mill.), glatte,  $\frac{1}{2}$  f. f. b. k. Südeuropa.

*latifolia* L., breitblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. f. b. k. Südeuropa.

*media* L., mittlere,  $\frac{1}{2}$  f. f. b. k. Südeuropa.

$\beta$ ) *ligustrifolia* Ait. (*virgata* W.).  $\gamma$ ) *pendula* Ait.  $\delta$ ) *oleaefolia* Ait.  $\epsilon$ ) *buxifolia* Ait.

*obliqua* W. (*foliacea* Lk.), schieflättrige,  $\frac{1}{2}$  f. f. b. k. Südeuropa.

*robusta* Roxb., grofse,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

*spinosa* Mill. (*ilicifolia* W.), stachelige,  $\frac{1}{2}$  f. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

**Philodendron** Lindl., Zehrwurzstrauch, XXI. IX., Aroideae.

*crassinervium* Lindl., dickrippiger,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.

**Philogyne** Haw. v. Narcissus.**Philotheca** Rudge, Fadenbecherblume, XVI. VI., Tricoccae-Rutaceae.

*australis* Rudg., neuholländische,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Philoxerus** RB., Strohkelch, V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.

*aggregatus* H. B. K., gehäuftblumiger, 4. w. Südamer.

*brasiliensis* RB., brasilianischer,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.

*vermicularis* RB., wurmförmiger, 4. w. Südamerika.

**Philydrum** Banks, Spaltlilie, I. I., Commelineae.

*lanuginosum* Banks, wollige, ♂. 4. k. Südchina, Cochinchina, Neuholland.

**Phleum** L., Lieschgras, III. II., Gramineae.

I. *Achnodon* Lk. (*Achnodonton* P. B.).

*tenue* Schrad. (*Bellardi* W.), dünnähriges, ☉. f. Südeuropa, Orient.

II. *Chilochloa* P. B.

*annuum* MB., jähriges, ☉. f. Caucasus.

*arenarium* L., sandliebendes, ☉. f. Nord- und südeuropäische Seeküsten.

*asperum* Vill. (*viride* All., *paniculatum* Huds.), rauhes, ☉. f. England, Mittel-, Süd- und Westeuropa.

*Böhmeri* Wibel (*phalaroides* Koel., *laeve* MB., *glabrum* Bernh.), Böhmer's, 4. f. Europa, Sibirien.

*cuspidatum* W. (*trigynum* Schrad., *Hostii* H. Vindob.), feinspitziges, 4. f. Tyrol.

*Michelii* All. (*hirsutum* Sut.), Micheli's, 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

III. *Phleum* P. B.

*alpinum* L., Alpen-L., 4. f. Europäische Alpen.

$\beta$ ) *commutatum* Gaud. (*Gerardi* Panz.).

*Bertolonii* DC. (? *stoloniferum* Bertol.), Bertolone's, 4. f. Sarzana.

*echinatum* Host (*felinum* Sm.), stacheliges, 4. f. Istrien, Dalmatien, Sicilien, Griechenland.

**Phleum**

*pratense* L., gemeines, 4. f. Europa, Asien.

b) *minus* Sin.  $\beta$ ) *nodosum* L. (*bulbosum* Gouan).

*Gerardi* All. v. *Alopecurus Gerardi*.

**Phlomis** T., Flammenlippe (Jerusalem's Salbei), XIV. I., Labiatae.

*agraria* Ledeb., Acker-F., 4. f. Sibirien.

*alpina* Pall., Alpen-F., 4. f. Altai.

*armeniaca* W., armenische, 4.  $\frac{1}{2}$ . k. Armenien.

*cretica* Presl (*fruticosa* Sbr.), cretische,  $\frac{1}{2}$ . k. Creta.

*crinita* Cav., bemähnte, 4. f. b. k. Spanien.

*ferruginea* Tenor., rostfarbige,  $\frac{1}{2}$ . k. Neapel.

*floccosa* D. Don, flockige,  $\frac{1}{2}$ . k. Aegypten.

*fruticosa* L., strauchige,  $\frac{1}{2}$ . k. Südeuropa.

*Herba venti* L., Windkraut-F., 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

*italica* Sm. (*purpurea* L.), italienische,  $\frac{1}{2}$ . k. Italien, Portugal.

*laciniata* L., schlitzzblättrige, 4. f. Armenien, Caucasus.

*lanata* W. (*fruticosa minor* Hort., *angustifolia* DC.), wollige,  $\frac{1}{2}$ . k. Calabrien, Spanien.

*lunarifolia* Sm., mondkrautblättrige, 4. f. b. k. Griechenland.

*Lychnitis* L., schmalblättrige,  $\frac{1}{2}$ . k. Südfrankr., Spanien.

*microphylla* Sbr., kleinblättrige,  $\frac{1}{2}$ . k. Aegypten, Creta.

*Nissolii* L., Nissole's, 4.  $\frac{1}{2}$ . k. Kleinasien.

*orientalis* DC., morgenländische, 4. f. b. Kleinasien.

*pungens* W., stechende, 4. f. b. Armenien, Caucasus, Persien, Sibirien.

*purpurea* Sm., purpurfarbige,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Portugal.

*Russeliana* Lag. (*lunarifolia*  $\beta$ . Bot. mag.), Russel's, 4. f. b. k. Levante.

*salviaefolia* Jacq., salbeiblättrige,  $\frac{1}{2}$ . k. ?

*samia* L., samische, 4. f. b. Griechenland, Nordafrika.

*scariosa* Presl., trockenhäutige,  $\frac{1}{2}$ . k. Calabrien.

*tuberosa* L., knollige, 4. Kn. Ungarn, Taurien, Caucasus, Sibirien.

*aspera* W. etc. vid. *Leucas aspera*. *Leonurus* etc. v. *Leonotis Leonurus*.

**Phlogacanthus** N. E. v. *Justicia*.

**Phlox** L., Flammenblume, V. 1., Polemoniaceae.

*acuminata* Pursh (*decussata* Lyon), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

*acutifolia* Swt., spitzblättrige, 4. f. Nordamerika.

*amoena* Sims, angenehme, 4.  $\frac{1}{2}$ . k. Nordamerika.

*aristata* Mchx., pfriemenkelchige, 4. k. Carolina.

*carnea* Ker (*triflora* Hort.), fleischfarbige, 4. f. Nordamer.

b) *major* A. P.

*carolina* L. (*triflora* Mchx.), karolinische, 4. f. Nordamer.

*cordata* Ell., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.

b) *grandiflora*. c) *rosea*.

*crassifolia* Lodd., dickblättrige, 4. f. Nordamerika.

*disticha* Sab., zweizeilige, 4. f. Nordamerika.

*divaricata* L., ausgesperrte, 4. f. Nordamerika.

*Drummondii* Hook., Drummond's,  $\odot$ .  $\sigma$ . f. k. Texas.

*excelsa* Penny, hohe, 4. f. Nordamerika.

*elata* Penny, erhabene, 4. f. Nordamerika.

*floridana* Nutt. (*Nuttalliana* Hort.), floridanische,  $\frac{1}{2}$ . k. Florida.

*glaberrima* L., kahle, 4. f. Nordamerika.

**Phlox**

*Hoodii* Richards., Hood's, 4. f. b. Nordamerika.  
*intermedia* Lodd., mittlere, 4. f. Nordamerika.  
*involuta* Nutt., hüllige, 4. f. Nordamerika.  
*laeta* Penny, freudige, 4. f. Nordamerika.  
*maculata* L., gefleckte, 4. f. Nordamerika.  
*nivalis* Swt., Lodd., schneeweisse, 4. f. b. Nordamer.  
*odorata* Swt., gutriechende, 4. f. Nordamerika.  
*ovata* L., eiförmige, 4. f. b. Nordamerika.

b) *Listoniana* Angl.

*paniculata* L., rispige, 4. f. Nordamerika.

b) *alba*. c) *striata*.

*pilosa* L. (*canadensis* Hort.), haarige, 4. f. Nordamer.  
*procumbens* Lehm., niederliegende, 4. f. b. Nordamer.  
*pyramidalis* Sm. (*latifolia* Mchx.), pyramidale, 4. f. Nordamerika.

b) *penduliflora* Swt. c) *corymbosa*. d) *alba* J.C.  
*reptans* Mchx. (*stolonifera* Curt., *prostrata* Ait. fil.), kriechende, 4. f. b. Carolina.

*scabra* Swt., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.  
*setacea* L., borstenblättrige, 4. f. b. Nordamerika.  
*Sickmanni* Lehm. (*longiflora* Swt., *tardiflora* Penny), Sickmann's, 4. f. Nordamerika.

b) *purpurea*.

*speciosa* Pursh, prächtige, 4. f. Nordamerika.  
*suaveolens* Ait., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.

b) *fol. variegat*.

*subulata* L., pfriemenförmige, 4. f. b. Nordamerika.  
*suffruticosa* Vent. (*nitida* Pursh), halbstrauchige, 4. f. k. f. b. Nordamerika.

b) *major*.

*undulata* Ait., wellenblättrige, 4. f. Nordamerika.  
*verna* Hort., Frühlings-F., 4. f. b. Nordamerika.  
*virginica* Lodd., virginische, 4. f. Nordamerika.

b) *alba*.

Hybriden und Varietäten: *aspera*, *atrocaulis* A. P., *autumnalis*, *bimaculata*, *Brownii*, *elegans*, *Ingramiana*, *omniflora*, *pulchella*, *reflexa* Swt., *Shepherdi* Swt., *Thompsoniana*, *Vernoniana*, *Wheeleriana* Swt.

**Phoenix** L., Dattelpalme, XXII. III. (VI. III.), Palmae.

*acaulis* Roxb., stammlose, f. w. Ostindien.  
*dactylifera* L., gemeine, f. w. Mittel- und Südasien, Nordafrika.  
*farinifera* Roxb., mehltragende, f. w. Ostindien.  
*leonensis* Lodd., westafrikanische, f. w. Sierra Leone.  
*paludosa* Roxb., sumpfliebende, f. w. Ostindien.  
*pygmaea* Lodd., Zwerg-D., f. w. Mauritius.  
*reclinata* Jacq., zurückgebogene, f. w. Südafrika.  
*sylvestris* Roxb., Wald-D., f. w. Ostindien.

**Phoenocoma** D. Don, Rothschoepf, XIX. II., Compositae-Helichrysae.

*prolifera* D. Don, sprossender, f. t. Cap der gut. H.

**Pholidota** Lindl., Schuppenorche, XX. I., Orchideae.

*imbricata* Lindl., Hook., ziegeldachförmige, 4. w. Nepal.  
*pallida* Lindl., bleiche, 4. w. Ostindien.

**Pholiurus pannonicus** Trin. v. **Lepturus pannonicus**.**Phormium** L., Flachslilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*tenax* Forst., zähe (neuseeländische), 4. k. f. b. Neuseeland.



- Photinia** Lindl., Photinie, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.  
*arbutifolia* Lindl., erdbeerbaublätterige, ♀. k. Californ.  
*dubia* Lindl., zweifelhafte, ♀. k. Nepal.  
*integrifolia* Lindl., ganzblätterige, ♀. k. Nepal.  
*serrulata* Lindl., sägezahnige, ♀. k. China, Japan.  
**Phragmites** Trin., Teichrohr, III. 11., Gramineae.  
*communis* Trin., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien,  
 Amerika, Neuholland.

β) *repens* C. W. Mey. γ) *flavescens* Cust.

*isiacus* Kunth, ägyptisches, 4. Wa. f. k. Aegypten.

- Phryma** L., Phryma, XIV. 1., Labiatae.

*leptostachya* L., schlankährige, 4. f. Nordamerika.

- Phrynium** W., Wasseringwer, I. 1., Scitamineae-Cannaceae.

*angustifolium* Lodd., schmalblätteriger, 4. w. Ostindien.

*capitatum* W., kopfförmiger, 4. w. Ostindien.

*Casupo* Rosc., Casupo-W., 4. w. Südamerika.

*coloratum* Hook., farbiger, 4. w. Brasilien.

*comosum* Rosc., schopfiger, 4. w. Surinam.

*dichotomum* Roxb., zweizinkiger, 4. w. Ostindien.

*ellipticum* Rosc., elliptischer, 4. w. Guiana.

*grandiflorum* Rosc., großblumiger, 4. w. Brasilien.

*imbricatum* Roxb., ziegeldachförmiger, 4. w. Ostindien.

*Myrosma* Rosc., balsamischer, 4. w. Südamerika.

*obliquum* Lodd., schiefer, 4. w. Ostindien.

*ovatum* Mart., eiförmiger, 4. w. Brasilien.

*Parkeri* Rosc., Parker's, 4. w. Südamerika.

*parviflorum* Roxb., kleinblumiger, 4. w. Ostindien.

*setosum* Roxb., borstiger, 4. w. Brasilien.

*spicatum* Roxb., ähriger, 4. w. Pegu.

*virgatum* Roxb., ruthenförmiger, 4. w. Ostindien.

- Phtheirospermum** Bunge, Würgsame, XIV. 11.,  
 Personatae-Rhinantheae.

*chinense* Bunge, F. et Mey., chinesischer, ♂. f. k.  
 Nordchina.

- Phycella** Lindl., Phycella, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*biflora* Lindl., zweiblumige, 4. ♂. t. k. ?

*corusca* Lindl., schimmernde, 4. ♂. w. Coquimbo.

*cyrtanthoides* Lindl., cyrtanthusähnliche, 4. Zw. w. Chili.

*glauca* Lodd. (*ignea* β. *glauca* Lodd.), blaugrüne, 4.  
 Zw. w. Chili.

*Herbertiana* Lindl., Herbert's, 4. Zw. w. Chili.

*ignea* Lindl., feuerfarbige, 4. Zw. w. Chili.

b) *pulchra* D. Don.

- Phylica** L., Heidemyrte, V. 1., Rhamneae.

I. Genuina.

*acerosa* W., nadelblätterige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

*acuminata* Hort., zugespitzte, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

*arborea* Thouars, baumartige, ♀. t. Tristan d'Acunna.

*bicolor* L. (*strigosa* Thbg.), zweifarbige, ♀. k. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

*capitata* Thbg., kopfförmige, ♀. k. t. Cap der gut. H.  
*Commelini* Spgl. (*pubescens* W.), Commelin's, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*cylindrica* Wendl., cylinderförmige, ♀. k. t. C.d.g.H.

*ericoides* L., gemeine, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

*eriophora* Berg., wollkopfige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

*excelsa* Wendl., hohe, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

*globosa* Thbg., kugelförmige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

**Phylica**

*horizontalis* Vent., horizontale, ꝥ. k. t. Cap d. gut. H.  
*imberbis* Thbg. (*brunioides* Lam.), unbärtige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*imbricata* Thbg., dachblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.  
*papillosa* Wendl., weichwarzige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.  
*parviflora* L. (? *australis* Lk.), kleinblumige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

*pinifolia* L., kieferblättrige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.  
*plumosa* L., federige, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffn.

*pubescens* Ait. (? *hirsuta* Thbg.), weichhaarige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*pumila* Wendl., kleine, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*racemosa* Thbg., traubige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

*ramosissima* DC., vielästige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

*reclinata* Wendl., zurückgebogene, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

*rosmarinifolia* Lam. (*secunda* Thbg.), rosmarinblättrige,

ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*squarrosa* Vent., sparrige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

*stipularis* Thbg., zwischenblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

*trichotoma* Thbg., dreizinkige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

*villosa* Thbg., zottige, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

## II. *Soulangia* Brogn.

*axillaris* Lam. (*rosmarinifolia* W.), achselblumige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*buxifolia* L. (? *ledifolia* Dsf.), buchsbaumblättrige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*cordata* L. (? *doica* L.), herzblättrige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

*oleioides* Dsf. (*spicata* Lodd.), ölbaumblättrige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

*orientalis* W., morgenländische, ꝥ. k. t. ? Cap d. g. H.

*paniculata* W. (*myrtifolia* Poir), rispige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

*spicata* L. (*pinea* Thbg.), ährige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

*thymifolia* Vent., thymianblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

## III. *Trichocephalus* Brogn.

*callosa* Thbg., schwielige, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

*lanceolata* Thbg. (*glabrata* Thbg., *atrata* Lichtstn.), lan-

zettliche, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*rubra* W., rothe, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffn.

*radiata* L. v. *Staavia radiata*.

## **Phyllanthus** L., Blatthlume, XXI. x., *Tricoccae-* *Euphorbiaceae*.

*angustifolius* Sw., schmalblättrige, ꝥ. ꝥ. w. Jamaica.

*calycinus* La Bill., grofskelchige, ꝥ. t. Neuholland.

*cantonensis* Hornem., cantonische, ☉. w. Südchina.

*ceramicus* P., moluckische, ꝥ. ꝥ. w. Molucken.

*Conami* Sw. (*brasiliensis* Poir.), Conami-B., ꝥ. ꝥ. w.

Westindien, Brasilien.

*cuneatus* W. (*obcordatus* Hort.), keilförmige, ☉. w. ? China.

*elongatus* Jacq. fil. (Lodd.), verlängerte, ꝥ. ꝥ. w. Jamaica.

*falcatus* Sw. (*Epiphyllanthus* L.), sichelförmige, ꝥ. ꝥ. w.

Bahamische Inseln.

*gracilis* Roxb., schlanke, ♂. w. Ostindien.

*grandifolius* L. (*ovatus* Poir.), grofsblättrige, ꝥ. ꝥ. w.

Westindien.

*juglandifolius* W. (? *fraxinifolius* Hort.), wallnufsblättrige,

ꝥ. ꝥ. w. Westindien.

*lanceolatus* Poir., lanzettblättrige, ꝥ. ꝥ. w. Mascarenas.

**Phyllanthus**

- latifolius Sw., breitblättrige, f. f. w. Jamaica.  
 linearis Sw., gleichbreitblättrige, f. f. w. Westindien.  
 longifolius Lam., langblättrige, f. f. w. Mascarenas.  
 lucens Poir., spiegelnde, f. f. w. China.  
 maderaspatensis L., Madras-B., f. f. w. Ostindien.  
 medius (Lodd.), mittlere, f. f. w. Jamaica.  
 microphyllus H. B. K., kleinblättrige, f. f. w. Südamer.  
 mimosoides Sw., mimosaähnliche, f. f. w. Caribäen.  
 montanus Sw., Berg-B., f. f. w. Jamaica.  
 Niruri L., weisse, ☉. w. Ostindien.  
 nutans Sw., nickende, f. f. w. Jamaica.  
 obovatus Mühlbg. (*carolinensis* Walt.), verkehrteiblättrige,  
 ☉. f. Nordamerika.  
 obscurus Roxb. (? *villosus* Poir.), dunkle, f. f. w. Ostind.  
 polyphyllus W., vielblättrige, f. f. w. Ostindien.  
 reticulatus Poir., netzförmige, f. f. w. Ostindien.  
 rhamnoides Retz, wegdornähnliche, f. f. w. Ostindien.  
 scandens Roxb., schlingende, f. f. Sch. w. Ostindien.  
 simplex Retz, einfache, ☉. w. Ostindien.  
 speciosus Jacq. (*Arbuscula* W.), schöne, f. f. w.  
 Westindien.  
 strictus Roxb., steife, f. f. w. Ostindien.  
 thymoides Loud., thymianähnliche, f. t. Neuholland.  
 Urinaria L., urintreibende, ☉. w. Ostindien.  
 virosus Roxb., giftige, f. f. w. Ostindien.  
*Emblica* L. (et *racemosus* L.) v. *Emblica officinalis*  
 et *racemosa*. *Kirganelia* W. v. *Kirganelia elegans*.  
*longifolius* Jacq. v. *Cicca disticha*.

**Phyllis** L., *Phyllis*, V. II., Rubiaceae.

Nobla L., edle, f. k. Canarische Inseln.

**Phyllolobium** Fisch., Blattlappen, XVII. IV. (XVI. VI.),  
Leguminosae-Papilionaceae.

- chinense Fisch., chinesischer, 4. k. China.  
 zanzibarense Boj., zanzibarischer, 4. w. Zanzibar.

**Phyllocladus** Rich., Blattästler, XXI. x., Coniferae-  
Taxineae.

- rhomboidalis Rich., rautenförmiger, f. t. Van-  
 Diemens-Land.

**Phyllodoce** Salisb., Blattheide, VIII. I., Ericaceae.

- empetriformis D. Don, rauschbeerenähnliche, f. f. b. k.  
 Nordwestliches Amerika.

Pallasiana DC., Pallas's, f. f. b. k. Sibirien.

taxifolia Salisb., taxusähnliche, f. f. b. k. Lappland,  
 Grönland, Sibirien, Nordamerika.

**Phylloma aloeflorum** Haw., *Jacquini* G. Don etc. v. *Loma-*  
*tophyllum borbonicum* etc.**Phymatanthus** Lindl. v. *Pelargonium*.**Physalis** L., Schlutte (Judenkirsche), V. I., Solanaceae.

aequata Jacq. fil. (*isocarpa* Brot.), gleichförmige, ☉. f. ?

Alkekengi L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa, Italien.

angulata L. (*peruviana* Walt., *minima* Wall.), kantige,  
 ☉. f. Nordamerika, Ost- und Westindien.

arborescens L., baumartige, f. k. Westindien, Neuspan.

aristata Ait., grannige, f. k. Canarische Inseln.

chenopodifolia Lam. (*tuberosa* W.), gänsefußblättrige,  
 4. w. Peru.

curassavica L., curassavische, 4. f. w. Curassav.

foetens Poir. (*foetidissima* Lag.), stinkende, ☉. f. m.  
 Neuspanien.



**Physalis**

*frutescens* DC. (*suberosa* Cav.), strauchige, ♀. k. Spanien.  
*heterophylla* N. E. (*tomentosa* et *nutans* Walt.), verschiedenblättrige, 4. k. f. Nordamerika.

*indica* Lam. (*parviflora* RB., *pseudo-angulata* Blume, *divaricata* D. Don), indische, ♂. f. m. Ostindien, Nepal, Neuholland.

*laurifolia* H. Berol. (*angulata* R. et P., *lanceolata* Mchx.), lorbeerblättrige, ♂. f. m. Peru.

*Linkiana* N. E. (*dubia* Lk.), Link's, ♂. f. m. Brasilien.  
*minima* L. (*parviflora* Lag., *Lagascae* R. et S., *villosa* Roth, *peruviana* Nutt., *Rothiana* R. et S.), kleinste, ♂. f. m. Vera-Cruz, Ostindien.

*peruviana* L. (*edulis* Sims), peruvianische, 4. w. k. Peru.

*philadelphica* Lam. (*chenopodifolia* W., *atriplicifolia* Jacq., *ovata* Poir., *megistocarpos* Zucc.), philadelphische, ♂. f. Nordamerika.

*prostrata* L'Her. (*limensis* Retz), gestreckte, ♂. f. m. Peru.  
*pruinosa* L., bereifte, ♂. f. m. Westindien.

*pubescens* L. (*barbadensis* Jacq.), weichhaarige, ♂. f. Nordamerika, Westindien.

*somnifera* L. (*flexuosa* L.), gebogene, 4. k. Südeuropa, Ostindien.

*viscosa* L. (? *pensylvanica* L., *Jacquini* Lk.), schmierige, 4. k. Buenos-Ayres, Nordamerika.

*indica* Lam. v. *Nicandra indica*.

**Physianthus** Mart., Blasenblume, V. II., Asclepiadeae.  
*albens* Mart., weifsliche, ♀. Sch. w. Brasilien, Buenos-Ayres.

**Physinga** Lindl., Physinga, XX. I., Orchideae.

*prostrata* Lindl., gestreckte, 4. w. ? Südamerika.

**Physolobium** Benth., Blasenblatt, ? XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*elatum* Benth., hohes, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

**Physomatium** Kaulf., Blasenhüllchen, XXIV. I., Pterioideae.

*molle* Kaulf., weiches, 4. w. ? Südamerika.

*pubescens* Kaulf., weichhaariges, 4. w. Brasilien.

**Physosiphon** Lindl., Blasenstendel(röhre), XX. I., Orchideae.

*carinatus* Lindl., kielförmiger, 4. w. ?

*emarginatus* Lindl., ausgerandeter, 4. w. Brasilien.

*Loddigesii* Lindl., Loddige's, 4. w. Neuspanien.

*spiralis* Lindl., spiralförmiger, 4. w. Brasilien.

**Physospermum** Cuss., Blasensame, V. II., Umbelliferae.

*commutatum* Spgl., verwechselter, 4. f. b. England, Oberitalien, Portugal, Griechenland.

**Physostegia** Benth., Blasenkelch, XIV. I., Labiatae.

*cordata* Benth. (Nutt.), herzblättriger, 4. f. Nordamer.

*denticulata* Benth. (Ait.), gezähnelter, 4. f. Virginien, Carolina.

*imbricata* Hook., ? Paxt., ziegeldachförmiger, 4. f. b. k. Texas.

*speciosa* Benth. (Sw.), prächtiger, 4. f. Sibirien.

*truncata* Benth., abgestutzter, ♂. f. St. Felipe.

*variegata* Benth. (Vent.), bunter, 4. f. b. k. Südcarolina.

*virginiana* Benth. (L.), virginischer, 4. f. Nordamerika.  
 b) *alba*.

**Phytelephas** R. et P., Elephantenpandane, XXII. XII., Pandaneae.

**Phytelephas**

macrocarpus R. et P., großfrüchtige, h. w. Peru.

**Phyteuma** L., Rapwurz, V. 1., Campanulaceae.

betonicaefolium Vill. (*persicifolium* Hoppe), betonienblättrige, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Dauphiné etc.

campanuloides MB., glockenblumenähnliche, 4. f. Caucasus.

canescens W. Kit., weißgrauliche, 4. f. Ungarn, Galicien, Siebenbürgen.

comosum L., schopfge, 4. k. f. b. Krain, Tyrol, Oberitalien. Alpen.

cordatum Vill. (*Sieberi* Spgl.), herzblättrige, 4. f. Tyrol, Krain, Dauphiné.

Halleri All. (*ovatum* Schm., *urticifolium* Clairv.), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

hemisphaericum L., kugelblumige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *graminifolium* Shr.

humile Schlchr. (*Carestiae* Biv.), niedrige, 4. f. Südliche schweizer Alpen.

inaequatum Kit., ungleiche, 4. f. Ungarn.

lanceolatum W., lanzettblättrige, 4. f. b. k. Armenien.

limonifolium Sibth., Sm. (*virgata* Lodd., *stricta* Sims, *lanceolata* Dsf., *collinum* Guss., *stylosum* Schrk.), statizenblättrige, 4. f. Griechenland, Süditalien.

Micheli All., Micheli's, 4. f. Schweizer u. piemonteser Alpen, Pyrenäen.

nigrum Schm. (*ovale* Hoppe), schwarze, 4. f. Deutschl. etc.

orbiculare L., kreisförmige, 4. f. Mitteleuropa.

β) *fistulosum* Rehb. γ) *lanceolatum* Vill.

pauciflorum L., wenigblumige, 4. f. Südeuropäische Alpen.

β) *globulariaefolium* Hoppe et Stbg.

pulchellum Fisch. et Mey., schöne, 4. f. Südrussland.

Scheuchzeri All., Scheuchzer's, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

β) *Charmelii* Vill.

scorzoneraefolium Vill., haferwurzblättrige, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

sibiricum Vest., sibirische, 4. f. Sibirien.

spicatum L., ährenförmige, 4. f. Europa.

veronicaefolium Schrad., ehrenpreisblättrige, 4. f. Tyroler Alpen.

virgatum W., ruthenförmige, ♂. f. Syrien.

*pinnatum* W. v. *Petromarula pinnata*.

**Phytolacca** T., Kermesbeere, X. v., Aizoideae-Phytolaccaeae.

abyssinica Hoffm., abyssinische, 4. h. w. Abyssinien.

bogotensis H. B. K., bogotische, 4. w. Neu-Granada.

decandra L., zehnmännige, 4. f. Nordamerika.

dioica L., zweihäusige, h. w. Südamerika.

dodecandra L'Her., elffädige, 4. w. Afrika.

icosandra L., zwanzigfädige, 4. w. Ostindien.

mexicana Swt. (*icosandra* Bot. mag.), mexicanische, 4. w. Mexico.

octandra L., achtmännige, 4. w. Mexico.

stricta Hoffm. (*heptandra* Retz), steife, 4. w. Südamer.

*Piранthus* RB. v. *Stapelia*.

*Picea* D. Don v. *Pinus*.

*Picotia brassicaefolia* R. et S. etc. vid. *Omphalodes amplexicaulis* etc.

**Picramnia** Sw., Bitterstrauch, XXII. v., Amyrideae-Terebinthaceae (*Cassuvieae*).

*Antidesma* Sw., antidesmaähnlicher, *h.* w. Jamaica.

*pentandra* Sw., fünf männiger, *h.* w. Caribäen.

**Picridium** Dsf., Bitterling, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.

*hispanicum* Lk. (*pinnatifidum* Lag.), spanischer, *o.* f. Spanien.

*ligulatum* Vent., zungenblättriger, *h.* k. Nordafrika.

*tingitanum* Dsf., tanger'scher, *o.* f. Nordafrika.

*vulgare* Dsf., gemeiner, *o.* f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.

*albidum* DC. v. *Barckhausia albida* Nachtr.

**Picris** L., Bitterkraut, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.

*altissima* Delil., hohes, *o.* f. Aegypten.

*asperima* Lindl., rauhestes, *h.* k. Van-Diemens-Land.

*asplenioides* L., strichfarnblättriges, *o.* f. Nordafrika.

*barbarorum* Lindl., fremdes, *h.* k. Neuholland.

*dahurica* Fisch., dahurisches, *o.* f. Dahurien.

*hieracioides* L., gemeines, *h.* f. Europa, Sibirien.

*β*) *umbellata* N. E. (*paleacea* Vest.). *γ*) *crepoides* Saut. *δ*) *ruderalis* Schm.

*hispidissima* Bartl. (*laciniata* Vils.), hackerigstes, *h.* f. Istrien, Dalmatien.

*kamtschatica* Lodd., kamtschatalisches, *o.* f. Kamtschatka.

*lyrata* Delil., leierförmiges, *o.* f. Aegypten.

*nepalensis* Loud., nepal'sches, *h.* k. Nepal.

*pauciflora* W., wenigblumiges, *o.* f. Oberitalien, Frankreich.

*rigida* Ledeb. (? *hispidia* Ait.), starres, *o.* f. Taurien.

*Sprengeriana* Lam. (*Rhagadiolus* P.), Sprenger's, *o.* f. Süd- und Westeuropa.

*strigosa* MB., striegeliges, *h.* f. Taurien.

*echioides* L. v. *Helminthia echioides*.

**Pictetia** DC. (A. Pictet, Arzt und Physiker zu Genf), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*aristata* DC., grannige, *h.* w. Westindien.

*squamata* DC., schuppige, *h.* w. Westindien.

**Pierardia** Roxb. (M. Pierard zu Kew Green), VIII. i., Sapindaceae.

*sapida* Roxb., wohlschmeckende, *h.* w. Sumatra.

**Pieris** D. et G. Don, *Pieris*, X. i., Ericaceae.

*formosa* D. et G. Don, schöne, *h.* k. t. Nepal.

*japonica* D. et G. Don, japanische, *h.* k. t. Japan.

*lanceolata* D. et G. Don, lanzettliche, *h.* k. t. Nepal.

*ovalifolia* D. et G. Don, eiblättrige, *h.* k. Nepal.

**Pilea** Lindl., Haarnessel, XXI. iv., Urticaceae.

*muscosa* Lindl., moosähnliche, *h.* w. Westindien.

**Pilogyne** Schrad., Haagriffel, XXII. iii., Cucurbitaceae.

*suavis* Schrad., angenehmriechender, *h.* Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

**Pilularia** L., Pillenfarn, XXIV. iv., Marsiliaceae.

*globulifera* L., kugeltragender, *h.* Wa. f. Europa.

**Pimelea** Forst., Glanzstrauch, II. i., Thymelaeaceae.

*arenaria* Cunn., sandliebender, *h.* t. Neuzeeland, Neusüdwallis.

*cinerea* RB., aschfarbiger, *h.* t. Neuholland.

*clavata* LaBill., keulenförmiger, *h.* t. Neuholland.



**Pimelea**

*collina* RB., Hügel-G.,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*crinita* Lindl., bemähter,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland (Schwanenfl.).  
*decussata* RB., kreuzblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.  
*diosmaefolia* Lodd., diosmablättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*drupacea* La Bill., steinfrüchtiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*filamentosa* Rudg., langfadiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*glauca* RB., blaugrüner,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

*graciliflora* Hook., schlankblumiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*hispida* RB., steifborstiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*humilis* RB., niedriger,  $\frac{1}{2}$  t. Van-Diemens-Land.  
*hypericina* Cunn., johanniskrautblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholl.  
*incana* RB., weißgrauer,  $\frac{1}{2}$  t. Van-Diemens-Land.  
*intermedia* Lindl., mittlerer,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*lanata* RB., wolliger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*ligustrina* La Bill., ligusterähnlicher,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

*linifolia* Sm., flachsblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*linoides* Cunn., flachsähnlicher,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*longiflora* RB., langblumiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*nivea* La Bill., schneeweißer,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

*pauciflora* RB., wenigblumiger,  $\frac{1}{2}$  t. Van-Diemens-Land.  
*rosea* RB., rosafarbiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*spicata* RB., ährenförmiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
*sylvestris* RB., Wald-G.,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Pimpinella** R. L., Bibernell, V. II., Umbelliferae.

*cretica* Poir., cretische, 4. f. Griechenland.  
*flava* C. A. Mey. (*aurea* Hort.), hellgelbe, 4. f. Südrussl.  
*lateriflora* Lk., seitenblumige, ♂. f. ? Nordafrika.  
*lutea* Dsf., gelbe, 4. f. b. Nordafrika.  
*magna* L., große, 4. f. Europa.

$\beta$ ) *rubra* Hoppe.  $\gamma$ ) *laciniata* Wallr. (*media* Hoffm., *orientalis* Gouan).  $\delta$ ) *dissecta* Retz.

*rotundifolia* MB., rundblättrige, 4. f. Caucasus.

*Saxifraga* L., gemeine, 4. f. Europa.

a) *major* Wallr.  $\beta$ ) *dissectifolia* Wallr.  $\gamma$ ) *poterifolia* Wallr.  $\delta$ ) *alpestris* Spgl. (*alpina* Host.).  
 $\epsilon$ ) *nigra* W.

*tenuis* Sieb., dünne, 4. k. f. b. Creta.

*Anisum* L., *apula* Bernh., *bubonoides* Brot. (et *Tragium* Vill.) vid. *Tragium Anisum*, *apulum*, *Broteri*, *Columnae* etc. *dioica* L. (*pumila* Jacq.), *glauca* L. et *glauca* Kit. vid. *Trinia vulgaris*, *Henningii* et *Kitaibelii*.

**Pinguicula** T., Fettkraut, II. I., Personatae-Lentibulariae.

*alpina* L. (*flavescens* Flörk., *purpurea* W.), Alpen-F., ♂. 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Nordeuropa.

*edentula* Hook., zahnloses, 4. k. Nordamerika.

*grandiflora* Lam. (*leptoceras* Rchb.), großblumiges, 4. f. b. k. Tyrol, Schweiz, Frankreich, Irland.

*longifolia* Ramond, langblättriger, 4. f. b. k. Schweiz, Tyrol, Frankreich.

$\beta$ ) *grandiflora* DC.

*lusitanica* L., portugiesisches, 4. f. b. k. Portugal, England, Schottland.

*lutea* Walt. (*campanulata* Lam.), gelbes, 4. k. Virginien, Carolina.

*vulgaris* L., gemeines, 4. f. Europa.

**Pinkneya** Mckx. (M. Pinkney, nordamerikanischer Botaniker), V. 1., Rubiaceae.

pubens Mchx., feinhaarige,  $\frac{1}{2}$  k. Südcarolina, Florida.

**Pinus** T. L., Fichte, XXI. x., Coniferae-Abietinae.

I. **Abies** T. DC., D. Don., Pechtanne (Fichte).

**Abies** L. (*Picea du Roi* A. *excelsa* DC., *Picea vulgaris* Lk.), gemeine,  $\frac{1}{2}$  f. Europa, Nordasien.

a) communis A. B. b) nigra A. B. c) carpathica A. B. d) pendula Lodd. e) fol. variegatis A. B. f) Clanbrasiliana Lodd. g) Clanbrasiliana stricta A. B. h) pygmaea A. B. (*nana* Lodd., *elegans* Sm.). i) tenuifolia Sm. k) gigantea Sm. l) monstrosa A. B. Sm. of Ayr.

alba Ait. (*laxa* Ehrh., *canadensis* du Roi), weisse,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

b) nana Dicks.

canadensis L. (*americana* du Roi), Schierlings-F.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

cephalonica A. B. (*taxifolia* et *luscombeana* Hort.), cephalonische,  $\frac{1}{2}$  f. Cephalonien.

Douglasii Sabine, Lindl. (*taxifolia* Lamb., *californica* Hort.), Douglas's,  $\frac{1}{2}$  f. Westliches Nordamerika.

b) taxifolia A. B.

dumosa Lam. (*decidua* Wall. et *Brunoniana* Wall., A. *Brunoniana* Lindl.), Hecken-F.,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Nepal.

Menziesii Lamb., Dougl., Menzies's,  $\frac{1}{2}$  f. Californien.

nigra Ait. (*mariana* Ehrh., *denticulata* Mchx.), schwarze,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

orientalis L., morgenländische,  $\frac{1}{2}$  f. Trapezunt.

rubra Lamb., Poir., rothe,  $\frac{1}{2}$  f. Neu-Schottland.

b) coerulea Booth.

Smithiana Wall. (*Khutrow* Royle, *Morinda* Hort.), Smith's,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Himalaya.

II. **Cedrus**, Barrel. T.

**Cedrus** L. (C. *Libani* Barrel.), Ceder-F. (von Libanon),  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Kleinasien, Syrien.

b) fol. argent. c) nana.

Deodara Roxb., Lamb., Deodara-Ceder,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.

III. **Larix** T., Lerchenbaum.

**Larix** L. (L. *europaea* DC.), Lerchen-F.,  $\frac{1}{2}$  f. Ost- und Mitteleuropa, Mittel- und Nordasien.

a) communis Laws. b) laxa Laws. c) compacta Laws. d) pendula Laws. e) repens Laws. f) flore rubro A. B. g) flore albo A. B. h) sibirica Fisch. (? *archangelica* Laws., *rossica* Sabin.). i) dahurica A. B. Laws. k) intermedia A. B. Lodd. l) Fraseri Anglor.

microcarpa Lamb. (*laricina* du Roi, L. *americana* Mchx. a *rubra* A. B.), kleinfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

pendula Ait. (*intermedia* du Roi, *nigra* Marsh., L. *americana*  $\beta$  A. B.), überhängende,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

$\beta$ ) prolifera A. B.

IV. **Picea** D. Don, Weifs-(Edel-)Tanne.

amabilis Dougl., liebliche,  $\frac{1}{2}$  f. Californien.

balsamea L., Balsam-T.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

b) longifolia Booth.

bracteata Lamb. (*venusta* Dougl.), deckblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Californien.

Fraseri Pursh, Fraser's,  $\frac{1}{2}$  f. Pensylvanien, Carolina.

## Pinus

- grandis Dougl., grofse, *h. f.* Neu-Californien.  
nobilis Dougl., edle, *h. f.* Nordamerika.  
Picea L. (*Abies* du Roi, *A. vulgaris* Poir., *A. pectinata* DC., *A. excelsa* Lk., *A. taxifolia* H. Par.), gemeine, Weifs-T., *h. f.* Europa.  
    b) tortuosa. c) fol. variegat. d) cinerea.  
Pichta Fisch. (*A. sibirica* Led.), Pichta-F., *h.* Altai.  
Pindrow Royle (*Taxus Lambertiana* Wall.), Pindrow-F., *h. k. f. b.* Himalaya.  
religiosa H. B. K., verehrte, *h. k.* Mexico.  
Webbiana Wall. (*spectabilis* Lamb.), Webb's, *h. f. b. k.* Nepal.  
V. Pinus T., Kiefer.  
austriaca Höss. (*nigricans* Host.), österreichische, *h. f.* Oesterreich.  
Banksiana Lamb. (*rupestris* Mchx., *sylvestris divaricata* Ait., *Hudsonia* Poir.), Bank's, *h. f.* Canada.  
brutia Tenor. (*conglomerata* Graeff.), calabrische, *h. f.* Calabrien.  
californiana Loisel. (*montereyensis* Godefroy, *adunca* Bosc, *montheragensis* H. Angl.), californische, *h. f.* Californien.  
canariensis C. Smith, canarische, *h. k.* Canarische Inseln.  
Cembra L., Zürbelnuß-K., *h. f.* Mitteleuropäische Alpen, Nordasien.  
    a) sibirica. b) pygmaea (*pumila* Pall.). c) helvetica Lodd.  
Coulteri D. Don (*Sabiniana* var. Hort., *macrocarpa* Lindl.), Coulter's, *h. f.* Santa Lucia.  
excelsa Wall. (*Dicksonii* Hort.), hohe, *h. k. f. b.* Nepal.  
Gerardiana Wall. (*Neosa* Govan.), Gerard's, *h. t.* Ostind.  
halepensis Ait. (*hierosolymitana* du Ham.), syrische, *h. f.* Syrien.  
inops Ait. (*virginiana* du Roi), Jersey-K., *h. f.* Nordamer.  
insignis Dougl., ausgezeichnete, *h. f.* Californien.  
Lambertiana Dougl., Lambert's, *h. f.* Nordamerika.  
Laricio Poir. (*maritima* Ait.), lerchenähnliche, *h. f.* Südeuropa.  
    a) corsicana. b) subviridis du Ham. c) carmanica Bosc, (*romana* H. Angl.). d) calabrica. e) pyrenaica (*hispanica* Cook).  
leiophylla Schiede et Deppe, glattblättrige, *h. k. t.* Mexico.  
Llaveana Otto, La Llaves, *h. k.* Mexico.  
longifolia Roxb., langblättrige, *h. k. t.* Nepal.  
mitis Mchx. (*variabilis* Lamb., *echinata* Mill.), Neu-York-K., unbewehrte, *h. f.* Nordamerika.  
Montezumae Lamb. (*occidentalis* H. B. K.), Montezuma's, *h. k. t.* Mexico.  
monticola Dougl., Berg-K., *h. f. b. k.* Columbien.  
muricata D. Don, weichstachelige, *h. k.* Californien.  
occidentalis Sw., westliche, *h. t.* Westindien.  
Ocote Loud. (*oocarpa* Schiede), Ocote-K., *h. k.* Mexico.  
Pallasiana Lamb. (*taurica* Hort., *tatarica* H. Angl., *maritima* Pall., *Pinea* Habl., *halepensis* MB.), Pallas's, *h. f.* Taurien, Sibirien.  
palustris Mill., Ait. (*australis* Mchx., *serotina* Hort.). Sumpf-F., *h. f. b. k.* Carolina, Florida.  
patula Schiede, ausgebreitete, *h. k. t.* Mexico.  
Pinaster Ait. (*maritima* du Ham.), italienische, *h. f.* Südeuropa.



## Pinus

- b) escarenas (*Aberdoniae* A. P.). c) *Lemoniana* Benth. d) minor. e) fol. variegat. f) *maritima*. g) *chinensis*. h) *nepalensis*. i) *novae-hollandiae* Lodd. k) *St. helenica*. l) *Massoniana* Lamb.

*Pinea* L., genießbare, ꝥ. f. b. k. Südeuropa.

- b) *fragilis* du Ham. c) *cretica* Hort. d) *americana* Hort.

*ponderosa* Dougl., schwerholzige, ꝥ. f. Nordamerika.

*Pumilio* Haenke (*P. Mughus* Scop.), Krummholz-K., ꝥ. f. Osteuropäische Alpen, Pyrenäen.

- b) *rubraeflora*. c) *Fischeri* Booth. d) *nana*.

*pungens* Lamb., Mchx., stechende, ꝥ. f. Nordcarolina.

*pyrenaica* Lapeyr., pyrenäische, ꝥ. f. Pyrenäen.

*radiata* D. Don, strahlige, ꝥ. k. Californien.

*resinosa* Ait. (*rubra* Mchx.), starkharzige, ꝥ. f. Nordamer.

*rigida* Mill. (*Taeda* β. *rigida* Ait., *canadensis trifolia* Du. H.), starre, ꝥ. f. Nordamerika.

- β) *alopécuroidea* Lamb.

*rotundata* Lk., zugerundete, ꝥ. f. Tyrol etc.

*Sabiniana* Dougl., Sabine's, ꝥ. f. Nordamerika.

*sanguinea* Lapeyr. (*uncinata* DC.), blutfarbige, ꝥ. f. Pyrenäen.

*serotina* Mchx., späte, ꝥ. f. Nordamerika.

*sinensis* Lamb., chinesische, ꝥ. k. China.

*Strobis* L., Weimuths-P., ꝥ. f. Nordamerika.

- b) *alba* Hort. c) *brevifolia* Hort. d) *compressa* Booth (*nova* Lodd.).

*sylvestris* L., gemeine K., ꝥ. f. Europa, Mittel- und Nordasien, Japan.

- a) *vulgaris*. b) *horizontalis* (*rubra* Mill.). c) *haguenensis*. e) *rigensis*. e) *montana* Mill. f) *Mughus* Jacq. g) *monophylla* Hodgins. h) *scariosa* Lodd. i) *intermedia*. k) *altaica* Ledeb. l) *tortuosa* Don.

*Taeda* L., dreinadelige, ꝥ. f. Nordamerika.

*Teocote* Schiede et Deppe, *Teocote*-K., ꝥ. k. t. Mexico.

*tuberculata* D. Don, höckerige, ꝥ. k. Californien.

Unbestimmtere: *Fraseri* Lodd. Cat., *timoriensis* Hort.

*Dammara* Lamb. v. *Dammara orientalis lanceolata* Lamb. v. *Cunninghamia lanceolata*.

## Piper L., Pfeffer, II. III., Piperaceae.

I. *Peperomia* R. et P.

*acuminatum* L., zugespitzter, 4. w. Westind., Südamer.

*alatum* Vahl, geflügelter, 4. w. Peru.

*amplexicaule* Sw., stengelumfassender, 4. w. Jamaica.

*amplexifolium* Lk., umfassendblättriger, 4. w. Jamaica.

*blandum* Jacq., geschmackloser, 4. w. Caracas.

*brachyphyllum* W., kurzblättriger, 4. w. Südamerika.

*capense* L., capischer, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

*coriaceum* Vahl, lederartiger, ꝥ. w. Ostindien.

*cuneifolium* Jacq., keilblättriger, 4. w. Caracas.

*distachyon* L., zweijähriger, 4. w. Südamerika.

*hispidulum* Sw., steifhaariger, ♂. w. Jamaica.

*humile* Vahl, niedriger, 4. w. Caribäen.

*inaequalifolium* Vahl (*aromaticum* W.), ungleichblättriger, 4. w. Peru.

*incanum* Haw., weißgrauer, 4. ꝥ. w. Brasilien.

*macrostachyum* Rich., großähriger, 4. w. Cayenne.

## Piper

- maculosum* L., gefleckter, 4, w. St. Domingo.  
*magnoliaefolium* Jacq., magnolienblättriger, 4. f. w. Südamerika.  
*nummulariaefolium* Sw., pfennigkrautblättriger, 4. w. Jamaica.  
*obtusifolium* L. (*clusiaefolium* Jacq.), stumpfblättriger, 4. f. Südamerika.  
*ovalifolium* Hook., eiblättriger, 4. w. Südamerika.  
*peireskiaefolium* Jacq., pereskiablättriger, 4. f. w. Südamerika.  
*pellucidum* L., durchsichtiger, ①. w. Südamerika.  
*polystachyum* Ait. (*obtusifolium* Jacq.), vieläteriger, 4. w. Jamaica.  
*pubescens* Vahl, weichhaariger, 4. w. Südamerika.  
*pulchellum* Ait., schöner, 4. w. Jamaica.  
*quadrifolium* Sw., vierblättriger, 4. w. Südamerika.  
*reniforme* Poir., nierenförmiger, 4. w. Ostindien.  
*repens* H. B. K., kriechender, 4. w. Südamerika.  
*rotundifolium* Sw., rundblättriger, 4. w. Westindien, Südamerika.  
*rubellum* Haw., röthlicher, 4. w. Westindien.  
*rubricaule* N. E., rothstengeliger, 4. f. w. Brasilien.  
*serpens* Sw., geschlängelter, 4. w. Jamaica.  
*sidaefolium* Lk. (*peltatum* R. et P. *umbellatum* Jacq.), sidablättriger, 4. f. w. Peru, Brasilien.  
*stellatum* Sw., sternförmiger, 4. w. Jamaica.  
*suaveolens* Dsf., gutriechender, 4. w. Cuba.  
*subrotundum*, Haw., rundlicher, 4. w. ?  
*talinfolium* R. et P., talinenblättriger, 4. w. Neu Granada.  
*tenellum* Sw., zarter, 4. w. Jamaica.  
*tricarinatum* Haw., dreikieliger, 4. w. Westindien.  
*trifolium* L., dreiblättriger, 4. w. Guiana.  
*tristachyum*, R. et S., dreiähriger, 4. w. Neu-Granada.  
*urocarpum* Fisch. et Mey., schweiffrüchtiger, m. f. w. Brasilien.  
*verticillatum* L., wertelblättriger, 4. f. w. Jamaica.  
 II. Piper R. et P.  
*acutifolium* R. et P., spitzblättriger, f. w. Peru.  
*aduncum* L., hackiggekrümmter, f. w. Westindien.  
*Amalago* L., Amalago P., f. w. Jamaica.  
*Betel* L., Betel-P., f. w. Ostindien.  
*colubrinum* Lk., schlangenähnlicher, f. w. Brasilien.  
*decumanum* L., größer, f. w. Westindien.  
*discolor* Swt., verschiedenfarbiger, f. w. Westindien.  
*fallax* Rich. (*spurium* Lk.), trügerischer, f. Sch. w. Ostindien.  
*geniculatum* Sw., gelenkiger, f. w. Jamaica.  
*glabrum* Mill., kahler, f. w. Südamerika.  
*hirsutum* Sw., rauhaariger, f. w. Jamaica.  
*hispidum* H. B. K., scharfhaariger, k. w. Neu-Granada.  
*laurifolium* H. P. K., lorbeerblättriger, f. w. Peru.  
*longum* L., langer, f. w. Ostindien.  
*macrophyllum* Sw. (*obliquum* R. et P.), großblättriger, f. w. Westindien.  
*marginatum* Jacq., berandeter, f. w. Südamerika.  
*nigrum* L., schwarzer, f. Sch. w. Ostindien.  
*nitidum* Sw., glänzender, f. w. Jamaica, Surinam.  
*nodulosum* Lk. (*geniculatum* W.), knotiger, f. w. ?  
*peltatum* L., schildförmiger, f. w. Westindien.

**Piper**

*plantagineum* Lam. (*medium* Jacq.), wegetritähnlicher, ♀. w. Caribäen.

*racemosum* Vahl., traubiger, ♀. w. Peru.

*tomentosum* Vahl., filziger, ♀. w. Java.

*umbellatum* L., doldiger, ♀. w. Südamerika.

*unguiculatum* R. et P. (*glaucescens* Jacq.), nagelförmiger, ♀. w. Peru.

**Piptanthus** Swt., Fallblume, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

*nepalensis* Swt., nepal'sche ♀. k. Nepal.

**Piptatherum** P. B., Fallgranne, III. 11., Gramineae.  
*coerulescens* P. B., bläuliche, 4. f. b. k. Nordafrika, Südeuropa.

*frutescens* \*, strauchige, 4. ♀. k. Griechenland.

*multiflorum* P. B., vielblumige, 4. f. Südeuropa.

*paradoxum* P. B., wunderbare, 4. f. b. Südeuropa, Caucasus.

*punctatum* P. B. v. *Oedipachne punctata*.

**Piqueria** Cav. (Andreas Piquerio, spanischer Botaniker)  
XIX. 1. Compositae-Eupatorieae.

*artemisioides* H. B. K., beifußähnliche, 4. ♀. k. Quito, Mexico.

*ovata* G. Don, eiförmige, 4. k. Mexico.

*pilosa* H. B. K., haarige, 4. k. Mexico.

*trinervia* Cav., dreinervige, 4. ♀. k. Neuspanien.

*Piriqueta racemosa* Swt. v. *Turnera racemosa*.

**Piscidia** L., Fischfängerbaum, XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.)  
Leguminosae-Papilionaceae.

*carthagenensis* Jacq., carthagenischer, ♀. w. Hispaniola, Neu-Granada.

*Erythrina* L., gewöhnlicher, ♀. w. Westindien.

*longifolia* W. v. *Daubentonia longifolia*.

**Pisonia** Plum. (W. Piso, holländischer Arzt und Naturforscher, welcher Brasilien bereiste) VII. 1. Nyctagineae.

*aculeata* L., stachelige, ♀. w. Westindien.

*fragrans* Dsf., wohlriechende, ♀. w. ?

*grandis* RB., grofse, ♀. t. Neuholland.

*hirtella* H. B. K., kurzhaarige, ♀. w. Mexico.

*macrophylla* Lk., grofsblättrige, ♀. w. ?

*mexicana* W. (*Boerhaavia arhorescens* P., *arborea* Lag.)  
mexicanische, ♀. w. Mexico.

*nigricans* Sw., schwärzliche, ♀. w. Westindien.

*nitida* W., glänzende, ♀. w. Madagascar.

*obovata* Lk., verkehrteiförmige, ♀. w. ?

*obtusata* Sw., stumpfblättrige, ♀. w. Westindien.

*subcordata* Sw., herzblättrige, ♀. w. Caribäen.

**Pistacia** L., Pistazie, XXII. v., Amyrideae-Terebinthaceae.

*atlantica* Dsf., nordafrikanische, ♀. k. Nordafrika.

*fagarioides* W., fagaraähnliche, ♀. k. ?

*Lentiscus* L., Mastix-P., ♀. k. Südeuropa, Kleinasien.

β) *massiliensis* Mill. (*angustifolia* DC.) γ) *chia* Dsf.

*Terebinthus* L., Terpentin-P., f. b. k. Südeuropa, Mittelasien, Nordafrika.

β) *narbonensis* L. (*reticulata* W.)

*vera* L. (*officinalis* H. Kew.) wahre, ♀. k. Levante.

β) *trifolia* L.

**Pistorinia** DC., Pistorinie, X, 1v., Corniculatae-Crasulaceae.



**Pistorinia**

*hispanica* DC., spanische, ♂. f. b. k. Spanien.

**Pisum** T., Erbse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*arvense* L., Acker-E., ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

*biflorum* Rafn., zweiblumige, ☉. S. h. f. Sicilien.

*elatum* MB., hohe, ☉. Sch. f. Caucasus.

*Jomardi* Schrk., Jomardis, ☉. Sch. f. Aegypten.

*maritimum* L., Meerstrand's-E., 4. f. Nordeuropa, England, Belgien, Canada.

β) *americanum* Mill.

*sativum* L., gemeine, ☉. Sch. f. Europa.

b) *saccharatum* Sering. c) *macrocarpum* Sering.

d) *umbellatum* L. e) *quadratum* L. f) *humile*

Poir. g) *chlorospermum* Hort.

*thebaicum* W., griechische, ☉. Sh. f. ? Griechenland.

*Ochrus* L. v. *Ochrus pallida*.

**Pitcairnia** L'Her. Ait. (W. Pitcairn, M. Dr. zu London) VI. i., Bromeliaceae.

*albiflora* Sogl. (*albiflos* Herb.), weisblumige, 4. w. Brasilien.

*angustifolia* Ait., schmalblättrige, 4. w. Westindien.

*bracteata* Ait. (*latifolia* Red.), breitdeckblättrige, 4. w. Westindien.

*bromeliaefolia* Ait., ananasblättrige, 4. w. Westindien.

*chilensis* Lodd., chilesische, 4. w. Chili.

*flamea* Bot. Reg., feuerfarbige, 4. w. Brasilien.

*humilis* Hort., niedrige, 4. w. Südamerika.

*integrifolia* Sims., ganzblättrige, 4. w. Westindien.

*intermedia* Hort., mittlere, 4. w. Südamerika.

*iridiflora* Hort., irisblumige, 4. w. Südamerika.

*latifolia* Ait., breitblättrige, 4. w. Westindien.

*media* Hort., mittlere, 4. w. Südamerika.

*staminea* Sims., langfadige, 4. w. Südamerika.

*suaveolens* Bot. Reg., gutriechende, 4. w. Brasilien.

*sulphurea* Andr., schwefelgelbe, 4. w. Westindien.

*coarctata* P. et *furfuracea* W. v. *Pourretia coarctata* et *pyramidata*.

**Pittosporum** Klebsame, V. i., Evonymeae-Pittosporae.

*Andersonii* Fisch., Anderson's, ♂. k. t. Neuholland.

*angustifolium* Lodd., schmalblättriger, ♂. k. t. Neusüd.

*bracteolatum* Endl., deckblättriger, ♂. k. t. Norfolkinsel.

*coriaceum* Ait., lederblättriger, ♂. k. Madeira.

*cornifolium* Cunn., cornusblättriger, ♂. k. t. Neuseeland.

*ferrugineum* Ait. rostfarbiger, ♂. w. Guinea.

*fulvum* Rudg., braungelber, ♂. k. t. Neuholland.

*hirtum* W. (*hirsutum* Lk.), kurzhaariger, ♂. k. Canarische Inseln.

*ligustrifolium* Cunn., ligusterblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

*mauritianum* Lodd., mascarenischer, ♂. t. w. Mauritius.

*oleifolium* Ait., ölbaumblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

*revolutum* Ait., zurückgerollter, ♂. k. t. Neuholland.

*tenuifolium* G., dünnblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

*Tobira* Ait., chinesischer, ♂. k. t. China.

*tomentosum* Bonpl. filziger, ♂. k. t. Neuholland.

*undulatum* Andr., wellenförmiger, ♂. k. t. Neuholland.

b) *variegatum* Dens.

*viridiflorum* Sims (*capense* et *arbutifolium* Hort., *sinense* Dsf.), grünblumiger, ♂. k. A. Cap der guten Hoffn.

- Pladera** Roxb., *Pladera*, IV. 1., Contortae-Gentianeae.  
 decussata Roxb., kreuzblättrige, ☉. ♂. t. Bengalen.  
 virgata Roxb., ruthenförmige, ☉. ♂. t. Ostindien.
- Plagianthus** Forst., Schiefblume, XVI. VII., Malvaceae-Bombaceae.  
 divaricatus Forst., ausgesperrte, ♣. k. t. Neuseeland.  
 sidoides Hook., sidaähnliche, ♣. k. t. Van-Diemens-Land.  
*Lampenii* Booth. v. *Sida pulchella*.
- Plagiobothrys** Fisch. et Mey., Schieftraube, V. 1., Asperifoliaceae.  
 rufescens Fisch. et Mey., braunröthliche, ☉. f. Chili.
- Plagiolobum** Swt., Schieflappen XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 chorizemaefolium Swt., chorizemablättriger, ♣. t. Neuholll.  
 ilicifolium Swt., stechhülsenblättriger, ♣. t. Neuholland.
- Planera** J. F. Gmel. Mchx., (J. J. Planer, Professor d. Botanik zu Erfurt), IV. III., Urticaceae-Ulmaceae.  
 Abelicea R. et S., griechische, ♣. k. Creta.  
 Gmelini Mchx. (*aquatica* Gmel.) Gmelin's, ♣. k. f. b. Carolina.  
 Richardi Mchx., Richard's, ♣. f. b. k., Süddcaucasus, Nordamerika.
- Plantago** T. L., Wegetritt, IV. 1., Plantagineae.  
 adspersa Bernh., besprengter, ♣. k. f. b. Portugal, Aegypten.  
 afra L., afrikanischer, ♣. k. Sicilien, Nordafrika.  
 alpina L., Alpen-W., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 altissima Jacq. (*dalmatica* Schott.), höchster, 4. f. Ungarn, Krain, Frankreich, Italien.  
 amplexicaulis Cav., (*lagopoides* Dsf.), stengelumfassender, ☉. f. Spanien, Nordafrika.  
 argentea Lam., silberfarbiger, 4. f. Frankreich.  
 asiatica L. (*cordata* Lam., *glabra* Nutt.), asiatischer, 4. Sibirien, China, Nordamerika.  
 β) depressa W. γ) kentuckensis Mchx.
- Bellardi** All. (*pilosa* Pourret, *holostea* Lam., *sphaerocephala* R. et S., *lanata* Poir.), Bellardi's, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 brasiliensis Sims, brasilianischer, 4. k. Brasilien.  
 brutia Tenor. (*uliginosa* Baumg.), neapolitanischer, 4. f. Calabrien, Siebenbürgen.  
 camtschatica Lk., kamtschatalischer, 4. f. Kamtschatka.  
 capensis Thbg., capischer, ☉. f. Cap der guten Hoffn.  
 ceratophylla Lk., (*coronopifolia* Brot.), ☉. f., hornblättriger. Portugal.  
 ciliata Dsf., gefranzter, ☉. f. Nordafrika.
- Cornuti** Gouan (*limosa* Kit. *Gouani* Gmel., *adriatica* Campan.), Cornuti's, 4. f. Südeuropa.
- Coronopus** L., krähenhufsblättriger, ☉. f. Europa.  
 β) Jacquini R. et S. (*Cornuti* Jacq., *Cupani* Guss.)
- crassa** W. (*bullata* Don., *crispa* Jacq., *crassifolia* Roth.), dickblättriger, 4. f. Italien.
- Cumingiana** Fisch. et Mey., Cuming's, 4. k. Chili.
- Cynops** L., (*genevensis* DC., *suffruticosa* Lam.) strauchartiger, ♣. f. Südeuropa, Sibirien.
- decumbens** Bernh., niederliegender, 4. f. Deutschland.
- d'Urvillei** DC., d'Urville's, 4. f. Chili, Neucalifornien.
- elongata** Pursh, verlängerter, 4. f. Nordamerika.
- eristachya** Tenor., wollähriger. ☉. f. Italien.

## Plantago

- Eschscholtziana Fisch. et Mey., Eschscholtz, 4. f. b. k. Chili.  
 exaltata Hornem., hoher, 4. f. ?  
 garganica Tenor., gargarischer, ☉. f. Neapel.  
 gentianoides Sm., enzianähnlicher, 4. k. Kleinasien.  
 hirsuta Thbg., rauhaariger, 4. k. Cap der guten H.  
 Hookeriana Fisch. et Mey., Hooker's, ☉. f. Texas.  
 humifusa Bernh., niedergestreckter, 4. f. ?  
 indica L., (*Psyllium* Auctor.) indischer, ☉. f. Ost-,  
 Nord- und Südeuropa, Taurien, Sibirien, Ostindien.  
     β) arenaria WK. γ) divaricata Zucc. (*rigida* Hort.  
     δ) sicula Presl.  
 Ispaghula Roxb., Ispaghula-W., ☉. f. Bengalen.  
 Lagopus L. (*intermedia* Lapey., *arvensis* Presl.), hasen-  
 fußähnlicher, ☉. f. Süd- und Westeuropa.  
 lanceolata L., lanzettblättriger, 4. f. Europa, Asien,  
 Nordamerika.  
     b) variegata.  
     β) hungarica WK. (*lanata* Portensch.) γ) pumila  
     K. (*sphaerostachya* K.)  
 Lessingii Fisch. et Mey., Lessing's, ☉. f. Sibirien, Mongol.  
 Löfflingii L., Löffling's, ☉. f. Spanien, Cap d. g. H.  
 lusitanica L. (*pseudolusitanica* Schrad.), portugiesischer,  
 ☉. f. Portugal.  
 macrophylla H. Par., großblättriger, ☉. f. ?  
 macrorrhiza Poir. (*crithmoides* Dsf.) großwurzeliger, 4.  
 f. Sicilien, Mauritanien.  
 major L., größer, 4. f. Europa, Asien, Amerika,  
     β) brasiliensis Fisch. et Mey., γ) scoparia, δ)  
     bracteata Mch. (*rosea* Hort.), ε) minima DC.,  
     (*nana* Tratt.), ζ) subsinuata Hornem., (*sinuata* Lam.)  
 maritima L. (*Wulfenii* Spgl.), Meerstrands-W., 4. f.  
 Europa.  
     b) variegata, c) vivipara.  
     β) dentata Roth., γ) ciliata K. (*alpina* Sbr., *gra-*  
     *minea* Schlchr., *Wulfeni* M. et K.)  
 maxima Jacq., (*cucullata* Lam.) größter, 4. f. Sibirien,  
 Canada.  
 media L., mittlerer, 4. f. Europa.  
 mexicana Lk., mexicanischer, 4. k. Mexico.  
 montana Lam. (*atrata* Hopp., *alpina* Vill., *sphaerocephala*  
 Poir.), Berg-W., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 notata Lagasc., bezeichneter, ☉. f. Spanien.  
 parviflora Dsf., kleinblumiger, ☉. f. Nordafrika.  
 patagonica Jacq., patagonischer, ☉. f. Patagonien.  
 Preslii Tenor., Presl's, ☉. f. Sicilien.  
 Psyllium L., betäubender, ☉. f. Süd- und Osteuropa.  
 pumila L. (*exigua* Murr.) kleiner, ☉. f. Griechenland,  
 Aegypten, Ostindien.  
 recurvata L., zurückgekrümmter, 4. f. Südeurop., Kleinasien.  
 salsa Pall., Salinen-W., 4. f. Sibirien, Taurien.  
 saxatilis MB., Gesteins-W., 4. f. Caucasus.  
 scorzoneraefolia Lam., haferwurzelblättriger, 4. f. Ar-  
 menien.  
 sericea W. K., (*capitata* Hopp.), seidenhaariger, 4. f.  
 Ungarn, oesterreichisches Littorale.  
 serpentina Lam. (*carinata* Schrad., *Wulfeni* Schrb., *su-*  
*bulata* Wulf., *Gerardi* Schult., *Holosteum* Scop.),  
 kielblättriger, 4. f. Südeuropa.  
     β) longebracteata K.



**Plantago**

*Serraria* L., sägeblättriger, 4. f. Italien, Nordafrika.  
*sibirica* Dsf., sibirischer, 4. f. Sibirien.

*sparsiflora* Mchx., (*interrupta* Poir., *pauciflora* Pursh.),  
 zerstreutblumiger, 4. f. Nordamerika.

*squarrosa* Murray (*aegyptiaca* Jacq.), sparriger, 4. f.  
 Aegypten.

*stricta* Schousb. (*rosetana* Poir.) steifer, 4. f. Spanien,  
 Marocco, Aegypten.

*subulata* L. (*pungens* Lapey.), pfriemenförmiger. 4. f.  
 Süd- und Westeuropa.

*tenuiflora* WK., dünnblumiger, 4. f. Ungarn.

*teretifolia* Sbr., rundblättriger, 4. f. b. k. Aegypten.

*truncata* Cham., abgestutzter, 4. k. Chili.

*tumida* Lk. (*chilensis* H. Par.) aufgeschwollener, 4. f. Chili.

*vaginata* Vent., scheidiger, 4. k. Mauritanien, Canari-  
 sche Inseln.

*varia* RB., veränderlicher, 4. k. Neuholland.

*velutina* Poir. (*albicans* Schousb., *argentea* Ten.), weifs-  
 haariger, 4. f. b. k. Calabrien, Marocco.

*Victorialis* Poir. (*argentea* Vill., *holosericea* Gaud., *pilosa*  
 Kit., *nutans* Lam.), sammethaariger, 4. f. Südeuropa.

*villosa* Mch. (*lanata* W., *microcephala* W.) zottiger, 4.  
 f. Ostindien, Persien.

*virginica*, L., virginischer, 4. f. Nordamerika.

*Weldenii* Rchb. (*parvula* et *pumila* Weld.), Welden's, 4.  
 f. Dalmatien.

**Platanthera** Rich., Breitbeutel, XX. 1., Orchideae.

*bifolia* Rich., zweiblättriger, 4. Kn. f. Europa.

β) *brachyglossa* Wallr.

*chlorantha* Cust. (*virescens* Zollik. bif. β. *elatio* Gaud.),  
 grünblumiger, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

*dilatata* Hook., verbreiteter, 4. Kn. f. b. Canada.

*orbicularis* Hook., kreisförmiger, 4. Kn. f. b. Canada.

**Platanus** T. Platane, Kleiderbaum, XXI. 1., Amentaceae-Styracifluae (*Artocarpeae* Auct.).

*acerifolia* W. (*intermedia* Hort.), ahornblättriger, 4. f.  
 Kleinasien.

b) *hispanica* Lodd. (*macrophylla* Cree.)

*cuneata* W. (*orientalis undulata* Ait.), keilblättriger, 4.  
 f. Kleinasien.

*occidentalis* L., abendländischer, 4. f. Nordamerika.

b) *tortuosa* Hort.

*orientalis* L., morgenländischer, 4. f. b. Griechenland,  
 Kleinasien, Caucasus.

**Platycarpum** H. B. K., Breitkapsel, XIV. 1., Personatae-Bignoniaceae.

*orinocense* H. B. K., Orinoco-B., 4. w. Orinoco.

**Platychilum** Delaun., Breitkrone, XVII. 1. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*Celsianum* Delaun., Cels's, 4. t. Neuholland.

**Platycodon** A. DC., Prachtglocke, V. 1., Campanulaceae.

*grandiflorus* A. DC., großblumige, 4. f. Sibirien.

**Platylobium** Sm., Breitlappe, XVII. 1. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*formosum* Sm., schöne, 4. t. Neusüdwallis.

*Murrayanum* Hook., Murray's, 4. t. Van-Diemens-Land.

*obtusangulum* Hook., stumpfkantige, 4. t. Van-Diemens-L.

*ovatum* Sbr., eiförmige, 4. t. Neuholland.

*parviflorum* Sm., kleinblumige, 4. t. Neusüdwallis.

**Platylobium**

triangulare RB., dreieckige,  $\frac{5}{8}$  t. Van-Diemens-Land.

**Platynema** Schrad., Breitkraut, V. 1., Asperifoliaceae.

dahuricum \*, dahurisches, 4. f. b. Dahurien.

denticulatum \*, gezähneltes, 4. f. b. Nordamerika.

marginatum \*, berandetes, 4. f. Nordamerika.

maritimum \*, Meerstrands-B., 4. f. Europa, Nordamerika.

paniculatum Schrad., rispenförmiges, 4. f. Nordamerika.

pulchrum \* (virginicum Hort.), schönes, 4. f. b. Virg., Carol.

sibiricum \*, sibirisches, 4. f. b. Sibirien.

**Platypteris** H. B. K., Breitflügel, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

crocata H. B. K., safranfarbiger, 4. w. Südamerika.

**Platyspermum** Hoffm., Breitsame, V. 11., Umbelliferae.

litorale K., Seestrands-B.,  $\odot$  f. f. Caucasus.

muricatum Hoffm., weichstacheliger,  $\odot$  f. Nordafrika.

orientale Hoffm., morgenländischer,  $\odot$  f. Ostcaucasus.

pulcherrimum K., schönster,  $\odot$  f. Caucasus.

grandiflorum M. et K. v. Orlaya grandiflora.

**Platystemon** Benth., Breitfädler, XIII. 1., Papaveraceae.

californicum Benth., californischer,  $\odot$  f. Californien.

leiocarpum Fisch. et Mey., glattfrüchtiger,  $\odot$  f. Sibirien.

**Platystigma** Benth., Breitnarbe, XIII. 1., Papaveraceae.

lineare Benth., gleichbreitblättrige,  $\odot$  ♂ f. Californien.

**Platystilis** Swt., Breitgriffel, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

cyanea Swt., himmelblauer, 4. f. Caucasus.

digitata \* (sessilifolia Swt), fingerförmiger, 4. f. Taurien.

**Plectocephalus americanus** D. Don v. Centaurea americana.**Plectranthus** L'Her., Spornblume, XIV. 1., Labiatae.

asper Spgl., rauhe,  $\frac{5}{8}$  w. Ostindien.

australis RB., südliche,  $\odot$  m. Neuholland.

Coetsa D. Don Hamilt., Coetsa-S., 4. t. Nepal.

coloratus D. Don., farbige,  $\frac{5}{8}$  t. Nepal.

comosus Sims, schopfige,  $\frac{5}{8}$  t. Nepal.

cordifolius D. Don., herzblättrige,  $\frac{5}{8}$  t. Nepal.

fruticosus L'Her., strauchige,  $\frac{5}{8}$  k. Cap der guten H.

galeatus Vahl., helmige,  $\odot$  f. m. Nepal, Java.

graveolens RB., starkkriechende,  $\frac{5}{8}$  k. t. Neuholland.

incanus Lk., weißgraue, 4. ?

mollis Spgl., weiche,  $\odot$  f. m. Ostindien.

monachorum Spl., Mönchs-S.,  $\odot$  f. m. Ostindien.

parviflorus W., kleinblumige,  $\frac{5}{8}$  w. Südamerika.

punctatus L'Her., punktirte,  $\odot$  m. w. Abyssinien.

rotundifolius Spl., rundblättrige,  $\odot$  m. w. Mascarenas.

scutellarioides RB., schildkrautähnliche,  $\odot$  f. m. Ostindien.

secundus Roxb., einseitige,  $\odot$  m. f. Ostindien.

strobiliferus Roxb., zapfenförmige,  $\odot$  m. f. Ostindien.

ternatus Sims, dreizählige, 4. w. Madagascar.

ternifolius D. Don., dreiblättrige,  $\odot$   $\frac{5}{8}$  t. Nepal.

thymiflorus Spl., thymianblumige,  $\odot$  m. f. Ostindien.

barbatus Andr. (Forskolei W.) v. Coleus barbatus,

moschatus RB. v. Moschosma Brownii.

**Plectritis** DC., Spornling, III. 1., Valerianeae.

congesta DC., gedrängthlummer,  $\odot$  f. Nordamerika.

brachystemon Fisch. et Mey., kurzfadiger,  $\odot$  f. Westliches Nordamerika

**Plectronia** L., Stachelsporn, V. 1., Rhamneae.

corymbosa Burm. (ventosa L.), traubendoldiger,  $\frac{5}{8}$  k.

Cap der guten Hoffnung.



- Pleea** Mchx., *Pleea*, IX. II., Colchicaceae.  
*tenuifolia* Mchx., feinblättrige, 4. k. Carolina.
- Pleopeltis** H, B. K., Schildfarn, XXIV. I., Pteroidae.  
*ensifolia* Carmich., schwertblättriger, 4. w. Cap der guten Hoffnung, ? Südamerika.  
*latifolia* Lodd., breitblättriger, 4. w. Südamerika.  
*nuda* Hook., D. Don, nackter, 4. w. Nepal.
- Pleroma** D. Don, Zellenbeere, X. I., Melastomaceae.  
*glomerata* G. Don, knaulförmige, 5. w. Westindien.  
*granulosa* D. Don, körnige, 5. w. Brasilien.  
*heteromalla* D. Don (*coerulea* \*), blaue, 5. w. Brasil.  
*holosericea* D. Don, sammethaarige, 5. w. Brasilien.  
*viminea* D. Don, ruthenförmige, 5. w. Brasilien.
- Pleurandra** LaBill., Rippenbeutel, XIII. II., Dilleniaceae.  
*acicularis* LaBill., nadelförmiger, 5. t. Neuholland.  
*bracteata* RB., deckblättriger, 5. t. Neuholland.  
*calycina* Cunn., breitkelchiger, 5. t. Neuholland.  
*Cneorum* DC., rosmarinblättriger, 5. t. Neuholland.  
*ericaefolia* DC., heideblättriger, 5. t. Neuholland.  
*stricta* Sieb., steifer, 5. t. Neuholland.
- Pleurospermum** Hoffm., Rippensame, V. II., Umbelliferae.  
*austriacum* Hoffm., österreichischer, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen, Sudeten, Thüringen.  
*Golacka* Rehb. v. *Hladnikia golacensis* Nachtr.
- Pleurothallis** RB., Rippenstendel, XX. I., Orchideae.  
*aphthosa* Lindl., dunkelgelber, 4. w. Mexico.  
*bicarinata* Lindl., zweikieliger, 4. w. Brasilien.  
*ciliata* K. et W., gefranzter, 4. w. Demerara.  
*foliosa* Hook., blattreicher, 4. w. Brasilien.  
*Grobyi* Lindl., Groby's, 4. w. Demerara.  
*Lanceana* Lodd., Lance's, 4. w. Surinam.  
*marginata* Lindl., herandeter, 4. w. Guatemala.  
*muscoidea* Lindl., moosartiger, 4. w. ?  
*occulta* K. et W., verborgenblumiger, 4. w. Brasilien.  
*ophiocephala* Lindl., schlangenköpfiger, 4. w. Mexico.  
*pectinata* Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.  
*picta* Lindl., bemalter, 4. w. Demerara.  
*prolifera* Herb., sprossender, 4. w. Südamerika.  
*racemiflora* Lindl., traubenblumiger, 4. w. Westindien.  
*ruscifolia* RB., mäusedornblättriger, 4. w. Caribäen, Südamerika.  
*saurocephala* Lodd., eidechsenköpfiger, 4. w. Brasilien.  
*stenopetala* G. Lodd., schmalkroniger, 4. w. Brasilien.  
*strupifolia* Lindl., zungenblättriger, 4. w. Brasilien.  
*vittata* Lindl., verschleierter, 4. w. Mexico.  
*coccinea* Hook. v. *Rodriguezia secunda*. *emarginata* Lindl. v. *Physosiphon emarginatus*. *punctata* Lindl. v. *Notylia punctata*.
- Plocama** Ait., *Plocama*, V. I., Rubiaceae.  
*pendula* Ait., überhängende, 5. k. Canarische Inseln.
- Pluchea subdecurrens* Cass. v. *Baccharis adnata*.
- Pluknetia** Plum. (L. Pluknet, alter englischer Botaniker), XXI. x. (XVI. VIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*verrucosa* Sm., warzige, 5. Sch. w. Surinam.  
*volubilis* L., windende, 5. Sch. w. Westindien.
- Plumbago** T., Bleiwurz, V. I., Plantagineae-Plumbagineae.



**Plumbago**

*capensis* Thbg. (*coerulea* Hort.), capische, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *tristis* Ait.

*coerulea* Humb., blaue, 4. w. Peru.

*europaea* L., europäische, 4. f. Südeuropa.

*lapathifolia* W., ampferblättrige, 4. f. b. k. Iberien.

*mexicana* Humb., mexicanische, ⚥. w. Mexico.

*micrantha* Ledeb., kleinblumige, 4. f. Sibirien.

*occidentalis* Scop. (*zeylanica* β. R. et S., *scandens* Hort. non L.), westliche, ⚥. Sch. Westindien.

*rhombifolia* Hook., rautenblättrige, ☉. w. Südamerika.

*rosea* L., rosafarbige, ⚥. w. Ostindien.

*scandens* L., kletternde, ⚥. Sch. w. Neu-Granada.

*zeylanica* L., zeylonische, ⚥. w. Ostindien, Neuholland.

**Plumieria** T. (C. Plumier, alter berühmter französischer Botaniker und Reisender), V. 1., Contortae-Apocynae.

*acuminata* Dryand. (*acutifolia* Poir.), zugespitzte, ⚥. w. Ostindien, China.

*alba* L., weisse, ⚥. w. Westindien.

*bicolor* R. et P., zweifarbige, ⚥. w. Südamerika.

*Blandfordiana* Lodd., Blandford's. ⚥. w. Südamerika.

*conspicua* Hort., ansehnliche, ⚥. w. Südamerika.

*Gouani* D. Don, Gouan's, ⚥. w. Mexico.

*incarnata* R. et P., fleischfarbige, ⚥. w. Peru.

*Lambertiana* Lindl., Lambert's, ⚥. w. Mexico.

*leucantha* Lodd., weißblumige, ⚥. w. Südamerika.

*longifolia* Lam., langblättrige, ⚥. w. Madagascar.

*lutea* R. et P., gelbe, ⚥. w. Peru.

*macrophylla* Lodd., großblättrige, ⚥. w. Peru.

*mexicana* Lodd., mexicanische, ⚥. w. Mexico.

*nivea* Lodd., schneeweiße, ⚥. w. Südamerika.

*Northiana* Lodd., North's, ⚥. w. Südamerika.

*obtusata* L., stumpfblättrige, ⚥. w. Westind., Südamer.

*parvifolia* Haw., kleinblättrige, ⚥. w. Westindien.

*pudica* Jacq., schamhafte, ⚥. w. Südamerika.

*purpurea* R. et P., purpurfarbige, ⚥. w. Peru.

*rubra* L., rothe, ⚥. w. Westindien, Südamerika.

*tenuifolia* Lodd., dünnblättrige, ⚥. w. Südamerika.

*tricolor* R. et P., dreifarbige, ⚥. w. Peru.

*tuberculata* Lodd., höckerige, ⚥. w. St. Domingo.

**Poa** L., Rispengras, III. 11., Gramineae.

*alpina* L., Alpen-R., 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

β) *vivipara*. γ) *brevifolia* Gaud.

*annua* L., jähriges, ☉. ♂. f. Europa.

β) *varia* Gaud. (*supina* Schrad.).

*aspera* Jacq., rauhes, 4. w. Westindien.

*australis* RB., neuholländisches, 4. k. Neuholland.

*brachyphylla* Pursh, kurzblättriges, 4. f. Nordamerika.

*bromoides* Vahl, trespenähnliches, 4. w. Peru.

*bulbosa* L., knolliges, 4. Kn. f. Europa.

β) *vivipara* (*crispa* Thuill.).

*caesia* Sm. (*glauca* Poir.), hechtblaues, 4. f. Schottland, Schweiz, Schlesien etc.

β) *Gaudini* R. et S. (*aspera* Gaud.).

*caespitosa* Forst., rasenartiges, 4. k. Neuzeeland.

*cenisia* All. (*stolonifera* Bell., *distichophylla* Gaud.,

## Poa

*flexuosa* Wahlbg.), Voralpen-R., 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

β) *Halleridis* R. et S. (*pallens* Gaud.).

*collina* Host. (*badensis* Haenk., *brevifolia* et *Koeleri* DC., *thermalis* P., *Molinieri* Balb., *brizoides* Willeb., *cenisia* Auctor.), Hügel-R., 4. f. Mittel- u. Osteuropa.  
*compressa* L., flachhalmiges, 4. f. Europa.

β) *muralis* Wib.

*concinna* Gaud., nettes, 4. f. Südliche Schweiz.

*decipiens* RB., täuschendes, 4. k. Neuholland.

*diandra* RB., zweimänniges, 4. k. Neuholland.

*Drymeja*\* (*Festuca Drymeja* M. et K., *F. exaltata* Presl., *sylvatica* Host, *montana* Auctor.), Eichenwald-R., 4. f. Ost- und Südeuropa.

*fertilis* Host (*palustris* Roth, *serotina* Gaud., Ehrh., *effusa* Kit., *angustifolia* L. spec.), fruchtbares, 4. f. Europa.

*hirsuta* Mchx., rauhhaariges, 4. f. Carolina, Virginien.

*hybrida* Gaud. (*Festuca montana* Stbg.), Bastard-R., 4. f. Deutschland, Schweiz.

*imbecilla* Forst., schwaches, 4. k. Neuzeeland.

*Langeana* Rchb., Lange's, 4. f. Westdeutschland.

*laxa* Haenk. (*flexuosa* Sm.), lockeres, 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

*limbata* Lk., gesäumtes, 4. k. Nepal.

*melicoidea* Lk., perlgrasähnliches, 4. k. ?

*microstachya* Lk., kleinähriges, ☉. f. Monte-Video.

*miliacea* Lk. (*Aira mil.* Vill.), hirseähnliches, 4. f. Italien, Frankreich.

*minor* Gaud., kleines, 4. f. Schweiz, Steyermark, Tyrol.

*nemoralis* L., Hain-R., 4. f. Europa.

β) *firmula* Gaud. (*coarctata* Hall. fil., *variegata* Hort., *dubia* Sut., *Scheuchzeri* Sut., *caespitosa* Poir.). γ) *rigidula* K. (*palustris* DC., *polymorpha* Wib., *serotina* Schrad.). δ) *glauca* K. ε) *montana* Gaud. ζ) *depauperata* Kit.

*nutans* Lk. (*Festuca n.* Spgl.), nickendes, 4. f. Nordamer.

*pratensis* L. (*glabra* Ehrh., *angustifolia* Poll.), Wiesen-R., 4. f. Europa.

β) *latifolia* K. (*subcoerulea* Turn., *depressa* Presl, *humilis* Ehrh.). γ) *angustifolia* L., Sm. δ) *anceps* Gaud.

*pumila* Host, kleines, 4. f. Krain.

*speciosa* R. et S. (*elegans* RB.), prächtiges, 4. k. Neuholl.

*sterilis* MB., unfruchtbares, 4. f. Taurien.

*sudetica* Haenk. (*rubens* Mchx., *sylvatica* Vill., *quadripedalis* Ehrh., *trinervata* DC.), Riesengebirgs-R., 4. f. Europa.

*sylvatica* Poll. (*trinervata* Ehrh., *Festuca sylvatica* Vill., *calamaria* Host.), Wald-R., 4. f. Europa.

*versicolor* Bess., buntfarbiges, 4. f. Podolien, Aleutische Inseln.

*viridis* Mühlbg., grünes, 4. f. Nordamerika.

*agrostidea* DC. vid. *Airopsis* Candollei. *airioides* Koel., *aquatica* L. etc. v. *Glyceria aquatica*, *specabilis* etc. *arundinacea* Lk. (et *semineutra* Trin.) v. *Aira arundinacea* etc. *capillaris* L. (*caroliniana* Spgl. et *chinensis* Lk. E., *ciliaris* L.) etc. v. *Eragrostis capillaris*, *verticillata* etc. *cristata* Murray

## Poa

etc. vid. *Koeleria cristata*. *decumbens* Schrad. vid. *Triodia decumbens*. *disticha* Wulf. vid. *Oreochloa disticha*, *dura* Scop. etc. v. *Sclerochloa dura*. *litoralis* Gouan etc. v. *Dactylis litoralis* etc. *obtusata* Lk. v. *Glyceria pensylvanica*. *pulchella* Stev. vid. *Sclerochloa rigida*. *quinquefida* Pursh v. *Tridens quinquefida*. *sicula* Jacq. v. *Brizopyrum siculum*. *tenax* Lk. vid. *Festuca tenax*. *virgata* Roth vid. *Leptochloa filiformis*.

**Pocockia** Sering. (Richard Pococke, ein englischer Bischof, welcher die Levante bereiste), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*cretica* Sering, kretische, ☉. f. Creta.

**Podalyria** Lam. (Podalirius, Sohn des Aesculapius), Podalirie, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

*biflora* W. (*argentea* Salisb.), zweiblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*Burchellii* DC., Burchell's, ♀. k. t. Cap der gut. H. *buxifolia* W., buchsbaumblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H. *calyptata* W., behaubte, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *cordata* RB., herzblättrige, ♀. k. t. Cap der gut. H. *cuneifolia* Vent., keilblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *glauca* DC., blaugrüne, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *hirsuta* W., rauhhaarige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *liparioides* DC., lipariaähnliche, ♀. k. t. Cap d. g. H. *myrtillifolia* W., heidelbeerblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*oleaefolia* Salisb., ölbaumblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H. *sericea* RB., seidenhaarige, ♀. k. t. Cap der gut. H. *styracifolia* Sims, styraxblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H. *subbiflora* DC., fastzweiblumige, ♀. k. t. Cap d. g. H. *alba* W. etc. v. *Baptisia alba* etc. *alpina* W. (et *lupinoides* W.) vid. *Thermopsis corgonensis* et *lan- ceolata*. *obcordata* Lam. v. *Requienia obcordata*.

**Podanthes** Haw. v. *Stapelia*. *Podanthus Mitiqui* Lindl. v. *Euxenia Mitiqui*.

**Podocarpus** L'Her., Stielfrucht, XXI. x., Coniferae-Taxineae.

*chinensis* Swt., chinesische, ♀. k. t. China. *elongatus* L'Her., verlängerte, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *macrophyllus* Swt., großblättrige, ♀. k. t. China, Japan. *neriifolius* Lamb., oleanderblättrige, ♀. w. Amboina, Nepal. *nucifer* P., nufstragende, ♀. k. t. Japan. *spinulosus* Spgl., feinstachelige, ♀. k. t. Neuholland. *taxifolius* H. B. K., taxusblättrige, ♀. w. Südamerika. *verticillatus* Hort., wirtelblättrige, ♀. t. Japan. *Yacca* G. Don, *Yacca-St.*, ♀. w. Westindien.

*asplenifolius* La Bill. v. *Phyllocladus rhomboidalis*.

**Podolepis** La Bill., Stielschuppe, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

*acuminata* Ait., zugespitzte, ? 4. m. Neusüdwallis. *aristata* Benth., grannige, ? ☉. f. m. Neuholland. *contorta* Lindl., gedrehte, ☉. ? 4. f. m. t. V. Diem. L. *gracilis* Graham, schlanke, ☉. f. m. Neuholland. *rugata* La Bill., gefaltete, ♀. t. Südliches Neuholland.

**Podolobium** RB., Hülsenfufs, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

*coriaceum* DC., lederblättriger, ♀. t. Neuholland.



**Podolobium**

heterophyllum Cunn., verschiedenblättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholl.  
 staurophyllum Sieb. (*Aquifolium* Lodd.), stechhülsen-  
 blättriger,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

scandens DC., kletternder,  $\frac{1}{2}$  Sch. t. Neuholland.

( $\beta$ ) humifusum DC.

trilobatum RB., dreilappiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.

**Podophyllum** L., Entenfufs, XIII. 1., Papaveraceae-Podophylleae.

peltatum L., schildblättriger, 4. f. Nordamerika.

diphyllum L. v. Jeffersonia diphylla.

**Podopterus** H. B. K., Flügelfufs, VI. 1., Portulacaceae-Polygoneae.

mexicanus H. B. K., mexicanischer,  $\frac{1}{2}$  t. k. Mexico.

**Podoria senegalensis** P. v. Boscia senegalensis.**Podosaemum foliosum** Lk., *mexicanum* Lk., *soboliferum*

Lk. vid. Cinna filiformis, mexicana, sobolifera. *glomeratum* Lk. (et *tenuiflorum* Lk.) vid. Mühlenbergia glomerata et Willdenowii. *pungens* Lk. et *virginicum* Lk. v. Sporobolus pungens et virginicus.

**Podosperma angustifolia** LaBill. v. Podotheca angustifol.**Podospermum** DC., Fufssame, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

calcitrapifolium DC. (*resedifolium* DC.), sterndistelblättriger,  $\frac{1}{2}$  4. f. Mittel-, Süd-, West- und Osteuropa, Nordafrika.

canum C. A. Mey., weifsgrauer,  $\frac{1}{2}$  f. Caucasus.

coronopifolium DC. (Dsf.), krähenfufsblättriger,  $\frac{1}{2}$  4. f. b. k. Nordafrika.

intermedium Guss., mittlerer,  $\frac{1}{2}$  f. Ober- und Süditalien, Südfrankreich, Caucasus, Persien.

Jacquini K., Jacquin's, 4. f. Unterösterreich, Mähren.

laciniatum DC. (*octangulare* Lk.), schlitzblättriger,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.

( $\beta$ ) muricatum DC.

pumilum DC. (Cav.), kleiner,  $\odot$  f. Spanien.

Tenorii DC., Tenore's,  $\frac{1}{2}$  4. f. Calabrien.

**Podostigma** Ell., Stielsäulchen, V. 11., Asclepiadeae.

pubescens Ell., weichhaariges, 4. k. Carolina.

**Podotheca** Cass., Podotheca, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

angustifolia Cass., schmalblättrige,  $\odot$  f. m. Südliches Neuholland.

**Pogonia** RB., Bartorche, XX. 1., Orchideae.

divaricata RB., ausgesperrte, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

ophioglossoides Ker., natterzungenähnliche, 4. Kn. k. Nordamerika.

pendula Spgl., überhängende, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

**Pogonia debilis** Andr., *glabra* Andr. v. Myoporum debile et ellipticum.**Pogostemon** Dsf., Haarfaden, XIV. 1., Labiatae.

plectranthoides Dsf., spornblumenähnlicher,  $\frac{1}{2}$  k. ?

**Poinciana** L. (M. de Poinci, Gouverneur der Antillen), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

elata L., hohe,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

Gilliesii Hook., Gillies's,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.

insignis H. B. K., ausgezeichnete,  $\frac{1}{2}$  w. ?

pulcherrima L., schönste,  $\frac{1}{2}$  w. Ost- und Westindien.

regia Boj., königliche,  $\frac{1}{2}$  w. Madagascar.

tarra R. et P. v. Coulteria tinctoria.

- Poinsettia** Grah. (M. Poinsette, welcher Mexico bereiste), ? XI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*pulcherrima* Grah., schönste, ♀. t. w. Mexico.  
 β) *albida* Hensl.
- Poiretia** Vent. (J. L. M. Poiret, französischer Botaniker und Reisender), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*scandens* Vent. (*punctata* Vent.), klimmende, ♀. Sch. w. Westindien.
- Poiretia elliptica** Sm., *linearis* Sm. vid. *Hovea elliptica* et *linearis*.
- Poitea** Vent. (Poiteau, französischer Botaniker und Reisender). XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*galegiformis* Spgl. (*galegioides* Vent.), galegaähnliche, 4. ♀. w. Hispaniola.
- Poivreia** Commers. (N. Poivre, Gouverneur der Insel Mauritius), X. I., Onagrariae-Combretaceae.  
*Afzelii* (G. Don), Afzelius's, ♀. Sch. w. Sierra Leone.  
*barbata* (G. Don), bärtige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*coccinea* DC., scharlachfarbige, ♀. Sch. w. Madagascar.  
*comosa* (G. Don), schopfige, ♀. Sch. w. Sierra Leone.  
*decandra* (Roxb.), zehnmännige, ♀. Sch. w. Ostindien.  
*intermedia* (G. Don), mittlere, ♀. Sch. w. Sierra Leone.
- Polanisia** Rafin., Polanisia, XI. I., Capparideae.  
*Chelidonii* DC., schöllkrautähnliche, ♂. m. f. Ostindien.  
*dodecandra* DC., zwölfmännige, 4. m. f. Ostindien.  
*graveolens* Rafin., starkriechende, 4. f. Canada.  
*uniglandulosa* DC., eindrüsige, 4. f. Mexico.  
*viscosa* DC., schmierige, 4. m. f. Ostindien.  
 β) *icosandra* DC.
- Polemonium** T., Sperrkraut, V. I., Polemoniaceae.  
*bursifolium* W., täschelkrautblättriges, 4. f. b. Mexico.  
*coeruleum* L., gemeines, 4. f. Europa, Nordasien.  
 b) *album*. c) *maculatum*. d) *variegatum*.  
 β) *gracile* W.  
*dissectum* Rchb., schlitzblättriges, 4. f. ? Sibirien.  
 b) *album*.  
*humile* Pall., niedriges, 4. f. Sibirien.  
*lacteum* Lehm., milchweißes, 4. f. ?  
*mexicanum* Cerv., mexicanisches, 4. f. b. Mexico.  
*moschatum* Wormsk., moschusduftendes, 4. f. Nordamer.  
*pulcherrimum* Hook., schönstes, 4. f. Nordamerika.  
*reptans* L., kriechendes, 4. f. Nordamerika.  
 b) *majus* J. C.
- Richardsonii* Grah., Richardson's, 4. f. Nordamerika.  
*sibiricum* Don, sibirisches, 4. f. Sibirien.  
*villosum* Rudolp., zottiges, 4. f. Sibirien.
- Polianthes** L., Tuberose, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*gracilis* Lk., schlanke, 4. Zw. t. Brasilien.  
*tuberosa* L., gemeine, 4. Zw. t. Mexico.
- Pollichia** Soland (J. A. Pollich, deutscher Botaniker), I. I., Portulacae-Paronychieae.  
*campestris* Ait., Feld-P., ♂. k. Cap der guten Hoffn.
- Pollichia Galeobdolon** Schr. v. *Galeobdolon luteum*.
- Pollinia** Spgl. (C. Pollini, Professor der Botanik zu Verona), III. II. (XXIII. I.), Gramineae.  
*distachya* Spgl., zweijährige, 4. f. Südeuropa.  
*striata* Spgl., gestreifte, 4. w. Malabar, Neuholland.  
*undata* Spgl., wellenblättrige, 4. w. Mascarenas.  
*Gryllus* Spgl. v. *Chrysopogon Gryllus*.

**Polyactidium** DC., Vielkraut, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*delphinifolium* DC., ritterspornblättriges, ♂. k. t. Südamer.

**Polybotrya** H. B. K., Vieltraubenfarn, XXIV. I., Pterioideae.

*acuminata* Lk. et Otto, zugespitzter, 4. w. ? Westind.

*cervina* Kaulf., geweihähnlicher, 4. w. Westindien.

*Raddiana* Kaulf., Raddi's, 4. w. Brasilien.

*vivipara* H. B. K., lebendiggebärender, 4. w. Ostind.

**Polycarpaea** Lam., Vielsamler, V. I., Portulacae-Paronychieae.

*alsinefolia* (Bivon.), mierenähnlicher, ☉. f. Sicilien.

*aristata* (Ait.), granniger, ☿. k. Canarische Inseln.

*Bivoniana* \* (*Mollia Polycarpon* Spgl., *Hagaea polycarpoides* Bivon.), Bivone's, 4. k. Sicilien.

*fragilis* Delil., spröder, ☉. f. Aegypten.

*indica* Lam. (*Mollia corymbosa* W.), indischer, ☿. w. Ceylon.

*latifolia* (W.), breitblättriger, ☿. k. Canarische Inseln.

*memphitica* Delil. (*Mollia gnaphalodes* W.), ägyptischer, ☿. k. Nordafrika.

*minuartioides* (R. et S.), minuartiaähnlicher, ☉. f. Span. *stellata* (W.), (et *Lahaya tenuifolia* R. et S.), sternförmiger, ☿. w. Guinea.

*Teneriffae* Lam. (*Mollia diffusa* W.), weitschweifiger, 4. f. Teneriffa.

**Polycarpon** Loeffl., Wirtelkraut, III. III., Portulacae-Paronychieae.

*tetraphyllum* L., vierblättriges, ☉. f. Europa, Nordamerika, Südafrika.

β) *diphyllum* Cav.

*Polychaetia* Tausch. v. Tolpis.

**Polycnemum** L., Knorpelkraut, III. I., Aizoideae-Amarantheae.

*arvense* L. (*inundatum* Schrk. et *pumilum* Hoppe), Acker-K., ☉. f. Europa.

β) *recurvum* Lois.

*brachiatum* Pall. (*oppositifolium* R. et S.), arnförmiges, ☉. f. Südrussland.

*malacophyllum* MB., weichblättriges, ☉. f. Caucasus.

*sclerospermum* Pall., hartsamiges, ☉. f. Taurien, Mittelasien.

*sibiricum* Pall., sibirisches, ☉. f. Sibirien.

**Polygala** T., Kreuzblume, XVII. II., Polygalaceae.

*alpestris* Rchb. (*Vaillantii* Bess., *hybrida* DC.), Vor-alpen-K., 4. ☿. f. Schweiz, Frankreich, Volhynien.

*amara* L. (*Amarella* Crtz), bittere, 4. ☿. f. Schweden, Mittel- und Ostdeutschland, Norditalien.

β) *amblyptera* Rchb. (*buxifolia* Rchb., *thuringiaca* Spgl.).

*ambigua* Nutt., zweifelhafte, ☉. f. Nordamerika.

*borboniaefolia* Burch. (*oppositaefolia* Bot. mag.), borbonienblättrige, ☿. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*bracteolata* L., deckblättrige, ☿. k. t. Cap d. gut. H.

*brevifolia* Nutt., kurzblättrige, ☉. f. Nordamerika.

*Burmanni* DC. (*microlopha* Burch.), Burmann's, ☿. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*Chamaebuxus* L., buchsbaumblättrige, ☿. f. Mittel- und Süddeutschland.

*comosa* Schk., schopfige, 4. f. Deutschland.

*cordifolia* Thbg., herzblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.



## Polygala

cruciata L., kreuzblättrige, ☉. f. Nordamerika.  
depressa Wender. (*serpyllacea* Weih.), quendelähnliche,  
4. ♀. f. Deutschland.

fastigiata Nutt., gipfelständige, ☉. f. Nordamerika.

flavescens DC., gelbliche, 4. ♀. f. b. k. Italien.

Garcini DC., Garcin's, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

genistoides Poir., ginsterähnliche, ♀. k. t. C. d. g. H.

graminifolia Poir., grasblättrige, 4. f. b. k. Carolina.

grandiflora Lodd., großblumige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

Hohenackeri Fisch. et Mey., Hohenacker's, 4. f. Süd-  
russland.

incarnata L., fleischfarbige, ☉. f. Nordamerika.

intermedia DC., mittlere, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

lanceolata Lodd., lanzettblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.

latifolia Ker, breitblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

ligularis Ker (*tenuifolia* Lk.), bandförmige, ♀. k. t. Cap  
der guten Hoffnung.

?liliifolia Mack. C., lilienblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.

lutea L., gelbe, ☉. f. Nordamerika.

major Jacq., große, 4. ♀. f. Süd- und Osteuropa.

monspeliaca L., südfranzösische, ♂. 4. f. b. k. Süd-  
und Westeuropa.

myrtifolia L., myrtenblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

nana DC. (*viridescens* Nutt.), zwergige, ☉. f. Nordamer.

nicaeensis Riss, Nizzaer, 4. ♀. f. b. Oberitalien.

Nummularia Burch., rundblättrige, ♀. k. t. Cap  
der guten Hoffnung.

oppositifolia L., gegenblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

β) major Lindl.

paniculata L., rispige, ☉. w. Westindien, Westafrika.

paucifolia W., wenigblättrige, 4. f. b. Nordamerika.

purpurea Nutt. (*sanguinea* Mchx.), purpurfarbige, ☉. f.  
Nordamerika.

rubella W. Pursh (*polygama* Walt.), röthliche, 4. f. b.  
Nordamerika.

sanguinea L. (*viridescens* Poir.), blutrothe, ☉. f. Nordamer.

Senega L., maryländische, 4. f. b. k. Nordamerika.

simplex Burch., einfache, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

speciosa Sims, prächtige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

teretifolia L. (*pinifolia* Lam.), rundblättrige, ♀. k. t.  
Cap der guten Hoffnung.

tetragona Burch., vierseitige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

thesioides W. (*gracilis* et *longifolia* Lodd.), thesium-  
ähnliche, ♀. t. Chili, Brasilien.

uliginosa Rchb. (*austriaca* Crtz), Sumpf-K., 4. ♀. f.  
Mittel- und Osteuropa.

umbellata Thbg., doldige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

verticillata L., wirtelblättrige, 4. f. Nordamerika.

virgata Thbg., ruthenförmige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

vulgaris L., gemeine, 4. ♀. f. Europa.

β) oxyptera Rchb. (*multicaulis* Tausch, *monspe-*  
*liaca* Auct.). γ) alpestris K. (*densiflora* Tausch.).

*alopecuroides* L. etc. v. *Muraltia alopecuroides* etc.,

*spinosa* L. v. *Mundia spinosa*.

## Polygonatum T., Weiswurz, VI. I., Sarmetaceae (*Asparagineae*).

angustifolium Pursh., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

canaliculatum Pursh., rinnenförmige, 4. f. Nordamerika.

hirtum (Lam.), kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.

**Polygonatum**

- latifolium Dsf., breitblättrige, 4. f. Osteuropa.  
 leptophyllum D. Don, schlankblättrige, 4. k. Nepal.  
 macrophyllum Swt. (*latifolium* Pursh.), großblättrige,  
 4. f. Nordamerika.  
 multiflorum Mch., vielblumige, 4. f. Europa.

β) bracteatum (Thom.)

- oppositifolium D. Don, gegenblättrige, 4. k. Nepal.  
 polyanthemum (MB.), häufigblumige, 4. f. Caucasus.  
 pubescens Push., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.  
 verticillatum Mch., wirtelblättrige, 4. Europa.  
 vulgare Dsf. (*anceps* Mch.), gemeine, 4. f. Europa.

b) flore pleno, c) minor.

**Polygonum** T., Knöterig, VIII. III., Portulacaceae-Polygonaceae.

- acetosum MB., saurer, ☉. 4. Sch. f. Krim.  
 acidulum W., säuerlicher, 4. f. Sibirien.  
 acutatum Lehm., zugespitzter, 4. f. ?  
 adpressum RB., angedrückter, ♀. Sch. k. Neuholland.  
 alpinum All., Alpen-K., 4. f. Schweiz, Italien.  
 amphibium L., Wasser-K., 4. Wa. f. Europa, Asien.

β) terestre (*hirsutum*), γ) maritimum Dethar.

- amplexicaule D. Don, stengelumfassender, 4. k. t. Nepal.  
 arenarium Wk., Sand-K., ☉. f. Ungarn.  
 arifolium L., zehrwurzblättriger, ☉. Sch. f. Nordamerika.  
 articulatum L., gegliederter, ☉. f. Nordamerika.  
 australe Spgl. ? P. (*glandulosum* RB.), neuholländischer,  
 ♂. k. Neuholland.

- aviculare L., Vogel-K., ☉. f. Europa, Asien, Nordam.

β) erectum Roth.

- barbatum L., bärtiger, 4. f. b. k. China, Japan.  
 Bellardi All., (*patulum* MB., *geniculatum* Poir.), Bellardi,  
 ☉. f. Italien, österreichisches Litorale, Taurien.  
 Bistorta L., Wiesen-K. (Natterwurz), 4. f. Europa,  
 Mittelasien, Nordamerika.

β) longifolium Fisch. et Mey., Dahurien, γ) nitens

- Fisch. et Mey., Altai, δ) bistortoides Pursh, Nordam.  
 chinense L., chinesischer, ☉. Sch. f. China.  
 cilinode Mchx., franzenknotiger, ☉. Sch. f. Canada.  
 coccineum Mühlbg., scharlachfarbiger, 4. Wa. f. Nordam.  
 Convolvulus L., windender, ☉. Sch. f. Europa, Asien,  
 Nordamerika.

- cymosum Trevir, afterdoldiger, ☉. f. Nepal.  
 decipiens RB., täuschender, 4. k. Neuholland.  
 diffusum Pall., weitschweifiger, 4. f. Sibirien.  
 divaricatum L., ausgesperrter, 4. f. Sibirien.  
 Donianum, Spgl. (*affine* D. Don), Don's, 4. k. Nepal.  
 Dryandri Spgl. (*elegans* Dryand), Dryander's, ☉. f.  
 Ostindien.

- elegans Ten., zierlicher, 4. ♀. f. b. k. Neapel.  
 ellipticum W., elliptischer, 4. f. Sibirien.  
 emarginatum Roth., ausgerandeter, ☉. f. China.  
 equisetiforme Sm., schachtelhalmähnlicher, ♀. k. Aegypten,  
 Griechenland, Süditalien.

- erectum L., aufrechter, ☉. f. Nordamerika.  
 Fagopyrum L., Buchweizen-K. (Heidekorn), ☉. f. Japan,  
 Sibirien.  
 floribundum Schltdl., blüthenreicher, ☉. f. Sibirien.  
 glabrum Roxb. W., kahler, ☉. f. m. Ostindien.  
 glaucum Nutt., blaugrüner, 4. f. Nordamerika.

**Polygonum**

- gracile RB., schlanker, 4. k. Neuholland.  
 herniarioides Delil., bruchkrautähnlicher, 4. k. Aegypten.  
 hirsutum Walt., rauhhhaariger, ①. f. Südcarolina.  
 Hydropiper L., scharfer, ①. f. Europa.  
 injucundum, Bot. reg., unlieblicher, 4. k. t. Valparaiso.  
 lapathifolium L. (*pensylvanicum* Curt.), ampferblättriger,  
 ①. f. Europa.

β) *incanum* Schm., (*tomentosum* Schrk.)

- Laxmanni Lep. (*davuricum* W.), Laxmann's, 4. f. Dahurien.  
 litorale Lk. (*flagellare* Bertol.), Ufer-K., 4. 4. f. b. k. Südeuropa.

- macrophyllum D. Don, großblättriger, 4. f. b. k. Nepal.  
 maritimum L., Seestrand-K., 4. f. b. k. Südeuropa.  
 minus Huds. (*pusillum* Lam., *strictum* All., *angustifolium* Roth.), kleiner, ①. f. Europa.

- mite Schrk. (*laxiflorum* Weih., *dubium* Stein, *Braunii*, Blff. et Fing.), gelinder, ①. f. Deutschland etc.

- niloticum Leh., ägyptischer, 4. Wa. k. Nordafrika.

- nodosum P., dickknotiger, ①. f. Europa.

- ocreatum L., grofstütiger, 4. f. Sibirien.

- orientale L., morgenländischer, ①. f. Mittelasien, Nordamerika, Neuholland.

b) *album*.

- oxyspermum Ledeb., sauersamiger, 4. f. Rußland.

- patens D. Don, abstehender, 4. f. b. k. Nepal.

- pensylvanicum L., pensylvanischer, ①. f. Nordamerika.

- Persicaria L., Flöhkraut-K., ①. f. Europa, Asien, Nordam.

- persicarioides H. B. K., flöhkrautähnlicher, ①. f. Mexico.

- petiolatum D. Don, langstieliger, 4. f. b. k. Nepal.

- plebejum RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neuh.

- ramosissimum Mchx., ästiger, ①. f. Nordamerika.

- sagittatum L., pfeilblättriger, ①. Sch. f. Nordamerika.

- salignum W., weidenblättriger, 4. f. Sibirien.

- salsugineum MB., Salz-K., 4. Wa. f. Südrußland.

- scandens L., klimmender, 4. Sch. f. Nordamerika.

- senegalense Mill., senegal'scher, ①. Wa. f. Guinea.

- sericeum Pall., seidenhaariger, 4. f. Sibirien.

- setosum Jacq., borstiger, 4. 4. f. b. k. Kleinasien.

- tataricum L., tatarischer, ①. f. Tatarei.

- tinctorium Lour. Ait., färbender, ♂. k. Südchina.

- undulatum Murr. (*acidum* Pall.), wellenblättriger, 4. f. Sibirien.

- virginianum L., virginischer, 4. f. Nordamerika.

- viviparum L., lebendiggebärender, 4. Europäische Alpen, Mittelasien.

*caucasicum* Hoffm., (*crispulum* Sims.) *frutescens* L.

et *polygamum* Vent. v. *Tragopyrum buxifolium lanceolatum et polygamum*.

**Polymnia L., Polymnie, XIX. iv., Compositae - Corymbiferae.**

- aspera Mart., rauhe, 4. k. Mexico.

- canadensis L., canadische, 4. f. Canada.

- maculata Cav., gefleckte, 4. k. Mexico.

- Uvedalia L., carolinische, 4. f. b. k. Nordamerika.

*abyssinica* L. v. *Guizotia oleifera*.

**Polypodium T., Tüpfelfarn, XXIV. I., Pterioideae. (Polypodiaceae).**

- alpestre Hoppe (*rhaeticum* DC., *molle* All.), Voralpen-T., 4. f. Salzburg, Dauphiné, Oberitalien.



## Polypodium

- angustifolium Sw., schmalblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.
- areolatum H. B. K., maschenartiger, 4. w. Neugranada.
- asplenifolium L., strichfarnähnlicher, 4. w. Westindien, Mascarenas.
- attenuatum W., verschmälerter, 4. w. Caribäen.
- aureum L., goldfarbiger, 4. w. Westindien.
- auriculatum Presl., geöhrt, 4. w. Brasilien.
- Billardieri RB. (*scandens* Labill.), La-Billardière's, 4. w. Van-Diemens-Land.
- Brownianum Spgl. (*attenuatum* RB.), Brown's, 4. w. Neuholland.
- calcareum Sm. (*Dryopteris* Bolt.), kalkliebender, 4. f. England, Mittel- und Südeuropa, Canada.
- Catharinae Fisch., Catharinen-T., 4. w. Insel Catharina bei Brasilien.
- ciliatum W., gefranzter, 4. w. Südamerika.
- connectile Michx., verbundener, 4. f. Canada.
- crassifolium L., dickblättriger, 4. w. Westindien.
- crenatum Sw., gekerbter, 4. w. Westindien.
- curvatum Sw., gekrümmter, 4. w. Jamaika.
- decumanum W., großer, 4. w. Brasilien.
- deflexum Kaulf., herabgebogener, 4. w. Brasilien.
- dissimile L., ungleicher, 4. w. Jamaika.
- drepanum J. Bevis, sichelförmiger, 4. t. w. Madeira.
- Dryopteris L., Eichenwald-T., 4. f. Europa, Nordasien.
- effusum Sw., weitausgebreiteter, 4. w. Westindien.
- fraxinifolium Jacq., eschenblättriger, 4. w. Neugranada.
- hastatum Thbg., spontonförmiger, 4. w. Japan.
- heterophyllum L., verschiedenblättriger, 4. w. Westind.
- hexagonopterum Mchx., sechseitiger, 4. f. b. k. Nordam.
- jamaicense Desv., jamaikaischer, 4. w. Jamaika.
- incanum Sw., weißgrauer, 4. w. Westindien.
- incisum Sw., eingeschnittener, 4. w. Westindien.
- irioides Poir., irisblättriger, 4. w. Mascarenas, Neuholl.
- juglandifolium Humb., wallnußblättriger, 4. w. Neugran.
- lanceolatum L., lanzettblättriger, 4. w. Westindien, Neugranada.
- latipes Fisch., breitstieliger, 4. w. Brasilien.
- lycopodioides L., bärlappähnlicher, 4. w. Westindien.
- nitidum Kaulf., glänzender, 4. w. Südamerika.
- olivaceum J. Bev., olivengrüner, 4. w. Südamerika.
- Otites L., tiefspaltiger, 4. w. Westindien.
- ovariense, Desv., owarischer, 4. w. Guinea.
- Paradiseae Fisch., paradisischer, 4. w. Brasilien.
- pectinatum L., kammförmiger, 4. w. Westindien.
- Phegopteris L., Buchenwald-T., 4. f. Europa.
- Phyllitidis L., Hirschzungen-T., 4. w. Westindien.
- phymatodes L., ceylonischer, 4. w. Ostindien.
- piloselloides L., mausöhrchenblättriger, 4. w. Westind.
- plantagineum Jacq. (*latifolium* Vahl), wegrittähnlicher, 4. w. Caribäen.
- Plumula H. B. K., federähnlicher, 4. w. Südamerika.
- polyanthum H. Liv., vielhäufiger, 4. w. Brasilien.
- Preslianum Spgl. (*longifolium* Presl.), Presl's, 4. w. Brasil.
- proliferum Kaulf. (*viviparum* J. Bevis), sprossender, 4. w. Brasilien.
- pustulatum Forst., blätteriger, 4. w. t. Neuseeland.
- quercifolium L., eichenblättriger, 4. w. Ostindien.

**Polypodium**

- repandum Sw., randschweifiger, 4. w. Jamaika.  
 repens L., kriechender, 4. w. Westindien.  
 salicifolium W., weidenblättriger, Neugranada, Brasil.  
 Schkuhrii Raddi, Schkuhr's, 4. w. Brasilien.  
 scolopendrioides L., hirschezungenähnlicher, 4. w. Westind.  
 serpens L., schlangenähnlicher, 4. w. Westindien.  
 simile L., gleichförmiger, 4. w. Jamaika.  
 stigmosum Sw., brandfarbiger, 4. w. Java.  
 taeniosum H.B.K., bandwurmförmiger, 4. w. Neugran.  
 tenellum Forst., zarter, 4. w. Neuholland.  
 tetragonum Sw., vierseitiger, 4. w. Westindien.  
 trichomanoides Sw., trichomanesähnlicher, 4. w. Westindien, Neugranada.  
 trifurcatum L., dreigabeliger, 4. w. Martinique.  
 tuberosum J. Bevis, knolliger, 4. kn. w. Westindien.  
 vacciniifolium Fisch., heidelbeerblättriger, 4. w. Brasil.  
 virginianum L., virginischer, 4. k. w. Virginien, Westind.  
 vulgare L., gemeiner (Engelsüfs) 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) cambricum L.

Noch findet man Nachstehende in den Gartenverzeichnissen: caespitosum concinnum, harpeodes, sporodocarpum.

adnascens Sw. etc. v. Nipholobolus adnascens etc. Filix foemina L. etc. v. Asplenium Filix foem. etc. Filix mas. etc. v. Aspidium Filix mas. etc. Grammitidis RB. v. Xiphopteris serrulata. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: Allantodia, Cheilanthes, Gynnogramma et Meniscium.

**Polypogon** Dsf., Vielbartgras, III. II., Gramineae.

litoralis Sm., Ufer-V., 4. f. England, Norddeutschland, Spanien.

maritimus W. (tataricus Fisch.), Seestrands-V., 4. f. Westfrankreich, Sibirien, Ostindien.

monspeliensis Dsf., südliches, 4. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika, Orient, Montevideo.

strictus N. E., steifes, 4. f. Cap der guten Hoffnung.

fasciculatus P. (subspicatus W.) v. Chaeturus fasciculatus, glomeratus W. v. Muehlenbergia glomerata.

**Polypteris** Nutt., Vielspreublättchen, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

integrifolia Nutt., ganzblättriges, 4. f. Nordamerika.

**Polyspora** Swt., Fächersame, XVI. VIII., Evonyneae-Camellaceae.

axillaris Swt., achselblumiger, 4. w. Ostindien.

**Polystachya** Hook., Vielährenstendel, XX. I., Orchideae.

grandiflora Lindl., großblumiger, 4. w. Sierra Leone.

luteola Hook., gelblicher, 4. w. Westindien, ? Ostind.

puberula Lindl., feinhaariger, 4. w. Sierra Leone.

ramulosa Lindl., ästige, 4. w. Sierra Leone.

zeylanica Lindl. (*Dendrobium polystachyum* Thouars), zeylonischer, 4. w. Ceylon, Madagascar.

**Pomaderris** La Bill (*Pomatoderris* Hffmng.), V. I., Wersenstrauch.

androsaemifolia Cunn., androsaemunblättriger, 4. k. Neusüdwalis.

apetala La Bill., kronenloser, 4. k. Neuholland.

betulina Cunn., birkenähnlicher, 4. k. Neusüdwallis.

capsularis G. Don, kapseltragender, 4. k. Südseeinseln.

**Pomaderris**

discolor Vent., (*acuminata* Lk.), verschiedenfarbiger, ♂. k. Neuholland.

elliptica La Bill., elliptischer, ♂. k. Neuholland.

globulosa G. Don, kugelförmiger, ♂. k. Neuholland.

intermedia Sbr., mittlerer, ♂. k. Neuholland.

lanigera Sims, wolliger, ♂. k. Neuholland.

ledifolia Cunn., porstblättriger, ♂. k. Neuholland.

phillyreoides Sieb., steinlindenähnlicher, ♂. k. Neuholl.

phylicaeifolia, Lodd., phylakablättriger, ♂. k. Neuholl.

spathulata G. Don, spathelförmiger, ♂. k. Neuholland.

Wendlandiana Swt., Wendland's, ♂. k. Neuholland.

**Pombalia** Vand. (Marquis v. Pombal, berühmter portugiesischer Minister), V. 1., Violaceae.

Ipecacuanha Vand., Brechwurzel-P., ♂. w. Brasilien.

Ituba Ging., brasilianische, 4. w. Brasilien.

**Ponczetia** RB. (M. Ponczet, französischer Botaniker), V. 1., Epacrideae.

sprengelioides RB., sprengeliaähnliche, ♂. t. Neuholl.

**Ponera** Lindl., Ponera, XX. 1., Orchideae.

graminifolia Lindl., grasblättrige, 4. w. Südamerika.

juncifolia Lindl., simsenblättrige, 4. w. Südamerika.

**Pongamia** Lam. (indianischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

glabra Vent. P., kahle, ♂. w. Ostindien.

grandiflora Vent., großblumige, ♂. w. Ostindien.

Piscidia Roxb., piscidiaähnliche, ♂. w. Ostindien.

sericea Vent., seidenhaarige, ♂. w. Java.

uliginosa DC., sumpfliebende, ♂. w. Westindien.

**Pontederia** L. (Julius Ponteder, Professor der Botanik zu Padua), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (?Commelinaceae).

angustifolia Pursh., schmalblättrige, 4. Wa. f. b. k. Nordam.

azurea Sw., azurblaue, 4. Wa. w. Jamaika.

coerulea Maund, blaue, 4. Wa. f. k. Nordamerika.

cordata L., herzblättrige, 4. Wa. k. Virginien.

crassipes Mart., dickstielige, 4. Wa. w. Brasilien.

dilatata Buchan., verbreiterte, 4. Wa. w. Ostindien.

lanceolata Nutt. (*lancifolia* Mühlbg. Ell.), lanzettblättrige, Wa. k. Georgien, Carolina.

**Ponthieuia** RB. (von Ponthieu, welcher an Baronet Banks Pflanzen sendete), XX. 1., Orchideae.

glandulosa RB. drüsige, 4. w. Westindien.

petiolata Lindl., langstielige, 4. w. Caribäen.

**Populus** T., Pappel, XXII. VII. (VIII. 1.), Amentaceae.

alba L., (*major* Mill., *nivea* W.) weiß, ♂. f. Europa, Asien.

angulata Ait., (*heterophylla* du Roi, *macrophylla* Lodd.

*angulosa* Mchx., *balsamifera* Mill.), kantenästige, ♂. f. Virginien, Florida.

b) nova Audib., c) Medusae Booth.

balsamifera L. (*Tacamahaca* Mill.), Balsam-P., ♂. f. Nordamerika, Sibirien.

b) viminalis Lodd. (*salicifolia* Hort., *longifolia*

Fischer), c) latifolia Hort., d) intermedia Hort.,

e) suaveolens Fisch., f) variegat. Mill.

betulifolia Pursh, (*nigra* et *hudsonica* Mchx., *hudsoniana* Bosc.), birkenblättrige, ♂. f. Canada.

candicans Ait. (*macrophylla* Lindl., *latifolia* Mch., *ontariensis* Dsf., *cordata* Lodd., *canadensis* Mch.), weißliche, ♂. f. Nordamerika.



**Populus**

*canescens* Sm., (*alba* Mill.), weißgrau, ♀. f. Europa, Asien.  
 b) *hybrida* MB. (*intermedia* Mertens, *grisea* Lodd.),  
 c) *acerifolia* Lodd. (*quercifolia* et *palmata* Hort.),  
 d) *aremburgica* Lodd., e) *candicans* Lodd., f)  
*aegyptiaca* Hort. (*pallida* Hort.), g) *pendula*, i)  
*belgica* Lodd.

*dilatata* Ait. (*fastigiata* Dsf., *italica* du Roi, *pyramidata*  
 Mch., *pannonica* Jacq.), italienische, 4. f. Italien.

*graeca* Ait., griechische, ♀. f. Griechenland.

*grandidentata* Mchx., grofszähnige, ♀. f. Canada.

β) *pendula* Mchx.

*heterophylla* L. (*cordifolia* Burgsd., *argentea* Mchx.),  
 verschiedenblättrige, ♀. f. Nordamerika.

*laevigata* Ait. (*canadensis* Mchx., *monilifera* H. Par.),  
 glattblättrige, ♀. f. Nordamerika.

*marylandica* Bosc., maryländische, ♀. f. Maryland.

*monilifera* Ait. (*carolinensis* Mch., *canadensis* Burgsd.,  
*glandulosa* Mch., ? *acladesca* Lindl.), canadische, ♀.  
 f. Nordamerika.

b) *Lindleyana* Booth., c) *fol. variegat.* Hort.

*nigra* L., schwarze, f. Europa.

b) *viridis* Lodd., c) *salicifolia* Lodd.

*tremula* L., Zitter-P., ♀. f. Europa.

a) *monticola* Mertens, b) *parvifolia* Mertens, c)

c) *rotundifolia major* Mertens, d) *grandifolia*

Mert., e) *minor* Mert., f) *oxyodonta* Mert., g) *stricta*

Mertens, h) *pendula* Lodd., i) *supina* Lodd.

*trepida* Mühlenb. (*tremuloides* Mchx.), langstielige, ♀.  
 f. Nordamerika.

**Porana** Burm., *Porana*, V. I., Convolvulaceae.

*volubilis* Burm., windende, ♀. Sch. w. Ostindien.

*paniculata* Roxb. et *racemosa* Jacq. fil. v. *Dinetus*  
*paniculata* etc.

**Poranthera** Rudg., Porenbeutel, V. III., Corniculatae-  
 Cunoniaceae.

*ericaefolia* Rudg., heideblättriger, ♀. t. k. Neuholland.

*Porcelia grandiflora* P. etc. v. *Asimina grandiflora* etc.

**Porliera** R. et P. (P. A. Porlier, ein Spanier, Beför-  
 derer der Pflanzenkunde), VIII. I., Zygophylleae.

*hygrometrica* R. et P., hygrometrische, ♀. w. Peru, Chili.

*Porophyllum decumbens* DC. *ellipticum* Cass. et *linifolium*  
 DC. v. *Kleinia decumbens*, *Porophyllum* et *suffruticosa*.

*Pörtenschlagia australis* Tratt. v. *Elaeodendron australe*.

**Portlandia** L. (Herzogin von Portland, eine grofse  
 Gönnerin der Botanik), V. I., Rubiaceae.

*coccinea* Sw., scharlachfarbige, ♀. w. Jamaika.

*grandiflora* L., grofsblumige, ♀. w. Jamaika.

*hexandra* L. Jacq. v. *Coutarea speciosa*.

**Portulaca** T., Portulack, XI. I., Portulacaceae.

*foliosa* Lindl., blattreicher, ☉. f. m. Guinea.

*Gilliesii* Hook., Gillies's 4. ♀. t. k. Chili.

*grandiflora* Hook., grofsblumiger, 4. Kn. t. k. Chili.

β) *lutea* Ait.

*guineensis* Lindl., guineischer, ☉. f. m. Guinea.

*halimoides* L., meldenähnlicher, ☉. f. m. Jamaika.

*involucrata* Haw., hüßblumiger, ☉. f. ?

*meridiana* L., mittagsblühender, ☉. m. f. Ostindien.

*mucronata* H. Vidob. Lk., weichspitziger, ☉. m. f. ?

## Portulaca

oleracea L. (*olerac. a sylvestris* DC.), gemeiner, ☉. f.

Mittel- und Südeuropa, Südamerika.

parvifolia Haw., kleinblättriger, ☉. m. f. Jamaika.

pilosa L., haariger, ☉. m. f. Südamerika.

pusilla H. B. K., niedrigster, ☉. m. f. Südamerika.

quadrifida L., vierspaltiger, ☉. m. f. Aegypten.

sativa Haw., (*latifolia* Hornem., *oleracea* β. *sativa* DC.), gebauter, ☉. f. Südamerika, Mittel- u. Südeuropa.

*crassifolia* Jacq., *cuneifolia* Vahl, *fruticosa* L. (*paniculata* L.), *racemosa* L. etc. v. *Talinum* *crassifol.* *cuneifol.* *fruticosum*, *triangulare* etc.

## Portulacaria Jacq., Portulackstrauch, V. III., Portulacaceae.

afra Jacq., afrikanischer, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

## Posoqueria Aubl. (guianischer Name), V. I., Rubiaceae.

gracilis R. et S., schlanke, ♂. w. Guiana.

longiflora Aubl., langblumige, ♂. w. Guiana.

*fragrans* Wall., *nutans* Roxb. Wall. et *longispina*

Roxb. Wall. v. *Gardenia fragrans*, *nutans* et *longispina*.

## Potamogeton T., Samenkraut, IV. IV., Alismaceae-Pontamophileae (*Najadeae*).

acutifolius Lk., spitzblättriges, 4. Wa. f. Europa.

compressus L. (*zosteraefolius* Schum., *complanatus* W., *cuspidatus* Schrad.), flachstengeliges, 4. Wa. Europa.

crispus L., krauses, 4. Wa. f. Europa.

densus L., dichtblättriges, 4. Wa. f. Mitteleuropa. ♂

β) *serratus* L. (*oppositifolius* DC.) γ) *setaceus* L.

(*oppositifol.* β. *lancifol.* DC.)

fluitans Roth (*oblongus* Mey.), fließendes, 4. Wa. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

gramineus L. (*heterophyllus* Schreb.), grasartiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

β) *heterophyllus* Fr. (*hybridus* Thuil., *augustanus* Balb., *distachyus* Bell., *crassipes* Kit.). γ) *Zizii* Cham. et Schldl.

Hornemanni Mey. (*coloratus* Hornem., *plantagineus* Ducros), 4. Wa. f. Nord- und Westdeutschland, Schweiz.

lanceolatus Sm., lanzettblättriges, 4. Wa. f. England.

longifolius Gay (*macrophyllus* Wolfgang), langblättriges, 4. Wa. f. Nordfrankreich, Südrussland.

lucens L. (*serratus* Web.), glänzendes, 4. Wa. f. Europa, Asien.

marinus L. (*filiformis* P., *setaceus* Schum.), Meer-S., 4. Wa. f. Nordeuropa.

natans L., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Antillen.

β) *parnassifolius* Schrad., γ) *oblongus* Viv.

nitens Web. (*curvifolius* Hartm.), schimmerndes, 4. Wa. f. Nordeuropa.

a) *salicifolius* Fr. (*gramineus* Wahlbg.). β) *heterophyllus* Fr. (*lacustris* Cham.)

obtusifolius M. et K. (*gramineus* Sm., *compressus* Roth), stumpfblättriges, 4. Wa. f. Europa.

pectinatus L., kammblättriges, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nord- und Südamerika.

perfoliatus L., durchwachsenblättriges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

β) *Loeselii* R. et S.

praelongus Wulf. (*lucens* Web., *flexuosus* Schlchr., *flexi-*

**Patamogeton**

*caulis* Dethard., *acuminatus* Wahlbg.), verlängertes,  
4. Wa. f. Europa.

*pusillus* L., kleinstes, 4. Wa. f. Europa.

a) *major* Fr. β) *vulgaris* Fr. γ) *tenuissimus*  
M. et K.

*rufescens* Schrad. (*semipellucidus* K. et Ziz.), *obscurus*  
DC., *serratus* Roth, *fluitans* Sm., *annulatus* Bell.,  
*alpinus* Balb., *purpurascens* Seidel, *obtusius* Ducros),  
rothbraunes, 4. Wa. f. Europa.

*sparganifolius* Laestad., *sparganium* blätteriges, 4. Wa. f.  
Schweden.

*spathulatus* Schrad., spatelblättriges, 4. Wa. f. West-  
deutschland, Nordamerika.

*zosteraceus* Fr., zosterähnliches, 4. Wa. f. Schweden.

**Potamophila** RB., Flußgras, VI. 1. (XXIII. 1.),  
Gramineae.

*parviflora* RB., kleinblumiges, 4. Wa. k. t. Neuholland.

*Potamophila parviflora* Schrk. v. *Microtea maypurensis*.

**Potentilla** L., Fingerkraut, XII. v., Rosaceae.

*agrimonoides* MB., odernennigähnliches, 4. f. Arme-  
nien, Caucasus.

*alba* L., weißes, 4. f. Europa, Caucasus.

*alchemilloides* Lapeyr., frauenmantelähnliches, 4. f. b.  
k. Pyrenäen.

*Anserina* L., Gänserich-F., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

*apennina* Tenor., apenninisches, 4. f. b. k. Apenninen.

*arachnoidea* Dougl., spinnewebenartiges, 4. f. Nordamer.

*argentea* L., silberfarbiges, 4. f. Europa, Asien, Nordam.

β) *sordida* Fr. γ) *impolita* Wahlbg.

*arguta* Pursh (*confertiflora* Torr., *missurica* Hornem.,  
*candicans* Fisch.), spitzzähniges, 4. f. Nordamerika.

*astracantha* Jacq., astracanthisches, 4. f. Caucasus, Astracan.

*ambigua* Gaud. (*intermedia* Hegetsch., *alpestris* var. Hall-  
fil., *geranioides* Schleich., *aurea* γ. *pectinata* Sering.)

zweifelhaftes, 4. f. Südliche Schweiz.

*atrosanguinea* D. Don, blutrothes, 4. f. Nepal.

b) *coccinea*. c) *fulgens*. d) *ignescens*.

*aurea* L. (*Halleri* Sering), goldfarbiges, 4. f. Euro-  
päische Alpen.

*biflora* W., zweiblumiges, 4. f. Ostsibirien.

*bifurca* L., zweigabeliges, 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) *subsericea* Sering.

*bipinnatifida* Dougl. (*arguta* Lehm. non Pursh), doppelt-  
federspaltiges, 4. f. Nordamerika.

*bithynica* Hornem., bithynisches, 4. f. Bithynien.

*Bocconi* Nestl., Boccone's, 4. f. b. k. Apenninen.

*calabra* Tenor., calabrisches, 4. f. b. Unteritalien, Sicilien.

*canadensis* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

*candicans* H. B. K., weißliches, 4. k. Mexico.

*caulescens* L., stengeliges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*chrysantha* Trevir., goldblumiges, 4. f. Mittel- und  
Südeuropa.

*cicutarifolia* W., cicutablättriges, 4. f. Kleinasien.

*cinerea* Chaix (*arenaria* Borkh., *incana* Mch., *ovata* Poir.),  
aschgraues, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*Clusiana* Jacq., Clusius's, 4. f. b. Tyrol, Salzburg,  
Steiermark, Oesterreich.

*collina* Wib. (*canescens* Hartm.), Hügel-F., 4. f. Deutsch-  
land, Schweden.



## Potentilla

*crocea* Hall. fil. (*salisburgensis* Haenk., *rubens* Vill., *aurea* Sm., *alpestris* Hall. fil., *dubia* Sut.), safranfarbiges, 4. f. Europäische Alpen.

β) *affinis* Host. γ) *filiformis* DC. (*alpestris* Host).

δ) *debilis* Schlchr.

*dealbata* Lodd., weifsblättriges, 4. f. Altai.

*declinata* Hornem., niedergebogenes, 4. f. ?

*effusa* Dougl., langstieliges, 4. f. Nordamerika.

*Egedii* Wormsk., Egede's, 4. f. Grönland.

*elatio*r Schltld., höheres, 4. f. ? Sibirien.

*Filipendula* W., filipendulablättriges, 4. f. Dahurien.

*flagellaris* W., ausläufertreibendes, 4. f. Ostindien.

*formosa* D. Don (*nepalensis* Hook), schönes, 4. f. Nepal.

b) *Garnieriana* Hort. c) *Mayana* Hort.

*Fragariastrum* Ehrh. (*Fragaria* Sm., *fragarioides* Vill., *fragariaefolia* Gmel., *Fragaria sterilis* L., *Comarum fragarioides* Roth), Erdbeer-F., 4. f. Europa, Caucasus, Japan.

*frigida* Vill. (*glacialis* Hall. fil., *helvetica* Schl.), kaltes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*fruticosa* L., strauchiges, 4. f. Nordeuropa, Asien, Nordamerika.

β) *dahurica* Nestl. γ) *tenuifolia* Schltld. (*floribunda* Pursh.).

*geoides* MB., geumähnliches, 4. f. Taurien.

*geranioides* W., storchschnabelähnliches, 4. f. Kleinasien, Armenien.

*glabra* Lodd., kahles, 4. f. Dahurien.

*glandulosa* Lindl., drüsiges, 4. f. Californien.

β) *incisa* Lindl.

*glaucophylla* Lehm., blaugrünblättriges, 4. f. Nordamer.

*gracilis* Dougl., schlankes, 4. f. Nordamerika.

*grandiflora* L., großblumiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Caucasus, Sibirien.

*Güntheri* Pohl (*Wiemanniana* Günth.), Günther's, 4. f. Schlesien, Böhmen, Südschweden.

*haematochrus* Lehm., blutfarbiges, 4. k. Mexico.

*Hippiana* Lehmann (*dealbata* Dougl., *leucophylla* Torrey), *Hippiani's*, 4. f. Nordamerika.

*hirsuta* Mchx., rauhhaariges, 4. f. Nordamerika.

*hirta* L. (*pilosa* Vill.), kurzhaariges, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien.

β) *angustifolia* DC.

*humifusa* Nutt., niedergestrecktes, 4. f. Nordamerika.

*hybrida* Wallr., Bastard-F., 4. f. Thüringen.

*incisa* Dsf., eingeschnittenes, 4. f. ?

*inclinata* Vill. (*canescens* Bess., *adscendens* W., *intermedia* Wahlbg., *recta* Jacq.), einwärtsgeneigtes, 4. f. Mittel- und Osteuropa, Caucasus.

*intermedia* L., mittleres, 4. f. Schweiz, Frankreich.

*laciniosa* Kit., schlitzbilättriges, 4. f. Ungarn, österreichisches Litorale.

*leucophylla* Pall. (*angustifolia* W. Lehm.), weifsblättriges, 4. f. Ostsibirien.

*Lindackeri* Tausch., Lindacker's, 4. f. Böhmen.

*lineariloba* M. et S., gleichbreitlappiges, 4. k. Mexico.

*lineata* Trevir. (*splendens* D. Dou, *Siemersiana* Lehm.), linirtes, 4. f. b. k. Nepal.

## Potentilla

*Loddigesii* Spgl. (*vinosa* Lodd., Ledeb.), Loddiges's, 4. f. Sibirien.

*lupinoides* W. (*valderia* Vill., *nivalis* Lapeyr.), wolfsbohnenähnliches, 4. f. b. k. Dauphiné, Pyrenäen.

*macrantha* Ledeb., großkroniges, 4. f. Ostsibirien.

*micrantha* Ram. (*breviscapa* Vest.), kleinblumiges, 4. f. Frankreich, Schweiz, Untersteiermark.

*millegrana* Dougl., vielkörniges, 4. f. Nordamerika.

*minima* Hall. fil. (*Brauniana* Hoppe), kleinstes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*mollissima* Lehm., weichblättriges, 4. f. ?

*monspeliensis* L., südfranzösisches, 4. f. Südfrankreich.

*Morisonii* DC., Morison's, 4. f. Südeuropa.

*multifida* L., vieltheiliges, 4. f. Schweiz, Schweden, Oberitalien, Taurien, Sibirien.

β) *angustifolia*.

*nitida* L. Jacq. (*multidentata* Sering.), glänzendes, 4. f. b. k. Mittel- und südeuropäische Alpen.

*nivea* L., schneeweißes, 4. f. Mittel- u. nordeurop. Alpen. β) *macrophylla* Sering.

*norwegica* L. (*dichotoma* Mch., *geminiflora* Schrk.), norwegisches, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa, Mittelasien.

β) *ruthenica* W. (*diffusa* W.).

*obscura* W. (*pilosa* W., *recta* Vill.), dunkles, 4. f. Mittel- und Westeuropa, Taurien, Sibirien.

*ontopoda* Dougl., dickstieliges, 4. f. Nordamerika,

*opaca* L., dunkles, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*ornithopoda* Tausch, vogelklauenähnliches, 4. f. ?

*patula* W.Kit., abstehendes, 4. f. Mähren, Schlesien, Ungarn.

*pectinata* Fisch., kammlättriges, 4. f. Nordamerika.

*pedata* W. (*rubens* All.), fußförmiges, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Oberitalien.

*pensylvanica* L. (*hispida* Poir.), pensylvanisches, 4. f. Nordamerika.

*petiolata* Gaud., kurzstieliges, 4. f. Schweiz.

*petraea* W., Gesteins-F., 4. f. Nordpersien.

*pimpinelloides* L., bibernellähnliches, 4. f. b. k. Armen.

*pumila* Poir., kleines, 4. f. Nordamerika.

*recta* L. (*pallens* Mch., *sulphurea* Lam.), gerades, 4. f. Europa, Caucasus.

*reptans* L., kriechendes, 4. f. Europa, Nordasien.

b) *flore pleno* J. C. c) *variegata* J. C.

*Richardsonii* Dougl., Richardson's, 4. f. Nordamerika.

*rupestris* L., Felsen-F., 4. f. Europa, Sibirien.

*Salesovii* W., Salesow's, 4. f. Sibirien.

*Sanguisorba* W., wiesenkopfähnliches, 4. f. Sibirien.

*sarmentosa* W. (*caroliniana* Poir., *simplex* Mch.), wurzelrankiges, 4. f. Nordamerika.

*sericea* L., seidenhaariges, 4. f. Sibirien.

*speciosa* W., prächtiges, 4. f. b. k. Creta, Parnassus.

*splendens* Ram. (*Vaillantii* Nestl., *montana* Schrad.), schimmerndes, 4. f. Frankreich, Pyrenäen.

*Sprengeliana* Lehm. (*fragarioides* Hort.), Sprengel's, 4. f. Sibirien.

*stipularis* L., zwischenblättriges, 4. f. Sibirien.

*stolonifera* Lehm., sprossendes, 4. f. ?

*subcaulis* Wulf., stengelloses, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

**Potentilla**

- supina L., niedriges, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
 taurica W. (*hirta* MB.), taurisches, 4. f. Taurien.  
 Thomasii Tenor., Thomas's, 4. f. Neapel.  
 thuringiaca Bernh. (*parviflora* Gaud.), thüringisches, 4. f. Thüringen, Schweiz.  
 tridentata Soland. (*retusa* Retz), dreizähniges, 4. f. Schottland, Grönland, Canada.  
 umbrosa Stev., schattenliebendes, 4. f. Taurien.  
 uniflora Ledeb., einblumiges, 4. f. Sibirien.  
 Valderia All. (*lanata* Lam.), weifsfilziges, 4. f. b. k. Oberitalienische Alpen.  
 velutina Lehm. (*subacaulis* DC. ? L.), sammethaariges, 4. f. b. Südfrankreich.  
 verna L., Frühlings-F., 4. f. Europa, Nordamerika.  
     β) aestiva Gaud. γ) pusilla Host.  
 verticillaris W. (*multifida* Pall.), wirtelblättriges, 4. f. Sibirien.  
 villosa Pall., zottiges, 4. f. Aleutische Inseln, Nordamer.  
 virgata Lehm. (*elongata* Bess.), ruthenförmiges, 4. f. Podolien.  
 viscosa Donn (*hispida* Nestl., W. E., *pensylvanica* Horn.), schmieriges, 4. f. Sibirien, Taurien.  
 Weinmanni Lodd., Weinmann's, 4. f. ? Südrufsland.  
     Hybriden: Russeliana Swt., Hopwoodiana Swt., Mackayana Swt., tormentillo-formosa Tong. (*Tonguei* Hort., *nemoralis-formosa* Hort.), ferruginea Paxt., conferta, atrosanguineo-pedata Maund. etc.  
     *nemoralis* Nestl. (et *Tormentilla* Schrk., Sibth.) v. *Tormentilla reptans et erecta. palustris* Scop. v. *Comarum palustre*.

**Poterium** L., Becherblume, XXI. ix. (XIII. ii.), Rosaceae-Sanguisorbeae.

- agrimonifolium Cav., odermennigblättrige, 4. k. Spanien.  
 ancistroides Dsf., ancistrumähnliche, 4. k. Nordafrika.  
 caudatum Ait., geschwänzte, 4. k. Canarische Inseln.  
 hybridum L., Bastard-B., 4. f. Frankreich.  
 polygamum W. K., vielehige, 4. f. Ungarn, österreichisches Litorale.  
 Sanguisorba L., gemeine, 4. f. Europa.  
     β) guestphalicum v. Bönningh.  
 spinosum L., dornige, 4. k. Sicilien, Creta, Syrien.  
**Pothos** L. (ceylanischer Name), IV. i. (XXI. i.), Aroideae.  
 acaulis L. (*Scolopendrium* Spgl.), stammloser, 4. w. Westindien.  
 angustatus H. B. K., verschmälert, 4. w. Südamer.  
 cannaefolius Curt., blumenrohrblättriger, 4. w. Südamerika, Westindien.  
 cordatus L., herzblättriger, 4. w. Südamerika.  
 coriaceus Grah., lederblättriger, 4. w. Brasilien.  
 crassinervius Jacq., dicknerviger, 4. w. Südamerika.  
 crenatus L., gekerbter, 4. w. Caribäen.  
 decursivus Roxb., herablaufender, 4. w. Ostindien.  
 digitatus Jacq., fingerförmiger, 4. w. Südamerika.  
 giganteus Roxb., riesenhafter, 4. w. Ostindien.  
 glaucus Lk. et Otto, blaugrüner, 4. w. Mexico.  
 Harrisii Grah., Harris's, 4. w. Brasilien.  
 heterophyllus Roxb., verschiedenblättriger, 4. w. Ostind.  
 lanceolatus L., lanzettblättriger, 4. w. Südamerika.  
 Lasia Roxb., stacheliger, 4. w. Ostindien.



**Pothos**

*longifolius* Lk. et Otto, langblättriger, 4. w. Brasilien.  
*macrophyllus* Sw. (*grandifolius* Jacq.), großblättriger,  
 4. w. Westindien, Südamerika.

*microphyllus* Hook., kleinblättriger, 4. w. Brasilien.  
*obtusifolius* Ait., stumpfblättriger, 4. w. Barbados.

*officinalis* Roxb., officineller, 4. w. Bengalen.

*palmatus* L., handförmiger, 4. w. Südamerika.

*pedatus* H. B. K., fußförmiger, 4. w. Neu-Granada.

*Peepla* Roxb., *Peepla-P.*, 4. w. Ostindien.

*pentaphyllus* W., fünfblättriger, 4. w. Cayenne.

*pertusus* Roxb., durchbrochener, 4. w. Ostindien.

*pinnatus* L., gefiederter, 4. w. Molucken.

*reflexus* Lk. et Otto, zurückgebogener, 4. w. Brasilien.

*reptans* Lk. et Otto, kriechender, 5. Sch. w. Brasilien.

*rubescens* Lk. et Otto, röthlicher, 4. w. Brasilien.

*rubrinervius* Lk., rothnerviger, 4. w. Südamerika.

*sagittatus* Sims (*subsagittatus* H. B. K.), pfeilblättriger,  
 4. w. Westindien.

*scandens* L., klimmender, 4. Sch. w. Ostindien, Nepal.

*violaceus* Sw., violetter, 4. w. Westindien.

*foetidus* Sims vid. *Symplocarpus foetidus*. *gracilis*  
 Rudg. v. *Anthurium gracile*.

**Poupartia** Commers., Poupartie, X. iv., Amyrideae-Terebinthaceae.

*borbonica* J. F. Gmel., Lam., borbonische, 5. w. Mascarenas.

**Pourretia** R. et P. (A. Pourret, französischer Botaniker),  
 VI. i., Bromeliaceae.

*coarctata* R. et P., gedrängtblumige, 4. w. Chili.

*coerulea* Miers, blaue, 4. w. Chili.

*magnispatha* Coll., großscheidige, 4. w. Chili.

*pyramidata* R. et P., pyramidale, 4. w. Südamerika.

*rubricaulis* Miers, rothstengelige, 4. w. Chili.

**Prasium** L., Nicoline, XIV. i., Labiatae.

*majus* L., grofse, 5. k. Süditalien, Nordafrika.

*minus* L., kleine, 5. k. Corsica, Südfrankreich, Creta.

**Prasophyllum** RB., Lauchstendel, XX. i., Orchideae.

*elatum* RB., hoher, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*fimbriatum* RB., gefranzter, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*flavum* RB., hellgelber, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*fuscum* RB., brauner, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*patens* RB., absteher, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*rufum* RB., fuchsrother, 4. Kn. t. w. Neuholland.

*striatum* RB., gestreifter, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Premna** L., Stammeiserich, XIV. i., Verbenaceae.

*asperima* Wall., rauhester, 5. w. Ostindien.

*esculenta* ? Roxb., genießbarer, 5. w. Ostindien.

*integrifolia* L., ganzblättriger, 5. w. Ostindien.

*reticulata* Juss., netzförmiger, 5. w. Jamaica.

**Prenanthes** Vaill., Hasenlattich, XIX. i., Cichoriaceae.

*alba* L. (*suavis* Salisb.), weißer, 4. f. Nordamerika.

*altissima* L., höchster, 4. f. Nordamerika.

*aspera* Schrad., rauher, 4. f. ?

*cordata* W., herzblättriger, 4. f. Nordamerika.

*deltoidea* MB., deltaförmiger, 4. f. Iberien.

*hispida* Pall., steifhaariger, 4. f. Ural.

*purpurea* L., purpurfarbiger, 4. f. Mittel-, Süd- und  
 Ostdeutschland, Italien.

*racemosa* Mchx., traubiger, 4. f. Canada.

**Prenanthes**

*rubicunda* W. (*autumnalis* Gronow), röthlicher, 4. f.

Pensylvanien, Virginien.

*Serpentaria* Pursh, Schlangen-H., 4. f. Nordamerika.

*virgata* Mchx., ruthenförmiger, 4. f. Nordamerika.

*tenuifolia* L., feinblättriger, 4. f. Schweiz, Italien.

*tuberosa* Steven (*hispida* MB.), knolliger, 4. Kn. f.

Armenien, Iberien,

*arborea* Brouss. (et *pinnata* L. et *spinosa* Brouss.)

vid. *Sonchus arboreus*, *leptocephalus* et *spinosus*.

*chondrilloides* Ard. vid. *Chondrilla prenanthoides*.

*japonica* L. vid. *Youngia japonica*, *muralis* L. v.

*Lactuca muralis*. *viminea* L. v. *Phoenixopus vimineus* Nachtr.

*viscosa* Baung. (*hieracifolia* W.,

*pulchra* DC.) v. *Crepis pulchra*.

**Prescotia** Lindl. (John Prescott, ein zu Petersburg lebender Engländer), XX. 1., Orchideae.

*colorans* Lindl., farbige, 4. w. Brasilien.

*lanceaefolia* Lk. et Otto, lanzettblättrige, 4. w. Südamer.

*plantaginifolia* Lindl., wegetrittblättrige, 4. w. Brasilien.

**Prestonia** RB. (C. Preston, M. Dr., Freund des Rajus), V. 1., Contortae-Apocynae.

*glabrata* Bonpl., kahle, 5. Sch. w. Quito.

*tomentosa* RB., filzige, 5. Sch. w. Brasilien.

**Priestleya** DC. (M. Priestley, englischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*axillaris* DC., achselblumige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*capitata* DC., kopfförmige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*elliptica* DC., elliptische, 5. t. Cap der guten Hoffn.

*ericaefolia* DC., heideblättrige, 5. t. Cap der gut. H.

*graminifolia* DC., grasblättrige, 5. t. Cap der gut. H.

*hirsuta* DC., rauhhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*laevigata* DC., glatte, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

*myrtifolia* DC., myrtenblättrige, 5. t. Cap d. gut. H.

*sericea* DC., seidenhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*teres* DC., rundblättrige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*tomentosa* DC., filzige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

*umbellifera* DC., doldige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

*vestita* DC., bekleidete, 5. t. Cap der gut. Hoffnung.

*villosa* DC., zottige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

**Primula** T., Primel (Schlüsselblume), V. 1., Primulaceae.

*acaulis* All. (*vulgaris* Sm., *grandiflora* Lam., *hybrida*

Schrank., *sylvestris* Scop., *uniflora* Gmel., schaftloses,

4. f. Mittel-. Süd- und Osteuropa, England.

b) *alba*. c) *plena alba*. d) *plena carnea*. e)

*plena sulphurea*. f) *plena rubra*. g) *plena cuprea*.

h) *plena atropurpurea*. i) *plena violacea*. k) *rubra*.

β) *brevistyla* DC. b) *versicolor*. γ) *caulescens*.

*algida* Adam (*longifolia* Bot. mag.), eisliebendes, 4. f.

b. k. Caucasus.

*Allionii* Loisel. (*glutinosa* All.), Allione's, 4. f. b. k.

Piemont.

*altaica* Lehm., altaisches, 4. f. b. k. Altai.

*amoena* MB., liebliches, 4. f. b. k. Caucasus.

*Auricula* L. (*lutea* Lam.), Aurikel-P., 4. f. b. b. Mittel- und südeuropäische Voralpen und Alpen.

b) *lutea plena*. c) *calycantha*. d) *integerrima*.

e) *hortensis*.

*Balbisii* Lehm., Balbis's, 4. f. b. k. Italien.

## Primula

- calycina Dub. (*glaucescens* Morett.), großkelchiges, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Frankreich, Italien.
- Candolleana Rchb. (*integrifolia* DC., Gaud.), De Candolle's, 4. f. b. k. Schweiz, Frankreich.
- carniolica Jacq., krainerisches, 4. f. b. k. Krain.
- ciliata Schrk., gefranztes, 4. f. b. k. Mitteleurop. Alpen.
- b) *purpurata* D. Don. c) *alba*.
- cortusoides L., cortusablätteriges, 4. f. b. k. Sibirien, Japan.
- davurica Spgl., Lehm., dahurisches, 4. f. b. k. Dahurien.
- decora Bot. mag., zierliches, 4. f. b. k. ? Südeuropa.
- denticulata Sm., gezähneltes, 4. k. Nepal.
- dentiflora Andr., zahnblumiges, 4. f. b. k. Sibirien.
- elator Jacq. (*inodora* Hoffm.), hohes, Garten-P., 4. f. Europa.
- b) *polyantha*. c) *calycantha*. d) *fl. pleno*.
- farinosa L., mehlblätteriges, 4. f. b. k. Europa.
- b) *pallidiflora*. c) *albiflora*.
- Floerkeana Schrad., Floerke's, 4. f. b. k. Oberkärnthen, Südtirol.
- gigantea Jacq., riesenhaftes, 4. f. b. k. Sibirien.
- glutinosa Wulf., klebriges, 4. f. b. k. Mitteleurop. Alpen.
- Hornemanniana Lehm. (*stricta* Hornem., *farinosa* Sm.), Hornemann's, 4. f. b. k. Lappland.
- inflata Lehm., aufgeblasenes, 4. f. Ungarn.
- integrifolia L., Jacq. (*spectabilis* Tratt.), ganzblätteriges, 4. f. b. k. Oesterreich, steyerländische etc. Alpen.
- a) *Clusiana* Tausch. β) *denticulata* K.
- latifolia Lapeyr. (*villosa* Sieb.), 4. f. b. k. Pyrenäen etc.
- longiflora All., langblumiges, 4. f. b. k. Mittel- und südeuropäische Alpen.
- marginata Curt. (*crenata* Loisel.), berandetes, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, französische Alpen.
- minima L., kleinstes, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.
- mistassinica Mchx., canadisches, 4. f. b. k. Canada.
- nivalis Pall., Schnee-P., 4. f. b. k. Sibirien.
- nivea Fisch. (*nivalis* Hort.), schneeweisses, 4. f. b. k. Sibirien.
- norvegica Retz (*finmarchica* Jacq.), norwegisches, 4. f. b. k. Nordnorwegen.
- Palinuri Petagn., Palinuri's, 4. f. k. Neapel.
- Pallasii Lehm., Pallas's, 4. f. b. k. Altai.
- pedemontana Thom. (*hirsuta* All., *helvetica* Donn), piemontesisches, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Oberital.
- b) *alba*.
- Perreiniana Flügge, Perrein's, 4. f. b. k. Spanien.
- praenitens Ker (*chinensis* Lindl.), chinesisches, 4. k. China.
- b) *alba*. c) *fimbriata rosea*. d) *fimbriata alba*.
- pubescens Wulf. (*villosa* Bot. mag.), weichhaariges, 4. f. b. k. Mitteleuropäische Alpen.
- b) *alba* (*Simsii* Swt.).
- pusilla Goldie (*farinosa* Nutt.), niedrigstes, 4. f. b. k. Canada.
- scotica Hook., schottisches, 4. f. b. k. Schottland.
- sibirica Jacq. (*intermedia* Ledeb.), sibirisches, 4. f. b. k. Sibirien.
- β) *integerrima* Hook.
- suaveolens Bertol. (*Columnae* Tenor.), feinriechendes, 4. f. Istrien, Italien.
- truncata Lehm. (*minima angustifolia* Hort.), abgestutztes, 4. f. b. k. Salzburg. Alpen.



**Primula**

*venusta* Host (*Freyeri* Hoppe), schönes, 4. f. b. k. Krain.  
*veris* L. (*officinalis* Jacq.), Frühlings-P., 4. f. Europa.

b) *rubra*. β) *uralensis* Fisch., Ural.

*verticillata* Forsk. (*involucrata* Hort.), wirtelblumiges,  
 4. k. t. Arabien.

*villosa* Jacq. (*hirsuta* All., *viscosa* Lam.), zottiges, 4. f.  
 b. k. Mitteleuropäische Alpen.

b) *alba* (*nivea* Hort.).

*viscosa* All., schmieriges, 4. f. b. k. Piemont.

*Vitaliana* L. v. *Aretia Vitaliana*.

**Prinos** L., Winterbeere, VI. 1., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

*ambiguus* Mchx., carolinische, 5. f. b. k. Carolina.

*atomarius* Nutt., punktirte, 5. f. b. k. Südcarolina,  
 Georgia.

*coriaceus* Pursh, lederblättrige, 5. f. b. k. Georgia.

*deciduus* DC., hinfällige, 5. f. b. Virginien.

β) *aestivalis* DC.

*dubius* G. Don (*ambiguus* Pursh), zweifelhafte, 5. f.  
 Nordamerika.

*glaber* L., kahle, 5. f. b. k. Nordamerika.

*laevigatus* Pursh, glatte, 5. f. b. Nordamerika.

*lanceolatus* Pursh, lanzettblättrige, 5. f. b. Nordamer.

*montanus* Swt., Berg-W., 5. w. Westindien.

*verticillatus* L. (*padifolius* W., *Gronovii* Mchx., *confertus* Mch., *prunifolius* Lodd.), wirtelförmige, 5. f.  
 Nordamerika.

*lucidus* Ait. v. *Nemopanthes canadensis*.

**Prismatocarpus** L'Her., A. DC., Prismakapsel, V. 1., Campanulaceae.

*diffusus* A. DC., weitschweifige, 4. k. Cap d. gut. H.

*fruticosus* L'Her., strauchige, 5. k. Cap der gut. H.

*interruptus* L'Her., unterbrochene, 5. 5. k. C. d. g. H.

*nitidus* L'Her., glänzende, 6. f. Cap der guten Hoffn.

*paniculatus* L'Her., rispige, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

*falcatus* Tenor. etc. v. *Specularia falcata* etc.

**Priva** Adans, Priva, XIV. 11., Verbenaceae.

*lappulacea* P. (*echinata* Juss.), igelstachelige, 4. w.  
 Westindien, Südamerika.

*mexicana* P., mexicanische, 4. w. Mexico.

*leptostachya* P. v. *Streptium asperum*.

**Prockia** P. Br., Prockia, XIII. 1., Bixaceae.

*Crucis* L., westindische, 5. w. Westindien, Südamerika.

*serrata* W., sägeblättrige, 5. w. Caribäen.

*theaeformis* W., theeähnliche, 5. w. Mascarenas.

**Procris** Commers., Procris, XXI. 14., Urticaceae.

*integrifolia* D. Don, ganzblättrige, 4. t. Nepal.

*punctata* Hamilt., punktirte, 4. t. Nepal.

**Proiphys amboinensis** Herb. v. *Eurycles amboinensis*.**Pronaya** Hügel (Baron Pronay, ein Oesterreicher, Freund und Gönner der Botanik), V. 1., Pittosporae.

*elegans* Hügel, schöne, 5. t. Neuholland (Schwanenfl.).

**Proselia serrata** D. Don v. *Chaetanthera serrata*.**Proserpinaca** L., Kriechling, III. 111., Halorageae.

*palustris* L., sumpfliebender, 6. Wa. f. Nordamerika.

*pectinata* Lam., kammblättriger, 6. Wa. f. Nordamer.

**Prosopis** L., Harzhülse, X. 1., Leguminosae-Mimoseae.

*cumanensis* Kunth, cumanische, 5. w. Cumana.

*domingensis* DC., domingische, 5. w. St. Domingo.

*dulcis* Kunth, süsse, 5. w. Neuspanien.

**Prosopis**

juliflora DC., kätzchenblumige, f. w. Westind., Südamerica.

pallida Kunth, bleiche, f. w. Südamerika.

spicigera L., ährentragende, f. w. Ostindien.

β) Adenanthera.

*Stephaniana* Kunth v. *Lagonychium* Stephanianum.

**Prostanthera** La Bill., Geneigtfa den, XIV. 1., Labiatae.

denticulata RB., gezähnelter, f. k. t. Neuholland.

incisa RB., schlitzblättriger, f. k. t. Neuholland.

lasiantha La Bill., haarblumiger, f. k. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

linearis RB., gleichbreitblättriger, f. k. t. Neuholland.

rhombea RB., rautenförmiger, f. k. t. Neuholland.

rotundifolia RB., rundblättriger, f. k. t. V.-D.-L.

violacea RB., violetter, f. k. t. Neuholland.

**Protea** L., Wunderfichte (Silberfichte), IV. 1., Proteaceae.

acaulis Thbg., stammlose, f. t. Cap der gut. Hoffn.

acerosa RB., nadelblättrige, f. t. Cap der gut. H.

acuminata RB., zugespitzte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

amplexicaulis RB., stengelumfassende, f. t. C. d. g. H.

angustata RB., verschälerte, f. t. Cap der gut. H.

canaliculata Andr., rinnenförmige, f. t. Cap d. gut. H.

coccinea RB., scharlachfarbige, f. t. Cap der gut. H.

compacta RB., dichtblumige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

cordata Thbg., herzblättrige, f. t. Cap der gut. H.

cynaroides L., artischockenblumige, f. t. Cap d. g. H.

elongata RB., verlängerte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

formosa RB., schöne, f. t. Cap der guten Hoffn.

glaucophylla Salib., blaugrünblättrige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

grandiflora Thbg., großblumige, f. t. Cap der gut. H.

β) marginata Bot. reg.

humilis RB. (*humiliflora* Andr.), niedrige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

incompta RB., ungezierte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

laevis RB. (*longifolia* Salib.), glatte, f. t. C. d. g. H.

latifolia RB., breitblättrige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

β) coccinea. γ) viridiflora.

Lepidocarpum RB., schuppenfrüchtige, f. t. C. d. g. H.

ligulaefolia Kn., bandblättrige, f. t. Cap d. gut. H.

longiflora Lam., langblumige, f. t. Cap der gut. H.

longifolia Andr., langblättrige, f. t. Cap der gut. H.

lorea RB., riemenblättrige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

macrophylla RB., großblättrige, f. t. Cap d. gut. H.

magnifica Kn., ansehnliche, f. t. Cap der gut. Hoffn.

melaleuca RB. (*coronata* Lam.), schwarzweißse, f. t.

Cap der guten Hoffnung.

mellifera Thbg., honiggebende, f. t. Cap der gut. H.

β) albiflora.

mucronifolia Salib., stachelspitzblättrige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

Mundii H. Berol., Mund's, f. t. Cap der gut. Hoffn.

nana Thbg., zwergige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

neriifolia RB. (*speciosa nigra* Andr.), oleanderblättrige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

obtusata Kn. (*speciosa* Bot. mag.), stumpfe, f. t. Cap der guten Hoffnung.

patens RB., abstehende, f. t. Cap der guten Hoffn.

pendula RB., herabhängende, f. t. Cap der gut. H.

pulchella Andr., hübsche, f. t. Cap der guten Hoffn.

# Protea

a) ciliata Andr. β) glabra Andr. γ) speciosa Andr.

repens Thbg., kriechende, ⚔. t. Cap der gut. Hoffn.  
 revoluta BB., zurückgerollte, ⚔. t. Cap der gut. Hoffn.  
 scabra RB., scharfblättrige, ⚔. t. Cap der gut. Hoffn.  
 Scolopendrium RB., hirschzungenähnliche, ⚔. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

Scolymus Thbg., distelköpfige, ⚔. t. Cap der gut. H.  
 speciosa L., prächtige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.  
 tenax RB., zähe, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.  
 tenuifolia RB., dünnblättrige, ⚔. t. Cap der gut. H.  
 turbiniflora RB., kreiselblumige, ⚔. t. Cap d. gut. H.  
 umbonalis Kn., buckelige, ⚔. t. Cap der guten Hoffn.  
 villifera Lindl., zottige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.  
 virgata Andr., ruthenförmige, ⚔. t. Cap der gut. H.

abrotanifolia Andr. (et cyanoides L., decumbens  
 Andr., glomerata Andr., glomerata L. etc. v. Ser-  
 ruria phyllicoides, cyanoides, pedunculata, glome-  
 rata etc. anemonifolia Salisb. (tridactylides Cav.)  
 et divaricata Andr. etc. v. Isopogon anemonifolius  
 etc. argentea L. (et cinerea Ait., densa W., globosa  
 Andr., pallens L., pallens Thbg., parviflora L. etc.)  
 vid. Leucadendron argenteum cinereum, tortum,  
 concolor, adscendens, decurrens, plumosum etc.  
 etc. aulacea Thbg., bracteata Thbg. (pinifolia L.)  
 vid. Aulax umbellata et pinifolia. caudata Thbg.  
 (et racemosa Thbg.) etc. vid. Spatalla Thunbergii  
 et ramulosa etc. concava Lam., Lagopus Thbg.,  
 Sceptum Thbg. etc. v. Nivenia spathulata, Lago-  
 pus etc. cucullata L., divaricata L. etc. vid. Mi-  
 metes cucullata etc. fucifolia Salisb. (pulchella  
 Cav.) etc. vid. Petrophila pulchella etc. imbricata  
 Thbg. etc. v. Sorocephalus imbricatus etc. linearis  
 Thbg. etc. v. Leucospermum lineare.

## Prunella L., Brunelle, XIV. 1., Labiatae.

alba Pall., weisse, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa,  
 Caucasus.

β) laciniata Mill.

australis Swt. (Browniana Penny), neuholländische, ©. f.  
 Neusüdwallis.

grandiflora Jacq., großblumige, 4. f. Europa, Caucas.

β) pinnatifida K. et Ziz.

hastata Brot., spontanblättrige, 4. f. Portugal.

hyssopifolia L., ysopblättrige, 4. f. Südfrankreich.

incisa Lk., schlitzblättrige, 4. f. ?

intermedia Lk., Brot., mittlere, 4. f. Oberital., Portug.

latifolia Lodd., breitblättrige, 4. f. ?

longifolia P., langblättrige, 4. f. Frankreich.

Marryattae Hort., Marryatt's, 4. f. ?

pennsylvanica W., pennsylvanische, 4. f. Nordamerika.

β) ovata Dsf.

vulgaris L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamer. etc.

b) alba. c) plena. d) rubra. β) hirta Bernh.

Webbiana Hort., Webb's, 4. f. ?

## Prunus T. L., Pflaume, XII. 1., Amygdalaceae-Ceraceae.

1. Armeniaca T., Apricose.

Armeniaca L., gemeine Ap., ⚔. f. b. Persien, Armen.

a) ovalifolia Sering. b) cordifolia Sering. c)

foliis variegatis Hort. d) flore pleno Hort.



**Prunus**

brigantiaca Vill., briançonner A., *fr.* Ostfrankreich.  
 dasycarpa Ehrh. (*atropurpurea* Lois., *nigra* Hort.),  
 schwarze (rauhfrüchtige), *fr.* ?

*β*) persicifolia Loisel.

pedunculata Hort., langstielige, *fr.* ?

sibirica L., sibirische, *fr.* Sibirien.

II. Cerasus T., Kirsche (et *Padus* R.).

avium L. (*C. sylvestris* Bauh., *C. nigra* Mill.), Vogel-K.,  
 süsse, *fr.* Europa.

a) macrocarpa Sering. b) pallida Sering. c)  
 multiplex Sering. d) nigricans Ehrh. e) varia

Ehrh. *β*) duracina DC. (Krach o. Knorpelk.).

a) cordigera Sering. b) obtusata Sering. c)

mammillaris Sering. (*macrophylla* Poir.). *γ*) Ju-

liana DC. (Molkenkirsche). b) heaumiana Sering.

c) pendula Sering.

borealis Mchx., nördliche, *fr.* Nordamerika.

canadensis W. Lois., canadische, *fr.* Nordamerika.

Capollin DC. (*virginiana* Flor. Mex.), mexicanische, *fr.*  
 k. Mexico.

caroliniana Ait., carolinische, *fr.* b. k. Carolina.

cartilaginea Lehm., knorpelige, *fr.* Nordamerika.

Cerasus L. (*C. vulgaris* Mill., *C. caproniana* DC.), saure  
 K., *fr.* Europa.

b) pallescens Ser. c) gobbetta Sering. (*acida*  
 Ehrh.). d) polygyna Ser. e) multiplex Sering.

f) persiciflora Sering. g) variegata Sering. h)

griotta Sering. i) cordigera. k) semiplena. *β*)

austera Ehrh. *γ*) aproniana Schübl. (*montmoren-*  
*cyana* DC.).

Chamaecerasus Jacq. (*fruticosa* Pall., *intermedia* Poir..  
*pumila* C. Bauh.), strauchartige (Erdweichsel), *fr.*  
 Europa, Mittelasien.

Chicasa Mchx., Chicasa-K., *fr.* Virginien, Carolina.

depressa Pursh (*Susquehanae* W., *pumila* Mchx.), nieder-  
 gedrückte, *fr.* Nordamerika.

hyemalis Mchx., Winter-K., *fr.* Nordamerika.

japonica Thbg. (*sinensis* P.), japanische, *fr.* b. Ja-  
 pan, China.

b) multiplex Sering.

Laurocerasus L., Lorbeer-K., *fr.* b. k. Kleinasien,  
 Caucasus.

lusitanica L., portugiesische, *fr.* k. f. b. Portugal.

*β*) Hixa Sering. (*multiglandulosa* Cav.).

Mahaleb L., Mahaleb-K., *fr.* Mittel-, Süd- und  
 Osteuropa.

b) fol. varieg. c) fruct. flavo. d) latifol. *β*)  
 Marasca Rchb.

nepalensis Sering., nepal'sche, *fr.* k. Nepal.

nigra Ait. (*americana* Darlingt.), schwarze, *fr.* Nordam.  
 occidentalis Sw., westliche, *fr.* w. Westindien.

Padus L., Trauben-K., *fr.* Europa, Asien, Nordamer.

a) vulgaris Sering. b) parviflora Sering. c) rubra  
 Sering. d) bracteosa Sering.

pensylvanica L. suppl. (*lanceolata* W.), pensylvanische,  
*fr.* Nordamerika.

persicifolia Dsf., pfirsichblättrige, *fr.* Nordamerika.

prostrata La Bill. (*incana* Stev.), gestreckte, *fr.* Cau-  
 casus, Armenien, Syrien, Creta.

## Prunus

*Pseudo-Cerasus* Lindl. (*paniculata* Ker non Thbg.),  
unächte,  $\S$ . k. f. b. China.

*pubescens* Pursh (*sphaerocarpa* Mchx., *sphaerica* W.),  
weichhaarige,  $\S$ . f. Nordamerika.

*pumila* L. (*glauca* Mchx.), kleine,  $\S$ . f. Nordamerika.

*pygmaea* W. (*candicans* W.), zwergige,  $\S$ . f. Pensyl-  
vanien, Carolina.

*salicina* Lindl., weidenähnliche,  $\S$ .  $\S$ . k. f. b. China.

*semperflorens* Ehrh. (*serotina* Roth), immerblühende,  $\S$ .  
f. Europa, Nordamerika.

*serotina* Ehrh. (*virgin.* Mill.), spätblumige,  $\S$ . f. Nordam.  
 $\beta$ ) *retusa* Sering.

*serrulata* Lindl. (*multiplex chinensis* Hort.), feingesägte,  
 $\S$ . f. b. k. China.

*sinensis* G. Don (*japonica* Ker), chinesische,  $\S$ . f. b. k. China.

*sphaerocarpa* Sw., kugelfrüchtige,  $\S$ . w. Jamaica.

*virginiana* L. (*rubra* Ait., W., *arguta* Bigelow), virgi-  
nische (rothe),  $\S$ . f. Nordamerika.

### III. *Prunus* T., Pflaume.

*candicans* Balb., weißblättrige,  $\S$ . f. ?

*cerasifera* Ehrh. (*domestica myrobalana* L.), Kirsch-P.,  
 $\S$ . f. Nordamerika.

b) fol. variegat.

*Cocomilla* Ten., *Cocomilla*-P.,  $\S$ . f. b. Calabrien.

*divaricata* Ledeb., ausgespernte,  $\S$ . f. Caucasus.

*domestica* L., gemeine,  $\S$ . f. Europa.

b) flore pleno. c) foliis variegat. d) armenioi-  
des Sering. e) Claudiana. f) damascena. g)  
turonensis. h) Juliana. i) Catharina Ser. k)  
Aubertiana Sering. l) pruneauliana Sering. (*py-  
ramidalis* DC.).

*insiticia* L., Kriechen-P. (Hafer-P.),  $\S$ . f. Europa.

a) fructu nigro. b) fructu luteo albo. c) fruct.  
rubro. d) flore pleno.

*maritima* Wangenh., Meerstrands-P.,  $\S$ . f. Nordamerika.

*Poiretiana*\* (*pubescens* Poir.), Poiret's,  $\S$ . f. ?

*spinosa* L., Schlehen-P.,  $\S$ . f. Europa.

a) vulgaris Sering. h) fol. variegat. c) micro-  
carpa Wallr. d) macrocarpa Wallr. e) ovata  
Sering. f) flore pleno.

### *Psamma* P. B., Sandrohr, III. II., Gramineae.

*arenaria* L., gemeines, 4. f. Deutschland etc.

*baltica* P. B., baltisches, 4. f. Ufer d. baltischen Meeres.

### *Psephellus spectabilis* Fisch. et Mey. v. *Centaurea spectabilis*.

### *Psiadia* Jacq., Tropfenpflanze, XIX. IV, Compositae- Corymbiferae.

*glutinosa* Jacq., klebrige,  $\S$ . t. Mascarenas.

### *Psidium* L., Guajavabaum, XII. I., Myrtaceae.

*aromaticum* Aubl., gewürzhafter,  $\S$ . w. Guiana.

*Cattleyanum* Sabin., Lindl., Cattley's,  $\S$ . w. China.

*chinense* Lodd., chinesischer,  $\S$ . w. China.

*cordatum* Sims, herzblättriger,  $\S$ . w. Westindien.

*fragrans* Lodd., wohlriechender,  $\S$ . w. Guiana.

*grandiflorum* Aubl., großblumiger,  $\S$ . w. Guiana.

*guianense* Rich., P., guianischer,  $\S$ . w. Guiana.

*guineense* Sw., guineischer,  $\S$ . w. Guinea.

*latifolium* Lk., breitblättriger,  $\S$ . w. Südamerika.

*montanum* Sw., Berg-G.,  $\S$ . w. Jamaica.

*myrtifolium* Lodd., myrtenblättriger,  $\S$ . w. ?

**Psidium**

*oligospermum* Lk., wenigsamiger, ♀. w. ?

*polycarpon* Anders., Lamb., vielfrüchtiger, ♀. w. Trinidad.

*pomiferum* L., äpfeltragender, ♀. w. Ost- u. Westind.

*pyriferum* L., birntragender, ♀. w. Ost- u. Westindien.

*sapidissimum* Jacq., wohlschmeckender, ♀. w. ? Westind.

*decaspermum* L. suppl. v. Nelitris Jambosella.

*Psilotum triquetrum* Sw. v. *Bernhardia dichotoma*.

**Psilurus** Trin., Borstenschwanz, l. II., Gramineae.

*nardoides* Trin., nardusähnlicher, ☉. f. Südeuropa.

**Psophocarpus** Neck., Flügelhülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*tetragonolobus* DC., vierlappige, ☉. Sch. w. m. f. Mascarenas.

**Psoralea** L., Harzkle, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*acaulis* Stev., stengelloser, 4. k. ?

*aculeata* L., stachelspitziger, ♀. k. Cap der gut. H.

*aphylla* L. (*decidua* Berg.), blattloser, ♀. k. C. d. g. H.

*arborea* Ker, baumartiger, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*argentea* Thbg., silberfarbiger, ♀. k. Cap der gut. H.

*axillaris* L. suppl. (*linearis* Thbg.), achselblumiger, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

*bituminosa* L., südeuropäischer, ♀. k. Italien, Südfrankr.

*brachiata* Dougl., armförmiger, 4. Kn. f. Nordamerika.

*bracteata* L., deckblättriger, ♀. k. Cap der gut. H.

*canescens* Mchx., graulicher, 4. ♀. k. Carolina, Georgia.

*capitata* Thbg., kopfförmiger, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

*cinerea* Lindl., aschfarbiger, ? ☉. f. Australien.

*corylifolia* L., haselnufsblättriger, ♂. w. Ostind., Arabien.

*cuspidata* Pursh, langspitziger, 4. Kn. f. b. k. Louisiana.

*decumbens* Ait. (*mucronata* Thbg.), niederliegender, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

*dentata* DC. (*americana* L.), gezählelter, ♀. k. Madeira.

*divaricata* H. B. K., ausgespreizter, ♀. w. Südamerika.

*esculenta* Pursh, genießbarer, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

*hirta* L., kurzhaariger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*incana* Nutt. (*argophylla* Pursh), weißgrauer, 4. k.

Nordamerika.

*intermedia* Bess., mittlerer, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*involuta* Thbg., hüllblättriger, ♀. k. Cap d. g. H.

*lanceolata* Pursh (*arenaria* Nutt.), lanzettblättriger, 4.

k. Nordamerika.

*lathyrifolia* Balb., platterbsenblättriger, ♀. k. ?

*Lupinella* Mchx., wolfsbohnenähnlicher, 4. k. f. b. Carolina, Florida.

*macrostachys* DC., großsähriger, 4. f. b. k. Westliches Nordamerika.

*melilotoides* Mchx. (*eglandulosa* Ell.), steinkleeähnlicher, 4. f. b. k. Nordamerika.

*multicaulis* Jacq., vielstengeliger, 4. k. Cap d. gut. H.

*odoratissima* Jacq., wohlriechender, ♀. k. C. d. g. H.

*Onobrychis* Nutt., esparsettähnlicher, 4. f. b. k. Louisiana.

*orbicularis* Lindl., kreisförmiger, 4. f. b. Californien.

*palaestina* L. (*hirsuta* Gouan), orientalischer, ♀. k. Palästina.

*pinnata* L., gefiederter, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*pubescens* Balb., weichhaariger, ♀. w. ? Mexico, Peru.

*repens* L., kriechender, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*sericea* Poir. (*pedunculata* Ker), seidenhaariger, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.



**Psoralea**

*spicata* L., ährenförmiger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
*Stachyos* Thbg. (*Stachydis* L. suppl.), stachysblättriger,  
 ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*striata* Thbg., gestreifter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
*tenuifolia* L., feinblättriger, 4. ♀. k. Cap der gut. H.  
*tomentosa* Thbg., filziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
*verrucosa* W. (*angustifolia* Ait.), warziger, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

*Dalea* L. (et *laxiflora* Poir. et *leporina* Ait.) vid.  
*Dalea alopecuroides*, laxifl. et *Lagopus*. *tetrago-*  
*noloba* L. v. *Cyamopsis psoraloides*.

**Psychine** Dsf., Psychine, XV. III., Cruciferae.

*stylosa* Dsf. (*numidica* Spgl.), numidische, ☉. f. Nordafrika.

**Psychotria** L., Psychotrie, V. I., Rubiaceae.

*asiatica* L., asiatische, ♀. w. Ostindien.

*brachiata* Sw., arnförmige, ♀. w. Westindien, Südamer.

*citrifolia* Sw., citronblättrige, ♀. w. Westindien.

*coriacea* Poir., lederblättrige, ♀. w. Hispaniola, Südamer.

*cumanensis* W., cumanische, ♀. w. Cumana.

*daphnoides* Cunn., seidelbastähnliche, ♀. ♀. t. Neuholl.

*elliptica* Ker, elliptische, ♀. w. Brasilien.

*glabrata* Sw., kahle, ♀. w. Westindien.

*hirsuta* Sw., rauhaarige, ♀. w. Westindien, Südamer.

*laurifolia* Sw., lorbeerblättrige, ♀. w. Westindien.

*marginata* Sw., herandete, 4. ♀. w. Jamaica.

*megalosperma* Vahl, grofssamige, ♀. w. Westindien.

*Myrtiphyllum* L., myrtenblättrige, ♀. w. Jamaica.

*parasitica* Sw., schmarotzende, ♀. w. Caribäen.

*pedunculata* Sw., langstielige, ♀. w. Jamaica, Südamer.

*pubescens* Sw., weichhaarige, 4. w. Westindien.

*rigida* Bredem. W. (*byrsophylla* Spgl.), starre, 4. ♀.  
 Cumana.

*undata* Jacq., wellenblättrige, ♀. w. Bahamische Inseln.

*crocea* Sw. et *lineata* W. vid. *Palicourea crocea* et

*P. apicata* Nachtr. *herbacea* L. v. *Geophila reni-*

*formis*. *involuta* Sw. et *racemosa* W. v. *Nona-*  
*telia officinalis* et *racemosa*.

**Ptarmica** *alpina* DC., *atrata* DC. etc. vid. *Achillea*  
*alpina* etc.

**Ptelea** L., Lederblume, IV. I., Tricoccae-Zanthoxyleae.

*trifoliata* L., dreiblättrige, ♀. f. Nordamerika.

*ovata* Lour. v. *Ptelidium ovatum*.

**Ptelidium** P. Thou., Ptelidie, IV. I., Evonymeae-  
Celastrineae.

*ovatum* P. Thou., eiblättrige, ♀. w. Madagascar.

**Pteris** L., Saumfarn (Flügelfarn), XXIV. I., Pterioideae.

*aculeata* Sw. (*arborea* P.), stacheliger, 4. ♀. w. Westind.

*Allosorus* J. Bevis, krauser, 4. w. ?

*ampla* J. Bevis, breiter, 4. w. ?

*aquilina* L., Adler-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
 β) *brevipes* Tausch.

*argentea* S. G. Gmel., silberfarbiger, 4. k. Ostsibirien.

*arguta* Vahl, feingezählter, 4. k. w. Madeira.

*atropurpurea* L., schwarzpurpurrother, 4. f. b. k. Nordamer.

*biaurita* L., zweigeöhrter, 4. w. Westindien.

*Calomelanos* Sw. (*hastata* Thbg.), schwarzstieliger, 4. w.  
 Cap der guten Hoffnung.

*caudata* L., geschwänzter, 4. w. Westindien.

*Cervantesii* H. Liverp., Cervantes's, 4. w. Mexico.

**Pteris**

- chinensis Lodd., chinesischer, 4. w. China.  
 collina Radd., Hügel-S., 4. w. Brasilien.  
 cordata Cav., herzblättriger, 4. w. Mexico.  
 crenulata Lodd., gekerbter, 4. w. ?  
 cretica L. (*semiserrata* Forsk.), cretischer, 4. k. w.  
 Südeuropa, Creta, Arabien.  
 denticulata Sw., gezähnelter, 4. w. Hispaniola, Brasilien.  
 discolor Kunze (*elegans* Sw.), verschiedenfarbiger, 4. w.  
 Brasilien.  
 elegans Poir., zierlicher, 4. w. ? Ostindien.  
 esculenta Forst., genießbarer, 4. w. Societätsinseln,  
 Neuholland.  
 falcata RB., sichelförmiger, 4. w. Neuholl., V.-D.-L.  
 flexuosa Lk. et Otto, hin- und hergebogener, 4. w.  
 Südamerika.  
 grandifolia L., großblättriger, 4. w. Westind., Philippinen.  
 hastata Sw. (*auriculata* Thbg., *polymorpha* Poir.), spon-  
 tonblättriger, 4. w. Cap d. gut. Hoffn., Mascarenas.  
 heterophylla Sw., verschiedenblättriger, 4. w. Westind.  
 inframarginalis Kaulf., untenrandiger, 4. w. Mexico.  
 Lactuca Poir., zartwedeliger, 4. w. Guadaloupe.  
 lanuginosa Bory, wolliger, 4. w. Mascarenas.  
 latizona Cunn., breitzoniger, 4. w. Neuholland.  
 leptophylla Sw., schlankwedeliger, 4. w. Brasilien.  
 longifolia L., langblättriger, 4. w. Westindien, Nepal,  
 Philippinen.  
 nemoralis Bory., W. (*semiovata* Poir.), Hain-S., 4. w.  
 Mascarenas, Ostindien, Cochinchina.  
 palmata W., handförmiger, 4. w. Westindien.  
 pedata L., fußförmiger, 4. w. Südamerika, Neuholland.  
 peruviana Poir. (*subverticillata* Cav., *ternifolia* Cav.),  
 peruvianischer, 4. w. Peru, Mexico.  
 Plumierii W., Plumier's, 4. w. Westindien, Südamer.  
 rotundifolia Forst., rundblättriger, 4. w. Neuzeeland.  
 sagittaeifolia Radd., pfeilblättriger, 4. w. Brasilien.  
 sagittata Cav., pfeilförmiger, 4. w. Quito.  
 serrulata L. (*multifida* Poir.), feinsägiger, 4. w. Ost-  
 indien, China, Japan.  
 spinulosa Radd., stachelsägiger, 4. w. Brasilien.  
 sulcata H. Berol., gefurchter, 4. w. Südamerika.  
 tremula RB., zitternder, 4. w. Neuholland.  
 umbrosa RB., schattenliebender, 4. w. Neuholland.  
 Vespertilionis La Bill., fledermausähnlicher, 4. w. Neuholl.  
*crispa* Sw. v. *Allosorus crispus*. *gracilis* Mchx. v.  
*Cheilanthes gracilis*. *lanceolata* L. etc. v. *Taenitis*  
*lanceolata* etc. *piloselloides* L. vid. *Nothochlaena*  
*piloselloides*. *podophylla* Sw. v. *Lonchitis pedata*.
- Pterocarpus** Löfl., Flügelfrucht, XVII. iv. (XVI. vi.),  
 Leguminosae-Papilionaceae.  
 dalbergioides Roth, dalbergiaähnliche, 5. w. Ostindien.  
 Draco L. (*officinalis* Jacq.), Drachenblut-F., 5. w. West-  
 indien, Südamerika.  
 indicus W., indische, 5. w. Molucken.  
 Marsupium Roxb., sichelhülsige, 5. w. Ostindien.  
 Rohrii Vahl, Rohr's, 5. w. Guiana, Brasilien.  
 sandalinus L. suppl., Rothholz-F., 5. w. Ostindien.  
 sandalinoides H. Angl., sandelholzähnliche, 5. w.  
 Sierra Leone.  
 scandens Poir., klimmende, 5. Sch. w. Caracas.

**Pterocarpus**

*Ecastaphyllum* Berg. vid. *Ecastaphyllum Brownii*.  
*latifolius* Poir. v. *Lonchocarpus latifolius*. *lunatus*  
 L. v. *Drepanocarpus lunatus*.

**Pterocarya** Kunth, Flügelnußs, XXI. ix., Juglandaeae.  
*caucasica* Kunth, caucasische, ♀. f. Caucasus, Nordam.

**Pterocephalus** Vaill., Federköpfchen, IV. i., Dipsaceae.  
*brachiatus* Spgl., armförmiges, ☉. f. Cypern, Palästina.  
*diandrus* Lagasc., zweimänniges, ☉. f. Portugal, Span.  
*dumetorum* Coult., Hecken-F., ♀. k. Teneriffa.

*involucratus* Spgl., fiederhülliges, ☉. f. Creta, Cypern.  
*plumosus* Coult., ächtes, ☉. f. Griechenland, Caucasus.  
*Vaillantii* Lagasc. (*Cephalaria papposa* et *Vaillantii* R.  
 et S.), Vaillant's, ☉. f. Portugal, Spanien.

**Pteroneuron** DC., Flügelkresse, XV. iii., Cruciferae.  
*carnosum* DC., fleischige, 4. f. b. Croatien, Dalmatien.  
*graecum* DC., griechische, ☉. f. Italien, Griechenland.  
*maritimum* Rchb. v. *Cardamine maritima*.

**Pteronia** L., Pteronie, XIX. i., Compositae-Eupatorineae.  
*camforata* L., kampferduftende, ♀. k. Cap d. gut. H.  
*echinata* Thbg., stachelige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*fasciculata* Thbg., büschelblumige, ♀. k. Cap d. g. H.  
*flexicaulis* Thbg., gebogene, ♀. k. Cap der gut. H.  
*glomerata* Thbg., knaulförmige, ♀. k. Cap der gut. H.  
*oppositifolia* L., gegenblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.  
*pallens* Thbg., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
*scariosa* Thbg., rauschende, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*stricta* Ait., steife, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*Chamaepeuce* Spgl. v. *Staehelina Chamaepeuce*.

**Pteroselinum** alsaticum Rchb., austriacum Rchb., *Chabraei*  
 Rchb., *glaucum* Rchb. etc. v. *Peucedanum alsaticum*,  
*austriacum*, *Chabraei*, *Schottii* etc.

**Pterospermum** Schreb., Flügelkern, XVI. vii., Mal-  
 vaceae-Dombeyaceae.

*acerifolium* W., ahornblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*canescens* Roxb., weißgraulicher, ♀. w. Ostindien.  
*lanceaefolium* Roxb., lanzettblättriger, ♀. w. Ostindien.  
*platanifolium* Lodd., platanusblättriger, ♀. w. Ostind.  
*semisagittatum* Roxb., ungleichpfeilblättriger, ♀. w.  
 Ostindien.

*suberifolium* W., spitzblättriger, ♀. w. Ostindien.

**Pterostegia** Fisch. et Mey., Flügelknöterich, V. iii.  
 (VI. iii.), Portulacaeae-Polygoneae.

*drymarioides* Fisch. et Mey., drymariaähnlicher, ☉. f.  
 Neu-Californien.

**Pterostylis** RB., Flügelorche, XXI. i., Orchideae.

*acuminata* RB., zugespitzte, 4. Kn. w. Neuholland.  
*Banksii* RB., Banks's, 4. Kn. t. w. Neuzeeland.  
*concinna* BB., nette, 4. Kn. w. Neuholland.  
*cucullata* RB., kappenförmige, 4. Kn. w. Van-Diem.-L.  
*curta* RB., kurze, 4. Kn. w. Neuholland.  
*gibbosa* RB., höckerige, 4. Kn. w. Neuholland.  
*grandiflora* RB., großblumige, 4. Kn. w. Neuholland.  
*longifolia* RB., langblättrige, 4. Kn. w. Neuholland.  
*nutans* RB., nickende, 4. Kn. w. Neuholland.  
*obtusata* RB., stumpflippige, 4. Kn. w. Neuholland.  
*ophioglossa* RB., Natterzungen-F., 4. Ln. w. Neuholl.  
*reflexa* RB., zurückgebogene, 4. Kn. w. Neuholland,  
 Van-Diemens-Land.

**Pterotheca** bifida Fisch. et Mey. etc. v. *Lagoseris bifida* etc.



**Pterygodium** Sw., Flügelstendel, XX. 1., Orchideae.

*alatum* Sw., blattreicher, 4. Kn. w. Cap der gut. H.

*Volucris* Sw., dreiblättriger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.

**Ptilostephium** H. B. K., Federfranze, XIX. 11.,  
Compositae-Corymbiferae.

*coronopifolium* H. B. K., krähensfußblättrige, ☉. f. Mexico.

*trifidum* H. B. K., dreispaltige, ☉. f. Mexico.

**Ptychotis** K., Faltendolde, V. 11., Umbelliferae.

*ammoides* K. (*verticillata* Duby), ammiähnliche, ☉. ♂. f.  
Süd- und Westeuropa.

*heterophylla* K. (*Bunius* Rchb.), verschiedenblättrige,  
♂. f. Süd- und Westeuropa.

**Pueraria** DC. (M. M. N. Puerari, Professor zu Copen-  
hagen), XVII. 14. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-  
Papilionaceae.

*tuberosa* DC., knollige, ♂. Sch. Kn. w. Bengalen.

*Wallichii* DC., Wallich's, ♂. Sch. t. Nepal.

**Pulegium** *vulgare* Mill. v. *Mentha Pulegium*.

**Pulicaria** G., Flöhalant, XIX. 11., Compositae-  
Corymbiferae.

*arabica* Lk., arabischer, ☉. f. Arabien.

*dysenterica* G., Rulir-F., 4. f. Europa, Mittelasien.

*indica* (L.), indischer, ☉. f. m. Ostindien.

*odora* Rchb., wohlriechender, 4. f. Istrien, Italien,  
Südfrankreich.

*paludosa* (Link), morastliebender, ☉. f. Span., Portugal.

*uliginosa* Stev., sumpfliebender, 4. f. Taurien.

*undulata* DC., wellenblättriger, ☉. ♂. f. Aegypten, Pers.

*villosa* Lk., zottiger, ☉. f. Nordamerika.

*viscosa* Lk., schmieriger, ☉. f. Nordamerika.

*vulgaris* G., gemeiner, ☉. f. Europa, Mittelasien.

*annua* G. v. *Stenactis annua*.

**Pulmonaria** T., Lungenkraut, V. 1., Asperifoliaceae.

*angustifolia* L. (*tuberosa* Schrk.), schmalblättriges, 4.  
Kn. f. Europa.

*azurea* Bess. (*Clusii* Baumg., *angustifolia* Auctor., *Bes-  
sera azurea* Schult.), azurblaues, 4. f. Mittel- und  
Osteuropa.

*mollis* Wolff (*media* Host), weichblättriges, 4. f. Mittel-  
und Osteuropa.

*oblongata* Schrad. (*media* Rchb.), länglichblättriges, 4.  
f. Mitteleuropa.

*officinalis* L., gemeines, 4. f. Europa.

b) *alba* J. C. c) *rosea*.

*saccharata* Mill. (*grandiflora* DC.), weißfleckiges, 4. f.  
West- und Norddeutschland.

*daurica* Sims, *denticulata* R. et S. (*sibirica* Pursh),

*maritima* L. (*parviflora* Mchx.), *paniculata* Ait. et

*virginica* L. etc. v. *Platynema dahurica*, *denticulat.*,

*maritim.*, *paniculat.* et *pulchrum* etc.

**Pulsatilla** Bauh. T., Küchenschelle, XIII. VI., Ran-  
unculaceae.

*africana* Herm., afrikanische, 4. k. Cap der gut. H.

*albana* Spgl. (Stev.), albanische, 4. f. Caucasus.

*alpina* de l'Arbre (*alba* Rchb.), Alpen-K., 4. f. Mittel-  
europäische Alpen und Voralpen.

*Burseriana* Rchb. (*apiifolia* Schult.), Burser's, 4. f.  
Mitteleuropäische Alpen.

*cernua* Spgl. (Thbg.), übergebogene, 4. k. Japan.

*daurica* Spgl. (Fisch., DC.), dahurische, 4. f. Dahurien.

**Pulsatilla**

Hackellii Pohl (*Halleri* Presl, *hybrida* Mikan, *patens* Auctor), Hackel's, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

β) *Wolfgangiana* Bess.

Halleri W. (All.), Haller's, 4. f. k. Südliche Schweiz, Oberitalien.

nutans Gaud. (*montana* Hoppe), nickende, 4. f. Oesterreichisches Litorale, südliches Tyrol, Schweiz.

Nuttalliana Spgl., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

patens Mill., ausgebreitete, 4. f. Ost-, Nord- und Mitteleuropa, Sibirien.

b) *ochroleuca* Bot. mag.

pratensis Mill., Wiesen-K., 4. f. Ost-, Mittel- und Nordeuropa.

tenuifolia Spgl., feinblättrige, 4. k. Cap der gut. H. vernalis Mill., Frühlings-K., 4. f. Europa.

b) *flore luteo*.

vulgaris Mill., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.

b) *albida* Hort. c) *rubra* Lam. β) *Bogenhardiana* Rchb. (*tenuifolia* Schlchr.). γ) *schizantha* Rchb.

**Pultenaea** Sm, (W. Pulteney, M. Dr., englischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

argentea Cunn., silberfarbige, f. t. Neuholland.

aristata Sbr., grannige, f. t. Neuholland.

asperata Sbr., rauhlättrige, f. t. Neuholland.

biloba RB. (*deltoidea* Sbr.), zweilappige, f. t. Neuholl.

candida Lodd., weißblättrige, f. t. Neuholland.

canescens Cunn., weißgraue, f. t. Neuholland.

capitellata Sbr., kleinköpfige, f. t. Neuholland,

comosa Sbr., schopfige, f. t. Neuholland.

cordata Grah., herzblättrige, f. t. Van-Diem.-Land.

crassifolia Lodd., dickblättrige, f. t. Neuholland.

cuneata Lodd., keilblättrige, f. t. Neuholland.

daphnoides Sm., seidelbastähnliche, f. t. Neusüdwallis.

dentata La Bill., gezähnelte, f. t. Neuholland.

echinata Sbr., stachelige, f. t. Neuholland.

elliptica Sm., elliptische, f. t. Neuholland.

euchila DC. (*Dillwynia cuneata* Sbr.), ungleichkelchige, f. t. Neuholland.

ferruginea Rudg. (*lanata* Sbr.), rostfarbige, f. t. Neuholl.

flexilis Sm. (*Dillwynia teucroides* Sbr.), biegsame, f. t. Neuholland.

hypolampra Sbr., glänzende, f. t. Neuholland.

incarnata Mack. C., fleischfarbige, f. t. Neuholland.

incurvata Cunn., einwärtsgekrümmte, f. t. Neuholland.

juniperina La Bill., wachholderähnliche, f. t. Nördliches Neuholland.

linophylla Sm., flachsblättrige, f. t. Neusüdwallis.

microphylla Sbr., kleinblättrige, f. t. Neuholland.

obcordata Andr., verkehrtherzblättrige, f. t. V.-D.-L.

oxalidifolia Cunn., sauerkleeblättrige, f. t. Neuholland.

paleacea Sm., spelzige, f. t. Neuholland.

parviflora Sbr., kleinblumige, f. t. Neuholland.

pedunculata Hook., langstielige, f. t. Neuholland.

phylicoides Sbr., phylicaähnliche, f. t. Neuholland.

plumosa Sbr., federige, f. t. Neuholland.

polifolia Cunn., poleiblättrige, f. t. Neuholland.

polygalaeifolia Rudg. (? *flexilis* Swt.), polygalablättrige, f. t. Neuholland.

procumbens Cunn., niederliegende, f. t. Neuholland.

**Pultenaea**

- racemulosa* Sbr., traubige, ⚥. t. Neuholland.  
*retusa* Sm., abgestutzte, ⚥. t. Neusüdwallis.  
*rosmarinifolia* Lindl. (*mucronata* Lodd.), rosmarinblät-  
 terige, ⚥. t. Neuholland.  
*scabra* RB., scharfblättrige, ⚥. t. Neusüdwallis.  
*squarrosa* Sbr., sparrige, ⚥. t. Neuholland.  
*staphyleoides* Cunn., staphyleablättrige, ⚥. t. Neuholl.  
*stenophylla* Ait., schmalblättrige, ⚥. t. Neuholland.  
*stipularis* Sm. (*psoraleoides* Sbr.), zwischenblättrige, ⚥.  
 t. Neuholland.  
*stricta* Curt., steife, ⚥. t. Van-Diemens-Land.  
*subumbellata* Hook., wenigdoldige, ⚥. t. Van-Diem.-L.  
*tenuifolia* RB., dünnblättrige, ⚥. t. Van-Diem.-Land.  
*thymifolia* Sieb., thymianblättrige, ⚥. t. Neuholland.  
*vestita* RB., bekleidete, ⚥. t. Südliches Neuholland.  
*villifera* Sieb., langfranzige, ⚥. t. Neuholland.  
*villosa* Sm., zottige, ⚥. t. Neuholland.  
*ericoides* Vent. (*rosmarinacea* Sbr.) v. *Aotus villosa*.  
*ilicifolia* Andr. vid. *Podolobium trilobatum*. *nana*  
 Andr. vid. *Chorizema nanum*. *retorta* Wendl. vid.  
*Dillwynia ericaefolia*. *rubiaefolia* Andr. v. *Mirbelia*  
*reticulata*. *sylvatica* Sbr. v. *Oxylobium Pultenaeae*.  
*virgata* Sbr. v. *Aotus virgata*.

**Punica** T., Granate, XII. 1., ? Onagrariae-Granateae.

- Granatum* L., gemeine, ⚥. k. f. b. Mittelasien, Südeuropa.  
 b) flore rubro pleno. c) albescens. d) albescens  
 fl. pleno. e) flavescens.

*nana* L., Zwerg-G., ⚥. k. t. Antillen, Südamerika.

**Purshia** DC. (F. Pursh, ein Deutscher, welcher Nordamerika in botanischer Hinsicht bereiste und eine Flora dieses Landes schrieb), XII. 1., Rosaceae-Spiraeaceae.

*tridentata* DC., dreizähnlige, ⚥. f. b. k. Nordamerika.

*Purshia hispida* Lehm. et *mollis* Lehm. vid. *Onosmodium hispidum* et *molle*.

**Puschkinia** Adams, MB. (Graf Mussin Puschkin, russischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*scilloides* Adams, MB., scillaähnliche, 4. Zw. f. b. Caucasus, Creta.

*Putoria foetida* P. v. *Ernodea montana*.

**Pycnanthemum** Mchx., Ballblume, XIV. 1., Labiatae.

- aristatum* Mchx., grannige, 4. f. Nordamerika.  
*incanum* Mchx., weißgraue, 4. f. Nordamerika.  
*lanceolatum* Pursh, lanzettliche, 4. f. Nordamerika.  
*linifolium* Pursh, flachsblättrige, 4. f. Nordamerika.  
*Monardella* Mchx., monardenähnliche, 4. f. Virginien,  
 Carolina.

*nudum* Nutt., kahle, 4. f. Carolina, Georgia.

*ovatum* Nestl., eiförmige, 4. f. Nordamerika.

*verticillatum* P., wirtelblättrige, 4. f. Pensylvan., Carol.

**Pycnostachys** Hook., Dickähre, XIV. 1., Labiatae.

*coerulea* Hook., blaue, ☉. w. Madagascar.

**Pyrethrum** Hall., Bertramwurz, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

*Achilleae* DC. (*tenuifolium* Tenor., *corymbosum* β. Auct.

*Matricaria corymbosa* Savi), Garben-B., 4. f. Italien.

*achilleaefolium* MB., garbenblättrige, 4. f. Caucasus, Sibirien.



## Pyrethrum

- $\beta$ ) pubescens (*Achillea pub.* H. P., *Gymnocline Vaillantii* Cass.).  
 alpinum W. (*saxatile* Lodd.), Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 $\beta$ ) pubescens Duby (*tomentosum* Clairv., Chrys., *minimum* Vill.).  
 ambiguum Ledeb., zweifelhafte, 4. f. Altai.  
 Balsamita W., frauenmünzenähnliche, 4. f. Nordpersien, Levante.  
 bipinnatum W., doppeltgefiederte, 4. f. Sibirien.  
 Bocconi W. (*Chrysanthem. aragonense* Ass.), Boccone's, 4. f. Spanien.  
 carneum MB. (*roseum* Lindl., *Chrysanth. coccineum* Sims), fleischfarbige, 4. f. Caucasus.  
 caucasicum W., caucasische, 4. f. Caucasus.  
 ceratophylloides W., Tenor. (*leucanthemoides* Tausch), hornblattähnliche, 4. f. Italien, Dalmatien, Pyrenäen.  
 $\beta$ ) dissectum DC.  
 cinerariaefolium Trevir. (*Chrysanth. rigidum* Vis., *Turreanum* Vis.), cinerarienblättrige, 4. f. Dalmatien.  
 corymbosum W., traubendoldige, 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.  
 $\beta$ ) Clusii Fisch. Rchb. (*italicum* Hort.).  $\gamma$ ) tenuifolium MB., W.  
 decipiens Fisch. et Mey., täuschende, 4. f. Nordpers.  
 discoideum Ledeb., scheibenförmige, 4. f. Tatarei.  
 fuscum W. (Dsf.), bräunliche, 4. f. Nordafrika.  
 glabrum Lagasc., kahle, 4. f. Spanien.  
 Halleri W. (*alpestre* Clairv., *Chrysanth. coronopifol.* Vill.), Haller's, 4. f. Schweiz, Oberitalien, Dauphiné.  
 $\beta$ ) Barrelieri Dufour.  
 incanum Ledeb., weißgraue, 4. f. Sibirien.  
 indicum Cass. (*Chrysanth. japonicum* Thbg., *Chr. tripartitum* Swt.), indische, 4. f. k. China, Japan, Ostindien.  
 inodorum Sm., geruchlose, 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) salinum Wallr.  
 leptophyllum Stev., schlankblättrige, 4. f. Ostcaucasus.  
 macrophyllum W., großblättrige, 4. f. Siebenbürgen, Ungarn, Croatien.  
 maritimum Sm., Meerstrands-B., 4. f. England, Gothland, Nordwestfrankreich.  
 $\beta$ ) elegans Poll.  
 millefoliatum W., vielblättrige, 4. f. Taurien, Bessarab.  
 multifidum DC. (*pinnatifidum* W., *Chrysanth. glaucum* P.), vieltheilige, 4. f. Orient.  
 Myconis Mch. (*Coleostephus Myconis* Cass.), spanische, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Syrien, Nordafrika.  
 $\beta$ ) hybridum Guss.  $\gamma$ ) albidum DC.  
 niveum Lagasc. (*parthenifolium*  $\beta$ . MB., *pulverulentum* W., *fruticulosum* Spgl., Schult., *argenteum* Adams), schneeweiße, 4. f. Iberien.  
 palustre W., Morast-B., 4. f. Armenien.  
 parthenifolium W. (*parthenifolium* a MB., *Chrysanth. praealtum* Vent.), parthenienblättrige, 4. f. Iberien.  
 Parthenium Sm., Mutterkraut-B., 4. f. Europa.  
 $\beta$ ) flosculosum.  $\gamma$ ) plenum.

## Pyrethrum

*praecox* MB., frühe, ☉. f. Taurien, Astrakan.

β) *parviflorum* W.

*pulchrum* L., schöne, 4. f. Altai.

*pulverulentum* Lag., bestäubte, ☉. f. Spanien.

*radicans* Cav., wurzelnde, 4. f. k. Spanien.

*roseum* MB. (*Chrysanth. coccineum* W.), rosafarbige, 4. f. Caucasus, Persien.

*sericeum* MB. (*Chrys. argenteum* W.), seidenhaarige, 4. f. Iberien.

*serotinum* W., späte, 4. f. Nordamerika.

*silaifolium* Stev., silausblättrige, 4. f. Ostcaucasus.

*sinense* Sabin. (*Chrysanth. indicum* Thbg.), chinesische, 4. f. k. Japan, China.

Gartenvarietäten: purple, changeable white, quilled white, superb white, tapeled white, quilled yellow, sulphur yellow, golden yellow, large lilac, rose or pink, buff or orange, spanish brown, quilled flamed yellow, quilled pink, early crimson, large quilled orange, expanded light purple, quilled light purple, curled lilac, superb clustered yellow, semidouble quilled pink, semidouble quilled white, semidouble quilled orange, late pale purple, quilled salmon-colored, small yellow, paper white, pale buff, early blush, blush *Ranunculus*-flowered, changeable pale buff, two-colored red, starry purple, brown purple, late quilled yellow, double indian yellow, Parks's small yellow, tasseled yellow, tasseled lilac, semidouble quilled pale orange, golden Lotus-flowered, two colored incurved, yellow Waratah, double indian white, clustered blush, starry blush, flat pink, incurving pink, dwarf pale rose, expanded rose, grooved light purple, rosy purple, expanded crimson, sanguineum or blood red, changeable yellow, Wheelerianum etc.

*tomentosum* DC. (*minimum* DC.), filzige, 4. f. b. k. Corsica.

*trifurcatum* W., dreigabelige, ☉. f. Nordafrika.

*uliginosum* W. K., Sumpf-B., 4. f. Ungarn.

Unbestimmtere: *absinthifolium* (Fisch.), 4. f. Sibirien.

*ruthenicum* (Fisch.), 4. f. Rußland. *tanacetifolium* (W.), 4. f. Orient.

*arvense* Salzm, v. *Phalacrodiscus arvensis*. *diversifolium* Grah. v. *Brachycome diversifolia*.

*indicum* Roxb. vid. *Chrysanthemum Roxburghii*.

*lanatum* Spgl. vid. *Egletes bellidifolia*.

*speciosum* W. vid. *Chrysanthemum grandiflorum* γ.

*simplicifolium* W. vid. *Egletes domingensis*.

*Tanacetum* DC. vid. *Balsamita vulgaris*. Hinsichtlich der übrigen siehe *Chrysanthemum*.

## *Pyrola* T., Wintergrün, X. 1., Ericaceae.

### I. *Genuina*.

*asarifolia* Mchx., haselwurzblättriges, 4. f. b. k. Nordam.

*chlorantha* Sw. (*convoluta* Bartr., *minor* Pursh, *virens* Schweig., *media* Hayne, *asarifolia* Rad., *rotundifolia* Sturm.), grünblumiges, 4. f. Mittel- u. Nordeuropa, Canada.

*elliptica* Nutt., elliptisches, 4. f. b. k. Pennsylvanien.

*media* Sw. (*rotundifolia* Flor. Dan.), mittleres, 4. f. Mittel- und Westdeutschland, Schweiz, Schweden, England etc.

**Pyrola**

*minor* L. (*rosea* Sm.), kleines, 4. f. Europa, Sibirien Nordamerika.

*rotundifolia* L., rundblättriges, 4. f. Europa, Nordam.  
β) *arenaria* K.

*secunda* L., einseitigwendiges, 4. f. f. Europa, Nordam.  
II. *Monesis* Salisb. (*Parnassioides* K.).

*uniflora* L. (*M. grandiflora* Salisb., DC.), einblumiges,  
4. f. Europa, Nordamerika.

III. *Chimophila* Pursh, Nutt.

*maculata* L., geflecktes, f. f. b. k. Nordamerika.

*umbellata* L. (*C. corymbosa* Pursh.), doldiges, f. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*Pyrolirion aureum* Herb. v. *Amaryllis peruviana*.

*Pyrolaria pubera* Mchx. v. *Hamiltonia oleifera*.

**Pyrus** T., Birne, Apfel. XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

I. *Pyrophorum* DC. (*Pyrus* T.).

*amygdaliformis* Vill. (*sylvestris* Magn., *salicifolia* Lois.),  
mandelähnliche, f. f. Istrien, Südfrankreich.

*communis* L. (*Achras* G.), gemeine, f. f. Europa.

a) *Achras* Wallr. b) *Pyraster* Wallr. c) *foliis*  
*variegat.* d) *fructu variegato.* e) *sanguinolenta.*  
f) *flore pleno.* g) *jaspida.* h) *sativa* DC. β)  
*tomentosa* K. (*Pollveria* Lej.).

*crenata* D. Don, gekerbte, f. f. b. k. Nepal.

*cuneifolia* Guss., keilblättrige, f. f. Sicilien.

*elaeagnifolia* Pall. (*orientalis* Horn.), oleasterblättrige,  
f. f. Taurien, Caucasus.

*Michauxii* Bosc, Michaux's, f. f. Nordamerika.

*nivalis* Jacq., Schnee-B., f. f. Oesterreich.

*parviflora* Dsf., kleinblumige, f. f. Creta.

*Pollveria* L. (*bollwylleriana* DC., *auricularis* Knoop,  
*irregularis* du Roi), Bollwyllerische, f. f. Elsass.

*salicifolia* L., weidenblättrige, f. f. Caucasus, Sibirien.

*salvifolia* DC., salbeiblättrige, f. f. Frankreich.

*sinaica* Thouin (*montis Sinai* et *orientalis* Hort., *persica*  
P.), sinaische, f. f. Sinai.

*sinensis* Lindl. (*sinica* Royle), chinesische, f. f. b. China.

*variolosa* Wall. (*Pashia* Hamilt.), schorfige, f. f. b. k. Nepal.

II. *Malus* T., Apfel.

*acerba* DC., Merat. (*P. Malus austera* Wallr., *M. com-*  
*munis sylvestris* Dsf.), saurer (Holzapfel), f. f. Europa.

*angustifolia* Ait. (*coronaria* Wagnenh.), schmalblättriger,  
f. f. Nordamerika.

*astracantha* DC., astrakanischer, f. f. Astrakan, Persien.

*baccata* L., beerentragender, f. f. Sibirien, Japan.

*coronaria* L., wohlriechender, f. f. Nordamerika.

*dioica* W. (*apetala* Münchh.), zweihäusiger (grünblühender), f. f. ?

*Malus* L. (*Malus* β. *mitis* Wallr. β. *tomentosa* K.), ge-  
meiner, f. f. Europa, Mittelasien.

β) *praecox* Swt.

*prunifolia* W. (*Malus* β. Ait., *hybrida* Dsf., *baccata* Hort.,  
*rubicunda* Hfinsgg.), pflaumenblättriger, f. f. Sibirien.

b) *fructu acerbo* Wender.

*Sieversii* Ledeb., Sievers's, f. f. Sibirien.

*spectabilis* Ait. (*M. sinensis* Dum.), ansehnlicher, f. f.  
b. k. China.

Unbestimmtere: *alnifolia* Hort., *Schottii* Hort.,  
*florentina* Targ., *stipulacea* Hort., *rivularis* Hort.



## Pyrus

*Aria* Ehrh., *aucuparia* G. etc. v. *Sorbus Aria* etc.  
*Azarolus* Scop. v. *Crataegus Azarolus*. *Botryapium*  
 L. suppl. (et *Amelanchier* du Roi) etc. vid. *Ame-*  
*lanchier Botryapium*, vulgaris etc. *Cydonia* L. etc.  
 v. *Cydonia vulgaris* etc.

*Pyxidanthera* Mchx., Büchsenanthere, V. 1., Ericaceae.  
*barbulata* Mchx., bärtige, 4. f. k. Nordamerika.

*Quadria heterophylla* R. et P. v. *Guevina Avellana*.

*Qualea* Aubl. (guianischer Name), I. 1., Lythriaceae-  
 Vochysieae.

violacea Mart., violette, f. w. Brasilien.

*Quassia* L. (Quassi, ein Negerslave in Surinam, der  
 zuerst ihre arzneilichen Kräfte entdeckte), X. 1., Tri-  
 coccae-Simarubeae.

amara L., bittere, f. w. Surinam.

*excelsa* Sw. et *Simaruba* L. vid. *Simaruba excelsa*  
 et officinalis.

*Quekettia* Lindl. (E. J. Quekett, englischer Pflanzen-  
 anatom), XX. 1., Orchideae.

*microscopia* Lindl., kleine, 4. w. ? Südamerika.

*Queltia* Salisb. v. *Narcissus*.

*Quercus* T. L., Eiche, XXI. ix., Amentaceae.

*Aegilops* L., Knopper-E., f. f. Süd- und Westeuropa,  
 Griechenland, Kleinasien.

b) *latifolia* Hort. c) *pendula*.

*agrifolia* Nee, stacheligblättrige, f. w. Westl. Nordam.

*alba* L. (*palustris* Marsh.), weißse, f. f. Nordamerika.

a) *pinnatifida* Mchx. β) *repanda* Mchx. γ) *si-*  
*nuata* Mchx.

*ambigua* Humb., zweifelhafte, f. t. Mexico.

*annulata* Sm. (*Phullata* Ham., *glauca* Lodd., ? *Kamroopii*

D. Don, *acuminata* Hort.), beringte, f. k. Nepal.

*apennina* Lam. (*conglomerata* P.), apenninische, f. f.  
 Südfrankreich, Elsaß, Italien.

*aquatica* Walt. (*uliginosa* Wangenh.), Wasser-E., f. f.  
 Nordamerika.

β) *hemisphaerica* Bartr. (*maritima* Auct.).

*australis* Lk. (*hybrida* Brot.), südliche, f. f. b. k. Portugal.

*Ballota* Dsf., langfrüchtige, f. k. f. b. Spanien, Portu-  
 gal, Nordafrika.

*bicolor* W. (*Prinus tomentosa* Mchx., *Michauxii* Nutt.),  
 zweifarbig, f. f. Nordamerika.

*borealis* Mchx. (*ambigua* W.), nördliche, f. f. Nordam.

*brutia* Tenor., calabrische, f. f. Calabrien.

*Castanea* W. (*Prinus acuminata* Mchx.), Kastanien-E.,  
 f. f. Pennsylvanien.

*Catesbaei* Mchx., Catesbai's, f. f. Carolina, Georgia.

*Cerris* L. (*crinita* Lam., *haliphloeos* Juss., Lam.), bur-  
 gundische, f. f. Südeuropa, Kleinasien.

a) *vulgaris* (*frondosa* Mill.). b) *pendula* Neill. c)

*variegata* Lodd. β) *austriaca* Jacq. W. (*Cerris* Host).

b) *cana major* Lodd. c) *cana minor* Lodd. d)

*Ragnal* Lodd. γ) *fulhamensis* Loud. (*dentata* Wats.,

*hybrida* var. *dentata* Swt.). b) *Lucombeana* Swt.

(*exoniensis* Lodd.). δ) *crispa* A. B. (*Lucombeana*

*crispa* Hort.). b) *suberosa* Hort. c) *incisa* Hort.

d) *dentata* Hort. e) *heterophylla* Hort. f) *bul-*

*lata* Hort. g) *dentata pendula* Hort.

# Quercus

- cinerea Mchx. (*Phellos*  $\beta$ . Ait., *humilis* Walt.), aschfarbige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- coccifera L., Kermes-E.,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Südeuropa, Kleinasien, Syrien.
- coccinea Wangenh. (*rubra*  $\beta$ . Ait.), Scharlach-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Cookii Loud., Cook's,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Gibraltar.
- dealbata Lindl., weifshblätterige,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.
- discolor Ait. (*tinctoria sinuosa* Mchx.), verschiedenfarbige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Esculus L., griechische,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Griechenl., Kleinasien.
- faginea Lam., buchenähnliche,  $\frac{1}{2}$  f. Span., Südfrankr.
- falcata Mchx. (*elongata* W., *discolor* Hort., *lyrata* Lodd., *cuneata* et *triloba* Hort.), sichelförmige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordam.
- falkenbergensis Booth, falkenbergische,  $\frac{1}{2}$  f. ?
- Fontanesii Guss. (*pseudo-coccifera* Dsf.), Desfontaine's,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Calabrien, Nordafrika.
- gramuntia L. (*rotundifolia* et *hispanica*  $\beta$ . Lam.), wellenblätterige,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Spanien.
- heterophylla Mchx., verschiedenblätterige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordam.
- hybrida nana Loud. (*pedunculat. Ilex*, Hort. Angl., *humilis* Hort.), Bastardzwerg-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Hybride.
- iberica Stev., iberische,  $\frac{1}{2}$  f. Caucasus.
- Ilex L. (*heterophylla* Lam.), immergrüne,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
- a) *integrifolia* Loud. b) *serratifolia* Lodd. c) *fagifolia* Lodd. d) *crispa* Lodd. e) *latifolia* Lodd. (*oblonga* Hort.). f) *longifolia* Lodd. g) *variegata* Hort.
- ilicifolia Wangenh. (*Banisteri* Mchx.), stechhülsenblätterige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- imbricaria Mchx. (*latifolia* Hort.), breitschuppige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- imbricata Hamilt., schuppenfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.
- infectoria Oliv., Färber-E.,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Orient.
- lanata Sm. (*lanuginosa* D. Don, *Banja* Hamilt., ? *oblongata* D. Don, ? *incana* Royle), wollige,  $\frac{1}{2}$  k. Nepal.
- laurifolia Mchx., lorbeerblätterige,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Südcaryl.
- $\beta$ ) *hybrida* Mchx. (*obtusa* Ait.).
- lyrata Walt. (*lobata* Nee), leierblätterige,  $\frac{1}{2}$  f. b. Carolina, Louisiana, Neuspanien.
- macrocarpa Mchx., grofsfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- maritima W. (*Phellos* *maritima* Mchx.), Meerstrands-E.,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Carolina.
- mexicana Humb., mexicanische,  $\frac{1}{2}$  k. t. Mexico.
- montana W. (*Prinus monticola* Mchx.), Berg-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Virginien, Carolina.
- myrtifolia W., myrtenblätterige,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Carolina.
- nana W. (*aquatica*  $\gamma$ . Ait.), Zwerg-E.,  $\frac{1}{2}$  f. b. Carolina.
- nigra L. (*marylandica* Ray., *ferruginea* Mchx., *aquatica* Lodd.), schwarze,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- olivaeformis Mchx., olivenfrüchtige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- palustris du Roi (*montana* et *Banisteri* Lodd.), Sumpfe.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- pedunculata Ehrh. (*Robur* Sm., *Robur* a L., *foemina* Mill., *racemosa* Lam., *navalis* Burnet), Stiel-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- b) *pubescens* Lodd. c) *fastigiata* Lam. (*pyramidalis* Hort., *viminalis* Bosc.). d) *pendula* Lodd.

## Quercus

- e) heterophylla Loud. (*salicifolia*, *flicifolia* et *Fennesii* Hort., *laciniata* Lodd.). f) fol. variegatis Lodd. g) *purpurea* Lodd. h) *Hodginsii* Lodd. i) *dulcis* Loud.  $\beta$ ) *rosea* Bechst.
- Phellos* L. (*Phellos sylvatica* Mchx.), weidenblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- prinoides* W. (*Prinus pumila* Mchx., *Chinquapin* Pursh), kastanienähnliche,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Prinos* L. (*Prinus palustris* Mchx.), kastanienblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Pseudo-Suber* Santi, unächte Kork-E.,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Südspanien, Italien, Nordafrika.
- pubescens* W. (*lanuginosa* Thuill., *collina* Schlchr., *Robur*  $\delta$ . Lam., *Frainetto* Tenor., *faginea* Spgl.), weichhaarige,  $\frac{1}{2}$  f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
- pyrenaica* W. (*Tauzin* P., *nigra* Thor., *Toza* Bosc, *stonifera* Lapeyr., *humilis* Lam., *castellana* Bosc), pyrenäische,  $\frac{1}{2}$  f. Westeuropa.
- Robur* L. suec. (*sessiliflora* Sm., *sessilis* Ehrh., *regalis* Burnet), Stein-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- a) *microcarpa*. b) *truncata*. c) *collina*. d) *nigrescens*.
- rubra* L., rothe,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- b) *latifolia*. c) *montana*.
- sericea* W. (*pumila* Mchx., *Phellos sericea* Ait.), seidenhaarige,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Carolina, Florida.
- spicata* Humb., ährige,  $\frac{1}{2}$  t. Mexico.
- stellata* Wangenh. (*obtusiloba* Mchx.), sternförmige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Suber* L., Kork-E.,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Südeuropa, Nordafrika.
- b) *latifolia*. c) *angustifolia*. d) *dentata* (*Pseudo-suber* Auctor.).
- Thomasii* Tenor., Thomas's,  $\frac{1}{2}$  f. Neapel.
- tinctoria* W. (*velutina* Lam., *tinctoria angulosa* Mchx., *nigra* du Roi, *rubra* Walt.), Quercitron-E.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- triloba* Mchx. (*cuneata* Wangenh.), dreilappige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Turneri* W. (*hybrida* Hort.), Turner'sche,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Tibet.
- virens* Ait. (*Phellos*  $\beta$ . L., *sempervirens* Walt., Banist.), immergrüne,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Nordamerika.
- Queria** Löffl. (Don J. Quer y Martínez, spanischer Wundarzt und Botaniker), III. III. (X. I.), Portulacaceae-Paronychieae.
- hispanica* L., spanische,  $\odot$  f. Spanien.
- canadensis* L. vid. *Anychia dichotoma*. *capillaris* Nutt. v. *Anychia capillaris* Nachtr.
- Quisqualis** L., Röhrenkelch, X. I., Onagrariae-Combretaceae.
- glabra* Burm. (*indica* Lour.), kahler,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien, Cochinchina, Südchina.
- indica* L., ostindischer,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.
- pubescens* Burm., weichhaariger,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.
- Quivisia** Commers. (Quivi-Holz), (mascarenischer Name), XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.
- heterophylla* Cav., verschiedenblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas.



*Rademachia* Thbg. v. *Artocarpus*.

*Radiola* Dill., Strahlenkraut, IV. III., Hypericineae-Lineae.  
linoides Gmel. (*Millegrana* Sm.), leinähnliches, ☉. f.  
Europa.

*Rafnia* Thbg. (C. G. Rafn, dänischer Botaniker), XVII.  
IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*cuneifolia* Thbg., keilblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.  
*elliptica* Thbg., elliptische, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*lancea* DC., lanzettblättrige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.  
*opposita* Thbg., gegenblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.  
*triflora* Thbg. (*Borbonia cordata* Andr.), dreiblumige,  
♂. t. Cap der guten Hoffnung.

*amplexicaulis* Thbg. v. *Vascoa amplexicaulis*. *retusa* Vent. v. *Templetonia retusa*.

*Rajania* L. (J. Ray oder Rajus, berühmter englischer  
Naturforscher), XXII. VI. (VI. III.), Sarmenaceae-  
Dioscoreae.

*cordata* L., herzblättrige, 4. Sch. w. Westind., Süd-  
*hastata* L., spatulblättrige, 4. Sch. w. Hispaniola.  
*quinquefolia* L., fünfblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

*Ramondia* Rich. (M. L. Ramond, französischer Bota-  
niker), V. I., ? Personatae-Verbasceae (? *Solanaceae*).

*pyrenaica* Rich., pyrenäische, 4. f. b. k. Pyrenäen, Piemont.

*Randia* L. (J. Rand, englischer Botaniker), V. I.,  
Rubiaceae.

*aculeata* L., stachelige, ♀. w. Westindien, Mexico.

*Bowieana* Cunn., Hook., Bowie's, ♀. w. Brasilien.

*longiflora* Lam., langblumige, ♀. w. Ostindien.

*macrantha* R. et S. (*longiflora* Salisb.), großblumige, ♀.  
w. Sierra Leone.

*obovata* R. et S. (*pubescens* R. et P.), verkehrteiblät-  
terige, ♀. w. Südamerika.

*parviflora* Lam. (*Gardenia Sonneratii* Spgl.), kleinblumige,  
♀. w. Ostindien.

*racemosa* Roxb., traubige, ♀. w. Ostindien.

*rotundifolia* R. et P., rundblättrige, ♀. w. Peru.

*sinensis* R. et S., chinesische, ♀. w. China.

*Ranunculus* Bauh., T., Ranunkel, Hahnenfuß, XIII. VI.,  
Ranunculaceae.

*abortivus* L., verkümmerter, 4. f. Nordamerika.

*aconitifolius* L., sturmhutblättriger, 4. f. Mitteleuro-  
päische Voralpen.

a) *humilis* DC. β) *crassicaulis* DC. γ) *medius*  
Bernh. δ) *platanifolius* L. b) *flore pleno*.

*acris* L. (*napellifolius* Crtz), scharfer, 4. f. Europa,  
Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. c) *sylvaticus* Thuill. d) *multi-  
fidus* DC. (*polyanthemos* Lobel). e) *albus* Hort.  
β) *Stevenii* Andrzy., Bess.

*affinis* RB., ähnelnder, 4. f. Melvilleinsel.

*alpestris* L., Voralpen-R., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*amplexicaulis* L., stengelumfassender, 4. f. Südeuro-  
päische Alpen.

*anemonoides* Zahlbr. (*Callianthemum rutaefolium* Rchb.),  
anemonenähnlicher, 4. f. Oest erreich, steyermärk. Alpen.

*angulatus* Presl, kantiger, 4. Kn. f. Sicilien.

*angustifolius* DC., schmalblättriger, 4. f. Pyrenäen.

*apiifolius* P., sellerieblättriger, ♂. f. k. Buenos-Ayres.

*aquatilis* L., Wasser-R., 4. Wa. f. Europa, Asien,  
Afrika, Amerika.

**Ranunculus**

- a) *peltatus* Schrk.  $\beta$ ) *truncatus* K.  $\gamma$ ) *quinque-lobus* K.  $\delta$ ) *tripartitus* Nolt.  $\epsilon$ ) *pantothrix* Brot.  $\zeta$ ) *succulentus* K.
- arcticus* Richards., Polar-R., 4. f. Nördl. Amerika.
- arvensis* L., Acker-R.,  $\odot$ . f. Europa.
- $\beta$ ) *tuberculatus* Kit.  $\gamma$ ) *inermis* K.
- asiaticus* L., asiatischer (Garten-R.), 4. Kn. f. b. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.
- $\beta$ ) *sanguineus* Mill.  $\gamma$ ) *tenuilobus* DC.
- auricomus* L. (*polymorphus* All., *vernus* Spenn.), goldschopfiger, 4. f. Europa, Nordamerika.
- $\beta$ ) *fallax* Wimm. et Grab. (*cassubicus* Auctor.).
- bonariensis* Poir., bonarischer,  $\odot$ . f. Buenos-Ayres.
- brevicaulis* Hook., kurzstengeliger, 4. f. Nordamerika.
- brevifolius* Tenore., kurzblättriger, 4. Kn. f. Neapel.
- brutius* Tenore., calabrischer, 4. f. Calabrien.
- bulbosus* L., zwiebelknolliger, 4. Kn. f. Europa, Nordamerika.
- b) *flore pleno*. c) *bracteatus* Schl. d) *ochroleucus*.
- bullatus* L., bauchiger, 4. Kn. f. b. Portugal, Sicilien, Griechenland, Nordafrika.
- b) *grandiflorus*. c) *flore pleno*.
- bupleuroides* Brot., bupleurumblättriger, 4. f. b. k. Portugal.
- cardiophyllus* Hook., herzblättriger, 4. f. Nordamerika.
- cassubicus* L., cassubischer, 4. f. Schlesien, Pommern, Preussen, Galicien.
- caucasicus* MB., caucasischer, 4. f. Caucasus.
- chaerophyllus* L. (*flabellatus* Dsf.), kerbelblättriger, 4. Kn. f. b. Südeuropa, Nordafrika.
- chius* DC., griechischer,  $\odot$ . f. Griechenland.
- cicutarius* Schltld., cicutablättriger, 4. Kn. f. Ostsibir.
- coronatus* Ehrb., gekrönter,  $\odot$ . f. Aegypten.
- cortusaefolius* W., cortusablättriger, 4. Kn. k. Canarische Inseln.
- crassicaulis* Hornem., dickstengeliger, 4. f. ?
- crenatus* WK., gekerbter, 4. f. b. Steyermark, ungarische Alpen.
- creticus* L., cretischer, 4. Kn. f. b. k. Creta, Nordafrika.
- $\beta$ ) *macrophyllus* Dsf.
- Cymbalaria* Pursh, cymbelkrautblättriger, 4. f. Sibirien, Nordamerika.
- dissectus* MB., schlitzblättriger, 4. f. Caucasus, Sibir.
- divaricatus* Schrk. (*circinatus* Sibth., *rigidus* Host., *stagnatilis* Wallr., *aquatilis*  $\beta$ . L., *pantothrix* a DC.), ausgesperter, 4. Wa. f. Europa.
- Eschscholtzii* Schltld., Eschscholtz's, 4. f. b. Aleutische Inseln.
- fascicularis* Mühlbg., büschelförmiger, 4. f. Nordamer.
- Flammula* L., beißender, 4. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.
- $\beta$ ) *ovatus* P.  $\gamma$ ) *serratus* DC.  $\delta$ ) *reptans* L.  $\epsilon$ ) *filiformis* Mchx.
- fluitans* Lam. (*fluvialis* Wigg., *peucedanifolius* All., *aquatilis*  $\delta$ . L., *pantothrix*  $\gamma$ . DC., *peucedanoides* Dsf.), Fluß-R., 4. Wa. f. Europa, Afrika, Nordamerika.
- frigidus* W. (*altaicus* Laxm.), kalter, 4. f. b. Sibirien.
- fumariaefolius* Dsf., erdrauchblättriger, 4. Kn. f. ?
- glaberrimus* Hook., kahlster, 4. f. Nordamerika.

**Ranunculus**

*glacialis* L., Gletscher-R., 4. f. b. Europäische Alpen.

β) *aconitoides* DC.

*Gouani* W. (*pyrenaeus* Gouan), Gouan's, 4. f. b. Pyren.

*gracilis* DC., schlanker, 4. Kn. f. b. k. Griechenland.

*gramineus* L., grasblättriger, 4. f. b. k. Südeuropa.

b) *flore pleno*. β) *phoenicifolius* DC.

*grandiflorus* L., großblumiger, 4. f. b. Kleinasien.

*gregarius* Brot. (*Thomasii* Tenor), gesellschaftlicher, 4.

Kn. f. b. Portugal, Neapel.

*hederaceus* L., epheuähnlicher, 4. Wa. f. Nord- und

Westeuropa, Sibirien.

*hirtus* Banks, kurzhaariger, 4. k. Neuzeeland.

*hispidus* Mchx., steifhaariger, 4. f. Virginien, Carolina.

*Hornemanni* Schltdl., Hornemann's, 4. Kn. f. Nordam.

*hybridus* Biria (*Thora* Jacq., *Pseudo-Thora* Host, *Pthora* Crantz), Bastard-R., 4. Kn. f. Mitteleurop. Alpen.

*hyperboreus* Rottb., nördlicher, 4. f. Norwegen, Island, Grönland.

*illyricus* L. (*sericeus* W.), illyrischer, 4. Kn. f. Oeland, österreichisches Litorale, Deutschland, Ungarn, Taurien, Caucasus.

*isopyroides* DC., dolstockenähnlicher, 4. f. Sibirien.

*lacerus* Bell. (? *frigidus* Schrk.), zeretzter, 4. f. Oberitalien, Schweiz, Frankreich.

b) *pallidus* DC.

*laciniatus* Baumg., geschlitzter, ☉. f. Siebenbürgen.

*lanuginosus* L., wolliger, 4. f. Europa.

*lappaceus* Sm., klettenfrüchtiger, 4. k. Neuholland.

*lapponicus* L., lappländischer, 4. f. Lappland, Island.

*Lingua* L., zungenblättriger (großer), 4. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

*lomatocarpus* Fisch. et Mey., saumfrüchtiger, ☉. f. ?

*marylandicus* Poir., maryländischer, 4. f. Nordamerika.

*millefoliatus* Vahl, garbenblättriger, 4. Kn. f. b. Sicilien, Griechenland, Nordafrika.

β) *grandiflorus* D. Don (*garganicus* Tenor.).

*monspeliacus* L. (*illyricus* W. E.), südfranzösischer, 4. Kn. f. Südfrankreich, Nordafrika.

β) *cuneatus* DC. (*apiifolius* Dsf.). γ) *rotundifolius* DC.

*montanus* W. (*nivalis* Jacq.), Berg-R., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*muricatus* L., weichstacheliger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Nord- und Südamerika.

β) *creticus* DC. γ) *carolinus* DC. (*echinatus* Vent.).

*nemorosus* DC. (*Breytinus* Crtz, *aureus* Schlchr.), Hain-R., 4. f. Mitteleuropa.

β) *pauciflorus* DC. (*villosus* St. Am.).

*nivalis* L., Schnee-R., 4. f. Nördliches Europa.

*nodiflorus* L., knotenblumiger, ☉. f. Südeuropa, Ungarn.

β) *dentatus* DC.

*obtusifolius* Horn., stumpfblättriger, 4. f. Sibirien.

*ophioglossifolius* DC. (*cordifolius* Bast., *fistulosus* Brign.), natterzungenblättriger, ☉. Wa. f. Südeuropa.

*ovalis* Rafin., eiförmiger, 4. f. Nordamerika.

*oxyspermus* MB., grannenfrüchtiger, 4. Kn. f. Taurien, Caucasus, Syrien.

*paludosus* Poir., Morast-R., 4. Kn. f. b. Nordafrika.



**Ranunculus**

- parnassifolius L., parnassiablätteriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 parviflorus L., Gouan, kleinblumiger, ☉. f. Südeuropa, England.  
 pedatifidus Sm., fußspaltiger, 4. f. Sibirien.  
 pedatus W. K., fußförmiger, 4. Kn. f. Ungarn, Siebenb.  
 pensylvanicus L., pensylvanischer, 4. f. Nordamerika.  
 Philonotis Ehrh. (*hirsutus* Curt., Ait., *sardous* Crtz., *pallidior* Vill., *agrarius* All.), rauher, ☉. f. Europa.  
     β) parvulus L. γ) intermedius Poir. (*pumilus* Thuill.).  
 plebejus RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neuholl.  
 polyanthemus L., vielblumiger, 4. f. Europa.  
 polyphyllus W. K. (*minimus* W.), vielblätteriger, ☉. Wa. f. Ungarn.  
 propinquus Ledeb., verwandter, ☉. f. Rußland.  
 Purshii Richards., Pursh's, 4. f. Nördliches Amerika.  
 pygmaeus Wahlbg., zwergiger, 4. f. Nördliches Europa und Amerika.  
 pyrenaeus L., pyrenäischer, 4. f. b. Mitteleurop. Alpen.  
     β) bupleurifolius Lapeyr. γ) plantagineus All.  
 recurvatus Poir. (*saniculaeformis* Mühlb.), zurückgekrümmerter, 4. f. Nordamerika.  
 repens L., kriechender, 4. f. Europa, Asien, Nordam.  
     b) flore pleno.  
 rhomboidalis Hook., rautenförmiger, 4. f. Nordamer.  
 rufulus Brot., fuchsröthlicher, 4. f. Portugal.  
 rutaefolius L. (*Callianthemum rutaefol.* C. A. Mey., *coriandrifolium* Rchb.), rautenblätteriger, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.  
 Sabini RB., Sabine's, 4. f. Melville-Insel.  
 salsuginosus Pall. (*ruthenicus* Jacq.), Salinen-R., 4. f. Sibir.  
 sceleratus L., blasenziehender, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
 Schlechtendalii Hook., Schlechtendal's, 4. f. Nordamer.  
 Schraderianus Fisch. et Mey., Schrader's, ☉. f. ?  
 Seguierii Vill. (*Columnae* All.), Seguier's, 4. f. b. Dauphiné, Piemont, krainer und tyroler Alpen.  
 sessiliflorus Poir., stiellosblumiger, ☉. f. Neuholland.  
 Thora L. (*scutatus* W. K.), giftiger, 4. Kn. f. Mitteleuropäische Alpen, Kroatien.  
 tomentosus Poir., filziger, 4. f. Carolina.  
 trachycarpus Fisch. et Mey., rauhfrüchtiger, ☉. f. Taurien.  
 Traunfellneri Hoppe, Traunfellner's, 4. f. Kärnthen, Krain.  
 trifolius Dsf., dreiblätteriger, 4. f. Sibirien.  
 trilobus Dsf., dreilappiger, ☉. f. Nordafrika, Sicilien, Griechenland.  
 tripartitus DC., dreitheiliger, 4. Wa. f. Frankreich, England etc.  
     a) micranthus DC. β) obtusiflorus DC.  
 tuberosus Lapey., knolliger, 4. Kn. f. Pyrenäen.  
 uliginosus W. (*cochlearifolius* Hornem.), sumpfliebender, ☉. Wa. f. Teneriffa.  
 ventricosus Vent. (*muricatus* γ. *brasiliensis* DC.), bauchiger, ☉. f. Südamerika.  
 Villarsii DC. (*lupponicus* Vill., *oreophilus* MB., *Hornschuchii* Hoppe, *Gouani* Hegetschw.), Villars's, 4. f. b. Krain, Schweiz, Dauphiné, Taurien, Caucasus, Sibirien.  
 villosus DC., zottiger, 4. f. Persien.

**Ranunculus**

*falcatus* L. et *falcatus* MB. v. *Ceratocephalus falcatus* et *orthoceras*. *Ficaria* L. v. *Ficaria verna*.

**Raphanistrum** T., Hederich, XV. 1., Cruciferae.

*arvense* Wallr. (*Lampsana* G., *innocuum* Medik.), Acker-H., ☉. f. Europa.

a) album. β) ochroleucum. γ) sulphureum. δ) purpureum.

*Gayanum* Fisch. et Mey. (*Landra* Hort.), Gay's, ☉. f. ?Südeuropa.

*Landra* (Morett.), *Landra*-H., ♂. f. Italien.

*maritimum* Rchb. (Sm.), Meerstrands-H., ♂. 4. f. Engl.

*odessanum* Andrzej., Bess., Odessa'scher, ☉. f. Odessa.

*rostratum* Fisch., schnabelförmiger, ☉. f. Nordpersien.

**Raphanus** T., Rettig, XV. 1., Cruciferae.

*caudatus* L., geschwänzter, ☉. f. m. Java.

*sativus* L., gebauter, ☉. ♂. f. China.

β) *radicula* DC. b) *rotundus* Mill. c) *oblongus* DC. d) *oleiferus* DC. (*chinensis* Mill.). γ) *niger* DC. b) *vulgaris* DC. c) *rotundus* DC. d) *griseus* DC. e) *albus* DC. (*orbicularis* Mill.).

*cheiranthiflorus* W. v. *Brassica Cheiranthus*. *ibericus* MB. etc. v. *Chorispora iberica* etc. *laevigatus*

MB. vid. *Goldbachia laevigata*. *pterocarpus* P. vid.

*Enarthrocarpus pterocarpus*.

**Raphiolepis** Lindl., Hagestrauch, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.

*indica* Lindl., indischer, ♂. t. Ostindien, China.

*laevis* Lodd., glatter, ♂. t. China.

*latifolia* Lodd., breitblättriger, ♂. t. China.

*phaeostemon* Lindl., braunfädiger, ♂. t. China.

*rubra* Lindl., rother, ♂. t. Südchina.

*salicifolia* Ker, weidenblättriger, ♂. t. China.

**Rapistrum** Boerh., Rapsdotter, XV. 1., Cruciferae.

*glabrum* Host, kahler, ♂. f. Oesterreichisches Litorale.

*orientale* DC. (*Bunias raphanifol.* Sm.), morgenländischer, ☉. f. Creta, Griechenland.

*perenne* All. (*diffusum* Crtz), ausdauernder, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*rugosum* All., runzeliger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

*aegyptiacum* RB. v. *Ochthodium aegyptiacum*. *pa-*

*niculatum* G. v. *Neslia paniculata*.

**Raspailia** Brong. (Raspail, französischer Botaniker), V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.

*microphylla* Brong., kleinblättrige, ♂. t. k. C. d. g. H.

**Ratabida** *columnaris* Rafin. v. *Rudbeckia columnaris* etc.**Rauwolfia** Plum. (L. Rauwolf, ein Arzt und Naturforscher zu Augsburg, welcher den Orient bereiste), V. 1. (11.), Contortae-Apocynae.

*canescens* L., weißgrauliche, ♂. w. Westindien.

*nitida* L., glänzende, ♂. w. Südamerika.

*ternifolia* H. B. K., dreiblättrige, ♂. w. Südamerika.

*tomentosa* Jacq., filzige, ♂. w. Südamerika.

**Ravenala** *madagascariensis* Sonner. v. *Urania speciosa*.**Reaumuria** L. (A. F. de Réaumur, berühmter franz. Naturforscher), XIII. v., Aizoideae-Tamariscineae.

*hypericoides* W., johanniskrautähnliche, ♂. k. Syrien.

*vermiculata* L., wurmförmige, ♂. k. Sicilien, Aegypt., Syrien.

**Redoutea** Vent. (P. J. Redouté, berühmter französischer Pflanzenmaler), XVI. VIII., Malvaceae.

**Redoutea**

heterophylla Vent., verschiedenblättrige, ☉. w. Süd- am.

**Reevesia** Lindl. (John Reeves zu Canton), XVI. VIII.,  
Malvaceae-Büttneriaceae.

thyrsoides Lindl., strauchsblumige, ♀. t. China.

**Rehmanniana** Libosch., Rehmannie, XIV. II., Perso-  
natae-Bignoniaceae (*Gesneriaceae*).

chinensis Fisch. (*glutinosa* Libosch.), chinesische, 4. k.  
f. b. China.

**Reichardia** Roth (J. J. Reichard, Arzt und Botaniker  
zu Frankfurt a. M.), X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.  
hexapetala Roth, sechskronenblättrige, ♀. w. Ostindien.

**Reichenbachia** Spgl. (L. Reichenbach, Hofrath, Pro-  
fessor etc. zu Dresden, einer der berühmtesten Bota-  
niker), II. I., Nyctagineae.

hirsuta Spgl., rauhhaarige, ♀. w. Brasilien.

**Reimaria** Flügge (Reimarus, Naturforscher zu Hamburg),  
III. II., Gramineae.

purpurascens Lk., purpurfarbige, 4. w. ? Südamerika.

**Relhania** L'Her. (Rich. Relhan, englischer Botaniker),  
XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina.

paleacea L'Her. (*ericoides* Cass.), heideähnliche, ♀. k.  
Cap der guten Hoffnung.

santolinoides L'Her., santolinaähnliche, ♀. k. C. d. g. H.  
squarrosa L'Her., sparrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

II. Eclopes G.

genistaefolia L'Her., ginsterblättrige, ♀. k. C. d. g. H.  
pungens Ker (*lateriflora* Lk., *trinervis* et *quinquenervis*

Thbg.), stechende, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*lateriflora* L'Her. v. *Rhynchopsidium sessiliflorum*.

**Remirea** Aubl. (guianischer Name), III. I., Gramineae.  
maritima Aubl., Seestrands-R., 4. w. Südamerika.

**Renanthera** Lour., Strauchstendel, XX. I., Orchideae.  
coccinea Lour., scharlachblumiger, 4. ♀. w. Südchina.

**Renealmia** L. suppl. (Paul Renealme, alter franz.  
Arzt und Botaniker), I. I., Scitamineae (*Bananeae*).

exaltata L., hohe, 4. w. Westindien.

*nutans* Andr. v. *Alpinia nutans*. *Renealmia grandi-  
flora* RB., *paniculata* RB. etc. v. *Libertia grandi-  
flora* etc.

**Requienia** DC. (Requien zu Avignon, französischer  
Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-  
Papilionaceae.

obcordata DC., verkehrtherzförmige, ♀. w. Senegal.

**Reseda** T., Reseda, XI. III., Resedaceae.

abyssinica Fresen., abyssinische, ☉. f. Abyssinien.

alba L., weisse, ☉. f. Südeuropa.

bipinnata W., doppeltgefiederte, ♀. k. Spanien.

canescens L. (*hexagyna* Forsk.), weißgraue, 4. k. Spa-  
nien, Aegypten.

chinensis Lour., chinesische, ☉. f. Südchina.

crispata Lk. (*lanceolata* Lag.), krausblättrige, ☉. f.  
Portugal, Spanien.

dipetala Ait. (*capensis* Thhg.), zweikronenblättrige, ♂.  
k. Cap der guten Hoffnung.

fruticulosa L., strauchige, 4. ♀. f. k. Spanien, Sicilien.

glaucula L., blaugrüne, 4. f. Spanien, Aegypten.

globulosa Fisch. et Mey., kugelige, ♂. f. Schirvan.



**Reseda**

*inodora* Rchb. (*mediterranea* Hort.), geruchlose, ☉ f. Südeuropa.

*linifolia* Hornem., flachsblättrige, ☉. f. Südeuropa.

*lutea* L., gelbe, ♂. 4. f. Europa.

*Luteola* L., Wau-R., ☉. ♂. f. Europa.

*mediterranea* ? L., Jacq. (*tetragyna* Forsk.), mittelländische, ☉. f. Palästina, Nordafrika.

*myriophylla* Tenor., vielblättrige, ☉. f. Süditalien.

*odorata* L., wohlriechende, ☉. ♂. f. Nordafrika.

b) *frutescens* Hort.

*Phyteuma* L., spatelblättrige, ☉. f. Unterösterreich, Südeuropa.

*pruinosa* Delil., bereifte, 4. k. Aegypten.

*ramosissima* Pourr. (*erecta* Lag.), ästige, 4. f. Spanien.

*saxatilis* Pourr. (*stricta* P.), steife, 4. f. Spanien.

*scoparia* Brouss., besenartige, ♂. k. Teneriffa.

*sesamoides* L. (*stellata* Lam., *Clusii* Spgl., *purpurascens* L.), sternsamige, ☉. f. Westeuropa.

*truncata* Fisch. et Mey., abgestutzte, ? ☉. f. Natolien.

*undata* L., wellenblättrige, ♂. f. Südeuropa.

*virescens* Hornem., grünliche, ☉. f. Spanien.

**Restio** L., Strickgras, III. 1. (XXII. III.), Restiaceae.

*australis* RB., südliches, 4. ♂. k. Van-Diemens-Land.

*fastigiatus* RB., gipfelständiges, 4. ♂. k. Neuholland.

*gracilis* RB., schlankes, 4. ♂. k. Neuholland.

*lateriflorus* RB., seitenblumiges, 4. ♂. k. Neuholland.

*paniculatus* Rottb., rispiges, 4. ♂. k. Cap der gut. H.

*tectorum* Thbg., Dach-S., 4. ♂. k. Cap der gut. H.

*tetraphyllus* La Bill., vierblättriges, 4. ♂. k. V.-D.-L.

*vaginatus* Thbg., scheidiges, 4. ♂. k. Cap d. gut. H.

*virgatus* Rottb., ruthenförmiges, 4. ♂. k. Cap d. g. H.

*dichotomus* Thbg. v, *Thamnochortus dichotomus*.

**Retanilla** Brogn. (peruvianischer Name), V. 1., Rhamneae.

*Ephedra* Brogn., ephedraähnliche, ♂. k. Chili.

*obcordata* Brogn., verkehrtherzblättrige, ♂. w. Peru.

**Retzia** Thbg. (A. J. Retzius, Professor der Naturgeschichte zu Lund), V. 1., Convolvulaceae.

*spicata* Thbg., ährige, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

**Rhabdochloa** *cruciata* P. B., *mucronata* P. B. vid. *Dactyloctenium aegyptiacum* et *mucronatum*. *domingensis*

P. B. et *virgata* P. B. v. *Leptochloa domingensis* etc.

**Rhagadiolus** T., Sichelsalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*edulis* G., genießbarer, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*Hedypnois* Fisch. et Mey., röhrleinartiger, ☉. f. Schirvan.

*Kölpinia* W., gleichbreitblättriger, ☉. f. Caucasus, Sibir.

*stellatus* W., sternförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *intermedius* Tenor. (*lapsanoides* Dsf.).

**Rhagodia** RB., Beerenmelde, V. 1. (XXIII. II.), Aizoideae-Atripliceae.

*Billardieri* RB., La-Billardière's, ♂. k. Neuholland.

*hastata* RB., spontonblättrige, ♂. k. Neusüdwallis.

*nutans* RB., nickende, 4. k. Neuholland, V.-Diem.-L.

*parabolica* RB., parabolische, ♂. k. Neuholland.

**Rhamnus** T. L., Wegdorn, V. 1., Rhamneae.

*Alaternus* L., immergrüner, ♂. k. f. b. Süd- u. Westeuropa.

a) *balearica*. b) *hispanica*. c) *glabra*. d) *integrifolia*. e) *maculata*. f) *aurea*. g) *variegata*.

h) *argentea*. i) *laciniata*.

## Rhamnus

alnifolius L'Her., erlenblättriger, *h. f.* Nordamerika.  
 alpinus L., Alpen-W., *h. f.* Schweiz, Tyrol, Kärnthen etc.  
 buxifolius Poir., buchsbaumblättriger, *h. k.* Nordafrika.  
 carolinianus Walt., Mchx., carolinischer, *h. f.* Carolina.  
 catharticus L., gemeiner (Kreuzbeere), *h. f.* Europa.

*β)* hydriensis Hacq.

celtifolius Thbg., celtisblättriger, *h. k.* Cap d. g. H.  
 Clusii W. (*Alaternus angustifolia* A. B.), Clusius's, *h. k.*

Südfrankreich, Portugal.

crenulatus Ait., gekerbter, *h. k.* Teneriffa.

dahuricus Pall., dahurischer, *h. f.* Dahurien.

Erythroxyton Pall., Rothholz-W., *h. f.* Sibirien.

*β)* angustissimus Hort. Angl. (*lycioides* Pall.).

Frangula L. (*Frangula vulgaris* Rchb.), glatter (Faulbaum), *h. f.* Europa.

*b)* angustifolia Hort.

franguloides Mchx. (*alnifolius* var. DC.), faulbaumähnlicher, *h. f.* Nordamerika.

glandulosus Ait., drüsiger, *h. k.* Canarische Inseln.

hybridus L'Her. (*burgundicus* Hort., Par., *sempervirens* Hort.), Bastard-W., *h. f.* ?

infectorius L. (*longifolius* Mill.), färbender, *h. f.* Südeur.

integrifolius DC. (*coriaceus* N. E.), ganzblättriger, *h. k.* Teneriffa.

lanceolatus Pursh, lanzettblättriger, *h. f.* Nordamerika.

latifolius L'Her., breitblättriger, *h. k.* Azoren.

longifolius Dum. Cours., Dsf. (*Willdenowiana* R. et S.), langblättriger, *h. f.* ? Nordamerika.

lycioides L., bocksdornähnlicher, *h. k. f. b.* Spanien.

*β)* arragonensis Asso.

microphyllus W., H. B. K., kleinblättriger, *h. w.* Mexico.

oleoides L. (*oleifolius* Hort.), ölbaumähnlicher, *h. k.* Sicilien, Mauritanien, Griechenland.

Pallasii Fisch. et Mey., Pallas's, *h. f.* Nordpersien.

prinoides L'Her., winterbeerenähnlicher, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.

pubescens Poir. (*oleoides* Lam.), weichhaariger, *h. k. f. b.* Frankreich.

pumilus L., niedriger, *h. f.* Mittel- und Südeuropa.

Purshianus DC. (*alnifolius* Pursh), Pursh's, *h. f.* Nordam.

pusillus Tenor., zwergiger, *h. f.* Neapel.

rupestris Scop. (*pumilus* Wulf., *Wulfenii* Spgl., *Frangula* Wulfenii Rchb.), Felsen-W., *h. f.* Oesterreichisches Litorale.

saxatilis L., Gesteins-W., *h. f.* Mittel- und Südeuropa.

spathulaefolius Fisch. et Mey., spatelblättriger, *h. f.* Gegend des kaspischen Meeres.

surinamensis Scop., surinamischer, *h. w.* Surinam.

tetragonus L., vierkantiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.

theezans L., theegebender, *h. k. t.* China.

tinctorius W. K. (*cardiospermus* W.), Färber-W., *h. f.* Oesterreich, Ungarn.

valentinus W. (*pumilus* var. DC.), valencianischer, *h. f.* Spanien.

virgatus Roxb. (*catharticus* Hamilt.), ruthenförmiger, *h. f. b.* Nepal.

*capensis* Thbg. (et *laevigatus* Vahl etc.) v. *Ceanothus capensis*, *laevigatus* etc. *colubrinus* L. et *cubensis* L. etc. v. *Colubrina ferruginosa* etc. *iguaneus*

**Rhamnus**

Cav., *Jujuba* L. (et *Zizyphus* L.) etc. v. *Zizyphus iguanea*, *Jujuba et vulgaris* etc. *lineatus* L. (et *volubilis* L.) vid. *Berchemia lineata* etc. *Paliurus* L. v. *Paliurus aculeatus*.

**Rhapis** L. fil., Fächerpalme, VI. III. (XXIII. I.), *Palmae arundinacea* Ait., rohrartige, 4. h. t. w. Carolina. *flabelliformis* Ait., gemeine, 4. h. t. w. China, Japan. *acaulis* W. v. *Sabal Adansoni*.

**Rhaponticum** DC., Flockendistel, XIX. III., *Compositae-Cynarocephalae*.

*acaule* DC. (*Cynara acaulis* L., *humilis* Juss.), stengellose, 4. k. Nordafrika, Cypern.

*atriplicifolium* DC., meldenblättrige, 4. f. Dahurien.

*cynaroides* Less., artischockenähnliche, 4. f. b. Pyren.

*pulchrum* Fisch. et Mey., schöne, 4. f. Caucasus.

*scariosum* DC. (? *Pallasii* G. Don), trockenhäutige, 4.

f. b. Schweiz, Savoyen, Piemont, Frankreich.

β) *lyratum* DC.

*uniflorum* DC., einblumige, 4. f. b. Sibirien, Dahurien.

**Rheedia** Plum., L. (Heinr. Adrian van Rheede tot Drakenstein, Statthalter der holländisch-ostindischen Compagnie auf Malabar, großer Beförderer der Botanik), XII. III., *Guttiferae*.

*lateriflora* L., seitenblumige, h. w. Antillen.

**Rheum** L., Rhabarber, IX. I., *Portulacaceae-Polygonaceae*.

*australe* D. Don (*Emodii* Wall.), nepal'scher, 4. f. Nepal.

*caspicum* W., caspischer, 4. f. Gegend d. caspischen M.

*compactum* L., lederblättriger, 4. f. Tatarei, China.

*crispum* Ledeb., krauser, 4. f. Sibirien.

*hybridum* Ait., Bastard-R., 4. f. Nordasien.

*leucorrhizum* Pall., weifswurzeliger, 4. f. Sibirien.

*nutans* Fisch., nickender, 4. f. Sibirien.

*palmatum* L., handförmiger, 4. f. Mongolei, China.

*Rhaponticum* L., stumpfblättriger, 4. f. Thracien, Sibir.

*Ribes* L., rauhblättriger, 4. f. Syrien, Persien.

*tataricum* L. suppl., tatarischer, 4. f. Tatarei.

*undulatum* L., wellenblättriger, 4. f. China, Sibirien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *crassinervium* Hort.,

*fenestratum* Anders., *sibiricum* Hort., *tauricum* Hort.

*austriacum* H. C. v. *Rumex alpinus*. *digynum* Wahlbg.

v. *Oxyria reniformis*.

**Rhexia** P. Br., Rhexie, VIII. I. (X. I.), *Lythraeae-Melastomeae*.

*angustifolia* Nutt. (*mariana* γ. *exalbida* Mchx.), schmalblättrige, 4. k. f. b. Georgien, Carolina.

*ciliolata* Mchx., gefranzte, 4. k. t. Südcarolina.

*diversifolia* Domb., verschiedenblättrige, h. w. Peru.

*Drummondii* H. Angl., Drummond's, 4. k. Nordamerika.

*hypericoides* W. (*villosissima* Rich.), johanniskrautähnliche, ☉. w. Cayenne.

*mariana* L., maryländische, 4. k. f. b. Nordamerika.

β) *rubella* Pursh.

*subtriplinervia* H. Berol. (*elegans* et *floribunda* Hort.), weifsbäumige, h. w. ?

*virginica* L., virginische, 4. k. f. b. Nordamerika.

*Acisanthera* L. vid. *Acisanthera quadrata*, *aquatica*

L. vid. *Aciotis aquatica*. *Fontanesii* H. B. K. (et

*holosericea* Bonpl. et *viminea* Bot. reg. vid. *Ple-*

*roma granulosa* etc. *glomerata* Lodd. v. *Osbeckia*



**Rhexia**

glomerata. lanceolata Bonpl. v. Chaetogastra lanceolata. versicolor Lindl. v. Arthrostemma versicolor.

**Rhinanthus** L., MB., Nasenblume, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

Elephas L., rüsselförmige, ☉. f. Calabrien, Kleinasien. Alectorolophus Poll. etc. v. Alectorolophus hirsutus etc. Trixago W. v. Trixago rhinanthina.

**Rhinopetalum** Fisch., Nasenlilie, VI. I., Coronariae Karelini Fisch., Karelin's, 4. Zw. f. Ural.

**Rhipidodendron dichotomum** W. et distichum W. vid Aloe dichotoma et plicatilis.

**Rhipsalis** G. (Hariota Adans), Peitschencactus, XII. I., Cactaeae.

Cassytha G. (pendula Hort., Cassytha baccifera Mill.), hängender, ♀. w. Jamaica, Hispaniola, Mexico.

a) Swartziana DC. β) Hookeriana DC. γ) Moeniana DC. δ) dichotoma DC. ε) mauritiana DC. ζ) pendula Salm.

Cereuscula Haw., kleiner, ♀. w. Brasilien.

fasciculata Haw. (parasitica Haw.), büschelförmiger, ♀. w. Caribäen.

floccosa Salm (Cassytha β. major H. Dyck.), flockiger, ♀. w. ?

funalis Salm (grandiflorus Haw., calamiformis Hort.), riemenförmiger, ♀. w. Südamerika.

β) minor (Cassytha δ. pilosiuscula Salm.).

mesembrianthoides Haw. (salicornioides β. Haw., echinata Hort.), zaserblumenähnlicher, ♀. w. Südamerika.

micrantha DC., kleinblumiger, ♀. w. Quito.

pentaptera Pfr., fünfflügeliger, ♀. w. Brasilien.

trigona Pfr., dreikantiger, ♀. w. Brasilien.

undulata Pfr. (parasitica DC.), wellenförmiger, ♀. w. Caribäen.

salicornioides Haw. v. Hariota s. Nchtr.

**Rhizophora** L., Wurzelträger, XI. I. (VIII. I.), Rhizophoreae.

Mangle L., keulfrüchtiger, ♀. w. Ost- und Westindien.

**Rhodanthe** Lindl., Rosenimmortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Manglesii Lindl., Mangles's, ☉. t. Neuholl. (Schwanenfl.).

**Rhodiola** L., Rosenwurz, XXII. VII., Corniculatae-Crassulaceae.

rosea L., gemeine, 4. f. Mitteleurop. Alpen, England.

sibirica Hort., sibirische, 4. f. Sibirien.

**Rhodochiton volubile** Zuccar. vid. Lophospermum atrosanguineum.

**Rhododendron** L., Alpenrose (Alpenbalsam), X. I., Ericaceae.

I. Buramia DC. (Booram G. Don).

arboreum Sm., baumartige, ♀. k. t. Nepal.

a) puniceum Roxb. (sanguineum Lindl.). β) roseum Lindl., Swt. γ) album Wall. (niveum Swt.).

δ) cinnamomeum Lindl. ε) strictum Lodd. ζ) zeylanicum Lodd. b) Loddigesii H. Angl. c)

Duncaster H. Angl. d) King Alfred H. Angl. etc.

Hybriden: venustum D. Don, Altaclerense Lindl., Smithii Swt., undulatum D. Don, Hook., Russe-

lianum Swt., Drummondii H. Angl., Manglesii H. Angl., Neillii H. Angl., augustum, blandum, Chel-

soniae, coccineum, nepalense, elegans, Waeheri H.

## Rhododendron

Dresd., Liebigii Seidel, Lehmanni Liebig, Seidelianum Liebig, Terscheckianum Liebig etc.

barbatum G. Don, Wall., bärtige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Nepal.

Noch nicht eingeführte:

formosum Wall., schöne,  $\frac{1}{2}$  t. Silhet.

linearifolium Poir., gleichbreitblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. Ostindien.

### II. Hymenanthus Blum.

Metternichii Sieb. et Zucc. (*maximum* Thbg., ?*scabrum*

G. Don, *Hymenanthus japonica* Blum.), Metternich's,  $\frac{1}{2}$  k. Nordjapan (noch nicht eingeführt).

### III. Eurhododendron DC. (*Brachycalyx* Swt., *Ponticum* et *Lephipherum* G. Don).

campanulatum D. Don, Wallich, glockenblumige,  $\frac{1}{2}$  t. Ostindien.

catawbiense Mchx., Catawba-A.,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nordamerika.

b) Russelianum H. Angl. c) tigrinum H. Anglor.

caucasicum Pall., caucasische,  $\frac{1}{2}$  f. b. Caucasus.

$\beta$ ) stramineum Hook.  $\gamma$ ) pulcherrimum Lindl.

$\delta$ ) Nobleanum Lindl.

chrysanthum Pall. (*aureum* Georg., *officinale* Salisb.), goldblumige,  $\frac{1}{2}$  f. b. Sibirien, Kamtschatka.

dahuricum L., dahurische,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien, Mongolei.

a) sempervirens Hook.  $\beta$ ) roseum DC.  $\gamma$ ) altaicum Fisch. (*atrovirens* Ker).

Farrerae Tate, Swt., Farrera's,  $\frac{1}{2}$  k. t. China.

ferrugineum L., rostfarbige,  $\frac{1}{2}$  f. b. Mitteleurop. Alpen.

$\beta$ ) albiflorum DC. (*album* Swt.).

hirsutum L., behaarte,  $\frac{1}{2}$  f. b. Mitteleuropäische Alpen.

b) variegatum.

lapponicum Wahlenb., lappländische,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nördlichstes Europa und Amerika.

lepidotum Wall., schülferige,  $\frac{1}{2}$  t. Ostindien.

macrophyllum G. Don, großblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nordam.

maximum L. (*procerum* Salisb.), größte,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nordam.

$\beta$ ) bigener DC. (*fragrans* Hort., *hybridum bigener* Lindl.).  $\gamma$ ) hybridum Hook. (?*latifolium* Hffg.).

ponticum L., pontische,  $\frac{1}{2}$  f. b. Kleinasien, Südspan.

$\beta$ ) Lowei Loud.  $\gamma$ ) hyacinthiflorum DC.  $\delta$ )

myrtifolium Lodd.  $\epsilon$ ) azaleoides Dsf. (*subdeciduum* Andr.). b) odoratum Lodd.  $\zeta$ ) obtusum

Wats. (?*ellipticum* Hoffmsg.).

Gartenvarietäten: album, angustifolium, angustissimum, arbutifolium, bromeliaefolium, bullatum, casinefolium, coerulescens, contortum, crispum, flore pleno, fol. argenteis, fol. aureis, fol. marginatis, frondosum, grandiflorum, incarnatum, intermedium, kalmiaefolium, macrophyllum, nivaticum, obtusum, ovatum, pygmaeum, roseum, salicifolium, spectabile, violaceum etc.

punctatum Andr. (*minus* Mchx., *parviflorum* Hort.), punktirte,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Nordamerika.

purpureum G. Don (*maximum*  $\gamma$ . *purpureum* Pursh), purpurfarbige,  $\frac{1}{2}$  f. b. Virginien, Carolina.

Purshii G. Don (*maximum*  $\beta$ . *album* Pursh), Pursh's,  $\frac{1}{2}$  f. b. Nordamerika.

$\beta$ ) majus Ker.

setosum D. Don, borstige,  $\frac{1}{2}$  k. t. Nepal.

Noch nicht eingeführte: album Blum. (Java), brachycarpum G. Don (Japan), celebicum DC. (Ost-

**Rhododendron**

indien), javanicum Benn., Blum. (Java), malayanum Jack (Sumatra), palustre Turcz. (Südsibirien), retusum Benn. (Sumatra), tubiflorum DC. (Blum.) (Java).

## IV. Pogonanthum G. Don.

anthopogon D. Don, Wall. (*aromaticum* Wall.), dichtblumige, f. t. Ostindien.

V. Tsutsusi G. Don (*Beverinckia* Salisb., *Loiseleuria* Rchb.).

albiflorum Hook., weißblumige, f. f. b. Nordamerika.  
indicum Swt., indische, f. f. t. k. Java, Japan, China.

a) puniceum Swt. β) purpureum Sims. γ) ignescens Swt. δ) lateritium Lindl. ε) variegatum (Lindl.). ζ) incarnatum DC. (*Azalea indica plena* Sims).

ledifolium G. Don, DC., borstblätterige, f. t. k. China.

a) leucanthum Bunge (? *mucronatum* G. Don).  
β) phoeniceum G. Don. b) speciosum Swt. (*indicum speciosum* Swt.).

pulchrum Swt. (*R. indicum Smithii* Swt., *indicum pulchrum* G. Don), schöne, f. t. Ostindien.

Hybriden und Varietäten: angustifolium Blum., aurantiacum G. Don, Danielsianum Paxt., elatum plenum H. Angl., floribundum Blum., grandiflorum Blum., luteum Swt., Rawsonii Paxt., spathulatum Blum. etc.

Noch nicht eingeführt: Burmanni G. Don (Japan).  
Unbekanntere: decumbens D. Don, molle G. Don, micranthum Turcz., mucronulatum Turcz., reticulatum D. Don.

Hybriden, von Rhododendrons und Azaleen gezogen: Cartonianum Lindl., enneandrum DC., Govenianum Swt., Seymouri (Lindl.) etc.

*arborescens* Torr. etc. vid. *Azalea arborescens*.  
*Rhodora* G. Don (*pulchellum* Salisb.) vid. *Rhodora canadensis*.

*Chamaecistus* L. etc. v. *Rhodothamnus* Cham. etc.

**Rhodora** Duham., Sumpfrosee, X. 1., Ericaceae.

canadensis L., canadische, f. f. b. Nordamerika.

**Rhodothamnus** Rchb., Röschenstrauch, X. 1., Ericaceae.

*Chamaecistus* Rchb., drüsiger, f. f. b. Oesterreich., kärnthn., tyroler, salzburger etc. Alpen.

kamtschaticum (Pall.), kamtschatkaiser, f. f. b. Kamtschatka, westliches Nordamerika.

**Rhopala** Aubl. (guianischer Name), IV. 1., Proteaceae.

dentata RB., zahnblätterige, f. t. Guiana.

media RB. (*montana* Aubl.), mittlere, f. t. Guiana.

sessilifolia Rich., stiellosblätterige, f. t. Guiana.

**Rhus** T., Sumach, V. 111., Amyrideae-Terebinthaceae.

acuminata DC., zugespitzter, f. t. k. Nepal.

alata Thbg., flügelstieliger, f. k. Cap der gut. Hoffn.

albida Schousb. (*albicans* W.), weißlicher, f. k. Marocco.

angustifolia L., schmalblätteriger, f. k. Cap d. gut. H.

aromatica Ait., wohlriechender, f. f. Nordamerika.

Bucku-Amela Roxb. (*Amela* D. Don), Bucku-S., f. t. k. Nepal.

Burmanni DC. (*lucida* H. Kew.), Burmann's, f. k. Cap der guten Hoffnung.

caustica Hook., ätzender, f. t. Chili.

Cavanillesii DC. (*lucida* Cav.), Cavanilles's, f. t. Mexico.



## Rhus

chinensis Mill., chinesischer, *h. k.* China.  
 ciliata Lichtstn., gefranzter, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 Commersonii Poir., Commerson's, *h. w.* Südamerika.  
 concinna Burch., netter, *h. k.* Cap der gut. Hoffnung.  
 copallina L., Copal-S., *h. f.* Nordamerika.

## β) leucantha Jacq.

Coriaria L., Gerber-S., *h. f.* Südeuropa, Syrien, Palästina.  
 Cotinus L., Perrücken-S., *h. f.* Südeuropa.  
 crenata Thbg., gekerbter, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 cuneifolia L. (? *grandidentata* Burch.), keilblättriger, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 dentata Thbg. (? *spicata* Thbg.), gezahnter, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 digitata L., fingerförmiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 dioica Brouss., zweihäusiger, *h. k.* Mogadore.  
 dissecta Thbg., zerschnittener, *h. k.* Cap der gut. H.  
 elegans Ait. (*glabra coccinea* Loud., *caroliniana* Mill.), schöner, *h. f.* Nordamerika.  
 elliptica Thbg., elliptischer, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 excisa Thbg., ausgeschnittener, *h. k.* Cap d. gut. H.  
 fragrans W., wohlriechender, *h. k.* Cap der gut. H.  
 fraxinifolia D. Don, eschenblättriger, *h. t. k.* Nepal.  
 glabra L., kahler, *h. f.* Nordamerika.

## a) hermaphrodita. β) dioica Lam.

glauca Thbg., blaugrüner, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 heterophylla DC., verschiedenblättriger, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 javanica L., javaischer, *h. t.* Japan, China, Ostindien.  
 incisa Thbg., schlitzbilättriger, *h. k.* Cap der gut. H.  
 laevigata W. (*trifoliata* W., *elongata* Jacq.), glatter, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 lineata P. (*lineatifolia* Orteg. Lag.), linirter, *h. w.* Cuba.  
 lobata Poir., gelappter, *h. k.* Teneriffa.  
 lucida L., spiegelnder, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 Metopium L., Corallen-S., *h. w.* Westindien.  
 micrantha Thbg., kleinblumiger, *h. k.* Cap der gut. H.  
 mucronata Thbg., stachelspitziger, *h. k.* Cap d. gut. H.  
 nervosa Poir., nerviger, *h. k.* Cap der guten Hoffn.  
 obliqua Thbg., schiefblättriger, *h. k.* Cap der gut. H.  
 oxyacantha Schousb. (*crataegifolium* P.), weifsdornähnlicher, *h. k.* Marocco.  
 paniculata Wall., rispiger, *h. t.* Nepal.  
 pauciflora L., wenigblumiger, *h. k.* Cap der gut. H.  
 pendulina Jacq., herabhängender, *h. k.* Cap d. g. H.  
 pentaphylla Dsf., fünfblättriger, *h. k.* Nordafrika, Sicilien.

## β) Thezera P.

pubescens L., Thbg., weichhaariger, *h. k.* Cap d. g. H.  
 pumila Mchx., zwergiger, *h. f.* Carolina.  
 pyroides Burch., birnenähnlicher, *h. k.* Cap d. gut. H.  
 radicans L., starkwurzelter, *h. f.* Nordamerika.

## β) volubilis Mill., Sch. γ) microcarpa Loud., Sch.

rigida Mill., starrer, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.  
 rosmarinifolia Vahl, rosmarinblättriger, *h. k.* C. d. g. H.  
 schinoides W., schinusähnlicher, *h. w.* Brasilien.  
 semialata Murr., halbgeflügelter, *h. t. w.* Ostind., China.  
 serraefolia Burch., sägeblättriger, *h. k.* Cap d. g. H.  
 sinuata Thbg., buchtiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.  
 suaveolens Ait. (*Myrica trifoliata* Hort.), wohlriechender, *h. f.* Nordamerika.

**Rhus**

- succedanea L., japanischer,  $\frac{1}{2}$  k. Japan.  
 Sumae Targ. Tozzet., italienischer,  $\frac{1}{2}$  f. Mittelitalien.  
 Thunbergiana R. et S., Thunberg's,  $\frac{1}{2}$  k. C. d. g. H.  
 tomentosa L., filziger,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der guten Hoffnung.  
 Toxicodendron L. (*T. quercifolium* Mchx., *T. pubescens*  
 et *serratum* Mill.), Gift-S.,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 tridactyla Burch., dreifingeriger,  $\frac{1}{2}$  k. Cap d. gut. H.  
 tridentata L., dreizähniger,  $\frac{1}{2}$  Sch. k. Cap d. gut. H.  
 trijuga Poir., dreijochiger,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 typhina L., virginischer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
     a) arborescens W. b) fol. variegatis Hort.  $\beta$ )  
     frutescens W.  
 undulata Jacq., wellenblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Cap d. gut. H.  
 vernicifera DC. (*Vernix* Thbg., *juglandifolium* Wall.),  
 firnisgebender,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Japan.  
 Vernix L. (*venenata* DC.), amerikanischer Firniss-S.,  $\frac{1}{2}$   
 f. Nordamerika.  
 villosa L. (*atomaria* Jacq.), zottiger,  $\frac{1}{2}$  k. C. d. g. H.  
 viminalis Vahl (*lanceum* Thbg.), weidenblättriger,  $\frac{1}{2}$  k.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 viridiflora Poir (*canadensis* Mill.), grünblumiger,  $\frac{1}{2}$  f.  
 Nordamerika.  
 zizyphina Tineo (*oxyacanthoides* P., *dioica* G. Don,  
*Rhamnus tripartita* Ucria), zizyphusähnlicher,  $\frac{1}{2}$  k.  
 Sicilien, Nordafrika.  
     obscurum MB. v. *Pterocarya caucasica*. *zeylunicum*  
     Burm. v. *Omphalobium indicum*.

**Rhynchosidium** Cass., DC., Schnabelkraut, XIX. II.,  
Compositae-Corymbiferae.

sessiliflorum DC., stiellosblumiges,  $\odot$  f. Cap d. g. H.

**Rhynchosia** Lour., Schnabelschiffchen, XVII. IV. (VI.),  
Leguminosae-Papilionaceae.

angustifolia DC., schmalblättriges,  $\frac{1}{2}$  Sch. k. t. Cap  
 der guten Hoffnung.

biflora DC., zweiblumiges,  $\odot$  Sch. m. w. Ostindien.

caribaea DC., caribäisches,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Westindien.

difformis DC., ungestaltetes,  $\frac{1}{2}$  Sch. f. Nordamerika.

erecta DC., aufrechtes,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.

Fredericiana DC., Frederic's,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Südamerika.

minima DC., kleinstes,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Jamaica.

mollis DC., weiches,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Guinea.

phaseoloides DC., bohnenähnliches,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Jamaica.

precatoria DC., scharlachsamiges,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Mexico.

reniformis DC., nierenförmiges,  $\frac{1}{2}$  Sch. k. Carolina.

reticulata DC., netzblättriges,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Jamaica.

rhombifolia DC., rautenblättriges,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostind.

scarabaeoides DC., käferähnliches,  $\odot$  Sch. w. Ostind.

suaveolens DC., wohlriechendes,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

violacea DC., veilchenähnliches,  $\frac{1}{2}$  w. Guiana.

viscida DC., schmieriges,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

viscosa DC., klebriges,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

volubilis Lour., windendes,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

**Rhynchospora** Vahl, Schnabelriet, III. I., Cyperaceae.

alba Vahl, weisses,  $\frac{1}{2}$  f. Europa, Nordamerika.

aurea Vahl, goldfarbiges,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.

fusca Vahl, braunes,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.

polyphylla Vahl (*comata* Lk.), vielblättriges,  $\frac{1}{2}$  w.  
 Westindien, Brasilien.

**Ribes** T. L., Johannisbeere (Stachelbeere), V. 1., Grossularieae (*Ribesiae*).

I. **Grossularia** T., Stachelbeere.

*aciculare* Sm. (*Uva crispa* Siever's), nadelstachelige, ♀. f. Sibirien.

*Cynosbati* L., stachelfrüchtige, ♀. f. Nordamerika.

*divaricatum* Dougl. (*triflorum* variet. Auct.), ausgesperrte, ♀. f. Nordamerika.

*gracile* Mchx., schlanke, ♀. f. Nordamerika.

**Grossularia** L. (*Uva crispa* var. *sativa* DC., *Grossularia hirsuta* Mill.), haarige (Stachelbeere), ♀. f. Europa, Sibirien.

β) *Uva crispa* L. γ) *spinosissima* Berland. δ) *reclinata* Berl. (*reclinatum* L.). ε) *Besseriana* Berland. (*hybridum* Bess.). ζ) *subinermis* Berl. η) *macrocarpa* Berl. θ) *bracteata* Berl.

Gartenvarietäten: the red Champagne, Horseman's green Gage, the red Rose etc.

*hirtellum* Mchx., kurzhaarige, ♀. f. Nordamerika.

*irriguum* Dougl. (? *triflorum* var. Auct.), Bach-St., ♀. f. Nordamerika.

*Menziesianum* Pursh (*Menziesii* Sm.), Menzies's, ♀. k. f. b. Nordwestliches Amerika.

*niveum* DC., Lindl., schneeweiße, ♀. f. Nordwestl. Amerika.

*oxyacanthoides* L., weißdornähnliche, ♀. f. Nordamer.

*rotundifolium* Mchx., rundblättrige, ♀. f. b. Carolina.

*setosum* Lindl., borstige, ♀. f. Nordamerika.

*speciosum* Pursh (*stamineum* Sm., *fuchsoides* Flor. Mexic., *triacanthum* Menzies), prächtige, ♀. k. f. b. Californ.

II. **Botryocarpum** Rich. DC.

*Diacantha* L. fil., zweistachelige, ♀. f. Sibirien.

*lacustre* Poir. (*echinatum* Dougl., ? *oxyacanthoides* Mchx.), Teich-S., ♀. f. Nordamerika.

*orientale* Dsf., morgenländische, ♀. f. Syrien.

*saxatile* Pall. (? *alpinum* Sievers), Gesteins-St., ♀. f. Sibir.

III. **Ribesia** Berl. DC. (Johannisbeere).

*albinerve* Mchx., weißnervige, ♀. f. Canada.

*alpinum* L., Alpen-J., ♀. f. Europa.

b) *fol. variegat.* Hort. a) *sterile* Wallr. β) *bacciferum* Wallr. γ) *pumilum* Lindl.

*atropurpureum* C. A. Mey., schwarzpurpurrothe, ♀. f. Sibir.

*Biebersteinii* Berl. (*caucasicum* MB.), Bieberstein's, ♀. f. Caucasus.

*carpathicum* Kit. (*acerrimum* Roch.), carpathische, ♀. f. Carpathen.

*cereum* Dougl., wachsfarbige, ♀. f. Nordwestamerika.

*floridum* L' Her. (*nigrum* β. L., *pensylvanicum* Lam., *recurvatum* Mchx.), blüthenreiche, ♀. f. Nordamer.

b) *grandiflorum* Hort. c) *parviflorum* Hort.

*fragrans* Pall., wohlriechende, ♀. k. Ostsibirien.

*glaciale* Wall., Gletscher-J., ♀. f. b. Nepal.

*glandulosum* R. et P., drüsige, ♀. k. f. b. Chili.

*hudsonianum* Richards. (*petiolare* Dougl.), Hudsonsbai-J., ♀. f. Hudsonsbai.

*inebrians* Lindl., trunkenmachende, ♀. f. Nordamerika.

*laxiflorum* Pursh (*affine* Dougl., *prostratum laxiflor.* Loud.), lockerblumige, ♀. f. Nordwestliches Amerika.

*multiflorum* Kit. (*spicatum* Schult.), vielblumige, ♀. f. Croatien.

*nigrum* L. (*olidum* Mch), schwarze, ♀. f. Europa, Sibir.



**Ribes**

- b) bacca flava Hort. c) bacca viridi Hort. d) fol. variegatis Vilmorin.  
 petraeum Wulf., Felsen-J., ♀. f. Mitteleurop. Voralpen.  
 procumbens Pall. (*polycarpon* Gmel.), niederliegende, ♀. f. Dahurien.  
 prostratum L. (*glandulosum* Ait.), hingestreckte, ♀. f. Nordamerika.  
 punctatum R. et P., punktirte, ♀. k. Chili.  
 resinum Pursh, harzige, ♀. f. Nordamerika.  
 rigens Mchx., starre, ♀. f. Nordamerika.  
 rubrum L., gemeine J., ♀. f. Europa, Sibirien.  
     a) sylvestre DC. β) hortense DC. γ) carneum Berland. δ) variegatum DC. ε) album DC.  
     b) foliis albo variegat. Duham, c) foliis luteo variegat. Duham.  
 sanguineum Pursh (*Calobotrya sanguinea* Spach), blutrothe, ♀. f. b. Nordamerika.  
     β) glutinosum Benth. (*augustum* Dougl.). γ) malvaceum Benth. δ) atrorubens Hort. ? ε) opulifolium Hort.  
 spicatum Robs., ährige, ♀. f. England.  
 trifidum Mchx., dreispaltige, ♀. f. Nordamerika.  
 triste Pall. (*altaicum* Pall.), traurige, ♀. f. Sibirien.  
 viscosissimum Pursh (*Coreosma viscosissima* Spach), schmierige, ♀. f. Nordamerika.  
 IV. *Symphocalyx* Berland. (*Chrysobotrya* Spach).  
 aureum Pursh (*Chrysobotrya revoluta* Spach), goldfarbige, ♀. f. Nordamerika.  
     a) praecox Lindl. β) villosum DC. (*longiflorum* Fras.). γ) serotinum Lindl.  
 flavum Colla (*aureum sanguineum* Lindl., *palmatum* Dsf., *aureum* Ker, *C. intermedia* Spach.), hellgelbe, ♀. f. Nordamerika.  
 tenuiflorum Lindl. (*aureum* Colla, *flavum* Berl., *missouriense* Hort., *C. Lindleyana* Spach), dünnblumige, ♀. f. Nordamerika.

a) fructu nigro. b) fructu luteo.

**Richardia** Kunth (L. C. Richard, berühmter französischer Botaniker), VII. 1. (XXI. 1.), Aroideae.

aethiopica Kunth, aethiopische, 4. Wa. k. t. Südafrika.

**R. pilosa** R. et P. et *scabra* L. vid. *Richardsonia pilosa* et *scabra*.

**Richardsonia** H. B. K. (J. Richardson, ein englischer Botaniker und Begleiter des Capitain Franklin nach dem Nordpol), VI. 1., Rubiaceae.

*pilosa* H. B. K., haarige, ☉. m. f. Südamerika.

*scabra* H. B. K., scharfe, ♂. ♀. m. Neuspanien.

*stellaris* Cham., sternförmige, ☉. m. f. Brasilien.

**Ricinus** T., Wunderbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

I. Genuin.

*africanus* W. (*communis* Dsf.), afrikanischer, ♂. ♀. t. Nordafrika.

*armatus* Andr., bewaffneter, ☉. m. f. Malta.

*communis* L., gemeiner, ☉. m. f. Ostindien.

*inermis* Jacq., unbewehrter, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Ostind.

*lividus* Jacq. (*communis* Thbg.), bleifarbener, ☉. ♀. m. f. t. Cap der guten Hoffnung.

*speciosus* N. L. Burm., prächtiger, ☉. ♀. m. f. t. Ostind.

**Ricinus**

viridis W., grüner, ☉. m. f. Ostindien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *macrophyllus*,  
*undulatus*.

**II. Mappa Adr. Juss.**

*globosus* W., kugelnkapseliger, ☿. w. Jamaica.

*tanarius* L., tanarischer, ☉. ☿. w. Molucken.

**Ricotia** L., Ricotie, XV. II., Cruciferae.

*Lunaria* L. (*aegyptiaca* L.), mondviolenähnliche, ☉. f. Syrien.

**Riedlea** Vent. (*Riedleia* DC.), (M. Riedle, Begleiter des  
Capitain Baudin auf der Reise um die Welt), XVI.  
II., Malvaceae-Hermannieae.

*borbonica* DC., borbonische, ☿. w. Mascarenas.

*caracasana* DC., caracasische, ☿. w. Südamerika.

*concatenata* DC., kettenförmige, ☿. w. Ostind., Westafrika.

*corchorifolia* DC., corchorusblättrige, ☉. w. m. f. Ostind.

*depressa* DC., niedergedrückte, ☿. w. Westindien.

*nodiflora* DC., knotenblumige, ☿. w. Westind., Mascaren.

*supina* DC., liegende, ☿. w. Ostindien.

*truncata* DC., abgestutzte, ☿. w. Ostindien.

*velutina* DC., sammethaarige, ☿. w. Ostindien.

**Rindera** Pall. (Rinder, Arzt in Moskau, Entdecker der  
Pflanze), V. I., Asperifoliaceae.

*laevigata* R. et S. (*tetraspis* Pall.), glatte, 4. f. Sibirien.

**Ripidium** Trin. v. Erianthus.**Ripogonum** Forst., Rohrsmilacine, VI. I., Sarmentaceae  
(*Asparagineae*).

*album* RB., weisse, 4. Sch. k. Neuholland.

*parviflorum* RB., kleinblumige, 4. Sch. k. Neuholland.

**Ritchiea** R. B. (M. Ritchie, ein englischer Reisender,  
welcher 1820 zu Tripolis ermordet wurde), XI. I.,  
Capparideae.

*fragrans* RB., wohlriechende, ☿. Sch. w. Sierra Leone.

**Rivinia** Plum. (A. Q. Rivinus, Professor zu Leipzig,  
einer der ausgezeichnetsten Botaniker), IV. I., Aizo-  
ideae-Phytolacceae.

*brasiliensis* Nocca (*glabrata* Humb.), brasilianische, ☿.  
w. Brasilien.

*humilis* L., niedrige, ☿. w. Westindien.

β) *canescens* W.

*laevis* L., glatte, ☿. w. Westindien.

*lanceolata* W., lanzettblättrige, ☿. w. Brasilien.

*octandra* L., achtmännige, ☿. w. Südamerika.

*purpurascens* Schrad. (*puberula* Humb.), purpurfarbige,  
☿. w. Westindien.

*tinctoria* Hamilt., färbende, ☿. w. Caracas.

**Robergia** Schreb. (Laurent. Roberg, Professor der Me-  
dicin zu Upsala), X. IV., Amyrideae-Connaraceae.

*frutescens* W., strauchige, ☿. ☿. w. Guiana.

**Robertia** DC. (M. Robert, corsicanischer Botaniker),  
XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*pinnatifida* Spgl., fiederspaltige. ♂. f. Neapel.

*taraxacoides* DC., löwenzahnähnliche, 4. f. b. k. Corsica.

**Robertsonia** Haw. v. Saxifraga.**Robinia** L. (Jean Robin, Gartenintendant zu Paris  
unter Heinrich IV.), Schotendorn, XVII. IV. (VI.),  
Leguminosae-Papilionaceae.

*guineensis* W., guineischer, ☿. w. Sierra Leone.

*hispida* L. (*rosea* Du Ham., *montana* Bartr.), steifhaariger,  
☿. f. b. Nordamerika.

## Robinia

- β) nana DC. γ) rosea Pursh. δ) macrophylla Schrad. (*grandiflora* Hort.).  
 hybrida Audib. (*dubia* Fauc., *ambigua* Poir., ?*echinata* Mill., *intermedia* Soul. Bod.), Bastard-R., ♀. f. Nordam.  
 Pseudacacia L., gemeiner (unächter Akazienbaum), ♀. f. Nordamerika.

- β) flore luteo Dum. C. γ) inermis DC. δ) crispa DC. ε) umbraculifera DC. (*inermis* Dum. C.).  
 ζ) tortuosa DC. η) sophoraefolia Lodd. θ) amorphaeifolia Lk. υ) stricta Lk. χ) procera Lodd. λ) pendula Ort. μ) monstrosa Lodd. ν) macrophylla Lodd. ξ) microphylla Lodd. (*angustifolia* Hort.). ο) spectabilis Dum. C. π) latisiliqua Prince's Cat.

purpurea Lk., purpurfarbige, ♀. t. ? Peru.

viscosa Vent. (*glutinosa* Curt., *montana* Bartr.), klebrige ♀. f. Nordamerika.

*Altagana* L'Her. (et *Caragana* L. etc.) v. *Caragana* Altagana, arborescens etc. *candida* Roxb. (et *suberosa* Roxb.) vid. *Tephrosia candida* et *suberosa capensis* Burm. vid. *Virgilia robinoides coccinea* Aubl. v. *Ormosia coccinea*. *Halodendron* Pall. (et *triflora* L'Her.) v. *Halodendron argenteum* et *subvirescens*. *mitis* L. (et *uliginosa* W.) v. *Pongamia glabra* et *uliginosa*. *sericea* Poir. (et *violacea* L. Jacq.) v. *Lonchocarpus sericeus* et *violaceus*. *squamata* Vahl v. *Pictetia squamata*.

*Roechia* DC. v. *Laroechia*.

**Rodigia** Spgl. (Rodig, K. S. pens. Amtmann, Freund der Botanik), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

*alliata* G. Don, knoblauchduftende, ♂. f. Sicilien.

*commutata* Spgl., verwechselte, ♂. f. Sicilien, Griechenl.

*laevigata* Spgl., glatte, ♂. f. Nordafrika, Candia.

**Rodriguezia** R. et P. (Emanuel Rodriguez, ein spanischer Arzt und Botaniker), XX. 1., Orchideae.

*Barkeri* Hook., Barker's, 4. w. Brasilien.

*laxiflora* Lindl., lockerblumige, 4. w. Brasilien.

*planifolia* Lindl., flachblättrige, 4. w. ? Brasilien.

*secunda* H. B. K., einseitigblumige, 4. w. Südamerika.

**Roella** L. (G. Roelle, Professor der Anatomie zu Amsterdam), V. 1., Campanulaceae.

*ciliata* L., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*decurrens* L'Her., herablaufende, ♂. m. f. Cap d. g. H.

*elegans* Paxt., schöne, ? ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*filiformis* Lam., fadenförmige, ♀. t. Cap der gut. H.

*muscosa* Thbg., moosartige, ♂. m. f. Cap der gut. H.

*squarrosa* L., sparrige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

*cernua* Brouss., *decumbens* Bot. reg. vid. *Wahlenbergia capensis* et *lobelioides*.

**Roemeria** Med. (J. J. Roemer, Professor der Botanik zu Zürich), XIII. 1., Papaveraceae.

*hybrida* DC. (*violacea* Medic.), violette, ♂. f. Südeuropa, England.

*refracta* DC., zurückgeknickte, ♂. f. Nordpers., Taur.

**Roeperia** Adr. Juss. (J. Roeper, Professor der Botanik zu Rostock), X. 1., Zygophylleae.

*aurantiaca* Lindl., orangenfarbige, ♀. t. Neuholland.

**Rohdea** Roth (Dr. Rohde, Botaniker aus Bremen), VI. 1., Aroideae-Orontiaceae.



**Rohdea**

japonica Roth, japanische, 4. Wa. k. Japan.

**Rolandra** Rottb. (D. Rolander, ein schwedischer Naturforscher, welcher Surinam bereiste), XIX. v., Compositae-Echinopeae.

argentea Rottb., silberfarbige, f. w. Westind., Südamer.

**Rolingia** G. B. K. (?) ? ?

ovalifolia G. B. K., eiblätterige. f. k. ?

**Roncela Erinus** Dumort. v. Campanula Erinus.**Rondeletia** Plum. (W. Rondelet, alter berühmter französischer Arzt und Zoolog), V. 1., Rubiaceae.

americana L., amerikanische, f. w. Südamerika.

hirsuta Sw., rauhhaarige, f. w. Jamaica.

hirta Sw., kurzhaarige, f. w. Jamaica.

laevigata Ait. fil., glatte, f. w. Westindien.

laurifolia Sw., lorbeerblättrige, f. w. Jamaica.

odorata Jacq., wohlriechende, f. w. Cuba.

paniculata Roxb., rispige, f. w. Molucken.

racemosa L., Sw., traubige, f. w. Jamaica.

speciosa Lodd., prächtige, f. w. Havannah.

thyrsoides Sw., straufsblumige, f. w. Jamaica.

tomentosa Sw., filzige, f. w. Westindien.

**Rosa** T., Rose, XII. III., Rosaceae.

acicularis Lindl., nadelstachelige, f. f. Sibirien.

β) pauciflora Lindl.

adenophylla W., drüsenblättrige, f. f. ?

Afzeliana Fries., Afzelius's, f. f. Schweden.

agrestis Sw., Acker-R., f. f. Schweden.

alba L., gemeine weisse, f. f. Europa, Caucasus.

\*Gartenvarietäten: Agate, Belle Aurore, Blanche à coeur vert, Blanche de belgique, Blush double white, Bouquet blanc, Celestial, Duc d'Yorck, Eliza, Feuille fermée, Grand cuisse de Nymphe, Henriette belle, Joanne d'Arc, Maiden's blush cluster, Maiden's blush great, Maiden's blush small, Moraga la favorite, Muscat rouge, Nova coelestis, Nova plena, Petite cuisse de Nymphe, Rosea, Simonville, Spineless Virgin, Thornless double, Triangularis, White double, White semidouble.

alpina L. (*rupestris* Crtz., *monspeliaca* Gouan, *inermis* Mill., *hybrida* Vill., *lagenaria* Vill., *biflora* Krock.), Alpen-R., f. f. Mitteleuropa, Taurien.

b) *pyrenaica* Gouan, Lindl. (*hispidula* Krock., *turbinata* Vill., *alpina coronata* Desv.). c) *pendulina* Ait. (*a. latifolia* Sering.). d) *pimpinellifolia* Vill., Lindl., (*pyrenaica* β. Sm.). e) *lagenaria* Sering. f) *sorbinella* Sering. g) *hispidella* Sering. h) *laevis* Sering. (*a. glabra* Desv.). i) *pyriformis* Sering. k) *setosa* Sering. (*a. hircina* Desv.). l) *globosa* Desv. (*canina ambigua* Desv.). m) *helleborina* Sering. n) *pilosula* Sering. o) *turbinata* Desv. (*inermis* Delaun, *a. flore pleno* Godefroy, *multiplex* Sering., *mixta* Tratt.). p) *speciosa* Hort. (*Drummondii* Hort.).

altaica W., Redout. (*spinosissima* γ. *Pallasii* Lindl.), altaische, f. f. Altai.

ambigua Waiz, zweifelhafte, f. f. ?

americana Waiz, amerikanische, f. f. b. ? Nordamerika.

## Rosa

- Andrzejovii Stev., Andrzejowski's, *h.* f. Volhynien.  
 Armidae P. B. Webb., Armida's, *h.* k. Teneriffa.  
 arvensis Huds. (*scandens* Mch., Wallr., ? *Herporrhodon* Ehrh., *Halleri* Krock., *fusca* Mch., *serpens* Ehrh., *sylvestris* Herrm., *sempervirens* Rössig, *repens* Gmel. Wib.), Feld-R., *h.* Sch. f. Europa.  
     *β*) ayreshirea Sering. (*capreolata* Neill.). *γ*) *hybrida* Lindl.  
 balsamica W., balsamische, *h.* f. ?  
 baltica Roth, baltische, *h.* f. Ufer der Ostsee.  
 Banksiae RB., Banks's, *h.* Sch. k. China.  
     *b*) flore luteo. *c*) multiplex.  
 Biebersteinii Lindl. (*ferox* MB.), Bieberstein's, *h.* f. Caucasus.  
 blanda Ait., liebliche, *h.* f. Westliches Nordamerika.  
 Borreri Woods. (*dumetorum* Sm., *rubiginosa* *β*. Lindl., *rubiginosa inodora* Hook., ? *sepium* Borkh., *affinis* Rau, *uncinella* *β*. Bess.), Borrer's, *h.* f. England, Deutschland.  
 bracteata Roxb., Wendl. (*Macartney's* R.), deckblättrige. *h.* k. Ostindien, China.  
     *β*) *scabricaulis* Lindl. (*b.* fl. pleno Lodd.).  
 Brunonii Lindl. (*Brownii* Spgl.), Brown's, *h.* k. Nepal.  
 caesia Sm., hechtblaue, *h.* f. England.  
 canina L. (*dumalis* Bechst., *glauca* Lois., *arvensis* Schrk., *glaucescens* et *nitens* Merat., *teneriffensis* Donn, *senticosa* Achar.), gemeine Hecken-R. (Hagebutte), *h.* f. Europa, Asien.  
     *b*) *surculosa* Woods. *c*) *nuda* Woods. *d*) *aciphylla* Rau. *e*) *aegyptiaca* Lindl. (*indica* Forsk.). *f*) *bourboniana* Desv. *g*) *nitens* Desv. *h*) *obtusifolia* Desv. (*leucantha* Lois.). *i*) *glaucescens* Desv. *k*) *Schottiana* Sering. (*glauca* Schott.). *l*) *pilosiuscula* Desv. (? *humilis* et *nitidula* Bess., *Friedlaenderiana* Bess., *collina* Rau). *m*) *fastigiata* Desv. *n*) *hispida* Desv. (*andegaviensis* Bast., *sempervirens* Bast., *canin. lanceolata*, *grandidentata* et *ovoidalis* Desv.). *o*) *microcarpa* Desv. *p*) *Meratiana* Sering. (? *biserrata* Merat.). *q*) *ambigua* Desv. (*malmundariensis* Lej.). *r*) *squarrosa* Hort. *s*) *rubiflora* Sering.  
 carolina L. (*virginiana* du Roi, *palustris* Marsh., *corymbosa* Ehrh., *pennsylvanica* Mchx., *Hudsoniana* Red., *evratina* Bosc.), carolinische, *h.* f. Carolina.  
 caryophyllacea Bess. (*iberica* Stev.), nelkenduftende, *h.* f. Volhynien, Podolien, Iberien.  
 caucasica MB., caucasische, *h.* f. Caucasus.  
 centifolia L. (*provincialis* Mill., *polyanthos* Rössig, *caryophyllea* Poir., *unguiculata* Dsf., *varians* Pohl.), hundertblättrige (Garten-R.), *h.* f. Caucasus, Macedonien.  
     *a*) *provincialis* Mill.  
 Gartenvarietäten: Aurora, Belgic red, Blandford or Kingston, Blush royal, Belle d'Aunay, Bourbon, Bright crumpled, Cabbage blush, Cabbage single, Carmine superb, Cent feuilles Anemone, Cent feuilles de Bruxelles, Cent feuilles de Hesse, Cent feuilles Gaufree, Chamois, Cluster, Constance,

## Rosa

Cramoisi grand, Cumberland, Dragon, Duchesse d'Angoulême, Duchesse de Berry, Elysian, Emperor, Juno, Louis XVIII., Malta, Mère Gryone, Mottled purple, Neapolitan, Oeillet, One-sided, Pencilled, Petite Hollande, Persian, Pompon gros, Pourprée aimable, Pourprée favorite, Pourprée violette, Prolifio, Provins blush, Provins cabbage, Provins childings, Provins common, Provins damask, Provins dutch, Provins early, Provins grand, Provins imperial, Provins invincible, Provins royal, Provins scarlet, Provins semidouble, Provins Shailier's, Provins single, Provins white, Rouge superbe, Sans petales, Souchet, Spongs, Striped nosegay, Surpassante, Syren, Trianon (belle de), Versailles, Vilmorin.

β) muscosa Mill. b) cristata Hook.

Gartenvarietäten: Moos blush, Moos commun, Moos dark, Moos prolific, Moos single, Moos striped, Moos white.

γ) pomponia DC.

Gartenvarietäten: De Meaux, Dwarf Bagshot, Mossy de Meaux, Mignonne charmante, Pomponne, Pomponne proliferos, Provins dwarf, Provins small, Rheims de St. Francis.

δ) bipinnata Red.

cinnamomea Besl., L. (*foecundissima* du Roi, *majulis* Hermann.), Zimmt-R., f. f. Europa, Caucasus, Sibir.

b) flore pleno. c) flore semipleno.

clinophylla Redout., geneigtblättrige, f. f. b. ?

collina Jacq. (*campestris* Sw.), Hügel-R., f. f. Europa, Caucasus.

Varietäten oder Hybriden: b) bractescens Woods.

c) taurica MB. d) psilophylla Rau. e) trachyphylla Rau. f) flexuosa Rau.

coriifolia Fr. (*crassifolia* Liljbl., *sepium* Sw.), lederblättrige, f. f. Schweden, Dänemark.

coruscans Waiz, schimmernde, f. f. b. ?

cuspidata MB., feingespitzte, f. f. Caucasus.

damascena Mill. (*belgica* Mill., *bifera* Poir., *calendarum* Sering.), Damascener-R. (Monats-R.), f. f. Syrien.

Gartenvarietäten: Agathe rouge, Argentea, Auguste belle, Aurora, Belgic blush, Belgique carnée, Belgique violette, Bifera carnea, Bifera de Naples, Bifera grandiflora, Blush early, Blush imperial, Blush monthly, Blush Watsons, Brunswick, Cluster pale, Couronnée belle, Couronnée petite, Damas argenté, Damas pourpré, Damask blush, Damask red, Damask white, Egyptian, Emperor, Felicite, Goliath, Gracieuse, Hundred-leaved petite, Incomparable, Mignonne, Favorite, Monarque grande, Monthly white, Paestana, Paragon, Parnassus, Perpetual, Prolific, Quatre saisons, Quatre saisons blanche, Quatre saisons flesh colored, Quatre saisons français, Quatre saisons panaché, Quatre saisons pompona, Quatre saisons sans épines, Quatre saisons semidouble, Royal great, Swifts, Vaillant, Versailles, York and Lancaster, Zeeland, etc.



## Rosa

dahurica Pall., dahurische, *h. f.* Sibirien.  
 Dicksoni Lindl., Dickson's, *h. f.* Irland.  
 dimorpha Bess., zweigestaltige, *h. f.* Podolien.  
 Doniana Woods. (*Sabini* *h. f.* Lindl.), Don's, *h. f.* Schottl.  
 b) horrida Hort.

dumetorum Thuill. (*collina* DC., *corymbifera* Borkh.,  
*sepium* Auct., *solstitialis* Bess., *leucantha* *h. f.* *acutifolia*  
 Bast.), Hecken-R., *h. f.* Europa.

ferox Lawr. (*kamtschatika* Red., *echinata* Dupont., *pro-*  
*vincialis* MB.), dichtstachelige, *h. f.* Taurien.

*h. f.* nitens Lindl.

flava Wikstr., hellgelbe, *h. f.* ?

floribunda Bess., blüthenreiche, *h. f.* Südrufsland.

Forsteri Sm. (*collina* *h. f.* et *h. f.* Woods.), Forster's, *h. f.*  
 England.

Fraseriana Hort., Fraser's, *h. f.* Hybride.

fraxinifolia Borkh. (*virginiana* Mill., *blanda* Jacq., *corym-*  
*bosa* Bosc., *alpina laevis* Redout.), eschenblättrige,  
*h. f.* Neufundland.

frondosa Stev., belaubte, *h. f.* Südpodolien.

frutetorum Bess., Strauch-R., *h. f.* Volhynien.

gallica L. (*rubra* Lam., *holosericea* Rössig, *Chamaerho-*  
*don* Wallr.), französische, *h. f.* Mitteleuropa, Caucasus.

*h. f.* pumila L. suppl. (*Polliniana* Spgl., *repens*  
 Münchh., *hispida* Münchh., *austriaca* Crtz., *olym-*  
*pica* Donn).

*h. f.* γ) arvina Rau (*germanica* Märklin.

*h. f.* δ) geminata Rau. (*Czackiana* Bess., *hybrida* K.

et Z. *h. f.* ε) hybrida Schlchr. ζ) Axmanni Gmel.

*h. f.* η) basilica Röss. (*gallica plena* Hort.). θ) in-

aperta Sering. ι) inermis Sering. χ) parvifolia

Ehrh. (*burgundica* Röss., *remensis* Dsf., *Ehrhar-*  
*tiana* Hort.).

Gartenvarietäten: Admirable, Aigle noir, Albanian, Amaranth, Antwerp, Atlas, Belle Aurore, Beauté aimable, Beauté rouge, Beauté suprême, Bijou, Bishop, Black Frizzled, Blue, Bouquet rouge royale, Brunette, Brussels, Buonaparte, Burning coal, Cardinal, Carmine, Carmine brillante, Carmine proliferous, Carnation, Catalonian, Champion, Chancellor, Changeable, Cherry, Clementine, Coquette, Couleur de feu, Cramoisie belle, Cramoisie grande, Crimson dutch, Crimson purple, Crimson royal, Crown, Cupid, Damask black, Delicious, Dingg, Duc de Guiche, Duchesse d'Orleans, Dwarf proliferous, Enchanter, Enfant de France, Eucharis, Fanny Byas, Fiery, Flander's, Flemish, Formidable, Fringed, Garnet, Gay, Giant, Gloria Mundi, Granatappel, Grand Monarque, Grand Sultan, Henry IV., Herminie belle, Hervi, Hollande noir de, Hundred-leaved blush, Hundred-leaved dutch, Hundred-leaved Singletons, Imperatrice, Incomparable, Infernal, Invincible, Italian, Josephine, Junon, King, La Dauphine, L'ombre agréable, L'ombre superbe, Leyden, Lisbon, Lively, Lurid, Maiden, Majorca, Malabar, Malta, Manteau royal, Marbled, Marbled dark, Marbled double, Marbled grand, Margaret, Matchless, Mauve, Mignonne, Mignonne blush, Mignonne dark, Mignonne favorite, Mignonne red. Mignonne semidouble, Mignonne striped, Mirabelles,

## Rosa

Mogul, Montauban, Morocco, Mottledblack, Natalie, Negrette, Negro, Ninon de l'Enclos, Nonpareil, Nonsuch, Normandy, Officinal, Officinal blush, Officinal carmine, Orleans, Ornement de Parade, Paestana, Panachée petite, Paradise, Paragon, Pavot, Perruque, Phoenix, Plicate, Pluto, Pomona, Pompadour, Pompon Bazard, Poniatowsky, Poppy, Porcelaine, Portland, Pourprée belle, Pourpre bouquet, Pourpre charmante, Pourpre de Tyr, Pourprée grand belle, Pourprée point, Pourpres Roi de, Pourpre Velours, Prince, Prince William V., Princess, Prolific, Pronville, Proserpine, Provins, Pulmonaire, Purple blue, Purple bright, Purple favorite, Purple grand, Purple light, Purple royal, Pyramid, Queen, Ranunculus, Ranunculus early, Red and violet, Roi de France, Rosa mundi, Rose de Parade, Royal red, Royal virgin, Sable, St. John's, Sanspareil, Sceptre, Shell, Spanish, Stadtholder, Stepney, Striped Nosegay, Sultana, Superb red, Trafalgar, Triumphant, Tuscany, Two colored, Velvet double, Velvet semidouble, Velvet single, Velvet striped, Venetian, Victory, Violet dark, Violette belle, Violette et rouge etc.

gemella W., gepaarthlumige, *h. f.* Nordamerika.

gentilis Stbg. (*rubella* Auct.), scharlachfrüchtige, *h. f.* Südeuropa.

glandulosa Bell. (*Raynieri* Hall. fil., *glabrata* Vest, *montana* Murrith non Vill., *rubrifolia* *β. montana* Gaud., *rubrifolia* et *glandulosa* Sering.), drüsige, *h. f.* Steyermark, Schweiz, Italien, Frankreich.

glutinosa Sm. (*rubiginosa cretica* Red., *rubiginosa sphaerocarpa* Desv.), klebrige, *h. f.* Creta, Sicilien.

gorinkensis Fisch., gorinkaische, *h. f.* Südrufsland.

gracilis Woods (*villosa* Sm.), schlanke, *h. f.* England.

grandiflora Lindl. (*pimpinellifolia* MB.), großblumige, *h. f.* Sibirien.

hibernica Sm., irländische, *h. f.* Irland.

hyacinthina Hort., Hyacinthen-R., *h. Sch. k.* Hybride.

Hystrix Lindl., igelstachelige, *h. Sch. k.* China, Japan.

iberica Stev., iberische, *h. f.* Iberien.

indica L. (*sinica* L., *semperflorens carnea* Rössig, *reclinata flore submultiplici* Red.), indische, *h. k. f. b.* China.

*β*) Noisettiana Sering. *a*) purpurea Red. *b*) nivea Hort. *c*) Smithii Hort. *γ*) odoratissima Swt. (*indica fragrans* Red, *Thea* Hort.). *δ*) longifolia W. (*salicifolia* Hort., *semperflorens* var. Du Ham.). *ε*) pumila Lindl. *ζ*) caryophyllea Red. *η*) pannosa Red. *θ*) cruenta Red. *ι*) Fraseriana H. Angl. *χ*) ruga Lindl. *λ*) ochroleuca Lindl. *μ*) Blairii D. Don. *ν*) Smithii Swt. *ξ*) nivea D. Don (*Aimé Vibert* Dennis).

involucrata Roxb. (*Lindleyana* Tratt., *palustris* Buchanan), großhüllige, *h. k. f. b.* Bengalen, Nepal, China.

involuta Sm. (*nivalis* Donn), eingerollte, *h. f.* Schottland, Hebriden.

Jundzilliana Bess., Jundzill's, *h. f.* Volhynien, Taurien, Caucasus.

*β*) glandulosa Bess. *γ*) nitidula Bess.

## Rosa

- kamtschatka Vent., kamtschatkalische, *h. f.* Kamtschatka.  
 Klukii Bess. (*floribunda* Stev., ? *balsamica* Bess., *rubiginosa* MB.), Kluk's, *h. f.* Volhynien, Taurien.  
 Kosinsciana Bess., Kosinsk's, *h. f.* Podolien.  
 laevigata Mchx., glattblättrige, *h. Sch. f. b.* Nordam.  
 Lawrenceana Swt., Lawrence's, *h. k.* China.  
 laxa Retz, lockere, *h. f.* Sibirien.  
 Ledebourii Spgl. (*mollis* Ledeb.), Ledebour's, *h. f.* Caucasus.  
 leucantha MB., weifsblumige, *h. f.* Taurien.  
 Lindleyi Spgl. (*carolina*  $\epsilon$ . Ait., *laxa* Lindl., *carolina pimpinellifolia* Andr.), Lindley's, *h. f.* Nordamerika.  
 livescens Bess. (*livida* Host, *guttensteinensis* Jacq., *arguta* Muss. Puschk.), schlagbläuliche, *h. f.* Caucasus, Podolien, Oesterreich.  
 Longii Swt., Long's, *h. Sch. f.* Hybride.  
 lucida Ehrh., spiegelnde, *h. f.* Nordamerika.  
     *b)* *candicans*.  
 lutea Dalech., Mill. (*Eglantheria* L., *foetida* Herm., *chlorophylla* Ehrh., *cerea* Rössig, *vulpina* Wallr.), gemeine gelbe, *h. f.* Europa.  
     *b)* *punicea* Mill. (*bicolor* W.). *c)* *subrubra* Redout. *d)* *flore pleno* (*Williams dble-flnd*). *e)* *Hoggii* D. Don.  
 lutescens Pursh (*hispida* Curt.), gelbliche, *h. f.* Nordam.  
 Lyellii Lindl., Lyell's, *h. k.* Nepal.  
 Lyonii Pursh, Lyon's, *h. f.* Nordamerika.  
 macrophylla Lindl., großblättrige, *h. k. f. b.* Nepal.  
 marginata Wallr. (? *trachyphylla* Rau), berandete, *h. f.* Deutschland.  
 melanocarpa Lk. (*microcarpa* Bess.), schwarzfrüchtige, *h. f.* Podolien, Volhynien.  
 micrantha Sm. (*rubiginosa*  $\beta$ . *micrantha* Lindl., *nemorosa* Libert, *Libertiana* Tratt.), kleinblumige, *h. f.* England, Deutschland.  
 microcarpa Lindl. (*cymosa* Tratt.), kleinfrüchtige, *h. Sch. k. f. b.* China.  
 microphylla Roxb., kleinblättrige, *h. k. f. b.* China.  
     *b)* *alba*.  
 montana Steven, Berg-R., *h. f.* Taurien, Südpodolien.  
 Montezumae H. B. K. (*mexicana* W.), Montezuma's, *h. k.* Mexico.  
 moschata Mill. (*opsostemma* Ehrh., *glandulifera* Roxb.), Bisam-R. (weisse spanische Büschel-R.), *h. k. f. b.* Nordafrika, Madeira, Nepal.  
     *b)* *flore pleno*. *c)* *nepalensis* Lindl. ? *d)* *arborea* P. *e)* *nivea* Lindl. *f)* *evratina* Bosc.  
 mosquensis Spgl., moskwaische, *h. f.* Südrussland.  
 multiflora Thbg. (*florida* Poir., *diffusa* Roxb.), vielblumige, *h. Sch. k. f. b.* Japan, China.  
     *b)* *multiplex*. *c)* *alba*. *d)* *Grevillei* Hort. (*Roxburghii* Hort., *platyphylla* Redout. *e)* *Russeliana* Hort. *f)* *Boursaultii* G. Don.  
 muricata Waitz., weichstachelige, *h. f.* ?  
 myriacantha DC., vielstachelige, *h. f.* Frankr., Taurien.  
 myrtifolia Hall. fil. (*sepium* Thuill., *rubiginosa sepium* DC.), myrtenblättrige, *h. f.* Mittel- und Südeuropa.  
 nitida W. (*blanda* Pursh, *rubescens* Red.), glänzende, *h. f.* Neufundland.



## Rosa

ochroleuca Sw., weißgelbe, ♀. f. Sibirien.  
 oxyacantha MB., weißdornähnliche, ♀. f. Sibirien.  
 parviflora Ehrh. (*humilis* Marsh., *caroliniana* Mchx., *carolina* du Roi, *pensylvanica* Wangenh.), kleinblumige, Nordamerika.

b) flore pleno.

*pensylvanica* Mchx., Lk., pensylvanische, ♀. f. Nordam.  
*pruinosa* Lindl., bereifte, ♀. f. Sibirien.  
*pulchella* W., schöne, ♀. f. Frankreich.  
*pulverulenta* MB., bestäubte, ♀. f. Caucasus.  
*purpurea* Hort., purpurfarbige, ♀. k. Hybride.  
*pygmaea* MB. (*pimpinellifolia* Vill.), zwergige, ♀. f. Taurien, Dauphiné.

*Rapa* Bosc. (*turgida* P., *fraxinifolia* Dum. Cours.), rübenfrüchtige, ♀. f. b. Florida.

*reversa* W. K., zurückgebogene, ♀. f. Ungarn, österreichisches Litorale.

*rubella* Sm. (*polyphylla* W.), röthliche, ♀. f. England, Mittelasien.

β) *melanocarpa* Lindl.

*rubifolia* RB., rubusblättrige, ♀. f. Nordamerika.

β) *fenestralis* Lindl.

*rubiginosa* L. (*Eglanteria* Mill., *suavifolia* Lightf., *Seraphini* Viv., *agrestis* Savi, *glutinosa* Auctor.), rostfarbige (Wein-R.), ♀. f. Europa, Mittelasien, Nordam.

b) *Vaillantiana* Red. c) *rotundifolia* Lindl. d) *aculeatissima* Dup. e) *nemoralis* Redout. f) *umbellata* Leers. (*tenuiglandulosa* Merat, *rubigi. cymosa* Woods, *sempervirens* Roth). g) *pubera* Ser. h) *grandiflora* Lindl. i) *major* Ser. k) *spinulosa* Ser. l) *flexuosa* Lindl. m) *parvifolia* W. n) *resinosa* Lej.

Gartenvarietäten: Americana single, Blush, Clementine, Cluster, Double, Dwarf semidouble, Maiden, Mannings, Monstrous, Mossy, Petite Hessoise, Royal, Scarlet, Tree double, White semidouble, Zabeth.

*rubrifolia* Vill. (*glaucescens* Wulf., *glauca* Dsf., *multiflora* Reyn., *rubicunda* Hall. fil., *livida* Andr., *cinnamomea* γ. *rubrifolia* Redout.), ♀. f. Mitteleuropa.

b) *hispidula* Sering. c) *Redoutea* Sering. d) *inermis* Sering. e) *pinnatifida* Sering.

*Sabini* Woods, *Sabine's*, ♀. f. Schottland.

b) *gracilis* Hort.

*sarmentacea* Sw., Woods. (*glaucophylla* W.), starkwurzelnende, ♀. f. Europa.

*saxatilis* Stev., Gesteins-R., ♀. f. Podolien, Taurien.

*sempervlorens* Curt. (*indica* Redout., *diversifolia* Vent., *chinensis* Jacq., *bengalensis* P.), immerblühende, ♀. k. f. b. China.

Varietäten oder Hybriden mit *indica*: Alba, Animate, Atro-nigra, Bengale à bouquet, Bengale à fl. panaché, Bengale blanche, Bichonia, Camellia rosea et purpurea, Carnescens, Centifolia, Cérise éclatante, Chiffonnée, Cucullata, elegans, Florida, Gigantea, hybrida, Lie de vin, Lucida, major, minor, monstrosa, Moonshine, nigra, ochroleuca, purpurea, sanguinea, sans épines, subalba, Terneaux, Thisbe, Veloulée etc.

## Rosa

*sempervirens* L. (*scandens* Mill., *balearica* Dsf., *atrovirens* Viv.), immergrüne, ♀. Sch. f. Süd- u. Westeuropa.

b) *Russeliana* A. B. c) *Clarei* Lindl. d) *Leschenaultiana* Redout.

*sericea* Lindl., seidenhaarige, ♀. k. f. b. Nepal.

*setigera* Mchx., borstentragende, ♀. Sch. f. Virginien, Carolina.

*Sherardi* Dav., *Sherard's*, ♀. f. England.

*sinica* RB. (*ternata* Poir., *nivea* DC., Redout., *trifoliata* Bosc., *cherokeeensis* Don), chinesische, ♀. Sch. k. f. b. China.

*spinosissima* L. (*pimpinellifolia* L. DC., *campestris* Wallr.).  
hibernellblättrige, ♀. f. Europa, Mittelasien.

a) *pimpinellifolia* L. β) *spinosissima* L. γ) *mitissima* Gmel. δ) *sanguisorbifolia* Donn. ε) *poterifolia* Bess. ζ) *rosea* K. b) *ciphiana* Sm.  
η) *affinis* Sternb.

Gartenvarietäten: (schottische Rosen), Blush Andersons double Ladys, Blush double Lady's, Blush double pink, Blush double Provins, Blush double Rose, Blush dutch double, Blush Princess double, Crimson double, Marbled double crimson, Marbled double dark, Marbled double light, Red double dark, Red double light, Red true double, Two colored large double, Two colored small double, White large double, White large semidouble, White small double, White Whitley's double, Yellow globe double, Yellow large double, Yellow pale double, Yellow small double etc.

*stricta* Mühlenb., Lindl., steife, ♀. f. Nordamerika.

*suaveolens* Pursh, feinriechende, ♀. f. Nordamerika.

*suavis* W., lieblichriechende, ♀. f. ?

*sulphurea* Ait. (*hemisphaerica* Herm., *glaucophylla* Ehrh., *lutea flore pleno* Ray.), schwefelgelbe, ♀. f. Levante.

*sylvestris* Lindl. (*tomentosa sylvestris* Woods), Wald-R., ♀. f. Europa.

*systyla* Bastard, verbundengriffelige, ♀. f. England, Frankreich, Steyermark.

a) *Devauxiana* Sering. (*stylosa* Desv., *collina* Sm., *bibracteata* DC.). β) *leucochroa* Desv. (*brevistyla* DC.). γ) *Monsoniae* Lindl.

*taurica* MB., taurische, ♀. f. Taurien.

*terebinthacea* Bess., terpentinariechende, ♀. f. Podolien, Volhynien.

*tomentosa* Sm. (*villosa* Ehrh., Poll., *mollissima* Bork., *dubia* Wib., *subglobosa* Sm.), filzige, ♀. f. Europa.

β) *dimorpha* Bess. ? γ) *pseudorubiginosa* Lejeun. δ) *farinosa* Bechst. (*mollissima* W.). ε) *scabriuscula* Sm. (*foetida* Bastard, *hispida* Borkh., *Borkhausenii* Tratt.).

*turbinata* Ait. (*campanulata* Ehrh., *francofurtana* Münchh.),  
Tapeten-R., ♀. f. Mittel- und Südeuropa.

a) *francofurtana* Sering. (*francofurtensis* Dsf., *Rosenbergiana* Redout.). β) *orbessanea* Redout.

*uncinella* Bess., hakige, ♀. f. Volhynien, Taurien,

*verecunda* H. Berol., schamhafte, ♀. f. Asien.

*villosa* L. (*ciliato petala* Bess., *cretica* Vest, *mollis* Sm., *pomifera* Herrm.), zottige, ♀. f. Europa, Mittelasien.

b) *pulchella* Woods. c) *heterophylla* Woods.

**Rosa**

- viminea* Lindl. (*horrida* Spgl.), gertenartige, ♀. f. ?  
*Willdenowii* Spgl. (*microphylla* W., *arenaria* MB.), Willdenow's, ♀. f. Sibirien.  
*Woodsii* Lindl. (*lutea nigra* Hort.), Woods's, ♀. f. Nordamerika.  
*berberifolia* Pall. (*simplicifolia* Salisb.) vid. *Lowea berberifolia*.

**Roscoeia** Sm. (W. Roscoe, englischer Botaniker), I. 1., Scitamineae-Amomeae.

- capitata* Sm., kopfförmige, 4. w. Nepal.  
*elatio* Sm., höhere, 4. w. Nepal.  
*gracilis* Sm., schlanke, 4. w. Nepal.  
*purpurea* Sm., purpurfarbige, 4. w. Nepal.  
*spicata* Sm., ährige, 4. w. Nepal.

**Rosmarinus** T., Rosmarin, II. 1., Labiatae.

- chilensis* Molin., chilesischer, ♀. k. Chili.  
*officinalis* L., gemeiner, ♀. k. f. b. Südeuropa.  
 b) *latifolius*. c) *fol. argenteis*. d) *fol. aureis*.

**Rostraria** Trin., Schnabelgras, III. 11., Gramineae.

- pubescens* Trin., weichhaariges, ☉. f. ?

**Rothia** P. (*Götzea* Rchb.), (A. W. Roth, berühmter deutscher Botaniker), XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- trifoliata* P., dreiblättrige, ☉. m. f. w. ?

**Rothia andryaloides** G. etc. v. *Andryala* *Rothia* etc.**Rottboellia** L. fil. (C. Rottboell, Professor der Botanik zu Copenhagen, III. 11., Gramineae.

- dimidiata* L. fil., halbseitige, 4. w. Südasien, Afrika, Südamerika.  
*exaltata* L., hohe, 4. w. Ostindien, Neuholland.  
*perforata* Roxb., durchbohrte, 4. w. Bengalen.

*biflora* Roth vid. *Lepturus pannonicus*. *cylindrica* W. (*subulata* Savi) etc. v. *Lepturus cylindricus* etc. *monandra* Schrad. v. *Psilurus nardoides*. *setacea* Roxb. v. *Microchloa setacea*. *spathacea* Tenor. v. *Spartina stricta*.

**Rottlera** Roxb. (Dr. Rottler, ein dänischer Missionair und Botaniker, welcher Ostindien bereiste), XXII. xi., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- brasiliensis* Spgl., brasilianische, ♀. w. Brasilien.  
*paniculata* Adr. Juss., rispige, ♀. w. Java, Ceylon.  
*tinctoria* Rxb., färbende, ♀. w. Ostindien.

**Roxburghia** Jones (W. Roxburgh, M. D., berühmter englischer Botaniker, welcher Ostindien durchforschte), VIII. 1., ? Aroideae, ? Asparagineae.

- gloriosoides* Roxb., prachtlilienähnliche, 4. Sch. Kn. w. Ostindien.

**Royena** L. (Adrian v. Royen, Professor der Botanik zu Leyden), X. 11., Sapotaceae-Ebenaceae.

- angustifolia* W., schmalblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.  
*glabra* L., kahlblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*hirsuta* L., rauhhaarige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*latifolia* W., breitblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*lucida* L., starglänzende, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*pallens* Thbg., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
*polyandra* L. suppl., vielmännige, ♀. k. Cap d. g. H.  
 β) *ambigua* Vent.

- pubescens* W., weichhaarige, ♀. k. Cap der gut. H.



**Royena**

*villosa* L., zottige, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.  
Unbestimmt: *myrtifolia* Hort.

**Roylea** Wall. (Dr. Royle, Vorsteher des botanischen Gartens zu Saharumpoor), XIV. 1., Labiatae.

*elegans* Wall., zierliche, 4. f. b. k. Nepal.

**Rubentia olivina** Juss. v. *Elaeodendron orientale*.

**Rubia** T., Röthe, IV. 1., Rubiaceae.

*angustifolia* L., schmalblättrige, ♂. k. Spanien.

*Bocconi* Petagn., *Boccone's*, 4. f. Neapel.

*canariensis* Poir., canarische, ♂. k. Canarische Inseln.

*cordifolia* L., herzblättrige, 4. f. Nordasien, Japan, China, Cap der guten Hoffnung.

*fruticosa* Ait., Jacq., strauchige, ♂. k. Teneriffa.

*galioides* Poir., labkrautähnliche, ♂. k. Canar. Inseln.

*lucida* L., spiegelnde, 4. f. England, Südfrankreich, Griechenland.

*peregrina* L. (*anglica* Huds.), fremde, 4. f. England, Südeuropa, Creta, Griechenland, Ostrufsländ.

*splendens* L. (*sylvestris* Brot.), schimmernde, ♂. k. Portugal.

*tinctorum* L., Färber-R. (Krapp), 4. f. Südeuropa, Kleinasien.

**Rubus** T., Brombeere, XII. 111. (v.), Rosaceae.

*abruptus* Weihe, abgebrochene, ♂. f. Norddeutshl., Engl.

*acuminatus* Sm., zugespitzte, ♂. Sch. k. f. b. Nepal.

*aegopodioides* Sering., gierschähnliche, 4. f. Nordam.

*affinis* Weihe, ähnelnde, ♂. f. Europa.

b) *bracteosus*.

*agrestis* Kit., Acker-B., ♂. f. Ungarn.

*amoenus* Portensch. (*fruticosus dalmaticus* Tratt., *discolor* Weihe), schöne, ♂. f. West- und Südeuropa.

*apetalus* Poir. (*tomentosus* Bory, *borbonicus* P.), kronenlose, ♂. w. Mascarenas.

*arcticus* L., nördlichste, 4. f. Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika.

*argutus* Lk., spitzzähnige, ♂. f. Nordamerika.

*asper* D. Don, rauhe, ♂. f. b. k. Nepal.

*caesius* L., kriechende (Kratzbeere), ♂. f. Europa, Japan.

b) *arvensis* Wallr. c) *grandiflorus* Sering. d)

*parvifolius* Wallr. e) *fol. variegatis* Hort.

*canadensis* L., canadische, ♂. f. Nordamerika.

*canescens* DC., weißgraue, ♂. f. Südeuropa.

*carpinifolius* Weihe, hainbuchenblättrige, ♂. f. Deutschland, England.

*Chamaemorus* L., Zwerg-B., 4. f. Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika.

*collinus* DC., Hügel-B., ♂. f. Süd- und Westeuropa.

*corylifolius* Sm. (*nemorosus* Hayne, *dumetorum a vulgaris* Weihe, *bifrons* et *nutans* Vest, *Aschoffii* Weihe),

haselnufsblättrige, ♂. f. Europa.

β) *pilosus* Rchb. (*tiliaefolius* Auctor.)

*cuneifolius* Pursh (*parvifolius* Walt.), keilblättrige, ♂. f. Nordamerika.

*deliciosus* Torrey., gutschmeckende, ♂. f. Nordamerika.

*distans* D. Don, entferntblumige, ♂. f. b. k. Nepal.

*diversifolius* Weihe, verschiedenblättrige, ♂. f. Deutschland, England.

*echinatus* Lindl. (*rudis* Weihe et N. E.), igelstachelige, ♂. f. Deutschland, England.

# Rubus

Eglanteria Tratt., Eglantinen-B., *h. k.* Neuholland.  
 ellipticus Sm. (*flavus* Hamilt.), elliptische, *h. b.* Nepal.  
 fissus Lindl. (*fastigiatus* Lindl. non Weihe), gespaltene,  
*h. f.* England.

flagellaris W., ausläufertreibende, *h. f.* Nordamerika.

foliolosus D. Don, blattreiche, *h. f. b.* Nepal.

fruticosus L. suec. (*plicatus* Weihe), strauchige, *h. f.*  
 Europa, Nordasien.

Varietäten oder Hybriden: b) pomponius Sering.

c) tauricus Hort. ? d) flore roseo pleno. e) fol.

variegat. A. B. f) leucocarpus Sering. (*albus*

Hort.). g) inermis Sering. h) concolor Wallr.

? β) Wiegmanni Weihe.

fuscoater Weihe, braunschwarze, *h. f.* Deutschl., Engl.

glandulosus Bellard. (*hybridus* Vill., *Güntheri* Weihe),  
 drüsige, *h. f.* Ost-, Mittel- und Südeuropa.

β) hirtus W. K.

heterophyllus W. (*villosus* Torr.), verschiedenblättrige,  
*h. f.* Nordamerika.

hispidus L., steifhaarige, *h. f.* Nordamerika.

horridus Weih. (*ferox* Vest), starkstachelige, *h. f.* Deutschl.

jamaicensis L., jamaicaische, *h. t. w.* Jamaica.

Idaeus L., gemeine Himbeere, *h. f.* Europa, Asien,  
 Nordamerika.

b) fructu albo (*leucocarpus* Auct.). c) fructu luteo.

d) fol. variegat. e) glaber Mill. (*inermis* Auct.).

β) microphyllus Wallr.

inermis W., unbewehrte, *h. f.* Pennsylvanien.

Köhleri Weihe et N. E. (*sylvestris*, *infestus* et *spino-*  
*sissimus* Weihe), Köhler's, *h. f.* Deutschland.

laciniatus W., schlitzblättrige, *h. f.* ?

lanuginosus Stev., wollige, *h. f.* Sibirien, Caucasus.

leucostachys Sm., weifsährige, *h. f.* Deutschland, Engl.

Linkianus Sering. (*paniculatus* Schldl., *fruticosus fl.*  
*pleno* Hort.), Link's, *h.* Sch. f. ? Südeuropa.

macropetalus Dougl., großkronige, *h. f.* Westl. Nordam.

macrophyllus Weihe et N. E., großblättrige, *h. f.*  
 Deutschland, England.

Menkii Weihe et N. E., (*velutinus* Vest.), Menke's, *h.*  
*f.* Deutschland.

micranthus D. Don (*pauciflorus* Wallich, Lindl.), klein-  
 blumige, *h. f. b. k.* Nepal.

moluccanus L., moluccaische, *h. w. t.* Molucken, ? Japan.

nitidus Weihe (*corylifolius* Hayne, *glaber*, *corymbosus* et  
*praecox* Weihe), glänzende, *h. f.* Deutschland etc.

nutkanus Moc. (*odoratus* Hort.), Nutka-Sund-B., *h. f.*  
 Californien.

occidentalis L., westliche, *h. f.* Nordamerika.

odoratus L., wohlriechende, *h. f.* Nordamerika.

pallidus Weihe, bleiche, *h. f.* Deutschland, England.

parvifolius L. (*triphyllus* Thbg.), kleinblättrige, *h. k.*  
 China, Japan.

pedunculatus D. Don, langstielige, *h. f. b.* Nepal.

pinnatus W., gefiederte, *h. k.* Cap der guten Hoffnung,  
 Madeira, St. Helena.

pistillatus Sm. (*acaulis* Mchx.), dichtgriffelige, *h. f.*  
 Nordamerika.

reflexus Ker (*moluccanus* Ait.), zurückgebogene, *h. t.*  
 Südchina.

## R u b u s

Reichenbachii Koehl., Weihe, Reichenbach's, ♀. f. Deutschland.

rhamnifolius Weihe et N. E. (*fruticosus* Auctor), wegdornblätterige, ♀. f. Deutschland, England.

β) cordifolius Weihe. γ) rubricaulis Weihe. δ) candicans Weihe.

rigidus Sm., starre, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

roridus Lindl., bethaute, ♀. t. w. Madagascar.

rosaefolius Sm., rosenblätterige, ♀. k. Mascarenas.

b) coronarius Sims.

rugosus Sm., runzelige, ♀. t. w. Südamerika.

sanctus Schreb. (*fruticosus* β. MB., *obtusifolius* W.), orientalische, ♀. f. Orient.

sanguinolentus Lk., blutfarbige, ♀. w. Mascarenas.

saxatilis L., Gesteins-H., 4. f. Europa, Asien, Nordam.

Schlechtendalii Weihe, N. E., Schlechtendal's, ♀. f. Deutschland.

Schleicheri Weihe et N. E., Schleicher's, ♀. f. Deutschland, Schweiz.

setosus Bigel., borstige, ♀. f. Nordamerika.

spectabilis Pursh (*stenopetalus* Choris.), ansehnliche, ♀. ♀. f. Westliches Nordamerika, aleutische Inseln.

Sprengelii Weihe et N. E., Sprengel's, ♀. f. Deutschl.

stellatus Sm., sternförmige, 4. f. Westl. Nordamerika.

strigosus Mchx. (*pensylvanicus* Poir.), striegelige, ♀. f. Nordamerika.

suberectus Anders. (*nessensis* Hall., *fastigiatus* Weihe, *sulcatus* Vest, *nemorosus* Auctor.), aufrechte, ♀. f. Deutschland, England.

tetraphyllus Ait., vierblättrige, ♀. f. Nordamerika.

tiliaceus Sm., lindenähnliche, ♀. f. b. k. Nepal.

tiliaefolius Weihe et N. E., lindenblättrige, ♀. f. Deutschl.

tomentosus Borkh., W. (*argenteus* C. G. Gmel., *triphyllus* Bell., *hypoleucus* Vest.), filzige, ♀. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

triflorus Rich., dreiblumige, 4. f. Nordamerika.

trivialis Mchx. (*procumbens* Mühlbg.), pensylvanische, ♀. ♀. f. Pennsylvanien, Carolina.

ulmifolius Schott., ulmenblättrige, ♀. f. Spanien.

villicaulis Köhl., zottigstengelige, ♀. f. Deutschland.

villosus Ait., zottige, ♀. f. Nordamerika.

vulgaris Weihe et N. E. (*fruticosus* Auctor.), gemeine, ♀. f. Deutschland etc.

japonicus L. v. *Keria japonica*.

Rudbeckia L. (Olaus Rudbeck, Professor der Botanik zu Upsala), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina (*Centrocarrha* D. Don).

asperrima Horn., rauhste, 4. f. Nordamerika.

chrysomelaena Mchx. (*acutifolia* Swt., *Newmanni* Hort.). goldblumige, 4. f. Nordamerika.

b) chrysantha Dens.

digitata Mill., Ait. (*laevis* Hoffmsg.), fingerförmige, 4. f. Nordamerika.

discolor Pursh, verschiedenfarbige, ♂. 4. f. b. Florida.

fulgida Ait., leuchtende, 4. f. Nordamerika.

gracilis Nutt., schlanke, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Gmel. (*nudicaulis* Nutt.), großblumige, 4. f. Nordamerika.

hirta L., rauhhaarige, ♂. 4. f. b. Nordamerika.



**Rudbeckia**

laciniata L., schlitzblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 laevigata Pursh, glatte, 4. k. Carolina, Georgia.  
 moschata Lodd., moschusduftende, 4. f. Nordamerika.  
 Radula Pursh (? *aspera* P.), raspelförmige, ♂. 4. f. b. Nordamerika.

spathulata Mchx., spatelblättrige, 4. k. Carolina.  
 speciosa Wender., Schrad., prächtige, 4. f. ?  
 subtomentosa Pursh, wenigfilzige, 4. f. Nordamerika.  
 triloba L., dreilappige, ♂. f. Nordamerika.

**II. Dracopis Cass.**

amplexifolia Jacq. (*amplexicaulis* Vahl, *perfoliata* Cav.),  
 stengelumfassende, ☉. f. Louisiana.

**III. Obeliscaria Cass. (Ratabida Rafin.).**

columnaris Pursh (*columnifera* Fras., *Tagetes* James),  
 säulenförmige, 4. f. Nordamerika.

pinnata Vent. (*odorata* et *cinerea* Hort., *digitata* W.),  
 fiederblättrige, 4. f. Nordamerika.

pulcherrima DC., schönste, 4. f. b. k. Texas.

*hispidula* Hffmsg. (*speciosa* Lk. et *purpurea* L.) etc.  
 vid. Echinacea serotina, purpurea etc. *intermedia*  
 Hort. v. Echinacea intermed. Nachtr.

**Rudolphia** W. (J. H. Rudolph, Botaniker zu Petersburg, K. A. Rudolphi, Geheim. Rath und Professor zu Berlin, berühmt als Anatom, Zoolog etc.), XVII.  
 IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

dubia H. B. K., zweifelhafte, ♀. Sch. w. Neugranada.

rosea Tuss., rosafarbige, ♀. Sch. w. Westindien.

**Ruellia** Plum. (J. Ruelle von Soissons, Botaniker und Arzt, Franz d. I. v. Frankr.), XIV. II., Acanthaceae.

australis Cav., neuholländische, 4. w. Neuholland.

cernua Roxb., übergebogene, 4. w. Ostindien.

ciliata Hornem., gefranzte, ♀. w. Ostindien.

ciliosa Pursh, gewimperte, 4. t. Georgien.

clandestina L., heimlichblühende, 4. w. Westindien.

coccinea Vahl, scharlachfarbige, ♀. w. Westindien.

dependens Roxb., herabhängende, 4. w. Ostindien.

elegans Hook., zierliche, ? ☉. w. Ostindien.

foetida H. B. K. (*pulchella* Schott.), stinkende, ♀. w. Südamerika.

formosa Andr. (*elegans* Poir.), schöne, 4. w. Brasilien.

fulgida Andr., feuerfarbige, 4. w. Westindien.

hirta Vahl, haarige, 4. w. Ostindien.

lactea Cav., milchweifse, 4. t. w. Mexico.

longifolia Roth, langblättrige, 4. w. Ostindien.

macrophylla Vahl, großblättrige, 4. w. Südamerika.

oblongifolia Lodd., länglichblättrige, ♀. w. Brasilien.

ocymoides Cav. (*concavifolia* Ortega), basilicumähnliche,  
 ♀. w. t. Mexico.

ovata Cav., eiförmige, 4. w. Mexico.

paniculata L., rispige, 4. ♀. w. Westind., Neugranada.

patula Jacq., abstehende, ♀. w. Ostindien.

picta Lodd., bemalte, ♀. w. St. Domingo.

pilosa L. (*pubescens* P., *ovata* Thbg.), weichhaarige, 4.

♀. w. k. Cap der guten Hoffnung.

rubricaulis Cav., rothstengelige, 4. w. Mexico.

salicifolia Vahl, weidenblättrige, 4. w. Ostindien.

strepens L., rauschende, 4. k. Virginien, Carolina,  
 Westindien.

tetragona Lk., vierkantige, 4. w. Brasilien.

## Ruellia

tuberosa L., knollige, 2. Kn. w. Jamaica.  
 undulata Vahl, wellenblättrige, 4. w. Ostindien.  
 violacea Aubl., violette, 4. w. Guiana.

*anisophylla* Wall. (*persicifolia* Lindl., *amygdalaeifolia* Hort.) vid. *Goldfussia anisophylla*. *biflora* L. (*oblongifolia* Mchx.) v. *Calophanes oblongifolia*. *Blechnum* L. et *blechioides* Sw. vid. *Blechnum Brownii* et *laxiflorum*. *cristata* Andr. v. *Aphelandra cristata*. *infundibuliformis* Andr. v. *Crossandra undulifolia*. *ringens* L. v. *Hygrophila ringens*. *Sabiniana* Wall. v. *Strobilanthes Sabiniana*. *varians* Vent. v. *Eranthemum nervosum*.

**Ruizia** Cav. (Hippolito Ruiz, spanischer Botaniker und Reisender), XVI VIII., Malvaceae-Dombeyaceae.

*lobata* Cav., gelappte, 5. w. Mascarenas.  
*variabilis* Jacq. (*palmata* et *laciniata* Cav.), veränderliche, 5. w. Mascarenas.

*Rulingia corylifolia* Cunn., *pannosa* RB. etc. v. *Büttneria corylifolia pannosa* etc. *R. Anasampseros* Ehrh. Haw., *polyphylla* Haw. et *varians* Haw. vid. *Anacampseros rotundifolia* etc.

**Rumex** L. (*Acetosa* T. et *Lapathum* T.). Ampfer, VI. III., Portulacaceae-Polygonaceae.

*abyssinicus* Jacq. (*arifolius* Ait.), abyssinischer, 5. k. Südeuropa, Nordafrika.

*Acetosa* L., gemeiner Sauer-A., 4. f. Europa, Mittelas.  
 β) *auriculatus* Wallr. γ) *intermedius* DC.

*Acetosella* L., kleiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) *multifidus* L. ?γ) *pyrenaicus* Lapeyr.

*aculeatus* L., stacheliger, 4. f. Creta, Spanien.

*acutus* L. (*pratensis* M. et K., *cristatus* Wallr.), spitzblättriger, 4. f. Europa.

*aegyptiacus* L., ägyptischer, ☉. f. Aegypten, Sardinien, Südrufsland.

*alpinus* L., Alpen-A., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*amplexicaulis* Lapeyr. (? *oblongus* et *rugosus* Campd.), stengelumfassender, 4. f. Pyrenäen.

*aquaticus* L. (*latifolius* Mey.), Wasser-A., 4. Wa. f. Europa.

β) *ochotensis* Fisch.

*arifolius* All. (*montanus* Poir., *hispanic.* Gmel.), arumblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*brasiliensis* Lk. (? *litoralis* H. B. K.), brasilianischer, 4. w. Brasilien.

*Britannica* L. (*xanthoriza* P., *bienne* Mch.), virginischer, ♂. 4. f. Virginien.

*Brownii* Campd. (*fimbriatus* RB.), Brown's, 4. Kn. k. Neuholland.

*bucephalophorus* L., oxsenkopffrüchtiger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*Burchellii* Campd. (? *sagittatus* Thbg.), Burchell's, 4. 5. k. Cap der guten Hoffnung.

*campestris* Savi, Feld-A., ?☉. f. Italien.

*condylodes* MB., knorriger, 4. f. Caucasus.

*confertus* W., gedrängter, 4. f. ?

*conglomeratus* Murr. (*glomeratus* Schreb., *divaricatus* Thuill., *Nemolapathum* Ehrh., *acutus* Sm., *paludosus* Wither., *crispus* β. Poll., *undulatus* Schrk.), knaulförmiger, 4. f. Europa, China.

## Rumex

- conspersus Hartm., überstreuter, 4. f. Schweden.  
 cordifolius Horn., herzblättriger, 4. f. ?  
 crispatus Mchx., krauser, ☉. f. Nordamerika.  
 crispus L., krausblättriger, 4. f. Europa.  
 cristatus DC., kammförmiger, 4. f. ?  
 cuneifolius Campd. (? *spathulatus* Thbg.), keilblättriger,  
 4. k. Cap der guten Hoffnung.  
 dentatus Murr., gezahnter, ☉. f. Aegypten.  
 domesticus Hartm., Haus-A., 4. f. Schweden.  
 fimbriatus Poir. (*repandus* Bosc.), gefranzter, 4. Kn. k.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 frutescens Thouars, strauchiger, ♀. k. Tristan d'Acunha.  
 giganteus Ait., riesenhafter, 4. k. Sandwichinseln.  
 graminifolius Lamb. (*augustissimus* Ledeb.), grasblät-  
 teriger, 4. f. Ostrufsland, Kamtschatka.  
 hastifolius MB., spontonblättriger, 4. f. Caucasus.  
 hastulatus Sm., Lamb., spontonförmiger, ♀. k. Chili.  
 Hydrolapathum Huds. (*aquaticus* Auct., *longifolius* DC.),  
 Flus-A., 4. f. Europa.  
 lacerus Balb. (*roseus* Delil.), schlitzbättriger, ☉. f.  
 Aegypten.  
 laevigatus W., glatter, 4. f. ?  
 ?lancifolius Lk., lanzettblättriger, 4. f. ?  
 longifolius H. B. K., langblättriger, ☉. f. Südamerika.  
 Lunaria L., baumartiger, ♀. k. Canarische Inseln.  
 luxurians L. suppl., wuchernder, 4. Kn. f. Italien,  
 Frankreich, England.  
 macrophyllus Campd. (*arifolius* L. suppl.), großblät-  
 teriger, 4. f. ?  
 maritimus L. (*Anthoxanthum* Murr., *aureus* With., *acu-*  
*tus* Poll), Meerstrands-A., ♂. Wa. f. Europa.  
 maximus Schreb. (*heterophyllus* Schultz, *acutus* Hartm.),  
 größter, 4. f. Europa.  
 montevidensis Spgl., mondevidensischer, 4. k. Montevideo.  
 nepalensis Spgl. (*hamatus* Trevir., *tuberosus* Roxb.), ne-  
 pal'scher, 4. Kn. f. Nepal.  
 obtusifolius L., stumpfblättriger, 4. f. Europa.  
 β) *purpureus* Poir. (*sanguineus latifolius* H. Par.).  
 γ) *sylvestris* Wallr.  
 palustris Sm. (*maritimus* Hoffm., *limosus* Thuill.), Sumpf-  
 A., ♂. Wa. f. Mitteleuropa.  
 Patientia L., Gemüse-A., 4. f. Südeuropa.  
 β) *orientalis* Bernh.  
 persicarioides L., flöhkrautähnlicher, 4. f. Nordamer.  
 polygonifolius ? Fisch. et Mey., knöterichblättriger, ? ☉. f. ?  
 pulcher L., schöner, ♂. f. England, Südeuropa, Nord-  
 afrika, Caucasus.  
 β) *pauciflorus* Campd. (*auratus* Sm.). γ) *diva-*  
*ricatus* L.  
 roseus L., rosafarbiger, ☉. f. Aegypten, Cypern.  
 salicifolius Weinm., weidenblättriger, ☉. f. Californien.  
 sanguineus L. (*Nemolapathum* Wallr., *nemorosus* Mey.),  
 blutfarbiger, 4. f. Europa.  
 a) *viridis* K. Sm. (*nemorosus* Schrad.). β) *ge-*  
*nuinus* K.  
 sarcorrhizus Lk. (*cordatus* Dsf.), dickwurzeliger, 4. ♀.  
 Kn. k. Cap der guten Hoffnung.  
 scutatus L., schildförmiger, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.  
 β) *glaucus* Jacq.



**Rumex**

- Steinii Beck., Stein's, 4. f. Westdeutschland.  
 strictus Lk. (*dentatus* Sbr.), steifer, ♂. 4. f. Aegypten.  
 tingitanus L., tanger'scher, 4. f. Nordafrika, Spanien.  
 triangularis Poir., DC. (*tuberosus* Hort.), dreieckiger,  
 4. Kn. f. ?  
 tuberosus L., knolliger, 4. Kn. f. Italien.  
 ucranicus Hornem. (*reticulatus* Bess.), ukrainischer, ☉.  
 f. Ukraine.  
 uncinulatus Schrad. (? *uncatus* Trevir.), hackiger,  
 ♂. f. Nepal.  
 venosus Pursh, aderiger, 4. k. Louisiana.  
 verticillatus L., wirtelförmiger, 4. f. Nordamerika.  
 vesicarius L., blasenfrüchtiger, ☉. f. Afrika.  
*digynus* L. v. *Oxyria reniformis*. *spinosus* L. vid.  
*Emex spinosus*.

**Rumia** Hoffm., Rumie, V. II., Umbelliferae.

- taurica Hoffm. (*Cachrys taurica* Pall.), taurische, 4.  
 f. Taurien.

capensis Lk. v. *Capnophyllum africanum*.

**Ruppia** L. (H. B. Rupp, berühmter deutscher Botaniker), IV. III., Alismaceae-Patamophileae.

- maritima L., Meerstrands-R., 4. Wa. f. Europa, Amer.  
 rostellata K., geschnäbelte, 4. Wa. f. Ostsee, Mannsfeld.

**Ruscus** T., Mäusedorn, XXII. XIII. (XVI. I.), Sarmen-  
taceae (*Asparagineae*).

- aculeatus L., stacheliger, ♂. f. b. England, Südeuropa.  
 β) rotundifolius Barr. γ) laxus Sm. (? *flexuosus* Mill.).

- androgynus T., zwittherblüthiger, ♂. Sch. k. Canar. Inseln.  
 Hypoglossum L., Zungen-M., ♂. f. k. Italien, Griechenl.  
 Hypophyllum L., breitblättriger, ♂. f. b. k. Italien,  
 Macedonien, Caucasus.

β) trifoliatum Mill.

- racemosus L., traubiger, ♂. f. b. k. ? Portugal, Griechenl.  
 reticulatus Thbg., netzblättriger, ♂. Sch. k. C. d. g. H.

? *volubilis* Thbg. v. *Myrsiphyllum asparagoides*.

**Russelia** Jacq. (Dr. Russel, englischer Naturforscher  
und Reisender), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

- floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♂. w. Mexico.  
 juncea Zuccar. (*scoparia* H. Berol.), simsenförmige, ♂.  
 w. Mexico.

multiflora Sims, vielblumige, ♂. w. Mexico.

ternifolia H. B. K., dreiblättrige, ♂. w. Mexico.

**Ruta** T., Raute, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

- angustifolia P. (*chalepensis* β. L.), schmalblättrige, ♂.  
 k. f. b. Südeuropa, Kleinasien.

bracteosa DC., deckblättrige, ♂. f. b. k. Griechenland,  
 Sicilien, Dalmatien, Istrien.

chalepensis L. (*macrophylla* Ker), aleppische, ♂. k. f. b.  
 Nordafrika, Syrien.

corsica DC. (*divaricata* Salzmann), corsicanische, ♂. k.  
 f. b. Corsica.

divaricata Tenor. (*montana* Auct.), ausgespernte, ♂. f.  
 b. k. Oesterreichisches Litorale, Italien, Griechen-  
 land, Taurien.

β) crithmifolia Moric.

graveolens L. (*hortensis* Mill.), gemeine, ♂. f. Südeuropa.

montana L. (*legitima* Jacq., *sylvestris* Mill., *tenuifolia*  
 Desf.), Berg-R., ♂. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

**Ruta**

- pinnata* L., gefiederte, ♀. k. Canarische Inseln.  
*albiflora* Hook. vid. *Boenninghausenia albiflora*.  
*Buxbaumii* Poir. etc. vid. *Haplophyllum Bux-*  
*baumii* etc.

**Ruyschia** Jacq. (F. Ruysch, berühmter holländischer Anatom), V. 1., Guttiferae-Marcgraviaeae.

- clusiaefolia* Jacq., clusiablätterige, ♀. w. Westindien.

**Ryanea** Vahl (John Ryan, welcher in Westindien Pflanzen sammelte und dieselben an Vahl sendete), XIII. 1., Capparideae-Flacourtieae.

- speciosa* Vahl, prächtige, ♀. w. Trinidad.

**Rytidophyllum** Mart., Grübchenblatt, XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

- auriculatum* Hook., gehörtes, ♀. w. Brasilien.

**Sabal** Adans., Sabalpalme, VI. 111., Palmae.

- Blackburniana* Lodd., Blackburn's, ♀. w. Südamerika.  
*graminifolia* Lodd., grasblätterige, ♀. w. Südamerika.  
*minor* P. (*Adansoni* Bot. mag.), kleine, 4. ♀. w. t. Carolina, Georgia.

- umbraculifera* Lodd., schirmförmige, ♀. w. Jamaica.

*Palmetto* Lodd. v. *Chamaerops Palmetto*.

**Sabbatia** Adans. (L. Sabbati, italienischer Botaniker), V. 1., Contortae-Gentianeae.

- angularis* Pursh, kantige, ♂. f. Nordamerika.  
*calycosa* Pursh, großkelchige, ♂. f. Nordamerika.  
*chloroides* Pursh, chloraähnliche, ♂. f. Nordamerika.  
*gracilis* Salisb., schlanke, ♂. f. Nordamerika.  
*paniculata* Pursh, rispige, 4. f. Nordamerika.

**Sabulina** Rchb. v. Alsine.**Saccharum** L., Zuckerrohr, III. 11., Gramineae.

- caudatum* Mey., schweif förmiges, 4. w. Essequibo.  
*chinense* Roxb., chinesisches, 4. w. China.  
*contractum* Poir., schmalrispiges, 4. w. Westindien, Südamerika.  
*dubium* H. B. K. (*Anatherum Berterianum* Schult., *A. portoricense* Sogl.), zweifelhaftes, 4. w. Südamerika.  
*mexicanum* Brouss., mexicanisches, 4. w. Mexico.  
*Munja* Roxb., Munja-Z., 4. w. Ostindien.  
*officinatum* L., gemeines, 4. w. Ost- und Westindien.  
*polystachyon* Sw., vielähriges, 4. w. Westindien, Südamer.  
*procerum* Roxb. (*Thunbergii* Retz), hohes, 4. w. Bengalen.  
*violaceum* Tussac, violettes, 4. w. Ost- und Westind.  
*appressum* Kit. (*strictum* Sogl.) et *giganteum* P. et *Ravennae* Murr. v. *Erianthus strictus*, saccharoides etc. *cylindricum* Lam. etc. v. *Imperata cylindrica* etc. *spicatum* L. vid. *Perotis latifolia*. *Teneriffae* L. v. *Tricholaena micrantha*.

**Saccolobium** Blume, Sackstendel, XX. 1., Orchideae.

- bifidum* Lindl., weispaltiger, 4. w. Manilla.  
*papillosum* Lindl., weichwarziger, 4. w. Ostindien.

**Sagina** L., Mastkraut, IV. 11., Caryophyllaceae-Alsineae.

- apetala* L., kronenloses, ♂. f. Europa.  
*ciliata* Fr., gefranztes, ♂. f. Nord- und Westeuropa.  
*β) depressa* Schultz.  
*filiformis* Pourr., fadenförmiges, ♂. f. Pyrenäen, Calabrien.  
*maritima* Don (*stricta* Fries), Meerstrands-M., ♂. f. Irland, Schottland, Schweden, Deutschland.  
*muscoides* Fröl., moosähnliches, ♂. f. Tyrol.

**Sagina**

*procumbens* L., niederliegendes, ☉. f. Europa, Asien.

β) *pluripetala* Dens.

*urceolata* Viv., becherförmiges, ☉. f. Corsica.

*cerastoides* Sm. et *erecta* L. v. *Moenchia cerastoides* et *erecta*.

**Sagittaria** L., Pfeilkraut, XXI. ix. (XIII. iv.), Alismaceae.

*acutifolia* L., spitzblättriges, 4. Wa. w. Surinam, Pennsylvanien.

*angustifolia* Bot. Reg., schmalblättriges, 4. Wa. w. Essequibo.

*chinensis* Sims, chinesisches, 4. Wa. w. China.

*Doniana* Swt. (*hastata* D. Don), Don's, 4. k. Nepal.

*falcata* Pursh, sichelförmiges, 4. Wa. k. Carolina.

*graminea* Mchx., grasblättriges, 4. Wa. k. Nordamer.

*hastata* Pursh, spontonförmiges, 4. Wa. k. Pensylvan.

*heterophylla* Pursh, verschiedenblättriges, 4. k. Pensylv.

*lancifolia* L., lanzettblättriges, 4. Wa. f. Nordamer.

b) *flore pleno*.

*natans* Mchx., schwimmendes, 4. Wa. k. Südcarolina.

*obtusifolia* W., stumpfes, 4. Wa. k. Nordamerika.

*obtusifolia* L., stumpfblättriges, 4. Wa. w. Ostindien.

*rigida* Pursh, starrblättriges, 4. Wa. f. Nordamerika.

*sagittifolia* L., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*.

**Sagus** Rumph, G., Sagopalme, XXI. vi. (VI. iii.), Palmae.

*pedunculata* Poir. (*Ruffia* Jacq.), langstielige, 5. w. Madagascar.

*Rumphii* W., Rumph's, 5. w. Molucken.

*vinifera* P. (*Palma Pinus* G.), weingebende, 5. w. Guinea.

**Salaxis** Salish., *Salaxis*, VIII. i., Ericaceae.

*axillaris* Salish. (*Erica axill.* Thbg.), achselblumige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

**Salicornia** T., Glasschmalz, I. i., Aizoideae-Chenopodeae.

*arabica* Pall., L. suppl., arabisches, 5. k. Arabien.

*fruticosa* L., strauchiges, 5. k. Südeuropa.

β) *macrostachya* Moric.

*herbacea* L. (*acetaria* Pall., *annua* Engl. Bot.), krautartiges, ☉. f. Europa, Amerika.

β) *procumbens* Sm.

*perennans* W., ausdauerndes, 4. f. m. Sibirien.

*radicans* Sm., starkwurzelndes, 4. f. England, Norddeutschland.

**Salisburia adiantifolia** Sm. v. *Ginkgo biloba*.**Salix** T., Weide, XXII. ii. (II. i.), Amentaceae.

*acuminata* Sm. (*longifolia* Host), zugespitzte, 5. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa.

β) *virescens* Mey.

*acutifolia* W. (*caspica* Hort., *violacea* Ander. Sm.), spitzblättrige, 5. f. Schlesien, Mark Brandeb., Podolien.

*aegyptiaca* L., ägyptische, 5. f. b. Aegypten.

*alba* L., weisse, 5. f. Europa.

β) *coerulea* Sm. γ) *vitellina* L. ? b) *rosea* Lodd.

*ambigua* Ehrh. (*plicata* Fr., *incubacea* ? L., *versifolia* Sering), zweifelhafte, 5. f. Nord- und Mitteleuropa.

b) *spatulata* W. c) *prostrata* Sm. d) *undulata* Borr. β) *glabrata* K. (*finmarchica* W. non Fries.).



## Salix

- amygdalina* L. (*amygdalina* L. Vill., *sempervirens*, *speciosa* et *tenuiflora* Host), mandelblätterige, *h. f.* Europa.  
 b) *Hoppeana* W.  
 β) *concolor* K. (*triandra* L., *ligustrina* Host, *alopecuroides* Tausch.).
- angustifolia* Wulf. (*incubacea* W., *laeta* Schultz, *pratensis* Host, *rosmarinifolia* β. *incubacea* K., *fusca* et *longifolia* Mey.), schmalblätterige, *h. f.* Nord- und Osteuropa.
- Arbuscula* L., Strauch-W., *h. f.* Europäische Alpen.  
 a) *Waldsteiniana* W. (*Arbuscula* Jacq., *ovata* Sering.). β) *foetida* Schlchr. (*alpina* Swt., *prunifolia* Sering., *vaccinifolia* Engl. Bot., *formosa* Auct.). γ) *prunifolia* Sm. (*venulosa* Sm. et *carinata* Sm.).
- aurita* L. (*rugosa* Sering.), Salbei-W., *h. f.* Europa.  
 β) *microphylla* Lodd. (*heterophylla* Host). γ) *uliginosa* W. δ) *cladostemma* Hayne.
- babylonica* L. (*propendens* Ser.), babylonische, Trauer-W., *h. f.* Griechenland, Kleinasien.  
 b) *crispa* s. (*annularis* Hort.). c) *Napoleona* Hort.
- berberifolia* Pall., berberitzenblätterige, *h. f.* Dahurien.  
*bicolor* Ehrh. (*Arbuscula* Wahlbg., *phylicifolia* Sm., *Weigeliiana* W.), zweifarbige, *h. f.* Mittel- u. Nordeuropa.  
 β) *radicans* Sm. γ) *Dicksoniana* S.
- Bonplandiana* Humb., Bonpland's, *h. k.* Mexico.  
*caesia* Vill. (*prostrata* Ehrh., *myrtilloides* W.), hechtblaue, *h. f.* Südfrankreich, Schweiz.
- candida* W., reinweißse, *h. f.* Nordamerika.
- Caprea* L. (*tomentosa* Sering., *ulmifolia* Thuill., *aurigerana* Lapeyr.), Sohl-W. (Palm-W.), *h. f.* Europa.  
 β) *sphacelata* W.
- cinerea* L. (*acuminata* Hoffm., *polymorpha* Host, *Hoffmanniana* Bluff et Fing.), Werft-W., *h. f.* Europa.  
 β) *aquatica* Sm.
- conformis* Forb., einförmige, *h. f.* Nordamerika.
- conifera* Wangenh. (*conica* W.), zapfenförmige, *h. f.* Nordamerika.
- cordata* Mühlenb., herzförmige, *h. f.* Virginien, Pensylv.  
*cordifolia* Pursh, herzblätterige, *h. f.* Labrador.
- Croweana* Sm., Crowe's, *h. f.* England.
- cuspidata* Schultz (*tetrandra* L.), feinspitzige, *h. f.* Nordeuropa.  
 β) *Meyeriana* W.
- daphnoides* Vill. (*praecox* Hoppe, *bigemmis* Hoffm.), kellerhalsähnliche, *h. f.* Europa.  
 β) *cinerea* W. γ) *pomeranica* W.
- Davalliana* Sm., Davall's, *h. f.* Schottland.
- depressa* L. (*livida* Wahlenb.), niedergedrückte, *h. h. f.* Nord- und Osteuropa.  
 a) *velutina* K. (*sphacelata* Sm., *livida* β. *cinerascens* Wahlbg. β) *foliolosa* Afz. γ) *bicolor* Fries.
- discolor* Mühlenb., verschiedenfarbige, *h. f.* Nordamer.  
*divaricata* Pall., ausgespernte, *h. f.* Dahurien.
- Doniana* Sm., Don's, *h. h. f.* England, Westphalen.
- finmarchica* Fr. (*campestris* Fr.), finmärkische, *h. f.* Schweden.
- fragilis* L. (*fragilior*, *fragilissima*, *excelsior* et *palustris* Host, *Trevirani* Sgpl.), Bruch-W., *h. f.* Europa.

## Salix

- a) *decipiens* Hoffm.  $\beta$ ) *excelsa* Tausch. (*Wargiana* Lej., *fragilis* Sm.).  $\gamma$ ) *Russeliana* Sm.  
*fuscata* Pursh, bräunliche,  $\S$ . f. Nordamerika.  
*glabra* Scop. (*coruscans* W., *Wulfeniana* W.), kahle,  $\S$ . f. Baierische, salzburg., kärnthn. u. krainer Alpen.  
*glauca* L. (*sericea* Vill.), blaugrüne,  $\S$ . f. Europ. Alpen.  
 $\beta$ ) *albida* Schlchr. (*elaeagnoides* Schlchr.).  $\gamma$ ) *appendiculata* Vahl.  
*grandifolia* Sering (*stipularis* Sering, ?*cinerascens* W.), großblättrige,  $\S$ . f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.  
*grisea* W. (*sericea* Mühlbg.), graublättrige,  $\S$ . f. Nordam.  
*hastata* L. (*Ludwigii* Schk., *malifolia* W., *serrulata* W., *elegans* Host.), spontonförmige,  $\S$ . f. Europäische Alpen.  
*herbacea* L., krautartige,  $\S$ . f. Europäische Alpen.  
*hippophaefolia* Thuill. (*violacea* Hollandr.), sanddornblättrige,  $\S$ . f. Deutschland, Frankreich.  
 $\beta$ ) *undulaefolia* K. (*undulata* H. Gött.).  $\gamma$ ) *leiocarpa* K.  
*holosericea* W. (*velutina* Schrad.), sammethaarige,  $\S$ . f. Norddeutschland.  
*Houstoniana* Pursh (*tristis* Lodd.), Houston's,  $\S$ . f. Virginien, Carolina.  
*Humboldtiana* W., Humboldt's,  $\S$ . w. Südamerika.  
*humilis* W., niedrige,  $\S$ . f. ?  
*Jacquiniana* Host (*fusca* Jacq., *alpina* Scop.), Jacquin's,  $\S$ . f. Oesterreichische, steyerländische, kärnthner etc. Alpen.  
*incana* Schrk. (*riparia* W., *lavandulaefolia* Lapeyr., *angustifolia* Poir., *rosmarinifolia* Gouan, *Elaeagnos* Scop.), weisgraue,  $\S$ . f. Europa.  
*lanata* L. (*chrysantha* Flor. Dan.), wollige,  $\S$ . f. Lappl.  
 $\beta$ ) *glandulosa* Wahlenb.  $\gamma$ ) *depolita* Koch.  
*lapponum* L. (*limosa* Wahlbg., *helvetica* Vill., *nivea* Sering, *lactea* Bray, *arenaria* W. Sm., *glaucophylla* W., *Stuartiana* Sm.), lappländische,  $\S$ . f. Europäische Alpen.  
 $\beta$ ) *glauca* Sm. (*arenaria denudata* Tausch.).  
*laurina* Sm. (*tenuior* Borrer), lorbeerblättrige,  $\S$ . f. Engl.  
 b) *bicolor* Sm.  
*laxiflora* Borrer, lockerblumige,  $\S$ . f. England.  
*leucophylla* W., weisblättrige,  $\S$ . f. ?  
*longifolia* Mühlbg., langblättrige,  $\S$ . f. Pennsylvanien.  
*lucida* Mühlbg. (*Forbesii* Swt.), starglänzende,  $\S$ . f. Virginien, Pennsylvanien.  
*mollissima* Ehrh. (*pubera* Koch), weichblättrige,  $\S$ . f. Norddeutschland, Schlesien.  
*Mühlenbergiana* W. (*tristis* Mühlbg., *alpina* Walt.), Mühlenberg's,  $\S$ . f. Nordamerika.  
*myricoides* Mühlbg., wachsmyrtenähnliche,  $\S$ . f. Virginien, Pennsylvanien.  
*Myrsinites* L. (*arbuscula* W., *dubia* Sut.), myrsinenartige,  $\S$ . f. Europäische Alpen.  
 $\beta$ ) *lanata* K.  $\gamma$ ) *leiocarpa* K.  
*myrtilloides* L. (*elegans* Bess.), heidelbeerähnliche,  $\S$ . f. Lappland, Schlesien, Baiern.  
*nigra* Marsh. (*caroliniana* Mchx.), schwarze,  $\S$ . f. Virginien, Pennsylvanien.

**Salix**

*nigricans* Sm., Fr., schwärzliche, ♀. f. Europäische Voralpen und Alpen.

a) *phylicifolia* K., Wahlbg., ? L. (*stylaris* Sering., *hastata* Hoppe, *Ammanniana* W., *Andersoniana* Sm., *menthaefolia* Host, *prunifolia* et *parietariaefolia* et *nivalis* Host. β) *eriocarpa* K. (*nigricans* Wahlbg., *rupestris* Forst., *hirta* et *cotiniifolia* Sm., *Halleri* Sering).

*obovata* Pursh, verkehrteiförmige, ♀. f. Nordamerika.

*obtusifolia* W., stumpfblättrige, ♀. f. Lappland.

*oleaefolia* Sm., ölbaumblättrige, ♀. f. England.

*pedicellaris* Pursh, langstielige, ♀. f. Nordamerika.

*pentandra* L. (*tinctoria* Sm.), fünfmännige, ♀. f. Europa.

β) *latifolia* K. (*polyandra* Bray). γ) *hermaphrodita* L.

*petiolaris* Sm., stielblättrige, ♀. f. England, Nordam.

? β) *pensylvanica* Forb.

*phlomoides* MB., wollkrautähnliche, ♀. f. Südrussland.

*plagiophylla* \* (*Purshiana* Speg., *falcata* Pursh non Humb.), schieflättrige, ♀. f. Virginien, Pennsylvanien.

*planifolia* Pursh, flachblättrige, ♀. f. Labrador.

*polaris* Wahlenb., Polar-W., ♀. f. Nordnorwegen, Spitzbergen.

*Pontederana* Schlchr., W. (*discolor* et *austriaca* Host),

*Pontederas*, ♀. f. Böhmen, Oesterreich, Krain, Schweiz.

*prinoides* Pursh, winterbeerenähnliche, ♀. f. Nordamer.

*purpurea* L. (*monandra* Arduin. Hoffm., *mutabilis*, *oppositifolia*, *carniolica* et *mirabilis* Host), purpurfarbige, ♀. f. Europa.

β) *Lambertiana* Sm. γ) *Helix* L. δ) *monadelphica* K. ε) *sericea* Sering.

*Purshiana* Borrer (*ambigua* Pursh, Sm., Forb., Hook.), Pursh's, ♀. f. Nordamerika.

*pyrenaica* Gouan, pyrenäische, ♀. f. Pyrenäen.

*recurvata* Pursh, zurückgekrümmte, ♀. f. Nordamerika.

*reflexa* W., zurückgebogene, ♀. f. ?

*repens* L. (*depressa* Hoffm., *fusca* Auct., *incubacea* et *rostrata* Thuill., *parvifolia* Sm.), kriechende, ♀. f. Europa.

β) *fusca* Sm. γ) *argentea* Sm. (*arenaria* L. suec., *lanata* Thuill.). δ) *leiocarpa* Mey.

*reticulata* L., netzförmige, ♀. f. Europäische Alpen, Nordamerika.

*retusa* L., abgestutzte, ♀. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *major* K. (*Kitaibeliana* W.). γ) *minor* K. (*serpyllifolia* Scop.).

*rigida* Mühlbg. (*cordata* Mchx.), starrblättrige, ♀. f. Nordamerika.

*rosmarinifolia* L. (*tenuis* et *parviflora* Host), rosmarinblättrige, ♀. f. Nord- und Osteuropa.

*rubra* Huds. (*fissa* Ehrh., Hoffm., *virescens* Vill., *membranacea* Thuill., *concolor* Host, *olivacea* Thuill., *linnearis* Walker), rothe, ♀. f. Europa.

β) *Forbyana* Sm. γ) *sericea* K. (*elaeagnifolia* Tausch.).

*salviaefolia* Lk. (*patula* et *oleifolia* Sering, *Flüggeana* W.), salbeiblättrige, ♀. f. Schweiz, Portugal.

*Schraderiana* W. (*discolor* Schrad.), Schrader's, ♀. f. Deutschland.



## Salix

Seringeana Gaud. (*lanceolata*, *holosericea* et *Kanderiana* Sering, *longifolia* Schlchr.), Seringe's, *h. f.* Schweiz, Tyrol, Krain.

serotina Pall., späte, *h. f.* Südrufsland.

silesiaca W., schlesische, *h. f.* Sudeten, Carpathen.

*β)* *fagifolia* W.

Smithiana W. (*mollissima* Sm., ? *rufinervis* DC.), Smith's, *h. f.* England, Nord- u. Westdeutschland, Schlesien.

stipularis Sm. (*longifolia* Host), zwischenblättrige, *h. f.* England, Norddeutschland, Unterösterreich, Schlesien.

tetrapla Sm., vierseitigästige, *h. f.* Schottland.

*β)* *Davalliana* Sm.

tetrasperma Roxb., viersamige, *h. w.* Ostind., Aegypten, tristis Ait., trauernde, *h. f.* Nordamerika.

undulata Ehrh., wellenblättrige, *h. f.* Norddeutschland, England.

*β)* *lanceolata* Sm.

Uva ursi Pursh, beerentraubenähnliche, *h. f.* Labrador. versifolia Wahlenb. (*fusca* L.), wechselblättrige, *h. f.* Lappland.

viminalis L., Korb-W. (Bind-W.), *h. f.* Europa.

violacea W., violette, *h. f.* ?

viridis Fries, grüne, *h. f.* Schweden.

Wilhelmsia MB., Wilhelm's, *h. f.* Iberien.

Unbestimmtere oder Varietäten: *adscendens* Donald's, *australis* Forbes (Schweiz), *Ansoniana* Forb. (Schweiz), *atrovirens* Forb. (Schweiz), *atropurpurea* Forb. (Schweiz), *alpina* Forbes, *albescens* Schlchr. (Schweiz), *alnifolia* Host, *alaternoides* Forb. (Schweiz), *betulina* ? Host, *candidula* ? Host, *carpinifolia* Schlchr., *cerasifolia* Schlchr. (Schweiz), *cinnamomea* Schlchr. (Schweiz), *clethraefolia* Schlchr. (Schweiz), *coluteoides* H. Angl., *cydoniaefolia* Schlchr. (Schweiz), *crassifolia* Forb., *coriacea* Forb. (Schweiz), *crispa* Forb., *dubia* Hort., *decumbens* Forb., *damascena* Forb. (*damascenifolia* Anders.), *dura* Forb., *eriantha* Schlchr., *Ehrhartiana* Mey. (*hexandra* Ehrh.), *feruginea* Anders. (Schottland), *firma* Forbes, *Forbesiana* H. Angl. (*Weigelianae* Forbes), *glabrata* Schlchr. (Schweiz), *geminata* Forbes (England), *grisophylla* Forbes (Schweiz), *grisonensis* Forb., *helvetica* Forb., *Hoffmanniana* Sm. (*triandra* Hoffm.), *incanescens* Schlchr. (Schweiz), *latifolia* Forbes, *lacustris* Forb., *Lyoni* Schlchr. (Schweiz), *mespilifolia* Schlchr. (Schweiz), *Micheliana* Forb. (Schweiz), *murina* Schlchr. (Schweiz), *montana* Forb. (Schweiz), *monspeliensis* Forb. (*fragilis* var. Borrer), *macrostipulacea* Forb. (Schweiz), *mutabilis* Forb. (Schweiz), *nervosa* Schlchr. (Schweiz), *nitens* Anders. (Engl.), *obtusa* Lk. (Schweiz), *obtusoserrata* Schlchr. (Schweiz), *proteaefolia* Schl. (Schweiz), *pallida* Forb. (Schweiz), *pannosa* Forb. (Schweiz), *patens* Forb., *pallescens* Schlchr. (Schweiz), *persicaefolia* Hort., *petraea* Anders. (England), *procumbens* Forb. (Schottland), *propinqua* Borr. (Engl.), *pyrifolia* Schlchr. (Schweiz), *rivularis* Forbes (Schweiz), *rotundata* Forbes (Schweiz), *ramifusca* Forbes (England), *septentrionalis* Host, *semperflorens* Host, *sitchensis* Hort., *subserrata* W., *subalpina* Forb. (Schweiz), *strepida*

**Salix**

Forb. (Schweiz), Schleicheriana Forb. (Schweiz), tenuifolia Lodd., virgata Forb. (Nordamerika), versicolor Forb. (Schweiz), vaudensis Forb. (Schweiz), villosa Forb. (Schweiz), vaccinioides Host, Willdenowiana Forbes, Woolgariana Borrer. etc.

**Salmea** DC. (C. Fürst von Salm-Dyck), XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

Eupatoria DC., dostenähnliche, ♀. w. Caribäen.

hirsuta DC., rauhaarige, ♀. Sch. w. Jamaica.

scandens DC., klimmende, ♀. Sch. w. Vera-Cruz, Jamaica.

*Salmia angustifolia* W. etc. v. *Carludovicia angustifolia* etc.

*Salpianthus arenarius* H. B. K. v. *Boldoa lanceolata*.

**Salpiglossis** R. et P., Zungenröhre, XIV. 11., Solanaceae. atropurpurea Grah., schwarzpurpurrothe, ☉. ♂. f. t. Cordilleren.

Barclayana Penny (*intermedia* Swt.), Barclay's, ☉. ♂. f. t. Englische Hybride.

parviflora G. Don, kleinblumige, ♂. t. Chili.

picta Swt., bemalte, ☉. ♂. f. t. Chili.

sinuata R. et P., buchtigblättrige, ☉. ♂. f. t. Chili.

straminea Hook., strohfarbige, ☉. f. t. Chili.

*integrifolia* Hook. vid. *Petunia Mirabilis linearis* Hook. v. *Petunia intermedia*.

**Salsola** L., Salzkraut, V. 11., Aizoideae-Atripliceae.

brachiata Pall., kreuzästiges, ☉. f. Mittelasien.

crassa MB., dickes, ☉. f. Caucasus etc.

erubescens Schrad., röthliches, ☉. f. Sibirien,

foliosa Schrad., blattreiches, ☉. f. Sibirien.

glauca MB. (*spicata* Pall.), blaugrünes, ♀. k. Mittelasien.

Kali L., gemeines, ☉. f. Europa, Asien, Amerika.

laniflora L. (*lanata* Pall.), wollblumiges, ☉. f. Mittelasien.

microphylla Cav., kleinblättriges, ☉. f. Spanien.

oppositifolia Dsf., gegenblättriges, ♀. k. Sicilien, Nordafrika,

rigida Pall., starres, ♀. k. Sibirien.

rosacea L., rosafarbiges, ☉. f. Mittelasien.

sativa L., gebautes, ☉. f. Spanien.

Soda L., Soda-S., ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Taurien, Caucasus.

tamariscina Pall., tamariskenähnliches, ☉. ♀. f. k. Taurien, Mittelasien.

Tragus L., glattes, ☉. f. Südeuropa, Mittelas., Nordafrika.

vermiculata L., wurmförmiges, ☉. ♀. f. k. Sibirien.

verrucosa MB., warziges, ☉. ♀. f. Caucasus.

*altissima* L. v. *Schaginia altissima*. *arenaria* WK. (et *dasyantha* Pall. etc.) vid. *Kochia arenaria* etc.

*radiata* Dsf. v. *Kochia dentata*. *articulata* Forsk.

v. *Anabasis aphylla*. *divergens* Poir., *fruticosa* L.,

*salsa* L. etc. v. *Suaeda hortensis*, *Schoberia fruticosa* etc.

*trigyna* W. (*altissima* Cav). vid. *Schaginia trigyna*.

**Salvia** T. L., Salbei, II. 1., Labiatae.

abyssinica Jacq., abyssinische, 4. ♀. k. Afrika.

aegyptiaca L., aegyptische, ♀. k. Aegypten, Canarische Inseln.

Aethiopis L., ungarische, ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen.

?affinis Spgl., ähnelnde, 4. f. ?

africana L., afrikanische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

## Salvia

- algeriensis Dsf., algier'sche, 4. f. Nordafrika.  
 amarissima Orteg. (*amara* Jacq., *acuminata* R. et P., *circinnata* Cav.), bittere, ♀. k. Mexico.  
 amethystina Sm., amethystfarbige, ♀. w. Neugranada.  
 amplexicaulis Lam. (*valentina* Vahl), stengelumfassende, 4. f. Spanien.  
 angustifolia Cav. (*reptans* Jacq.), schmalblättrige, 4. k. Mexico.  
 applanata W., flachgedrückte, ♂. f. k. ? Aegypten, Creta.  
 argentea L., silberfarbige, ♂. 4. f. k. Creta.  
 aurea L., goldfarbige, ♀. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
 aurita Thbg., geöhrt, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 austriaca L., österreichische, 4. f. Oesterreich, Siebenb.  
 azurea Lam., azurblaue, 4. f. k. Südcarolina.  
 Barrelieri Etl., Barrelier's, 4. f. Calabrien, Spanien.  
 Bauhini Fisch., Bauhin's, 4. f. ? Rußland.  
 betonicaefolia Etl. (*pendula* Vahl, *cremenecensis* Bess., betonienblättrige, 4. f. Galicien, Podolien, Siebenb.  
     b) grandiflora.  
 bicolor Lam., zweifarbig, 4. f. Nordafrika.  
 biflora R. et P., zweiblumige, 4. k. w. Peru.  
 Boosiana Jacq. fil. (*amoena* Curt. Lindl., *thymiflora* W.), Boos's, 4. w. Peru.  
 bracteata Russ., deckblättrige, 4. ♀. f. b. k. Syrien.  
 byzantina Russ., türkische, ♂. f. Türkei.  
 caesia Humb. (*polystachya* Orteg., *lineatifolia* Lag., *lamiifolia* Jacq.), hechtblaue, ♀. k. Mexico.  
 calycina Sibth., großkelchige, ♀. f. b. k. Griechenland.  
 campestris MB. (*caduca* Hornem., *hypanica* Bess.), Feld-S., 4. f. Taurien.  
 canariensis L., canarische, ♀. k. Canarische Inseln.  
 candidissima Vahl (*crassifolia* Sibth.), weißswollige, 4. f. b. k. Cypern.  
 canescens C. A. Mey., weißgraue, 4. f. Caucasus.  
 ceratophylla L. (*exasperata* Cav.), hornblättrige, ♂. f. k. Nordafrika, Kleinasien.  
 ceratophylloides Arduin, L., halbgefiederte, ♂. f. k. Aegypten, Sicilien.  
 chamaedryoides Cav. (*Chamaedrys* W.), gamanderartige, ♀. k. Mexico.  
 clandestina L. (*ceratophylloides* W.), heimlichblumige, 4. f. Süd- und Osteuropa.  
     β) controversa Tenor. (*lanigera* Poir., *clandestina* Sibth.).  
 coarctata Vahl, gedrungene, 4. f. Kleinasien.  
 coccinea L. Murr., scharlachrothe, ♂. ♀. k. Südcarolina, Florida, Mexico.  
 colorata L. (*barbata* Lam.), buntkelchige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 comutata Benth. (*dominica* L.), verwechselte, 4. f. Syrien.  
 compressa Vahl, platte, 4. f. ?  
 confusa Benth. (*aurita* Schult.), verkannte, ♀. f. Südeuropa.  
 cretica L. (*tenuifolia* Riv.), cretische, ♀. k. Creta, Spanien.  
 cyaniflora H. Berol. (? *cyanea* Benth.). kornblumenblaue, ♀. k. Mexico.  
 dentata Ait., gezahnte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 desertorum Schang., Wüsten-S., 4. f. Sibirien.  
 disermas L., zottige, 4. f. b. k. Syrien.



## Salvia

- dolichostachya* Lagasc., langähhrige, ♀. k. t. Mexico.  
*?erosa* Dsf., benagte, ☉. f. ?  
*foliosa* Benth., blattreiche, ☉. ♂. f. k. Mexico.  
*Forskolei* L., Forskol's, 4. k. Orient.  
*fulgens* Cav. (*cardinalis* Humb.), feuerfarbige, ♀. k. Mexico.  
*gigantea* Dsf., riesenhafte, ♂. f. ?  
*glutinosa* L., klebrige, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.  
*Grahami* Benth., Graham's, ♀. k. Mexico.  
*grandiflora* Etl., großblumige, 4. f. Taurien.  
*haematodes* L. (*virgata* Sav.), blutfarbige, 4. Kn. f. Italien, Spanien.  
*hastata* Etl., spontonblättrige, 4. f. Rußland.  
*hirsuta* Jacq. (*ciliata* Hort.), rauhhaarige, ☉. f. Mexico.  
*hispanica* L., spanische, ☉. f. Spanien, Frankreich.  
*Horminum* L., Scharlach-S., ☉. f. Italien, Südfrankreich, Griechenland.  
     b) violacea. c) rubra.  
*indica* L., indische, 4. k. Ostindien.  
*interrupta* Schousb., unterbrochenblättrige, ♀. k. Mauritanien.  
*involucrata* Cav., eingehüllte, 4. ♀. k. t. Mexico.  
*lanceolata* Cav., Brouss. (*reflexa* Hornem.), lanzettblättrige, ☉. f. Neuspanien.  
*lavandulaefolia* Vahl (*hispanorum* Lag., *rosmarinifolia* Hort., *tenuior* Dsf.), lavendelblättrige, ♀. k. Spanien.  
*leonuroides* Glox. (*formosa* L'Her., *nodosa* R. et P.), löwenschwanzähnliche, ♀. t. Peru.  
*leucantha* Cav., weißblumige, 4. k. t. Mexico.  
*limbata* C. A. Mey., gesäumte, 4. f. Caucasus.  
*lusitanica* Poir. (*sclareoides* Brot., *bullata* Schousb., *elongata* Spgl.), portugiesische, 4. f. Spanien, ?Portug.  
*lyrata* L., leierförmige, 4. f. Virginien.  
*mexicana* L. (*melissaefolia* Dsf., ?*papilionacea* Cav.), mexicanische, ♀. k. t. Mexico.  
*micrantha* Vahl (*bullata* Orteg.), kleinblumige, 4. t. w. Westindien.  
*mollis* Jacq., weiche, 4. f. ?  
*napifolia* Jacq., rübenblättrige, 4. f. Südeuropa.  
*nemorosa* L., Hain-S., 4. f. Mittel- und Osteuropa.  
*?nepetifolia* Dsf., katzenmünzenblättrige, ☉. f. ?  
*nilotica* Murr., nilotische, 4. k. Aegypten.  
*nubia* Murr., nubische, 4. k. Afrika.  
*nubicola* Wall., Swt., wolkige, 4. k. Nepal, Ostindien.  
*nutans* WK., nickende, 4. f. Ungarn, Galicien.  
*occidentalis* Sw., westindische, 4. w. Jamaica.  
*odorata* W., wohlriechende, ♀. k. Bagdad.  
*officinalis* L., officinelle, ♀. f. Süd- und Westeuropa.  
     b) variegata. β) *crassifolia* Dsf. (*latifolia* Hort., ?*chromatica* Hoffmsg.).  
*paniculata* L., rispige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
*patens* Cav., Benth. (*macrantha* Hort.), abstehende, 4. ♀. k. Neuspanien.  
*patula* Dsf. (*Aethiopis* Brot., *atlantica* P.), ausgebreitete, ♂. k. Portugal, Mauritanien.  
*phlomoides* Asso, wollkrautähnliche, ♂. 4. f. Spanien.  
*pilantha* Lk. (*Linkiana* R. et S., *rosaefolia* Hort.), haarblumige, ♀. k. ?  
*pinnata* L., gefiederte, ♂. k. Kleinasien.

## Salvia

pomifera L. (*fragifera* Etl.), äpfeltragende, ♀. k. Griechenland, Syrien.

pratensis L. (*agrestis* L.), Wiesen-S., 4. f. Europa.

b) alba. c) rubra. d) rostrata Schm. β) dumetorum Andr., Bess.

prismatica Cav., prismatische, ☉. f. Mexico.

pseudococcinea Jacq., leuchtendrothe, ☉. ♀. f. k. Süd- und Osteuropa.

pulchella DC., hübsche, ♀. t. w. Südamerika.

purpurea Cav., purpurfarbige, 4. t. k. Mexico.

pyramidalis Petagn., pyramidale, 4. f. Calabrien.

pyrenaica L., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

rosaefolia Sm., rosenblättrige, ♀. k. f. b. Armenien.

rosea Vahl, rosafarbige, ♀. w. Ostindien.

rubra Spgl., rothe, 4. f. b. ? Aegypten.

rugosa Thbg., runzelige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

runcinata L., schrotsägenförmige, ♀. k. Cap d. g. H.

scabiosaefolia Lam. (*Hablitziana* Pall. W.), scabiosenblättrige, 4. ♀. f. b. Taurien.

scabra Thbg., scharfe, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Sclarea L., Muscateller-S., ♂. f. Süd- und Osteuropa.

Scorodonia Poir. (*melissodora* Lag., *hirta* Auctor.), Scorodonien-S., ♀. k. t. Mexico.

serotina L. (*dominica* Vahl), spätblühende, ♀. k. Griechenland, ? Westindien.

Simsiana Schult. (*bracteata* Sims), Sims's, 4. f. Rußland.

Spielmanni Scop. (*truncata* Donn), Spielmann's, 4. f. Italien.

β) pinnatifida Lk. (*Verbenaca* W.).

spinosa L. Jacq. (*praecox* Vahl), dornige, ☉. ♂. f. k. Aegypten.

splendens Ker, Sellow (*brasiliensis* Spgl., *colorans* Hortul.), prächtige, ♀. w. Brasilien.

strictiflora Hook., steifblumige, ♀. w. Peru.

sylvestris L., wilde, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

syriaca L., syrische, ♀. k. Syrien.

Tenorii Spgl. (*Barrelieri* Schrk.), Tenore's, 4. f. Calabrien.

tiliaefolia Vahl (*fimbriata* H. B. K.), lindenblättrige, ♀. k. t. Peru.

tingitana Etl. (*foetida* Lam.), färbende, ♀. k. Nordafrika.

trichostemmoides Pursh, trichostemmaähnliche, ☉. f. Nordamerika.

triloba L. suppl. (*Clusii* Jacq., *baccifera* Etl.), dreilappige, ♀. k. Syrien, Griechenland.

tubifera Cav., röhrige, 4. w. Mexico.

tubiflora Sm., röhrenblumige, ♀. k. Lima.

urticaefolia L., nesselblättrige, 4. f. Nordamerika.

variegata WK., bunte, 4. f. Ungarn.

verbascifolia MB. (*candidissima* MB.), königskerzenblättrige, 4. f. Iberien, Caucasus.

Verbenaca L. (*polymorpha* Lk. Hfmsg., *clandestina* W., *praecox* Savi), eisenkrautähnliche, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

β) multifida Sibth. γ) oblongata Vahl.

versicolor Lag., verschiedenfarbige, 4. f. Spanien.

verticillata L., wirtelförmige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.

β) auriculata. γ) macrophylla.

virgata Ait., ruthenförmige, 4. f. Kleinasien.

viridis L., grüne, ☉. f. Italien, Griechenl., Nordafrika.

viscosa Jacq., schmierige, 4. f. Italien.

**Salvia**

*vulnerariaefolia* W., wundkrautblättrige, ♀. k. Armen.  
*carnosa* Dougl. v. *Audibertia incana*.

**Salvinia** Michel. Guett. (Antonio Maria Salvini, Professor zu Florenz), XXIV. IV., Rhizocarpace (*Marsiaceae*)-Salvinieae.

*natans* All., schwimmende, 4. Wa. f. Europa, Nordam.

*Samara coriacea* Sw. et *pentandra* Sw. v. *Myrsine coriacea* et *Samara*.

**Sambucus** T., Hollunder, V. III., Dipsaceae-Viburneae.

*canadensis* L., canadischer, ♀. f. Nordamerika.

*chinensis* Lindl., chinesischer, 4. f. China.

*Ebulus* L. (*herbacea* Hall.), Zwerg-H., 4. f. Europa, Caucasus.

β) *humilis* Mill.

*nigra* L. gemeiner (Flieder), ♀. f. Europa, Nord- und Mittelasien.

b) *virescens* Dsf. c) *leucocarpa* DC. (*albida* Hort.).

d) *rotundifolia* Hort. e) *monstrosa* Hort.

f) *fol. argenteis* Hort. (*variegata* Hort.). g) *foliis*

*luteis* Hort. (*aurea* Hort.). β) *laciniata* Mill. Retz.

*pubens* Mchx. (*racemosa* Hook., *pubescens* Lodd.), weichhaariger, ♀. f. Nordamerika.

*racemosa* L., traubiger, ♀. f. Mittel- und Südeuropa.

β) *laciniata* K.

**Samolus** L., Pungen, V. I., ?Sapotaceae-Myrsineae (*Ardisiaceae*).

*campanuloides* RB., glockenblumenähnliche, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*litoralis* RB., Strand-P., 4. k. Neuzeeland, Neuholland.

*Valerandi* L., Salz-P., ♂. 4. k. Europa, Asien, Südafrika, Amerika.

**Samyda** L. (griechischer Name für Birke), X. I., Samydeae.

*decurrens* Spgl., herablaufende, ♀. w. Brasilien.

*glabrata* Sw., glatte, ♀. w. Jamaica.

*macrophylla* W. (*viridiflora* Poir.), großblättrige, ♀. w. Ost- und Westindien.

*nitida* L., glänzende, ♀. w. Jamaica.

*pubescens* L., weichhaarige, ♀. w. Hispaniola.

*rosea* Ait., rosafarbige, ♀. w. Westindien.

*serrulata* L., sägezähnige, ♀. w. Westindien.

*villosa* Sw., zottige, ♀. w. Jamaica.

**Sandoricum** Rumph (Santoor, ostindischer Name), XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.

*indicum* Cav., indisches, ♀. w. Philippinen, Molucken.

**Sanguinaria** Dill., Blutkraut, XIII. I., Papaveraceae.

*canadensis* L., canadisches, 4. Kn. f. b. Nordamerika.

*grandiflora* Rosc., großblumiges, 4. Kn. f. b. Nordamer.

**Sanguisorba** R. L., Wiesenknopf, IV. I., Rosaceae-Sanguisorbeae.

*bracteosa* Fisch., deckblättriger, 4. f. ?Podolien.

*canadensis* L., canadischer, 4. f. Canada.

*carnea* Fisch. (*rubra* Schrk.), fleischfarbiger, 4. f. ?

*mauritanica* Dsf., mauritanischer, 4. f. Nordafrika.

*media* L., mittlerer, 4. f. Canada.

*officinalis* L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) *auriculata* Scop.

*neglecta* G. Don, übersehener, 4. f. ?

*tenuifolia* Fisch., feinblättriger, 4. f. ?



**Sanicula** T., Sanikel, V. II., Umbelliferae.

*canadensis* L., canadischer, 4. f. Nordamerika.

*europaea* L., gemeiner, 4. f. Europa.

*marylandica* L., maryländischer, 4. f. Nordamerika.

**Sanseviella** Rchb., Sansevielle, VI. I., Aroideae-Tacceae.

*carnea* Rchb., fleischfarbige, 4. f. b. k. China.

**Sansevieria** Thbg. (Sansevier, schwedischer Botaniker),

VI. I., Corönariae-Hemerocallideae.

*ensifolia* Haw., schwertblättrige, 4. w. Ostindien.

*fulvo-cincta* Haw., rothgelbrandige, 4. w. Brasilien.

*glauca* Haw., blaugrüne, 4. w. ?

*grandicuspis* Haw., großspitzige, 4. w. ?

*guineensis* W. (*thyrsiflora* Thbg.), guineische, 4. w. Guinea.

*laete virens* Haw., freudiggrüne, 4. w. Cochinchina.

*lanuginosa* W., wollige, 4. w. Ostindien.

*longiflora* Sims, langblumige, 4. w. Afrika.

*polyphylla* Haw., vielblättrige, 4. w. ?

*pumila* Haw., kleine, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

*spicata* Haw., ährige, 4. w. Ostindien.

*stenophylla* Lk., schmalblättrige, 4. ?

*zeylanica* W., zeylonische, 4. w. Ceylon.

*carnea* Andr. (*sessiliflora* Bot. mag.) vid. *Sanseviella carnea*.

**Santalum** L. (*Sandalum* Anct.), Sandelholz, IV. I., Sandalaceae.

*album* L., weisses, 5. w. Ostindien.

*myrtifolium* Spgl. (*Sirium myrtifol.* L. mant.), myrtenblättriges, 5. w. Ostindien.

*obtusifolium* RB., stumpfblättriges, 5. 5. t. Neuholland.

**Santolina** T., Heiligenpflanze, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

*Chamaecyparissus* L. (*incana* Lam.), cypressenartige, 5. k. f. b. Südeuropa.

*leucantha* Bertol. (*pinnata* Viv.), weißblumige, 5. k. f. b. Italien.

*pectinata* Lag., kammförmige, 5. k. Spanien.

*rosmarinifolia* L. (*minor* Mill.), rosmarinblättrige, 5. k. Spanien.

*squarrosa* W. (*villosa* Mill.), sparrige, 5. k. Südfrankreich, Spanien.

*viridis* W. (*virens* Mill., *cupressiformis* Lam.), grüne, 5. k. f. b. Südfrankreich, Spanien.

*anthemoides* L. vid. *Lyonetia abrotanifolia*.

Murr. (*alpina* Bertol., *pinnata* Donn), *crithmifolia*

Hornem., *eriosperma* P. v. *Lasiospermum crithmi-*

*folium* etc. Nachtr. (*rigida* Sm. v. *Lyonetia rigida*

Nachtr. *maritima* Huds. Sm. v. *Otanthus maritimus*.

**Sanvitalia** Cav., Sanvitalie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*procumbens* W. (*villosa* Cav.), niederliegende, 5. f. m. Mexico.

**Sapindus** T., Seifenbaum, VIII. III., Sapindacei.

*emarginatus* Vahl, ausgerandeter, 5. w. Ostindien.

*Forsythii* DC., Forsyth's, 5. w. Caribäen.

*frutescens* Aubl. (*surinamensis* Poir.), strauchiger, 5. w. Guiana.

*indicus* Poir., indischer, 5. w. Ostindien.

*laurifolius* Vahl, lorbeerblättriger, 5. w. Malabar.

*longifolius* Vahl, langblättriger, 5. w. Ostindien.

*marginatus* W. (*Saponaria* Mchx.), randstieliger, 5. t. Carol.

**Sapindus**

*rigidus* Ait., starrer, ♀. w. Westindien.

*rubiginosus* Roxb., rostfarbiger, ♀. w. Ostindien.

*Saponaria* L., gemeiner S., ♀. w. Caribäen, Südamer.

*senegalensis* Poir., senegal'scher, ♀. w. Senegal.

**Sapium** Jacq., Saftbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*aucuparium* Jacq. (*Hippomane biglandulosa* Aubl.), zweidrüsiger, ♀. w. Surinam, Westindien.

*Hippomane* Meyer (*aucuparium* W.; *Hippom. biglandul.* L.), Mancinellen-S., ♀. w. Westindien.

*ilicifolium* W., stechhülsenblättriger, ♀. w. Westindien.

*indicum* W., indischer, ♀. w. Ostindien.

**Saponaria** L., Seifenkraut, X. ii., Caryophyllaceae.

*bellidifolia* Sm., maßliebenblättriges, 4. f. b. Calabrien.

*caespitosa* Sm., rasenartiges, 4. k. Griechenland.

*calabrica* Guss., calabrisches, ☉. f. Calabrien.

*cerastoides* Fisch. et Mey., hornkrautähnliches, ☉. f. Nordpersien.

*depressa* Bivon. (*sicula* Rafin.), niedergedrücktes, 4. f. b. k. Sicilien.

*elegans* Lapeyr. (*caespitosa* DC.), zierliches, 4. f. Pyren.

*glutinosa* MB., klebriges, ♂. f. Caucasus.

*lutea* L., gelbes, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, italienische Alpen.

*ocymoides* L., basilicumähnliches, 4. f. b. k. Süd- und westeuropäische Alpen.

*officinalis* L., gemeines, 4. f. Europa.

b) fl. pleno. c) fl. pleno purpureo.

*orientalis* L., morgenländisches, ☉. f. Kleinasien.

*porrigens* L., ausgestrecktes, ☉. f. Kleinasien.

*viscosa* Fisch. et Mey., schmieriges, ☉. f. ? Persien.

*perfoliata* Roxb. et *Vaccaria* L. v. *Vaccaria perfoliata* et *pyramidata*.

**Saracha** R. et P. (Isidore Saracha, ein spanischer Benedictinermönch und Botaniker), V. i., Solanaceae.

*procumbens* R. et P. (*Atropa plicata* Roth, *Bellinia procumb.* R. et S.), niederliegende, ☉. 4. f. k. Peru.

*umbellata* DC. (*Bellinia umbell.* R. et S.), doldige, 4. ♀. t. w. Peru.

*viscosa* Swt., schmierige, ♀. t. w. ? Peru.

**Sarcanthus** Lindl., Fleischblume, XX. i., Orchideae.

*guttatus* Lindl. (*Aerides guttat.* Roxb.), tropfenfleckige, 4. w. Ostindien.

*paniculatus* Lindl., rispige, 4. w. China.

*praemorsus* Lindl., abgebissene, 4. w. Ostindien.

*rostratus* Lindl., schnabelförmige, 4. w. China.

*succisus* Lindl., abgeschnittene, 4. w. China.

*teretifolius* Lindl., rundblättrige, 4. w. China.

**Sarcocapnos** DC., Fleischrauch, XVII. ii., Fumariaceae.

*enneaphylla* DC., neunblättriger, 4. f. Südfrankreich, Spanien.

**Sarcocaulon** DC., Fleischstämmchen, XVI. vii., Geraniaceae.

*Burmanni* DC., Burmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*L'Heritieri* DC., L'Heritier's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*Patersonii* DC., Paterson's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

**Sarcocephalus** Afz., Fleischkopf, V. i., Rubiaceae.

*esculentus* Afz., genießbarer, ♀. ♀. w. Sierra Leone.

**Sarcochilus** RB., Fleischlippe, XX. i., Orchideae.

**Sarcochilus**

*falcatum* RB., sichelförmige, 4. w. Neuholland.

*praemorsum* Spgl. v. *Sarcanthus praemorsus*.

**Sarcococca** Lindl., Fleischknopf, XX. 1v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*pruniformis* Lindl., pflaumenförmiger, 5. t. Nepal.

**Sarcolobus** RB., Fleischwende, V. 11., Asclepiadeae.

*carinatus* RB., Wall., nachenförmige, 5. Sch. w. Bengalen.

*globosus* RB., Wall., kugelfrüchtige, 5. Sch. w. Bengalen.

**Sarcophyllum** Thbg., Fleischblatt, XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*carnosum* Thbg., capisches, 5. k. t. Cap der gut. H.

**Sarcostemma** RB., Fleischkrönchen, V. 11., Asclepiadeae.

*Swartzianum* R. et S., Swartz's, 5. Sch. w. Westind.

*viminale* RB., gertenartiges, 5. Sch. w. Afrika, Ostind.

**Sarracenia** T. (Dr. Sarrazin, französischer Arzt), XIII. 1., Sarracenieae.

*flava* L., hellgelbe, 4. k. Nordamerika.

*minor* Nutt., kleine, 4. h. Nordamerika.

*purpurea* L., purpurfarbige, 4. k. Nordamerika.

*rubra* Walt., rothe, 4. k. Nordamerika.

*variolaris* Mchx. (*adunca* Sm.), schorfige, 4. k. Carolina.

**Satureja** T., Saturey (Pfefferkraut), XIV. 1., Labiatae. I. Genuina.

*hirsuta* Presl, rauhhaariges, 4. k. Sicilien.

*hortensis* L., gemeines Pfeffer- oder Bohnenkraut, ☉. f. Taurien, Caucasus.

*montana* L., Berg-P., 5. k. f. b. Südeuropa.

*mutica* Fisch. et Mey., spitzenloses, 4. 5. k. f. b. Talüsch.

*obovata* Lag., verkehrteiförmiges, 5. k. f. b. Südspanien.

*pygmaea* Sieb. (*subspicata* Bernh., *illyrica* Host), zwergiges, 5. k. f. b. Illyrien, Dalmatien.

*Thymbra* L., griechisches, 5. k. Nordafrika, Griechenland, Kleinasien.

*variegata* Host, buntes, 5. k. f. b. Oesterr. Litorale.

II. *Micromeria* Benth.

*approximata* Bivon. (*fascicularis* Rafin.), büschelförmiges, 5. k. Sicilien.

*canescens* Guss., grauliches, 5. k. Sicilien.

*congesta* Hornem., gedrängtblumiges, 5. k. ?

*filiformis* Benth. (*Thymus* f. Ait.), fadenförmiges, 5. k. Balearische Inseln.

*graeca* L. (? *micrantha* Hffmsg., Lk.), griechisches, 5. k. Griechenland, ? Portugal.

β) *consentina* Tenor.

*Juliana* L., julianisches, 5. k. Italien, Dalmatien, Griechenl.

*microphylla* Guss. (? *filiformis* Dsf., *Teneriffae* W.), kleinblättriges, 5. k. Sicilien, Nordafrika.

*nervosa* Dsf. (*capitata* Dsf., *filiformis* Tenor.), nerviges, 5. k. Südeuropa, Nordafrika.

*parviflora* Visian. (*inodora* Hort.), kleinblumiges, 5. k. Dalmatien.

*Piperella* Benth., quendelblättriges, 5. k. Süd- und Westeuropa, Croatien.

*subcordata* Vis., fastherzblättriges, 5. k. Dalmatien.

*Teneriffae* Benth. (*Thymus terebinthinaceus* W.), Teneriffa-P., 4. 5. k. Teneriffa.

*tenuifolia* Tenor., dünnblättriges, 5. k. Apulien.



**Satureja**

*varia* Benth. (*thymoides* Lowe, *Thymus ericaefolius* Roth),  
veränderliches, ♂. k. Canarische Inseln.

*marifolia* Benth., *Pulegium* Benth. et *rupestris*  
Wulf. (*thymifolia* Scop.) vid. *Calamintha marifolia*,  
*subnuda* et *thymifolia*.

**Satyrium** L., Faunstendel, XX. 1., Orchideae.

*candidum* Lindl., reinweißer, 4. Kn. w. Cap d. g. H.  
*carneum* RB., fleischfarbiger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.  
*coriifolium* Sw. (*erectum* Sw.), lederblättriger, 4. Kn.  
w. Cap der guten Hoffnung.

*cucullatum* Sw., kappenförmiger, 4. Kn. w. C. d. g. H.  
*foliosum* Sw., blattreicher, 4. Kn. w. Cap d. gut. H.  
*membranaceum* Sw., hautblättriger, 4. Kn. w. Cap  
der guten Hoffnung.

*parviflorum* Sw., kleinblumiger, 4. Kn. w. C. d. g. H.  
*albidum* L. etc. v. *Gymnadenia albida* etc. *hirci-*  
*num* L. v. *Himantoglossum hircinum* Nachtr. *nigrum*  
L. vid. *Nigritella angustifolia* etc. *repens* L. vid.  
*Goodyera repens*.

**Saurauja** W. (?Sauraujo, spanischer Botaniker), XIII.  
v., Evonymaceae-Ternstroemiaceae.

*excelsa* W., hohe, ♂. w. Neu-Granada.

*nepalensis* DC., nepal'sche, ♂. w. Nepal.

**Sauroglossum** Lindl., Eidechsenzüngel, XX. 1.,  
Orchideae.

*elatum* Lindl., erhöhtes, 4. w. Brasilien.

**Saururus** L., Eidechschwanz, VII. III., ?Aroideae,  
?Piperaceae.

*cernuus* L., übergebogener, 4. Wa. k. Virginien.

*chinensis* Hort., chinesischer, 4. Wa. k. China.

*lucidus* Donn., spiegelnder, 4. Wa. k. f. Nordamerika.

**Saussurea** DC. (H. B. de Saussure, schweizerischer  
Naturforscher), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

*acuminata* Turcz., zugespitzte, 4. f. Dahurien.

*alata* DC. (*decurrens* Ledeb.), geflügelte, 4. f. Sibirien.

*alpina* DC., Alpen-S., 4. f. b. Europäische Alpen.

*amara* DC., bittere, 4. f. Sibirien.

*angustifolia* DC., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

*cana* Ledeb., graue, 4. f. Sibirien.

*crassifolia* DC., dickblättrige, 4. f. Sibirien.

*discolor* DC., verschiedenfarbige, 4. f. b. Mitteleuro-  
päische Alpen.

*elata* Ledeb., hohe, 4. f. Sibirien.

*elegans* Ledeb., zierliche, 4. f. Sibirien.

*elongata* DC., verlängerte, 4. f. Sibirien.

*latifolia* Ledeb., breitblättrige, 4. f. Sibirien.

*lyrata* Fisch., leierblättrige, 4. f. Sibirien.

*pulchella* Fisch., schöne, 4. f. Sibirien.

*pygmaea* Spgl., zwergige, 4. f. b. Oesterreich, Ungarn.

*runcinata* DC., schrotsägenförmige, 4. f. Sibirien.

*salicifolia* DC., weidenblättrige, 4. f. Sibirien.

*salsa* Spgl., Salinen-S., 4. f. Caucasus.

*tenuis* Ledeb., dünne, 4. f. Sibirien.

**Sauvagesia** Jacq. (F. B. de Sauvage, französischer  
Botaniker), V. 1., Violaceae.

*erecta* L., aufrechte, ☉. ♂. w. Südamerika.

*geminiflora* DC., paarblumige, ☉. ♂. w. Mexico.

*nutans* P., nickende, ☉. ♂. w. Madagascar.

*Saxifraga* T. L., Steinbrech, X. II., Corniculatae-Saxifrageae.

I. *Bergenia* Mch. (*Geryonia* Schrk., *Megasea* Haw.).

*cordifolia* Haw., herzblättriger, 4. f. Sibirien.

*crassifolia* L., dickblättriger, 4. f. Sibirien.

*ligulata* Wall. (*M. ciliata* Haw.), zungenförmiger, 4. k. Nepal.

II. *Diptera* Borkh. Lk.

*cuscutaeformis* Lodd. (*grandiflora* Hort.), cuscutaähnlicher, 4. k. China.

*sarmentosa* L. suppl. (*chinensis* Lour., *stolonifera* Jacq.), wuchernder, 4. k. China, Japan.

III. *Gymnopera* D. Don (*Robertsonia* Haw.).

*aestivalis* Fisch. et Mey. (*punctata* Stbg., *semidodecandra* Wormsk.), Sommer-S., 4. f. Kamtschatka.

*arguta* D. Don, spitzsägiger, 4. f. Nordamerika.

*cuneifolia* L., keilblättriger, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

β) *davurica* D. Don.

*dissimilis* G. Don, unähnlicher, 4. f. Nordamerika.

*erosa* Pursh, genagter, 4. f. b. k. Virginien, Carolina,

β) *hirsuta* D. Don.

*Geum* L., nierenblättriger, 4. f. Irland, Schweiz, Sibirien.

*hirsuta* L. (*punctata* Hort.), rauhhaariger, 4. f. Irland, Pyrenäen.

? β) *sphaeroidea* Haw.

*hybrida* Vill. Stbg., Bastard-St., 4. f. Dauphiné.

*leucanthemifolia* Lapeyr. (*Clusii* Gouan), wucherblumenblättriger, 4. f. Pyrenäen, Tyrol, Krain, Carolina.

*media* Haw., mittlerer, 4. f. England.

*polita* Haw., geschmückter, 4. f. Schottland.

*punctata* L. (*dentata* Haw.), punktirter, 4. f. Irland, Sibirien.

? β) *crenata* Haw. γ) *elegans* Mack.

*serrata* Haw. (*serratifolia* Mack.), sägeblättriger, 4. k. f. b. Irland.

*spicata* D. Don (*Geum* Pursh), ährenförmiger, 4. f. Westliches Nordamerika.

*stellaris* L., sternförmiger, 4. f. Europ. Alpen, Asien.

β) *Schleicheri* D. Don.

*umbrosa* L., schattenliebender, 4. f. Irland, Pyrenäen, Sudeten, Salzburg.

IV. *Leiogyne* D. Don.

*aizoides* L. (*autumnalis* L.), Herbst-S., 4. f. Europäische Alpen.

b) *atrorubens* Bertol.

*altifida* Haw., tiefspaltiger, 4. f. ?

*arachnoidea* Stbg., spinnewebenartiger, 4. f. Südl. Tyrol.

*aspera* L., rauher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*bronchialis* L., halbstrauchiger, 4. f. Nördliches Asien und Amerika.

*bryoides* L. (*aspera* β. DC.), moosartiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*bulbifera* L., zwiebeltragender, 4. f. Oesterreich, Schweiz, Italien, Spanien.

β) *veronicaefolia* Bertol. (*Russi* Presl).

*cernua* L. (*vivipara* Vest., *penduliflora* Bastard.), übergebogener, 4. f. Lappland, Schottland, schweizer Alpen, Pyrenäen, Steyermark.

*flagellaris* Stbg. (*setigera* Pursh, *aspera* MB., *prorepens* Fisch.), peitschenförmiger, 4. f. Nordasien und Amerika, Caucasus.

**Saxifraga**

granulata L., körnertragender (gemeiner), 4. f. Europa,  
b) flore pleno.

hederacea L., epheuähnlicher, ☉. f. Creta.

Hirculus L., cistenblüthiger, 4. f. Europa, Nordasien.

laevis MB., glatter, 4. f. Caucasus.

nudicaulis D. Don, nacktstengeliger, 4. f. Westliches  
Nordamerika.

rivularis L., Bach-S., 4. f. Nordeuropa, Nordamerika.

rotundifolia L., rundblättriger, 4. f. Europäische  
Alpen, Asien.

β) repanda Stbg.

sibirica L. (?grandiflora Stbg.), sibirischer, 4. f. Sibirien.

V. Micranthes D. Don.

congesta Haw. (nivalis Pursh), gedrängtblumiger, 4. k.  
Nordamerika.

ferruginea Grah, rostfarbiger, 4. k. f. k. Nordamerika.

hieracifolia WK., habichtskrautblättriger, 4. f. Car-  
pathen, dinarische Alpen, Steyermark.

nivalis L., Schnee-St., 4. f. Sudeten, nördlichstes  
Europa, Spitzbergen, Sibirien.

β) longiscapa D. Don.

pennsylvanica L., pennsylvanischer, 4. f. Nordamerika.

b) glabra.

pyrolaefolia D. Don, pyrolenblättriger, 4. f. Kamt-  
schatka, aleutische Inseln.

semipubescens Swt. (marylandica Hort., palustris Lk.),  
halbhaariger, 4. f. Nordamerika.

virginiensis Mchx. (vernalis W., elongata Stbg.), virgi-  
nischer, 4. k. f. b. Nordamerika.

V. Saxifraga genuina.

adscendens L. (controversa Stbg., petraea Gun.), auf-  
steigender, ☉. 4. f. Europäische Alpen.

β) Bellardi All.

affinis D. Don (laevis Donn), ähnelnder, 4. f. ?

ajugaefolia L., günselblättriger, 4. f. Süd- und west-  
europäische Alpen.

Aizoon Jacq., traubenblüthiger, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

a) intacta W. β) recta Lap. (major K.). γ)  
minor brevifolia Stbg. (parviflora Haw.).

androsacea L., mannsschildähnlicher, 4. f. Mitteleuro-  
päische Alpen.

aquatica Lapeyr. (petraea Gouan, adscendens Vahl),  
Wasser-St., 4. f. Pyrenäen.

aretioides Lapeyr., aretiaähnlicher, 4. f. Pyrenäen.

atropurpurea Stbg., dunkelpurpurrother, 4. f. Tyrol etc.

biflora All. (oppositifolia β. W.), zweiblumiger, 4. f.  
Schweiz, Tyrol, Piemont, Pyrenäen etc.

Burseriana L., Burser's, 4. f. Tyrol, Steyermark, Krain,  
Apenninen, Pyrenäen.

caesia L. (recurvifolia Láp.), hechtblauer, 4. f. Mittel-  
europäische Alpen.

caespitosa L. (decipiens Ehrh., palmata Sm., petraea  
Roth), rasenartiger, 4. f. Mittel- und Nordeuropa.

a) groenlandica L. β) Sternbergii W. (palmata  
Panz., tridentata D. Don). b) media Tausch.

c) Steinmanni Tausch. γ) villosa W. δ) uni-  
flora Stbg.

ceratophylla Dryand. (trifurcata Schrad.), hornblättriger,  
4. f. Spanien.



## Saxifraga

- Cotyledon L. (*pyramidalis* Lapeyr., Stbg.), nabelkraut-artiger, 4. f. Schweiz, Pyrenäen, Lappland.
- crocea Gaud., safranfarbiger, 4. f. b. Südsavoyen.
- crustata Vest (*longifolia* γ. *minor* Stbg.), crustirter, 4. f. Tyrol, Kärnthen, Krain.
- denudata D. Don, nackter, 4. f. Schottland, Irland.
- diapensioides Bell., diapensiaähnlicher, 4. f. b. Südliche Schweiz, italienische Alpen.
- elator M. et K. (*longifolia* β. *media* Stbg., *longifolia* Host., ? *Hostii* Tausch), höherer, 4. f. Schweiz, krainer Alpen etc.
- elongella Sm., verlängerter, 4. f. Schottland.
- exarata Vill. (*caespitosa* Wahlbg., *hypnoides* All., *nervosa major* Stbg.), ausgefurchter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Caucasus.
- b) *intricata* Lapeyr. (*nervosa minor* Stbg.). c) *striata* Hall. fil. β) *nervosa* Lapeyr. (*intermedia* Gaud.). ? b) *pubescens* Pourr. (*mixta* Lapeyr.).
- geranioides L. (*quinquefida* Lam.), storchschnabelähnlicher, 4. f. Pyrenäen.
- hirta Donn, kurzhaariger, 4. f. Schottland.
- Hohenwartii Stbg, Hohenwart's, 4. f. Krain, Kärnthen, Steyermark.
- hypnoides L. (*aggregata* Lej., *sponhemica* Panz.), liegender, 4. f. Europa.
- b) *viscosa* Hort. c) *angustifolia* Hort. d) *muscosa* D. Don. e) *pulchella* D. Don.
- incurvifolia D. Don, einwärtsgekrümmter, 4. f. Irland.
- irrigua Fisch. (*aquatica* MB., *petraea* Pall.), wasserliebender, ♂. 4. f. Taurien, Sibirien.
- Kochii Hornung, Koch's, 4. f. Schweiz.
- laete-virens D. Don, freudiggrüner, 4. f. Schottland.
- lanceolata Haw., lanzettblättriger, 4. f. ?
- b) *obtusa* Haw.
- leptophylla P., schlankblättriger, 4. f. ? Schweiz.
- b) *angustifolia* D. Don.
- longifolia Lapeyr. (*lingulata* Bell.), langblättriger, 4. f. Pyrenäen, oberitalienische Alpen.
- b) *media* D. Don.
- media Gouan (*calyciflora* Lapeyr., *porophylla* Bertol., *ambigua* DC.), mittlerer, 4. f. Pyrenäen, Apenninen, Kleinasien.
- moschata Wulf., moschusduftender, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- muscoides Wulf. (*caespitosa* Scop., *pyrenaica* Vill.), lebermoosähnlicher, 4. f. Europäische Alpen.
- β) *pygmaea* Haw.
- mutata L., veränderlicher, 4. f. Schweiz, Baiern, salzburger und steyerländer Alpen, Pyrenäen.
- oppositifolia L. (*coerulea* P., *retusa* Stbg.), gegenblättriger, 4. f. Europäische Alpen, Nordamerika.
- ? *paniculata* Loud., rispiger, 4. f. ?
- patens Gaud., abstehender, 4. f. Schweiz, Tyrol.
- pedatifida Sm., fußspaltiger, 4. f. Schottland.
- pedemontana All. (*heterophylla* Stbg., *Allionii* Baumg., *cymosa* WK.), piemontesischer, 4. f. Südl. Schweiz, oberitalienische und dinarische Alpen.
- pentadactylis Lapeyr., fünfteiliger, 4. f. Pyrenäen.

**Saxifraga**

*petraea* L. (*Ponae* Stbg., *rupestris* W., *geranioides* Host),

⊙. f. Krain, österreichisches Litorale.

*planifolia* Lapeyr. (*tenera* Sut., *muscoideus* All.), plattblättriger, 4. f. Tyrol, Schweiz, Salzburg, Pyrenäen.

β) *atropurpurea* K.

*platypetala* Sm., breitkroniger, 4. f. Schottland, Engl.

*quinquefida* Haw., fünfspaltiger, 4. f. England.

*retusa* Gouan (*purpurea* All., *oppositifol.* γ. W.), abgestutzter, 4. f. Oberitalienische Alpen, Pyrenäen.

*Rudolphiana* Hornsch., Rudolphi's, 4. f. Kärnthen.

*Schraderi* Stbg., Schrader's, 4. f. ?

*sedoides* L. (*trichodes* Scop.), sedumähnlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*Seguierii* Stbg., Spgl., Seguier's, 4. f. Schweiz, Tyrol.

*spanhemica* Gmel. (*condensata* Gmel., *palmata* et *confusa* Lej., *bohemica* Panz., *hypnoides* β. DC.), Spanheimischer, 4. f. Westdeutschland.

b) *flavescens* Stbg.

*squarrosa* Shr., sparriger, 4. f. Tyrol.

*stenopetala* Gaud. (*aphylla* Stbg.), schmalkroniger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*tenella* Wulf., zarter, 4. f. Kärnthner, krainer und steyerländer Alpen.

*tricuspidata* Rotth., dreispitziger, 4. f. Grönland.

*tridactylites* L., dreitheiliger, ⊙. f. Europa.

b) *minuta* Poll.

*Vandelli* Stbg., Vandelli's, 4. f. Julische Alpen.

? *viscosa* Haw., schmieriger, 4. f. ?

*paradoxa* Stbg. v. *Zahlbruckneria paradoxa*.

**Scabiosa** T. L., R. et S. (*Asterocephalus* Vaill., *Sclerostemma* et *Cyrtostemma* K. et *Spongostemma* Rchb.),

Scabiose, IV. 1., Dipsaceae.

*acutiflora* Rchb., spitzblumige, 4. f. Südeuropa.

*africana* L., afrikanische, ♂. k. Cap der guten Hoffnung, ionische Inseln.

*altissima* Jacq. (*laciniata* Lichtstein), höchste, ♂. k. Südafrika.

*ambigua* Tenor., zweifelhafte, 4. f. Neapel.

*amoena* Jacq. (*nitida* Bernh.), liebliche, 4. f. Rußland.

*atropurpurea* L., schwarzpurpurrothe, ⊙. f. Ostindien.

b) *carnea*. c) *rosea*. d) *variegata*. e) *alba*.

f) *prolifera*.

*bannatica* WK., bannatische, 4. f. Banat.

b) *flore albo*.

*caucasica* MB., caucasische, 4. f. b. Caucasus.

β) *elegans* Spgl. (*connata* Hornem.).

*ceratophylla* Tenor. (*Ast.* ? *pilosus* Lagasc.), hornblättriger, ♂. f. Calabrien, Spanien.

*Columbaria* L., Tauben-S. (Berg-S.), ♂. 4. f. Europa.

b) *alba*.

*Columnae* Tenor., Columna's, 4. f. Neapel.

*commutata* R. et S., verwechselte, 4. f. Sibirien.

*coronopifolia* Sm., Bivon. (*crenata* Cyril.), krähenfußblättriger, 4. f. Sicilien, Capri.

*cretica* L., cretische, ♂. k. Creta, Apulien.

*daucoides* Dsf., möhrenähnliche, ⊙. ♂. f. b. k. Nordafrika.

*dichotoma* Ucr. (*parviflora* Dsf.), zweizinkige, ⊙. f. Sicilien, Nordafrika.

*diffusa* Rchb., weitschweifige, 4. k. Teneriffa.

*Fischeri* DC., Fischer's, 4. f. Dahurien.

## Scabiosa

- graminifolia L., grasblättrige, 4. f. b. Krain, südliches Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen, Nordafrika.
- gramuntia L., feinblättrige, 4. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
- a) agrestis WK. (*leiocephala* Hoppe, *styriaca* Vest).
- β) mollis W. (*capillata* R. et S.). γ) tomentosa K. (*mollissima* DC., *pyrenaica* Bertol.).
- grandiflora Scop., großblumige, ☉. ♂. f. Nordafrika.
- Hladnikiana Host, Hladnik's, 4. f. Krain, Istrien.
- holosericea Bertol. (*laxiflora* W., *pyrenaica* All.), sammethaarige, 4. f. Italien, Dalmatien, Pyrenäen.
- incana R. et S. (*ucranica* MB.), weißgraue, 4. f. Taurien.
- intermedia R. et S., mittlere, 4. f. Südeuropa.
- isetensis L. (*rupestris* MB.), sibirische, 4. f. Sibirien, Caucasus.
- legionensis Lagasc., leonische, ☉. f. Spanien.
- lucida Vill. (*norica* Wulf., Vest., *stricta* WK.), glänzende, ♂. 2. f. Mitteleuropäische Alpen etc.
- lutea Fisch., gelbe, 4. f. Rußland.
- lyrata Forsk., leierförmige, ♂. f. Türkei.
- maritima L., Meerstrands-S., ☉. ♂. f. Südeuropa.
- micrantha Dsf. (*sicula* MB., *Biebersteinii* R. et S.), kleinblumige, ☉. f. Kleinasien, Taurien.
- multiseta Vis., vielborstige, ♂. f. Dalmatien.
- neglecta Hornem., übersehene, ☉. f. Italien.
- nitens R. et S. (*lucida* Ait.), schimmernde, 4. k. Azoren.
- ochroleuca L. (*tenuifolia* Roth), weißgelbe, ♂. f. Europa.
- palaestina L. (*VahlII* Coult.), morgenländische, ☉. f. Paläst.
- pauciseta DC. (*uniseta* Savi, *Saviana* Rchb.), wenigborstige, 4. f. Ober- und Mittelitalien.
- pectinata Lag., kammförmige, ☉. f. Arabien.
- prolifera L., sprossende, ☉. f. Cypern, Nordafrika.
- reversa Ledeb., rückwärtshaarige, 4. f. ?
- rotata MB., radförmige, ☉. f. Iberien.
- saxatilis Cav., Gesteins-S., ☉. f. Spanien.
- Scopolii Lk., Scopol's, 4. f. Südeuropa.
- setifera Lam., langborstige, 4. f. Südfrankreich.
- sicula L. (*divaricata* Jacq.), sicilische, ☉. f. Sicilien, Griechenland.
- silenifolia WK., silenenblättrige, 4. f. Croatien.
- simplex Dsf. (*monspeliensis* Jacq.), einfache, ☉. f. Frankreich, Spanien, Nordafrika.
- stellata L., sternförmige, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.
- suaveolens Dsf. (*canescens* WK.), feinriechende, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
- tomentosa Cav. (*pyrenaica* All., *mollissima* Vis., *maritima* Vill.), filzige, 4. f. Süd- und Westeuropa.
- ucranica L. (*argentea* L., *alba* Scop., *maritima* Wulf.), ukrainische, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien, Ukraine, Nordafrika.
- urceolata Dsf. (*rutaefolia* Vahl), becherförmige, 4. f. b. k. Nordafrika, Sicilien, Corsica, Portugal.
- Webbiana Ker, Webb's, 4. f. b. k. Kleinasien.
- alpina* L., *Succisa* L. etc. v. *Succisa alpina*, *pratensis* etc. *arvensis* L. etc. vid. *Knautia arvensis*.
- brachiata* Sm., *plumosa* Sm. (*Willichii* Lk.) etc. v. *Pteroccephalus brachiatus*, *plumosus* etc.
- Scaevola L., Spaltglocke, V. 1., Campanulaceae-  
Goodenovieae.



**Scaevola**

- crassifolia La Bill., dickblättrige, f. t. Neuholland.  
 cuneiformis La Bill., keilblättrige, f. t. Neuholland.  
 hispida Cav., steifhaarige, f. t. Neuholland.  
 Königii Vahl (*Taccada* Lk.), König's, f. w. Ostindien,  
 Molucken.  
 microcarpa Cav., kleinfrüchtige, 4. t. Neusüdwallis.  
 Plumierii Vahl., Plumier's, f. w. Westindien.  
 suaveolens RB., feinriechende, 4. t. Neusüdwallis.

*Scalia jaceoides* Sims v. *Podolepis acuminata*.

**Scandix** T., Kerbel, V. II., Umbelliferae.

- australis L., südlicher, ☉. f. Südeuropa.  
 brachycarpa Guss., kurzfrüchtiger, ☉. f. Sicilien.  
 falcata Londe, sichelförmiger, ☉. f. Kleinasien.  
 grandiflora L., großblumiger, ☉. f. Griechenl., Taurien.  
 iberica MB., iberischer, ☉. f. Iberien.  
 Pecten L., nadelförmiger, ☉. f. Mitteleuropa.  
 persica Mart., persischer, ☉. f. Persien.  
 pinnatifida Vent., fiederspaltiger, ☉. f. Taurien, Persien.  
*Anthriscus* L., *Cerfolium* L., *fumarioides* WK.  
 etc. v. *Anthriscus vulgaris*, *Cerfolium* etc.

**Scaphyglottis** Pöpp., Nachenlippe, XXI. I., Orchideae.

- reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. w. Demerara.  
 violacea Lindl., violette, 4. w. Demerara.

**Sceptranthes** Grah., Scepterschwertel, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

- Drummondii D. Don, Drummond's, 4. Zw. t. k. Texas.

**Schaefferia** Jacq. (J. C. Schaeffer, Superintendent zu Regensburg, berühmt als Naturforscher), XXII. IV. (IV. I.), Rhamneae.

- completa Sw., vollkommene, f. w. Jamaica, Hispaniola.  
*lateriflora* Sw. v. *Drypetes crocea*.

**Schanginia** Ledeb. (P. Schangin, russischer Botaniker), V. II., Aizoideae-Atripliceae.

- altissima N. E., höchste, ☉. f. Südrussland, Spanien.  
 trigyna\*, dreiweibige, ☉. f. Spanien.

**Schaueria calycotricha** N. E. v. *Justicia calycotricha*.**Schedonorus pratensis** R. et S. etc. v. *Festuca elatior* etc.**Schelhammeria** RB. (C. C. Schelhammer, Professor zu Jena), VI. I., Coronariae-Asphodeleae-Methoniceae.

- multiflora RB., vielblumige, 4. t. Neuholland.  
 undulata RB., wellenblättrige, 4. t. Neuholland.

**S. capitata** Mch. v. *Carex cyperoides*.**Scheuchleria** \* (Scheuchler, K. S. geh. Finanzrath etc., Freund und Kenner der Naturwissenschaften), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- patula\*, ausgebreitete, ☉. f. China.

**Scheuchzeria** L. (J. et J. J. Scheuchzer, schweizerischer Botaniker), VI. III., Alismaceae.

- palustris L., Sumpf-S., 4. f. Wa. Europa, Nordamer.

**Schinus** L., Mastixbaum, XXII. IX. (X. III.), Amyrideae-Terebinthaceae.

- Molle L., hängender, f. t. Brasilien, Peru.  
 terebinthifolia Radd., terpentinblättriger, f. t. Brasilien.  
 virgata Swt., ruthenförmiger, f. t. Lima.

*dentata* Andr. v. *Duvaua dentata*.

**Schisanthes** Haw. v. *Narcissus*.**Schismus** P. B., Schlitzspelze, III. II., Gramineae.

- marginatus P. B. (*Festuca barbata* L., *calycina* Lam.),  
 herandete, ☉. f. Spanien, Südfrankreich, Sicilien.

**Schismus**

*minutus* R. et S. (*hirsutus* Trin., *Festuca m.* Stev. M. B.), kleinste, ☉. f. Taurien.

**Schivereckia** Andr. (A. Schivereck, russischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

*podolica* Andr., DC., podolische, 4. f. b. Podolien, Volhynien.

**Schizaea** Sm., Spaltfarn, XXIV. I., Osmundaceae.

*bifida* Sw. (*incurvata* Schk.), zweispaltiger, 4. w. Neuholl.  
*elegans* Sw., zierlicher, 4. w. Trinidad.

*pectinata* Sm., kammförmiger, 4. w. Cap der gut. H.

*penicillata* H. B. K., pinselförmiger, 4. w. Neugranada.

*pusilla* Sw. (*tortuosa* Mühlbg.), kleiner, 4. k. Nordamer.

*rupestris* RB., Felsen-S., 4. w. Neuholland.

**Schizandra** Mchx., Schlitzbeutel, XXI. x. (V. VI.), Menispermaceae.

*coccinea* Mchx., scharlachrother, ♀. Sch. k. Carolina.

**Schizanthus** R. et P., Schlitzblume, II. I., Solanaceae (? *Personatae-Antirrhineae*).

*Grahami* Hook., Graham's, ☉. f. m. Chili.

*Hookeri* Gill., Hooker's, ☉. f. m. Chili.

*pinnatus* R. et P., gefiederte, ☉. f. m. Chili.

β). *humilis* Lindl.

*porrigens* Hook., ausgestreckte, ☉. f. m. Chili.

*retusus* Hook., abgestutzte, ☉. f. m. k. Chili.

**Schizomeria** D. Don, Spaltblatt, X. II., Araliaceae.

*ovata* D. Don, eiblätteriges, ♀. t. k. Neuholland.

**Schizopetalon** Sims, Schlitzblatt, XV. III., Cruciferae.

*Walkeri* Sims, Walker's, ☉. f. Chili.

**Schkuhria** Roth (C. Schkuhr, berühmter deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*abrotanoides* Roth, stabwurzähnliche, ☉. f. Mexico.

**Schmidelia** L. (K. C. Schmidel, Professor der Naturgeschichte zu Erlangen), VIII. I., Sapindaceae.

*Cominia* Sw., zottige, ♀. w. Westindien.

*occidentalis* Sw., westindische, ♀. w. Westindien.

*racemosa* L., traubige, ♀. w. Ostindien.

*serrata* DC., sägeblättrige, ♀. w. Ostindien.

**Schmidtia** Tratt. (W. Schmidt, böhmischer Botaniker), II. II., Gramineae.

*subtilis* Tratt. (*utriculosa* Stbg.), zarte, ☉. f. Böhmen.

**Schmidtia** Mch. v. Tolpis.**Schoberia** Ledeb., C. A. Mey. (Gottlob Schober, ein Arzt und Botaniker, welcher unter Peter I. Südrussland und Nordpersien bereiste), V. II., Aizoideae-Atripliceae.

*Biebersteiniana* C. A. Mey. (*Chenopod. Bieberst.* p. 189.), Bieberstein's, ☉. f. Caucasus.

*fruticosa* C. A. Mey., strauchige, ♀. k. f. b. England, Südeuropa, Nordafrika.

*maritima* C. A. Mey., Seestrands-S., ☉. f. Europa, Sibirien.

*microphylla* C. A. Mey. (*Chenopod. parvifolium* Schult.), kleinblättrige, ☉. f. Caucasus.

*Pallasiana* C. A. Mey., Pallas's, ☉. f. Persien.

*salsa* C. A. Mey., Salinen-S., ☉. f. Astrachan.

*setigera* \*, horstige, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.

*spicata* C. A. Mey., ährenförmige, ☉. f. Spanien.

**Schoenodum tenax** LaBill. v. *Leptocarpus tenax*.**Schoenus** L., Knopfgras, III. I., Cyperaceae.

I. *Genuinus*.

**Schoenus**

- imberbis RB., unbärtiges, 4. k. Neuholland.  
 melanostachys RB., schwarzähliges, 4. k. Neuholland.  
 mucronatus L. (*Mariscus mucronat.* Presl.), weichspelziges, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.  
 nigricans L., schwärzliches, 4. f. Europa.  
 stellatus ? Sw., sternförmiges, 4. w. Westindien.

**II. Streblidia Lk.**

- ferrugineus L., rostfarbiges, 4. f. Europa.  
 albus L., comatus Lk, et fuscus L. vid. *Rhynchospora alba*, polyphylla et fusca. *compressus* L. etc. vid. *Blysmus compressus* etc. *Mariscus* L. vid. *Cladium Mariscus. monoicus* Sm. v. *Kobresia caricina. turbinatus* Poir. v. *Chaetosporea turbinata.*  
*Schollera Oxycoccus* Roth v. *Oxycoccus palustris.*  
*Schollia crassifolia* Jacq. v. *Hoya carnos.*  
**Schomburgkia** Lindl. (R. J. H. Schomburgk, ein Deutscher, welcher Guiana bereiste), XX. 1., Orchideae.  
 marginata Lindl., berandete, 4. w. Surinam.  
**Schotia** Jacq. (R. van der Schot, Begleiter des Baron Jacquin in Westindien), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.  
 alata Thbg., geflügelte, 5. w. t. Cap der gut. Hoffn.  
 latifolia Jacq., breitblättrige, 5. w. Cap der gut. H.  
 speciosa Jacq., prächtige, 5. w. Cap der gut. Hoffn.  
 stipulata RB., zwischenblättrige, 5. w. Cap d. g. H.  
 tamarindifolia Afzel., tamarindenblättrige, 5. w. Südafrika.  
**Schradera** Vahl (H. A. Schrader, berühmter deutscher Botaniker), VI. 1., Caprifoliaceae.  
 cephalotes W., rundköpfige, 5. w. Jamaica.  
**Schrankia** W. (Franz v. Paula Schrank, Professor der Botanik zu München), VIII. 1. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.  
 aculeata W., stachelige, 4. Kn. w. Vera-Cruz.  
 uncinata W. (*Mimosa horridula* Mchx.), hackige, 5. t. Virginien, Florida.  
*Schrebera albens* Retz v. *Elaeodendrum glaucum*.  
*Schubertia capensis* Speg. et *disticha* Mirb. vid. *Taxodium juniperoides* et *distichum.*  
**Schultzia** Speg. (C. F. Schultz, Arzt zu Neubrandenburg, Bearbeiter der mecklenburgischen Flora), V. 11., Umbelliferae.  
 crinita Speg., bemähnte, 5. f. Altai.  
*Schwägrichenia flavida* et *rufa* Speg. vid. *Anigozanthos flavida* et *rufa.*  
**Schwenckia** L. (J. T. Schwenck, Professor der Medicin zu Jena), 11. 1., ?Personatae-Antirrhineae.  
 americana L., amerikanische, 5. w. Südamerika.  
**Scilla** L., Meerzwiebel, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.  
 I. Genuina.  
 amoena L., schöne (Sternhyacinthe), 4. Zw. f. Mitteleuropa.  
 autumnalis L., Herbst-M., 4. Zw. f. England, Süd- und Westeuropa.  
 b) major. c) alba.  
 bifolia L., zweiblättrige, 4. Zw. f. Mitteleuropa.  
 b) alba.  
 Cupaniana Guss., Cupani's, 4. Zw. f. Sicilien.  
 esculenta Sims, genießbare, 4. Zw. f. Nordamerika.  
 hyacinthoides L., hyacinthenähnliche, 4. Zw. k. Madeira.  
 italica L., italienische, 4. Zw. f. Italien, Südfrankreich.



**Scilla**

*Lilio-Hyacinthus* L., lilienartige, 4. Zw. f. Spanien, Südfrankreich.

*lusitanica* L., portugiesische, 4. Zw. f. Portugal.

*obtusifolia* Poir., stumpfblättrige, 4. Zw. f. b. Nordafrika, Sardinien.

*odorata* Brot., gutriechende, 4. Zw. f. Portugal.

*peruviana* L., peruvianische, 4. Zw. k. f. b. Portugal, Nordafrika,

b) *alba*.

*plumbea* Lindl., bleifarbig, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*praebracteata* Haw. (*peruviana* Hort.), langdeckblättrige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

*praecox* W., frühe, 4. Zw. f. ?

*pratensis* W. K., Wiesen-M., 4. Zw. f. Croatien.

*pumila* Brot. (*monophyllos* Lk.), niedrige, 4. Zw. f. b. k. Portugal.

*rosea* Lehm. (*bifolia rubra* Bot. mag., *carnea* Swt.), rosafarbige, 4. Zw. f. b. Nordafrika.

*umbellata* Ram., doldige, 4. Zw. f. Pyrenäen.

*verna* L. (*fastigiata* Viv.), Frühlings-M., 4. Zw. f. England, Spanien, Süddeutschland.

b) *alba*. c) *rosea*.

*villosa* Dsf., zottige, 4. Zw. f. b. k. Nordafrika.

## II. *Limonanthe* Lk.

*azurea* Goldb. (*amoena* MB., *cernua* Red., *amoenula* Hornem., *sibirica* Andr.), azurblaue, 4. Zw. f. Mittelrußland.

*brevifolia* Ker, kurzblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*campanulata* Ait. (*hyacinthoides* Jacq.), glockige, 4. Zw. f. Spanien, Portugal.

*cernua* Lk., übergebogene, 4. Zw. f. Spanien.

*corymbosa* Sims, traubendoldige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

*indica* Roxb., indische, 4. Zw. w. Ostindien.

*mauritanica* Schousb., mauritanische, 4. Zw. f. b. k. Mauritien.

*nutans* Sm. (*non scripta* Lk.), nickende, 4. Zw. f. England, Südeuropa.

b) *carnea*. c) *alba*.

*sibirica* Sims, sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.

*unifolia* L., einblättrige, 4. Zw. f. b. k. Portugal.

*maritima* L. vid. *Ornithogalum maritimum*. *paradoxa* MB. v. *Allium paradoxum*. *pomeridiana* DC. vid. *Anthericum pomeridianum*. *romana* L. vid. *Bellevallia romana*. *serotina* Curt. vid. *Uropetalum serotinum*.

## **Sciodaphyllum** P. Br., Schattenblatt, V. v., Araliaceae.

*acuminatum* Poir., zugespitztes, 5. Sch. w. Peru.

*anomalum* G. Don, abweichendes, 5. w. Trinidad.

*Brownii* Sogl., Brown's, 5. w. Jamaica.

*conicum* Poir., kegelblumiges, 5. Sch. w. Peru.

*digitatum* G. Don, fingerförmiges, 5. w. Ostindien.

*pedicellatum* Poir., langstieliges, 5. Sch. w. Peru.

*pentandrum* Poir., fünfmänniges, 5. w. Peru.

*Sciophila convallarioides* Wib. v. *Smilacina bifolia*.

*Scirpidium aciculare* N. E. v. *Heleocharis acicularis*.

**Scirpus** T. L. (et *Heleogiton* Lestib., Rchb.), Binse, III. r., Cyperaceae.

*articulatus* L., gegliederte, 4. w. Ost- und Westindien.

**Scirpus**

*brunneus* Mühlbg. (*exaltatus* Pursh), dunkelbraune, 4. f. Nordamerika.

*carinatus* Sm. (*trigonus* Roth, *Duvalii* Hoppe), nachenförmige, 4. f. England, Nord- und Süddeutschland, Schweiz.

*elongatus* D. Don, Hamilt., verlängerte, 4. k: f. b, Nepal.

*lacustris* L., Teich-B., 4. Wa. f. Europa, Asien, Amer.

*litoralis* Schrad. (*mucronatus* Scop., *fimbrisetus* Delil., *Malacochaete litoralis* N. E.), Ufer-S., 4. Wa. f. Südeuropa, Aegypten.

*maritimus* L., Meerstrands-S., 4. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.

β) *tuberosus* Dsf.

*mucronatus* L. (*glomeratus* Scop.), weichspitzige, 4. Wa. f. Mittel- und Südeuropa, Afrika, Ostindien, Neuholland.

*pungens* Vahl (*Rothii* Hoppe, *tenuifolius* DC., *triqueter* Auct.), stechende, 4. f. Norddeutshl., Schweiz etc.

*quinquangularis* Vahl (*pentagonus* Roxb.), fünfkantige, 4. w. Ostindien.

*radicans* Schk., wurzelnde, 4. f. Mittel- u. Nordeuropa.

*sylvaticus* L., Wald-B., 4. f. Europa.

*Tabernaemontani* C. C. Gmel. (*glaucus* Sm.), *Tabernaemontan's*, 4. Wa. f. Europa.

*triqueter* L., dreikantige, 4. Wa. f. Europa, Amerika.

β) *Hoppii* Weihe. γ) *Lejeunii* Weihe.

*acicularis* L. etc. vid. *Heleocharis acicularis* etc.

*annuus* All. etc. v. *Fimbristylis annua* etc. *atro-*

*virens* W., Mühlbg. etc. v. *Isolepis atrovirens* etc.

*Baeothryon* Ehrh. etc. vid. *Limnochloa Baeothryon*

etc. *caricinus* Schrad. (*compressus* P.) etc. vid.

*Blysmus compressus* etc. *Luzulae* L. v. *Cyperus*

*Luzulae. Michelianus* L. v. *Dichostylis Michelianus.*

*thyrsiflorus* W. (*Eriophorum* Mchx.) v. *Eriophorum*

*cyperinum.*

**Scleranthus** L., Knaul, X. II., Portulaceae-Paronychieae.

*annuus* L., jähriger, ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *verticillatus* Tausch.

*perennis* L., ausdauernder, 4. f. Europa.

β) *fallax* Bönningh. γ) *fastigiatus* Hochst.

*pungens* RB., stechender, ☉. f. Neuholland.

**Scleria** Berg., Geißelgras, XXI. III., Cyperaceae.

*Flagellum* Sw., Peitschen-G., 4. w. Jamaica, Guiana.

**Sclerocarpus** Jacq., Knorpelfrucht, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

*africanus* Jacq., afrikanische, ☉. m. f. Guinea.

**Sclerochloa** P. B., Knorpelgras, III. II., Gramineae.

I. *Catapodium* Lk.

*loliacea* Lk. (*Festuca rottboellioides* Kunth, *Brachypod.*

*lol. R. et S.*), lolchähnliches, ☉. f. Südeuropa, Engl.

II. *Genuina.*

*articulata* Lk. (*Festuca divaricata* Dsf., *F. lanceolata*

Forsk., *Dactylis memphitica* Spgl.), gegliedertes, ☉. f.

Nordafrika, Südeuropa.

*dichotoma* Lk. (*Festuca d. Forsk.*, *Brachyp. maritimum*

R. et S.), zweizinkiges, ☉. f. England, Frankreich.

*dura* P. B. (*Festuca d. Vill.*, *Sesleria d. Kunth*), hartes,

☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

*procumbens* P. B., niederliegendes, ☉. f. Engl., Frankr.

**Sclerochloa**

*rigida* Lk., Panz. (*Festuca rigid.* Kunth), starres, ☉. f. England, Frankreich, Mittel- und Südeuropa.

**III. Sphenopus Trin.**

*divaricata* P. B., ausgesperartes, ☉. f. Südfrankreich, Oberitalien, Sicilien.

*Sclerophyllum pulchrum* Gaud. v. *Crepis pulchra*.

**Scleropus** Schrad., Knorpelfufs, XXI. III., Aizoideae-Amaranthaceae.

*amaranthoides* Schrad. (*Amaranthus crassipes* Schltdl.), amaranthähnlicher, ☉. f. m. Südamerika.

**Sclerothermus** RB., Knorpelstrauch, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

*microphyllus* RB., kleinblättriger, ♀. t. Neuholland.

**Scolochloa** Lk., Rohrschwengel, III. II., Gramineae.

*festucea* Lk. (*Festuca arundinacea* Liljeb., *F. donacina* Wahlbg., *F. borealis* M. et K.), nördlicher, 4. f. Nordeuropa.

**Scolopendrium** Sm., Hirschzunge, XXIV. I., Pteridoideae.

*Hemionitis* Cav., netzfarnähnliche, 4. k. Spanien, Italien.

*officinatum* Sm., officinelle, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

a) *angustifolium*. b) *crispum*. c) *undulatum*.

d) *multifidum*. e) *ramosum*.

**Scolymus** T., Golddistel, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*grandiflorus* Dsf., großblumige, ♂. 4. f. b. k. Nordafrika.

*hispanicus* L. (*maculatus* Scop.), spanische, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

*maculatus* L., gefleckte, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Scoparia** L., Besenkraut, IV. III., Personatae-Antirrhineae.

*dulcis* L., süßes, ☉. ♀. f. m. w. Ost- u. Westindien, Südamerika etc.

**Scopolia** Jacq. (J. A. Scopoli, berühmter österreichischer Naturforscher), V. I., Solanaceae.

*carniolica* Jacq. (*Scopolina atropoides* Schult.), krainerische, 4. f. Krain, Ungarn, Galicien.

*S. aculeata* Sm., *inermis* W. Sm. v. *Toddalia aculeata* et *paniculata*.

**Scorodonia heteromalla** Mch. v. *Teucrium Scorodonia*.

**Scorpiurus** L., Scorpionkraut, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*acutifolia* Viv., spitzblättriges, ☉. f. Nordafrika, Corsica.

*laevigata* Sm., glattes, ☉. f. Griechenland.

*muricata* L., weichstacheliges, ☉. f. Südeuropa.

*subvillosa* L., zottiges, ☉. f. Südeuropa.

*sulcata* L., gefurchtes, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

*vermiculata* L., wurmförmiges, ☉. f. Südeuropa.

**Scorzonera** T., Scorzonere (Haferwurz), XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

**I. Genuina.**

*austriaca* W. (*humilis* Jacq.), österreichische, 4. f. Ost- und Südeuropa.

β) *angustifolia* Rchb.

*caricifolia* Pall., riedgrasähnliche, 4. f. Sibirien.

*chondrilloides* Pourr., knorpelsalatähnliche, 4. f. Spanien.

*crispa* MB., krausblättrige, 4. f. Taurien.

*fistulosa* Brot., röhrenblättrige, 4. f. Portugal.

*graminifolia* L., grasblättrige, 4. f. Sibirien, Kleinasien.



**Scorzonera**

*grandiflora* Lapeyr. (*aristata* Ram., *Hoppeana* Sbr., *alpina* Hoppe), großblumige, 4. f. Illyrien, Kärnthen, Südtirol, Pyrenäen.

*hispanica* L., spanische, ♂. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Nordasien.

a) *latifolia* K. (*edulis* Mch., *denticulata* Lam.).

β) *glastifolia* W. (*graminifolia* Roth). γ) *asphodeloides* Wallr. (*montana* Mutel, *angustifolia* Auctor.). δ) *rumicifolia* Balb.

*humilis* L. (*lanata* Schrk., *nervosa* Lam., *plantaginea* Schlchr.), niedrige, 4. f. Europa.

β) *macrorrhiza* Schlchr.

*lanata* MB., wollige, 4. Kn. f. b. Griechenland, Armenien, Syrien etc.

*parviflora* Jacq., kleinblumige, ♂. f. Osteuropa.

*pinifolia* Gouan (*subulata* Lam.), kieferblättrige, 4. f. Südfrankreich, Spanien.

*purpurea* L., purpurfarbige, 4. f. Europa.

β) *rosea* W. K.

*radiata* Fisch., strahlige, 4. f. Sibirien.

*stricta* Hornem. (*villosa* MB.), steife, 4. f. Taurien.

*taurica* MB., taurische, 4. f. Taurien, Podolien.

*trachysperma* Günth. (*serrulata* Viv.), rauhsamige, ♂. 4. f. Calabrien.

*tuberosa* Pall., knollige, 4. Kn. f. Syrien, Südrußland.

*undulata* Vahl (*mollis* MB.), wellenblättrige, 4. f. Nordafrika, Griechenland, Taurien.

## II. Galasia Cass.

*villosa* Scop., zottige, 4. f. Krain, österr. Litorale.

## III. Lasiospora H. Cass. (*Lasiospermum* Fisch.).

*ensifolia* MB., schwertblättrige, 4. f. Caucasus.

*eriosperma* MB. (*L. angustifolia* H. Cass.), wollsamige, 4. f. Caucasus.

*hirsuta* L., rauhhaarige, 4. f. Süd- und Osteuropa.

*nervosa* Trevir. (*Lasiosp. latifolia* Fisch. et Mey.), nervige, 4. f. Armenien.

*asperissima* W. (*hispidula* M. B.) v. *Asterothrix asperima*. *calcitrapifolia* Vahl etc. vid. *Podospermum calcitrapifolium* etc.

**Scottia** RB. (Robert Scott, Professor der Botanik zu Dublin, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*angustifolia* Lindl., schmalblättrige, ♂. t. Neuholland.

*dentata* RB., gezähnte, ♂. t. Neuholland.

*laevis* Lindl. (? *trapeziformis* Hort.), glatte, ♂. t. Neuholland.

**Scrofularia** T., Braunwurz, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (*Scrofularineae*).

*adscendens* W., aufsteigende, 4. k. ?

*altaica* Murr., altaische, 4. f. Sibirien.

*appendiculata* Jacq., beblättrte, 4. k. Nordafrika.

*aquatica* L., Wasser-B., 4. f. Europa.

*arguta* Ait., spitzzahnige, ☉. f. Canarische Inseln.

*auriculata* L., geöhrte, 4. k. Spanien.

*Balbisi* Hornem. (*auriculata* All.), Balbis's, 4. f. Oberitalien, Westdeutschland.

*betonicaefolia* L., betonienblättrige, 4. f. Portugal, Italien.

*biserrata* W., doppeltgesägte, 4. k. ?

## Scrofularia

*canina* L. (*atropurpurea* Morett.), Hunds-B., 4. f. Süd-europa, Taurien, Kleinasien.

β) *chrysanthemifolia* MB. W. (*bicolor* Sibth. Sm.).

*cretacea* Fisch., kreideliebende, 4. f. Sibirien.

*ebulifolia* MB., attichblättrige, 4. f. Caucasus.

*elongata* P. B. Webb., verlängerte, 4. k. Teneriffa.

*filicifolia* Mill., farnnblättrige, 4. k. Creta.

*frutescens* L., strauchige, 4. k. Portugal, Nordafrika.

*glabrata* Ait., kahle, ♂. k. Canarische Inseln.

*grandiflora* DC., großblumige, 4. k. ? Südamerika.

*hirsuta* Hornem., rauhhaarige, 4. f. Südeuropa.

*hispida* Dsf., steifhaarige, 4. k. Atlasgebirge.

*Hoppii* K. (*canina* Hoppe), Hoppe's, ♂. f. Krain, Kärnthen, Tyrol, Schweiz.

*laciniata* WK. (*verbenaeifolia* Poir.), schlitzblättrige, 4. f. Croatien.

*lanata* Fisch., wollige, 4. f. Sibirien.

*lanceolata* Pursh, lanzettblättrige, 4. f. Pennsylvanien.

*lucida* L., spiegelnde, 4. k. f. b. Italien, Griechenland, Taurien, Kleinasien.

*luridiflora* Fisch. et Mey., schlagblau blühende, ♂. 4. f. b. Natolien.

*lyrata* W., leierförmige, 4. k. ?

*marylandica* L., maryländische, 4. f. Nordamerika.

*melissaefolia* Urv., melissenblättrige, 4. k. f. b. Kleinasien.

*mellifera* Ait. (*viridiflora* Poir.), honiggebende, 4. k. Nordafrika, Corsica.

*multifida* W. (*silaifolia* Clark.), vieltheilige, 4. k. Sicilien, Kleinasien.

*nodosa* L., gemeine, 4. f. Europa.

*orientalis* L., morgenländische, 4. f. Kleinasien, Sibir.

*peregrina* L., fremde, ♂. f. Istrien, Italien.

*pinnatifida* Brot., fiederspaltige, 4. k. Portugal.

*ramosissima* Lois. (*frutescens* DC.), ästige, 4. k. Corsica, Südfrankreich.

*rupestris* MB., Felsen-B., 4. f. Taurien.

*sambucifolia* L., hollunderblättrige, 4. k. Spanien, Portugal, Orient.

*Scopolii* Hoppe (*auriculata* Scop., *Scorodonia* Host, *glandulosa* W. K.), Scopol's, ♂. 4. f. Osteuropa, Kärnthen, Krain etc.

β) *rugosa* W.

*Scorodonia* L., melissenblättrige, 4. f. Engl., Italien.

β) *grandidentata* Tenor.

*Smithii* Hornem., Smith's, 4. k. Canarische Inseln.

*tanacetifolia* W., rainfarnnblättrige, 4. f. b. k. Taurien, ? Nordamerika.

*trifoliata* L., dreiblättrige, 4. k. Corsica, Nordafrika.

*variegata* MB., bunte, 4. f. b. k. Caucasus.

*vernalis* L., Frühlings-B., 4. f. Europa.

β) *cordata* P. (? *latifolia* Host).

## Scutellaria R. L., Helmkraut (Schildkraut), XIV. 1., Labiatae.

*albida* L., weißliches, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

*alpina* L., Alpen-H., 4. f. Schweiz, Croatien etc.

b) *variegata* Hort. c) *sanguinea* D. Don.

*altaica* Ledeb., altaisches, 4. f. Sibirien.

*altissima* L., höchstes, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibir.

*ambigua* Nutt., zweifelhaftes, 4. f. Nordamerika.

**Scutellaria**

- caroliniana* Lam., carolinisches, 4. f. Carolina.  
*Columnae* All., Columna's, 4. f. Ungarn, Italien.  
*galericulata* L., gemeines, 4. f. Europa, Asien.  
*grandiflora* Sims, großblumiges, 4. f. Sibirien.  
*hastifolia* L., spontonblättriges, 4. f. Europa.  
*havanensis* Jacq., Havanna-H., 4. w. Cuba.  
*hirta* Sm. (*decumbens* Sbr., *utriculata* La Bill.), kurz-  
 haariges, 4. f. b. k. Creta, Syrien.  
*humilis* RB., niedriges, 4. k. Neuholland, V.-D.-L.  
*incarnata* Vent., fleischfarbiges, 4. w. Südamerika.  
*integrifolia* L. (*hyssopifolia* L.), ganzblättriges, 4. f.  
 Nordamerika.  
*lateriflora* L., seitenblumiges, 4. f. Nordamerika.  
*lupulina* L., hopfenartiges, 4. f. Sibirien.  
*macrantha* Fisch., großblumiges, 4. f. Sibirien.  
*minor* L., kleines, 4. f. Europa.  
*nervosa* Pursh, nerviges, 4. f. Virginien.  
*nigrescens* Spgl. (*hirta* Sbr.), schwärzliches, 4. f. b. Creta.  
*orientalis* L., morgenländisches, 4. f. Kleinasien.  
*pallida* MB. (*verna* Bess.), bleiches, 4. f. Taurien,  
 Galicien, Ungarn.  
*parvula* Mchx., kleines, 4. f. Nordamerika.  
*peregrina* L., fremdes, 4. f. Italien, Ungarn, Sibirien.  
*pilosa* Mchx. (*elliptica* Mühlbg., *ovalifolia* P., *caroliniana*  
 Walt.), haariges, 4. f. Nordamerika.  
*polybotrya* Bernh., vieltraubiges, 4. f. ?  
*purpurascens* Sw., purpurfarbiges, 4. w. Westindien.  
*rubicunda* Hornem., rötliches, 4. f. ?  
*scordifolia* Fisch., scordiumblättriges, 4. f. Sibirien.  
*serrata* Andr. (*pubescens* Mühlbg.), sägeblättriges, 4. f.  
 Nordamerika.  
*Tournefortii* Benth., Tournefort's, 4. f. Persien.  
*cretica* L. v. *Teucrium* Arduini.

**Scyphanthus** Swt., Tassenblume, XVIII. II. (XIII. I.), Loasaceae.

- grandiflorus* Swt., großblumige, ☉. Sch. m. f. Chili.  
*Scytalia chinensis* G. et *Rambootan* Roxb. vid. *Euphoria*  
*Litchi* et *Nephelium*. *trijuga* Roxb. vid. *Melicocca*  
*trijuga*.

**Seaforthia** RB. (Lord Seaforth, ein Gönner der Botanik), XIII. III. (XXIII. I.), Palmae.

- elegans* RB., zierliche, 5. w. Neuholland.  
**Sebaea** RB. (A. Seba, Apotheker und Naturforscher zu  
 Amsterdam), IV. I., Contortae-Gentianeae.  
*albans* RB., weißliche, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.  
*aurea* RB., goldfarbige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.  
*congesta* Schrad., gedrängte, ☉. f. m. Cap d. gut. H.  
*cordata* RB., herzblättrige, ☉. f. m. Cap der gut. H.  
*guianensis* Spgl., guianische, ☉. m. f. w. Guiana.  
*ovata* RB., eiförmige, ☉. f. m. Neuholland.  
*Sebastiana heterophylla* Bertol. vid. *Chrysanthellum pro-*  
*cumbens*.

**Sebifera glutinosa** Lour. v. *Tetranthera laurifolia*.**Secale** T., Roggen (Korn), III, II., Gramineae.

- cereale* L., gemeiner, ☉. ♂. f. Caucasus.  
 a) *hybernum* R. et S. b) *vernum* R. et S. c)  
*compositum* R. et S.  
*fragile* MB. (*sylvestre* Host), spröder, ☉. f. Podolien, Taurien.  
*prostratum* Pall. etc. v. *Triticum prostratum* etc.



- Secamone** RB. (Squamouna, arabischer Name), V. II.,  
Asclepiadeae,  
Alpini R. et S. (*aegyptiaca* H. Kew.), Alpini's, ♀. Sch.  
t. w. Aegypten, Cap der guten Hoffnung.  
*elliptica* RB., elliptische, ♀. Sch. t. Neuholland.  
*emetica* RB., brechenenerregende, ♀. Sch. w. Ostindien.
- Sechium** P. Br., Chochokürbis, XXI. x. (XVI. III.),  
Cucurbitaceae.  
*edule* Sw., genießbarer, ☉. Sch. m. f. Westindien.
- Securidaca** L., Beilstrauch, XVII. III., Polygalaceae.  
*erecta* L., aufrechter, ♀. w. Westindien.  
*virgata* Sw., ruthenförmiger, ♀. Sch. w. Westindien.  
*volubilis* L., windender, ♀. Sch. w. Westindien.
- S. lutea* Mill. v. *Securigera Coronilla*.
- Securigera** DC., Beilhülse, XVII. IV. (VI.), Legumi-  
nosae-Papilionaceae.  
*Coronilla* DC., kronenwickenähnliche, ☉. f. Südeuropa.
- Securinea** Juss., Axtspott (Otaheiti-Myrte), XXI. v.,  
Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*Commersonii* Ait., Commerson's, ♀. w. Mascarenas.  
*nitida* W., glänzende, ♀. w. Mascarenas.
- Sedum** T. L., Mauerpfeffer, X. IV., Corniculatae-  
Crassulaceae.  
*acre* L. (? *glaciale* Clarion), scharfer, 4. f. Europa.  
b) *diminutum* Haw. c) *elongatum* Haw.  
*Aizoon* L., sägeblättriger, 4. f. Sibirien, Creta.  
*albescens* Haw., weißblättriger, 4. f. England.  
*albicans* Haw., weißgrüner, 4. f. ?  
*album* L., weißblumiger (Tripmadam), 4. f. Europa.  
β) *micranthum* Haw.  
*altaicum* Fisch., altaischer, 4. f. Altai.  
*altissimum* Poir. (*Jacquini* Haw.), höchster, 4. f. Py-  
renäen, Piemont, Griechenland.  
β) *ochroleucum* Sm.
- Anacampseros* L., rundblättriger, 4. ♀. f. Südfrankr.  
*andegavense* DC., anderscher, ☉. f. Frankreich.  
*anglicum* Huds., englischer, 4. f. Engl., Schottl., Irland.  
b) *microphyllum*. c) *hibernicum*.  
*annuum* L. (*saxatile* Wigg., *rupestre* Oed., *Oederi* Retz,  
*aestivum* All.), jähriger, ☉. ♂. f. Europa.  
*anopetalum* DC. (*rufescens* Tenor., *rupestre* Vill.), blaß-  
gelber, 4. f. Süd- und Westeuropa.  
β) *aurantiacum* Sal.
- argutum* Haw., spitzzahniger, 4. f. Carpathen.  
*atratum* L., schwärzlicher, ☉. f. Mitteleurop. Alpen.  
*calabricum* Tenor., calabrischer, ☉. f. Calabrien.
- Cepaea* L. (*galioides* Pourr. All., *spatulatum* W. K.,  
*paniculatum* Lam., *tetraphyllum* Sm.), portulakblät-  
teriger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.  
*coerulescens* Haw., bläulicher, ☉. f. ?  
*coeruleum* Vahl (*azureum* Dsf.), himmelblauer, ☉. f.  
Nordafrika, Sicilien.
- Cotyledon* Jacq., nabelkrautähnlicher, 4. k. ?  
*cruciatum* DC. (*monregalense* Balb.), kreuzblättriger,  
4. f. k. Französische und oberitalienische Alpen.  
*dasyphyllum* L., bereifter, 4. f. England, Mittel- und  
Südeuropa.
- dentatum* Haw., gezahnter, 4. f. ?  
*divaricatum* Ait., ausgesperrter, ♀. k. Madeira.

## Sedum

- elegans* Lej. (*rupestre* Sm.), zierlicher, 4. f. England, Belgien.
- Eversii* Ledeb., Ever's, 4. f. Sibirien.
- Fabaria* K. (*purpureum* Tausch), Bruchwurz-M., 4. f. Mittel- und Südeuropa, England.
- Forsterianum* Sm. (*cristatum* Schrad.), Forster's, 4. f. Engl.
- fruticosum* Brot., strauchiger, ♀. k. Portugal.
- glaucum* WK. (*Andersonii* G. Don, *sexfidum* MB.), blaugrüner, ☉. ♂. f. Illyrien, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.
- Guettardi* Vill., Guettard's, 4. f. Dauphiné.
- hexapetalum* Haw., sechskroniger, 4. f. ?
- hirsutum* All., rauhhaariger, ♂. f. Oberitalien. Alpen.
- hispanicum* L., spanischer, ♂. 4. f. Südeuropa.
- hybridum* L., Bastard-M., 4. f. Sibirien, Creta.
- involucratum* MB., hüllblättriger, 4. f. Caucasus.
- lividum* W., schlagblauer, 4. f. ?
- maximum* Sut. Lk. (*latifolium* Bertol., *Telephium* ε. L.), größter, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.
- minus* Haw. (*reflexum* Auct.), kleiner, 4. f. Südeuropa.
- miserum* Lindl., kümmerlicher, ☉. f. Mexico.
- neglectum* Tenor., übersehener, 4. f. Neapel.
- nudum* Ait., nackter, ♀. k. Madeira.
- oblongum* Haw., länglicher, 4. f. England.
- oppositifolium* Sims, gegenblättriger, 4. f. Caucasus.
- ? *pallens* Vent., bleichgrüner, ♂. f. Südeuropa.
- pallidum* MB., bleichblumiger, 4. f. Caucasus.
- paucident* Haw., wenigzahniger, 4. f. ?
- pectinatum* Haw., kammförmiger, 4. f. ?
- pilosum* MB., behaarter, 4. f. Caucasus.
- populifolium* L., pappelblättriger, ♀. f. b. k. Sibirien.
- quadrifidum* Pall., vierspaltiger, 4. f. Nordasien.
- reflexum* L., zurückgebogener (Garten-Tripmadam), 4. f. Europa.
- a) *viride* K. (*reflexum* L., *crassicaule* Lk.). b) *virens* Ait. β) *glaucum* K. (*rupestre* L.)- b) *collinum* W. c) *recurvatum* W. (*reflexum* Lk., *glaucum* Sm.).
- repens* Schlchr., DC. (*rubens* Haenk., *alpestre* Vill., *saxatile* All.), kriechender, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen und Alpen.
- roseum* Stev., rosafarbiger, 4. f. Caucasus.
- sempervivoides* Fisch., MB. (*Sempervivum* Ledeb.), hausaubähnlicher, ♂. f. b. k. Iberien.
- septangulare* Haw., siebenkantiger, 4. f. ?
- sexangulare* L. (*schistosum* Lej.), sechseckiger, 4. f. Europa.
- Sieboldii* Loud., Siebold's, 4. f. b. k. Japan.
- spirale* Haw. (*sexangulare* Auct.), spiralförmiger, 4. f. ?
- spurius* MB. (*ibericum* Stev.), unächter, 4. f. Caucasus.
- stellatum* L., sternförmiger, ☉. f. Schweiz, Italien, Frankreich.
- subclavatum* Haw., keilförmiger, 4. f. Nordamerika.
- telephioides* Mchx., wundkrautähnlicher, 4. f. Nordam.
- Telephium* L., Wundkraut-M. (fette Henne), ☉. f. Europa.
- β) *purpureum* Lk. (*Anacampseros triphylla* Haw.).
- ? *teretifolium* Lam., rundblättriger, 4. f. England.
- ternatum* Mchx. (*portulacoides* Mühlbg., *deficiens* Donn), dreiblättriger, 4. f. Nordamerika.

**Sedum**

- turgidum DC., aufgeschwollener, ♂. f. Südfrankreich.  
 verticillatum L., wirtelblättriger, 4. f. Sibirien.  
 villosum L., zottiger, ♂. f. Europa.  
 virescens W. (? *viridulum* Haw.), grünlicher, 4. f. Sibirien.  
 Unbestimmt: quinquefidum W. Loud.  
 spinosum W. v. Umbilicus spinos.

**Selago L., Grufskraut, XIV. II., Globulariaceae.**

- angustifolia Thbg., Ait., schmalblättriges, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 bracteata Thbg. (*lucida* Vent.), deckblättriges, ♀. k.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 canescens Thbg., grauliches, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.  
 corymbosa L., traubendoldiges, ♀. k. Cap d. gut. H.  
 dentata Poir. (*teretifolia* Lk.), gezahntes, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 diffusa Thbg. (*spinea* Lk.), weitschweifiges, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 fasciculata L., büschelförmiges, ♀. k. Südafrika.  
 heterophylla Thbg., verschiedenblättriges, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 myrtifolia Rchb. (*Gillii* Hook.), myrtenblättriges, ♀. k.  
 Cap der guten Hoffnung.  
 ovata Thbg., eiförmiges, ♀. k. Cap der guten Hoffn.  
 polygaloides Thbg., polygalaähuliches, ♀. k. Cap  
 der guten Hoffnung.  
 ramulosa Lk., ästiges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 rapunculoides L. (*fulvo-maculata* Lk.), rapunzelähn-  
 liches, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 rotundifolia Thbg., rundblättriges, ♀. k. C. d. g. H.  
 spicata Lk., ähriges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.  
 spuria L., unächt, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.  
*Selas lanceolatum* Spgl. v. *Cyminosma pedunculata*.

**Selinum L., Silge, V. II., Umbelliferae.**

- Angelicastrum Lk. (*Angelica lancifolia* Spgl.), angelica-  
 ähnliche, 4. f. ?  
 Carvisfolia L. (*Angelica Carvisfolia* Spgl., *S. membranaceum*  
 Vill.), kümmelblättrige, 4. f. Europa.  
 caasicum MB., caucasische, 4. f. Caucasus.  
 latifolium MB., breitblättrige, 4. f. Caucasus.  
 scabrum Lapeyr., scharfe, 4. f. Pyrenäen.  
 sibiricum Retz, sibirische, 4. f. Sibirien.  
 terebinthaceum Fisch., Terpentin-S., 4. f. Sibirien.  
*austriacum* Jacq. (*argenteum* Crtz, *nigrum* Lam.,  
*nigricans* Gaud., *montanum* Schlchr., *polymorphum*  
 Spgl.), *elegans* Balb. (*lineare* R. et S., *rablense*  
 Spgl., ? *Bellardi* Balb.) etc. vid. *Peucedanum au-*  
*striacum*, *rablense* etc. *decipiens* Wendl. v. *Mela-*  
*noselinum* *decipiens* Nachtr. *Galbanum* L. etc. v.  
*Dubon Galbanum*. *Gmelini* Bray. (*livonicum* Ledeb.)  
 vid. *Conioselinum Fischeri* Nachtr. *intermedium*  
 Bess. (et *palustre* L. et *Schivereckii* Bess.) vid.  
*Thysselinum palustre* etc. *lineare* Schum. (*pra-*  
*tense* Spgl.) et *Monnieri* L. (*peregrinum* W.) v. *Cni-*  
*dium venosum* et *Monnieri*. *podolicum* Bess. vid.  
*Peucedanum Chabraei*. *pubescens* Mch. (*sylvestre*  
 Crtz), *pyrenaeum* Gouan (*Lachenalii* Gmel.) v. *An-*  
*gelica sylvestris* et *pyrenaea*. *rigidulum* Vivian. (*appia-*  
*num* P.) v. *Carum rigidum* Nachtr. *Seguieri* L. fil. v.



**Selinum**

*Ligusticum Seguieri.* *sylvestre* Jacq. vid. *Thysse-*  
*linum palustre.*

**Selloa** Sogl. (Friedrich Sellow aus Potsdam, welcher  
als Botaniker Brasilien bereiste), XIX. II., Compo-  
sitae-Corymbiferae.

*glutinosa* Sogl., klebrige, ♂. w. Brasilien.

**Semecarpus** L. fil., Markfrucht, V. III. (XXIII. II.),  
Amyrideae-Terebinthaceae.

*Anacardium* L. (*Anacardium longifol.* Lam.), ostindische,  
♂. w. Ostindien.

β) *cuneifolium* DC.

**Sempervivum** R. L., Hauswurz (Hauslaub), XI. VII.,  
Corniculatae-Crassulaceae.

?*africanum* Haw., afrikanisches, 4. k. Cap d. gut. H.  
*arachnoideum* L., spinnewebenartiges, 4. f. Mittel-  
europäische Alpen.

b) *majus.* c) *minus.*

*arboreum* L. (*africanum* Mll.), baumartiges, ♂. k. t.  
Griechenland, Portugal, Cap der guten Hoffnung.

b) *fol. variegat.* c) *fol. atropurpur.*

*arenarium* K., Sand-H., 4. f. Tyrol.

*aureum* C. Sm. (*calyciforme* Haw.), goldfarbiges, ♂.  
k. t. Canarische Inseln.

*barbatum* Chr. Sm. (*lineolare* Haw., *spathulatum* Hornem.),  
bärtiges, ♂. k. t. Canarische Inseln.

*bifurcum* Loud., zweigabeliges, ♂. k. t. Madeira.

*Braunii* Funk., K., Braun's, 4. f. Kärnthen.

*caespitosum* C. Sm. (*barbatum* Hornem., *ciliatum* Sims),  
rasenartiges, ♂. k. t. Canarische Inseln.

*canariense* L., canarisches, ♂. k. t. Canarische Inseln.

*ciliatum* Brouss., gefranztes, ♂. k. t. Canarische Inseln.

b) *hybridum* Haw.

*dodrantale* W., spannenlanges, ☉. ♂. f. k. Teneriffa.

*flagelliforme* Fisch., peitschenförmiges, 4. f. Sibirien.

*frutescens* Haw., strauchiges, ♂. k. t. Teneriffa.

*Funkii* Braun, K., Funk's, 4. f. Tyrol, Salzburg.

*glandulosum* Ait., drüsiges, ♂. k. t. Madeira.

*globiferum* L. K. (?*cuspidatum* Haw.), kugelförmiges,  
4. f. Südrussland.

*glutinosa* Ait., klebriges, ♂. k. t. Madeira.

*grandiflorum* Haw. (*globuliferum* Bot. mag.), groß-  
blumiges, 4. f. ?

*hirtum* L., haarblumiges, 4. f. Oesterreich, Ungarn.<sup>1</sup>

*hispanicum* W., spanisches, 4. k. Spanien.

*laxum* Haw., lockeres, ♂. k. t. ?

*micranthes* P. B. Webb. (*Monanthes spathulata* J. C.),  
kleinblumiges, 4. k. t. Madeira.

*monanthum* Ait., einblüthiges, 4. k. t. Canar. Inseln.

*pumilum* MB., niedriges, 4. f. Caucasus.

*retusum* Haw., abgestutztes, ♂. k. t. Teneriffa.

*Smithii* Sim's, Smith's, ♂. k. t. Teneriffa.

*soboliferum* Sims (*globiferum* Auct.), sprossendes, 4. f.  
Deutschland etc.

*stellatum* Sm. (*villosum* Bot. mag.), sternförmiges, ☉. f.  
Baldgebirge.

*tabulaeforme* Haw., tafelförmiges, ♂. k. t. Madeira.

*tectorum* L., gemeines, 4. f. Europa.

*tortuosum* Ait., gedrehtes, ♂. k. t. Canarische Inseln.

*urbicum* C. Sm., städtisches, ♂. k. t. Teneriffa.

**Sempervivum**

uviferum P. B., Webb., traubiges, ♀. k. t. Teneriffa.

villosum Ait., zottiges, ♀. k. t. Madeira.

Wulfeni Hoppe (*globiferum* Wulf.), Wulfen's, 4. f. Tyrol, Kärnthen.

*sediforme* Jacq. v. *Sedum altissimum*.

**Senecia** Commers. (Senac, ein französischer Arzt), V. 1., Pittosporeae.

nepalensis DC., nepal'sche, ♀. t. k. Nepal.

undulata Lam., wellenblättrige, ♀. w. Mascarenas, Madagascar.

*glauca* Lam. v. *Elaeodendron glaucum*.

**Senebiera** Poir. (J. Senebier, Bibliothekar in Genf, berühmt als Pflanzenphysiolog), XV. 1., Cruciferae.

Coronopus Poir., P., Krähenfuß-S., ☉. f. Europa, Nordamerika.

nilotica DC., Nil-S., ☉. f. Unteraegypten.

pinnatifida DC. (*didyma* P.), fiederspaltige, ☉. f. England, Norddeutschland. Südeuropa, Amerika.

β) *incisa* W.

**Senecillis** G., Kreuzwurz, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*glauca* G., blaugrüne, 4. f. Sibirien, Podolien,

*purpurata* G. (? *Cineraria purp.* L.), purpurfarbige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*glauca* Ledeb. v. *Ligularia altaica*.

**Senecio** T. (et *Jacobaea* T.), Kreuzkraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

1. Cinerariae (*Cineraria* Auct.).

alpestris DC. (Hoppe), (*C. integrifolia* W.), Voralpen-K., 4. f. Oesterreich, Steyermark, Kärnthen, Krain.

β) *leiocarpus* (K.).

arachnoideus Sbr. (*Scopolii* Hoppe, *C. arachnoidea* Rchb.), spinnewebiges, 4. f. b. Krain, österreichisches Littorale, Italien.

aurantiacus DC. (Hoppe), orangefarbiges, 4. f. Kärnthen, Frankreich, Sibirien, Volhynien etc.

β) *flosculosus* Bess. γ) *tomentosus* DC. (*C. aurant. flocculosa* Rchb.).

Balbisianus DC. (*C. longifolia* All.), Balbis's, 4. f. Piemont.

brachychaetus DC. (*C. longifolia* Jacq.), kurzhaariges, 4. f. Oesterreichische, kärnthner und tyroler Alpen, Apenninen, Caucasus.

campestris DC. (Retz), Feld-K., 4. f. Europa, Nordas.

a) *humilis* DC. (*C. alpina* Huds., *C. integrifolia* Sm., ? *C. papposa* Rchb.). β) *vulgaris* DC. (*C. lanceolatu* Lam.). γ) *capitatus* DC. (Ledeb.),

δ) *glabratus* DC. ι) *dentatus* Rchb.

*capitatus* (Wahlbg.), (*C. fulva* Stev.), kopfförmiges, 4. f. Carpathen, Caucasus, Schweiz, Tyrol, Frankreich.

β) *discoideus* (Rchb.).

*croceus* DC. (Tratt.), safranfarbiges, 4. f. Oesterreich, Carpathen.

*crispatus* DC. (*C. crispa* L. fil., Jacq.), krausblättriges, 4. f. Salzburg, Oesterreich.

*Doronicum* L. (*Doronicum helveticum* Mill.), gemenwurzähnliches, 4. f. Mitteleurop. Alpen, Italien.

β) *polycephalus* DC. (*apenninus* Tausch., *orientalis*

## Senecio

- Tenor., *Barrelieri* Gouan).  $\gamma$ ) *rotundifolius* Lapeyr.  $\delta$  *tomentosus* DC.
- flammeus* DC. (Turcz.), feuerfarbiges, 4. f. Dahurien.
- ovirens* DC. (K.), (*C. crassifolia* Kit., *C. Clusiana* Host), ovirisches, 4. f. Kärnthen, Illyrien, Krain.
- palustris* L., sumpfliebendes,  $\odot$   $\delta$ . f. Europa, Nordasien.
- papposus* Less. (Rchb.), langfederiges, 4. f. Böhmen, Kärnthen, Galicien.
- pratensis* DC. (Hoppe). Wiesen-K., 4. f. Galicien, Salzburg.
- racemosus* DC. (*C. racemosa* MB., *C. glabrata et auriculata* Ledeb.), traubiges, 4. f. Caucasus, Armenien.
- rivularis* DC. (WK.), Bach-K., 4. f. Ungarn, Salzburg, Böhmen.
- Schkuhrrii* DC. (Rchb.), (*C. integrifolia* Schk.), Schkuhr's, 4. f. Sudeten, sächsisches Erzgebirge.
- spathulaefolius* DC. (Gmel.), (*C. longifolia* Sturm., *integrifolia* Roth, Wallr.), spatheblättriges, 4. f. Pfalz, Schweiz, Thüringen.
- sudeticus* DC. (K.), Sudeten-K., 4. f. Sudeten, Oberlausitz.
- Tournefortii* Lapeyr. (*persicaefolius* Ram. non Thbg.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen.
- II. Genuini.
- abrotanifolius* L., stabwurzähnliches, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- aegyptius* L. (*Jacobaea sinuata* Mch.), aegyptisches,  $\odot$  f. Aegypten.
- alpinus* ? Scop. (*cordatus* K., *C. alpina* L.), Alpen-K., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.
- a) *cordifolius* Rchb. (*C. cordifol.* Jacq. L. fil., ? *C. baldensis* Poir.  $\beta$ ) *auriculatus* Rchb. (*subalpinus* K., *C. cordifolia auriculata* Jcq., *C. alliarifolia* Dsf.).
- aetnensis* Jan. (*Jacobaea carnosae* Presl.), Aetna-K.,  $\delta$  f. Sicilien.
- $\beta$ ) *incisus* DC. (*chrysanthemifolius* Biv.).
- ambiguus* DC. (*C. ambigua* Biv., *C. bicolor* W.), zweifelhaftes,  $\S$ . k. Sicilien.
- $\beta$ ) *Schouwii* DC. (*C. ceratophylla* Tenor.).
- ambraceus* Turcz. (*C. ambracea* Hornem.), ambraduftendes, 4. f. Mongolei.
- ampullaceus* Hook., blasenförmiges,  $\delta$ . 4. f. Texas.
- aquaticus* Huds., Wasser-K.,  $\delta$ . 4. f. Europa.
- $\beta$ ) *barbareaefolius* Krock. (*pratensis* Richt.).
- arabicus* L. (*intactus* Mch.), arabisches,  $\odot$   $\delta$  f. Aegypt.
- argutus* H. B. K., spitzzahniges, 4.  $\S$ . k. t. Mexico.
- artemisiaefolius* P. (*adonidifolius* Lois., *tenuifolius* DC.), beifußblättriges, 4. f. Südfrankreich, Spanien.
- aureus* L. (*fastigiatus* Schweinig), goldfarbiges, 4. f. Nordamerika.
- auritus* W. (*auriculatus* Dsf.), geöhrtes,  $\odot$  f. Nordafrika.
- Balsamitae* Mühlbg. (*lyratus* Mchx., *carolinianus* Spgl., *lobatus* P., *glabellus* Poir.), frauenmünzenähnliches, 4. f. Nordamerika.
- Cacaliaster* Lam. (*croaticus* WK.), cacaliablättriges, 4. f. Frankreich, Croatien, Salzburg.
- calcarius* H. B. K., kalkiges,  $\S$ . k. t. Mexico.
- canadensis* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.



## Senecio

candidus DC. (Presl.), reinweißes, ⚥. k. Sicilien.  
 caucasicus DC. (MB.), caucasisches, 4. f. Caucasus.  
 carniolicus W. (*incanus* Scop.), krainerisches, 4. f.  
 Tyroler, salzburger, krainer und schweizer Alpen.  
 chrysanthemifolius Poir., wucherblumenblättriges, ♂. 4.  
 f. Sicilien, Taurien, Ostindien.

β) *microglossus* DC. γ) *latilobus* DC. (*squalidus* Sm., *dentatus* Hort.).

Cineraria DC. (*maritimus* Rchb., *C. maritima* L.), aschgraues, 4. ⚥. k. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

cinerarioides H. B. K., cinerariaähnliches, ⚥. k. t. Mexico.  
 cinerascens Ait., grauliches, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.  
 coriaceus Ait. (*orientalis* Mill.), lederblättriges, 4. f.  
 Kleinasien.

coronopifolius Dsf., krähensfußblättriges, ☉. f. Nordafrika.

?β) *hispanicus* P.

crassifolius W. (*Jacobaea carnosa* Presl), dickblättriges,  
 ☉. f. Frankreich, Italien, Nordafrika.

delphinifolius Vahl, ritterspornblättriges, ♂. 4. f.  
 Nordafrika, Sardinien.

β) *laxus* DC. γ) *Badaroi* DC. (*flabellatus* Viv.).

dentatus Jacq., gezahntes, ☉. ♂. f. k. Cap d. g. H.  
 Doria L. (*altissimus* Mill.), hohes, 4. f. Süd- und  
 Osteuropa.

elegans L., zierliches, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.  
 erraticus Bertol. (*aquaticus* Lois.), herumschweifendes,  
 ♂. 4. f. Schlesien, Tyrol, Krain, Italien, Griechenl.

erubescens Ait., röthliches, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

erucaefolius L., Huds. (*siculus* Jan., *neglectus* Desv.,  
*lycopifolius* Dsf.), raukenblättriges, 4. f. Europa.

β) *tenuifolius* Jacq. γ) *napifolius* Schrad. δ)  
*breviligulatus* DC. ε) *discoideus* DC.

Eudorus DC. (*Cacalia senecioides* Dsf., *Chrysocoma*  
*senecioides* H. Par., *Eudorus senecioides* Cass.), mon-  
 ströses, 4. f. ?

foeniculaceus Ten., fenchelähnliches, ☉. f. Süditalien.

Fuchsii C. C. Gmel. (*ovatus* W., *salicifolius* Wallr.,  
*alpestris* Gaud., *saracenicus* Poll.), Fuchs's, 4. f.  
 Mittel- und Osteuropa, Frankreich.

gallicus Vill. (*squalidus* W., ? L.), französisches, ☉. f.  
 Süd- und Westeuropa.

a) *laxiflorus* Viv. β) *difficilis* Duf. γ) *desqua-*  
*matus* Lk. (*exsquameus* Brot.).

gibbosus DC. (Guss.), (? *Cin. litoralis* Vest), höckeriges,  
 4. ⚥. k. Sicilien.

giganteus Dsf., riesenhaftes, 4. f. k. Nordafrika.

glastifolius L. fil. (*lilacinus* Schrad., *serratifolius* Weinm.),  
 waidblättriges, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

glaucescens Speg., bläulichgrünes, 4. f. ?

glaucus L., meergrünes, ☉. ♂. f. Nordafrika.

grandiflorus Berg. (*venustus* Ait., Schrad.), großblumiges,  
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

a) *tenuifolius* Schrad. β) *iatifolius* Schrad.

halimifolius L. (*sessilis* Thbg.), meerneldenblättriges,  
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

hastulatus L. (*hastatus* W.), spontonförmiges, 4. k. Cap  
 der guten Hoffnung.

## Senecio

*Jacobaea* L., *Jacobs-K.*, 4. f. Europa, Mittelasien.

β) *flosculosus* DC.

*ilicifolius* L., stechhülsenblättriges, 5. k. C. d. g. H.

*incanus* L., weißgrau, 4. f. Süd- u. westeurop. Alpen.

*Kaempferi* DC., *Kaempfer's*, 4. k. Japan.

*lanceus* Ait. (*oporinus* W., *litoreus* Thbg.), lanzettblättriges, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

*lanuginosus* Spgl., wolliges, 0. f. ?

*leucophyllus* DC. (*tomentosus* Rhod. non Mchx., *incanus* et *palmatus* Lapeyr.), weißblättriges, 5. k. Pyren.

*linifolius* L., flachsblättriges, 4. f. b. k. Südspanien, Balearische Inseln, Italien.

*lividus* L., bleifarbiges, 0. f. Westeuropa, Madeira, Corsica, Dänemark.

?β) *denticulatus* Müll.

*longifolius* L., langblättriges, 5. k. Cap der gut. H.

*lyratifolius* Rchb. (*alpinus* L. fil., *Ciner. senecifolia* Poir.), leierblättriges, 4. f. Mitteleurop. Voralpen.

*lyratus* L. fil., Thbg. (*ilicifolius* Berg.), leierförmiges, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*macrophyllus* MB., großblättriges, 4. f. Caucasus.

*nebrodensis* L. (*Jacobaea lanuginosa* Presl), sizilianisches, 0. f. Italien, Sicilien.

*nemorensis* L. Jacq. (*Jacquinianus* Rchb., *frondosus* Tausch., *germanicus* Wallr.), Hain-K., 4. f. Mittel-, Süd-, West- und Osteuropa, Caucasus, Sibirien.

?β) *octoglossus* DC.

*obovatus* Mühlbg., verkehrteiförmiges, 4. f. Nordamer.

*Othonnae* MB. (*Ciner. anomala* Sibth., *Cacalia pinnata* W.), othonnaähnliches, 4. f. Caucasus.

*paludosus* L., Sumpf-K., 4. f. Europa.

β) *riparius* Wallr. γ) *Sadleri* Lang. (*tomentosus* Host).

*parviflorus* All., kleinblumiges, 4. f. Piemont.

*persicifolius* L., pfirsichblättriges, 5. k. Cap d. g. H.

*peucedanifolius* L. fil. (*Cacalia peuced.* Jacq.), haarstrangblättriges, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

*platyphyllus* DC. (*Cacalia macrophylla* MB., *Cineraria macrophylla* Ledeb.), breitblättriges, 4. f. Caucasus.

*praealtus* Bertol. (*anthoraefolius* Rchb., *grenarius* MB., *chrysanthemifolius* Morett.), hohes, 4. f. Oberitalien, Podolien, Taurien.

β) *borysthenticus* Andr.

*pseudo-elegans* Less. (*elegans* Auct. et Hort.), Garten-K., 0. f. Cap der guten Hoffnung.

b) flore pleno purpureo. c) flore albo. d) fl.

albo pleno. e) flore lilacino. f) fl. lilacino pleno.

*pubigerus* L. (?*squamosus* Thbg., *Prenanthes glomerata* Rchb.), feinhaariges, 0. f. Cap der guten Hoffnung.

*purpureus* L. (*Cacalia villosa* Jacq.), purpurfarbiges, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*reclinatus* L. suppl. (*graminifolius* Jacq., Balb.), rückwärtsgeneigtes, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *serratus* DC.

*rigescens* Jacq., starrliches, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

*rigidus* L. (*Sclerobasis rigida* Cass.), starres, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

## Senecio

rosmarinifolius L. fil., rosmarinblättriges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

a) Jacquini DC. (*rosmarinifol.* Jacq.). β) asper Ait. rupestris WK. (*laciniatus* Bertol.), Felsen-K., ☉. f. Süd- und Osteuropa.

β) montanus W. (*paradoxus* Hoppe).

saracenicus Jacq., heidnisches, 4. f. Europa, Sibirien. scaber W., scharfes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

sinuatus H. B. K., buchtiges, 4. k. Mexico.

solidagineus Berg., goldruthenähnliches, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

speciosus W. (*Pseudochina* Andr.), prächtiges, 4. k. China.

squamosus Thbg., schuppiges, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

sylvaticus L., Wald-K., ☉. f. Europa.

telephifolius Jacq., telephiumblättriges, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

triflorus L., dreiblumiges, ☉. f. Aegypten.

trilobus L. (*leucanthemifolius* Poir., *vernus* Biv.), dreilappiges, ☉. f. Nordafrika, Italien.

umbrosus WK., schattenliebendes, ☉. f. Ungarn.

uniflorus All., einblumiges, 4. f. Schweiz, Piemont.

verbenaefolius Jacq., eisenkrautblättriges, ☉. f. Aegypt.

vernalis WK., Frühlings-K., ☉. f. Ungarn, Griechenland, Caucasus, Schlesien.

β) caucasicus DC.

viscosus L., schmieriges, ☉. f. Europa.

vulgaris L., gemeines, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittel- und Nordasien.

III. *Cremocephalum* Cass. (*Crassocephalum* Mch.).

cernuus L. fil. (*uniflorus* Retz), übergebogenes, ☉. f. Ostindien, Mascarenas, Madagascar.

IV. *Erechtites* Rafin.

cacalioides Fisch., cacaliaähnliches, ☉. w. Jamaica.

glomeratus Dsf., knaulförmiges, ☉. f. Neuholland.

hieracifolius L. (*Sonchus agrestis* et *occidentalis* Spgl., *Neoceis hieracifolia* Cass., *E. praealta* Rafin.), habichtkrautblättriges, ☉. f. Nord- u. Südamer., Westind.

valerianaefolius Wolf, Lk., baldrianblättriges, ☉. f. m. Südamerika.

V. *Gynura* Cass.

bicolor DC. (*Cacalia bicolor* Roxb. p. 114.), zweifarbiges, 4. ♀. w. Molucken.

haematophyllus W. (*cruentus* Roth, *discolor* Dsf., *bicolor* Balb., *africanus* Hortul.), blutfarbiges, ♀. w. ?

japonicus Thbg. (*Porophyllum japonicum* DC.), japanisches, 4. k. Japan.

Pseudo-China L., dickwurzelliges, 4. t. w. China, Ostind.

*adenotrichius* DC. vid. *Adenotrichia amplexicaulis*.

*cruentus* DC. etc. vid. *Cineraria cruenta*. *Tussilagin* Lindl. v. *Pericallis Tussilaginis*.

Septas L., Siebenling, VII. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

capensis L., capischer, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

globiflora Sims, kugelblumiger, 4. k. t. Cap d. g. H.

umbella Haw., doldiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Serapias L., Stendelwurz, XX. i., Orchideae.

cordigera L. (*ovalis* Rich.), herzförmiger, 4. Kn. k. Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.

Lingua L., Zungen-St., 4. Kn. k. Südeuropa, Nordafrika,



**Serapias**

*longipetala* Poll., langkronige, 4. Kn. k. Italien.

Hinsichtlich der übrigen siehe *Cephalanthera* et *Epipactis*.

**Serjania** Plum. (P. Serjeant, französischer Botaniker), VIII. III., Sapindaceae.

*caracasana* W., Caracas-S., ♂. Sch. w. Cuba, Südamer.

*divaricata* Schum., ausgesperrte, ♂. Sch. w. Jamaica.

*mexicana* W., mexicanische, ♂. Sch. w. Mexico.

*sinuata* Schum., buchtige, ♂. Sch. w. Hispaniola.

*tritermata* W., dreifachdreizählige, ♂. w. Westindien.

**Seringia** Gay. (N. C. Seringe, Professor der Botanik zu Lyon), V. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

*platypylla* Gay., breitblättrige, ♂. t. Neuholland.

**S. ovata** Sogl. v. *Ptelidium ovatum*.**Seriola** L., Nesselsalat, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*aethnensis* L., sicilianisches, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

*albicans* Tin., weiflicher, ♂. f. Sicilien.

*apargioides* Rchb. (*Robertia taraxacoides* Hort., *S. taraxacifolia* Salzm.), löwenzahnblättriger, 4. f. Sicilien, Nordafrika.

*cretensis* L., cretischer, ☉. f. Sicilien, Creta.

*glauca* Tin., blaugrüner, ☉. f. Sicilien.

*rubescens* Tin., röthlicher, 4. f. Sicilien.

*urens* L., brennender, ☉. f. Sicilien, Griechenland.

*alliata* Bivon. etc. v. *Rodigia alliata* etc. *taraxacoides* Loisel. (*uniflora* Bivon.) vid. *Robertia taraxacoides*.

**Seriphium alopecuroides** Lam., *juniperifolium* Lam. etc. v. *Stoebe reflexa aethiopica* etc.**Serissa** Commers., Juss., Serisse, V. I., Rubiaceae.

*foetida* W. (*Lycium japonicum* Thbg., *foetidum* L.), stinkende, ♂. k. Japan. China, Cap der gut. Hoffn.

b) flore pleno.

**Serpicula** L., Kriechleinkraut, XXI. IV. (XXII. IV.), Halorageae.

*repens* L., afrikanisches, 4. k. Südafrika, Mascarenas.

*verticillata* L. Mühlbg. v. *Udora verticillata*.

**Serratula** Dill., Scharte, XIX. I., Compositae-Cynarcephalae.

*arguta* Fisch., spitzzahnige, 4. f. Südrussland.

*caspica* Pall., caspische, 4. f. Caspisches Meer.

*centauroides* L. (*heterophylla* et *pulchella* Hort.), kornblumenähnliche, 4. f. Sibirien.

*cichoracea* DC., cichorienähnliche, 4. f. Italien, Cauc.

*coronata* L., gekrönte, 4. f. Sibirien.

*divaricata* Fisch. et Mey., ausgesperrte, ☉. f. Nordpers.

*glauca* Ledeb., blaugrüne, 4. f. Sibirien.

*Gmelini* Ledeb. (*centauroides* MB.), Gmelin's, 4. f. Cauc.

*heterophylla* Dsf. (*Carduus lycopifolius* Vill.), verschiedenblättrige, 4. f. Frankreich.

*Kitaibelii* G. Don (*nitida* Bess., *Carduus nitidus* WK.).

Kitaibel's, 4. f. Ungarn, Vohynien.

*nitida* Fisch., glänzende, 4. f. Ostsibirien.

*nudicaulis* L. (*Carduus cerinthifolius* Vill., *cerinthoides* W., *glauca* Cav., *cirsiioides* Ten.), nacktstengelige, 4. f. Süd- und Westeuropa.

*Picris* MB., picrisähnliche, 4. f. Caucasus.

*quinquefolia* MB., fünfblättrige, 4. f. Caucasus.

**Serratula**

*radiata* MB. (*centauroides* MB., *pinnatifida* Dsf., *Carduus radiatus* WK.), strahlige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.

*tinctoria* L., Färber-S., 4. f. Europa.

b) *alba*.

*xeranthemoides* MB., strohblumenähnliche, 4. f. Caucasus, Bessarabien.

*acaulis* etc. v. *Rhaponticum acaule*. *alata* Dsf. etc. v. *Jurinea alata*. *alpina* L. etc. v. *Saufsurea alpina*. *arvensis* L. v. *Cirsium arvense*. *blanda* MB. (*simplex* DC.) vid. *Jurinea mollis*. *elegans* Ait. etc. v. *Liatris elegans*. *multiflora* L. v. *Jurinea linearifolia*. *praealta* L. etc. v. *Vernonia praealta*.

**Serruria** RB. (J. Serrurier, Professor der Botanik zu Utrecht), IV. 1., Proteaceae.

*abrotanifolia* Kn., stabwurzblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

*adscendens* RB., aufsteigende, ♀. t. Cap der gut. H.

*aemula* RB., ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*Aitoni* RB., Aiton's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*arenaria* RB., Sand-S., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*artemisiaefolia* Kn., beifußblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

*Burmanni* RB., Burmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*candicans* RB., weißliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*ciliata* RB., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*congesta* RB., gedrängtblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

*crithmifolia* RB., meerfenchelblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*cyanoides* RB., flockenblumenähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*decipiens* RB., täuschende, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*decumbens* RB., niederliegende, ♀. t. Cap der gut. H.

*diffusa* RB., weitschweifige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*elongata* RB., verlängerte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*emarginata* Swt. (*arenaria* Kn.), ausgerandete, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

*flagellaris* RB., ausläuferartige, ♀. t. Cap der gut. H.

*florida* RB., blüthenreiche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*foeniculacea* RB., fenchelblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

*glaberrima* RB., glatte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*glomerata* RB., knaulförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*millefolia* Kn., vielblättrige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*nitida* RB., glänzende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*Nivenii* RB., Niven's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*odorata* Swt., wohlriechende, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*parilis* Kn., gleichmäßige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*pedunculata* RB., stielblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

*phylicoides* RB., phylicaähnliche, ♀. t. Cap d. gut. H.

*pinnata* RB., gefiederte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

*Roxburghii* RB., Roxburgh's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

*rubricaulis* RB., rothstengelige, ♀. t. Cap der gut. H.

*scoparia* RB., besenartige, ♀. t. Cap der guten Hoff

*squarrosa* RB., sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

*triternata* RB., dreinaldreizählige, ♀. t. Cap d. g. H.

*villosa* RB., zottige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

**Sersalisia** RB. (J. B. Sersalis, ein neapolitanischer Geistlicher), V. 1., Sapotaceae.

*sericea* RB., seidenhaarige, ♀. t. k. Neuholland.

**Sesamum** L., Sesam, XIV. 11., Personatae-Sesameae.

*indicum* L., indischer, ☉. w. m. Ostindien.

**Sesamum**

orientale L. (*edule* Hort.), morgenländischer, ☉. w. m. Ostindien.

**Sesbania** P. Br., P. (arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

aculeata P., stachelige, ☉. w. Ostindien.

aegyptiaca P., ägyptische, ☿. w. Aegypten.

affinis Schrad., ähnelnde, ☉. w. Ostindien.

cannabina P., hanfblättrige, ☉. w. Ostindien.

gracilis Schrad., schlanke, ☉. w. ?

macrocarpa Elliot, großfrüchtige, ☉. w. m. f. Louisiana.

occidentalis Poir., westliche, ☿. w. Westindien,

paludosa Jacq. fil. (? *uliginosa* Roxb.), sumpfliebende, ☉. w. Ostindien.

picta P., bemalte, ♂. w. Neuspanien, Westindien.

punctata DC., punktirte, ☉. w. Guinea.

sericea L., seidenhaarige, ☉. w. Ostindien.

stricta Schrad., steife, ☉. w. Ostindien.

coccinea P. etc. vid. *Agati coccinea* etc. *disperma* Pursh v. *Glottidium floridanum*.

**Seseli** Boerh. L., Sesel, V. II., Umbelliferae.

annuum L. (*bienne* Crtz, *coloratum* Ehrh., *tortuosum* Poll.), jähriger, ♂. f. Europa, Sibirien.

Bocconi Spgl. (*Bubon siculus* Spgl.), Boccone's, ♂. f. Sicilien.

buchtormense (Fisch.), buchtormischer, ♂. f. Sibirien.

campestre Bess., Feld-S., ♂. f. Galicien.

cervariaefolium DC., hirschwurzblättriger, ☿. k. Teneriffa.

chaerophylloides Thbg., kerbelähnlicher, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

cuneifolium MB., keilblättriger, ♂. 4. f. Caucasus.

crassifolium Schrad., dickblättriger, ♂. f. ? Südeuropa.

dichotomum MB., zweizinkiger, ♂. 4. f. Caucasus.

elatum L., hoher, 4. f. Südeuropa.

fragile Gouan, brüchiger, ♂. f. ?

glaucum Jacq. (? *elatum* L., *junceum* Sm.), blaugrüner, 4. f. Süd- und Osteuropa.

Gouani K. (*elatum* Gouan), Gouan's, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

gracile W. K., schlanker, 4. f. Ungarn.

Hippomarathrum L. (*articulatum* Crtz, *Hippomarathrum pelviforme* G. M. S.), Pferde-S., 4. f. Mitteleuropa.

leucospermum WK., weißsamiger, 4. f. Ungarn.

Lobelianum Bess., Lobel's, ♂. f. ? Südeuropa.

macedonicum (L.), (*Athamanta macedonica* Spgl.), macedonischer, ♂. k. f. b. Macedonien, Italien, Nordafrika.

montanum L. (*multicaule* Jacq.), Berg-S., 4. f. Südeuropa.

Pallasii Bess., Pallas's, ♂. f. Sibirien.

petraeum MB. (*Bubon glaucus* Spgl.), Felsen-S., 4. f. Taurien, Caucasus.

peucedanifolium Bess. (*rigidum* WK.), haarstrangblättriger, 4. f. Podolien, Bannat.

pimpinelloides Will., bibernellähnlicher, 4. f. Podolien, Griechenland, Kleinasien.

proliferum Spgl., sprossender, 4. f. ?

striatum Thbg., gestreifter, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

strictum Ledeb., steifer, ♂. f. Sibirien.

tauricum Lk., taurischer, ♂. f. Taurien.

tortuosum L., gedrehter, 4. f. Südeuropa.

triterdatum Pursh, dreifachdreizähliger, 4. f. Nordamer.



**Seseli**

*varium* Trevir., hunter, ♂. f. Unterösterreich.

*ammoides* Gouan (*corsicum* Lk., *pusillum* Brot., *verticillatum* Dsf.), (et *Saxifragum* L., *Bunius* Vill.)

v. *Ptychotis ammoides* et *heterophylla*. *pyrenaicum* L. v. *Angelica pyrenaica*.

**Sesleria** Arduin. (Leonard Sesler, Arzt und Botaniker, Freund des Vitaliano Donati), III. II., Gramineae.

I. *Genuina*.

*alba* Sibth., weisse, 4. f. Griechenland.

*albicans* Kit., weifslische, 4. f. Carpathen.

*coerulea* Ard., blaue, 4. f. Europa.

*cylindrica* DC. (*argentea* Savi), cylinderförmige, 4. f. Frankreich, Italien, Dalmatien.

*elongata* Host, langährige, 4. f. Oesterreich. Litorale.

*filifolia* Heuff., fadenblättrige, 4. f. Banat.

*nitida* Tenor., glänzende, 4. f. Calabrien, Sicilien.

*phleoides* Stev., lieschgrasähnliche, 4. f. Ostcaucasus.

*rigida* Heuffel, starrblättrige, 4. f. Banat.

*sphaerocephala* Arduin. (*leucocephala* DC.), rundköpfige, 4. f. Norische Alpen, Schweiz etc.

*tenuifolia* Schrad. (*juncifolia* Suffr. Host), feinblättrige, 4. f. Oesterreichisches Litorale.

II. *Psilathera* Lk.

*microcephala* DC. (*tenella* Host), kleinköpfige, 4. f. Norische Alpen etc.

*dura* Kunth vid. *Sclerochloa dura*. *echinata* Host vid. *Echinaria capitata*. *echinata* Lam. v. *Dactylis pungenis*.

**Sesuvium** L., Gliederkraut, XII. II., Aizoideae-Ficoideae.

*longifolium* W., langblättriges, ☉. w. m. f. Südamer.

*Portulacastrum* L. (*pedunculatum* P.), portulakähnliches, 4. w. t. Südamerika.

*repens* W., kriechendes, ☉. w. m. f. Ostindien.

*revolutifolium* Vahl, eingerolltblättriges, 4. w. Südamer.

*sessile* P. (*Portulacastrum* DC.), stiellosblumiges, 4. w. Westindien.

**Setaria** P. B., Borstenfennich, III. II., Gramineae.

*composita* H. B. K. (*polystachya* Schrad.), vielähriger, ☉. ♂. f. m. w. Südamerika.

*compressa* Kunth, flachhalmiger, ☉. f. Neuholland.

*corrugata* R. et S., runzeliger, ☉. f. Nordamerika.

*erythrosperma* Spgl., rothsamiger, ☉. f. Virginien.

*geniculata* R. et S., gliederiger, ☉. 4. w. Antillen.

*glauca* P. B., blaugrüner, ☉. f. Europa, Amerika, Ostindien, Neuholland etc.

*glauescens* Lk., grünlichblauer, ☉. f. ?

*helvola* R. et S., graulichgelber, ☉. f. m. Ostindien.

*intermedia* R. et S., mittlerer, ☉. f. m. Ostindien.

*italica* P. B., italienischer, ☉. f. Südeuropa, Ostindien, Nordamerika.

b) *germanica* P. B. c) *sibirica* Hort.

*longifolia* Lk., langblättriger, 4. w. ?

*macrochaeta* Spgl., großhaariger, ☉. f. m. Ostindien.

*macrostachya* H. B. K. (*setosa* P. B., ? *cylindrica* R. et S., *Panicum tenax* Rich.), großähriger, ☉. f. m. Südamerika.

*muricata* Lk., weichstacheliger, ☉. f. Nordamerika.

*nubica* Thbg., Lk., nubischer, ☉. f. Dongola.

*pumila* Lk., kleiner, ☉. f. ?

**Setaria**

*purpurascens* H. B. K., purpurfarbiger, ☉. f. Mexico, Peru etc.

*scandens* Schrad. (*Panic tenacissimum* N. E.), kletternder, ☉. w. m. f. Brasilien.

*sericea* R. et S., seidenhaariger, ☉. f. m. Ostindien.

*tenacissima* Schrad., zäher, ☉. w. f. m. Brasilien.

*verticillata* P. B., wirtelblüthiger, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*viridis* P. B., grünes, ☉. f. Europa, Asien, Nordamer.

β) *Weinmanni* R. et S. γ) *majus* Gaud.

Hinsichtlich der übrigen s. *Pennisetum*.

**Sethia** H. B. K. (S. Sethi, Verfasser eines Werkes über Küchengewächse), X. III., Caryophyllaceae-Erythroxyleae.

*indica* DC., indische, ♀. w. Ostindien.

**Seymeria** Pursh (Henry Seymer, ein englischer Naturforscher), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

*pectinata* Pursh, kammlätterige, ☉. f. Nordamerika.

*tenuifolia* Pursh, feinblätterige, ☉. f. Nordamerika.

**Sheffieldia** *repens* Forst (*incana* La Bill.) vid. *Samolus litoralis*.

**Shepherdia** Nutt. (W. Shepherd, Vorsteher des botanischen Gartens zu Liverpool), XXII. IV., Elaeagneae.

*argentea* Nutt., silberfarbige, ♀. f. Nordamerika.

*canadensis* Nutt., canadische, ♀. f. Nordamerika.

**Sherardia** L. (W. Sherard, berühmter englischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.

*arvensis* L., Acker-S., ☉. ♂. f. Europa.

*muralis* L. v. *Galium murale*.

**Sibbaldia** L. (Robert Sibbald, Professor der Physik zu Edinburgh), V. v., Rosaceae.

*erecta* L., aufrechte, ♀. f. Sibirien.

*parviflora* W., kleinblumige, ♀. f. b. Kleinasien.

*polygyna* W., vielgriffelige, ♀. f. Sibirien.

*procumbens* L., niederliegende, ♀. f. Mittel- und nord-europäische Alpen, Sibirien, Nordamerika.

**Sibthorpia** L. (H. Sibthorp, Professor der Botanik zu Oxford), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

*europaea* L., europäische, ♀. f. England, Portugal.

*peregrina* L. v. *Disandra prostrata*.

**Sicyos** L., Haargurke, XXI. x. (XVI. III.), Cucurbitaceae.

*angulatus* L., kantenblätterige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*laciniatus* L., schlitzblätterige, ☉. Sch. f. m. Westind.

*microphyllus* H. B. K., kleinblätterige, ☉. Sch. f. m. Mexico.

*parviflorus* W., kleinblumige, ☉. Sch. f. m. Quito.

*vitifolius* W., weinblätterige, ☉. Sch. f. ?

*edulis* Jacq. vid. *Sechium edule*. *Garcini* L. vid.

*Bryonia Garcini*.

**Sida** L., Sammetpappel, XVI. VIII., Malvaceae.

*abutiloides* Jacq., halbstrauchige, ☉. ♀. m. f. w. Jamaica.

*Abutilon* L., gemeine, ☉. f. Südeuropa, Mittelasien.

*acerifolia* Cav., ahornblätterige, ♀. w. Neuspanien.

*acrantha* Lk., spitzblumige, ♀. w. Brasilien.

*acuminata* DC., zugespitzte, ♀. w. Hispaniola.

*acuta* N. L. Burm., spitze, ♀. w. Ostindien.

*alba* L., weisse, ☉. m. f. w. Ostindien.

*albida* W., weisliche, ♀. k. Canarische Inseln.

*alnifolia* L., erlenblätterige, ☉. m. f. w. Ostindien.

## Sida

- althaeaefolia* Sw., eibischblättrige, ♀. w. Westindien, Südamerika.  
*americana* L., amerikanische, ☉. m. f. Jamaica.  
*angustifolia* Juss. Murr. (*ulmifolia* Retz), schmalblättrige, ♀. 4. w. Westindien, Brasilien, Mascarenas.  
*arborea* L. suppl. (*peruviana* Cav.), baumartige, ♀. w. Peru.  
*arguta* Sw., zpitzzähnige, ♀. w. Jamaica.  
*asiatica* L., asiatische, ☉. m. f. w. Ostindien.  
*atrosanguinea* Jacq. (*capillaris* Cav.), dunkelblutrothe, ♀. w. Südamerika.  
*aurea* Lodd., goldfarbige, ♀. w. Ostindien.  
*aurita* Wall., geöhrt, ♀. w. Ostindien.  
*betulina* Horn., birkenblättrige, 4. w. Südamerika.  
*borbonica* Cav., borbonische, ♀. w. Mascarenas.  
*bracteolata* DC., deckblättrige, ♀. w. Südamerika.  
*brasiliensis* Cav., brasilianische, ♂. w. Brasilien.  
*brevipes* DC., kurzstielige, ☉. m. f. w. Neugranada.  
*calyxhymenia* Gay, hautkelchige, ♀. k. t. Neuholland.  
*canariensis* W. (*alba* Cav.), canarische, ♂. ♀. k. Canarische Inseln.  
*carpinifolia* L. fil. (*betulina* Lag., *planicaulis* Cav.), hainbuchenblättrige, ♀. k. t. Canarische Inseln, Ostindien.  
*ciliaris* L., gefranzte, ♂. ♀. w. Westindien.  
*compressa* DC., platte, ☉. ♀. m. f. k. Nepal.  
*conferta* Lk., gedrängtblumige, ♀. w. Brasilien.  
*contracta* Lk., engrispige, ♀. w. Madagascar.  
*cordifolia* L., herzblättrige, ☉. m. f. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.  
*cornuta* Humb., W., gehörnte, ♀. w. Südamerika.  
*crassifolia* L'Her. (*tricuspidata et tomentosa* Cav.), dickblättrige, ♀. w. Hispaniola.  
*crispa* L. (*amplexicaulis* Lam., *amplexifolia* Sess.), krause, ☉. m. f. Carolina, Südamerika.  
*dioica* Cav., zweihäusige, 4. f. Virginien.  
*dumosa* Sw., Hecken-S., ♀. w. Jamaica.  
*erosa* Lk., genagte, 4. w. Brasilien.  
*ferruginea* DC., rostfarbige, ♀. w. Peru.  
*Fischeriana* \* (*arguta* Fisch. Lk.), Fischer's, ♀. w. Brasilien.  
*foetida* Cav. (*viscosa* L'Her.), stinkende, ☉. ♀. m. f. w. Peru.  
*frutescens* Cav., strauchige, ♀. w. Westindien, Brasilien.  
*fulva* Hoffg. (? *atropurpurea* Blum., *vitellina* Hoffg.), rothgelbe, ♀. w. Java.  
*gigantea* Jacq., riesenhafte, ♀. w. Caracas.  
*glauca* Cav., blaugrüne, ♀. w. Guinea.  
*globiflora* Hook., kugelblumige, ♀. w. Mauritius.  
*grandifolia* W. (*mollis* Orteg.), großblättrige, ♀. w. Peru.  
*graveolens* Roxb., starkkriechende, ♂. w. Ostindien.  
*hernandioides* L'Her., hernandiaähnliche, ♀. w. Hispaniola.  
*hirta* Lam. (*pilosa* L'Her.), kurzhaarige, ♂. w. Ostind.  
*humilis* Cav. (*pilosa* Retz, *unilocularis* L'Her.), niedrige, ☉. m. f. Ostindien.  
*jamaicensis* L. (*glomerata* Cav.), jamaicaische, ♀. w. Jamaica.  
*jatrophaoides* L'Her. (*palmata* Jacq.), jatrophaähnliche, ☉. m. f. Südamerika.



## Sida

- inaequalis Lk. (*inaequalifolia* Hort.), ungleichblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 incana Lk., weißgraue,  $\frac{1}{2}$  w. Sandwichinseln.  
 indica L., indische,  $\odot$  m. f. Ostindien.  
 lasiostega Lk., wollige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 Lechenaultiana DC., Lechenault's,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 linifolia Cav., flachblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 Luciana DC., St. Lucia-S.,  $\frac{1}{2}$  w. St. Lucia.  
 maculata Cav. (*suberosa* L'Her.), gefleckte,  $\frac{1}{2}$  w. Hispaniola.  
 mauritiana L'Her. (*planiflora* Cav.), mascarenische,  $\odot$   $\frac{1}{2}$  m. f. w. Mascarenas.  
 micans Cav., schimmernde,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 Milleri DC., Miller's,  $\odot$  m. f. ?  
 mollicoma W., weichschopfige,  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 mollissima Cav. (*cistiflora* L'Her.), weichhaarige,  $\frac{1}{2}$  w. Peru.  
 multiflora Cav., vielblumige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 Napaea Cav., virginische,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.  
 nudiflora L'Her. (*stellata* Cav.), nacktblumige,  $\frac{1}{2}$  w. Hispaniola, Peru.  
 ?obtusa Vogel, stumpfblättrige,  $\odot$  m. f. ?  
 occidentalis L., westliche,  $\odot$  m. f. Neugranada.  
 orbiculata DC., kreisblättrige,  $\frac{1}{2}$  t. China.  
 paniculata L. (*nervosa* DC.), rispige,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 patens Andr., abstehende,  $\frac{1}{2}$  w. Abyssinien.  
 pentacarpa Roxb., fünfkapselige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 periplocaefolia L., periplocablättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Ost- und Westindien.  
      $\beta$ ) ceylanica.  $\gamma$ ) caribaea.  
 permollis W., weiche,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 pilosa Cav., haarige,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 polyantha Schltdl., vielblumige,  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 populifolia Lam., pappelblättrige,  $\odot$  m. f. Ostindien.  
 pulchella W., hübsche,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.  
 pulchra Coll., schöne,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.  
 purpurascens Lk., purpurfarbige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 recisa Lk., stutzblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. ? Brasilien.  
 reflexa Cav. (*retrorsa* L'Her.), zurückgebogene,  $\frac{1}{2}$  w. Peru.  
 repanda Roth, ausgeschweifte,  $\odot$   $\frac{1}{2}$  m. f. w. ?  
 retusa L. (*philippica* Cav.), eingedrückte,  $\odot$   $\frac{1}{2}$  w. Ostindien, Molucken, Mascarenas.  
 rhombifolia L., rautenblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Ost- und Westindien.  
 rhomboidea Roxb., rautenförmige,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
 ricinoides L'Her. (*Ricini* Spgl., *palmata* Cav.), ricinus-ähnliche,  $\odot$  m. f. Peru.  
 rotundifolia Cav., rundblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas.  
 semicrenata Lk., halbkerbige,  $\frac{1}{2}$  w. Manila.  
 sericea Ait., seidenhaarige, ?  $\frac{1}{2}$  w. ?  
 sessiliflora Hook., stiellosblumige,  $\frac{1}{2}$  w. Südamerika.  
 Schrankii DC. (*brasila* Schrk.), Schrank's,  $\frac{1}{2}$  w. Brasil.  
 Sonneratiana W. Cav., Sonnerat's,  $\frac{1}{2}$  t. k. Cap der guten Hoffnung.  
 spinosa L., stachelige,  $\odot$  f. Ostindien etc.  
 spiraeaefolia Lk. (*ulmifolia* W., *carpinoides* DC.), spiräenblättrige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien.  
 speciosa W. (*rosea* Lk.), prächtige,  $\frac{1}{2}$  w. Brasilien, Cumana.

## Sida

*stipulata* Cav. (*lanceolata* Retz), zwischenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

*supina* L'Her. (*procumbens* Sw., *ovata* Cav.), niederliegende, 4. w. Westindien.

*tiliaefolia* Fisch., lindenblättrige, ☉. m. f. Tibet.

*triloba* Cav., dreilappige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*triquetra* L. (*trisulcata* Jacq.), ♀. w. Westindien, Südamerika.

*umbellata* L., doldige, ♂. ♀. w. Westindien.

*urens* L., brennende, ♀. w. Westindien.

*venosa* H. Berol., aderige, ♀. ♀. w. Brasilien.

*verruculata* DC., kleinwarzige, ♀. w. Brasilien.

*verticillata* Cav., wirtelblumige, ♀. w. Brasilien.

*vesicaria* Cav., blasige, ♀. t. Mexico.

*villosa* Mill., zottige, ♀. w. Südamerika.

*viminea* Fisch., gartenartige, 4. w. Brasilien.

*virgata* Cav., ruthenförmige, ♀. w. Peru.

*vitifolia* Cav., weinblättrige, ♀. w. Chili.

*coccinea* DC. vid. *Cristaria coccinea*. *crenatiflora* P., *cristata* L., *deltoides* Hornem., *Dilleniana* W., *hastata* W. etc. v. *Anoda parviflora*, *cristata*, *triangularis*, *Dilleniana* etc. *malacophylla* Lk. v. *Lopinia malacophylla*. *periptera* Sims vid. *Periptera punicea*.

*Sideranthus spinulosus* Swt. vid. *Aplopappus spinulosus*. *villosus* Swt. v. *Chrysopsis villosa*.

**Sideritis** T., Magnetkraut (Gliederkraut), XIV. 1., Labiatae.

*alpina* Vill. (*pyrenaica* Auct.), Alpen-M., 4. f. Dauphiné.

*angustifolia* Lag., schmalblättriges, 4. f. Spanien.

*brutia* Tenor., neapolitanisches, 4. f. Neapel.

*canariensis* L., canarisches, ♀. k. Canarische Inseln.

*candicans* Ait., weisfilziges, ♀. k. Madeira.

*chamaedryfolia* Cav. (*hirtula* Brot.), gamanderblättriges, ♀. f. Spanien, Portugal.

*cretica* L., cretisches, ♀. k. Creta.

*crispata* W. (*Cavanillesii* Lag.), krausblättriges, ♀. k. Südspanien.

*decumbens* Thbg., niederliegendes, ☉. f. Cap d. g. H.

*elegans* Murr. (*nigricans* Lam.), zierliches, ☉. f. ?

*foetida* Dsf., Poir., stinkendes, 4. f. Spanien.

*hirsuta* L., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa.

*hyssopifolia* L., ysopblättriges, 4. f. Süd- u. Westeuropa.

*ilicifolia* W., stechhülsenblättriges, 4. f. k. Kleinasien.

*incana* L., weisgraues, ♀. k. Spanien.

*lanata* L., wolliges, ☉. f. Kleinasien, Aegypten.

*leucantha* Cav., weisblumiges, ♀. k. Spanien.

*montana* L., Berg-M., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

*perfoliata* L., durchwachsenes, 4. f. k. Kleinasien.

*romana* L. (*Burgsdorfia rigida* Mch., *romana* Rchb.), römisches, ☉. f. Istrien, Italien.

*scordioides* L., scordiumähnliches, 4. ♀. f. Südeuropa.  
β) *hirta* Roth. γ) *fruticulosa* Pourr.

*serrata* Lag., sägeblättriges, 4. f. k. Spanien.

*spinoza* L., (*subspinoza* Cav.), stacheliges, 4. f. k. Spanien, Nordafrika.

*syriaca* L., syrisches, 4. ♀. k. Griechenland, Syrien.

*taurica* W., taurisches, 4. ♀. f. k. Taurien.

*calycantha* MB. v. *Zietenia orientalis*. *linearifolia* Lnm. v. *Stachys stenophylla*.

*Siderodendron* Schreb., Eisenbaum, IV. 1., Rubiaceae, triflorum Vahl, dreiblumiger, f. w. Westindien.

*Sideroxylon* Dill., Eisenholz, V. 1., Sapotaceae.

inermis L., unbewehrtes, f. k. Cap der guten Hoffn.  
tomentosum Roxb., filziges, f. w. Ostindien.

*lycioides* L. etc. vid. *Bumelia lycioides* etc. *mite* L. (et *canariensis* L.) v. *Manglilla Milleriana* et *canariensis*. *melanophleum* L. (et *venulosum* W.) v. *Myrsine melanophlea* et *venulosa*. *sericeum* Ait. v. *Sersalisia sericea*. *spinosum* L. v. *Argania Sideroxylon*.

*Siebera cherlerioides* Hoppe v. *Alsine aretioides*.

*Siegesbeckia* L. (J. C. Siegesbeck, Botaniker und Akademiker zu Petersburg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*cordifolia* H. B. K., herzblättrige, ☉. f. Mexico.

*droseroides* Swt. (? *jorullensis* H. B. K.), droseraähnliche, ☉. f. Mexico.

*flosculosa* L'Her., dreifädige, ☉. f. Peru.

*orientalis* L. (*iberica* W.), morgenländische, ☉. f. Ostindien, Japan, Taurien.

*triangularis* Cav., dreikantige, ☉. f. Mexico.

*laciniata* Poir. et *occidentalis* L. vid. *Verbena laciniata* et *Siegesbeckia*.

*Sieversia* W. (J. Sievers, russischer Botaniker), XII. 111., Rosaceae.

*anemonoides* W., anemonenähnliche, 4. f. Kamtschatka.  
*glacialis* Spgl. (*Adamsia glacialis* Fisch.), Eis-S., 4. f. Nördliches Sibirien.

*montana* Spgl., Berg-S., 4. f. Mitteleurop. Alpen.

*Peckii* RB. (*Geum* P. Pursh), Peck's, 4. f. Nordamer.

*reptans* Spgl., kriechende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

*rosea* Grah., rosafarbige, 4. f. Nordamerika.

*triflora* Spgl., RB., dreiblumige, 4. f. Louisiana.

*Silau* Bess., K. Silau (Rofskümmel), V. 11., Umbelliferae.

*pratensis* Bess., K. Wiesen-S., 4. f. Europa, Sibirien.

*Silene* L. (et *Viscago* Hall. et *Otites* Otth.), Leimkraut, X. 111., Caryophyllaceae-Sileneae.

*acaulis* L., stengelloses, 4. f. Europäische Alpen.

b) *alba*. β) *exscapa* All.

*adscendens* Lagasc., aufsteigendes, ☉. f. Spanien.

*aegyptiaca* L., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

*alpestris* Jacq. (*viscida* Spgl.), Voralpen-L., 4. f. Oesterreich, Krain, Tyrol etc.

*altaica* P. (*graminifolia* Otth., *jeniseensis* W., *Cucub. fruticosus* Pall.), altaisches, 4. f. Sibirien.

*amoena* L., liebliches, 4. f. Tatarei.

*angustifolia* MB., schmalblättriges, 4. f. Caucasus.

*annulata* Thor., beringtes, ☉. f. Frankreich.

*antirrhina* L., löwenmaulähnliches, ☉. f. Nordamerika.

*apetala* W. (*aspera* Hort.), kronenloses, ☉. f. ?

*aprica* Turcz., dürres, ☉. f. Baical.

*Armeria* L., Garten-S., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Westeuropa.  
b) *alba*.

*Atocion* Jacq. (*orchidea* L. suppl.), knabenkrautblumiges, ☉. f. Cypern, Kleinasien.

*Behen* L., blasenkelchiges, ☉. f. Griechenland, Kleinas.

*bellidifolia* Jacq., maßliebenblättriges, ☉. f. ? Griechenland, Südeuropa.



**Silene**

- bicolor Thore (*picta* P., *reticulata* Hort.), zweifarbiges,  
 ☉. f. Frankreich.
- brachypetala DC., kurzkröniges, ☉. f. Südfrankreich.
- bupleuroides L., hasenöhrchenähnliches, ♂. 4. f. b. k.  
 Persien, Armenien.
- caespitosa Stev., rasenartiges, 4. f. Caucasus.
- Campanula P., glockenblumiges, 4. f. Piemont.
- cana Otth, weißgraues, 4. f. ?
- canariensis W., canarisches, ☉. f. Teneriffa.
- canescens Tenor., weißgrauliches, ☉. f. Neapel.
- carnosa Mch., fleischiges, ☉. f. ?
- caspica P. (*fruticulosa* MB.), caspisches, 4. ♂. f. b. k.  
 Südrussland.
- Catesbaei Walt., Catesbai's, 4. f. Nordamerika.
- catholica Otth. (*Mussini* Hornem., *Cucubalus glutinosus* Retz.), catholisches, 4. f. Sicilien.  
 ♂) bessanensis Lk.
- cerastoides L. (? *coarctata* Lagasc.), hornkrautähnliches,  
 ☉. f. Süd- und Westeuropa.
- cernua Thbg., übergebogenes, ♂. f. k. Cap d. gut. H.
- cheiranthifolia Schott., lackblättriges, ☉. f. San-Rocco.
- chloraefolia Sm., chlorablättriges, 4. f. b. k. Armenien, Caucasus.
- chlorantha Ehrh., grünblumiges, 4. f. Odergebiete, Krain.  
 ? chlorophis Wall., grünliches, ♂. k. f. Nepal.
- cinerea Dsf., aschfarbiges, ☉. f. Nordafrika.
- clandestina Jacq., heimlichblühendes, ☉. f. C. d. g. H.
- colorata Schousb., farbiges, ☉. f. Mauritanien.
- compacta Fisch., Hornem., MB. (*purpurea* K. et W.),  
 dichtblumiges, ☉. ♂. f. Caucasus, Siebenbürgen.
- commutata Guss., verwechseltes, ☉. f. Sicilien.
- congesta Sm., gedrängtblumiges, ☉. f. Griechenland.
- conica L., kegelförmiges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
- conoidea L., kegelnähnliches, ☉. f. Westeuropa.
- cordifolia All., herzblättriges, 4. ♂. f. b. k. Oberitalienische Alpen.
- corsica DC., corsisches, 4. ♂. k. Corsica.
- ? Csereii Baum., Csereii's, ☉. f. ?
- crassifolia L., dickblättriges, ♂. f. k. Cap d. gut. H.
- cretica L., cretisches, ☉. f. Creta.
- cylindriflora Otth, cylinderblumiges, ♂. f. Südeuropa.
- dahurica Fisch., dahurisches, ♂. f. Dahurien.
- decumbens Bivon., niederliegendes, ☉. f. Sicilien.
- depressa MB., niedergedrücktes, 4. f. Armen., Caucas.
- dichotoma Ehrh. (*membranacea* Poir., *trinervis* Soland.),  
 zweizinkiges, ♂. f. Osteuropa, Kleinasien.
- Dilleniana Schott., Dillen's, ☉. f. ?
- dinarica Spgl. (*depressa* Baumg.), dinarisches, 4. f.  
 Dinarische Alpen.
- discolor Sm., verschiedenfarbiges, ☉. f. Cypern.
- divaricata Clem., sparriges, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
- diversifolia Otth, verschiedenblättriges, ☉. f. ?
- effusa Otth (Fisch.), ergossenes, 4. f. Südrussl., Illyrien.
- elata Otth (*chlorantha* Auct.), hohes, 4. f. Taurien.
- elegans Brot., zierliches, ☉. f. Portugal.
- Fabaria Sm., fabariablättriges, 4. k. Creta, Sicilien.
- fimbriata Sims, gefranztes, 4. f. Caucasus.
- flavescens W. Kit., gelbliches, 4. f. Banat.
- fruticosa L., strauchiges, ♂. k. Sicilien.

## Silene

gallica L., französisches, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

β) sylvestris Schott. γ) anglica L. δ) lusitanica L.

geminiflora W., paarblumiges, ☉. f. ?

gigantea L., hohes, ♂, k. Afrika.

glaucifolia Lagasc., blaugrünblättriges, ♂. f. Spanien.

gracilis DC., schlankes, ☉. f. ?

Gypsophila Dsf., gypskrautähnliches, 4. f. ?

halophila W. (*hispanica* Otth, *parviflora* Zea), Salinen-L., ♂. f. Spanien.

hirsuta Lag. (*sabuletorum* Lk., *hirsutissima* Otth), rauhaariges, ☉. f. Spanien.

hispida Dsf. (*disticha* W.), steifhaariges, ☉. f. Nordafrika, Italien.

iberica MB. (*divaricata* Sm.), iberisches, ☉. f. Iberien. Kleinasien.

imbricata Dsf., ziegeldachförmiges, ☉. f. Nordafrika.

inaperta L., ungeöffnetes, ☉. f. Südeuropa.

inclusa Hornem., eingeschlossenes, ☉. f. ?

indica Roxb., indisches, 4. k. Nepal.

inflata Sm. (*oleracea* Fic., *S. Cucubalus* Wib.), aufgeblasenes, 4. f. Europa.

β) alpina (Lam.). γ) Antelopum (Vest). δ) angustifolia (Tenor.). ε) glauca (W.) (? *saponariaefolia* Schott.).

italica P. (*silenoides* Vill., *Viscago clavata* Mch.), italienisches, 4. f. Südeuropa.

β) insubrica Gaud. (*viscosa* Schlchr.).

juvenalis Delil., jugendliches, ☉. f. Aegypten.

lacera Sims, schlitzblumiges, ♂. f. Caucasus.

laciniata Cav., geschlitztes, 4. k. Mexico.

laevigata Sm., kahles, ☉. f. Griechenland.

latifolia Hornem., breitblättriges, 4. f. ?

laxiflora Broter., lockerblumiges, ☉. f. Spanien, Portug.

Lerchenfeldiana Baumg., Lerchenfeld's, 4. f. Dinarische Alpen.

linicola Gmel. (*linaceola* Wib.), Lein-L., ☉. f. Süddeutschland.

linifolia W., flachslättriges, ☉. f. Spanien.

livida W. (*rubra* Vest), bläulichgraues, 4. f. Steyermark, Krain, österreichisches Litorale.

Loefflingiana H. Dresd., Loeffling's, ☉. f. ? Spanien.

longicaulis Pourr., langstengeliges, ☉. f. Spanien.

longiflora Ehrh. (*juncea* Roth), langblumiges, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

longipetala Vent. (*macropetala* Spgl.), langkroniges, ☉. f. Syrien.

marginata Schott, berandetes, ☉. f. ?

maritima W. (*uniflora* Roth, *amoena* Huds., Spgl.), Meerstrand's, ☉. f. England.

b) flore pleno Penny.

micrantha Lk., kleinblumiges, ☉. f. Portugal.

micropetala DC., kleinkroniges, ☉. f. ?

Mociniana DC., Mocini's, 4. k. Mexico.

mollissima Sm., weichblättriges, 4. f. Kleinasien.

multiflora P., vielblumiges, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

muricata H. Petrop., weichstacheliges, ☉. f. ? Südrussl.

Muscipula L., Fliegen-L., ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.

## Silene

- mutica Stev., unbespitztes, ☉. f. Caucasus.  
 nemoralis W. Kit., Hain-L., 4. f. Deutschl., Ungarn.  
 nicaeensis All. (*arenaria* Dsf., *villosa* Mch.), nizzaisches,  
 ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.  
 β) viscosissima Tenor. γ) Psammitis Lk.  
 noctiflora L., nachtblühendes, ☉. f. Mitteleuropa.  
 nocturna L. (*setacea* Otth), nächtliches, ☉. f. Südeuropa,  
 Nordamerika.  
 nutans L., nickendes, 4. f. Europa.  
 β) infracta W. K.  
 nyctantha W., abendblumiges, ☉. f. ?  
 obtusifolia W. (*colorata* Fisch.), stumpfblättriges, ☉.  
 f. Nepal.  
 ocymoides Dsf., basilicumbblätteriges, ☉. f. ?  
 ornata Ait., zierendes, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. Hoffn.  
 Otites Sm., P., Hügel-L., 4. f. Europa.  
 ovata Pursh, eiförmiges, 4. f. b. k. Carolina.  
 paradoxa L., wunderbares, 4. f. Italien.  
 parvifolia Otth, kleinblättriges, ♂. f. ?  
 parviflora P. (Ehrh.), kleinblumiges, 4. f. Ungarn,  
 Siebenbürgen, Illyrien.  
 patula Dsf., abstehendes, 4. f. b. Nordafrika.  
 pelidna Rchb., bleifarbiges, 4. f. ? Caucasus.  
 pendula L. (*crispa* Mch., *Agrostemma humilis* Hort.),  
 überhängendes, ☉. f. Südeuropa.  
 pensylvanica Mchx., pensylvanisches, 4. f. Nordamer.  
 perfoliata Otth (*Cucubalus chloraefolius* Poir.), durch-  
 wachsenes, ♂. f. Südeuropa.  
 pernoctans Lk., Nacht-L., ☉. f. ? Portugal.  
 petraea W. K., Stein-L., 4. f. Ungarn.  
 pilosa Spgl. (*Cucubalus mollissimus* WK.), weichhaariges,  
 4. f. Italien, Ungarn, Siebenbürgen.  
 pinguis Hornem., fettes, ☉. f. Südeuropa.  
 polyphylla L., vielblättriges, ♂. 4. f. Siebenbürgen.  
 portensis L., portoisches, ☉. f. Portugal.  
 Pourretii Poir. (*ciliata* Pour., *arvatica* et *legionensis*  
 Lagasc.). Pourret's, ☉. f. Spanien.  
 procumbens Murr. (*Cucubalus polyphyllus* Fisch.), lie-  
 gendes, 4. f. Sibirien.  
 Pseudatocion Dsf., stendelblumiges, ☉. f. Sicilien,  
 Nordafrika.  
 pubescens Lois, feinhaariges, ☉. f. Corsica.  
 Pumilio Wulf., niedriges, 4. f. b. Carnische, norische  
 und rhätische Alpen.  
 quadridentata DC. (*quadrifida* L.), vierzähniges, 4. f.  
 Mittel- und osteuropäische Alpen.  
 β) pusilla W. K. γ) pudibunda Hffmssgg.  
 quinquevulnera L., fünffleckiges, ☉. f. England, Mittel-  
 und Südeuropa.  
 ramosa Otth (*ramosissima* Sm.), ästiges, ☉. f. Creta.  
 ramosissima Dsf., starkästiges, ♂. f. k. Nordafrika.  
 regia Sins, königliches, 4. f. Nordamerika.  
 repens Patr., kriechendes, 4. f. Sibirien.  
 Requierii Otth, Requier's, 4. f. b. Corsica.  
 reticulata Dsf., genetztes, ☉. ♂. f. k. Nordafrika.  
 rubella L., röthliches, ☉. f. Aegypten, Portugal.  
 rupestris L. (*Kaulfussii* Spgl.), felsenliebendes, 4. f.  
 Mittel- und nordeuropäische Alpen.  
 ruthenica Otth, russisches, 4. f. Rußland.



**Silene**

sardoa Moris, sardinisches, ☉. f. Sardinien.

saxatilis MB., Gesteins-L., 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) tenuis W.

Saxifraga L., steinbrechartiges, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

Schafta Gmel., Schafta-L., 4. f. Sibirien.

secundiflora Otth, einseitsblumiges, 4. f. Syrien.

sedoides Jacq., sedumähnliches, ☉. f. Frankr., Italien.

sericea All., seidenhaariges, ☉. f. Italien.

?serotina Hort., spätblumiges, ☉. f. ?

sibirica P., sibirisches, 4. f. Caucasus.

spathulata MB., spathelblättriges, ♂. f. Caucasus.

spergulifolia MB., sparkblättriges, 4. f. Caucasus, Armenien.

Steveni ?Spgl., Steven's, 4. f. Caucasus.

stricta L., steifes, ☉. f. Südfrankreich.

stylosa Loud., langgriffeliges, 4. f. ?

suavis Schrad., feinriechendes, ?☉. f. ?

subvinosa H. Monspel. (?narbonensis Hort.), Wein-L., ☉. f. Südfrankreich.

supina MB., niedergestrecktes, 4. f. k. f. b, Taurien, Caucasus.

tatarica P., tatarisches, 4. f. Neumark, Rußl., Sibirien.

tenuifolia Otth, feinblättriges, ☉. f. Dahurien.

tridentata Dsf., dreizähniges, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

trinervia Sebast., dreinerviges, ☉. f. Mittelitalien.

undulata Ait., wellenblättriges, ♂. k. Cap der gut. H.

Urvillei Schott., Urville's, f. k. Griechenland.

vallesia L., Walliser-L., 4. f. Schweiz, Piemont.

vesicaria Schrad., blasiges, ?♂. f. ?

vespertina Retz (*bipartita* Dsf., *colorata* Poir.), vesperblumiges, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

viridiflora L., grünblumiges, ♂. f. k. Taurien.

viscaginoides Hornem., viscagoähnliches, 4. f. Dahurien.

viscosa P., schmieriges, ♂. f. Nord- u. Osteuropa, Cauc.

volgensis Spgl., wolgaisches, 4. f. Rußland.

Zawadzki Herbach, Zawadzki's, 4. f. Galicien.

*baccifera* Roth v. *Cucubalus bacciferus*.

**Siler Scop., Silerkraut, V. II., Umbelliferae.**

trilobum Scop. (*aquilegifolium* G.), dreilappiges, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Sibirien.

*caucasicum* Spgl. vid. *Agasyllis caucasica* Nachtr.

*montanum* Crtz v. *Laserpitium Siler. salsum* Spgl. v. *Palimbria salsa* Nachtr.

**Silphium L., Silphie, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.**

Asteriscus L. (*scabrum* Walt.), sternblumenartige, 4. f. Nordamerika.

atropurpureum Retz, dunkelpurpurrothe, 4. f. Nordam.

compositum Mchx. (*laciniatum* Walt.), kleinblumige, 4. f. Nordamerika.

conjunctum W., verbundene, 4. f. Nordamerika.

connatum L., verwachsene, 4. f. Nordamerika.

erythrocaulon Bernh., rothstengelige, 4. f. Nordamer.

glaucum Weinm. (*Coreopsis latifolia* Mchx.), blaugrüne, 4. f. Nordamerika.

Hornemanni DC. (*Asteriscus* Hornem., *connatum* Dsf.), Horneimann's, 4. f. Nordamerika.

laciniatum L. (*dissectum* Poir.), schlitzbblätterige, 4. f. Nordamerika.

**Silphium**

perfoliatum L., durchwachsene, 4. f. Nordamerika.  
 pumilum Mchx. (*tomentosum* Pursh.), kleine, 4. f. Nordamerika.

quercifolium DC., eichenblättrige, 4. f. ?  
 terebinthinaceum L. supp., terpeninriechende, 4. f. Nordamerika.

ternatum Retz, dreizählige, 4. f. Nordamerika.

trifoliatum L. (*ternifolium* Mchx.), dreiblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

**Silybum** Vaill. G., Mariendistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

I. *Alfredia* Cass.

cernuum G., übergebogene, 4. f. Sibirien.

II. *Genuin*.

marianum G., officinelle, ♂. f. Mitteleuropa.

a) flore albo. b) flore purpureo.

*atriplicifolium* Fisch. v. *Rhaponticum atriplicifolium*.

**Simaba** Aubl. (guianischer Name), X. 1., Tricoccae-Simarubeae.

guianensis Aubl., guianische, ♀. Guiana.

orinocensis H. B. K., Orinoco-S., ♀. Südamerika.

**Simaruba** Aubl. (guianischer Name), X. 1., Tricoccae-Simarubeae.

excelsa DC., hohe, ♀. w. Jamaica.

officinalis DC. (*amara* Aubl.), officinelle, ♀. w. Guiana, Caribäen.

**Simsia** P. (J. Sims, berühmter englischer Botaniker), XIX. 111., Compositae-Corymbiferae.

amplexicaulis P., stengelumfassende, 4. f. ?

*ficifolia* P. v. *Ximenesia foetida*.

**Sinapis** T., Senf, XV. 111., Cruciferae.

alba L., weißer, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

Allionii Jacq., Allione's, ☉. f. Aegypten.

amplexicaulis DC., stengelumfassender, ☉. f. Sicilien, Numidien.

apula Tenor., apulischer, ☉. f. Süditalien.

arvensis L., Acker-S., ☉. f. Europa.

auriculata DC., geöhrt, ☉. f. ?

brassicata L., kohlblättriger, ☉. f. China.

cernua Thbg., übergebogener, ☉. f. Cap der gut. H.

chinensis L., chinesischer, ☉. f. China.

dissecta Lag., schlitzblättriger, ☉. f. Spanien.

foliosa W., blattreicher, ☉. f. Levante.

frutescens Ait. (*Hesperis diffusa* Banks), strauchiger, ♀. k. Madeira.

geniculata Dsf., gegliederter, ☉. f. Nordafrika.

hastata Dsf., spontonförmiger, ☉. f. Neuholland.

hispida Schousb. (*flexuosa* Lam.), steifhaariger, ☉. f. Marocco.

integrifolia W., ganzblättriger, ☉. f. Ostindien.

junceae L., binsenförmiger, ☉. f. China.

Kaber DC., Kaber-S., ☉. f. Persien.

laevigata L. (*campestris* Jacq. fil.), glatter, ☉. f. Spanien, Portugal.

nigra L., schwarzer, ☉. f. Europa, Mittelasien.

β) turgida P. γ) torulosa P. δ) villosa Murr.

ε) laevigata Burm.

nudicaulis Lagasc., nacktstengeliger, 4. f. Spanien.

**Sinapis**

*orientalis* L., morgenländischer, ☉. f. Südeuropa, Spanien, Levante.

*pekinensis* Lour., pekin'scher, ☉. f. China.

*pubescens* L., weichhaariger, 4. ♀. k. Spanien, Süditalien, Griechenland.

*ramosa* Roxb., ästiger, ☉. f. Ostindien.

*retrohirsuta* Bess., rückwärtshaariger, ☉. f. ?Volhynien.

*subbipinnatifida* Lag., fiederspaltiger, ☉. f. Spanien.

*turgida* Delil. (*Raphanus turg.* P.), aufgeschwollener, ☉. f. Aegypten.

*bipinnata* Dsf. v. *Didesmus bipinnatus*. *crassifolia* Raf. (et *tenuifolia* RB.) vid. *Diploaxis crassifolia* etc. *Cheiranthus* K. (*recurvata* All., *Tournefortii* All.) vid. *Brassica Cheiranthus*. *Eruca* Röhl vid. *Eruca sativa*. *hispanica* L. v. *Erucaria tenuifolia*. *heterophylla* Lagasc. v. *Erucastrium heterophyllum* Nachtr. *incana* L. (*taurica* MB., *persica* Fisch.) v. *Erucastrium incanum*. *pyrenaica* L. vid. *Sisymbrium acutangulum*.

*Sinningia Helleri* N. E. etc. v. *Gloxinia Helleri* etc.

*Siphocampylus* D. et G. Don v. *Lobelia*.

*Siphonanthus indica* L. v. *Clerodendron Siphonanthus*.

*Siphonia* Rich., Kautschuckbaum, XXI. x. (XVI. vi.)  
Tricoccae-Euphorbiaceae.

*elastica* P. (*Cahuchu* Rich.), elastischer, ♀. w. Guiana, Brasilien.

**Sison** L. K., Süßdolde, V. II., Umbelliferae.

*Amomum* L., gewürzhafte, ♂. f. England, Südeuropa.  
*capillaceus* Spgl., haarförmige, ☉. f. Carolina, Hispaniola.  
*flexuosus* Tenor., gebogene, ♂. 4. f. Neapel.

*Ammi* L. etc. v. *Helosciadium Ammi* etc. *Anisum* Spgl. v. *Tragium Anisum*. *arvensis* Brot. (*segetum* L.) etc. vid. *Petroselinum segetum* etc. *aureus* Spgl. v. *Zizia aurea*. *canadense* L. v. *Conopodium canadense*. *crinitum* Pall. vid. *Schultzia crinita*.  
*Podagraria* Spgl. v. *Aegopodium Podagraria*. *verticillatum* L. v. *Carum verticillatum*.

**Sisymbrium** T., Rauke, XV. III., Cruciferae.

1. Genuin.

*acutangulum* DC. (*sinapoides* RB.), spitzkantige, ♂. f. Schweiz, Frankreich, Italien.

*asperum* L., rauhe, ☉. f. Westeuropa.

*atrovirens* Hornem., schwarzgrüne, ☉. f. China.

*austriacum* Jacq., österreichische, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *eckartsbergense* W. (*multisiliquosum* Hoffm.).

γ) *Tillieri* Bell. (*erysimifolium* Pourr.).

*brachycarpum* Richards., kurzschotige, ☉. f. Nordamer.

*bursifolium* L., täschelkrautblättrige, ☉. f. Sicilien, Pyren.

*canescens* Nutt., grauliche, ☉. f. Nordamerika.

*Columnae* Jacq., Columna's, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *altissimum* L.

*contortum* Lag., gedrehte, ♂. f. Spanien.

*contortuplicatum* DC., ineinandergefaltete, ☉. f. Südrußland, Albanien.

*crassifolium* Cav., dickblättrige, ♂. f. Spanien.

*Cummingianum* Fisch. et Mey., Cumming's, ☉. f. Chili.

*erysimoides* Dsf. (*rigidulum* Lag.), hederichähnliche, ☉. f. Nordafrika.



**Sisymbrium**

*fugax* Lagasc., hinfällige, ☉. ♂. f. Spanien.  
*gallicum* W., französische, ☉. f. Frankreich.  
*hirsutum* Lag., rauhhaarige, ☉. f. Spanien.  
*hispanicum* Jacq., spanische, ♂. f. Westeuropa.  
*incanum* Bernh. (*canescens* Hook.), weißgraue, ☉. f. Nordamerika.

*Irio* L. (*glabrum* W.), langblättrige, ♂. f. England, Süd- und Osteuropa.

*junceum* MB., simsenförmige, ♂. f. Osteuropa, Sibirien.

*Millefolium* Ait., garbenblättrige, ♀. k. Teneriffa.

*nitidum* Zea (*Zea* Spgl.), glänzende, ☉. f. Spanien.

*pannonicum* Jacq. (*Sinapeos* Retz, *Sinapistrum* Crtz) ungarische, ♂. f. Süd-, Ost- und Westeuropa.

β) affine W.

*persicum* Spgl., Bernh., persische, ☉. f. Persien.

*pinnatifidum* DC. (*bursifolium* Gouan, *dentatum* All.), fiederspaltige, 4. f. Südeuropa.

*pumilum* Steph., kleine, ☉. f. Nordpersien, Caucasus.

*Sophia* L. (*parviflorum* Lam.), feinblättrige, ☉. f. Europa.

*strictissimum* L., steifste, ☉. f. Mitteleuropa.

*subhastatum* W., spontonblättrige, ☉. f. Griechenland.

*taraxacifolium* DC., löwenzahnblättrige, ♂. f. Südfrankreich, Spanien.

*torulosum* Dsf., holperige, ☉. f. Nordafrika, Griechenl.

*tripinnatum* DC., dreifiederige, ☉. f. Cap d. gut. H.

II. *Arabidopsis* DC. K.

*Thalianum* Monn., Gay., Gaud. (*Conringia Thaliana* Rchb.), Thal's, ☉. f. Europa, Mittelasien, Nordamer.

III. *Huegeninia* Rchb.

*tanacetifolium* L., rainfarnblättrige, 4. f. Schweiz, Italien, Frankreich.

IV. *Velarum* DC.

*corniculatum* Cav., kleinhörnige, ☉. f. Spanien.

*officinale* Scop., officinale, ☉. f. Europa, Nordamerika, Nordafrika.

*polyceraton* L., vielhörnige, ☉. f. Südeuropa.

*rigidum* MB. (*cornutum* Pall.), starre, ☉. f. Taurien, Sibirien.

*runcinatum* Lag., schrotsägenförmige, ☉. f. Spanien.

*supinum* L., niedrige, ☉. f. Oeland, Frankreich.

*amphibium* L. (et *Nasturtium* L.) etc. vid. *Nasturtium*

*amphibium*, officinale etc. *Barbarea* L. vid.

*Barbarea plantaginea. catholicum* L. etc. v. *Diplo-*

*taxis catholica. Erucastrum* Poll. (et *obtusangulum*

Schlchr.) vid. *Erucastrum Pollichii* et *obtusang.*

*filifolium* W. vid. *Leptaleum filifolium. integrifo-*

*lium* L. (et *pectinatum* Fisch. et *Sieversianum* Re-

dowsk.) v. *Andreoskia integ.*, *pectin.* et *eglandulosa.*

*monense* Gmel. vid. *Brassica Cheiranthus. Loeselii*

L. vid. *Leptocarpaea Loeselii. valentinum* L. vid.

*Brassica valentina. Tilesii* Ledeb. vid. *Arabis*

*ambigua.*

**Sisyrinchium** L., Schweinsrüssel, III. 1. (XVI. 1.), Irideae

*anceps* L. (*gramineum* Curt.), flügelstengeliger, 4. f. k. Virginien, Canada.

*aphyllum* Spgl., blattloser, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

*bermudianum* Mill., L., bermudischer, 4. k. Bermud. Ins.

*californicum* Spgl., californischer, 4. k. Californien.

*chilense* Hook., chilesischer, 4. k. Chili.

**Sisyrinchium**

convolutum Nocc., zusammengerollter, 4. k. Cap der guten Hoffnung, Südamerika.

Cummingii Penny, Cumming's, 4. k. Südamerika.

Douglasii Alb. Diet. (*grandiflorum* Dougl. non Cav.), Douglas's, 4. k. f. Nordamerika.

elegans W., zierlicher, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

flexuosum Spgl., gebogener, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

glaucophyllum Penny, blaugrünblättriger, 4. f. Nordam.

graminifolium Lindl., grasblättriger, 4. k. Chili.

β) pumilum Lindl.

guttatum Moris (? *maculatum* Hook.), getüpfelter, 4. k. Chili.

hirtellum Penny, kurzhaariger, 4. f. k. Nordamerika.

iridifolium H. B. K., grasblättriger, 4. k. t. Südamer.

laxum Lk., lockerer, 4. k. t. Südamerika.

lutescens Lodd., gelblicher, 4. k. ?

luteum Fisch., gelber, 4. k. t. ? Südamerika.

macrocephalum Hort., grofsköpfiger, 4. k. ?

maculatum Hook., gefleckter, 4. k. Chili.

micranthum Cav., kleinblumiger, 4. t. Südamerika.

mucronatum Mchx., weichspitziger, 4. k. t. Nordamer.

Nuttalli Swt. (*bermudianum* Nutt.), Nuttall's, 4. k. f. Nordamerika.

odoratissimum Lindl., wohlriechendster, 4. k. Chili.

palmifolium L. (*racemosum* P.), palmenblättriger, 4. w. Brasilien, Peru.

pedunculatum Gill., langstieliger, 4. k. Chili.

plicatum Spgl. (*latifolium* Sm., *palmifol.* Cav.), gefalteter, 4. Kn. w. Westindien.

speciosum Hook., prächtiger, 4. w. Chili.

striatum Sm. (*spicatum* Cav.), gestreifter, 4. k. f. b. Mexico.

tenuifolium H. B. K., feinblättriger, . k. Mexico.

*collinum* Cav. v. *Homeria collina*. *gladiatum* Spgl. v. *Bobartia gladiata*. *ixioides* Forst. vid. *Libertia ixioides*.

**Sium** T., Merk, V. II., Umbelliferae.I. *Berula* K.

angustifolium L. (*erectum* Huds.), schmalblättriger, 4. Wa. f. Europa, Caucasus.

II. *Genuin*.

ferulaefolium Spgl., steckenkrauthblättriger, 4. Kn. f. b. k. Cypern, Creta, Nordafrika.

lancifolium MB., lanzettblättriger, 4. Wa. f. Volhynien, Ukraine.

latifolium L., breitblättriger, 4. Wa. f. Europa.

lineare Mchx. (*longifolium* Pursh), gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.

peucedanoides Spgl., haarstrangblättriger, 4. f. Cauc.

Sisarum L., Zuckerwurz-M., 4. Kn. f. Ostasien.

*Bulbocastanum* L. etc. vid. *Carum Bulbocastanum* etc. *Falcaria* L. vid. *Falcaria Rivini*. *inundatum* Roth etc. v. *Helosciadium inundatum* etc. *rigidius* L. v. *Pastinaca rigida*. *Saxifragum* Roth v. *Ptychotis heterophylla*. *siculum* L. v. *Brignolia panicifolia*. *Silaus* Roth v. *Silaus pratensis*.

*Skinnera excorticata* Forst. v. *Fuchsia excorticata*.

*Sloanea* Plum. (Hans Sloane, berühmter englischer Naturforscher), XIII. I., Tiliaceae.

dentata L. (*Plumierii* Aubl.), gezahnte, f. w. Südamer.

## Sloanea

*sinemariensis* Aubl. (*Aubleti* Sw.), Aublet's, ♂. w. Caribäen, Guiana.

**Smeathmannia** Soland. (Smeathmann, ein Engländer, welcher Afrika bereiste), XIII. VI., Passifloreae.

*laevigata* Sol., glatthläutterige, ♂. w. Sierra Leone.

**Smilacina** Dsf., Maieublümlein, VI. I., Asparagineae.

I. *Genuina*.

*borealis* Sims (*Dracaena boreal.* Ait.), nördliche, 4. f. Nordamerika.

*ciliata* Dsf., gefranzte, 4. f. Nordamerika.

*dahurica* Turcz., dahurische, 4. f. Dahurien.

*racemosa* Dsf., traubige, 4. f. Nordamerika.

*ramosa* G. Don, ästige, 4. f. Sibirien.

*stellata* Dsf., sternförmige, 4. f. Nordamerika.

*trifolia* Dsf., dreiblätterige, 4. f. Nordamerika.

*umbellata* Dsf., doldige, 4. f. Nordamerika.

II. *Majanthemum* Wigg.

*bifolia* Dsf., zweiblätterige, 4. f. Europa, Asien.

*canadensis* Pursh, canadische, 4. f. Nordamerika.

**Smilax** T., Stechwinde, XXII. VI. (VI. I.), Asparagineae-Smilaceae.

*acuminata* W., zugespitzte, ♂. Sch. w. Westindien.

*Alpini* W., Alpin's, ♂. Sch. k. Griechenland.

*aspera* L., rauhe, ♂. Sch. k. f. b. Südeuropa, Syrien.

b) *auriculata*.

*australis* RB., neuholländische, ♂. Sch. t. k. Neuholland.

*Bona nox* L. (*variegata* Walt.), bunte, ♂. Sch. k. Carolina.

*brasiliensis* Spgl., brasilianische, ♂. Sch. w. Brasilien.

*caduca* L., hinfällige, ♂. Sch. f. Nordamerika.

*canariensis* W., canarische, ♂. Sch. k. Teneriffa.

*catalonica* Poir. (*bermudensis* Duham.), catalonische, ♂.

Sch. k. f. b. Spanien.

*China* L., China-S., ♂. Sch. k. China, Japan.

*cumanensis* H. B. K., cumanische, ♂. Sch. w. Cumana, Jamaica.

*excelsa* L., hohe, ♂. Sch. k. Caucasus, Kleinasien.

*glabra* Roxb., kahle, ♂. Sch. w. Ostindien.

*glauca* Walt., blaugrüne, ♂. Sch. k. Carolina.

*glycyphylla* Sw., süßblätterige, ♂. Sch. k. t. Neuholl.

*hastata* W. (*bona nox* Mchx.), spontanblätterige, ♂. Sch.

k. Südcarolina, Florida.

*havanensis* Jacq., havanaische, ♂. Sch. w. Cuba.

*herbacea* L., krautartige, 4. Sch. f. b. k. Nordamer.

*horrida* Dsf., dichtstachelige, ♂. Sch. f. b. k. Nordamer.

*lanceolata* Walt., lanzettblätterige, ♂. Sch. k. f. b.

Nordamerika.

*latifolia* RB., breitblätterige, ♂. Sch. k. t. Neuholland.

*laurifolia* L., lorbeerblätterige, ♂. Sch. k. Virgin., Carol.

*longifolia* Rich., langblätterige, ♂. Sch. w. Cayenne.

*maculata* Roxb., gefleckte, ♂. Sch. t. Nepal.

*mauritanica* Poir. (*excelsa* Duh.), mauritanische, ♂. Sch.

k. Nordafrika.

*nigra* W., schwarze, ♂. Sch. k. Spanien, Portugal.

*ovalifolia* Roxb., eiblätterige, ♂. Sch. w. Ostindien.

*peduncularis* Mühlbg. (*humilis* Mill., *pulverulenta* Mchx.),

langstielige, 4. Sch. k. f. b. Nordamerika.

*prolifera* Roxb., sprossende, ♂. Sch. w. Ostindien.

*Pseudochina* L., unächte S., ♂. Sch. k. Virgin., Jamaica.

*puber* Mchx., weichhaarige, ♂. Sch. k. Carolina, Georgia.



**Smilax**

*quadrangularis* Mühlbg., vierkantige, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

*sagittaeifolia* Lodd., pfeilblättrige, ♀. Sch. k. China.

*rotundifolia* L., rundblättrige, ♀. Sch. k. f. b. Nordamer.

*Roxburghiana* DC., Roxburgh's, ♀. Sch. w. Ostindien.

*rubens* Wats., röthliche, ♀. Sch. k. f. b. Nordamer.

*Sarsaparilla* L., Sassaparillen-S., ♀. Sch. k. Virginien.

*syphilitica* H. B. K., antisiphilitische, ♀. Sch. w. Südamer.

*tamnoides* L. (*tamniifolia* Mchx.), schmeerwurzähnliche, 4. Sch. f. Nordamerika.

*virginiana* Mill., virginische, ♀. Sch. k. Virginien.

*Walteri* Pursh, Walter's, ♀. Sch. k. Virginien, Carolina.

*Watsoni* Swt. (*longifolia* Wats.), Watson's, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

*zeylanica* L., ceylonische, ♀. Sch. w. Ostindien.

**Smithia** Ait. (J. E. Smith, berühmter englischer Botaniker), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*conferta* Sm., gedrängte, ☉. f. Neuholland.

*geminiflora* Roth, paarblumige, ☉. w. Ostindien.

*sensitiva* Ait., empfindsame, ☉. w. Ostindien.

**Smyrnium** T., Myrrhendolde, V. ii., Umbelliferae.

*apiifolium* L., sellerieblättrige, 4. f. b. k. Creta.

*cicutarium* MB., cicutaähnliche, 4. f. Caucasus.

*cordatum* Walt. (*trifoliatum* Bartr.), herzblättrige, 4. f. Nordamerika.

*Dodonaei* Spgl. (*perfoliatum* L., *ramosum* Urv.), Dodonaeus's, ♂. f. Spanien, Italien, Griechenland.

*integerrimum* L. (*Sison integ.* Spgl.), einfache, 4. f. Nordamerika.

*nudicaule* MB., nacktstängelige, 4. f. Caucasus.

*Olusatrum* L., schottische, ♂. f. England, Frankreich, Italien, Griechenland.

*perfoliatum* Mill. (*Dioscoridis* Spgl.), durchwachsene, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

*aureum* L. vid. *Zizia aurea*. *atropurpureum* Lam.

vid. *Cnidium atropurpureum*. *nodiflorum* All. vid.

*Trochiscanthes nodiflora*. *nudiflora* Pursh v. *Pastinaca nudicaulis*.

**Sobolewskia** MB. (Gregor Sobolewski, russischer Botaniker), XV. i., Cruciferae.

*lithophila* MB., steinliebende, ♂. f. Taurien, Mittelasien.

**Soja** Mch. (japanischer Name), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

*hispida* Mch., steifhaarige, ☉. Sch. w. Ostindien.

**Solandra** Sw. (Solander, englischer Botaniker), V. i., Solanaceae.

*grandiflora* Sw., großblumige, ♀. ♀. Sch. w. Jamaica.

*guttata* D. Don, betropfte, ♀. w. Mexico.

*nitida* Zucc., glänzende, ♀. ♀. Sch. w. Ostindien.

*oppositifolia* Hort., gegenblättrige, ♀. w. Ceylon.

*viridiflora* Ker, grünblumige, ♀. w. Brasilien.

**Solanum** T., Nachtschatten, V. i., Solanaceae.

*acetosaefolium* Lam. (*trilobatum* Burm.), sauerampferblättrige, ♀. w. Ostindien.

*aculeatissimum* Jacq., starkstacheliger, ♀. w. Südamer.

*aethiopicum* L. (*torulosum* Mch.), aethiopischer, ☉. f. Afrika, Südasien.

*aggregatum* Jacq. (*Atropa solanacea* L.), angehäufter, ♀. k. t. Westindien, Cap der guten Hoffnung.

## Solanum

- Anguivi Lam., madagascarischer, 4.  $\frac{1}{2}$ . Kn. w. Madagascar.  
 angulatum R. et P. (*quitense* Lam.), kantiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Peru.  
 appendiculatum H.B.K., Dun., anhängseliger,  $\frac{1}{2}$ . w. Mexico.  
 arboreum H.B.K., Dun., baumartiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Neugranada.  
 argenteum Dun., silberfarbiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.  
 armatum RB., bewaffneter,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Neuholland.  
 astroides Jacq., sternblumiger,  $\frac{1}{2}$ . w. ?  
 auriculatum Ait., geöhrt,  $\frac{1}{2}$ . w. Madagascar, Mascaren.  
 bahamense L., bahamischer,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Bahamische Inseln.  
 Balbisii Dun. (*decurrens* Balb., *viscosum* Lag., *inflatum* Hort., *brancaefolium* Jacq.), Balbis's,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamer.  
 Besseri Weinm., Besser's,  $\odot$ . f. Amerika.  
 betaceum Cav. (*crassifolium* Ortega.), dickblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.  
 bombense Jacq., bomba'scher,  $\frac{1}{2}$ . k. Mexico, Südamerika.  
 bonariense L., bonarischer,  $\frac{1}{2}$ . k. Buenos-Ayres.  
 brasiliense Dnn., brasilianischer,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.  
 Brownii Dun. (*violaceum* RB.), Brown's,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Neuholl.  
 calycinum Sess., großkelchiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Mexico.  
 campanulatum RB., glockiger,  $\odot$ . 4. f. m. k. Neuholland.  
 campechiense L. (*acanthifolium* Mill.), rothstacheliger,  $\frac{1}{2}$ . w. Neuspanien.  
 carolinense L., carolinischer,  $\odot$ . f. m. Carolina.  
 Cervantesii Lag., Cervantes's,  $\frac{1}{2}$ . k. t. Mexico.  
 cestrifolium Jacq., hammerstrauchblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. ?  
 chenopodioides Lam., gänsefußähnlicher,  $\odot$ . f. Chili.  
 ciliatum Lam. (*ciliare* W., *pentapetaloides* Hort.), gefranzter,  $\frac{1}{2}$ . w. ?  
 cinereum RB., aschfarbiger, 4.  $\frac{1}{2}$ . k. Neuholland.  
 coagulans Forsk., gerinnendmachender,  $\frac{1}{2}$ . t. w. Oberägypten, Arabien.  
 coccineum Jacq., scharlachfarbiger,  $\frac{1}{2}$ . w. Westindien.  
 congense Lk., Congo-N.,  $\frac{1}{2}$ . w. Congo.  
 corymbosum Jacq., doldentraubiger, 4.  $\frac{1}{2}$ . w. Peru.  
 crispum R. et P., krauser,  $\frac{1}{2}$ . k. Chili.  
 cuneifolium Dun., keilblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Hispaniola, Cayenne.  
 dealbatum Lindl., weißlicher,  $\frac{1}{2}$ . t. Chili.  
 Dillenii Schult. (*patulum* P.), Dillens,  $\odot$ . f. Ungarn.  
 diphyllum L., zweiblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Westindien.  
 diversifolium Bonpl., verschiedenblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Caracas.  
 Dulcamara L., Bittersüßs-N., 4.  $\frac{1}{2}$ . Sch. f. Europa.  
     b) fl. albo. c) fol. argenteo-variegat. d) fol. aureo-variegat.  
 elaeagnifolium Cav., oleasterblättriger,  $\frac{1}{2}$ . k. Chili.  
 elatum Lk. (*laurifolium* Hort.), hoher,  $\frac{1}{2}$ . w. ?  
 esculentum Dun. (*insanum* et *Melongena* L., ? *longum* Roxb.), genießbarer,  $\odot$ . f. m. Südasien und Afrika.  
 etuberosum Lindl., knollenloser, 4. f. b. Chili.  
 fastigiatum W., gipfelständiger,  $\frac{1}{2}$ . k. Mexico.  
 ferox L., kelchstacheliger, 4. w. Ostindien.  
 ferrugineum Jacq., rostfarbiger,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Südamerika.  
 flavescens Dun., gelblicher,  $\frac{1}{2}$ . w. Trinidad.  
 flavum Kit. (*ochroleucum* Dun.), gelbbeeriger,  $\odot$ . f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 fragrans Hook., wohlriechender,  $\frac{1}{2}$ . w. Brasilien.  
 fugax Jacq., vergänglichlicher,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.  
 fuscum L., braunstieler,  $\odot$ . f. m. Südamerika.  
 giganteum Jacq., riesenhafter,  $\frac{1}{2}$ . k. Cap der gut. H.  
 glutinosum Dun., klebriger,  $\frac{1}{2}$ . w. ?

## Solanum

- gracile Otto, schlanker,  $\text{f. t.}$  ? Südamerika.  
 guineense Lam., afrikanischer,  $\text{O. f.}$  Guinea.  
 havanense Jacq., Havanna-N.,  $\text{f. w.}$  Westindien, Südamer.  
 Herbertianum Paxt., Herbert's,  $\text{f. w.}$  ?  
 heterotrichum Dun., verschiedenhaariger,  $\text{f. w.}$  Südamer.  
 hirtum Vahl, haariger,  $\text{f. w.}$  Trinidad.  
 Hookerianum Spgl. (*coriaceum* Hook.), Hooker's,  $\text{f. t.}$   
 w. Mexico.  
 humile Bernh., niedriger,  $\text{O. f.}$  Mittel- und Südeuropa.  
 hybridum Jacq., Bastard-N.,  $\text{f. w.}$  Guinea.  
 Jacquinii W., Jacquin's,  $\text{O. f. m. w.}$  Ostindien.  
 jamaicense Sw., jamaicaischer,  $\text{f. w.}$  Jamaica.  
 igneum L. (*cuneatum* Mch.), feuerfarbiger,  $\text{f. w.}$  Westind.  
 incanum L. (*zeylanicum* Lam.), weißgrauer,  $\text{f. w.}$   
 Mascarenas, Ceylon.  
 indicum L., indischer,  $\text{f. w.}$  Ostindien, Mascarenas.  
 Kitaibelii Schult., Kitaibel's,  $\text{O. f.}$  Ungarn.  
 laciniatum Ait. (*pinnatifidum* Lam., *reclinatum* L'Her.,  
*aviculare* Forst), schlitzblättriger,  $\text{4. f. k.}$  Neuhol-  
 land, Neuzeeland.  
 b) herbaceum.  
 lanceaefolium Jacq., lanzettblättriger,  $\text{f. w.}$  Westind.  
 lanceolatum Cav. (*mexicanum* Sess.), lanzettlicher,  $\text{f.}$   
 k. Mexico.  
 laurifolium L., lorbeerblättriger,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
 lentum Cav., zäher,  $\text{f. Sch. w.}$  Südamerika.  
 Lichtensteinii W., Lichtenstein's,  $\text{f. Sch. k.}$  C. d. g. H.  
 ligustrinum Lodd., ligusterähnlicher,  $\text{f. k.}$  Chili.  
 litorale Lk., Seestrand-N.,  $\text{4. f. Sch. f.}$  Europa.  
 lividum W., schlagblauer,  $\text{f. w.}$  Madagascar.  
 longiflorum Vahl (*longifolium* Dun.), langblumiger,  $\text{f.}$   
 w. Guiana.  
 lycioides L. (*candicans* Dun.), bocksdornähnlicher,  $\text{4. f.}$   
 w. Peru.  
 macrocarpum L., großfrüchtiger,  $\text{f. w.}$  Südamerika.  
 mammosum L. (*villosissimum* Zuccag.), zitzenfrüchtiger,  
 $\text{O. m. f.}$  Carolina, Westindien.  
 marginatum L., berandeter,  $\text{f. k.}$  Südafrika.  
 melanoxylon Lk., schwarzholziger,  $\text{O. m. f. w.}$  ?  
 Milleri Jacq. (*capense* Spgl.), Miller's,  $\text{f. k.}$  C. d. g. H.  
 miniatum Bernh. (*alatum* Mch., *puniceum* Gmel.), men-  
 nigrother,  $\text{O. f.}$  Mittel- und Südeuropa.  
 molle Bonpl., weicher,  $\text{f. w.}$  Neugranada.  
 monanthum R. et S. (*uniflorum* Lag.), krummstiel-  
 blumiger,  $\text{4. w.}$  Neuspanien.  
 muricatum Ait. (*variegatum* R. et P., *scabrum* Lam.),  
 weichstacheliger,  $\text{f. w.}$  Peru, Chili.  
 myriacanthum Dun., tausendstacheliger,  $\text{f. w.}$  ?  
 myrtifolium Lodd., myrtenblättriger,  $\text{f. t.}$  ?  
 neglectum Dun., übersehener,  $\text{f. w.}$  Westindien, Südam.  
 nigrum L., gemeiner,  $\text{O. f.}$  Europa, Asien, Afrika etc.  
 nodiflorum Jacq., knotenblumiger,  $\text{f. w.}$  Westindien,  
 Mascarenas.  
 obtusifolium Bonpl., stumpfblättriger,  $\text{f. k. t.}$  Mexico.  
 ochroneuron Lk., braunwolliger,  $\text{f. w.}$  Brasilien.  
 $\beta$ ) macracanthum.  
 oleraceum Rich., Gemüse-N.,  $\text{O. f.}$  Südeuropa, Brasil.  
 oliganthum Lk., ? Humb. (*laurifolium* Hort.), wenig-  
 blumiger,  $\text{f. w.}$  Südamerika.



## Solanum

oporinum W. (*macrophyllum* Dun., *cymosum* Orteg.),  
netzartiger, ♀. k. t. Mexico.  
ovigerum Dun. (*Melongena* Murr.), eiertragender, ☉.  
m. f. Arabien.

a) violaceum. b) album. c) luteum. d) rubrum.  
pentadactylum G. Don, fünffingeriger, ♀. w. Trinidad.  
platanifolium Sims, platanusblättriger, ♀. w. Südamer.  
polyacanthum Lam. (*parviflorum* Cav.), vielstacheliger,  
♀. w. Westindien.

Pseudocapsicum L., beisbeerenartiger, ♀. k. Madeira.  
pteroaulon Dun. (*melanocerasum* W., *judaicum* Bess.),  
flügelstengeliger, ☉. f. England, Süd- u. Osteuropa etc.  
pubescens W., weichhaariger, ♀. w. Ostindien.  
pubigerum Dun., zarthaariger, ♀. k. t. Mexico.  
pungentium RB., stechender, ☉. m. f. Neuholland.  
pygmaeum Cav., zwergiger, ☉. f. Buenos-Ayres.  
pyracanthum Lam. (*Pyracantha* Sm., *runcinatum* Wendl.),  
feuerrothstacheliger, ♀. w. Madagascar.

## β) inerme.

quadrangulare Thbg., vierkantiger, ♀. k. Cap d. g. H.  
quercifolium L. (*runcinatum* R. et P.), eichenblättriger,  
♀. k. Peru, Chili.

racemiflorum Dun. (*scabrum* Jacq.), traubenblumiger,  
♂. w. Südamerika.

racemosum L., traubiger, ♀. w. Westindien.

radicans L. (*quercifolium* R. et P.), starkwurzelnder,  
4. k. t. Neugranada.

reticulatum Dun. (*crotonoides* Lam.), netzförmiger, ♀.  
w. Caribäen.

rigescens Jacq. (*humile* Lam.), starrer, ♀. k. Cap  
der guten Hoffnung.

rubiginosum Vahl, braunrother, ♀. w. Cayenne.

rubrum Mill., rothbeeriger, ☉. f. Südamerika.

sanctum L. (*incanum* Forsk.), heiliger, ♀. w. Pa-  
lästina, Aegypten.

saponaceum Dun., seifenartiger, ♀. k. t. Chili.

scandens L., klimmender, 4. ♀. Sch. w. Surinam.

Seaforthianum Andr., Seaforth's, ♀. Sch. w. Südamer.

sinuatum W., buchtiger, ☉. f. m. ?

sisymbriifolium Lam., raukenblättriger, ?☉. f. Bue-  
nos-Ayres.

sodomeum L. (*Hermanni* Lam.), Sodoms-N., ♀. k. Ca-  
labrien, Sicilien, Afrika.

spinosissimum Lodd., dorniger, ♀. w. ?

stellatum Jacq., sternförmiger, ♀. w. Südamerika.

stelligerum Sm. (*discolor* RB.), sterntragender, ♀. k.  
Neuholland.

stramonifolium Jacq., stechapfelblättriger, ♀. w. Süd-  
amerika, Ostafrika, Ostindien.

subarmatum W., schwachbewaffneter, ♀. w. ?

subinerme Jacq., fast unbewehrter, ♀. w. Westindien.

suffruticosum Schousb., halbstrauchiger, ♀. k. Nordafrika

tectum P., verdeckter, ♀. k. t. Mexico.

Tegore Aubl., Tegore-N., ♀. w. Guiana.

tomentosum L., filziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

torvum Sw. (*stramonifol.* Lam., *ficiifolium* Orteg.), häß-  
licher, ♀. k. t. Westindien.

triangulare Lam., dreikantiger, ☉. f. m. Ostindien.

trilobatum L., dreilappiger, ♀. w. Jamaika.

**Solanum**

triquetrum Cav., dreiseitiger, ♀. w. Neuspanien.

triste Jacq. (*oblongum* R. et P.), trauriger, ♀. w. Westindien, Südamerika.

Trongum Poir., moluckischer, ☉. m. f. w. Molucken.

tuberosum L., Kartoffel-N., 4. f. b. Chili.

β) Commersonii Poir.

Tweedianum Hook., Tweedie's, 4. ♀. k. t. Buenos-Ayres.

umbrosum Bonpl., schattenliebender, 4. ♀. w. Südamer.

undatum Lam., welliger, ♀. w. Mascarenas.

uniflorum Dun., einblumiger, ♀. w. Hispaniola.

verbascifolium L., königskerzenblättriger, ♀. k. t.

Westindien, Südamerika, Neuholland, Cochinchina.

vernucatum Lindl., Firnifs-N., ? ☉. ♀. f. k. Buenos-Ayres.

villosum Lam. (*hirsutum* et *Rumphii* Dun.), zottiger,

☉. f. Südeuropa, Asien, Afrika.

virgatum Lam., ruthenförmiger, 4. ♀. w. Westindien.

virginianum L., virginischer, ☉. f. Virginien.

viridiflorum R. et P., grünblumiger, ♀. k. t. Peru.

volubile Sw., windender, ♀. Sch. w. Westindien.

xanthocarpum Schrad., gelbfrüchtiger, ☉. f. m. Aethiopien.

Zuccagnianum Dun. (*obtusifolium* W., *Willdenowii* R.

et S.), Zuccagni's, ☉. f. ?

*heterandrum* Pursh (et *Vespertilio* Ait.) etc. vid.

*Nycterium heterandrum*, *cordifolium* etc. *Hum-*

*boldtii* W. (et *Lycopersicum* L.) etc. v. *Lycoper-*

*sicum* Humboldti, esculentum etc.

**Soldanella** T., Alpenglöckchen (Trottelblume), V. I.,  
Primulaceae.

alpina L. (*Clusii* Schm.), gemeines, 4. f. Mitteleuro-  
päische Alpen.

minima Hoppe, kleinstes, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

b) alba J. C.

montana W., Berg-A., 4. f. Salzburg, Oesterreich, Böhmen.

pusilla Baumg. (*Clusii* Gaud.), Zwerg-A., 4. f. Mittel-  
und osteuropäische Alpen.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *affinis* J. C.,  
*crenata* Penny.

**Soldevilla** Lag. (Soldevilla, ein Freund Lagasca's),  
XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

setosa Lagasc. (*Hispidella hispanica* Barnades), borstige,  
4. f. k. Spanien.

**Solea** Spgl., Ging. (W. Sole, englischer Botaniker), V.  
I., Violaceae.

concolor Ging. (*Hybanthus concolor* Spgl.), einfarbige,  
4. f. Nordamerika.

*stricta* Spgl. et *verticillata* Spgl. v. *Jonidium* Sprengel-  
gelium et *polygalaeifolium*.

**Solena** gracilis Rudg. et *longiflora* W. v. *Posoqueria* gra-  
cilis et *longiflora*.

**Solenandra** cordifolia Vent. v. *Galax* aphylla.

**Solenostemma** Hayne, Röhrenkrönchen, V. II.,  
Asclepiadeae.

Argel Hayne, ägyptisches, ♀. k. t. Oberägypten.

**Solidago** L., Goldrute, XIX. II., Compositae-Corym-  
biferae.

altissima L. (*rigidula* Bosc.), höchste, 4. f. Nordamer.

β) recurvata Mill. γ) virginiana Mill. δ) pi-  
losa Mill.

ambigua Ait., zweifelhafte, 4. f. ? Nordamerika.

**Solidago**

- angulata Mühlbg., kantige, 4. f. Nordamerika.  
 angustifolia Ell., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 anisata Lodd., anisduftende, 4. f. Nordamerika.  
 arguta Ait. (*argentea* Hornem.), spitzzahnige, 4. f. Nordamerika.  
 aspera Ait., rauhe, 4. f. Nordamerika.  
 asperata Pursh, rauhlättrige, 4. f. Nordamerika.  
 axillaris Pursh, achselblumige, 4. f. Nordamerika.  
 bicolor L. (*Aster b. N. E.*), zweifarbige, 4. f. Nordamer.  
 caesia Ait., blaustielige, 4. f. Nordamerika.  
 canadensis L., canadische, 4. f. Nordamerika.  
 carinata Schrad., kielförmige, 4. f. Nordamerika.  
 ciliaris Mühlbg. (*glabra* H. Par.), gefranzte, 4. f. Nordamerika.  
 Cleliae DC. (*dubia* Scop.), Clelia's, 4. f. ?  
 decurrens Lour., herablaufende, 4. f. China.  
 elata Pursh, aufgerichtete, 4. f. Nordamerika.  
 elliptica Ait. (*latissimifolia* Mill., *plantaginea* Dsf.), elliptische, 4. f. Nordamerika.  
 erecta Pursh, aufrechte, 4. f. Nordamerika.  
 flabelliformis Wendl. (*flabellata* Schrad.), fächerförmige, 4. f. ?  
 flexicaulis L. (*scrophulariaefolia* Mill.), gebogene, 4. f. Nordamerika.  
 fragrans W., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.  
 fuscata Dsf., bräunliche, 4. f. Nordamerika.  
 gigantea Ait., riesenhafte, 4. f. Nordamerika.  
 glabra Dsf., kahle, 4. f. Nordamerika.  
 glomerata Mchx., knaulförmige, 4. f. Nordamerika.  
      $\beta$ ) macrophylla Pursh.  
 gracilis Poir., schlanke, 4. f. Nordamerika.  
 graminifolia Ell. (*lanceolata* W.), grasblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 grandiflora Dsf., großblumige, 4. f. Nordamerika.  
 hirta W., kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.  
 hispida Mühlbg., steifhaarige, 4. f. Nordamerika.  
 humilis Dsf., niedrige, 4. f. Nordamerika.  
 integrifolia Dsf. (? *speciosa* Nutt.), ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 juncea Ait., simsenförmige, 4. f. Nordamerika.  
 laevigata Ait., glatte, 4. f. Nordamerika.  
 lateriflora L., seitenblumige, 4. f. Nordamerika.  
 latifolia L., breitblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 ? leucanthemifolia Loud., wucherblumenähnliche, 4. f. ?  
 lithospermifolia W., steinsamenblättrige, 4. f. Nordamer.  
 leiocarpa DC. (? *humilis* Pursh), glattsamige, 4. f. Nordamerika.  
 limonifolia P. (*mexicana* L., *obliqua* Mch.), ineernelkenblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 livida W., bleigraue, 4. f. Nordamerika.  
 longifolia Schrad., langblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 minuta L., kleine, 4. f. b. Pyrenäen.  
 mollis Bartl., weiche, 4. f. Nordamerika.  
 multiradiata Ait., vielstrahlige, 4. f. Nordamerika.  
 nemoralis Ait., Hain-G., 4. f. Nordamerika.  
 nepalensis D. Don (*Amphirhapis pubescens* DC.), nepalischer, 4. f. Nepal.  
 noveboracensis L., neuyorkische, 4. f. Nordamerika.  
 nutans Dsf., nickende, 4. f. Nordamerika.



**Solidago**

- odora Ait., riechende, 4. f. Nordamerika.  
 patula Mühlbg., abstehende, 4. f. Nordamerika.  
 pauciflosculosa Mchx. (*Bigelowia uniligulata* DC.), wenig-  
 blüthige, 4. f. Nordamerika.  
 petiolaris Ait., stielblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 polifolia Lodd., poleiblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 procera Ait., hohe, 4. f. Nordamerika.  
 puberula Nutt., feinhaarige, 4. f. Nordamerika.  
 pulverulenta Nutt. (*argentea* Lodd.), bestäubte, 4. f.  
 Nordamerika.

- pyramidata Pursh, pyramidale, 4. f. Nordamerika.  
 recurvata W., zurückgekrümmte, 4. f. Nordamerika.  
 reflexa Ait., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.  
 rigida L., starre, 4. f. Nordamerika.

β) *microcephala* DC. (*asperula* Hort.).

- rugosa Mill. (*altissima* Ait.), runzelige, 4. f. Nordamer.  
 scabra Mühlbg., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.  
 Schraderi DC. (*gracilis* Schrad.), Schrader's, 4. f.  
 Nordamerika.

- sempervirens L. (*noveboracensis* et *carnosa* Mill., *tardi-  
 flora* Mch.), immergrüne, 4. f. Nordamerika.

- serotina Ait., spätblumige, 4. f. Nordamerika.

- simplex H. B. K., einfache, 4. k. f. b. Mexico.

- squarrosa Mühlbg., Nutt., sparrige, 4. f. Nordamerika.

- stricta Ait., steife, 4. f. Nordamerika.

- tenuifolia Pursh, dünnblättrige, 4. f. Nordamerika.

- ulmifolia Mühlbg., ulmenblättrige, 4. f. Nordamerika.

- verrucosa Schrad., warzige, 4. f. Nordamerika.

- villosa Pursh (*Bosciana* Moret.), zottige, 4. f. Nordam.

- viminea Ait., gertenförmige, 4. f. Nordamerika.

- virgata Mchx., ruthenförmige, 4. f. Nordamerika.

- Virgaurea L., gemeine, 4. f. Europa, Nordasien.

β) *alpestris* WK. γ) *cambrica* Ait. δ) *litoralis*  
 Savi. ε) *arenaria* Hornem. ζ) *nudiflora* Viv.

*spuria* Forst. v. *Conyza rugosa*. *urticaefolia* Mill.

v. *Caleacte urticaefolia*. *viscosa* Schrad. v. *Psiadia  
 glutinosa*.

- Soliva** R. et P. (Salvator Soliva, ein spanischer Arzt  
 und Botaniker), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.  
*anthemifolia* RB., kamillenblättrige, ☉. f. Neuholland.  
*stolonifera* RB. (*lusitanica* Less.), sprossende, ☉. f.  
 Portugal.

- Sollya** Lindl. (Richard Horsman Solly, englischer Pflan-  
 zenphysiolog), V. i., Pittosporae.

- angustifolia* Lindl., schmalblättrige, ♀. Sch. t. Van-  
 Diemens-Land.

- heterophylla* Lindl., verschiedenblättrige, ♀. Sch. t.  
 Neuholland.

- Sommerauera quadrifida** Hoppe v. *Alsine aretioides*.

- Sonchus** Vaill., Gänsedistel, XIX. i., Compositae-  
 Cichoriaceae.

- abbreviatus* Lk., abgekürzte, ♀. k. Teneriffa.

- arvensis* L., Acker-G., 4. f. Europa, Nordamerika.

- asper* Fuchs (*fallax* Wallr.), rauhe, ☉. f. Europa,  
 Neuholland.

- chondrilloides* Dsf., chondrillähnliche, ♂. f. Sicilien,  
 Nordafrika.

- dentatus* Ledeb., gezahnte, 4. f. Sibirien.

- divaricatus* Hornem., ausgesperrte, ♂. ♀. k. ?

**Sonchus**

hyoserifolius Hornem., hyoserisblätterige,  $\text{f. k.}$  Madeira.  
Jacquini DC. (*fruticosus* Jacq., *congestus* W.), Jacquin's,  
 $\text{f. k.}$  Teneriffa.

lacerus W., schlitzbblätterige,  $\odot. f. ?$

laevigatus W., glatte,  $\text{f. k.}$  Canarische Inseln.

$\beta$ ) lyratus W.

longifolius Trevir., langblätterige,  $\odot. f. ?$

maritimus L., Meerstrands-G.,  $4. f.$  Südeuropa, Canarische Inseln.

$\beta$ ) aquatilis Pourr.  $\gamma$ ) litoralis Rchb.

palustris L., Sumpf-G.,  $4. f.$  Europa.

pinnatus Ait., gefiederte,  $\text{f. k.}$  Madeira.

radicatus Ait., langwurzelige,  $\text{f. k.}$  Madeira.

roseus Bess., rosafarbige,  $\text{f. f.}$  Podolien.

squarrosus DC. (*fruticosus* L. suppl.), sparrige,  $\text{f. k.}$  Madeira.

taraxacifolius W. (*goraeensis* Lam.), löwenzahnblätterige,  $\odot. f.$  Guinea, Westindien.

tenerrimus L., zarte,  $\odot. f.$  Südfrankreich.

uliginosus MB., Morast-G.,  $4. f.$  Caucasus, Sibirien.

*alpinus* L. (*coeruleus* Sm.) etc. v. *Mulgedium alpinum* etc. *caucasicus* Fisch. vid. ? *Mulgedium sibiricum*. *pallidus* W. v. *Lactuca canadensis*, *picroides* Lam. etc. v. *Picridium vulgare* etc.

**Sophora** L. (arabischer Name), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides L., fuchsschwanzähnliche,  $4. f.$  Caucasus, Kleinasien.

crassifolia J. S. Hill., dickblätterige,  $\text{f. w.}$  Guinea.

flavescens Ait., gelbliche,  $4. f.$  Sibirien.

galegoides Pall., galegaähnliche,  $4. f.$  Sibirien.

glauca Lesch., blaugrüne,  $\text{f. f. w.}$  Ostindien.

japonica L., japanische,  $\text{f. f.}$  Japan, China.

b) fol. variegatis. c) pendula. d) chinensis Lodd.

litoralis Schrad. (*arenicola* N. E.), Strand-S.,  $\text{f. w.}$  Brasilien.

macrocarpa Sm., großfrüchtige,  $\text{f. k.}$  Chili.

sericea Nutt., seidenhaarige,  $4. f.$  Nordamerika.

tomentosa L., filzige,  $\text{f. w.}$  Ost- und Westindien.

$\beta$ ) occidentalis L. (*havanensis* Jacq.).

velutina Lindl., sammethaarige,  $\text{f. k. t.}$  Nepal.

*alpina* Pall., *fabacea* Pall. et *lupinoides* Pall. vid.

*Thermopsis corgonensis* etc. *aurea* Ait. etc. vid.

*Virgilia aurea* etc. *buxifolia* Burm. (et *galioides*

Berg. etc.) vid. *Cyclopia latifolia*, *galioides* etc.

*sericea* J. S. Hil. (et *tetraptera* Ait.) v. *Edwardsia*

*nitida* et *grandiflora*.

**Sophronitis** Lindl., Zierstendel, XX. 1., Orchideae.

cernua Lindl., übergebogener,  $4. w.$  Brasilien.

grandiflora Lindl., großblumiger,  $4. w.$  Südamerika.

**Sorbus** T., Eberesche, XII. III., Rosaceae-Pomaceae.

1. *Adenorachis* DC. (*Aronia* P.).

arbutifolia \* (*Pyrus arb.* L. fil., *A. pyrifol.* P.), erdbeerbaumblätterige,  $\text{f. f. f.}$  Nordamerika.

$\beta$ ) intermedia (Lindl.).

*Chamaemespilus* Crtz., mispelähnliche,  $\text{f. f. f.}$  Mitteleuropäische Alpen.

depressa \* (*Pyrus d.* Lindl.), niedergedrückte,  $\text{f. f. f.}$  Nordamerika.

## Sorbus

*floribunda* \* (*Pyrus f.* Lindl.), blüthenreiche,  $\S$ .  $\S$ . f. Nordamerika.

*grandifolia* \* (*Pyrus g.* Lindl.), großblättrige,  $\S$ .  $\S$ . f. Nordamerika.

*melanocarpa* \* (*Pyrus m.* W.), schwarzfrüchtige,  $\S$ .  $\S$ . f. Nordamerika.

$\beta$ ) *subpubescens* (Lindl.).

*pubens* \* (*Pyrus p.* Lindl.), feinhaarige,  $\S$ . f. Nordam. II. Genuin.

*americana* W., amerikanische,  $\S$ . f. Canada.

*Aria* Crtz, Mehlbeer-E.,  $\S$ . f. Europa.

a) *obtusifolia* (DC.) (*ovalis* Hort.). b) *acutifolia* (DC.) (*Crataeg. longifolia* Duham.). c) *undulata* (Lindl.). d) *angustifolia* (Lindl.). e) *rugosa* (Lindl.). f) *cretica* (Lindl.) (*rotundifolia et graeca* Hort.). g) *bullata* (Lindl.) (*acuminata* Hort.).

*aucuparia* L., gemeine,  $\S$ . f. Europa, Asien.

b) *fructu luteo*. c) *fol. variegat.* d) *fastigiata*.

*auriculata* P., geöhrt,  $\S$ . f. Aegypten.

*domestica* L. (*Pyrus Sorbus* G.), Speierlings-E.,  $\S$ . f. Mittel- und Südeuropa.

b) *maliformis* Lodd. c) *pyriformis* Lodd.

*hybrida* L. (*Pyrus pinnatifida* Ehrh.), Bastard-E.,  $\S$ . f. England, Schweden, Mitteldeutschland.

b) *pendula* Lodd. c) *arbuscula* DC.

*latifolia* P. (*Crataegus dentata* Thuill.), breitblättrige,  $\S$ . f. Süddeutschland, Frankreich.

$\beta$ ) *edulis* (W.) (*Crataegus e.* Hort.).

*lanuginosa* Kit. (*hybrida lanuginosa* Hort.), wollige,  $\S$ . f. Ungarn.

*microcarpa* Pursh (*micrantha* Dum. C.), kleinfrüchtige,  $\S$ . f. Nordamerika.

*rivularis* \* (*Pyrus r.* Dougl.), Bach-E.,  $\S$ . f. Nordamer.

*scandiac* Fries. (*Pyrus intermedia* Ehrh.), schwedische,  $\S$ . f. Schweden.

*spuria* P. (*Pyrus hybrida* Mch., *Mespilus sorbifolia* Poir.), unächte,  $\S$ . f. Kamtschatka.

b) *sambucifolia* Hort. c) *pendula* Hort.

*torminalis* Crtz, Elzbeer-E.,  $\S$ . f. Deutschland.

*trilobata* \* (*Pyrus t.* DC., *Crataegus* La Bill.), dreilappige,  $\S$ . f. Libanon.

*vestita* Lodd. (Wall.) (*Pyrus nepalensis* Hort.), bekleidete,  $\S$ . f. b. Nepal.

**Sorghum** P. (indianischer Name), Durrgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

*avenaceum* P. B., haferähnliches,  $\odot$ . f. Cap d. g. H.

*bicolor* W., zweifarbiges,  $\odot$ . f. Persien, Ostindien.

*Caffrorum* R. et S. (*Arduini* Jacq.), Caffern-D.,  $\odot$ . f. Cap der guten Hoffnung.

*cernuum* W., übergebogenes,  $\odot$ . f. Ostindien.

*elongatum* R. et S., verlängertes,  $\mathcal{A}$ . k. Neuholland.

*halepense* P., aleppisches,  $\mathcal{A}$ . f. b. k. Südeuropa, Asien etc.

*nigrum* R. et S., schwarzes,  $\odot$ . f. ?

*rubens* W., röthliches,  $\odot$ . f. ?

*saccharatum* P., zuckerrohrähnliches,  $\odot$ . f. Ostind., Arab.

*vulgare* P., gemeines,  $\odot$ . f. Ostindien.

**Sorindeia** Thou. (?madagascarischer Name), II. I. (XXIII. II.), Terebinthaceae.



**Sorindeia**

madagascariensis Thou., madagascarisches, f. w. Madagasc.

**Sorocephalus** RB., Häufchenkopf, IV. 1., Proteaceae.  
diversifolius RB., verschiedenblättriger, f. t. Cap  
der guten Hoffnung.

imberbis RB., unbärtiger, f. t. Cap der gut. Hoffn.

imbricatus RB., ziegeldachblättriger, f. t. C. d. g. H.

lanatus RB., wolliger, f. t. Cap der guten Hoffnung.

setaceus RB., borstenblättriger, f. t. Cap der gut. H.

spatalloides RB., spatallähnlicher, f. t. Cap d. g. H.

tenuifolius RB., feinblättriger, f. t. Cap der gut. H.

**Soulangia** Brog. v. Phylica.

**Southwellia nobilis** Salisb. v. Sterculia nobilis.

**Soyeria montana** Monni. etc. v. Crepis montana etc.

**Sowerbaea** Sm. (J. Sowerby, berühmter englischer  
Blumenmaler), VI. 1., ? Xyrideae.

junceus Sm., simsensförmiger, 4. t. Neusüdwallis.

**Soja** Mch. (japanischer Name), XVII. 1v. (vi.), Legumi-  
nosae-Papilionaceae.

hispidus Mch., steifhaariger, ☉. Sch. w. Ostindien.

**Spananthe** Jacq., Magerdolde, V. 11., Umbelliferae.

paniculata Jacq., rispiger, ♂. w. Südamerika.

**Sparaxis** Ker, Schlitzschwertel, III. 1., Irideae.

anemonaeflora Ker, anemonenblumiger, 4. Zw. k. Cap  
der guten Hoffnung.

bicolor Ker, zweifarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

blanda Hort., Berol., lieblicher, 4. Zw. k. C. d. g. H.

bulbifera Ker, zwiebeltragender, 4. Zw. k. C. d. g. H.

fragrans Ker, wohlriechender, 4. Zw. k. C. d. g. H.

galeata Ker, helmiger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

grandiflora Ker, großblumiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) striata. c) Liliago.

Griffini Hort., Griffin's, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

lineata Swt., linirter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

pendula Ker, überhängender, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

stellaris D. Don, sternförmiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.

tricolor Ker, dreifarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

b) sanguineo-purpurea. c) violaceo-purpurea.

d) roseo-alba.

**Sparganium** T., Igelskopf, XXI. 111., Typhaceae.

alpinum D. Don, Alpen-J., 4. Wa. f. England.

natans L., schwimmender, 4. Wa. f. Mittel- und  
Nordeuropa.

simplex Huds. (erectum β. L.), einfacher, 4. Wa. f.  
Europa, Nordamerika.

ramosum Huds. (erectum L.), ästiger, 4. Wa. f. Eu-  
ropa, Sibirien, Nordamerika.

**Sparganophorus** Vaill., G., Spargträger, XIX. 1.,  
Compositae-Eupatorineae.

Struchium Sw., westindischer, ☉. m. f. Jamaica.

Vaillantii G., Vaillant's, ☉. m. f. Westindien.

verticillatus Mchx., wirtelblättriger, ☉. f. Carolina.

**Sparmannia** Thbg. (A. Sparrmann, ein Schwede, wel-  
cher das Vorgebirge der guten Hoffnung bereiste),  
XIII. 1., Tiliaceae.

africana Thbg., afrikanische, f. t. k. Cap der gut. H.

palmata H. Berol., handförmiger, f. t. k. Cap d. g. H.

**Spartianthus junceus** Lk. v. Spartium junceum.

**Spartina** Schreb. (Limnetis P.), Ginstergras, III. 1.,  
Gramineae.

**Spartina**

- alterniflora Lois., wechselblumiges, 4. f. Frankreich.  
 cynosuroides Roth, cynosurusähnliches, 4. f. Nordamer.  
 geniculata P. B., geknietes, 4. w. Java.  
 juncea Mühlbg., simsensförmiges, 4. f. Nordamerika.  
 patens Mühlbg., abstehendes, 4. f. Nordamerika.  
 polystachya Mühlbg., vielähriges, 4. f. Nordamerika.  
 pumila Roth, kleines, 4. f. Nordamerika.  
 stricta Roth, steifes, 4. f. Süd- und Westeuropa.

**Spartium** L., Pfriemen, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.),  
Leguminosae-Papilionaceae.

- junceum L., simsensförmiger, 5. k. f. b. Südeuropa.  
 b) flore pleno.

odoratissimum D. Don (? *acutifolium* Lindl.), wohl-  
 riechender, 5. k. f. b. Türkei, Persien.

*complicatum* Gouan et Lois. v. *Adenocarpus telo-*  
*nensis* et *parvifolius*. *multiflorum* Ait. et *nubige-*  
*num* Ait. v. *Cytisus albus* et *nubigenus*. *scoparium*  
 L. v. *Sarothamnus scoparius* Nachtr. Hinsichtlich  
 der übrigen s. Genista.

**Spartothamnus** Cunn., Pfriemenstrauch, XIV. II.,  
Globulariaceae-Myoporineae.

- junceus Cunn., simsensförmiger, 5. t. Neuholland.

**Spatalanthus** Swt., Zartschwertel, XIV. I., Irideae.

- speciosus Swt., prächtiger, 4. k. t. Cap d. gut. H.

**Spatalla** RB., Salish., Spatalle, IV. I., Proteaceae.

- bracteata RB., deckblättrige, 5. t. Cap der gut. H.  
 brevifolia RB., kurzblättrige, 5. t. Cap der gut. H.  
 caudata RB., geschweifte, 5. t. Cap der gut. Hoffn.  
 incurva RB., einwärtsgekrümmte, 5. t. Cap d. g. H.  
 mollis RB., weiche, 5. t. Cap der guten Hoffnung.  
 nivea RB., schneeweiße, 5. t. Cap der guten Hoffn.  
 pedunculata RB., stielährige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.  
 prolifera RB., sprossende, 5. t. Cap der gut. Hoffn.  
 pyramidalis RB., pyramidale, 5. t. Cap der gut. H.  
 ramulosa RB., ästige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.  
 sericea RB., seidenhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.  
 Thunbergii RB., Thunberg's, 5. t. Cap der gut. H.

**Spathelia** L., Spathelie, V. III., Terebinthaceae.

- simplex L., einfache, 5. w. Jamaica.

**Spathodea** P. B., Scheidenbignonie, XIV. II., Perso-  
natae-Bignoniaceae.

- corymbosa Vent., traubendoldige, 5. w. Trinidad.  
 fraxinifolia H. B. K., eschenblättrige, 5. Sch. w. Caracas.  
 laevis P. B., glatte, 5. w. Guinea.  
 longiflora Vent., langblumige, 5. w. Ostindien.  
 pentandra Hook., fünfinännige, 5. w. Ostindien.  
 Rheedii Spgl., Rheede's, 5. w. Ostindien.  
 Roxburghii Spgl., Roxburgh's, 5. w. Ostindien.  
 uncata Spgl., hackige, 5. Sch. w. Westindien.

**Specklinia** Lindl. (Specklin, ein Deutscher, berühmt  
als Xylograph), XX. I., Orchideae.

- atropurpurea Lindl., schwarzpurpurrothe, 4. w. Jamaica.  
 ciliaris Lindl., gefranzte, 4. w. Mexico.  
 elegans Lindl., zierliche, 4. w. Südamerika.  
 orbicularis Lindl., kreisförmige, 4. w. Demerara.  
 retusa Lindl., abgestutzte, 4. w. Mexico.

**Specularia** Heist., Venusspiegel, V. I., Campanulaceae.

- biflora Fisch. et Mey., zweiblumiger, 6. f. Californien.  
 falcata A. DC., sichelförmiger, 6. f. Südeuropa.



**Specularia**

hybrida A. DC. (*Prismatocarpus confertus* Mch.), Bastard-K., ☉. f. Mittel- und Osteuropa.

pentagona A. DC., fünfkantiger, ☉. f. Creta, Syrien.

perfoliata A. DC., durchwachsener, ☉. f. Nord- und Südamerika.

Speculum A. DC., gemeiner, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Taurien.

b) flore albo. β) calycina A. DC. γ) pubescens A. DC. (*Campanula hirta* R. et S.).

**Spergula** L., Spark, X. iv., Portulacaceae-Paronychieae, ? Caryophyllaceae.

**I. Genuina.**

arvensis L., Acker-S., ☉. f. Europa, Nord- u. Südamer.

a) sativa v. Bönningh. β) vulgaris v. Bönn. γ)

maxima Weihe.

pentandra L., fünfmänniger, ☉. f. Europa.

**II. Spergella Rchb.**

glabra W. (*sagmoides* All.), kahler, 4. f. Cottische Alpen.

laricina L., lärchenblättriger, 4. f. Sibirien.

nodosa L., knotiger, 4. f. Europa.

β) glandulosa Bess.

pallida Salisb., bleicher, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

sagmoides L., saginaähnlicher, 4. f. Mittel- und nord-europäische Alpen, Sibirien, Carolina.

subulata Sw., pfriemenblättriger, 4. f. Nordeuropa, Deutschland.

**Spergulastrum** Mchx., Sparklein, X. iii., Caryophyllaceae-Alsineae.

lanuginosum Mchx., wolliges, 4. f. Nordamerika.

**Spermacoe** Dill., Zahnwirbel, IV. i., Rubiaceae.

aspera Aubl., rauher, ☉. w. m. f. Westindien.

Fischeri Lk. (*adscendens* Fisch.), Fischer's, ☉. w. m. f. Jamaica.

glabra Mchx., kahler, ☉. f. Nordamerika.

hirta L., kurzhaariger, ☉. f. m. Westindien.

hispida L., steifhaariger, ☉. w. m. f. Ceylon.

laevis Lam., glatter, ☉. w. m. f. Antillen.

lanceolata Lk., lanzettblättriger, ☉. w. m. f. Jamaica.

latifolia Aubl., breitblättriger, ♂. w. Guiana.

linifolia Vahl, flachsblättriger, ☉. w. m. f. Cayenne.

mucronata N. E., weichstacheliger, 4. w. Südamerika.

radicans Aubl., starkwurzelnder, 4. w. Guiana.

Roxburghii W. A. (*laevis* Roxb.), Roxburgh's, ♂. w. Ostind.

scabra W., scharfer, ☉. w. m. f. Coromandel.

suffruticosa Jacq., halbstrauchiger, ♂. w. ?

tenuior L., dünnerer, ☉. m. f. Westindien, Carolina.

villosa Sw., zottiger, ☉. m. f. Westindien.

biflora Hort. v. Hedyotis biflora. *sumatrensis* Retz

etc. v. *Knoxia corymbosa* etc. *rubra* Jacq. (*strigosa*

Sims, *longiflora* Humb.) etc. v. *Crusea rubra* etc.

*verticillata* Hort. et L. etc. v. *Bigelovia commutata*,

*verticillata* etc.

**Spermadictyon** Roxb., Netzsame, V. i., Rubiaceae.

azureum Lindl., azurblauer, ♂. w. Nepal.

suaveolens Roxb., wohlriechender, ♂. w. Ostindien.

**Spermaxyrum** La Bill., Spitzsame, III. i., Sapotaceae-Olacineae.

strictum DC., steifer, ♂. t. Neuholland.

**Sphacele** Benth., Ziestsalbei, XIV. i., Labiatae.



**Sphacele**

campanulata Benth., glockenblumige,  $\frac{1}{2}$  t. Chili.

Lindleyi Benth., Lindley's,  $\frac{1}{2}$  t. Chili.

**Sphaeralcea angustifolia** S. Hil. v. *Malva angustifolia*.

**Sphaeranthus** L., Klumpenblümchen, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

africanus L., afrikanisches,  $\odot$  f. m. Cap der gut. H.

hirtus W., haariges,  $\frac{1}{2}$  w. Manila.

indicus L., indisches,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien, Aegypten.

**Sphaerolobium** Sm., Kugelfüßchen, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

medium RB., mittleres,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

vineum Sm. (*minus* La Bill.), gertenartiges,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Sphaerophysa** DC., Kugelhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

caspica DC., caspische,  $\frac{1}{2}$  f. Gegend d. caspisch. Meeres.

**Sphaerostemma** Blume, Kugelfädler, XXII. xiii. (XVI. iv.), Anonaceae.

propinquum Blum., verwandter,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Nepal.

**Sphaerostigma** Sering., Kugelnärbchen, VIII. i., Onagrariae.

Chamissonis Fisch. et Mey., Chamisso's,  $\odot$  f. Chili.

cheiranthifolium Fisch. et Mey., lackblättriges,  $\odot$  f. Chili.

$\beta$ ) viridescens Hook.

hirtum Fisch. et Mey., kurzhaariges,  $\odot$  f. Californien.

minimum \*, kleinstes,  $\odot$  f. Nordamerika.

minutiflorum Fisch. et Mey., kleinblumiges,  $\odot$  f. Chili.

spirale Fisch. et Mey., spiralförmiges,  $\odot$  f. Chili.

strigulosum Fisch. et Mey., striegeliges,  $\odot$  f. Neucaliforn.

**Sphenodesma** Jack, Schlingblume, V. i., Verbenaceae.

pentandra Jack, fünfmännige,  $\frac{1}{2}$  Sch. w. Ostindien.

**Sphenogyne** RB., Schleudernarbe, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.

abrotanifolia RB., stabwurzblättrige,  $\frac{1}{2}$  k. C. d. g. H.

anthemoides RB., kamillenähnliche,  $\odot$  f. C. d. g. H.

crithmifolia RB., meerfenchelblättrige,  $\frac{1}{2}$  k. C. d. g. H.

dentata RB., gezahnte,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der guten Hoffnung.

foeniculacea Swt., fenchelähnliche,  $\odot$  f. Cap d. g. H.

odorata RB., riechende,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der guten Hoffn.

pilifera Ker, haartragende,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der gut. Hoffn.

scariosa RB., trockenhäutige,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der gut. H.

speciosa Maund, schöne,  $\odot$  f. Südamerika.

*leucanthemoides* RB. v. *Arctotis leucanthemoides*.

**Sphenopus** Trin. v. *Sclerochloa*.

**Sphenotoma** Swt., Schleuderstrauch, V. i., Epacrideae.

capitatum Lindl. (*Dracophyll* cap. p. 275), kopfförmiger,  $\frac{1}{2}$  t. Neusüdwallis.

gracile Swt., schlanker,  $\frac{1}{2}$  t. Neuholland.

**Spielmannia** Medik. (J. R. Spielmann, Professor der Medicin zu Straßburg), XIV. ii., Verbenaceae.

africana W., afrikanische,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der gut. Hoffn.

**Spigelia** L. (A. Spigel, Professor der Anatomie zu Padua), V. i., Contortae-Gentianeae.

Anthelmia L., wurmtreibende,  $\odot$  w. Westindien.

marylandica L., maryländische,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Nordamer.

**Spilanthes** Jcq., Fleckblume, XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

Acmella L., wahre,  $\odot$  m. f. Ostindien.

alba L'Her. (*Salivaria* Murr.), weiße,  $\odot$  m. f. Peru.

**Spilanthes**

- debilis* H. B. K., schwache, ☉. m. f. Südamerika.  
*exasperata* Jacq., rauhe, ♂. w. Caracas.  
*oleracea* L., Gemüse-F., ☉. m. f. Ostindien, Mascarenas.  
*Pseudacmella* L., unächte, ☉. m. f. Ostindien.  
*uliginosa* Sw. (*Jägeria ulig.* Spgl.), Sumpf-F., ☉. m. f. Jamaica.

*arborescens* Forst. v. *Petrobium arborescens*. *crocatus* Sims v. *Platypteris crocata*. *repens* Mchx. v. *Ac-mella repens*.

**Spinacia** T., Spinat, XXII. v., Aizoideae-Atripliceae.

*oleracea* L., Gemüse-S., ☉. f. Arabien, Spanien.

a) *inermis* Mch. (*glabra* Mill.). β) *spinosa* Mch.

**Spiraea** T., Spierstaude, XII. II, Rosaceae-Spiraeaceae.

*acutifolia* W. (*sibirica* Hort., *ambigua* Pall.), spitzblät-  
 terige, ♀. f. Sibirien.

*alpina* Pall., Alpen-S., ♀. f. Ostsibirien.

*ariaefolia* Sm., mehlbeerbaumblätterige, ♀. f. b. Nordam.

*Aruncus* L., Geisbart-S., 4. f. Mitteleuropa, Nord-  
 asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. β) *americana* Mchx.

*barbata* Wall., bärtige, 4. k. f. b. Nepal.

*bella* Sims, hübsche, ♀. f. b. Nepal.

*betulifolia* Pall., birkenblätterige, ♀. f. Sibirien.

*cana* W. K., graue, ♀. f. Croatien.

*capitata* Pursh (*opulifolia* var. Hook.), kopfblumige, ♀. f.  
 Westliches Nordamerika.

*ceanothifolia* Hornem., ceanothusblätterige, ♀. f. ?

*chamaedryfolia* L., gamanderblätterige, ♀. f. Ungarn,  
 Sibirien, Nordamerika.

a) *vulgaris* Cambd. β) *media* Pursh. γ) *ob-  
 longifolia* W. K. δ) *subracemosa* Sering. ε)  
*incisa* Hort.

*corymbosa* Rafn., traubendoldige, ♀. f. Nordamerika.

β) *sororia* Penny.

*crataegifolia* Lk., weifsdornblätterige, ♀. f. ?

*crenata* L., gekerbte, ♀. f. Ungarn, Podolien, Sibirien.

β) *obovata* W. K. γ) *savranica* Bess. δ) *Besse-  
 riana* Sering.

*decumbens* K. (*flexuosa* Rchb.), niederliegende, ♀. f. Friaul.

*digitata* W. (*palmata* Pall.), fingerförmige, 4. f. Sibirien.

*Filipendula* L., knollige, 4. Kn. f. Europa.

b) *flore pleno*.

*flexuosa* Fisch. (*alpina* Hort.), gebogene, ♀. f. Sibirien.

*hypericifolia* L., johanniskrautblätterige, ♀. f. Ural, Canada.

a) *uralensis* Sering. β) *Pluknetiana* Sering.

*japonica* Siebold, japanische, 4. ♀. f. b. k. Japan.

*laevigata* L. (*altaica* Pall.), glatte, ♀. f. Sibirien.

*lanceolata* Poir., lanzettblätterige, ♀. w. Mascarenas.

*lobata* Jacq., gelappte, ♀. f. Virginien, Carolina.

*monogyna* Torrey, einweibige, ♀. f. Nordamerika.

*nepalensis* Lodd., nepal'sche, ♀. f. b. Nepal.

*nutans* Royle (*argentea* Loud.), nickende, ♀. f. b. Nepal.

*opulifolia* L., schneeballblätterige, ♀. f. Nordamerika.

β) *tomentella* Sering.

*palmata* Thbg., L. suppl., handförmige, 4. f. Japan.

*picoviensis* Bess., picovische, ♀. f. Podolien.

*salicifolia* L., weidenblätterige, ♀. f. Mittel- und Süd-  
 europa, Sibirien, Nordamerika.

a) *carnea* Ait. β) *alpestris* Pall. γ) *paniculata*

## Spiraea

Ait. (*alba* Ehrh.). δ) *carpinifolia* W. (*obovata* Rafin.). ε) *grandiflora* Swt.

*sorbifolia* L., ebereschenblättrige, ♀. f. Sibirien, Nordamerika.

β) *alpina* Pall. (*grandiflora* Loud., *Pallasii* G. Don). *thalictroides* L. (*aquilegaefolia* Pall.), wiesenrautenblättrige, ♀. f. Sibirien.

*tobolskia* Lodd., tobolskische, ♀. f. Sibirien.

*tomentosa* L., filzige, ♀. f. Nordamerika.

*triloba* L., dreilappige, ♀. f. Sibirien.

*Ulmaria* L., Sumpf-S., 4. f. Europa.

b) *flore pleno*. β) *denudata* Presl.

*ulmifolia* Scop. (*chamaedryfolia* Jacq.), ulmenblättrige, ♀. f. Krain, Friaul.

β) *phyllantha* Sering.

*vaccinifolia* D. Don, heidelbeerblättrige, ♀. f. b. k. Nepal.

*trifoliata* L. etc. v. *Gillenia trifoliata* etc.

*Spiralepis* D. Don v. *Leontonix*.

*Spiranthera* A. St. Hil., Spiralbeutel, V. I., *Tricoccae-Rutaceae*.

*odoratissima* A. St. Hil., wohlriechendster, ♀. w. Brasilien.

**Spiranthes** Rich., Wendelähre, XX. II., *Orchideae*.

*aestivalis* Rich., Sommer-W., 4. Kn. f. Südeuropa.

*amoena* MB. (*congesta* Lindl.), liebliche, 4. Kn. k.

Ostsibirien, China, Nepal.

*australis* Lindl., neuholländische, 4. w. Neuholland.

*autumnalis* Rich., herbstliche, 4. Kn. f. Europa.

*bicolor* Lindl., zweifarbige, 4. w. Caribäen.

*bracteosa* Lindl., deckblättrige, 4. w. Brasilien.

*cernua* Rich., übergebogene, 4. Kn. f. b. Nordamerika.

*diuretica* Lindl., harntreibende, 4. w. Chili.

*elata* Lindl., hohe, 4. w. Westindien.

*picta* Lindl., bemalte, 4. w. Trinidad.

*plantaginea* Spgl., wegetrittähnliche, 4. k. w. Nepal.

*pudica* Lindl., schamhafte, 4. Kn. k. w. China, Nepal, Dahurien.

*tortilis* Rich., gedrehte, 4. w. Westindien, Nordamerika.

**Spondias** L., Mombinpflaume, X. IV., *Terebinthaceae*.

*dulcis* Forst. (*cytherea* Sonne.), süsse, ♀. w. Mascarenas.

*mangifera* W. (*amara* Lam., *Amra* Hamilt.), bittere, ♀. w. Ostindien.

Mombin L. (*purpurea* L.), purpurfarbige, ♀. w. Westind.

*Myrobalanus* L. (*lutea* L., Mombin Jacq.), gelbe, ♀. w. Westindien.

*axillaris* H. Beng. v. *Buchanania angustifolia*.

*Spongostemma atropurpurea* Rchb. etc. vid. *Scabiosa atropurpurea* etc.

**Sporobolus** RB., Straufshalm, III. II., *Gramineae*.

I. *Phippsia* RB.

*algidus* Lk., kalter, 4. f. Grönland, Melville Insel etc.

II. *Vilfa* Trin. Adans.

*coromandelianus* Lk., Kunth., coromandelischer, ♂. 4. w. Ostindien, Arabien.

*diandrus* P. B., zweimänniger, ♂. m. f. Ostindien.

*indicus* RB., indischer, ♂. f. Westindien, Nordamerika, Neuholland.

*minutiflorus* Lk. (*Panicum tenuissimum* Schrk., *Agrosticula muralis* Radd., *V. tenuiflora* Trin.), kleinblumiger, 4. w. ? Brasilien.



**Sporobolus**

*minutus* Lk., kleinster, ☉. w. ?

*pungens* Trin. (Schreb.), stechender, 4. f. Süd- und Westeuropa.

*tenacissimus* P. B., zäher, 4. w. Westindien, Südamer.

*virginicus* Trin., virginischer, 4. f. Nordamerika.

*Sprekelia formosissima* Herb. v. *Amaryllis formosissima*.

**Sprengelia** Sm. (C. C. Sprengel, ehemaliger Rector zu Spandau, Curt Sprengel, Professor der Botanik zu Halle, einer der ausgezeichnetsten Gelehrten), V. 1., Epacrideae.

*incarnata* Sm., fleischfarbige, ♀. t. Neusüdwallis.

**Staavia** Thbg. (Martin Staav, ein Correspondent des Linné), V. 1., Corniculatae-Bruniaceae.

*ciliata* Brogn., gefranzte, ♀. t. k. Cap der gut. Hoffn.

*glutinosa* Thbg., klebrige, ♀. t. k. Cap d. gut. Hoffn.

*radiata* Thbg., strahlige, ♀. t. k. Cap der gut. Hoffn.

**Stachys** L., Ziest (Rosspolei), XIV. 1., Labiatae.

*aethiopica* L., aethiopischer, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

*albicaulis* Lindl., weisstengeliger, 4. k. Chili.

*alpina* L., Alpen-Z., 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

*ambigua* Sm., zweifelhafter, 4. f. Schottland, Deutschl.

*angustifolia* MB. (*tenuifolia* Pall.), schmalblättriger, 4. f. Taurien.

*annua* L., jähriger, ☉. f. Europa.

*arabica* Hornem., arabischer, ☉. f. Arabien.

*arenaria* Vahl, Sand-Z., 4. f. Calabrien, Nordafrika, Kleinasien.

*arvensis* L., Acker-Z., ☉. f. Europa.

*aspera* Mchx. (*arvensis* Walt.), rauher, 4. f. Nordam.

*betonicaefolia* Dsf., betonienblättriger, 4. f. k. Creta.

*circinata* L'Her. (*velutina* W., *canariensis* Jacq.), kreiselförmiger, 4. k. Nordafrika, Spanien.

*coccinea* Jacq., scharlachfarbiger, 4. ♀. k. t. Mexico.

*corsica* P., corsischer, 4. f. b. Corsica.

b) *alba*.

*cretica* L. (*dasyantha* Raf.), cretischer, 4. f. Sicilien, Creta.

*debilis* H. B. K., schwacher, 4. k. Quito.

*decumbens* Dsf. (*pubescens* Tenor.), niederliegender, 4. ♀. k. f. Neapel.

*diffusa* Schwaeg. (*arenaria* Sims), weitschweifiger, 4. f. Südeuropa.

*fruticulosa* MB., strauchiger, 4. ♀. f. Caucasus.

*germanica* L. (*biennis* Roth), deutscher, ♂. f. Europa.

β) *pubescens* Lindl.

*glaucescens* Muss., blaugrünlicher, 4. f. Caucasus.

*glutinosa* L., klebriger, ♀. k. Creta, Corsica.

*grandidentata* Lindl., grofszähniger, 4. k. Chili.

*heraclea* All. (*phlomoides* W., *intermedia* Tenor.), italienischer, 4. f. Italien, Südfrankreich.

*hirsuta* H. B. K., rauhhaariger, 4. k. Mexico.

*hirta* L., kurzhaariger, 4. f. Süd- und Westeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

β) *inscripta* Rchb.

*hispida* Pursh, steifhaariger, 4. f. Nordamerika.

*hyssopifolia* Mchx., yso-plättriger, 4. f. Nordamerika.

*iberica* MB., iberischer, 4. f. Caucasus.

*inflata* Benth., aufgeblasener, 4. f. Nordafrika.

*intermedia* Ait., mittlerer, 4. f. Sibirien.

**Stachys**

*lanata* Jacq., wolliger, 4. f. Taurien, Griechenland, Kleinasien.

*latifolia* Ait., breitblättriger, 4. f. ?

*lusitanica* Swt., portugiesischer, 4. f. Portugal.

*maritima* L., Meerstrands-Z., 4. f. Südeuropa.

*mollissima* W., weicher, 4. f. k. Ionische Inseln.

*nepetaefolia* Dsf., katzenmünzenblättriger, 4. f. Kleinasien.

*obliqua* W. K., schiefblättriger, 4. f. Croatien.

*orientalis* L., morgenländischer, 4. k. f. b. Palästina, Kleinasien.

*palaestina* L., palästinischer, 4. k. Griechenland, Syrien.

*palustris* L., sumpfliebender, 4. f. Europa.

b) *alba*. c) *variegata*. β) *austriaca* \*.

*polystachya* Tenor., vielähriger, ♂. 4. f. Neapel.

*recta* L. (*St. Sideritis* Vill., *bufonia* Thuill.), weißgelber, 4. f. Europa.

*rugosa* Ait., runzeliger, 4. k. Cap der guten Hoffn.

*salviaefolia* Tenor., salbeiblättriger, 4. f. Italien, Istrien.

*scordifolia* W., scordiumblättriger, 4. f. ? Nordamer.

*scordioides* Poir., scordiumähnlicher, 4. k. Nordafrika.

*sericea* Swt., seidenhaariger, 4. f. k. Nepal.

*setifera* C. A. Mey., borstentragender, 4. f. Caucasus.

*sibirica* Lk., sibirischer, 4. f. Sibirien.

*spinosa* L., dorniger, 4. k. Creta.

*spinulosa* Sm., stechender, ♂. 4. f. Creta, Istrien.

*stenophylla* Spgl., schmalblättriger, 4. 4. f. Südspan.

*sylvatica* L., Wald-Z., 4. f. Europa.

*Foeniculum* Pursh v. *Lophanthus anisatus*. *lavan-*

*dulaefolia* Vahl vid. *Zietenia orientalis*. *Salviae*

Lindl. v. *Sphacele* Lindleyi.

**Stachytarpheta** Vahl, Dichtähre, II, 1., Verbenaceae.

*angustifolia* Vahl, schmalblättrige, ♂. w. Südamerika.

*cayennensis* Vahl, cayennische, 4. w. Südamerika.

*hirsutissima* Lk., starkhaarige, 4. w. Brasilien.

*jamaicensis* Vahl, jamaikaische, ♂. w. Westind., Südamer.

*indica* Vahl, indische, ♂. w. Ceylon, Guinea.

*marginata* Vahl, berandete, ♂. w. Westindien.

*mutabilis* Vahl, veränderliche, 4. w. Caracas.

*orubica* Vahl, orubische, ♂. w. Neu-Granada.

*prismatica* Vahl, prismatische. ♂. w. Südamerika.

*umbrosa* H. B. K. (*urticaefolia* Sims), schattenliebende, ♂. w. Südamerika.

**Stackhousia** Sm. (John Stackhouse, englischer Botaniker), V. III., Tricoccae-Stackhouseae.

*linariifolia* Cunn., gleichbreitblättrige, 4. t. k. Neuholl.

*monogyna* La Bill., einweibige, 4. t. k. Nördl. Neuholl.

**Stadmannia** Lam. (Stadmann, Botaniker und Reisender), VIII. 1., Sapindaceae.

*australis* RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

**Staehelina** L. (Benedict Staehelin, ein schweizer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

*arborescens* L., baumartige, 4. k. Creta, Südfrankreich.

*dubia* L., zweifelhafte, 4. k. Südeuropa.

*Chamaepeuce* L. v. *Chamaepeuce mutica*. *gnapha-*

*lodes* L. v. *Helipterum gnaphal.*

**Stanhopea** Hook. (Graf Stanhope, Präsident der medicin. botan. Gesellschaft in London), XX. 1., Orchideae.

*Cavendishii* Lindl., Cavendish's, 4. w. Peru.

*eburnea* Lindl., elfenbeinweißse, 4. w. Brasilien.

**Stanhopea**

*grandiflora* Lindl., großblumige, 4. w. Trinidad.

*insignis* Hook., ausgezeichnete, 4. w. Trinidad.

*Lindleyi* Zuccar., Lindley's, 4. w. Mexico.

*oculata* Lindl., geäugelte, 4. w. Mexico.

*quadricornis* Lindl., vierhörnige, 4. w. Südamerika.

*tigrina* Batem., getigerte, 4. w. Mexico.

**Stanleya** Nutt. (Lord Stanley, Vicepräsident der Linnéischen Gesellschaft zu London), XV. III., Cruciferae.  
*pinnatifida* Nutt., fiederspaltige, 4. k. Louisiana.

**Stapelia** L. (J. B. van Stapel, holländischer Gelehrter), V. II., Asclepiadeae.

**I. Caruncularia** Haw.

*pedunculata* Mass., langstielige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

**II. Duvalia** Haw.

*caespitosa* Mass., rasenartige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*compacta* Haw., dichte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*elegans* Mass., zierliche, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*glomerata* Haw., knaulförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*hirtella* Jacq., feinhaarige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*Jacquiniiana* R. et S. (*radiata* Jacq.), Jacquin's, 4. f. t.

w. Cap der guten Hoffnung.

*laevigata* Haw., glatte, 4. f. t. w. Cap der guten H.

*mastodes* Jacq., breitwarzige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*radiata* Sims, strahlige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*reclinata* Mass., rückwärtsgeneigte, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

*replicata* Jacq., umgeschlagene, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*tuberculata* Haw., höckerige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

**III. Genuina.**

*acuminata* Mass., zugespitzte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*ambigua* Mass., zweifelhafte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*aperta* Mass., offene, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*arida* Mass., dürre, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

*Asterias* Mass., sternförmige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*brevirostris* W., kurzschnabelige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*canescens* Haw., weißgrauliche, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*comata* Jacq., schopfige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*concinna* Mass., nette, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*cordata* Haw., herzförmige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*deflexa* Jacq. (*reflexa* Haw.), herabgebogene, 4. f. t. w.

Cap der guten Hoffnung.

*fissirostris* Jacq., spaltschnabelige, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

*flavicomata* Haw., gelbschopfige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*glandulifera* Haw., drüsige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*glanduliflora* Mass., drüsenblumige, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

*Gordoni* Mass., Gordon's, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*grandiflora* Mass., großblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*Gussoneana* Jacq. fil. (*europaea* Guss.), Gussone's, 4.

f. t. Sicilien.

*hamata* Jacq., hakenförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*hirsuta* L., rauhhaarige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

β) *atra* Jacq.

*hispidula* Hornem., steifhaarige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*incarnata* Mass., fleischfarbige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*juvencula* Jacq., junge, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*lanigera* Haw., wollige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.



## Stapelia

*lucida* DC., spiegelnde, 4. f. t. w. Cap der gut. H.  
*mamillaris* Thbg., W., zitzenförmige, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*Massoni* Haw., Masson's, 4. f. t. w. Cap der gut. H.  
*multiflora* DC., vielblumige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.  
*ophiuncula* Haw., schlangenförmige, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*patula* W. (*sororia* Jcq.), absteheude, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*pilifera* Mass., haartragende, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*pulvinata* Mass., polsterförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*ramosa* Mass., ästige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*rufa* Mass., fuchsrothe, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*sororia* Mass., verschwisterte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*spectabilis* Haw. (*grandiflora* Sims), ansehnliche, 4. f.  
 t. w. Cap der guten Hoffnung.

*stellaris* Jacq., Haw., sternblumige, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

### IV. Gonostemon Haw.

*divaricata* Mass., ausgespreizte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*pallida* Haw., bleiche, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*stricta* Ker, steife, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

### V. Obesia Haw.

*decora* Mass., zierliche, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*geminata* Mass., paarblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*serrulata* Jacq., feinsägige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

### VI. Orbea Haw.

*anguinea* Jacq., schlangenähnliche, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*bisulca* Donn, Haw., zweifurchige, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*bufonia* Jacq., krötenartige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*clypeata* Jacq., schildförmige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

*conspurcata* W., getüpfte, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*Curtisii* Haw. (*variegata* Curt.), Curtis's, 4. f. t. w.  
 Cap der guten Hoffnung.

*inodora* Haw., geruchlose, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*lepida* Jacq., schülferige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*maculosa* Jacq., gefleckte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*marginata* W., berandete, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*marmorata* Jacq., marmorirte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*mixta* Haw., gemischte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*mutabilis* Jacq., veränderliche, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*normalis* Jacq., normale, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*orbicularis* Haw., kreisförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*picta* Haw., bemalte, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

*planiflora* Jacq., flachblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

*quinquenervis* Haw., fünfnervige, 4. f. t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*retusa* Haw., abgestutzte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*rugosa* Jacq., runzelige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

*trisulca* Jacq., dreifurchige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

*variegata* L., bunte, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

*Wendlandiana* R. et S. (*rugosa* Wendl.), Wendland's, 4.  
 t. w. Cap der guten Hoffnung.

*Woodfordiana* Haw., Woodford's, 4. f. t. w. C. d. g. H.

### VII. Pectinaria Haw.

*articulata* Mass., gegliederte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

## Stapelia

### VIII. Piaranthus RB.

*parviflora* Mass., kleinblumige, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.  
*pulla* Mass. (*fasciculata* Thbg.), dunkelbraune, 4. ♂ t.  
 w. Cap der guten Hoffnung.

*punctata* Mass., punktirte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

### IX. Podanthes Haw.

*ciliata* Thbg., gefranzte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*irrorata* Mass., getüpfelte, 4. ♂ t. w. Cap d. gut. H.

*pulchella* Mass., hübsche, 4. ♂ t. w. Cap d. gut. H.

*pulchra* Haw. (*verrucosa* Bot. mag.), schöne, 4. ♂ t.  
 w. Cap der guten Hoffnung.

*roriflua* Jacq., bethaute, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*verrucosa* Mass., warzige, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

### X. Tridentea Haw.

*depressa* Jacq., niedergedrückte, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.

*gemmiflora* Mass., knospenblumige, 4. ♂ t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*hircosa* Jacq. (*moschata* Haw.), bockige, 4. ♂ t. w.  
 Cap der guten Hoffnung.

*paniculata* Jacq., rispige, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*Simsii* Haw. (*vetula* Sims), Sims's, 4. ♂ t. w. Cap  
 der guten Hoffnung.

*stygia* Haw., dunkelfarbige, 4. ♂ t. w. Cap d. g. H.

*vetula* Haw., ältliche, 4. ♂ t. w. Cap der gut. Hoffn.

### XI. Tromotriche Haw.

*fuscata* Jacq., bräunliche, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*glauca* Haw., blaugrüne, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*obliqua* W., schiefe, 4. ♂ t. w. Cap der gut. Hoffn.

*pruinosa* Mass., bereifte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

*revoluta* Mass., zurückgerollte, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.

*adscendens* Roxb. v. *Caralluma adscendens*. *barbata*

Mass. etc. v. *Huernia barbata* etc.

## Staphylea L., Pimpernuß, V. III., Sapindaceae- Staphyleaceae.

*occidentalis* Sw., westliche, ♂ w. Jamaika.

*pinnata* L., gefiederte, ♂ f. Mittel- und Südeuropa.

*trifolia* L., dreiblättrige, ♂ f. Nordamerika.

*Bumalda* DC. v. *Bumalda trifolia*.

*Starkea umbellata* v. *Liabum Brownii*. *spinulosa* Nutt. v.  
*Aplopappus spinulosus*.

## Statice L. (et *Taxanthema* RB.), Wegerichnelke, V. v., Plumbagineae.

### I. Genuina.

*acerosa* W. (*Echinus* Sm.), nadelblättrige, ♂ k. Grie-  
 chenland, Caucasus.

*acutifolia* Rchb., spitzblättrige, 4. f. Oberitalien.

*altaica* Hort., altaische, 4. f. Sibirien.

*arborea* Brouss., baumartige, ♂ k. Canarische Inseln.

*articulata* Lois. (*rorida* Sm., *echioides* R. et S.), ge-  
 gliederte, 4. k. f. b. Südeuropa.

*aurea* L., goldfarbige, 4. ♂ f. k. Ostsibirien.

*auriculaefolia* Vahl, aurikelblättrige, 4. k. Spanien,  
 Portugal, Nordafrika.

*auriculata* Bess., geöhrt, 4. f. Podolien.

*australis* Spgl., neuholländische, 4. k. Neuholland.

*bellidifolia* Sm., maßliebenblättrige, 4. k. Griechenl.

*Besseriana* Andrz., Besser's, 4. f. Südrußland.

*binervosa* G. E. Sm., zweinervige, 4. f. England.

*caroliniana* Walt., carolinische, 4. f. k. Carolina.

# Statice

- caspia* W. (*reticulata* MB.), caspische, 4. f. Caucasus, Sibirien.  
*cinerea* Poir., aschgraue, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*conspicua* Sims, ansehnliche, 4. f. Sibirien.  
*cordata* L., herzblättrige, 4. k. Sicilien, Griechenland.  
*cuneata* Hort., keilblättrige, 4. f. Sibirien.  
*dichotoma* Cav., zweizinkige, 4. k. Spanien, Griechenl.  
*Echinus* L., stechende, 4. k. Griechenland, Kleinasien, Aegypten, Caucasus.  
*echioides* L. (*aristata* Sm.), rauhblättrige, ♂. k. Südeuropa, Griechenland.  
*elata* Fisch., hohe, 4. f. Sibirien.  
*emarginata* W., ausgerandete, 4. k. Spanien.  
*ferulacea* L., steckenkrautähnliche, 4. k. Süd- und Westeuropa.  
*flexuosa* W., gebogene, 4. f. Sibirien.  
*foliosa* Penny, blattreiche, 4. k. Griechenland.  
*globulariaefolia* Dsf., kugelblumenblättrige, 4. k. Nordafrika.  
*Gmelini* W., Gmelin's, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibir.  
*graeca* Poir., griechische, 4. k. Griechenland.  
*graminifolia* Ait., grasblättrige, 4. f. Südrussland.  
*grandiflora* Loud., großblumige, 4. k. ?  
*imbricata* P. B. Webb., ziegeldachartige, 4. k. Teneriffa.  
*incana* L., weißgraue, 4. f. Taurien, Sibirien.  
*latifolia* Sm. (*coriaria* Pall.), breitblättrige, 4. f. Caucasus, Mittelasien.  
*Limonium* L., gemeine, 4. f. Europa.  
     β) *Pseudo-Limonium* Rchb.  
*macrophylla* W., großblättrige, 4. k. Canar. Inseln.  
*minuta* L., kleine, 4. k. f. Südeuropa.  
*monopetala* L., einkronige, 4. k. Südeuropa.  
*mucronata* L. (*crispa* P.), krause, 4. k. Nordafrika.  
*nana* Penny, zwergige, 4. f. England.  
*oleaefolia* Scop., Pourr., ölbaumblättrige, 4. f. Südeuropa.  
*ovalifolia* Poir., eiblättrige, 4. k. Canarische Inseln.  
*pectinata* Ait., kammförmige, 4. k. Canarische Inseln.  
*pruinosa* L., bereifte, 4. k. Nordafrika.  
*puberula* Webb. (*furfuracea* Lag.), feinhaarige, 4. k. Canarische Inseln.  
*pubescens* DC., weichhaarige, 4. f. Süd- u. Westeuropa.  
     β) *furfuracea* Rchb.  
*purpurata* L., purpurfarbige, 4. k. Cap der gut. H.  
*reticulata* L., netzförmige, 4. k. f. b. England, Südeuropa.  
*scabra* Thbg., scharfe, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*scoparia* Pall., besenartige, 4. f. Caucasus, Sibirien.  
*serotina* Rchb., spätblumige, 4. f. Südeuropa.  
*sinuata* L., buchtige, 4. k. Sicilien, Griechenland.  
*spathulata* Dsf., spatelblättrige, 4. k. Nordafrika, Creta.  
*speciosa* L., prächtige, 4. f. Sibirien.  
*spicata* W. (*lyrata* MB.), ährenförmige, ♂. f. Caucasus.  
*suffruticosa* L., halbstrauchige, 4. k. Taurien.  
*tatarica* L., tatarische, 4. f. Tatarei.  
*tetragona* Thbg., vierkantige, 4. k. Cap d. gut. H.  
*Thouini* Vivian. (*aegyptiaca* P., *alata* W., *cuneata* Sm.), Thouin's, 4. k. Aegypten.  
*viminea* Schrad., gartenartige, 4. f. ?  
*virgata* W., ruthenförmige, 4. k. f. b. Spanien.



## Statice

Willdenowiana Poir., Willdenow's, 4. f. b. k. Südfrankreich.

*Armeria* L. etc. v. *Armeria vulgaris* etc.

**Stauracanthus** Lk., Stachelginster, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

aphyllus Lk., blattloser, 5. k. Portugal.

*Steenhammera maritima* Rchb. v. *Platynema marit.*

*Stegania falcata* RB. etc. v. *Lomaria falcata* etc.

**Stelis** Sw., Stelis, XX. I., Orchideae.

micrantha Sw., kleinblumige, 4. w. Jamaica.

ophioglossoides Sw., natterzungenähnliche, 4. w. Westind.

tristyla Lindl., dreigriffelige, 4. w. Brasilien.

tubata Lodd. v. *Physosiphon Loddigesii*.

**Stellaria** L., Sternmiere, X. III., Caryophyllaceae-  
Alsineae.

*Arenaria* L. (*Arenaria hispanica* Spgl.), arenarienähnliche, 0. f. Spanien.

bulbosa Wulf. (*dichotoma* Scop.), knollige, 4. Kn. f. Krain.

cerastoides L. (*multicaulis* W.), hornkrautähnliche, 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen, England.

crassifolia Ehrh., dickblättrige, ♂. 4. f. Nordeuropa.

dahurica W., dahurische, ♂. f. Dahurien.

dichotoma L., zweizinkige, 0. ♂. f. Sibirien.

elegans Seringe, zierliche, ♂. f. Sibirien.

Friesiana Sering. (*longifolia* Fr.), Fries's, 4. f. Sudeten, Nordeuropa.

glauca Wither. (*palustris* Retz), blaugrüne, 4. f. Europa.

b) *Dilleniana* Mch.

graminea L., grasartige, 4. f. Europa.

holostea L., großblumige, 4. f. Europa.

humifusa Sw. (*Arenaria humif.* Wahlbg., *A. norwegica* Gun.), niedergestreckte, 0. f. Norwegen.

Laxmanni Fisch., Laxmann's, 0. f. Ostsibirien.

longipes Goldie, langstielige, ♂. f. Nordamerika.

muralis Lk. (*Arenaria m.* Sbr.), Mauer-S., 0. f. Creta.

nemorum L., Hain-St., 4. f. Europa.

b) *latifolia* P.

scapigera Ait., schafttragende, 4. f. Schottland.

uliginosa Murray (*aquatica* Poll., *Alsine* Reich., *fontana* Wulf., *hypericifolia* Wigg.), Sumpf-S., 0. f. Europa.

velutina Seringe, sammethaarige, 4. f. Sibirien.

viscida MB. (*Cerastium anomalum* W. K.), schmierige, 0. f. Osteuropa, Taurien, Persien.

**Stellera Chamaejasme** L. et **Passerina** L. vid. *Passerina Stelleri* et annua.

**Stemodia** L., Spaltfädler, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

chilensis Benth., chilesischer, 4. k. Chili.

durantifolia Sw., durantablättriger, ♂. w. Westindien.

lobelioides Lehm., lobelienähnlicher, 4. k. Chili.

maritima L., Meerstrands-S., ♂. w. Westindien.

parviflora RB., kleinblumiger, 0. f. Südamerika.

suffruticosa Bonpl. (*trifoliata* Rchb.), halbstrauchiger, 5. w. Brasilien.

verticillaris Lk. (*Conobea verticillaris* Spgl.), wirtelblättriger, 0. w. Brasilien.

viscosa Roxb., schmieriger, ♂. w. Ostindien.

**Stenactis** Cass., Schmalstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

annua Cass., jähriger, 0. f. Europa, Nordamerika.

**Stenactis**

*glauca* N. E. et *speciosa* Lindl. v. *Erigeron glaucus* et *speciosus*.

**Stenanthera** RB., Schmalbeutler, V. 1., Epacrideae.

*pinifolia* RB., fichtenblättriger, f. t. Neusüdwallis.

**Stenia** Lindl., Schmalstendel, XX. 1., Orchideae.

*pallida* Lindl., bleicher, 4. w. Demerara.

**Stenocarpus** RB., Schmalbalgkapsler, IV. 1., Proteaceae.

*salignus* RB., weidenblättriger, f. f. k. Neuholland.

**Stenochilus** RB., Dünnlippler, XIV. 11., Globulariaceae-Myoporineae.

*glaber* RB., kahler, f. t. Neuholland.

*longifolius* RB., langblättriger, f. t. Neuholland.

*maculatus* Ker., gefleckter, f. t. Neuholland.

*viscosus* Grah., schmieriger, f. t. Neuholland.

**Stenomesson** Herb., Dünnschwertel, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*croceum* Red., safranfarbiger, 4. Zw. w. Peru.

*flavum* Herb. v. *Chrysiphiala flava*.

**Stenorrhynchos** Rich., Schmalschnabel, XX. 1., Orchideae.

*calcaratum* Rich., gespornter, 4. w. Hispaniola.

*orchoides* Rich., knabenkrautähnlicher, 4. w. Jamaica.

*speciosum* Rich., prächtiger, 4. w. Südamerika.

**Stenospermum** Swt. (*Kunzea* Rchb.), Dünnsame, XII. 1., Myrtaceae.

*capitatum* Swt., kopfförmiger, f. f. k. t. Neuholland.

*ciliatum* \*, gefranzter, f. f. k. t. Neucaledonien.

*corifolium* Swt., corisblättriger, f. f. k. t. Neuholl.

*ericaefolium* \*, heideblättriger, f. f. k. t. Neuholland.

**Stephania** W. (F. Stephan, Professor zu Moskau), VI. 1., Capparideae.

*cleomoides* W., cleomenähnliche, f. w. Caracas.

**Sterculia** L., Stinkmalve(baum), XXI. x. (XVI. vii.), Malvaceae-Sterculiaceae.

*acerifolia* Cunn., ahornblättrige, f. w. Neuholland.

*acuminata* P. B., zugespitzte, f. w. Guinea.

*angustifolia* Roxb., schmalblättrige, f. w. Malacka.

*Balanghas* L., eiförmige, f. w. Ostindien.

*coccinea* Roxb., scharlachfarbige, f. w. Malacka.

*colorata* Roxb., gefärbte, f. w. Ostindien.

*diversifolia* G. Don (*heterophylla* Cunn.), verschiedenblättrige, f. t. Neuholland.

*foetida* L., ächte, f. w. Ostindien, Molucken.

*grandiflora* Vent., großblumige, f. w. Ostind., Mascar.

*guttata* Roxb., betropfte, f. w. Ostindien.

*Helicteres* P., schraubenbaumähnliche, f. w. Neugranada.

*Ivira* Sw. (*crinita* Cav.), mähenfrüchtige, f. w. Westindien, Südamerika.

*lanceolata* Cav., lanzettblättrige, f. w. China, Java.

*nobilis* Sm., edle, f. w. Ostindien.

*platanifolia* L., platanenblättrige, f. t. Japan, China, Arabien.

b) flore rubro pleno.

*pubescens* G. Don (*Tragacantha* Lindl.), weichhaarige, f. w. Sierra Leone.

*urens* Roxb., brennende, f. w. Ostindien.

*villosa* Roxb., zottige, f. w. Ostindien.

**Sterigma** DC. (*Sterigmotemon* MB.), Sterigma, XV. 1., Cruciferae.

**Sterigma**

*acanthocarpum* Fisch. et Mey., stachelfrüchtiges, ☉. f. Nakitschivan.

*tomentosum* DC., filziges, ♂. f. Caucasus, Sibirien.

*torulosum* DC., knorriges, ♂. f. Caucasus.

**Sternbergia** W. K. (Graf Caspar von Sternberg, berühmter böhmischer Botaniker), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

*Clusiana* Ker, Clusius's, 4. Zw. f. Thracien.

*colchiciflora* W. K., zeitlosenblumige, 4. Zw. f. Ungarn, Taurien.

*exigua* Ker, kleine, 4. Zw. k. f. b. Nordafrika.

*lutea* Ker, gelbe, 4. Zw. f. Südeuropa, Caucasus, Griechenland.

b) *angustifolia*.

**Stevenia** Adams (C. v. Steven, berühmter russischer Botaniker), XV. III., Cruciferae.

*alyssoides* Adams, Fisch., alyssumähnliche, ☉. f. Sibirien.

*cheiranthoides* DC., lackähnliche, ♂. f. Sibirien.

**Stevia** Cav. (P. J. Esteve, Professor der Botanik zu Valencia), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*adenophora* Lag., drüsentragende, 4. k. Chili.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, ♀. k. t. Mexico.

*callosa* Cerv., schwielige, 4. k. Mexico.

*connata* Lag., verwachsene, ♀. k. Neuspanien.

*Eupatoria* W., dostenähnliche, 4. k. Mexico.

*fascicularis* DC., büschelförmige, ♀. k. Mexico.

*fastigiata* H. B. K., gipfelständige, 4. k. Neuspanien.

*hyssopifolia* Cav., ysopblättrige, 4. k. Neuspanien.

*incanescens* Lag., weißgrauliche, 4. k. Neuspanien.

*ivaefolia* W., ivablättrige, 4. k. Neu-Granada.

*lanceolata* Lag., lanzettblättrige, 4. k. Mexico.

*laxiflora* DC., lockerblumige, 4. k. Mexico.

*lucida* Lag., spiegelnde, 4. ♀. k. Neuspanien.

*micrantha* Lagasc., kleinblumige, 4. k. Neuspanien.

*monardaefolia* H. B. K., monardenblättrige, 4. k. Mexico.

*nepetaefolia* H. B. K., nepetablättrige, 4. k. Mexico.

*ovata* Lag., eiförmige, 4. k. Neuspanien.

*paniculata* Lag., rispige, 4. k. Neuspanien.

*pilosa* Lag., haarige, 4. k. Neuspanien.

*pubescens* Lag., feinhaarige, 4. k. Neuspanien.

*purpurea* Lag., purpurfarbige, 4. k. Mexico.

*rhombifolia* H. B. K., rautenblättrige, 4. k. Mexico.

*salicifolia* Cav., weidenblättrige, ♀. k. Mexico.

*salviaefolia* Hort., salbeiblättrige, 4. k. Mexico.

*serrata* Cav., sägeblättrige, 4. k. Mexico.

*suaveolens* Lag., feinriechende, 4. k. Neuspanien.

*subpubescens* Lag., wenighaarige, 4. ♀. k. Neuspanien.

*ternifolia* H. B. K., dreiblättrige, 4. k. Neuspanien.

*tomentosa* H. B. K., filzige, 4. k. Mexico.

*trifida* Lag., dreispaltige, 4. k. Neuspanien.

*viminea* Schrad., gertenförmige, 4. k. Mexico.

*violacea* Cervant., violette, 4. k. Mexico.

*viscida* H. B. K., schmierige, 4. k. Mexico.

*pedata* Cav. vid. *Hymenopappus pedatus*. *linearis*

W. (*lavandulaefolia* W.) v. *Palafoxia linearis*.

**Stiffitia** Mikan (Stift, kais. österr. Leibarzt und Protomedicus), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

*insignis* Fisch., ausgezeichnete, 4. w. Brasilien.



**Stigmaphyllon** St. Hil., Narbenblatt, X. III., Malpighiaceae.

*aristatum* Lindl., begranntes, ♀. Sch. w. Brasilien.

*auriculatum* Lindl. (*Banisteria auricul.* Cav.), geöhrttes, ♀. Sch. w. Brasilien.

**Stilago** L., Salamanderbaum, XXII. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*Bunius* L., dreifädiger, ♀. w. Ostindien.

*diandra* Roxb., zweifädiger, ♀. w. Ostindien.

**Stillingia** Garden (B. Stillingfleet, englischer Botaniker), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*ligustrina* W., ligusterähnliche, ♀. k. f. b. Nordamer.

*populnea* Vahl, pappelähnliche, ♀. w. Ceylon.

*sebifera* Mchx., talgebende, ♀. w. China, Carolina, Cuba.

*sylvatica* L., Wald-St., 4. k. Carolina, Florida.

**Stipa** L., Pfriemengras, III. II., Gramineae.

I. *Genuina*.

*Aristella* L., kurzgranniges, 4. f. Südeuropa, Kleinasien.

*avenacea* L. (*bicolor* Trin.), haferähnliches, 4. f. Nordamerika.

*bicolor* Vahl, zweifarbiges, 4. k. Chili, Brasilien.

*capillata* L., haarförmiges, 4. f. Europa, Sibirien.

*conferta* Poir (*Redowskii* Trin.), gedrängtes, 4. f. Sibirien.

*erecta* Hort., Madrit., aufrechtes, 4. f. ?

*gigantea* Lagasc., riesenhaftes, 4. f. Spanien.

*humilis* Cav., niedriges, ☉. f. Südamerika.

*juncea* L., simsensförmiges, ☉. 4. f. Westeuropa, Creta, Nordamerika.

*Lagascæ* R. et S., Lagasca's, 4. f. Spanien, Nordafrika.

*pennata* L., federiges, 4. f. Europa, Sibirien.

*sibirica* Lam., sibirisches, 4. f. Sibirien.

*striata* Lk., gestreiftes, 4. k. Neuholland.

*tortilis* Dsf. (*paleacea* Sm., *seminuda* Hornem.), gedrehtes, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Cap d. g. H.

II. *Lasiagrostis* Lk.

*Calamagrostis* Wahlbg., rohrähnliches, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

*splendens* Trin., schimmerndes, 4. f. Sibirien.

III. *Macrochloa* Kunth.

*arenaria* Brot., Sand-P., 4. f. b. Portugal.

*tenacissima* L., zähes, 4. k. Spanien, Griechenland, Nordafrika.

**Stipularia** Haw. v. Alsine.

**Stizolobium altissimum** P. etc. v. *Mucuna altissima* etc.

**Stobaea** Thbg. (D. Stobaeus, ein Schwede, Gönner des Linné), XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

*glomerata* Spgl. (*Cynara glomera* Thbg.), knaulförmige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*pinnata* L., gefiederte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

**Stoebe** L., Stoebe, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

*aethiopica* L., aethiopische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*cinerea* Thbg., aschgraue, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*ericoides* L., heideähnliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

*reflexa* Thbg., zurückgebogene, ♀. k. Cap d. gut. H.

**Stokesia** L'Her. (J. Stokes, englischer Botaniker), XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

*cyanea* L'Her., kornblumenblaue, 4. k. Südcarolina.

**Stranvaesia** Lindl. (W. Fox Strangways, englischer Botaniker), XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

*glauescens* Lindl., blaugrünliche, ♀. f. b. Nepal.

**Stratiotes** L., Siggel (Wasserfeder), XXII. IX. (XI. VI.), Hydrocharideae.

aloides L., aloeähnliche, 4. Wa. f. Europa.

**Stravadium** Juss. (*Stravadia* P.), (malabarischer Name), XVI. VIII., Myrtaceae.

acutangulum Juss., spitzkantiges, 5. w. Ostindien.

racemosum Swt., traubiges, 5. w. Ostindien.

**Streblidia** Lk. v. Schoenus.

**Strelitzia** Ait. (Gemahlin Georg des III., Königs von England, geborene Prinzessin von Mecklenburg Strelitz), V. I., Musaceae.

angustifolia Dryand., schmalblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

augusta Thbg (*Heliconia alba* L.), herrliche, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

farinosa Dryand., mehlig, 4. w. Cap der gut. Hoffn.

humilis Lk., niedrige, 4. w. Cap der guten Hoffn.

junceae Andr., simsenförmige, 4. w. Cap der gut. H.

ovata Dryand. (*Reginae* Curt.), eiblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

parvifolia Dryand. (*Principis* Andr.), kleinblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

Reginae Ait., königliche, 4. w. Cap der guten Hoffn.

Unbestimmtere: flava Hort., pumila Hort., spathulata Hort., stolonifera Hort.

**Streptachne** RB., Doppelgranne, III. II., Gramineae.

capensis N. E., capische, ④. 4. f. k. Cap d. gut. H.

**Streptanthera** Swt., Drehschwertel, III. I., Irideae.

cuprea Swt., kupferfarbiger, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

elegans Swt., zierlicher, 4. k. Cap der guten Hoffn.

**Streptanthus** Nutt., Drehblume, XV. III., Cruciferae.

hyacinthoides Hook., hyacinthenblumige, ④. f. Texas.

obtusifolius Hook., stumpfblättrige, ④. f. Arkansa.

**Streptium** Roxb., Drehröhre, XIV. II., Verbenaceae.

asperum Roxb., rauhe, 4. w. Ostindien.

**Streptocarpus Rexii** Lindl. v. Henckelia Rexii.

**Streptopus** Mchx., Drehfuß, VI. I., Sarmentaceae (*Asparugineae*).

amplexifolius DC. (*distortus* Mchx.), stengelumfassender, 4. f. Mitteleuropäische Vorälpen, Ungarn, Nordamerika, Grönland.

lanuginosus Mchx., wolliger, 4. f. Nordamerika.

roseus Mchx., rosafarbiger, 4. f. Nordamerika.

simplex D. Don, einfacher, 4. k. Nepal.

**Strobilanthes** N. E., Zapfenblümchen, XIV. II., Acanthaceae.

Sabiniana N. E., Sabine's, 5. w. Nepal.

**Strophanthus** DC., Drehblüthler, V. I., Contortae-Apocynae.

dichotomus DC., zweizinkiger, 5. w. Ostindien.

divergens Grah. (*dichotomus* Bot. reg.), divergirender, 5. w. China.

sarmentosus DC., starkwurzelnder, 5. w. Sierra Leone.

**Strumaria** Jacq., Kropflilie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

angustifolia Jacq., schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

crispa Ker, krause, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

filifolia Jacq., fadenblättrige, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.

gemmata Sims, knospige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

**Strumaria**

*linguaeifolia* Jacq., zungenblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

*rubella* Jacq., röthliche, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

*spiralis* Ker, spiralförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*stellaris* Ker, sternförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*truncata* Jacq., abgestutzte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

*undulata* Jacq., wellenblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

**Struthiola** L., Strauftsstrauch, IV. 1., Thymelaeaceae.

*angustifolia* Lam., schmalblättriger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*glabra* L. (*erecta* Thbg., *stricta* Donn, *tetragona* Retz, *tuberculosa* Lam.), kahler, 5. t. k. Cap der gut. H.

*imbricata* Andr. (*striata* Lam.), ziegeldachblättriger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*incana* Lodd., weißgrauer, 5. t. k. Cap der gut. H.

*juniperina* Retz. (*lucens* Poir.), wachholderähnlicher, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*ovata* Thbg. (*lanceolata* Retz, *myrsinites* Lam.), eiförmiger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*pubescens* Retz (*virgata* Sm.), weichhaariger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*tomentosa* Andr. (*chrysantha* Lichtstn.), filziger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*virgata* L. (*ciliata* Andr., *longiflora* Lam., *lateriflora* Hornem.), ruthenförmiger, 5. t. k. Cap der gut. H.  
β) *rubra* Andr.

**Struthiopteris** W., Strauhsfarren, XXIV. 1., Pterioideae.

*germanica* W., deutscher, 4. f. Europa, Asien.

*pennsylvanica* W., pennsylvanischer, 4. f. Nordamerika.

**Strychnos** L., Krähenaugenbaum, V. 1., Contortae-Apocynae.

*axillaris* Colebr., achselblumiger, 5. w. Bengalen.

*coubrina* L., Schlangen-K., 5. w. Molucken.

*madagascariensis* Thouars, madagascarischer, 5. w. Madagascar.

*Nux vomica* L., ächter, 5. w. Ostindien.

*potatorum* L., trunkenmachender, 5. w. Ostindien.

*spinosa* Lam., dorniger, 5. w. Madagascar.

**Stuartia** Cav. (*Stewartia* Auct.), (J. Stuart, Marquis von Bute, englischer Botaniker), XVI. VIII., Ternstroemiaceae.

*virginica* Cav. (*Malachodendron* L.), virginische, 5. f. b. k. Virginien, Carolina.

**Sturmia** Rchb. (*Liparis* Rich., Lindl.), (J. Sturm, deutscher Botaniker und Künstler), XX. 1., Orchideae.

*bituberculata* (Lindl.), zweihöckerige, 4. w. Nepal.

*Correana* (Spgl., Nutt.), Correa's, 4. f. b. k. Nordam.  
*elata* (Lindl.), hohe, 4. w. Brasilien.

*foliosa* (Lindl.), blattreiche, 4. w. Mascarenas.

*guineensis* (Lindl.), guineische, 4. w. Sierra Leone.

*liliifolia* (Rich.), lilienblättrige, 4. f. b. k. Nordamer.

*Loeselii* Rchb., Loesel's, 4. f. Europa.

*pendula* (Lindl.), überhängende, 4. w. Ostindien.

*reflexa* (Lindl.), zurückgebogene, 4. w. Neuholland.

*Walkeriae* (Lindl., Grah.), Walker's, 4. w. Ceylon.

**Stylandra** Nutt., Säulenbeutel, V. 11., Asclepiadeae.

*pumila* Nutt., niedriger, 4. k. Carolina.



**Stylidium** Sw., Säulenblümchen, XX. II., Campanulaceae-Stylideae.

*adnatum* RB., angewachsenes, ♂. ♀. t. Südl. Neuholl.  
*fasciculatum* RB. (*Knighthii* Hort.), büschelförmiges, ♀. t. Südliches Neuholland.

*fruticosum* RB., strauchiges, ♀. t. Neuholland.

*graminifolium* Sw. (*lineare* Sbr.), grasblättriges, 4. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

*hirsutum* RB., rauhhaariges, ♀. t. Neuholland.

*junceum* RB., simsensförmiges, 4. t. Neuholland.

*laricifolium* Rich. (*tenuifolium* RB.), lerchenblättriges, ♀. t. Neuholland.

*lineare* Sw., gleichbreitblättriges, 4. t. Neuholland.

*scandens* RB., klimmendes, 4. Sch. t. Südl. Neuholl.

*Stylolepis gracilis* Lehm. v. *Podolepis gracilis*.

**Stylosanthes** Sw., Griffelblume, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*elator* Sw. (*hispida* Pursh), aufgerichtete, 4. t. Nordamerika, Westindien.

*erecta* P. B., aufrechte, ♀. w. Guinea.

*guianensis* Sw., guianische, ☉. w. Guiana, Brasilien.

*mucronata* W., weichspitzige, 4. ♀. w. Ostindien.

*procumbens* Sw., niederliegende, 4. w. Westindien.

*viscosa* Sw., schmierige, ♀. w. Jamaica, Brasilien.

**Stypandra** RB., Stielaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

*caespitosa* RB., rasenartige, 4. k. t. Neuholland.

*frutescens* K. et W., strauchige, ♀. k. t. Neuholland.

*glaucal* RB., blaugrüne, 4. k. t. Neuholland.

*propinqua* Cunn., verwandte, 4. k. t. Neusüdwallis.

*umbellata* RB., doldige, 4. k. t. Neuholland.

**Styphelia** Sm., Starrstrauch, V. I., Epacrideae.

*adscendens* RB., aufsteigender, ♀. t. Neuholland.

*epacrioides* Loud., epacrisähnlicher, ♀. t. Neuholland.

*laeta* RB., freudiger, ♀. t. Neuholland.

*latifolia* RB., breitblättriger, ♀. t. Neuholland.

*longifolia* RB., langblättriger, ♀. t. Neusüdwallis.

*triflora* Andr. (*glaucescens* Sbr.), dreiblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

*tubiflora* Sm., röhrenblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

*viridiflora* RB. (*viridis* Andr.), grünblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

*cornifolia* Rudg. vid. *Trochocarpa laurina*. *glaucal*

La Bill. etc. vid. *Monotoca lineata* etc. *Gnidium*

Vent. (*parviflora* Andr.) v. *Leucopogon parviflorus*.

*obovata* La Bill. etc. vid. *Leucopogon obovatus* etc.

*Oxycedrus* La Bill. v. *Cyathodes Oxycedrus*. Hin-

sichtlich der übrigen s. die Gattungen *Acrotriche*, *Astroloma*, *Lissanthe* und *Stenanthera*.

**Styrax** T., Storax, X. I., Sapotaceae-Styracineae.

*grandifolius* Ait. (*officinal*. Walt.), großblättriger, ♀. k. f. b. Nordamerika.

*laevigatus* Ait. (*glabrum* Cav., *laeve* Walt.), glatter, ♀. k. f. b. Carolina.

*officinalis* L., officineller, ♀. k. f. b. Kleinasien, Syrien, Griechenland.

*pulverulentus* Mchx. (*laevigatus* Sims), bestäubter, ♀. k. f. b. Carolina.

**Suaeda** Pall., Vielkelch, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

*hortensis* Forsk., Garten-V., ♀. k. Aegypten.

**Suaeda**

Hinsichtl. der Uebrigen s. die Gattungen Kochia, Schaninia und Schoberia.

*Suardia picta* Schr. v. *Melini minutiflora*, Nachtr.

**Subularia** Raj., Pfriemenblatt., XV. II., Cruciferae.

*aquatica* L., Wasser-P., ☉. Wa. f. Mittel- u. Nordeuropa.  
*alpina* W. v. *Arabis vochinensis*.

**Succisa** Vaill., Schuppenkopf, IV. I., Dipsaceae.

I. *Cephalaria* Schrad. (*Lepicephalus* Lag., *Cerionanthus* Schott).

*alpina* Spgl., Alpen-S., 4. f. Schweiz u. franz. Alpen.  
*amplexicaulis* Spgl., stengelumfassender, ☉. f. Orient.  
*attenuata* (R. et S.) (*trifida* Spgl.), verdünnter, 4. f. k.

Cap der guten Hoffnung.

*centauroides* Spgl. (*Scabiosa laevigata* W.), kornblumen-ähnlicher, 4. f. Südeuropa, Taurien.

*corniculata* (W. K.), gehörnter, 4. f. Banat.

*graeca* (R. et S.) (*decurrens* Sibth. Sm.), griechischer, 4. f. Griechenland.

*joppica* Spgl., joppischer, ☉. f. Syrien.

*laevigata* Spgl. (*Scabiosa coriacea* W., *cretacea* MB.), glatter, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.

*leucantha* Spgl. (*Scubiosa albescens* W.), weifsblumiger, 4. f. Südeuropa, Griechenland.

β) *rigida* Mill. γ) *Trenta* Hacq.

*rigida* Spgl., starrer, f. k. Cap. der gut. Hoffn.

*scabra* Spgl., scharfblättriger, 4. f. k. Cap d. g. H.

*syriaca* Spgl., syrischer, ☉. f. Syrien.

*tatarica* Spgl. (*Scabiosa altissima* Mill., *elata* Hornem., *atrata* Lag., *gigantea* Ledeb.), tatarischer, 4. Sibirien, Caucasus.

*transylvanica* Spgl., siebenbürgischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

*uralensis* Spgl., uralischer, 4. f. Rußland.

*Vaillantii* (M. B.) (*Sc. lancifolia* Mchx.), Vaillant's, ☉. f. Taurien, Syrien, Spanien.

II. *Genuina*.

*australis* Rchb. (*Scabiosa repens* Brignol.), südliche, 4. f. Oesterreich, Friaul.

β) *pseudoaustralis* (R. et S.)

*pratensis* Mch., Wiesen-S., 4. f. Europa.

b) *alba*. β) *glabrata* Schott.

**Succowia** Medik. (Suckow, Professor der Medicin zu Heidelberg), XV. I., Cruciferae.

*balearica* Medik., balearische, ☉. f. Balearen, Teneriffa.

**Suffrenia** Bell. (v. Suffren, oberital. Botaniker), II. I., Lythraeae.

*filiformis* Bell., fadenförmige, ☉. f. Italien.

**Sutherlandia** RB. (J. Sutherland, engl. Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*frutescens* RB., strauchige, f. k. Cap der gut. Hoffn.

**Swainsonia** Salisb. (Isaac Swainson, engl. Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*coronillaefolia* Salisb., kronenwickenblättrige, f. t. Neusüdwallis.

*galegifolia* RB., geifsrautenblättrige, f. t. Neusüdwallis.

b) *albiflora* RB.

*lessertiaefolia* DC. (*astragalifolia* Hort.), lessertienblättrige, f. t. Neusüdwallis.

- Swartzia** W. (O. Swartz, berühmter schwed. Botaniker), XIII. I., Leguminosae-Swartzieae.  
*grandiflora* W., großblumige, ♀ w. Trinidad.  
*pinnata* W., gefiederte, ♀ w. Trinidad.  
*simplicifolia* W. (*simplex* Speg.), einfachblättrige, ♀ w. Caribäen.
- Sweetia** DC. (Robert Sweet, berühmter engl. Gärtner und Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*filiformis* DC., fadenförmige, ♀. Sch. w. Südamerika.  
*lignosa* DC., holzige, ♀. Sch. w. St. Domingo.  
*longifolia* DC., langblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Swertia** L. (E. Swert, berühmter holländischer Gärtner), V. II., Contortae Gentianeae.  
*corniculata* Gmel., gehörnte, ♂. f. Ostsibirien.  
*Michauxiana* R. et S. (*americana* Speg., *corniculata* Pursh.), Michaux's, ♂. f. Canada.  
*perennis* L., ausdauernde, 4. f. Europa, Sibirien.  
*carinthiaca* Wulf., vid. *Lomatogonium carinthiacum* Nachtr.
- Swietenia** L., Mahagonibaum (Baron v. Swieten, berühmter Arzt zu Wien), X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Cedreleae.  
*febrifuga* Roxb., fiebertreibender, ♀ w. Ostindien.  
*Mahagony* L., echter, ♀ w. Westindien.  
*Chloroxylon* Roxb., vid. *Chloroxylon Swietenia*.
- Syagrus** Mart., Flaschenpalme, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.  
*cocoides* Mart., cocosähnliche, ♀ w. Brasilien.
- Symphoricarpos** Dill. (*Symphoria* P. Pursh.), Ballbeere, V. I., Caprifoliaceae.  
*montanus* H. B. K., Berg-B., ♀. k. Mexico.  
*racemosus* Mchx. (*Lonicera leucocarpa* Hort.), traubige, ♀. f. Nordamerika.  
 b) *puniceus* Sims.  
*vulgaris* Mchx. (*Symphoria glomerata* Pursh.), gemeine, ♀. f. Nordamerika.  
 b) *foliis variegatis*.
- Symphyandra** A. DC., Bandglocke, V. I., Campanulaceae.  
*armena* A. DC., armenische, 4. f. h. k. Caucasus, Armenien.  
*pendula* A. DC., überhängende, 4. f. h. k. Caucasus.
- Symphotrichum unctuosum* N. E., vid. *Aster tardiflorus* β.
- Symphytum** T. Schwarzwurz (Beinwell), V. I., Asperifoliaceae.  
*asperimum* MB. (*asperum* Lepech., *echinatum* Ledeb.), rauhe, 4. f. Caucasus.  
 b) *hybridum*.  
*bulbosum* Schimp. (*macrolepis* Gay, *filipendulum* Bischoff, *Clusii* Gmel., *punctatum* Gaud.), zwiebelwurzige, 4. Kn. f. Südeuropa.  
*bullatum* Jacq. (*tauricum* W.), hauchige, 4. f. Podolien.  
*caucasicum* MB., caucasische, 4. f. Caucasus.  
*cordatum* W. K. (*cordifolium* Baumg., *pannonicum* P.), herzblättrige, 4. f. Ungarn, Siebenb., Caucasus.  
*officinale* L., gebräuchliche, 4. f. Europa.  
 a) *patens* Sibth. (*violaceum*), β) *bohemicum* Sm. (*album*), γ) *coccineum* Hort.  
*orientale* L., morgenländische, 4. f. Taurien, Thracien.



**Symphytum**

peregrinum Ledeb., fremde, 4. f. Podolien.

tuberosum L., knollige, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

**Sympieza** Lichtstn., Zwergheide, IV. 1., Ericaceae.

capitellata Lichtstn., kopfförmige, 5. t. Cap d. gut. H.

**Symplocarpus** Salisb., Kugelkolben, IV. 1., Aroideae.

foetidus Salisb. Nutt., stinkender, 4. Wa. k. Nordamerika.

**Symplocos** L., Rechenblume, XVIII. 11., Sapotaceae  
Styraceae.

coccinea H. B. K., scharlachfarbige, 5. t. w. Mexico.

crataegoides Hamilt. D. Don, weifsdornähnliche, 5. t. Nepal.

sinica Ker., chinesische, 5. 5. t. k. China.

tinctoria L'Her., färbende, 5. k. China.

*Syncarpha gnaphaloides* DC., vid. *Helipterum gnaphaloides*.

**Syncephalanthia** Bartl., Bandköpfchen, XIX. 11.,  
Compositae - Corymbiferae.

decipiens Bartl., täuschendes, 6. f. Mexico.

**Syndesmanthus** Klotzsch, Benth., Bandheide, IV. 1.,  
Ericaceae.

*articulatus* Kl., *fasciculatus* Kl. et *scaber* Kl. sind  
synonym mit *Blairia* gleiches Namens p. 124.

*Syndesmon tuberosum* Hoffmsg., v. *Thalictrum tuberosum*.

**Synedrella** G., Synedrelle, XIX. 11., Compositae-  
Corymbiferae.

nodiflora G., knotenblumige, 6. m. f. w. Westindien.

**Synnotia** Swt. (W. Synnot, der auf dem Vorgebirge  
der gut. Hoffn. Pflanzen sammelte), III. 1., Irideae.

bicolor Swt., zweifarbig, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

galeata Swt., helmartige, 4. Zw. k. t. Cap der g. H.

variegata Swt., bunte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

*Syntherisma ciliare* Schrad. etc., vid. *Digitaria ciliaris* etc.

*Syrenia* Andr., vid. *Erysimum*.

**Syringa** L., Flieder, Lilac, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

chinensis W., (*media* Dum. Cour., *sibirica* Hort., *dubia*

P., *rothomagensis* Renault), chinesischer, 5. f. China.

b) Lilac royal, c) sanguinea Hort. (*coccinea* Lodd.,  
*chinensis rubra* Angl.)

Josikaea Jacq., fil. Josika's, 5. f. Siebenbürgen.

persica L., persischer, 5. 5. f. Persien.

b) alba Hort., c) laciniata Mill. (*capitata* Gmel.)

d) salvifolia Lodd.

vulgaris L., gemeiner, 5. f. Ungarn, Moldau, Persien etc.

a) coerulea Clus., b) violacea Curt. (*tatarica*

Hort.), c) alba d) alba major Lodd., e) alba plena

Lodd., f) rubra Lodd., g) rubra major Lodd.,

h) pumila Hort.

*Syringodea* D. et G. Don, vid. *Erica*.

*Syzygium caryophyllifolium* DC. etc. vid. *Calyptanthus ca-*  
*ryophyllifolia* etc.

**Szovitsia** Fisch. et Mey. (J. Szovits, russischer Bota-  
niker), V. 11., Umbelliferae.

callicarpa Fisch. et Mey., schönfrüchtige, 6. f. Armenien.

**Tabernaemontana** Plum. (J. T. Tabernaemontanus,

alter deutscher Botaniker), V. 1., Contortae Apocynae.

alba Mill. (*citrifolia* Jacq.), weiß, 5. w. Westindien.

amygdalifolia Jacq., mandelblättrige, 5. w. Südamerika.

arcuata R. et P., bogenförmige, 5. w. Peru.

**Tabernaemontana**

*citrifolia* L., citronenblättrige, f. w. Westindien.

*coronaria* W., gekrönte, f. w. Ostindien.

b) flore pleno.

*crispa* Loud., krause, f. w. Ostindien.

*cymosa* Jacq. (*multiflora* Lk.), afterdoldige, f. w. Neu-Granada.

*densiflora* Wall., dichtblumige, f. w. Ostindien.

*discolor* Sw., verschiedenfarbige, f. w. Jamaika.

*grandiflora* L., großblumige, f. w. Neu-Granada.

*gratissima* Lindl., angenehmste, f. w. Ostindien.

*laurifolia* L., lorberblättrige, f. w. Westindien, Brasilien.

*muricata* Lk., weichstachelige, f. w. Brasilien.

*odorata* Vahl, wohlriechende, f. w. Südamerika.

*persicariaefolia* Jacq., knöterichblättrige, f. w. Mascarenas.

*undulata* Vahl, wellenblättrige, f. w. Trinidad.

*Amsonia* Ait., vid. *Amsonia latifolia*.

**Tacca** Forst. (malayischer Name), VI. 1., Aroideae.

*aspera* Roxb., rauhe, 2. Zw. w. Ostindien.

*integrifolia* Ker, ganzblättrige, 2. w. Ostindien.

*guineensis* G. Don, guineische, 2. Zw. w. Guinea.

*laevis* Roxb., glatte, 2. Zw. w. Ostindien.

*phalifera* Boj., mascarenische, 2. Zw. w. Mascarenas.

*pinnatifida* Forst. (*Leontice Leontopetaloides* L.), fiederspaltige, 2. Kn. w. Molukken.

*phalifera* Rumph., vid. *Arum campanulatum*.

**Tachigalia** Aubl. (*Tachia* P.) (guianischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

*bijuga* DC. Steud. (*Leptolobium bijugum* Vogel), zweijochige, f. w. Brasilien

**Tacsonia** Juss. (Tacso, peruanischer Name), XVI. 11., Passifloreae.

*peduncularis* P., langstielige, f. Sch. w. Peru.

*pinnatistipula* Juss., fiederasterblättrige, f. Sch. w. Chili.

**Taenitis** Sw., Fadenfarren, XXIV. 1., Pteroideae.

*angustifolia* Spgl., schmalblättriger, 2. w. Westindien.

*graminifolia* Hock., grasblättriger, 2. w. Caribäen.

*lanceolata* Kaulf., lanzettblättriger, 2. w. Westindien.

**Tagetes** T., Studentenblume (Sammetblume), XIX. 11., Compositae - Corymbiferae.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, ♂. f. m. Mexico.

*caracasana* Humb., caracasische, ♂. f. m. Caracas.

*coronopifolia* W. (*clandestina* Lagasc., *Enalcida pilifera* Cass.), krähenfußblättrige, ♂. f. m. Mexico.

*corymbosa* Swt. (*tenuifolia* H. B. K.), traubendoldige, ♂. f. m. Mexico.

b) lutea.

*daucoides* Schrad., möhrenähnliche, ♂. f. m. Chili.

*erecta* L., aufrechte, ♂. f. m. Mexico.

b) flore pleno, c) flore fistuloso, d) flore sulfureo.

*Feuillaei* Bert. (*Lasthenia chilensis* DC.), Feuillées, ♂. f. m. Chili.

*filifolia* Lag., fadenblättrige, ♂. f. m. Mexico.

*florida* Swt., blüthenreiche, 2. k. f. b. Mexico.

*foetidissima* Hort. (*tanacetifolia* Hort.), starkstinkende, ♂. f. m. Mexico.

*lucida* Cav. (*integrifolia* Orteg.), schimmernde, 2. k. f. b. Mexico.

*micrantha* Cav., kleinblumige, ♂. f. m. Mexico.

**Tagetes**

*minuta* L. (*glandulifera* Schrk., *glandulosa* Lk., *bonariensis* P., *montana* Hort.), drüsige, ☉. f. m. Südamer.  
*patula* L., ausgebreitete, ☉. f. m. Mexico.

b) flore pleno, c) flore striato, d) nana, e) ranunculoides.

*signata* Bartl., gezeichnete, ☉. f. m. Mexico.

*subvillosa* Lag., wenigzottige, ☉. f. m. Mexico.

*tenuifolia* Cav., feinblättrige, ☉. f. m. Peru.

*papposa* Vent. (*pumila* Hort.), vid. *Dyssodia chrysanthemoides*.

**Talauma** Juss. (westind. Name), XIII. VI., Magnoliaceae.

*Candollii* Blum. (*T. odoratissima* et *Magnolia odoratissima* Reinwardt), de Candolles, ♀. ♀. w. Java.

*Plumieri* DC., Plumier's, ♀. ♀. w. Antillen.

*pumila* Blume, vergl. *Magnolia pumila* p. 488.

**Taliera** Mart. (einheimischer Name), VI. I., Palmae.

*bengalensis* Spgl., bengalische, ♀. w. Ostindien.

**Taligalea campestris** Aubl., vid. *Amasonia erecta*.**Talinum** Adans., *Talinum*, XI. I., Portulacae.

*Andrewsii* Swt. (*patens* Andr.), Andrew's, 4. ♀. w. Westindien.

*ciliatum* R et P., gefranztes, ☉. w. Peru.

*crassifolium* W., dickblättriges, ♀. w. ?

*crenatum* R. et P., gekerbtes, ☉. w. m. f. Peru.

*cuneifolium* W., keilblättriges, ♀. w. Arabien.

*fruticosum* W., strauchiges, ♀. w. Westindien.

*patens* W. (*reflexum* Cav.), abstehendes, ♂. w. Westind.

*Anacampseros* W. etc., vid. *Anacampseros rotundifolia* etc., *paniculatum* R. et P. etc., vid. *Calandrinia paniculata* etc.

**Talisia** Aubl. (Toulichy, guianischer Name), VIII. I., Sapindaceae.

*guianensis* Aubl. (*rosea* Vahl), guianische, ♀. w. Guiana.

**Tamarindus** T., Tamarindenbaum, XVII. II. (XVI. VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

*indica* L., indischer, ♀. w. Ostindien.

*occidentalis* DC., westindischer, ♀. w. Westindien.

**Tamarix** L., Tamariske, V. III., Aizoideae-Tamariscineae.

*africana* Dsf. Poir., afrikanische, ♀. ♀. f. b. k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

*articulata* Vahl, gegliederte, ♀. w. Aegypten, Ostindien.

*dioica* Roxb., zweihäusige, ♀. w. Ostindien.

*gallica* L., französische, ♀. ♀. f. b. k. Südfrankreich, Nordafrika.

α) *subtilis* Ehrenb., β) *narbonnensis* Ehbg., γ) *nilotica* Ehbg., δ) *arborea* Sbr., ε) *mannifera* Ehbg., ζ) *heterophylla* Ehbg., η) *libanotica* Lodd.

*hispida* W. (*pentandra* var. Pall., *tomentosa* Sm., *canescens* Desv.), steifhaarige, ♀. ♀. f. b. Am Casp. Meere.

*indica* W., indische, ♀. ♀. w. Ostindien.

*Pallasii* Desv. (*pentandra* Pall., *gallica* MB., *paniculata* Stev.), Pallas's, ♀. f. b. Caucasus.

*tetrandra* Pall., viermännige, ♀. ♀. f. b. Taurien.

*dahurica* W., *germanica* L. etc., vid. *Myricaria dahurica* etc.

**Tamonea** Aubl. (guianischer N.), XIV. II., Verbenaceae.

*curassavica* P. (*verbenacea* Sw.), curassavische, ♂. w. Westindien.

*mutica* P., unbewehrte, ♂. w. Guiana.



**Tamus** L., Schmeerwurz, XXII. VI., Sarmientaceae-Dioscoreae.

*communis* L., gemeine Sch., 4. f. England, Südeuropa, Mittelasien.

*cretica* L., cretische Sch., 4. f. k. Creta.

*Elephantipes* L'Her., vid. *Testudinaria Elephantipes*.

**Tanacetum** T., Wurmkraut (Rainfarn), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*argenteum* W., silberfarbiges, 4. f. Armenien.

*Barclayanum* DC. (*incanum* H. Angl.), Barclay's, 4. f. Sibirien.

*boreale* Fisch., nördliches, 4. f. Sibirien.

*canariense* DC. (*fruticosum* C. Sm.), canarisches, 5. k. canarische Inseln.

*Douglasii* DC. (*boreale* Hort. Angl.), Douglas's, 4. f. Nordamerika.

*fruticulosum* Ledeb., strauchiges, 4. 5. f. Sibirien.

*globiferum* DC. (*obtusum* Thbg.), kugelblumiges, 4. f. k. Cap der gut. Hoffn.

*grandiflorum* Thbg., großblumiges, 4. h. Cap d. g. H.

*linifolium* Thbg., flachsblättriges, 5. k. Cap. d. g. H.

*myriophyllum* W., vielblättriges, 4. f. Kleinasien.

*pauciflorum* Richards., wenigblumiges, 4. f. Nordamer.

*praecox* Fisch., frühes, 4. f. Sibirien.

*purpureum* D. Don, purpurfarbiges, 4. f. Nepal.

*sibiricum* L., sibirisches, 4. f. Sibirien.

*suffruticosum* L., halbstrauchiges, 5. k. Cap der g. H.

*Vahlia* DC. (*Achillea pauciflora* W.), Vahl's, 5. k. Span.

*vestitum* Thbg., bekleidetes, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

*vulgare* L., gemeines, 4. f. Europa, Mittelasien.

b) *variegatum*, β) *crispum*.

*angulatum* W., vid. *Achillea filipendulina*, *annuum*

L., vid. *Balsamita annua*, *millefoliatum* Fisch. et

Mey. v. *Achillea myriophylla*, *incanum* Dsf. (et *orientale*

Hort), vid. *Artemisia fasciculata*, *flabelliforme*

L'Her., vid. *Pentzia flabelliformis*.

**Tanaecium** Sw., *Tanaecium*, XIV. II., ? Solanaceae.

*pinnatum* W., gefiedertes, 5. w. Mascarenas, Mozambique.

**Tanghinia** A. P. Th. (madagascarischer Name) V. I., Contortae-Apocynae.

*veneniflua* A. P. Th. Poir., giftige, 5. w. Madagascar.

**Tapagomea purpurea** Aubl. etc., v. *Cephaelis purpurea* etc.

**Taraxacum** Hall. (*Leontodon* Auct.), Löwenzahn, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*bicolor* DC. (*L. leucanthum* Ledeb.), zweifarbiges, 4. f. Rußland.

*caucasicum* DC. (M. B.), caucasischer, 4. f. Caucasus.

*ceratophorum* DC. (Ledeb.), hörnertragender, 4. f. Rußl.

*eriopodum* (D. Don), wollfüßiger, 4. f. Nepal.

*erythrospermum* Andr. (*L. bessarabicus* Fisch., *L. obliquus* Fr.), rothsamiger, 4. f. Bessarabien etc.

*glauanthum* DC. (Ledeb.), grünlichblumiger, 4. f. Rußl.

*glaucescens* Rchb. (M. B.) (*L. salsus* Bess.), blaugrünl. licher, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

*laevigatum* DC. (*L. arcuatus* Tausch, *L. praecox* Kit., *L. cichoriaceus* Schlchr., *L. taraxacoides* Hoppe), kahler, 4. f. Europa.

β) *alpinum* (Hoppe), γ) *corniculatum* (Kit.).

*leptocephalum* Rchb., schlankköpfiger, 4. f. Mähren.

**Taraxacum**

- lyratum (Ledeb.), leierförmiger, 4. f. Rußland.  
 montanum DC. (C. A. Mey.), Berg-L., 4. f. Rußland.  
 nigricans (Kit.), schwärzlicher, 4. f. Ungarn.  
 obovatum DC. (W.), verkehrt-eiförmiger, 4. f. Spanien.  
 officinale Wigg. (*vulgare* Schrk., *Dens leonis* Dsf.), gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafr. u. Amer.  
 palustre DC. (*L. lividus* W. K., *L. salinus* Poll., *L. erectus* Hoppe), sumpfliebender, 4. f. Europa.

b) tenuifolius Hoppe.

- Scorzonera (Roth), haferwurzähnlicher, 4. f. Europa.  
 serotinum Poir. (W. K.) spätblumiger, 4. f. Osteuropa.

**Tarchonanthus** L., Pelzsame, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- camforatus L., kampferduftender, 5. k. Cap der g. H.  
 ellipticus Thbg., elliptischer, 5. k. Cap der gut. Hoffn.  
 dentatus Thbg., vid. Brachylaena nereifolia.

**Tauscheria** Fisch. (D. Tauscher zu Dresden, welcher Südrußland bereiste), XV. 1., Cruciferae.

- gymnocarpa Fisch., kahlschotige, 6. f. Sibirien.  
 lasiocarpa Fisch., haarschotige, 6. f. Sibirien.

**Taverniera** DC. (J. B. Tavernier, ein Franzose, der den Orient bereiste), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- lappacea DC., klettenähnliche, 5. k. t. Aegypten.  
 nummularia DC., pfennigkrautblättrige, 5. k. t. Arabien.

**Taxanthema australis** RB., vid. Statice australis.**Taxodium** Rich., Eibencypresse, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

- distichum Rich., zweizeilige, 5. f. Nordamerika.  
 a) patens Ait., b) nutans A. B., c) excelsum Booth,  
 d) sinense Nois., e) pendulum A. B.  
 juniperoides\* (*capense* Loud.), wachholderähnliche, 5. k.  
 Cap der guten Hoffnung.

- sempervirens Lamb., immergrüne, 5. k. f. b. Nordam.

**Taxus** T., Eibenbaum, XXII. XIII. (XVI. IX.), Coniferae-Taxineae.

- baccata L., gemeiner, 5. f. Europa, Mittel- u. Nordasien.  
 b) fastigiata Lindl. (*hibernica* Hook), c) procumbens Lodd., d) erecta A. B., e) foliis variegatis Lodd., f) fructu luteo A. B.

- canadensis W. (*baccata*,  $\beta$ . *minor* Mchx.), canadischer, 5. f. Canada.

- Harringtonia Knight., Harrington's, 5. k. Penang.

- Makoya Low, Makoy's, 5. k. f. b. Japan.

- chinensis* Roxb., *elongata* Thbg., *nucifera* Kämpf.,  
 vid. Podocarpus chinensis etc.

**Tecoma** Juss. (*Tecomaxochitl*, mexicanischer Name), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

- australis RB., neuholländische, 5. Sch. k. Neuholland.  
 capensis Bot. reg. (*Bign. capensis* Ait.), capische, 5. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

- incisa Swt. (*Bignonia inc.* Colv.), schlitzblättrige, 5. w. Südamerika.

- meonantha Swt., schmalblumige, 5. Sch. k. Neusüdwallis.  
 mollis H. B. K., weiche, 5. t. Mexico.

- pentaphylla Juss. (*digitata* Bonpl.), fünfblättrige, 5. w. Westindien, Brasilien.

- radicans Juss., starkwurzeln, 5. Sch. f. b. Nordamer.  
 b) minor.

**Tecoma**

- rosaefolia* H. B. K., rosenblättrige, ♀. w. Peru.  
*sambucifolia* H. B. K., hollunderblättrige, ♀. w. Peru.  
*sorbifolia* H. B. K., ebereschenblättrige, ♀. w. Quito.  
*splendida* Spgl. (*Esterhazia splendida* Mikan), ansehnliche, ♀. ♀. w. Brasilien.

*stans* Juss., eschenblättrige, ♀. w. Westindien.

*grandiflora* Swt. vid. *Incarvillea grandiflora*.

**Tectonia** L. (Tekka, malabarischer Name), Tekkabaum, V. I., Verbenaceae.

*grandis* L., großer, ♀. w. Ostindien.

**Teedia** Rudolph. (*Borkhausenia* Roth.), Teedie, XIV. II., Personatae - Antirrhineae.

*lucida* Rudolph., schimmernde, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

*pubescens* Burch., weichhaarige, ♂. k. Cap der g. H.

**Teesdalia** RB. (R. Teesdale, ein engl. Botaniker), XV. II., Cruciferae.

*nudicaulis* RB. (*Iberis* DC.), nacktstengelige, ☉. f. Europa.

*regularis* Sm. (*Lepidium* DC.), gleichkronige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Telekia** Baumg., vid. *Bupthalmum*.

**Telephium** L., Wundkraut, V. III., Portulacaceae.

*Imperati* L., Imperatis, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Telfairia pedata** Hook., vid. *Joliffia africana*.

**Tellima** RB. (Anagramm v. Mitella), X. II., Sazifrageae.

*grandiflora* Dougl., großblumige, 4. f. Nordamerika.

**Telopea** RB., *Telopea*, IV. I. Proteaceae.

*speciosissima* RB., schönste, ♀. t. Neusüdwallis.

**Teloxis aristata** Moq. Tand., vid. *Chenopodium aristat.*

**Templetonia** RB. (J. Templeton, irländischer Botaniker), XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*glauca* Sims, blaugrüne, ♀. t. Neuholland.

*retusa* RB., abgestutzte, ♀. t. Neuholland.

**Tenoria arborescens** Spgl. etc., v. *Bupleurum arboresc.* etc.

**Tephrosia** P., Aschenwicke, XVII. IV. (VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

*Apollinea* Spgl., apollinische, ♀. w. Oberägypten.

*biflora* DC., zweiblumige, ♀. w. ?

*candida* DC., weißblättrige, ♀. w. Ostindien.

*capitulata* Lk., kleinköpfige, 4. w. Sandwichinseln.

*caribaea* P. caribäische, ♀. w. Westindien.

*chilensis* Trev., chilesische, 4. k. t. Chili.

*chinensis* Lindl., chinesische, ♀. w. China.

*colonila* Loud., gebaute, ♀. w. Ostindien.

*fruticosa* DC., strauchige, ♀. w. Ostindien.

*grandiflora* P., großblumige, ♀. k. Cap der guten H.

*Heyniana* Roxb., Heyne's, ♀. w. Ostindien.

*hypargyra* DC., silberweißliche, ♀. w. Ostindien.

*lanceaefolia* Lk., lanzettblättrige, ♀. t. ?

*linearis* P., gleichbreitblättrige, ♀. w. Guinea.

*litoralis* P., uferliebende, 4. w. Südamerika.

*mucronata* DC., stachelspitzige, ♀. t. Cap der gut. H.

*ochroleuca* P., weißgelbe, ♀. w. Westindien.

*pallens* P., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*piscatoria* P., Fischer-A., ♂. w. Ostindien.

*purpurea* P., purpurfarbige, 4. w. Ceylon.

*sericea* P., seidenhaarige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

*stricta* P., steife, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

*suberosa* DC., korkige, ♀. w. Ostindien.



**Tephrosia**

toxicaria P., giftige, ♀. w. Südamerika.

villosa P., zottige, ♀. w. Ostindien.

virginiana P., virginische, 4. f. Nordamerika.

*longifolia* P., vid. *Sweetia longifolia*.

**Teramnus** P. Br., Laubenbohne, XVII. iv. (vi.) (Xvi. vi.) Leguminosae-Papilionaceae.

uncinatus Sw., hakige, ♀. Sch. w. Jamaica.

volubilis Sw., windende, ♀. Sch. w. Jamaica.

**Terminalia** L., Catappenbaum, X. i. (XXIII. i.), Combretaceae.

arbuscula Sw., strauchiger, ♀. w. Südamerika.

Bellirica Roxb., Bellirica-C., ♀. w., Ostindien.

Benzoin L. suppl. (*angustifolia* Jacq.), schmalblättriger, ♀. w. Ostindien.

Biticaria Roxb., Biticaria-C., ♀. w. Ostindien.

Catappa L., gemeiner, ♀. w. Ostindien.

Chebula Roxb., drüsiger, ♀. w. Ostindien.

citrina Roxb., citronengelber, ♀. w. Ostindien.

disticha Lodd., zweizeiliger, ♀. w. ? Ostindien.

gangetica Roxb., Ganges-C., ♀. w. Ostindien.

latifolia Sw., breitblättriger, ♀. w. Westindien.

madagascariensis Spgl. (*Fatraea* Boj.), madagascarischer, ♀. w. Madagascar.

molluccana Lam. (*glabrata* Forst.), molukkscher, ♀. w. Molukken, Societätsinseln.

procera Roxb., hoher, ♀. w. Ostindien.

rotundifolia Lodd., rundblättriger, ♀. w. ? Ostindien.

subcordata H. B. K., herzblättriger, ♀. w. Südamerika.

**Ternstroemia** L. (M. Ternstroem, schwedischer Naturforscher), XIII. i., Ternstroemiaceae.

brevipes DC., kurzstielige, ♀. ♀. w. Südamerika.

dentata Sw., gezahnte, ♀. ♀. w. Guiana.

peduncularis DC., langstielige, ♀. ♀. w. Caribäen.

punctata Sw., punctirte, ♀. ♀. w. Guiana.

venosa Spgl., aderige, ♀. ♀. w. Brasilien.

**Terpnanthus jasmiodorus** Mart. v. *Spiranthera odoratissima*.**Testudinaria** Salisb., Schildkrötenpflanze, XXII. vi., Sarmantaceae-Dioscoreae.

Elephantipes Burch., elefantenfußförmige, 4. Sch. Kn. t. Cap der guten Hoffnung.

montana Burch., Berg-S., 4. Sch. Kn. t. Cap d. g. H.

rupicola Ecklon, Felsen-S., 4. Sch. Kn. t. C. d. g. H.

sylvatica Ecklon, Wald-S., 4. Sch. Kn. t. C. d. g. H.

**Tetracera** L., Vierhorn, XIII. iv., Dilleniaceae.

alnifolia W. (*potatoria* Afzel.), erlenblättriges, ♀. Sch. w. Guinea.

volubilis L. (*Dillenia scandens* Hort.), windendes, ♀. Sch. w. Südamerika.

*Calinea* W. vid. *Doliocarpus Calinea*, *sarmentosa* Vahl, vid. *Delima sarmentosa*.

**Tetracme quadricornis** Bunge, vid. *Notoceras quadricorne*.**Tetradium** Lour., Vierling, XXII. iv., Amyrideae-Connaraceae.

trichotomum Lour., dreizinkiger, ♀. w. Cochinchina.

**Tetragonia** L., Vierecksfrucht, XII. ii., Aizoideae-Ficoideae.

crystallina L'Her., krystallartige, ☉. f. m. Peru.

decumbens Mill., niederliegende, ♀. k. Cap der g. H.

echinata Ait., igelstachelige, ♂. k. Cap der guten H.

**Tetragonia**

expansa Murr. (*halimifolia* Forst., *japonica* Thbg.), ausgebreitete (Neuzeeländ. Spinat), ☉. f. m. Neuzeeländ, Japan.

fruticosa L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

herbacea L., krautartige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

linearis Haw., gleichbreitblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.

obovata Haw., verkehrteiförmige, ♀. k. Cap der g. H.

spicata L., ährenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

Tetrapteris Haw., geflügelte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

**Tetragonolobus** Riv. Scop., Spargelerbse, XVII. IV.

(VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

biflorus Spgl., zweiblumige, ☉. f. Sicilien, Numidien.

conjugatus Lk., gepaarte, ☉. f. Südfrankreich.

purpureus Mch., purpurfarbige, ☉. f. Italien, Südfrankr.

b) flore luteo.

siliquosus Roth, Wiesen-S., 4. f. Europa.

β) maritimus Roth.

**Tetragonotheca** L'Her., Würfelkelch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

helianthoides L'Her., sonnenblumenähnlicher, 4. f. Nordamerika.

*abyssinica* Ledeb., vid. *Guizotia oleifera*.

**Tetramerium** G. fil., Viersäumler, IV. I., Rubiaceae.

odoratissimum G. fil., wohlriechendster, ♀. w. Westind.

paniculatum Spgl., rispenblumiger, ♀. ♀. w. Guiana.

**Tetramicra** Lindl., Vierorche, XX. I., Orchideae.

rigida Lindl. (*Brassavola elegans* Bot. mag.), starre, 4. w. Westindien.

**Tetranthera** Jacq., Vierfächerbeutel, IX. I., Laurineae.

Cervantesii Loud. (H. B. K.), Cervantes's, ♀. w. Mexico.

citrifolia Spgl. (*apetala* Roxb.), citronenblättriger, ♀. t.

w. Coromandel, Neuholland.

dealbata RB., weisblättriger, ♀. t. Neuholland.

ferruginea RB., rostfarbiger, ♀. t. Neuholland.

glarescens Spgl., blaugrünlicher, ♀. w. Mexico.

laurifolia Jacq., lorbeerblättriger, ♀. w. t. Japan, China.

sebifera Spgl., talggebender, ♀. w. Ostindien.

trinervia Spgl. (*Litsaea zeylanica* N. E.), dreinerviger, ♀. w. Ostindien, China.

**Tetranthus** Sw., Vierblümmler, XIX. II., Compositae-Eupatorineae.

litoralis Sw., uferliebender, 4. w. Hispaniola.

**Tetrapeltis** Wall., Vierschildchen, XX. I., Orchideae.

fragrans Wall., wohlriechendes, 4. w. Nepal.

**Tetrapogon** Dsf., Vierbart, III. II., Gramineae.

villosus Dsf., zottiger, ☉. f. Nordafrika.

**Tetrapoma** Turcz., Vierklappler, XV. II., Cruciferae.

barbareaefolium Turcz. (*Camelina b.* DC.), barbareablätteriger. ♂. f. Dahurien.

**Tetrapteris** Cav., Vierflügel, X. III., Malpighiaceae.

buxifolia Cav., buxusblättriger, ♀. w. Westindien.

citrifolia P., (*inaequalis* Cav.), citronenblättriger, ♀. w. Jamaica.

**Tetrapterygium** Fisch. et Mey., Vierflügelschote, XV. III., Cruciferae.

glastifolium Fisch. et Mey., waidblättriger, ☉. f. Armenien.

**Tetratheca** Sm., Vierbüchse, VIII. I., Polygalaceae-Tremandreae.

ericaefolia Sm., heideblättriger, ♀. t. Neuholland.

**Tetradlea**

*glandulosa* La Bill., drüsige, ♀. t. Van-Diemensland.

*junceae* Sm., simsienförmige, ♀. t. Neusüdwallis.

*pilosa* La Bill. (*glandulosa* Sm.), haarige, ♀. t. Van-Diemensland.

*rubroides* Cunn., rötheähnliche, ♀. t. Neuholland.

*thymifolia* Sm., thymianblättrige, ♀. t. Neuholland.

**Teucrium** T. L., Gamander XIV. 1., Labiatae.

*abutiloides* L'Her., (*macrophyllum* Lam.), großblättriger, ♀. k. Madeira.

*angustissimum* Schreb. (*Chulilia* Cav.), schmalster, ♀. k. Spanien.

*Arduini* Schreb., Arduin's, ♀. k. Griechenl., Kleinasien.

*asiaticum* L., asiatischer, ♀. k. ? Ostindien.

*aureum* Schreb. (*flavicans* Lam.), goldfarbiger, ♀. k. Westeuropa, Sicilien, Griechenland, Syrien.

*betonicum* L'Her. (*betonicaefolium* Jacq., *maderense* Lam.), betonienblättriger, ♀. k. Madeira.

*Botrys* L., halbquirblüthiger, ☉. f. Europa, Mittelasien.

*bracteatum* Dsf., deckblättriger, 4. k. Nordafrika.

*brevifolium* Schreb., kurzblättriger, ♀. k. Creta.

*buxifolium* Schreb. (*saxatile* Cav.), buxusblättriger, ♀. k. Südspanien.

*campanulatum* L., glockenkelchiger, 4. k. f. b. Italien, Griechenland.

*canadense* L., canadischer, 4. f. Nordamerika.

*canum* Fisch. et Mey., weifsgrauer, ♀. k. Armenien.

*capitatum* L., kopfförmiger, ♀. k. Westeuropa, ionische Inseln etc.

*Chamaedrys* L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien.

*creticum* L. (*hyssopifolium* Schreb., *rosmarinifolium* Hort.), cretischer, ♀. k. Creta.

*cubense* L., cubaischer, ☉. ♂. w. Cuba.

*flavescens* Schreb., gelblicher, ♀. k. Südfrankreich.

*flavum* L., hellgelber, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

*fruticans* L., strauchiger, ♀. k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

β) *latifolium* W.

*gnaphalodes* L'Her., ruhrkrautähnlicher, ♀. k. Spanien.

*heterophyllum* L'Her. (*canariense* Lam.), verschiedenblättriger, ♀. k. Canarische Inseln.

*hyrcanicum* L., hyrcanischer, 4. f. b. k. Nordpersien, Caucasus.

*inflatum* Sw., aufgeblasener, 4. w. Jamaika.

*laevigatum* Vahl., glatter, 4. t. Südamerika.

*Laxmanni* Murr., Laxmann's, 4. f. Osteuropa, Sibirien.

*lucidum* L., starkglänzender, 4. f. k. Italien, Griechenl.

*lusitanicum* Schreb., portugiesischer, ♀. k. Portugal.

*Marum* L. (*Marum verum* Hort.), Katzen-G., ♀. k. Spanien.

*massiliense* L., französischer, ♀. k. Südfrankr., Creta.

*montanum* L., Berg-G., ♀. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Asien.

β) *supinum* L.

*multiflorum* L., vielblumiger, ♀. k. Spanien.

*Nissolianum* L., Nissolle's, ☉. f. Spanien, Portugal.

*orchideum* Lindl. (*heterophyllum* Cav.), orchisähnlicher, ♀. k. Chili.

*orientale* L., morgenländischer, 4. k. f. Kleinas., Caucas.

*Polium* L., Polei-G., ♀. k. Südeuropa, Asien.

*Pseudohyssopus* Schreb., ysopähnlicher, ♀. k. Italien.



**Teucrium**

- Pseudo-Chamaepitys* L., feinblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
- Pseudo-Scorodonia* Dsf., scorodonienähnlicher,  $\frac{1}{2}$  k. Nordafrika.
- pumilum* L., kleiner,  $\frac{1}{2}$  k. Spanien.
- pynophyllum* Schreb., dichtblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Spanien.
- pyrenaicum* L., pyrenäischer,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Pyrenäen.
- regium* L., königlicher,  $\frac{1}{2}$  k. Spanien.
- resupinatum*, Dsf., umgekehrtkroniger,  $\odot$  f. Nordafrika.
- saxatile* Lam. (*rotundifolium* P.), Gesteins-G.,  $\frac{1}{2}$  k. Südspanien.
- scordioides* Schreb., wasserlauchähnlicher,  $\frac{1}{2}$  f. b. k. Creta, Portugal.
- Scordium* L., knoblauchduftiger (Wasserlauch),  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- Scorodonia* L., Scorodonien-G.,  $\frac{1}{2}$  f. Mittel- u. Südeuropa.
- spinosum* L., dorniger,  $\odot$  f. Spanien, Portug., Kleinas.
- subspinosum* Pour., wenigdorniger,  $\frac{1}{2}$  k. Balearen.
- thymifolium* Schreb., thymianblättriger,  $\frac{1}{2}$  k. Spanien.
- trifidum* Retz (*capense* Thbg.), dreispaltiger,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der guten Hoffnung.
- virginicum* L., virginischer,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- rhombifolium* W., vid. *Hyptis canescens*, *sibiricum* L., vid. *Nepeta sibirica*.
- Thalamia asplenifolia* Spgl., vid. *Phyllocladus rhomboidalis*, *cupressina* Spgl. vid. *Dacrydium cupressinum*.
- Thalia** L. (Joh. Thal, alter deutscher Arzt und Botaniker), I. 1., Scitamineae-Cannaceae.
- dealbata* Fras., weißliche,  $\frac{1}{2}$ , Wa. t. w. Südcarolina.
- geniculata* L., gegliederte,  $\frac{1}{2}$  w. Westindien.
- Thalictrum** T., Wiesenraute, XIII. VI., Ranunculaceae.
- I. Genuin.
- acutilobum* DC., spitzlappige,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien.
- alpinum* L., Alpen-W.,  $\frac{1}{2}$  f. Europäische Alpen, Sibirien, Nordamerika.
- ambiguum* H. Berol. (non Schlchr.), zweifelhafte,  $\frac{1}{2}$  f. ? Sibirien.
- angustifolium* Jacq. (*Bauhini* Spgl., *nigricans* Gaud.), schmalblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- $\beta$ ) *heterophyllum* Wimm. et Grab. (*nigricans* DC., *Morisoni* Gmel.)
- apiculatum* Tausch., kurzspitzige,  $\frac{1}{2}$  f. ?
- appendiculatum* C. A. Mey., anhängselige,  $\frac{1}{2}$  f. Altai.
- aquilegifolium* L., akeleiblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Europa, Sibirien.
- $\beta$ ) *atropurpureum* Jacq.,  $\gamma$ ) *formosum* Sims.
- calabricum* Spgl., calabrische,  $\frac{1}{2}$  f. Calabrien, Sicilien.
- capillare* Rchb., haarförmige,  $\frac{1}{2}$  f. Südeuropa.
- carolinianum* Bosc. (*rugosum* Pursh.), carolinische,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- Chelidonii* DC., Schöllkraut-W.,  $\frac{1}{2}$  f. k. Nepal.
- cinereum* Dsf., aschfarbige,  $\frac{1}{2}$  f. ?
- clavatum* DC., keulförmige,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamerika.
- collinum* Wallr. (*minus* Jacq., *stipulaceum* Hort., *flexuosum* Rchb.), Hügel-W.,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- concinnum* W., nette,  $\frac{1}{2}$  f. ?
- contortum* L., gedrehte,  $\frac{1}{2}$  f. Ostsibirien.
- Cornuti* L. (*corynellum* DC.), Cornut's,  $\frac{1}{2}$  f. Nordamer.
- crenatum* DC., gekerbte,  $\frac{1}{2}$  f. Südeuropa.
- cynapiifolium* Fisch., gleifseblättrige,  $\frac{1}{2}$  f. Sibirien.

**Thalictrum**

diffusum Schrad., weitschweifige, 4. f. ?  
 dioicum L., zweihäusige, 4. f. Nordamerika.  
 divaricatum W., ausgesperrte, 4. f. ?  
 divergens Lk. (*divaricatum* Spgl.), divergierende, 4. f. Sibirien.

elatum Jacq., hohe, 4. f. Süd- und Osteuropa.

exaltatum C. A. Mey., höchste, 4. f. Sibirien.

falcatum H. P., sichelförmige, 4. f. ?

flavum L. (*nigricans* Jacq., *anonymon* Wallr., *heterophyllum* Lej.), hellgelbe, 4. f. Europa, Sibirien.

foetidum L. (*saxatile* Vill.), stinkende, 4. f. Südeuropa, Böhmen.

β) alpestre Gaud.

galioides Nestl. (*Bauhini* Crtz.), labkrautähnliche, 4. f. Ost-, Süd- und Westdeutschland, Frankreich.

glaucescens DC., blaugrünliche, 4. f. ? Rußland.

glaucum Dsf. (*speciosum* Poir.), blaugüne, 4. f. Südeur.

laserpitiifolium W. (*lucidum* DC.), laserkrautblättrige, 4. Süd- und Westeuropa.

lucidum L. (*medium* Jacq.), starkglänzende 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

mexicanum DC., mexicanische, 4. k. Mexico.

microcarpum C. A. Mey., kleinfrüchtige, 4. f. Altai.

minus L. (*majus* Jacq.; *montanum* Wallr.), kleine, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, England.

β) pubescens Schlchr. DC. (*mont. glandulosum* Wallr.), γ) roridum Wallr. (*glaucescens* W.),

δ) dumosum K. (*majus* Sm., *elatum* Gaud., *ambiguum* Schlchr.)

nutans Dsf. (*acuminatum* Spgl.), nickende, 4. f. Südeuropa.

oligospermum Fisch., wenigsamige, 4. f. Sibirien.

palmatum Walt. Mühlbg. (*ranunculinum* W.), handförmige, 4. f. Carolina.

petaloideum L. (*stamineum* L. suppl.), grofskronige, 4. f. Südsibirien, Mongolei.

polygamum Mühlbg., vielehige, 4. f. Pennsylvanien.

purpurascens L., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.

repens, C. A. Mey., kriechende, 4. f. Altai.

revolutum DC. (*pubescens* Pursh.), zurückgerollte, 4. f. Nordamerika.

rosmarinifolium Nocc. Polli., rosmarinblätt., 4. f. Italien.

rufinerve Lej. et Court., rothgelbnervige, 4. f. Westdeutschland, Belgien.

rugosum Ait. (*discolor* W.), runzelige, 4. f. Nordamer.

saxatile DC. (*minus* Poll. Sm.), Gesteins-W., 4. f. Deutschland, Frankreich, England.

Schweiggerii Spgl., Schweigger's 4. f. ?

sibiricum L. (? *flexuosum* Bernh.), sibirische, 4. f. Sibir.

b) ruthenicum Hort.

simplex L. (*tenuifolium* Sw.), einfache, 4. f. Scandien, Schweiz, Oberitalien, Dauphinée.

sparsiflorum Turcz., zerstreutblumige, 4. f. Dahurien.

squarrosus Steph., sparrige, 4. f. Sibirien.

trigynum Fisch., dreieibige, 4. f. Sibirien.

vaginatum Dsf., scheidige, 4. f. Sibirien.

II. *Syndesmon* Hffg.

anemonoides Mchx. (*S. thalictroides* \*), anemonenähnliche, 4. Kn. f. Nordamerika.

**Thalictrum**

b) flore pleno.

tuberosum L., knollige, 4. Kn. f. Spanien.

**Thamnochortus** Berg., Strauchgras, XXII. III. (III. 1.), Restiaceae.

dichotomus RB., zweizinkiges, 5. k. t. Cap der g. H.

**Thapsia** L., Thapsie, V. II., Umbelliferae.

Asclepium L., schwalbenwurzähnliche, 4. k. f. b. Süditalien, Griechenland.

foetida L., stinkende, 4. k. f. b. Span., Italien, Griechenl.

garganica L. (*Ferula neapolitana* Tenor.), garganische, 4. k. f. b. Süditalien, Creta, Nordafrika.gummifera Spgl. (*tenuifolia* Barr., *praealta* Urv.), gum-migebende, 4. k. Griechenl., Span., Portug., Nordafr.

Laserpitii Spgl., laserkrautähnliche, 4. k. Apulien, Atlas.

trifoliata Mill. (*Ligusticum barbinode* Mchx., *Smyrniun* b. Bart., *Thaspium* Nutt.), dreiblättrige, 4. f. Nordam.

villosa L., zottige, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

**Thea** L., Theestrauch, XIII. 1. (XVI. VIII.), Ternstroemiaceae (*Camelliaceae*.)Bohea L. (*chinensis*  $\beta$ . *Bohea* Sims DC.), brauner, 5. 5. k. China, Japan. $\alpha$ ) laxa Ait.,  $\beta$ ) stricta Ait.viridis L. (*chinensis*  $\alpha$ . *viridis* Sims DC.), grüner, 5. 5. k. China, Japan.

b) latifolia Lodd.

**Thelygonum** L., Hundskohl, XXI. IX., Azioideae-Atripliceae.

Cynocrambe L., gemeiner, 6. f. Südeuropa, Griechenland, Ostindien.

**Thelymithra** Forst., Frauenmütze, XX. 1., Orchideae.

angustifolia RB., schmalblättrige, 4. Kn. t. w. Neuholl.

carnea RB., fleischfarbige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

ixioides Sw., ixienähnliche, 4. Kn. t. w. Neuholland.

longifolia J. R. Forst. (*Forsteri* Sw.), langblättrige, 4. Kn. t. w. Neuzeeland, Van-Diemensland.

media RB., mittlere, 4. Kn. t. w. Neuholland.

pauciflora RB., wenigblumige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

venosa RB., aderige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

**Thenardia** H. B. K. (M. Thenard, berühmter franz. Chemiker), V. 1., Contortae-Apocynae.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, 5. Sch. w. Mexico.

**Theobroma** L., Cacaobaum, XVIII. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

bicolor Humb., zweifarbiger, 5. w. Neugranada.

Cacao L., ächter, 5. w., Südamerika.

guianense W., guianischer, 5. w. Guiana.

*Guazuma* L., vid. *Guazuma ulmifolia*.**Theophrasta** L. (Theophrastos Eresios, griechischer Philosoph u. Naturforsch.), VI., Sapotaceae-Myrsineae.

americana L., amerikanische, 5. w. Südamerika.

Jussieui Lindl., Jussieu's, 5. w. Westindien.

*longifolia* L. Jacq. etc., v. *Clavija ornata* etc., *ser-**ratifolia* Hort., vid. *Brexia spinosa*.**Thermopsis** RB. (*Thermia* Nutt.), Fuchsbohne, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.corgonensis DC. (*Thermia alpina* Spgl.), corgonische, 4. f. Altai.fabacea DC. (*rhombifolia* Rich. Nutt.), rautenblättrige, 4. f. Louisiana.



**Thermopsis**

*lanceolata* RB. (*lupinoides* Lk.), lanzettblättrige, 4. f. Sibirien, Kamschatka.

*laburnifolia* D. Don vid. *Piptanthus nepalensis*.

**Thesium** L., Leinblatt, V. 1., Sandalaceae.

*alpinum* L., Alpen-L., 4. f. Europa.

*amplexicaule* L., stengelumfassendes, 5. k. C. d. g. H.

*divaricatum* Jan., ausgesperartes, 4. f. Oesterreich. Litorale.

*ebracteatum* Hayne, deckblattloses, 4. f. Norddeuschl.

*elegans* Roch., zierliches, 5. k. Banat.

*Linophyllum* ? L. et Auct. (*intermedium* Schrad.), gemeines, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.

*montanum* Ehrh., Berg-L., 4. f. Europa.

*pratense* Ehrh., Wiesen-L., 4. f. Europa.

*ramosum* Hayne (*palatinum* Roth.), ästiges, 4. f. Unterösterreich.

*rostratum* M. et K., schnabelförmiges, 4. f. Schweiz, Baiern, Tyrol, Salzburg.

*drupaceum* La Bill., vid. *Leptomeria* Billardieri,

*umbellatum* L., vid. *Comandra umbellata*.

**Thespesia** Corr., Göttermalve, XXI. VIII., Malvaceae.

*grandiflora* DC., großblumige, 5. w. Porto-Rico.

*populnea* Corr., pappelblättrige, 5. w. Ost- u. Westind. β) *guadalupensis* DC.

**Thisantha glomerata** Eckl. et Zeyh., v. *Crassula glomerata*.**Thlaspi** T., Täschelkraut, XV. II., Cruciferae.

*alliaceum* L., knoblauchduftendes, ☉. ♂. f. Mittel- u. Südeuropa, Holstein.

*alpestre* L. (*caerulescens* Presl, *calaminare* Lej.), Vor-alpen-T., ♂. 4. f. Mitteleuropa.

*alpinum* Jacq. (*sylvium* Gaud.), Alpen-T., 4. f. Schweiz, österreichische etc. Alpen.

*arvense* L., Acker-T., ☉. f. Europa, Nordamerika.

*cepeaefolium* K., fettblättriges, 4. f. b. Kärnthen, Apenninen.

*ceratocarpum* Murr., hörnerschotiges, ☉. f. Sibirien.

*collinum* MB., Hügel-T., ☉. f. Caucasus.

*latifolium* MB. (*Lepia latif.* Desv.), breitblättriges, 4. f. Caucasus

*montanum* L., Berg-T., 4. f. Mitteleuropa.

*perfoliatum* L. (*alpestre* Huds. Gmel.), durchwachsblättriges, ☉. ♂. f. Mitteleuropa, Mittelasien.

*platycarpum* Fisch. et Mey., breitschotiges, ☉. ♂. f. Natolien.

*praecox* Wulf., frühes, 4. f. Oesterreich. Litorale.

*rotundifolium* K., rundblättriges, 4. f. b. Mittel- und südeuropäische Alpen.

*stylosum* \*, langgriffeliges, ♂. k. f. b. Neapel.

*umbellatum* Stev. Gmel. jun., doldiges, ☉. f. Nordpersien.

*arabicum* MB. (et *saxatile* L.), v. *Aethionema Buxbaumii* et *saxatile*, *bursa pastoris* L., v. *Capsella* b., *campestre* L. etc., v. *Lepidium campestre* etc.,

*luteum* Biv., v. *Bivonaea lutea*, *nudicaule* Dsf., v. *Teesdalia regularis*, *Psychine* W., vid. *Psychine*

*stylosa*.

**Thomasia** Gay. (M. Thomas, schweizer. Botaniker), V. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

*dumosa* Cunn., heckige, 5. t. k. Neuholland.

*foliosa* Gay, blattreiche, 5. t. k. Neuholland.

*purpurea* Gay, purpurfarbige, 5. t. k. Neuholland.

*quercifolia* Gay, eichenblättrige, 5. t. k. Neuholland.

**Thomasia**

solanacea Gay, nachtschattenähnliche,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Neuholl.  
triphylla Gay, dreiblättrige,  $\frac{1}{2}$ . t. k. Neuholland.

**Thouinia** Poir. (And. Thouin, Intendant des botanisch.  
Gartens zu Paris), VIII. 1., Sapindaceae.

pinnata Turp., gefiederte,  $\frac{1}{2}$ . w. Hispaniola.

**Thrinax** L. fil., Schilfpalme, VI. 1., Palmae.

parviflora Sw., kleinblumige,  $\frac{1}{2}$ . w. Jamaika.

**Thrinicia** Roth., Thrinicie, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

hirta Roth., kurzhaarige, 4. f. Europa.

$\beta$ ) nudicalyx Lag.,  $\gamma$ ) Leysseri Wallr.

hispida Roth. (*taraxacoides* Gaud.), steifhaarige,  $\odot$ . f. Süd- und Westeuropa.

maroccana P. (*mauritanica* Spgl.), marokkanische,  $\odot$ . f. Mauritanien.

tuberosa DC., knollige, 4. Kn. f. Südeuropa.

**Thryallis** L., Thryallis, X. III., Malpighiaceae.

brachystachys Lindl., kurzährlige,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Brasilien.

**Thuja** L., Lebensbaum, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

chilensis Lamb., chilesischer,  $\frac{1}{2}$ . k. Chili.

cupressoides L. (*aphylla* Auct.), cypressenähnlicher,  $\frac{1}{2}$ . k. Cap der guten Hoffnung.

occidentalis L., gemeiner,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika, Sibirien.

b) variegata Lodd., c) odorata Marsh.

orientalis L., morgenländischer,  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. China, Japan.

b) stricta Hort., (*pyramidalis* Bauh.), c) tatarica Lodd. ?, d) nepalensis Lodd.

pendula Lamb. (*filiformis* H. Angl.), überhängender,  $\frac{1}{2}$ . f. Tatarei.

pensilis Lamb., hängender,  $\frac{1}{2}$ . k. China.

plicata Donn, Lamb., gefalteter,  $\frac{1}{2}$ . f. Nordamerika.

sphaeroidea Rich., kugelzapfiger, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: australis Bosc., inaequalis Dsf., lineata Poir.

*aphylla* L., v. *Tamarix articulata*, *articulata* Vahl., vid. *Callitris quadrivalvis*.

**Thunbergia** L. (C. P. Thunberg, berühmter schwedischer Botaniker u. Reisender), XIV. 11., Acanthaceae.

alata Hook., geflügelte,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Westafrika.

b) albiflora Hook. (*leucantha* Hort.), c) flava Hffsg.

angulata Boj. Hook., kantige,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Madagascar.

capensis Retz., capische,  $\frac{1}{2}$ . Sch. t. Cap der guten H.

coccinea Wall., scharlachfarbige,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Bengalen.

cordata Coll., herzblättrige,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Trinidad.

fragrans Roxb., wohlriechende,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Ostindien.

grandiflora Roxb., großblumige,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Ostindien.

Hawtayneana Wall., Hawtayne's,  $\frac{1}{2}$ . Sch. w. Ostind. Nepal.

**Thymbra** L., Thymbra, XIV. 1., Labiatae.

ciliata Dsf., gefranzte,  $\frac{1}{2}$ . k. Nordafrika.

spicata L., ährenförmige,  $\frac{1}{2}$ . k. Levante.

verticillata L., wirtelförmige,  $\frac{1}{2}$ . k. Griechenland.

**Thymus** T., Thymian, XIV. 1., Labiatae.

angustifolius P., (*Serpyllum* Fr., *exserens* Ehrh.), schmalblättriger,  $\frac{1}{2}$ . f. Europa.

b) flore albo.  $\beta$ ) acicularis W. K.

azoricus Ait., azorischer,  $\frac{1}{2}$ . k. Azoren.

azureus Maund., azurblauer,  $\frac{1}{2}$ . f. Südeuropa.

cephalotus L., großköpfiger,  $\frac{1}{2}$ . k. Spanien, Portugal.

# Thymus

Chamaedrys Fr. (*Serpyllum* Auct., *includens* Ehrh.),  
Gamander-T.,  $\S$ . f. Europa.

b) *citriodorus* Schreb., b) *subcitratus* Schreb.,  
d) *sylvestris* Schreb.

*citriodorus* Gmel. Lk., citronenduftender,  $\S$ . k. f. b.  
Südeuropa.

*collinus* MB., Hügel-T.,  $\S$ . f. Podol., Taurien, Caucas.

*corsicus* P., corsischer,  $\S$ . k. Corsica.

*creticus* Brot. (*capitatus* Lk., *Satureja capitata* L.),  
cretischer,  $\S$ . k. Süd- und Westeuropa.

*elongatus* Schrad., verlängerter,  $\S$ . k. ?

*glabrescens* Lk. (*adscendens* Bernh.), kahler,  $\S$ . f. Süd-  
und Westeuropa.

*hirsutus* MB. (*hirtus* W.), rauhhariger,  $\S$ . f. Caucasus,  
Croatien, ? Spanien.

*humifusus* Bernh. (*lanuginosus* Lk.), niedergestreckter,  
 $\S$ . Südeuropa.

*lanceolatus* Dsf., lanzettblättriger,  $\S$ . k. Nordafrika,  
Griechenland.

*lanuginosus* Schk., wolliger,  $\S$ . f. Deutschland.

*lucidus* Ehrh., starkglänzender,  $\S$ . k. ?

*Marinosci* Tenor., *Marinosci's*,  $\S$ . k. Neapel.

*Mastichina* L., *Mastix-T.*,  $\S$ . k. Spanien.

*montanus* W. K., Berg-T.,  $\S$ . f. Ungarn, Siebenbürg.

*numidicus* Poir., numidischer,  $\S$ . k. Nordafrika.

*nummularius* MB. (*majoranaefolius* Dsf.), rundblättriger,  
 $\S$ . f. Caucasus, südl. Schweiz.

*odoratissimus* MB., wohlriechendster,  $\S$ . f. Südpodolien,  
Taurien.

*pannonicus* All. (*austriacus* Bernh.), ungarischer,  $\S$ . f.  
Mittel-, Süd- und Osteuropa.

$\beta$ ) *Marschallianus* W.

*Serpyllum* Rchb. ? L. (*sylvestris* Fic. et Heynh.), Quen-  
del-T.,  $\S$ . f. Europa.

b) *flore albo* (*inodorus* Lej.), c) *fol. variegat.*,  
 $\beta$ ) *reflexus* Lej.

*spicatus* Loud., ährenförmiger,  $\S$ . k. Pyrenäen.

*tomentosus* W., filziger,  $\S$ . k. Spanien.

*Tragoriganum* L., Bocks-T.,  $\S$ . k. Griechenland.

*villosus* L., zottiger,  $\S$ . k. Portugal.

*vulgaris* L., gemeiner,  $\S$ . f. Südeuropa, Sibirien.

b) *latifolius*, c) *variegatus*.

*Zygis* L., spanischer,  $\S$ . k. f. b. Spanien, Portugal,  
*acynoides* Tenor., *Acynos* L. etc., v. *Calamintha*  
*heterophylla*, *Acynos* etc., *Brauneanus* Hopp. (*Calamintha*  
*Scop.*), *Calamintha* DC. etc., v. *Calamintha*  
*Nepeta*, *officinalis* etc., *croaticus* P. (*marginatus*  
Sm., *Piperella* L.), *ericaefolius* Roth., *filiformis* Ait.  
etc., vid. *Satureja Piperella*, *varia*, *filiformis* etc.,  
*parviflorus* Req., vid. *Mentha Requieni*, *virgatus*  
Tenor., vid. *Satureja graeca*, *virginicus* Murr., vid.  
*Pycnanthemum linifolium*.

*Thyrsanthus palustris* Schrk., vid. *Lysimachia thyrsiflora*,  
*frutescens* Ell., vid. *Wistaria frutescens*.

*Thysanocarpus* Hook., Franzennüßchen, XV. 1., Cru-  
ciferae.

*curvipes* Hook., krummstieliges,  $\odot$ . f. Californien.

*elegans* Fisch. et Mey., zierliches,  $\odot$ . f. Californien.

*pulchellus* Fisch. et Mey., schönes,  $\odot$ . f. Californien.



**Thysanotus** RB., Wimperkrone, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

*elator* RB., hohe, 4. Kn. k. t. Neuholland.

*intricatus* Lindl., verwebte, 4. k. t. Neuholland (Schwanenflufs).

*isantherus* RB., gleichbeutelige, 4. Kn. k. t. Neusüdwall.

*junceus* RB., simsenförmige, 4. k. t. Neusüdwallis.

*proliferus* Lindl., sprossende, 4. k. t. Neusüdwallis.

*tenuis* Lindl., dünne, 4. k. t. Neuholl. (Schwanenflufs).

*tuberosus* RB., knollige, 4. Kn. k. t. Neuholland.

**Thysselinum** Riv. Hoffm., Sumpfsilge, V. 11., Umbelliferae.

*palustre* Hoffm. (*Plinii* Spgl., *sylvestre* et *angustifolium* Rchb.), gemeine, ♂. 4. f. Europa.

β) *intermedium* (Bess.), γ) *Schivereckii* (Bess.)

*davuricum* Spgl., v. Callisace daturica.

**Tiarella** L., Spitzhütchen, X. 11., Saxifrageae.

*colorans* Grah., farbiges, 4. f. Nordamerika.

*cordifolia* L., herzblättriges, 4. f. Nordamerika.

*Menziesii* Pursh., Menzies's, 4. f. Nordamerika.

*polyphylla* D. Don, Wall., vielblättriges, 4. f. b. Nepal.

*bitermata* Vent., vid. *Astilbe decandra*.

**Tiaridium** Lehm., Tiaridium, V. 1., Asperifoliaceae.

*indicum* Lehm., indisches, ♂. m. f. Ostindien, Nordam.

*velutinum* Lehm., sammethaariges, ♂. m. f. Ostindien.

**Tigarea tridentata** Pursh., vid. *Purshia tridentata*.

**Tigridia** Juss., Tigerblume (Pfauenschwertel), XVI. 1., Irideae.

*conchiflora* Swt., gelbblühende, 4. Zw. k. Mexico.

*pavonia* Juss., rothe, 4. Zw. k. Mexico.

b) *leona* Hort.

*violacea* Schiede, violette, 4. Zw. k. Mexico.

*Herberti* Bot. mag., vid. *Cypella Herberti*.

**Tilia** T., Linde, XIII. 1., Tiliaceae.

*alba* W. Kit. (*argentea* DC., *tomentosa* Mch., *rotundifolia* Duham.), weisse, ♂. f. Ungarn.

? β) *petiolaris* DC.

*americana* L. (*glabra* Vent., *canadensis* Mch.), amerikanische, ♂. f. Nordamerika.

*dasystyla* Stev., haargriffelige, ♂. f. Taurien.

*grandifolia* Ehrh. (*platyphyllos* Scop., *cordifolia* Bess., *pauciflora* Hayne, *europaea* L.), großblättrige, ♂. f. Europa.

b) *laciniata* Mill., c) *aurea* Hort.

*heterophylla* Vent. (*alba* Ait., *americana* du Roi), verschiedenblättrige, ♂. f. Nordamerika.

*intermedia* DC. (*vulgaris* Hayn., *europaea* Sm.), mittlere ♂. f. Europa.

*laxiflora* Mch., lockerblumige, ♂. f. Nordamerika.

*parvifolia* Ehrh. (*microphylla* Vent. W., *cordata* Mill., *ulmifolia* Scop., *europaea* γ. L.), kleinblättrige, ♂. f. Europa.

b) *aurea*, c) *cucullata*.

*pubescens* Ait. (*caroliniana* Mill., *americana* Walt.) weichhaarige, ♂. f. Nordamerika.

β) *leptophylla* Vent. (*missisippensis* Dsf.),

*rubra* DC. (*triflora* Hornem., *corinthiaca* Bosc., *corallina* H. Kew.), rothe, ♂. f. Taurien, England.

Hybriden und Varietäten: *asplenifolia* nova Hort., *aurea* nova Hort., *rubricaulis* Hort., *corylifolia* Host,

**Tilia**

latebracteata Host, mutabilis Host, obliqua Host,  
 praecox Host, pyramidata Host, tenuifolia Host,  
 vitifolia Host.

**Tiliacora** Colebr. (bengalischer Name) XXII. VI. (VI. III.), Menispermaceae.

racemosa Colebr., traubige, 5. Sch. w. Ostindien.

**Tillaea** Michel. (M. A. Tilli, italienischer Botaniker), IV. III., Corniculatae-Crassulaceae.

muscosa L., moosähnliche, ☉. f. Mittel- und nördliches Europa.

rubescens H. B. K., röthliche, ☉. f. Chili.

aquatica L. etc., vid. *Bulliardia aquatica* etc.

**Tillandsia** L. (Elias Tillandsius, Prof. der Physik zu Abo), VI. I, Bromeliaceae.

acaulis Lindl., stengellose, 4. w. Brasilien.

aloefolia Hook., aloebblätterige, 4. w. Caribäen.

anceps Lodd., zweischneidige, 4. w. Westindien.

angustifolia Sw., schmalblättrige, 4. w. Westindien.

Bartramii Ell., Bartram's, 4. w. Carolina.

bracteata Hook., deckblättrige, 4. w. Westindien.

bulbosa Hook., zwiebelige, 4. Kn. Caribäen.

canescens Sw., weifsgrauliche, 4. w. Jamaika.

coarctata Gill., gedrungene, 4. w. Chili.

compressa Gill., platte, 4. w. Chili.

fasciculata Sw., büschelförmige, 4. w. Jamaika.

flexuosa Sw., gebogene, 4. w. Westindien.

b) pallida.

gracilis Gill., schlanke, 4. w. Chili.

nitida Hook., glänzende, 4. w. Jamaika.

nutans Sw., nickende, 4. w. Westindien.

obscura Lodd., dunkle, 4. w., Südamerika.

paniculata L., rispige, 4. w. Westindien.

polystachya L., vielährige, 4. w. Westindien.

psittacina Hook., papageifarbig, 4. w. Brasilien.

pulchra Hook., schöne, 4. w. Caribäen.

ramosa Gill., ästige, 4. w. Chili.

recurvata L., zurückgekrümmte, 4. w. Südamerika.

rigida Gill., starre, 4. w. Chili.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Brasilien.

serrata L., sägezahnige, 4. w. Westindien.

setacea Sw., borstenblättrige, 4. w. Jamaika.

stricta Sims, steife, 4. w. Brasilien.

tenuifolia L., dünnblättrige, 4. w. Westindien.

usneoides L., haarflechtenähnliche, 4. w. Carolina, Westindien.

utriculata L., schlauchförmige, 4. w. Westindien.

xiphioides Ker, schwertelblättrige, 4. w. Buenos Ayres.

amoena Lk., v. *Billbergia amoena*, *lingulata* L. Jacq.

vid. *Caraguata lingulata*.

**Tithonia** Dsf., Aurorablume, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

excelsa DC., hohe, 4. k. Mexico.

tagetiflora Dsf., tagetesblumige, ☉. m. f. Vera-Cruz.

tubaeformis Cass. (*helianthoides* Hort.), röhrenförmige, ☉. m. f. Südamerika.

**Tithymalus pendulus** Haw. etc., v. *Euphorbia pendula* etc.**Tittmannia** Rchb. (Dr. Tittmann, Arzt und Botaniker zu Dresden) XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

ovata Rchb., eiförmige, ☉. f. Societätsinseln. Philippinen.

**Tittmannia**

*viscosa* Rchb., schmierige, ☉. f. m. Ostindien.

*scabra* Spgl., vid. *Artanema fimbriatum*.

**Tococa** Aubl. (Tococo, guianischer Name), X. 1., Melastomaceae.

*Aubletii* D. Don (*guianensis* Aubl.), Aublet's, ☿. w. Guiana.

*lanata* D. Don, wollige, ☿. w. Trinidad.

**Tocoyena** Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

*longiflora* Aubl., langblumige, ☿. w. Guiana.

**Toddalia** Juss. (Kaka Toddali, malabarischer Name), V. 1., Zanthoxyleae.

*aculeata* P., stachelige, ☿. w. Ostindien.

*angustifolia* Lam., schmalblättrige, ☿. w. Ostindien.

*paniculata* Lam., rispige, ☿. w. Mascarenas.

**Todea** W. (H. J. Tode, Bearbeiter der mecklenburgischen Flora), XXIV. 1., Osmundaceae.

*africana* W., afrikanische, 4. t. w. Cap der guten H.

*australis* RB., neuholländische, 4. t. w. Cap d. g. H.

**Tofieldia** Huds. (M. Tofield, engl. Botaniker), VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

*alpina* Stbg. Hoppe (*borealis* Wahlbg., *pusilla* Pursh.), Alpen-T., 4. f. Mittel- u. Nordeuropa, Asien und Nordamerika.

*calyculata* Wahlbg. (*palustris* Huds.), Sumpf-T., 4. f. Mittel- und Nordeuropa.

*glacialis* Gaud., Gletscher-T., 4. f. Schweiz.

*glutinosa* Pursh., klebrige, 4. f. Nordamerika.

*pubescens* Dryand., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

*stenopetala* Sm., schmalkronige, 4. f. Nordamerika.

**Tolpis** Adans. G., Tolpis, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. *Drepania* Juss.

*barbata* G., bärtige, ☉. f. m. Südeuropa, Griechenland, Kleinasien.

*umbellata* Bertol., doldige, ☉. f. Italien, Kleinasien.

II. *Polychaetia* Tausch. (*Schmidtia* Mch.).

*altissima* P. (*virgata* Bertol., *Drepania ambigua* DC.), höchste, ☉. f. Frankreich, Italien.

*anethifolia* (Rchb.), dillblättrige, ☉. f. Madeira.

*coronopifolia* Bivon., krähensfußblättrige, ♂. f. k. Canarische Inseln, Sicilien.

*crinita* Low., bemähnte, ☉. f. Madeira.

*crithmifolia* DC., meerfenchelblättrige, ☉. f. Teneriffa.

*filiformis* DC., fadenförmige, ♂. k. Madeira.

*fruticosa* DC. (Mch.), strauchige, ☿. k. Madeira.

*macrorrhiza* DC., großwurzelige, 4. k. Madeira.

**Tomea sebifera** W. et *tetranthera* W., vid. *Tetranthera sebifera* et *laurifolia*.

**Tontelea** Aubl. (*Tonsella* Schreb.) (Ravoua-tontelle, caribäischer Name), III. 1., Evonymaceae-Hippocrateaceae.

*pyriformis* H. Taur., birnförmige, ☿. Sch. w. Guiana.

*scandens* Aubl., klimmende, ☿. Sch. w. Guiana.

**Tordylium** T., Zirmet (Drehkraut), V. II., Umbelliferae.

*apulum* Riv. (*grandiflorum* Mch.), apulischer, ☉. ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *humile* Dsf.

*maximum* L., größter, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Mittelasien.



**Tordylium**

β) lusitanicum Lk. et Hffg.

officinale L., officineller, ☉. f. England, Südeuropa.

syriacum Riv., syrischer, ☉. f. Griechenland, Syrien.

*Anthriscus* L. etc., vid. *Torilis Anthriscus* etc., *la-*

*tifolium* L., vid. *Turgenia latifolia*, *siifolium* Scop.,

vid. *Heracleum austriacum* β.

**Torenia** L. (Olof Toren, schwedischer Botaniker), XIV.

II., Personatae-Antirrhineae.

asiatica L., asiatische, 4. w. Ostindien.

cordifolia Roxb., herzblättrige, ☉. w. Ostindien.

diffusa D. Don, weitschweifige, 4. w. Nepal.

scabra RB. Grah., vid. *Artanema fimbriatum*.

**Torilis** Adans. G., Heckenkörbel, V. II., Umbelliferae.

*Anthriscus* G. Gmel., gemeiner, ☉. f. Europa.

helvetica Gmel. (*infesta* Auct., *Scandix infesta* L.),

schweizerischer, ♂. f. Mitteleuropa.

heterophylla Guss., verschiedenblättriger, ☉. f. Istrien, Italien.

neglecta R. et S. (*infesta* Rchb.), übersehener, ☉. f. Unterösterreich.

nodosa G., knotiger, ☉. f. Südeuropa.

trichosperma Spgl., haarsamiger, ☉. f. Aegypten.

tuberculata Spgl., kleinhöckeriger, ☉. f. Syrien.

**Tormentilla** T., Tormentille, XII. III., Rosaceae.

erecta L., aufrechte, 4. f. Europa, Nordasien.

b) flore pleno.

reptans L., kriechende, 4. f. Europa.

**Tournefortia** L. (J. P. v. Tournefort, berühmter französischer Botaniker), V. I., Asperifoliaceae.

angustifolia R. et S., schmalblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

argentea L., silberfarbige, ♀. t. w. Ostindien, Neuhol- land, Mascarenas.

Arguzia RB., sibirische, 4. k. Taurien, Sibirien.

bicolor Sw., zweifarbige, ♀. w. Jamaika.

cymosa L. (*macrophylla* Lam.), afterdoldige, ♀. w. Jamaica.

foetidissima L., stinkende, ♀. w. Jamaica, Mexico.

fruticosa RB., strauchige, ♀. k. Teneriffa.

gnaphalioides RB., ruhrkrautähnliche, ♀. w. Westindien.

heliotropioides Hook., heliotropiumähnlicher, ♀. t. w. Buenos Ayres.

Messerschmidia RB., Messerschmid's, ♀. k. Canar. Ins.

mutabilis Vent., veränderliche, ♀. w. Java.

scabra Lam., scharfe, ♀. w. Hispaniola.

suffruticosa RB., halbstrauchige, ♀. w. Westindien.

*laurifolia* Vent. etc., v. *Messerschmidia laurifolia* etc.

**Tourrettia** Domb. (M. A. de la Tourrette, ein Freund Rousseau's), XIV. II., Personatae-Sesameae.

lappacea W., klettenähnliche, ☉. Sch. f. Peru.

**Toxicodendron capense** Thbg., vid. *Hyaenanche globosa*.

**Trachelium** L., Halskraut, V. I., Campanulaceae.

coeruleum L., blaues, ♂. ♀. k. Sardinien, Nordafrika.

*diffusum* L., vid. *Prismatocarpus diffusus*.

**Trachymene** Rudg., Runzeldolde, V. II., Umbelliferae.

gigantea Ait., riesenhafte, ♀. t. ? Neuhollland.

incisa Rudg., schlitzbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

lanceolata Spgl., lanzettbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

linearis Spgl., gleichbreitbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

*coerulea* Grah., vid., *Huegelia cyanea*.

*Trachynia distachya* Lk. et *rigida* Lk. vid. *Brachypodium distachyum* etc.

*Trachynotia cynosuroides* Mchx. etc., vid. *Spartina cynosuroides* etc.

*Trachyspermum* Lk., Rausame, V. II., Umbelliferae.  
*copticum* Lk., coptischer, ☉. f. Aegypten.  
*rigens* G. Don, starrer, ☿. k. Cap der guten Hoffn.

*Trachytella* DC., Rauhblättchen, XIII. v., Dilleniaceae.  
*Actaea* DC., windendes, ☿. Sch. t. China.

*Tradescantia* L. (John Tradescant, Gärtner König Carl's I. von England), VI. I., Commelinaceae.

*congesta* Penny, gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.

*cordifolia* Sw., herzblättrige, 4. w. Jamaika.

*crassifolia* Cav., dickblättrige, 4. w. t. Neuspanien.

*crassiuscula* Lk. (*Sellowii* Pohl.), dickliche, 4. w. Brasil.

*discolor* Ait., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.

*diuretica* Mart. (*hirsuta* H. B. K.), harntreibende, 4. w. Brasilien, Neugranada.

*divaricata* Vahl, ausgespernte, 4. w. Guiana, Trinidad.

*erecta* Cav. (*bifida* Roth.), aufrechte, ☉. f. m. Mexico.

*fusca* Ker, braunrothe, 4. w. Brasilien.

*geniculata* L., gekniete, 4. w. Westindien.

*iridescens* Lindl., schwertelähnliche, 4. k. t. Mexico.

*latifolia* R. et P., breitblättrige, ☉. f. m. Peru.

*Lyonii* Hort., Lyon's, 4. f. Nordamerika.

*malabarica* L., malabarische, 4. w. Malabar.

*multiflora* Sw., vielblumige, 4. w. Jamaika.

*paniculata* Roxb., rispige, ♂. w. Ostindien.

*parviflora* R. et P. kleinblumige, 4. w. Peru.

*procumbens* W. (*multiflora* Jacq.), niederliegende, 4. w. Trinidad, Caracas.

*pulchella* H. B. K., hübsche, 4. t. w. Mexico.

*rosea* Mchx., rosafarbige, 4. f. b. Carolina.

*speciosa* L. suppl., prächtige, 4. w. Mexico, C. d. g. H.

*subaspera* Ker, rauhliche, 4. f. Nordamerika.

*tuberosa* Roxb., knollige, 4. Kn. w. Ostindien.

*undata* H. B. K., wellenblättrige, 4. w. Cumana.

*virginica* L., virginische, 4. f. Virginien, Carolina.

b) *alba*, c) *rubra*, d) *plena*, e) *coerulea albida*,  
 f) *pilosa*.

*cristata* L., vid. *Cyanotis cristata*.

*Zanonia* L., vid. *Campella Zanonia*.

*Tragia* Plum. (J. Bock, genannt Tragus, alter deutscher Botaniker), XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*cannabina* L. suppl., hanfähnliche, 4. w. Ostindien.

*corniculata* Vahl (*Vahlia* Sogl.), gehörnte, ☉. w. m. Guiana, Trinidad.

*infesta* Mart., schädliche, ☉. w. m. Brasilien.

*involucrata* L., hüllblättrige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

*Mercurialis* L., bingelkrautähnliche, ☉. w. m. f. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.

*pedunculata* P. B., stielblumige, ☿. Sch. w. Guinea.

*urens* L., brennende, ☉. f. Nordamerika, Westindien.

*urticaefolia* Mchx., nesselblättrige, ☉. f. Nordamerika.

*volubilis* L., windende, ☿. Sch. w. Westindien.

*Tragium* Sogl., Ziegendolde V. II., Umbelliferae.

*Anisum* Lk., Anis-Z., ☉. f. Aegypten.

*apulium* (Bernh.) apulische, ☉. f. Apulien.

**Tragium**

aromaticum Spgl. (*Gussoni* Presl., *anisoides* Brigant. *Pimpinella villosa* Schousb.), aromatische, 4. f. Ostcaucasus, Sicilien, Nordafrika.

Broteri Spgl., Brotero's, 4. k. Portugal.

Columnae Spgl., Columna's, 4. f. Südeuropa, Creta.

β) depressum Sbr. (*glaucum* Presl.)

peregrinum Spgl., fremde, 4. f. Südeuropa.

tauricum Ledeb., taurische, 4. f. Taurien.

tenuifolium Spgl. (? *tenue* Sbr.), feinblättrige, 4. k. Creta.

**Tragopogon** T., Bocksbart, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

angustifolius Bell. (*parviflorus* Hornem.), schmalblättriger, ♂. f. Ligurien.

brevirostris DC., kurzschnabeliger, ♂. f. Rußland.

β) intermedius Bess., γ) podolicus Bess., δ) lithuanicus Bess.

campestris Bess., Feld-B., ♂. f. Bessarabien, Podolien.

collinus DC. (*roseus* C. A. Mey.), Hügel-B., ♂. f. Caucasus.

crocifolius L., safranblättriger, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien.

eriospermus Tenor., wollsamiger, ♂. f. Neapel.

floccosus W. K. (*canus* W.), flockiger, ♂. f. Süd-, Nord- und Osteuropa.

livescens Bess. (*dubius* Hornem.), schlagbläulicher, ♂. f. Podolien.

major Jacq., großer, ♂. f. Deutschland.

minor Fries, kleiner, ♂. f. Schweden.

mutabilis Jacq., veränderlicher, ♂. f. Sibirien.

orientalis L. (*villosus* Habl., *undulatus* Auct.), morgenländischer, ♂. f. Sibirien, Deutschland.

phaeopappus Fisch. et Mey., braunfederiger, ♂. f. Südrußland.

porrifolius L., porreiblättriger, ♂. f. Thracien, Deutschl.

pratensis L., Wiesen-B., ♂. f. Europa.

β) tortilis K. (*revolutus* Schweig., *undulatus* Auct.).

pusillus MB., zwergiger, ♂. f. Armenien, Iberien.

roseus Trevir. (*ruber* S. G. Gmel.), rosafarbiger, ♂. f. Sibirien.

undulatus Jacq. (*orientalis* Wahlg.), wellenblättriger, ♂. Osteuropa, Kleinasien.

villosus L., zottiger, ♂. f. ? Spanien, Sibirien.

*capense* Jacq. etc., vid. *Urospermum capense* etc.

**Tragopyrum** MB., Bockweizen, VIII. 1., Polygoneae.

buxifolium MB., buxusblättriger, ♂. f. Caucas., Sibir.

lanceolatum MB., lanzettblättriger, ♂. f. Sibirien.

polygamum Spgl., vielehiger, ♂. k. f. b. Carolina.

**Tragus racemosus** Hall. (*muricatus* Mch.), vid. *Lappago vacemosa*.

**Trapa** L., Wassernuß, IV. 1., Onagrariae-Trapeae.

bicornis L., zweihörnige, 4. Wa. k. t. China.

bispinosa Roxb., zweidornige, ♂. Wa. w. Ostindien.

natans L., gemeine, ☉. Wa. f. Europa.

quadrispinosa Roxb., vierdornige, ♂. Wa. w. Ostindien.

**Trautvetteria** Fisch. et Mey. (E. R. v. Trautvetter, Directorgehülfe am k. botanischen Garten zu Petersburg), XIII. VI., Ranunculaceae.



**Trautvetteria**

*palmata* Fisch. et Mey., handförmige, 4. f. Virginien Carolina.

*Treisia clava* Haw., *Hystrix* Haw. etc., vid. *Euphorbia Haworthii* etc.

**Trevirania** W. (G. R. Treviranus zu Bremen und L. Ch. Treviranus, Professor der Botanik zu Bonn, ausgezeichnete Naturforscher), XIV. II., Personatae-Gesnerieae.

*coccinea* W., scharlachfarbige, 4. w. Jamaika.

**Trevoa** Cav., *Trevoa*, V. I., Rhamneae.

*quinquenervis* Hook., fünfnervige, 5. k. t. Chili.

*triplinervis* Gill., dreinervige, 5. k. t. Chili.

**Trewia** L. (C. J. Trew, Arzt und Botaniker zu Nürnberg), XXII. XII., ? Tricoccae-Euphorbiaceae.

*nudiflora* L. (*macrophylla* Roth.), nacktblumige, 5. w. Ostindien.

**Trianthema** Sauv., Dreiblümchen, X. II., Portulacaeae.

*decandrum* L., zehnfädiges, 6. w. m. f. Ostindien.

*monogynum* L., einweibiges, 6. w. m. f. Aegypten, Westindien.

*obcordatum* Roxb., verkehrtherzförmiges, 6. w. m. f. Ostindien.

**Trias** Lindl., Triangelorche, XX. I., Orchideae.

*oblonga* Lindl., längliche, 4. 5. w. Ostindien.

**Tribrachia** Lindl., Dreiähre, XX. I., Orchideae.

*pendula* Lindl., überhängende, 4. w. Sierra Leone.

**Tribulus** T., Bürzeldorn, X. I., Zygophylleae.

*albus* Poir., weißer, 6. w. m. f. Guinea.

*cistoides* L., cistusähnlicher, 4. w. Südamerika.

*lanuginosus* L., wolliger, 6. w. m. Ostindien.

*litoralis* Ait., Ufer-B., 4. t. w. Neuholland.

*maximus* L., größter, 6. w. m. Westindien.

*subinermis*, Fisch., thibetanischer, 6. m. f. Thibet.

*terrestris* L., gemeiner, 6. f. Südeuropa, Mittelasien, Afrika.

*trijugatus* Nutt., dreipaariger, 6. m. f. Georgien (Nordam.).

**Trichaeta** P. B., Dreiborste, III. II., Gramineae.

*ovata* P. B., eiförmige, 6. ♂. f. Spanien.

**Trichera** *arvensis* R. et S., et *ciliata* R. et S. etc., vid. *Knautia arvensis* etc.

**Trichilia** L., Trichilie, X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

*glandulosa* Sm., drüsige, 5. w. t. Neuholland.

*havanensis* Jacq. (*glabra* Murr.), kahle, 5. Cuba, Mexico.

*hirta* L., kurzhaarige, 5. w. Jamaika.

*odorata* Andr., riechende, 5. w. Westindien.

*spondioides* Jacq., mombinpflaumenähnliche, 5. w. Westindien.

**Trichocentrum** Pöpp., Haarstendel XX. I., Orchideae.

*fuscum* Lindl., braunblumiger, 4. w. Mexico.

*iridifolium* G. Lodd., schwertelblättriger, 4. w. Südamer.

**Trichochloa** *capillaris* R. et S. etc., vid. *Mühlenbergia capillaris* etc., *foliosa* Trin. etc., v. *Cinna filiformis* etc.

**Trichocephalus** Brogn., vid. *Phylica*.

**Trichocladus** P. (*Dahlia* Thbg.), Haarast, XXII. II., ? Cunoniaceae.

*crinitus* P., bemähter, 5. f. Cap der guten Hoffn.

**Trichocrepis** *bifida* Visian vid. *Lagoseris bifida*.

- Trichodesma** RB., Haarboretsch, V. I., Asperifoliaceae.  
*africanum* Lehm., afrikanischer, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.  
*indicum* Lehm., indischer, ☉. m. f. Ostindien.  
*zeylanicum* RB., zeylonischer, ☉. m. f. Ostind., Neuhol.
- Trichodium** *alpinum* Schrad. etc., v. *Agrostis rupestris* etc.
- Tricholaena** Schrad., Haarfennich, III. II., Gramineae.  
*arenaria* N. E., Sand-H., 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*capensis*, N. E., capischer, 4. k. Cap der gut. Hoffn.  
*micrantha* Schrad. (*Agrostis ptumosa* Tenor., *Panicum villosum* Presl.), kleinblumiger, 4. k. Sicilien, Teneriffa.  
*rosea* N. E., rosafarbiger, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*tonsa* N. E., beschorener, 4. k. Cap der guten Hoffn.
- Trichomanes** L., Haarfarn, XXIV. I., Pteridoideae.  
*brevisetum* H. Kew., kurzborstiger, 4. k. England.  
*membranaceum* L., häutiger, 4. w. Westindien.
- Trichonema** Ker., Haarschwertel, III. I., Irideae.  
*Bulbocodium* Ker, rinnenblättriger, 4. Zw. f. b. k. Südeuropa.  
*caulescens* Bot. mag., stengeliger, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*chloroleucum* Ker, gelblichweißser, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*coelestinum* Swt., himmelblauer, 4. Zw. k. Carolina.  
*Columnae* Tenor., Columna's, 4. Zw. k. Neapel.  
*cruciatum* Jacq., kreuzförmiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*filifolium* Ker, fadenblättriger, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*longifolium* Salisb. (*cruciatum* Ker), langblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
*pudicum* Ker, schamrother, 4. Zw. k. Cap der g. H.  
*purpurascens* Swt., purpurfarbiger, 4. Zw. k. Neapel.  
*quadrangulum* Swt., vierkantiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*ramiflorum* Swt., astblumiger, 4. Zw. f. b. k. Neapel.  
*recurvum* Spgl., zurückgekrümmter, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*roseum* Ker, rosafarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten H.  
*speciosum* Ker, prächtiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.  
*tortuosum* Ker, gewundener, 4. Zw. k. Cap der g. H.  
*monadelphum* Swt., vid. *Spatanthus speciosus*.
- Trichopetalum** Lindl., Haarauffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.  
*gracile* Lindl., schlanke, 4. k. Chili.  
*stellatum* Lindl., sternförmige, 4. k. Chili.
- Trichophorum** Rich. P., vid. *Eriophorum*.
- Trichophyllum** *lanatum* Nutt., *oppositifolium* Nutt. (*Bahia lanata* DC., *oppositifolia* DC., *Helenium oppositifol.* Spgl.), v. *Eriophyllum caespitosum et oppositifolium*.
- Trichopilia** Lindl., Haarhütchen, XX. I., Orchideae.  
*tortilis* Lindl., gedrehtes, 4. w. Mexico.
- Trichorrhiza** *teretifolia* Lindl., v. *Vanda trichorrhiza*.
- Trichosanthes** L., Haarblume, XXI. x. (XVI. I.), Cucurbitaceae.  
*Anguina* L., schlangenfrüchtige, ☉. m. w. Südchina.  
*colubrina* Jacq., natterähnliche, ☉. m. w. ?  
*cucumerina* L., gurkenähnliche, ☉. m. w. Ostindien.  
*cordata* Roxb., herzförmige, ☉. m. w. Ostindien.  
*lobata* Roxb., gelappte, ☉. m. w. Ostindien.  
*foetidissima* Jacq., vid. *Melothria foetida*, *tuberosa* W. (*corniculata* Lam.), vid. *Ceratosanthes tuberosa*.
- Trichostemma** L., Haarfädler, XIV. I., Labiatae.  
*dichotomum* L., zweizinkiger, ☉. f. Nordamerika.  
*lineare* Mühlbg., gleichbreiter, ☉. f. Nordamerika.  
*brachiatum* L., vid. *Isanthus coeruleus*.
- Tricondylus** *myricoides* Salisb., v. *Lomatia longifolia*.

- Tricoryne** RB., Tricoryne, VI. 1., Coronariae.  
 elatior RB., aufgerichtete, 4. k. t. Neuholland.  
 scabra RB., scharfblättrige, 4. k. t. Neuholland.  
 simplex RB., einfache, ♂. k. t. Neuholland.
- Tricratus** L'Her., Hüllennycagine, V. 1., Nyctagineae.  
 admirabilis L'Her., wunderbare, 4. k. f. b. Californien.
- Tricuspis** P. B. (*Tridens* R. et S.), Dreispitzgras, III. II., Gramineae.  
 quinquefida P. B., fünfspaltiges, 4. f. Nordamerika.
- Tridax** L., Dreizinke, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
 procumbens L., langstielige, ☉. f. m. Mexico, Neuspan.
- Tridentea** Haw., vid. Stapella.
- Trientalis** Rupp., Schirmkraut, VII. 1., Primulaceae.  
 americana Pursh., amerikanisches, 4. f. Nordamerika.  
 europaea L., europäisches, 4. f. Europa.
- Trifolium** T., Klee, Dreiblatt, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
 agrarium L. (*aureum* Poll.), Hopfen-K., ☉. ♂. f. Europa.  
 alatum Bivon. (*Cupani* Tin., *physodes* MB.), geflügelter, 4. f. Sicilien, Caucasus.  
 albens Fisch. (*Lupinaster*,  $\beta$  *albiflor.* Sering.), weißer, 4. f. Sibirien.  
 albidum Retz., weißlicher, ☉. f. ?  
 alexandrinum L., alexandrinischer, ☉. f. Aegypten.  
 alpestre L., Voralpen-K., 4. f. Europa.  
     b) flore albo.  
 alpinum L., Alpen-K., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 angulatum W. K., eckiger, ☉. f. Ungarn.  
 angustifolium L., schmalblättriger, ☉. f. Südeuropa,  
     Cap der guten Hoffnung.  
 anomalum Schrk, ungewöhnlicher, 4. f. ?  
 armenium W., armenischer, 4. f. Armenien.  
 arvense L., Acker- (Hasen-)K., ☉. f. Europa, Mittelasiën.  
      $\beta$ ) *gracile* Thuill.  
 badium Schrb., kastanienbrauner, ♂. f. Mitteleuropäische Alpen.  
 Bocconi Sav. (*semigladium* Brot.), Boccone's, ☉. f. Italien, Frankreich, Portugal.  
      $\beta$ ) *collinum* Bat.  
 bracteatum Schousb., deckblättriger, ♂. f. Nordafrika.  
 caespitosum Reyn. (*Thalii* Vill.), rasenartiger, 4. f. Tyrol, Schweiz.  
 campestre Schrb. (*procumbens* Sm.), Feld-K., ☉. f. Europa.  
 canescens W., graulicher, 4. f. Kleinasien.  
 cernuum Brot., übergebogener, ☉. f. Spanien, Portugal.  
 Cherleri L., Cherler's, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.  
 cinctum DC., ungürteter, ☉. f. Südfrankreich.  
 clandestinum Lagasc., heimlichblumiger, ☉. f. Spanien.  
 clypeatum L., schildförmiger, ☉. f. Griechenl., Kleinas.  
 coerulescens MB., bläulicher, ☉. f. Caucasus.  
 comosum L. (*carolinianum* Mchx., *arvense* Walt.), schopfger, 4. ♂. f. Carolina.  
 congestum Guss., gedrängtblumiger, ☉. f. Sicilien.  
 constantinopolitanum Sering., Konstantinopolitanischer, ☉. f. Türkei.  
 cyathiforme Lindl., becherförmiger, 4. f. Columbia.  
 dalmaticum Vis., dalmatischer, ☉. f. Dalmatien.  
 decipiens Hornem., täuschender, ☉. f. ?  
 diffusum Ehrh. (*ciliolum* Thuill.), weitschweifiger, ♂. f. Ungarn, Taurien, Frankreich.



**Trifolium**

*divaricatum* Hornem., ausgesperrter, ☉. f. Südeuropa.  
*echinatum* MB., igelköpfiger, ☉. f. Caucasus.  
*elegans* Sav. (*Vaillantii* Poir.), zierlicher, 4. f. Süd- und Westeuropa.

*erinaceum* MB., pfriemenstacheliger, ☉. f. Caucasus.  
*expansum* W. K., ausgestreckter, 4. f. Ungarn.  
*filiforme* L. (*minus* Sm. Relh.), fadenförmiger, ☉. f. Europa.

*fimbriatum* Lindl., gefranzter, 4. f. Columbia.  
*flavescens* Tin., gelblicher, ☉. f. Sicilien.  
*fragiferum* L., erdbeerköpfiger, 4. f. Europa, Kleinasien.  
*fuscum* Lindl., bräunlicher, ☉. f. Californien.  
*gemellum* Pourr., paarähriger, ☉. f. Spanien.  
*globosum* L., kugelförmiger, ☉. f. Kleinasien, Arabien, Südchina.

*glomeratum* L., knauförmiger, ☉. f. England, Westeur.  
*grandiflorum* Ledeb. (*eximium* Fisch.), großblumiger, 4. f. Sibirien.

b) *albiflorum*.

*Gussoni* Tin., Gussone's, ☉. f. Sicilien.  
*hispidum* Dsf. (*hirtum* All., *laguroides* Pourr.), steifhaariger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *pictum* Roth.

*hybridum* L., Bastard-K., 4. f. Europa, Mittelasien.  
*incarnatum* L., fleischfarbiger, ☉. f. Südeuropa.

b) *flore albo*, β) *Molinieri* Balb.

*intermedium* Guss., mittlerer, ☉. f. Sicilien.  
*involucratum* W. (*Wildenowii* Spgl.), eingehüllter, ☉. f. Mexico.

*Kitaibelianum* Ser. (*conicum* Hornem.), Kitaibel's, ☉. f. Ungarn.

*Lagascanum* Sering. (*conicum* Lag.), Lagasca's, ☉. f. Spanien.

*Lagopus* Pourr., Hasenpfötchen-K., ☉. f. Spanien, Pyrenäen.  
*lappaceum* L., klettenartiger, ☉. f. Südeuropa, Taurien, Caucasus.

*lasiocephalum* Lk. (*hirsutum* Hort.), wollköpfiger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

*latinum* Sebast., römischer, 4. f. Mittelitalien.

*leucanthum* MB., weißblumiger, ☉. f. Taurien.

*libanoticum* Ehbg., libanotischer, ☉. f. Syrien.

*ligusticum* Balb. (*arrectisetum* Brot., *aristatum* W., *Broteri* Lk. Hffg.), granniger, ☉. f. Portugal, Frankreich, Italien.

*Lupinaster* L., wolfsbohnenähnlicher, 4. f. Sibirien.

*malacanthum* Lk. (*echinatum* Hort.), weichblumiger, ☉. f. ?

*maritimum* Sm. (*irregulare* Pourr., *dipsaceum* Thuill., *stellatum* Huds.), Meerstrands-K., ☉. ♂. f. England, Frankreich, Italien.

*medium* L. (*flexuosum* Jacq.), mittlerer, 4. f. Europa.

*megacephalum* Nutt., großköpfiger, 4. f. Nordamerika.

*Michelianum* Sav. (*Vaillantii* Lois.), Micheli's, ☉. f. Italien, Frankreich, Kleinasien.

*micranthum* Viv., kleinkroniger, ☉. f. Nordafrika.

*montanum* L., Berg-K., 4. f. Europa.

*nigrescens* Viv. (*hybridum* Sav., *polyanthemum* Tenor.), schwärzlicher, ☉. f. Illyrien, Italien.

*noricum* Wulf., norischer, 4. f. Kärnten, Krain, Tyrol.

*obscurum* Guss., dunkler, ☉. f. Sicilien.

## Trifolium

- ochroleucum L., weißgelber, 4. f. Mittel- und Osteuropa, England, Kleinasien.
- olympicum Hook., olympischer, 4. f. Griechenland.
- oxypetalum Fisch. et Mey., schmalkroniger, 4. f. Louisiana.
- pallescens Schreb., bleichblumiger, 4. f. Kärnthen, Krain, Tyrol etc.
- pallidum W. K., bleicher, ♂. f. Banat, Italien, Dalmatien.
- pannonicum L., ungarischer, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus, Kleinasien, Frankreich.
- parviflorum Ehrh. (*strictum* Schreb.), kleinblumiger, ☉. f. Mitteldeutschland, Ungarn, Caucasus.
- patens Schreb. (*parisiense* DC., *aureum* Thuill., *chrysanthum* Gaud.), abstehtender, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
- phleoides Pourr., lieschgrasähnlicher, ☉. f. Spanien, Sibirien.
- physopetalum Fisch. et Mey., blasenkroniger, ☉. f. Neu-Californien.
- pratense L., Wiesen-K. (spanischer), ♂. f. Europa, Nordam.  
     β) heterophyllum Lej., γ) sativum Mill. (*pensylvanicum* W.), δ) nivale Sieb. (? *vaginatum* Schlchr., *P. alpinum* Hoppe, *P. flavicans* Sering.).
- procumbens L. (*pseudoprocumbens* Gmel.), niederliegender, ☉. f. Europa.
- purpurascens Fisch. (*Lupinaster*, γ) *oblongifolium* Ser.), purpurfarbiger, 4. f. Sibirien.
- purpureum Loisel., purpurblumiger, ☉. f. Frankreich.  
     β) *sylvaticum* Gerard.
- reclinatum W. K., zurückgelegter, ☉. f. Ungarn.
- reflexum L., zurückgebogener, 4. f. Virginien, Texas.
- repens L., kriechender, 4. f. Europa, Mittelas., Nordam.  
     b) pentaphyllum, c) maculatum, β) prostratum Biasol. (*Biasolettianum* Steud. et Hochst.).
- resupinatum L., verkehrtblumiger, ☉. f. Südeuropa.
- rigidum Sav., starrer, ☉. f. Italien.
- rubens L., rother, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.
- rubescens, H. Hall., rothwerdender, ☉. f. ?
- rubicundum Schousb., röthlicher, ☉. f. Mauritanien.
- rupestre Tenor., Felsen-K., 4. f. Neapel.
- Russelianum Lindl., Russel's, 4. f. ?
- saxatile All. (*thymiflorum* Vill.), Gesteins-K., ♂. 4. f. Schweiz, Oberitalien. Alpen, Dauphinée.
- scabrum L., scharfer, ☉. f. Europa.
- Sebastianum Sav., Sebastiani's, ☉. f. Mittelitalien.
- spadiceum L., glänzendbrauner, ☉. f. Europa.
- speciosum W., prächtiger, ☉. f. Sicilien, Griechenland.
- sphaerocephalum Dsf. (*arachnoideum* Presl.), kugelhöpfiger, ☉. f. Nordafrika, Sicilien.
- spumosum L., schäumiger, ☉. f. Frankreich, Italien.
- squarrosum L., sparriger, ☉. f. Süd-u. Westeur., Caucas.  
     β) *flavicans* Sering.
- stellatum L., sternförmiger, ☉. f. Krain, Italien, Griechenl.
- striatum L., gestreifter, ☉. f. Europa.  
     a) *tenuiflorum* Tenor., β) Schreberi \* (*scabrum* Schreb.)
- strictum L. (*laevigatum* Dsf.), steifer, ☉. f. Südeuropa, Ungarn, Nordafrika.
- suaveolens W., wohlriechender, ☉. f. Persien.
- subterraneum L., unterirdischer, ☉. f. Südeuropa.

**Trifolium**

suffocatum L., Sand-K., ☉. f. England, Südeuropa, Griechenland.

supinum Sav. (? *malacanthum* Lk.), niedriger, ☉. f. Italien, Südfrankreich.

tenuifolium Tenor., feinblättriger, ☉. f. Italien.

tomentosum L., filziger, ☉. f. Südeuropa.

trichocephalum M. B., haarköpfiger, 4. f. Caucasus.

tridentatum Lindl., dreizähniger, 4. f. Columbien.

uniflorum L. (*Buxbaumii* Sav.), einblumiger, ☉. f. Frankreich, Italien, Griechenland, Syrien etc.

β) Sternbergianum Sering.

vesiculosum Santi (*recurvum* W. K., *turgidum* MB.), blasiger, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

Wormskioldii Lehm., Wormskiold's, 4. f. Grönland.

*guianense* Aubl. vid. *Stylosanthes guianensis*, *Melilotus coerulea* L. etc. vid. *Melilotus coerulea* etc.,

*Melilotus cretica* L. vid. *Pocockia cretica*, *ornithopodioides* L. vid. *Trigonella ornithopodioides*.

**Triglochin** L., Salzsims (Dreizack), VI. III., Alismaceae.

Barrelieri Lois., Barrelier's, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

bulbosum L., knollige, 4. Kn. k. Cap der guten H.

decipiens RB., trügerische, 4. k. Neuholland, Van-Diemensland.

elatum Nutt., hohe, 4. k. f. b. Nordamerika.

maritimum L., Meer-S., 4. f. Europa, Nordamerika.

palustre, gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

*Triglossum bambusinum* Fisch. vid. *Ludolfia glaucescens*.

**Trigonella** L., Kuhhornklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

arcuata Fisch. et Mey., bogenförmiger, ☉. f. Astrachan.

astroites Turcz., sternförmiger, ☉. f. Armenien.

Calliceras MB. Fisch. (*ornithorhynchos* Fisch. Hornem.), schöner, ☉. f. Caucasus.

cancellata Dsf. (*aegyptiaca* Poir.), gegitterter, ☉. f. Aegypten.

corniculata W., gekrümmter, ☉. f. Südfrankreich, Italien, österreichisches Litorale.

elongata Ledeb. Lk., verlängerter, ☉. f. ?

esculenta W., genießbarer, ☉. m. f. Ostindien.

flexuosa Del. Poir., gebogener, ☉. f. Aegypten.

Fischeriana DC. (*flexuosa* Fisch.), Fischer's, ☉. f. Caucas.

Foenum graecum L., gemeiner, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

gladiata Stev. (*prostrata* DC.), schwertförmiger, ☉. f. Taurien, Caucasus, Süd- und Westeuropa.

hamosa L., hakenförmiger, ☉. f. Aegypten.

hybrida Pourr., Bastard-H., ☉. f. Südfrankreich.

litoralis Guss., Ufer-H., ☉. f. Sicilien.

maritima Delil., Meerstrands-H., ☉. f. Aegypten.

monspeliaca L., französischer, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Taurien, Caucasus.

monantha C. A. Mey., einblumiger, ☉. f. Südrussland.

ornithopodioides DC., vogelfußsähnlicher, ☉. f. Schleswig, England, Frankreich, Portugal.

pinatifida Cav. (*media* Del.), fiederspaltiger, ☉. f. Spanien.

platycarpa L., breithülsiger, ☉. f. Sibirien.



**Trigonella**

*polycerata* L., vielhülsiger, ☉. f. Südeuropa.

*ruthenica* L., russischer, ☉. f. Sibirien.

*spinosa* L., stechender, ☉. f. Griechenland.

*striata* L. suppl., gestreifter, ☉. f. Caucasus.

*tenuis* Fisch. MB., dünner, ☉. f. Caucasus.

*uralensis* Hort., ural'scher, ☉. f. Ural.

*brachycarpa* Rehb. vid. *Medicago brachycarpa* etc.,

*coerulea* Sering etc. vid. *Melilotus coerulea*, *indica*

L. vid. *Lotus indicus*.

**Trigonia** Aubl., Trigonie, XXI. II., Evonymaceae - Hippocrateaceae.

*mollis* DC., weiche, ♀. w. Brasilien.

*villosa* Aubl., zottige, ♀. w. Guiana, Brasilien.

**Trigonidium** Lindl., Triangelstendel, XX. I., Orchideae.

*acuminatum* Batem., zugespitzter, 4. w. Demerara.

*Egertonianum* Batem., Egerton's, 4. w. Honduras.

*obtusum* Lindl., stumpfer, 4. w. Demerara.

**Trillium** L., Dreiblatt, VI. III., Sarmenaceae-Smilaceae.

*Catesbaei* Ell., Catesbaie's, 4. Kn. k. f. b. Südcarolina.

*cernuum* L., übergebogenes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

*discolor* Wray, verschiedenfarbiges, 4. Kn. k. f. b.

Georgien (Nordamerika).

*erythrocarpum* Mchx. (*pictum* Pursh.) rothbeeriges, 4.

Kn. f. b. k. Nordamerika.

*grandiflorum* Salisb. (*erythrocarpum* Bot. mag.), groß-

blumiges, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

*nervosum* Ell., nerviges, 4. Kn. k. f. b. Carolina, Georgia.

*obovatum* Pursh., verkehrteiförmiges, 4. Kn. f. b. Can-

nada, Kamschatka.

*ovatum* Pursh., eiförmiges, 4. Kn. f. b. k. Westliches

Nordamerika.

*pendulum* W. (*erectum viridiflorum* Hook.), hängendes, 4.

Kn. f. b. k. Pennsylvanien.

*petiolatum* Pursh., stielblättriges, 4. Kn. f. b. k. West-

liches Nordamerika.

*pusillum* Mchx. (*pumilum* Pursh.), niedriges, 4. Kn. k.

f. b. Südcarolina.

*rhomboideum* Mchx. (*erectum* L.), rautenblättriges, 4.

Kn. f. b. k. Nordamerika.

*sessile* L., sitzendes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

*undulatum* W., wellenkroniges, 4. Kn. f. b. k. Nordam.

**Trinia** Hoffm. (Trinius zu Petersburg, kais. russischer Staatsrath, einer der ausgezeichnetsten Botaniker), V. II., Umbelliferae.

*elatio*r Gaud., höhere, ♂. f. Schweiz.

*Hoffmanni* MB., Hoffmann's, ♂. f. Caucasus.

*Kitaibelli* MB. (*glauca* [W. K.]), Kitaibel's, ♂. f. Ungarn.

*vulgaris* DC. (*pumila* Rehb., *Henningii* MB.), niedrige,

♂. f. Süd- und Osteuropa.

**Triodia** RB., Dreizahngras, III. II., Gramineae.

*decumbens* P. B. (*Danthonia* d. DC.), 4. f. Europa.

*cuprea* Jacq. v. *Tricuspidis quinquefida*.

**Triopteris** L., Dreiflügler, X. III., Malpighiaceae.

*jamaicensis* L., jamaikaischer, ♀. Sch. w. Jamaika.

*sericea* Lodd., seidenhaariger, ♀. Sch. w. Südamerika.

*buxifolia* W. etc. vid. *Tetrapteris buxifolia* etc.

**Triosteum** L., Dreistein, V. I., Caprifoliaceae.

*angustifolium* L., schmalblättriger, 4. f. b. Virginien.

*perfoliatum* L., durchwachsener, 4. f. b. Carolina.

- Triphasia** Lour., Triphasie, VI. 1. (V. 1.), Hesperideae-Aurantiaceae.  
*trifoliata* DC. (*aurantiola* Lour.), dreiblättrige,  $\frac{5}{8}$  t. China, Cochinchina.
- Triphysaria** Fisch. et Mey., Dreirodelkraut, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.  
*versicolor* Fisch. et Mey., buntfarbiges,  $\odot$ . f. Neucaliforn.
- Tripinnaria africana** Spgl. v. *Tanaecium pinnatum*.
- Triplaris** L., Baumknöterich, XXII. VIII. (IX. III.), Polygoneae.  
*americana* L. (*pyramidalis* Jacq.), amerikanischer,  $\frac{5}{8}$  w. Südamerika.
- Tripolium** N. E. vid. Aster.
- Tripsacum** L., Löchergras, XXI. III. (III. II.), Gramineae.  
*dactyloides* L., dreiähriges,  $\frac{4}{8}$  f. k. Nordamerika.  
*monostachyum* W., einähriges,  $\frac{4}{8}$  k. Südcarolina.  
*hermaphroditum* L. v. *Antephora elegans*.
- Tripteris arborescens** Less. etc. v. *Calendula arborescens* etc.
- Triptilion** R. et P., Dreispreuler, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae — Perdicieae.  
*cordifolium* R. et P., herzblättriger,  $\odot$ . f. Chili.  
*spinosum* R. et P., stacheliger,  $\odot$ . f. Chili.
- Trisetum** v. Avena, *Trisetum longifolium* N. E. v. Avena *longifolia* Nachtr., *ovatum* P. v. *Trichaeta ovata*.
- Tristania** RB., Tristanie, XVIII. II., Myrtaceae.  
*albicans* Cunn., weißliche,  $\frac{5}{8}$  t. Neuholland.  
*arborescens* Hort. Angl., baumartige,  $\frac{5}{8}$  t. Neuholland.  
*conferta* RB. (*laurina* Sbr.), gedrängte,  $\frac{5}{8}$  t. Neusüdwall.  
*depressa* Lodd., niedergedrückte,  $\frac{5}{8}$  t. Neuholland.  
*laurina* RB. (*macrophylla* Cunn.), lorbeerähnliche,  $\frac{5}{8}$   $\frac{5}{8}$  t. Neusüdwallis.  
*myrtifolia* Ait., myrtenblättrige,  $\frac{5}{8}$  t. Neuholland.  
*neriifolia* RB., oleanderblättrige,  $\frac{5}{8}$  t. Neusüdwallis.  
*persicifolia* Cunn., pfirsichblättrige,  $\frac{5}{8}$  t. Neuholland.
- Tristegis glutinosa** N. E. v. *Melinis minutiflora* Nachtr.
- Triteleia** Lindl., Narbenaffodile, III. 1., Coronariae-Asphodeleae.  
*grandiflora* Lindl., großblumige,  $\frac{4}{8}$  Zw. k. Nordwestamer.  
*laxa* Benth., lockere,  $\frac{4}{8}$  Zw. k. Californien.  
*uniflora* Lindl., einblumige,  $\frac{4}{8}$  Zw. k. t. Buenos Ayres.
- Triticum** T., Weizen, III. II., Gramineae.  
 1. *Agropyrum* G.  
*acutum* DC., spitzer,  $\frac{4}{8}$  f. Süd-, West- u. Nordeuropa.  
*angustifolium* Lk., schmalblättriger,  $\frac{4}{8}$  f. Sibirien.  
*caninum* Schreb., queckenartiger,  $\frac{4}{8}$  f. Europa.  
 $\beta$ ) Gmelini Ledeb.  
*cristatum* Schreb., kamniger,  $\frac{4}{8}$  f. Süd- u. Osteuropa.  
*crinitum* Lk., mähniger,  $\odot$ . k. ?  
*dasyanthum* Ledeb., wollblumiger,  $\frac{4}{8}$  f. Südrussland.  
*densiflorum* W., dichtblumiger,  $\frac{4}{8}$  f. Sibirien.  
*desertorum* Fisch., Wüsten-W.,  $\frac{4}{8}$  f. Sibirien.  
*distichum* Tbg., zweizeiliger,  $\frac{4}{8}$  k. Cap der guten H.  
*fragile* Roth., brüchiger,  $\frac{4}{8}$  f. ?  
*geniculatum* Trin., geknieter,  $\frac{4}{8}$  f. Sibirien.  
*glaucum* Dsf. (*intermedium* Host), blaugrüner,  $\frac{4}{8}$  f. Ostdeutschland, Schweiz.  
*imbricatum* MB. Stev. (*causasicum* Spgl.), ziegeldachförmiger,  $\frac{4}{8}$  f. Caucasus, Taurien, Sibirien.

**Triticum**

- junceum* L. (*farctum* Viv.), sinsenförmiger, 4. f. Europa, Caucasus.  
*muricatum* Fisch. Lk., weichstacheliger, 4. f. Sibirien.  
*obtusiflorum* DC., stumpfblumiger, 4. f. Nord- und Westeuropa.  
*orientale* MB., morgenländischer, ☉ ♂. Griechenland, Taurien, Sibirien.  
*pectinatum* RB., kammiger, 4. k. Van-Diemensland.  
*pectiniforme* R. et S. (*pectinatum* MB.), kammförmiger. 4. f. Taurien.  
*prostratum* L. (*A. triticeum* G.), hingestreckter, ☉. f. Südeuropa, Sibirien, Orient.  
*pungens* P., stechender, 4. f. Südeuropa.  
*ramosum* Trin., aestiger, 4. f. Sibirien, Astrachan.  
*repens* L., kriechender (Quecke), 4. f. Europa, Asien, Amerika.

α) *arvense* Schreb., β) *subulatum* Schreb., γ) *dumetorum* Honck., δ) *Vaillantianum* Wulf., ε) *Leersianum* Wulf., ζ) *capillare* R. et S., η) *maritimum* K. et Ziz., θ) *litorale* Host, ι) *firmum* Presl., κ) *caesium* Presl., λ) *flavescens* H. Dresd.

- Richardsonii* Hort., Richardson's, 4. f. Nordamerika.  
*rigidum* Schrad. (*elongatum* Host, *junceum* β. *giganteum* Roth.), starrer, 4. f. Böhmen, österr. Litorale.  
*rupestre* Lk., Felsen-Q. 4. f. ?  
*sibiricum* W., sibirischer, 4. f. Sibirien  
*squarrosus*, Roth. (*patulum* W., *Buonapartii* Spgl., *planum* Dsf.), sparriger, ☉. f. Aegypten.  
*variegatum* Fisch., bunter, 4. f. Sibirien.

**II. Genuin. (Cerealialia).**

- dicoccum* Schrk. (*Spelta* Host, *amyleum* Sering. *Zea* Oecon.), Emmerkorn-W., ☉ ♂. Mittel- u. Südeuropa.  
 Variet.: *andalusaceum* Hort., *atratum* Host, *Bauhini* Lag., *Cienfuegos* Lag., *rufum* Hort. Oeconom.  
*durum* Dsf. (*hordeiforme* Host.), harter, ☉ ♂. f. Nordafrika.  
 Variet.: *brachystachyum* Hort., *cochleare* Clem., *fastuosum* Clem., *Gaertnerianum* Lag., *Hosteanum* Clem., *platystachyum* Lag., *pyramidale* Delil., *sardinicum* Koel. (*siculum* R. et S.), *villosum* Host, *pruinatum* Hornem. etc.

- monococcum* L., einkörniger, ☉ ♂. f. Taurien.

b) *Hornemanni* Clem.

- polonicum* L., polnischer, ☉ ♂. f. ?

b) *Cevallos* Lagasc.

- Spelta* L. (*Zea* Host), Dunkel-W., ☉ ♂. f. Südeuropa.  
 Var.: *Arias* Clem., *Forskolei* Clem., *album*, *aristatum*, *muticum*, *rufum* etc.

- Tumonia* Schrad., *Tumonia*-W., ☉. f. ?

- turgidum* L., aufgeschwollener, ☉ ♂. f. ?

Var.: *album*, *compositum* L., *glabrum*, *nigrum*, *rufum*.

- venulosum* Sering., aderiger, ☉. f. Aegypten.

- villosum* MB., zottiger, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

- vulgare* Vill. (*cereale* Schrk.), gemeiner, ☉ ♂. f. ?

α) *aestivum*, β) *hybernum*. Andere Variet.: *siculum* Hornem., *glaucum* Hornem., *compactum* Host, *nigrum*, *velutinum*, *pubescens* etc. — *chilense*, *hispanicum*, *Humboldtii*, *mongolicum*, *odesanum* etc.



**Triticum**

*biunciale* All. vid. *Vulpia* (*Nardurus*) *tenuiflora*  $\beta$ .  
*brizoides* Lam. (*unioloides* Ait.) vid. *Brizopyrum*  
*siculum*, *ciliatum* DC. etc. v. *Brachypodium dista-*  
*chyum* etc., *creticum* R. et S. v. *Secale creticum*  
 Nachtr., *festucoides* Bertol. (*hispanicum* Vivian., *te-*  
*nuiculum* Lois.) et *Festuca* DC. vid. *Vulpia* (*Nar-*  
*durus*) *Lachenalii*  $\gamma$ . et  $\beta$ ., *Halleri* Vivian (*Lache-*  
*nenalii* Gmel., *Poa* DC., *tenellum* L.), vid. *Vulpia*  
*Lachenalii*, *loliaceum* Sm. (*Rottboella* DC.) v. *Scle-*  
*rochloa loliacea*, *Nardus* DC. (*tenellum* a. Lam.) v.  
*Vulpia* (*Nardurus*) *tenuiflora*, *patens* Brot. v. *Lo-*  
*lium festucaceum*.

**Tritomanthe** Hffing. Lk. (*Tritoma* Ker), Hyacinthaloe,  
 VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae.

*Burchellii* (Herb.), Burchell's, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*media* Lk. (Ker), mittlere, 4. k. Cap der gut. Hoffn.  
*pumila* Lk. (Ker), niedrige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.  
*Uvaria* Lk. (Ker), grofse, 4. k. Cap der guten Hoffn.

*Tritonia crispa* Ker etc. vid. *Waitzia crispa* etc.

**Triumfetta** Plum. (G. B. Triumfetti, Prof. der Bota-  
 nik zu Bologna), XI. 1., Tiliaceae.

*angulata* Lam. (*Bartramia* L.), kantige, ☉. w. Ostindien.  
*annua* L. (*indica* Lam.), jährige, ☉. w. Java.

*glandulosa* Forsk. (*Vahlia* Poir.), drüsige, ☿. w. Ara-  
 bien, Mascarenas, Ostindien.

*grandiflora* Vahl, grofsblumige, ☿. w. Caribäen.

*havanensis*, H. B. K., Havana-T., ☿. w. Westindien.

*heterophylla* Lam., verschiedenblättrige, ☿. w. Hispaniola.

*Lappula* L., rauhkelchige, ☿. w. Westindien.

*macrophylla* Vahl (*althaeoides* Lam.), grofsblättrige, ☿.  
 w. Westindien.

*micropetala* Bot. reg., kleinkronige, ☿. w. Ostindien.

*pilosa* Roth., haarige, ☿. w. Ostindien.

*rhomboidea* Jacq., rautenförmige, ☿. W. Westindien.

*rotundifolia* Lam., rundblättrige, ☿. w. Ostindien.

*semitriloba* L., halbdreilappige, ☿. w. Westindien.

*suborbiculata* DC., fastkreisförmige, ☿. w. Ostindien.

*trichoclada* DC., haarästige, ☉. w. m. f. Nepal.

$\alpha$ ) *triclada* Lk.,  $\beta$ ) *oblongata* Lk.

*trilocularis* Roxb., dreifächerige, ☿. w. Ostindien.

**Trixago** Lk., Glitscher, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.  
*latifolia* Rchb. (*purpurea* Stev.), breitblättriger, ☉. f.  
 Süd-, West- und Osteuropa.

*rhinanthina* Lk. (*apula* Coll.), klafferähnlicher, ☉. f.  
 Süd-, West- und Osteuropa, Syrien.

$\beta$ ) *maxima* (W.),  $\gamma$ ) *versicolor* (Lam.).

*scordifolia* Rchb., scordiumblättriger, ☉. f. Portugal.

*viscosa* Rchb., schmieriger, ☉. f. England, Frankreich,  
 Italien, Griechenland.

**Trixis** P. Br., Trixis, XIX. 1v., Compositae-Eupatori-  
 neae — *Perdiciceae*.

*auriculata* Hook., geöhrte, ☿. w. Brasilien.

*senecioides* Hook., kreuzkrautähnliche, ☉. f. m. Chili.

**Trizeuxis** Lindl., Lippenorche, XX. 1., Orchideae.

*falcata* Lindl., sichelförmige, 4. w. Trinidad.

**Trochiscanthes** Koch, Nageldolde, V. 11., Umbelli-  
 ferae.

*nodiflorus* K., knotenblumige, 4. f. Wallis, Oberital.,  
 Dauphinée.

- Trochocarpa** RB., Radfrucht, V. 1., Epacrideae.  
*laurina* RB., lorbeerähnliche, ♀. ♀. t. Neuholland.  
*glauca* Spgl. vid. *Cyathodes glauca*.
- Trollius** L., Trollblume (Engelblume), XIII. 1v., Ranunculaceae.  
*americanus* Mühlbg. (*laxus* Salisb. Pursh.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.  
*asiaticus* L., asiatische, 4. f. Sibirien.  
 b) *intermedius*, c) *hybridus*.  
*caucasicus* Stev., (*minimus* Wender., *parviflorus* Lk., *tauricus* Hort.), caucasische, 4. f. Caucasus.  
*europaeus* L., gemeine, 4. f. Europa.  
 a) *altissimus* Crtz. Wender., β) *humilis* Crtz.  
 γ) *albus*.  
*Ledebourii* Rchb., Ledebour's, 4. f. Sibirien.  
*napellifolius* Röpert (*medius* Wender), sturmhutblättriger, 4. f. ? Caucasus.  
*patulus* Salisb., abstehende, 4. f. Sibirien, Kleinasien.  
*Riederianus* Fisch. et Mey., Rieder's, 4. f. Kamschatka.
- Tromotriche** Haw. vid. *Stapelia*.
- Tropaeolum** L., Capuzinerkresse, VIII. 1., Tropaeoleae.  
*aduncum* Sm. (*peregrinum* L.), hakenförmige, ☉. Sch. m. f. Peru, Mexico.  
*hybridum* L., Bastard-C., ♂. k. ?  
*majus* L., gemeine (spanische), ☉. ♂. f. k. Peru.  
 a) *atrosanguineum* (*atropurpureum* Hort.) D. Don,  
 b) *atrosang. fl. pleno*, c) *maculatum*, d) *fl. luteo pleno*, e) *fl. croceo pleno*.  
*minus* L., kleine, ☉. ♂. f. k. Peru.  
 b) *flore pleno*.  
*Moritzianum* H. Berol., Moritz's, ☉. Sch. m. f. Südamer.  
*pinnatum* Andr., gefiederte, 4. t. k. Peru.  
*brachyceras* Hook. etc. v. *Chymocarpus brachyc.* etc.
- Trophis** L. Futterbaum, XXII. 1v., Urticaceae.  
*americana* L., amerikanischer, ♀. w. Westindien.  
*aspera* Retz., rauhlättriger, ♀. w. Ostind., Cochinchina.
- Tros** Haw. vid. *Narcissus*.
- Troximon** G., Bocksalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.  
*cuspidatum* Pursh. (*marginatum* Nutt.), feinspitziger, 4. f. b. Louisiana.  
*glaucum* Pursh., blaugrüner, 4. f. b. Louisiana.  
*Dandelion* P. v. *Cynthia Dandelion* Nachtr., *virginicum* P. v. *Cynthia virginica*.
- Trymalium** Fenzl., Trymalium, ? V. 1., Rhamneae.  
*odoratissimum* Fenzl., wohlriechendes, ♀. t. Neuholland.
- Tubilium siculum** Chois. v. *Jasonia sicula*.
- Tulbaghia** L. (Tulbagh, holländischer Gouverneur des Vorgeb. der gut. Hoffn.), VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae.  
*affinis* Lk., ähnelnde, 4. Zw. k. t. Cap der guten H.  
*alliacea* L., knoblauchduftende, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.  
*cepacea* L., zwiebelduftende, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.  
*violacea* Harv., violette, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.
- Tulipa** Gesn. T., Tulpe. VI. 1., Coronariae.  
*acuminata* Vahl. (*cornuta* Redout.), zugespitzte, 4. Zw. f. Levante.  
*altaica* Pall., altaische, 4. Zw. f. Altai.  
*Biebersteiniana* R. et S., Bieberstein's, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

**Tulipa**

- biflora Pall., zweiblumige, 4. Zw. f. Ural, Sibirien.  
 Bonarotiana Reboul, Bonarota's 4. Zw. f. Italien.  
 Celsiana Redout., Cels's (*transtagana* Brot.), 4. Zw. f.  
 b. k. Frankreich, Portugal, Taurien.  
 Clusiana Redout., Clusius's, 4. Zw. f. Persien.  
 Gesneriana L., gemeine Garten-T., 4. Zw. f. Kleinasien, Thracien.

b) versicolor, c) plena, d) laciniata, e) lutea.  
 maleolens Bertol., übelriechende, 4. Zw. f. Italien.

- b) variegata Swt.  
 media Ag., mittlere, 4. Zw. f. ?  
 montana Bot. reg., Berg-T., 4. Zw. f. Persien.  
 Oculus solis S. Amans, Sonnenaugen-T., 4. Zw. f. Frankreich.

- patens Ag., abstehende, 4. Zw. f. Sibirien.  
 praecox, Tenor., frühe, 4. Zw. f. Neapel.  
 pubescens W., weichhaarige, 4. Zw. f. Kleinasien.  
 repens Fisch., kriechende, 4. Zw. f. Rußland.  
 saxatilis Sbr., Gesteins, 4. Zw. f. b. k. Creta.  
 scabriscapa Str., scharfschaftige, 4. Zw. f. Italien.  
 stellata Bot. mag., sternförmige, 4. Zw. k. Cumana.  
 strangulata Reboul., schlagblaufarbige, 4. Zw. f. ?  
 suaveolens Roth. (Duc van Thol), feinriechende, 4. Zw. f. Südeuropa.

b) flore pleno.

- sylvestris L., wilde, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.  
 tricolor Fisch., dreifarbig, 4. Zw. f. Rußland.  
 turcica Roth., türkische (Papagaien-T.), 4. Zw. f. Türkei.

*Breyniana* L. vid. *Kolbea Breyniana*.

**Tunica** Scop., Steinnelke, X. II., Caryophyllaceae-Sileneae.

- compressa Fisch. et Mey., platte, 4. k. Nordafrika.  
 cretica Fisch. et Mey., cretische, 4. k. Creta.  
 dianthoides Fisch. et Mey., einfachstengelige, 4. f. k. Creta.  
 illyrica Fisch. et Mey., illyrische, ♂. 4. k. Dalmatien, Sicilien, Griechenland.

- ochroleuca Fisch. et Mey., weißgelbe, ♂. 4. k. Griechenl.  
 pachygonia Fisch. et Mey., dickkantige, ♂. f. Natolien.  
 Saxifraga L., gemeine, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.  
 stricta Fisch. et Mey., steife, ♂. f. Nordpersien, Altai.

*Tupa* G. Don vid. *Lobelia*.

**Tupistra** Ker, *Tupistra*, VI. I., Aroideae.

- nutans Lindl., nickende, 4. w. Ostindien.  
 squalida Ker, braune, 4. w. Ostindien.

**Turgenia** Hoffm., Dickdolde, V. II., Umbelliferae.

- latifolia Hoffm., breitblättrige, ♂. f. England, Mittel-, Süd- und Osteuropa.

*Turgosia* Haw., vid. *Crassula*.

**Turnera** L. (W. Turner, alter englischer Botaniker), V. III., Turneraceae.

- brasiliensis W., brasilianische, f. w. Brasilien.  
 cistoides L., cistusähnliche, ♂. m. f. Südamerika.  
 cuneiformis Juss., keilblättrige, 4. f. w. Südamerika.

β) trioniflora Ker.

- elegans Otto, zierliche, f. w. Brasilien.  
 guianensis Aubl., guianische, ♂. f. w. m. f. Guiana.  
 hirta W., haarige, ♂. w. m. f. Brasilien.  
 Pumilea L., zwergige, ♂. w. m. f. Westindien.  
 racemosa Jacq., traubige, ♂. m. f. Westindien.  
 rupestris Aubl., Felsen-T., f. w. Guiana.



*Turpinia punctata* P. v. *Poiretia scandens*.

**Turraea** L. (A. Turra, Professor zu Vicenza, G. Turra, Professor der Botanik zu Padua), X. 1. (XVI. vi.), Hesperideae-Meliaceae.

*pinnata* Wall., gefiederte, ♀. w. Silhet.

*rigida* Vent., starre, ♀. w. Mascarenas.

*virens* L., grünliche, ♀. w. Ostindien.

**Turritis** T., Thurmkraut, XV. iii., Cruciferae.

*glabra* L., kahles, ♂. f. Europa, Sibirien.

*Grahami* Lehm., Graham's, ♂. f. ? Nordamerika.

*patula* Grah., abstehendes, ☉. f. Nordamerika.

*salsuginosa* DC., sibirisches, ☉. f. Sibirien.

*stricta* Grah., steifes, ☉. f. Nordamerika.

*ciliata* W., *hirsuta* L. etc. vid. *Arabis ciliata*, *hirsuta* etc., *Loeselii* RB. v. *Leptocarpaea Loeselii*.

**Tussilago** T., Huflattig, XIX. ii., Compositae-Eupatorineae.

I. Genuina.

*Farfara* L., gemeiner, 4. f. Europa.

b) *foliis variegatis*.

II. Homogyne Cass.

*alpina* L., Alpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alp. und Voralpen.

*discolor* Jacq., verschiedenfarbiger, 4. f. Tyrol, Kärnten, Steyermark, Oesterreich.

*sylvestris* Scop., Wald-H., 4. f. Kärnten, Krain, Steyermark.

*Anandria* L. v. *Anandria Bellidiasstrum*, *fragrans*

Vill., *frigida* L. etc. v. *Petasites fragrans* etc., *japonica* L. Thbg. v. *Senecio Kaempferi*, *integrifolia*

Mchx. v. *Chaptalia tomentosa*, *nutans* L. v. *Leria*

*nutans*.

**Tweedia** Hook. (M. Tweedie, engl. Botaniker u. Reisender), XIV. ii., Personatae-Antirrhineae.

*coerulea* D. Don, blaue, 4. Sch. t. Buenos-Ayres.

*versicolor* Hook., buntfarbige, 4. Sch. t. Buenos-Ayres.

**Tylophora** RB., Schwielenträger, V. ii., Asclepiadeae.

*barbata* RB., bärtiger, ♀. Sch. w. Neuholland.

*exilis* Colebr., zarter, ♀. Sch. w. Ostindien.

*grandiflora* RB., großblumiger, ♀. Sch. w. Neuholland.

**Typha** T., Rohrkolbe, XXI. iii., Typhaceae.

*angustifolia* L., schmalblättrige, 4. Wa. f. Europa.

β) *elatio* v. Bönningh.

*latifolia* L., breitblättrige, 4. Wa. f. Europa, Nordam.

*minima* Hoppe, kleinste, 4. Wa. f. Süddeutschland, Salzburg, Schweiz.

*minor* Sm. (*media* DC.), kleine, 4. Wa. f. England, Frankreich, Schweiz, Westdeutschland.

**Tyrimnus** Cass., Fleckdistel, XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

*leucographus* Cass., weißliche, ☉. f. Südfrankreich, Italien, Dalmatien, Griechenland.

*Uciana speciosa* W. vid. *Tocoyena longiflora*.

**Udora** Nutt., Udora, XXII. iv. (IV. i.), Hydrocharideae.

*lithuanica* Bess., lithauische, 4. Wa. f. Lithauen.

*verticillata* Spgl., wirtelförmige, 4. Wa. f. Ostindien, Nordamerika, Pommern.

**Ulex** L., Hecksame (Stechginster), XVII. iv. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae Papilionaceae.

## Ulex

*europaeus* L., gemeiner, f. f. b. England, Nord-, Mittel- und Westdeutschland, Frankreich.

b) *flore pleno*.

*hibernicus* G. Don, irländischer, f. k. f. b. Irland.

*nanus* Sm., zwergiger, f. k. f. b. England, Frankreich.

*provincialis* Lois., südfranzösischer, f. k. Südfrankreich.

*genistoides* Brot. (*mitis* Hort.) vid. *Stauracanthus aphyllus*.

**Ulloa** P. (Anton Ulloa, spanischer Naturforscher u. Reisender), V. I., Solanaceae.

*parasitica* P., schmarozende, f. w. Peru.

**Ulmus** T., Ulme, V. II., Urticaceae-Ulmaceae.

*alba* Kit., weisse, f. f. Ungarn.

*alata* Mchx. (*pumila* Walt.), geflügelte, f. f. Nordamer.

*americana* L., amerikanische, f. f. Nordamerika.

a) *rubra* Ait., b) *alba* Ait. (*mollifolia* R. et S.),

c) *pendula* Pursh., d) *incisa* H. S.

*campestris* L., gemeine, f. f. Europa, Caucasus.

a) *vulgaris*, b) *latifolia* Hort., c) *alba* Masters,

d) *acutifolia* Masters, e) *stricta* Hort., f) *virens*

Hort., g) *cornubiensis* Hort. (*stricta* Lindl.), h)

*parvifolia* Lindl. (*microphylla* Lodd., *aspera* Lodd.,

*crispa* Lodd.), i) *sarniensis* Lodd., k) *tortuosa*

Lodd., l) *foliis variegatis* Lodd., m) *betulaefolia*

Lodd., n) *planifolia* Hort., o) *cucullata* Hort.,

p) *concavaefolia* Hort., q) *foliis aureis* Hort.,

r) *nana* Lodd., s) *foliis maculatis* Lodd., t) *du-*

*bia* Lodd., u) *viscosa* Lodd.

*carpinifolia* Lindl., hainbuchenblättrige, f. f. England.

*chinensis* P. (*pumila* Hort., *peregrina* Hort.), chinesische, f. f. b. k. China.

*effusa* W. (*ciliata* Ehrh., *octandra* Schkr., *pedunculata* Lam., *laevis* Pall., *racemosa* Borkh.), langstielige, f. f. Europa, Caucasus.

*fulva* Mchx. (*rubra* Hort.), rothgelbe, f. f. Nordamerika.

*glabra* Mill., kahle, f. f. England, Deutschland etc.

a) *vulgaris*, b) *vegeta* Hort., c) *scampstoniana*,

d) *major* Hort., e) *glandulosa* Lindl., f) *latifolia*

Lindl., g) *microphylla* H. S. (*parvifolia* Hort.),

h) *pendula* Hort. Dur., i) *variegata* H. S., k) *ra-*

*mulosa* Booth.

*integrifolia* Roxb., ganzblättrige, f. w. Ostindien.

*major* Sm. (*hollandica* Mill., *latifolia* Mchx.), grofse, f. f. England, Holland, Nordamerika.

*montana* Bauh. Sm. (*glabra* Huds., *effusa* Sibth., *scabra* Mill., *nuda* Ehrh.), Berg-U., f. f. Europa.

a) *vulgaris*, b) *rugosa* Lodd., c) *major* Masters,

d) *minor* Masters, e) *cebennensis* Hort., f) *nigra*

Lodd., g) *australis* Hort., h) *pendula* Lodd. (*glabra*

*decumbens* Hort. Dur., *horizontalis* et *rubra*

Hort.), i) *fastigiata* Hort. (*glabra replicata* Hort.

Dur., *Fordii* et *exoniensis* Hort.), k) *crispa* W.

*parvifolia* Jacq. (*microphylla* P., *pumila transbaicalensis* Pall., *humilis* Hort.), kleinblättrige, f. f. Gegend des caspischen Meeres.

*pumila* Pall. (*humilis* Amm.), zwergige, f. f. Sibirien.

*suberosa* Mch. Ehrh. (*campestris* Woods.), Kork-U., f. k. Europa, Caucasus.

## Ulmus

- a) vulgaris, b) foliis variegatis Lodd., c) alba Masters, d) erecta Lodd., e) Hertfordshireana Angl. *Abelicea* Sm., *nemoralis* Ait., *polygama* Rich. vid. *Planera Abelicea* et Richardi.

## Ulospermum Lk., Krausdolde, V. II., Umbelliferae.

- dichotomum Lk., zweizinkige, ☉. f. Südeuropa, Nordafr.

## Umbilicus DC., Nabelkraut, X. IV., Corniculatae-Crasulaceae.

- erectus DC. (*Cotyled. lutea* Huds.), aufrechtes, 4. k. f.

- b. England, Süd- u. Westeuropa.

- Lievenii G. Don, Lieven's, 4. k. Altai.

- hispidus DC. (*Cotyled. Mucizonia* Orteg.), steifhaariges, 4. k. Spanien, Portugal.

- Malacophyllum DC., weichblättriges, ♂. k. Dahurien.

- pendulinus DC. (*Cotyled. Umbilicus* L.), hängendes, 4. k. f. b. England, Süd- und Westeuropa.

- Sempervivum DC., hauslaubähnliches, 4. k. Caucasus.

- serratus DC., sägeblättriges, 4. k. Creta.

- spinosus DC., stacheliges, 4. k. Sibirien.

## Uncaria Schreb. G., Hakenstiel, V. I., Rubiaceae.

- Gambir Wall., Gambir-H., ♀. Sch. w. Ostindien.

- sessilifructus Roxb., stiellosfrüchtiger, ♀. Sch. w. Ostindien.

## Uncinia P., Hakengras, XXI. III., Cyperaceae.

- jamaicensis P., jamaikaisches, 4. w. Jamaika.

- phleoides P., lieschgrasähnliches, 4. w. Chili.

## Uniola L., Spitzgras, III. II., Gramineae.

- I. Chasmanthium Lk.

- gracilis Mchx., schlankes, 4. f. Nordamerika.

- II. Genuina.

- latifolia Mchx., breitblättriges, 4. f. Nordamerika.

- paniculata L. (*maritima* Mchx.), rispiges, 4. f. Nordamer.

- distichophylla* R. et S. (*spicata* L. *Poa Michauxii*

- Kunth.), vid. *Brizopyrum americanum*.

## Unona L., Unona, XIII. VI., Anonaceae.

- acuminata DC., zugespitzte, ♀. w. Guiana.

- aromatica Dun. (*concolor* W.), gewürzhafte, ♀. w. Guiana.

- fasciculata Wall., büschelförmige, ♀. w. Ostindien.

- fuscata DC., bräunliche, ♀. w. Guiana.

- longiflora Roxb. Wall., langblumige, ♀. w. Ostindien.

- longifolia Dun., langblättrige, ♀. w. Ostindien, Java.

- Narum Dun., starkwurzeln, ♀. Sch. w. Malabar.

- odorata Dun., wohlriechende, ♀. w. Molukken, China.

- esculenta* Dun. (*uncinata* Dun. DC.), vid. *Artabotrys odoratissimus*.

## Urachne asperifolia Trin. et racemosa Trin. etc. vid. Ory-

- zopsis asperifolia α. et β. etc., *coerulescens* Lk. etc. v.

- Piptatherum coerulescens* etc.

## Urania Schreb., Uranie, VI. I., Scitamineae.

- speciosa Schreb., prächtige, 4. w. Madagascar.

## Uraria Dsv., Uraie, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- comosa DC., schopfige, ♀. w. Ostindien.

- crinita DC., mähnige, ♀. w. Ostindien.

- lagocephala DC., haarköpfige, 4. w. Brasilien.

- lagopodioides DC., haarkelchige, ♀. t. China.

- Lagopus DC., hasenfüßige, ♀. t. Nepal.

- picta Dsv., buntblättrige, ♀. w. Guinea.

## Urceolina Rchb., Becherschwertel, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.



**Urceolina**

- pendula* Herb., überhängender, 4. Zw. w. Südamerika.  
**Urena** L. (malabarischer Name), XVI. VIII., Malvaceae.  
*heterophylla* Sm., verschiedenblättrige, ♀. w. Ostindien.  
*lobata* L., gelappte, ♀. w. t. China.  
*multifida* Cav., vielspaltige, ♀. w. Mascarenas.  
*muricata* DC., weichstachelige, ☉. w. m. Ostindien.  
*repanda* Sm. (*Pavonia* r. Spgl.), ausgeschweifte, ☉. w. m. Ostindien.  
*reticulata* Cav. (*americana* L. suppl.), netzförmige, ♀. w. Hispaniola, Guiana.  
*scabriuscula* L. (*lobata* Cav.), schärfliche, ☉. w. m. Ostindien.  
*Sieberi* Coll. (*mauritiana* Sbr.), Sieber's, ☉. w. m. Mascarenas.  
*sinuata* L., buchtige, ♀. w. Ostindien.  
*speciosa* Wall., prächtige, ♀. w. Ostindien.  
*subtriloba* Schrk., fastdreilappige, ☉. w. m. Brasilien.  
*Swartzii* DC. (*sinuata* Sw.), Schwartz's, ♀. w. Westind.  
*tricuspis* Cav., dreispitzige, ♀. w. Mascarenas.

*Typhalea* L. vid. *Paphonia* *Typhalea*.

**Uropetalum** Ker, Schweifkrönchen, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

- crispum* Burch., krauses, 4. Zw. k. Cap der guten H.  
*fulvum* Swt., fahlgelbes, 4. Zw. k. Mogadore.  
*glaucum* Burch., blaugrünes, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*longifolium* Lindl., langblättriges, 4. Zw. w. Ostafrika.  
*serotinum* Ker, spätblumiges, 4. Zw. k. Spanien, Nordafrika.

*viride* Ker, grünes, 4. Zw. k. Cap der guten H.

**Urospermum** Scop., Schweifsame, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

- capense* Spgl., capischer, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. H.  
*Dalechampii* Dsf., Dalechamp's, 4. k. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.  
*picroides* Dsf., picrisähnlicher, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.  
*β) asperum* (L.).

**Ursinia** G., Ursinie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

*paradoxa* G., wunderbare, ♀. k. Cap d. guten Hoffn.

*abrotanifolia* Spgl. etc. v. *Sphenogyne* *abrot.* etc.

**Urtica** T., Nessel, XXI. IV., Urticaceae.

- aestuans* L., hitzige, ♂. w. Surinam.  
*angustifolia* Fisch., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.  
*arborescens* Lk., baumartige, ♀. w. Manila.  
*ardens* Lk., feurige, ☉. m. f. Nepal.  
*baccifera* L., beerentragende, ♀. w. Neugranada.  
*balearica* L., balearische, ☉. f. Balearen.  
*canadensis* L., canadische, 4. f. Nordamerika.  
*cannabina* L., hanfähnliche, 4. f. Sibirien.  
*capitellata* Poir. (*melastomoides* Hort.), kleinköpfige, ♀. w. Java.  
*caracasana* Jacq., caracasansische, ♀. ♀. w. Caracas.  
*caravellana* Schrk., caravellansische, ☉. w. m. f. Südamerika.  
*chamaedryoides* Pursh., gamanderähnliche, ☉. f. Georgia.  
*ciliata* Sw., gefranzte, ♀. w. Jamaika.  
*convexa* Hornem., convexe, ☉. f. ?  
*crassifolia* W., dickblättrige, ♀. w. Südamerika.  
*depressa* Sw., niedergedrückte, 4. w. Jamaika.  
*diffusa* Sw., weitschweifige, ♀. w. Jamaika.

## Urtica

- dioica* L., gemeine grofse Brenn-N., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
*divaricata* L., ausgespernte, 4. f. Nordamerika.  
*Dodartii* L. (*integrifolia* Poir.), Dodart's, ☉. f. Südeurop.  
*elongata* Lk., verlängerte, ☉. m. f. Philippinen.  
*ferox* Forst., wilde, ♀. k. Neuzeeland.  
*gigas* Cunn., grofse, ♀. k. t. Neuholland.  
*gracilis* Ait., schlanke, 4. f. Hudsonsbai.  
*grandifolia* L., grofsblättrige, ♀. w. Jamaika.  
*heterophylla* Wall. (*diversifolia* Lk.), verschiedenblättrige, ♀. w. Ostindien, Nepal.  
*horrida* H. B. K., schreckliche, ♀. w. Südamerika.  
*involucrata* Sims., gehüllte, ♀. w. Caribäen.  
*Linkiana* \* (*horrida* Lk.), Link's, ☉. m. f. Nepal.  
*macrostachya* Wall., grofsährige, ♀. w. Ostindien.  
*membranacea* Poir. (*caudata* Vahl.), häutige, 4. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.  
*microphylla* Sw., kleinblättrige, 4. w. Westindien.  
*moroides* Cunn., maulbeerbaumähnliche, ♀. k. t. Neuholland.  
*nivea* L., schneeweifse, 4. ♀. f. k. Mongolei, China etc.  
*nudicaulis* Sw., nacktstengelige, ♀. w. Jamaika.  
*nummularifolia* Sw. (*hederacea* Poir.), pfennigkrautblättrige, ☉. m. f. Westindien.  
*Parietaria* L., glaskrautähnliche, ♀. w. Jamaika.  
*pentandra* Roxb., fünfmännige, 4. w. Ostindien.  
*photeinophylla* Cunn., glänzendblättrige, ♀. k. t. Neuholland.  
*pilulifera* L., pillentragende, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Mittelasien, Ostindien.  
*pulchella* Lk., schöne, ♀. w. Ostindien.  
*pumila* L. kleine, ☉. f. Nordamerika.  
*reticulata* Sw., netzförmige, ♀. w. Jamaika.  
*rufa* Sw., fuchsrothe, ♀. w. Jamaika.  
*rugosa* Sw., runzelige, ♂. w. Jamaika.  
*scabrella* Roxb., schärfliche, ♀. w. Ostindien.  
*scripta* Hamilt., schwarzaderige, 4. k. Nepal.  
*urens* L., gemeine kleine Brenn-N., ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.  
*arborea* L. suppl. v. *Boehmeria rubescens*, *naucleiflora* Roxb. vid. *Conocephalus naucleiflorus*.
- Urvillaea** H. B. K. (J. Dumont d'Urville, französischer Seefahrer u. Botanik.), VIII. III., Sapindaceae.  
*ferruginea* Bot. reg., rostfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.  
*ulmacea* H. B. K. (*Koelreutera triphylla* P.), ulmenähnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Usteria scandens* Cav. Andr. v. *Maurandia semperflorens*.
- Utricularia** L., Wasserschlauch, II. I., Personatae-Lentibulariae.  
*intermedia* Hayn., mittlerer, 4. Wa. f. Europa.  
*minor* L., kleiner, 4. Wa. f. Europa.  
*neglecta* Lehm., übersehener, 4. Wa. f. Norddeutschl.  
*vulgaris* L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.
- Uvaria** L., Zapfenbeere, XIII. VI., Anonaceae.  
*ceylanica* L., ceylonische, ♀. Sch. w. Ceylon.  
*Gaertneri* DC., Gärtner's, ♀. w. Ostindien.  
*lucida* Boj., schimmernde, ♀. w. Malabar.  
*lutea* Roxb. (*coriacea* Vahl.), gelbe, ♀. w. Coromandel.  
*tomentosa* Roxb., filzige, ♀. w. Coromandel.

## U varia

velutina DC., sammethaarige, ♀. w. Ostindien.

villosa H. C., zottige, ♀. w. Ostindien.

*lanceolata* Sw. etc. v. *Guatteria virgata* etc.

## U vularia L., Zäpfchenkraut, VI. 1., Coronariae.

flava Sm., hellgelbes, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Sm. (*lanceolata* Ait.), großblumiges, 4. f. Nordamerika.

perfoliata L., stengelumfassendes, 4. f. Nordamerika.

puberula Mchx., feinhaariges, 4. f. b. Carolina.

sessilifolia L., stiellosblättriges, 4. f. Nordamerika.

*amplexifolia* W. vid. *Streptopus amplexifolius*, chi-

*nensis* Ker vid. *Disporum fulvum*.

## V accaria Dod., Kuhkraut, X. 11., Caryophyllaceae-Sileneae.

perfoliata (Roxb.), durchwachsenblättriges, ☉. f. Ostind.

pyramidata G. M. S. (*vulgaris* Host), pyramidales, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

## V accinium L., Heidelbeere, VIII. 1., Ericaceae-Vaccineae.

albiflorum Hook., weißblumige, ♀. f. b. Nordamerika.

arborescens Mchx., baumartige, ♀. k. f. b. Nordcarolina, Florida.

Arctostaphylos L., bäentraubenähnliche, ♀. k. f. b. Cappadocien.

buxifolium Salisb. (*brachycerum* Mchx.), buxusblättrige, ♀. k. f. b. Virginien.

caespitosum Mchx., rasenartige, ♀. f. b. k. Nordamerika.

canadense Richards., canadische, ♀. f. b. Canada.

caracasana H. B. K., caracasische, ♀. w. Caracas.

corymbosum L., traubendoldige, ♀. f. b. Nordamerika.

α) *disomorphum* Mchx. (*album* Lam., *corymbosum* Wats.), β) *amoenum* Ait.

crassifolium Andr. (*carnosum* P.), dickblättrige, ♀. k. f. b. Südcarolina.

diffusum Ait., weitschweifige, ♀. k. f. b. Südcarolina.

dumosum Andr. (*frondosum* Mchx.), heckige, ♀. f. b. k. Nordamerika.

β) *humile* Wats.

elevatum Banks et Soland. (*stamineum* Andr. *album* Pursh.), erhabene, ♀. k. f. b. Nordamerika.

elongatum Wats., verlängerte, ♀. f. b. Nordamerika.

frondosum L. W. (*glaucum* Mchx.), belaubte, ♀. k. f. b. Nordamerika.

β) *venustum* Ait.

fuscum Ait. (*formosum* Andr., *virgatum* Wats.), braunkelchige, ♀. k. f. b. Carolina.

galeans Mchx., gabelblättrige, ♀. k. f. b. Virginien, Carolina.

glabrum Wats., kahle, ♀. f. b. Nordamerika.

grandiflorum Wats., großblumige, ♀. f. b. Nordamerika.

halleriaefolium Lodd., halleriablättrige, ♀. f. b. Nordam.

hirtellum Ait., kurzhaarige, ♀. k. Carolina.

humifusum Grah., niedergestreckte, ♀. f. b. k. Nordam.

intermedium Ruthe, mittlere, ♀. f. Mark Brandenburg.

ligustrinum Mchx., ligusterähnliche, ♀. f. b. k. Virginien, Pennsylvania.

maderense Lk. (*padifolium* Sm., *caucasicum*, *canariense* Hort.), canarische, ♀. k. Canarische Inseln.



**Vaccinium**

- marianum* Wats. (*marylandicum* Lodd.), marianische  $\S$ . f. b. Nordamerika.
- meridionale* Sw., mittägliche,  $\S$ . w. Jamaika.
- minutiflorum* Wats., kleinblumige,  $\S$ . f. b. Nordamerika.
- mucronatum* L., stachelspitzige,  $\S$ . f. b. Nordamerika.
- Myrsinites* Mchx., kleinblättrige,  $\S$ . k. f. b. Carolina, Florida.
- $\beta$ ) *lanceolatum* Pursh.,  $\gamma$ ) *obtusum* Pursh.
- myrtifolium* Mchx., myrtenblättrige,  $\S$ . k. Carolina.
- myrtilloides* Mchx., flaschenblumige,  $\S$ . f. b. Nordamer.
- $\alpha$ ) *angustifolium* Ait.,  $\beta$ ) *macrophyllum* DC. (*membranaceum* Dougl.).
- Myrtillus* L., gemeine,  $\S$ . f. Europa.
- $\beta$ ) *baccis albis*,  $\gamma$ ) *baccis albis pyriformibus*.
- nitidum* Andr., glänzende,  $\S$ . k. f. b. Carolina.
- $\beta$ ) *decumbens* Bot. mag.
- ovatum* Pursh., eiförmige,  $\S$ . k. f. b. Nordwestamerika.
- pallidum* Ait. bleiche,  $\S$ . f. b. Nordamerika.
- pensylvanicum* Lam. (*tenellum* Pursh., *virgatum* Ait., *ramulosum* et *humile* W.), pensylvanische,  $\S$ . f. b. k. Nordamerika.
- resinosum* Ait., harzige,  $\S$ . f. b. k. Nordamerika.
- $\alpha$ ) *lutescens* Pursh.,  $\beta$ ) *rubescens* Sims.,  $\gamma$ ) *parviflorum* Andr.
- salicinum* Chamis., weidenähnliche,  $\S$ . k. f. b. Nordwestamerika.
- stamineum* L., langbeutelige,  $\S$ . f. b. k. Nordamerika.
- tenellum* Ait., zarte,  $\S$ . k. f. b. Pennsylvanien, Neu jersey.
- uliginosum* L. (*gualteroides* Bigel., *pubescens* Wormsk., *sedense* P.), Rausch-H. (Trunkelbeere),  $\S$ . f. Europa, Nord- und Südamerika.
- virgatum* Ait. (*corymbosum* var. G. Don), ruthenförmige,  $\S$ . f. b. k. Virginien, Carolina.
- $\alpha$ ) *latifolium* Wats.,  $\beta$ ) *angustifolium* Wats. (*fuscatum angustifolium* Pursh.).
- Vitis idaea* L., rothe (Preufselbeere),  $\S$ . f. Europa, Nordamerika.
- album* L. vid. *Lonicera ciliata* b., *erythrocarpum* Mchx. (et *hispidulum* Wangenh., *macrocarpum* Ait., *oblongifolium* Hort. et *Oxycoccus* L.) vid. *Oxycoccus*, *erythrocarp.*, *macrocarp.* et *palustris*, *hispidulum* L. v. *Phalerocarpus hispidulus* (*serpyllifolius*), *ligustrinum* L. v. *Lyonia ligustrina*.
- Valantia** T. (Sebastian Vaillant, berühmter französischer Botaniker), IV. 1, Rubiaceae.
- hispidula* L., steifhaarige,  $\odot$ . f. Südeuropa.
- muralis* L., Mauer-V.,  $\odot$ . f. Italien, Südfrankreich.
- filiformis* Ait., fadenförmige,  $\odot$ . f. Teneriffa.
- articulata* L. etc. v. *Galium articulatum*.
- Valeriana** T., Baldrian, III. 1, Valerianeae.
- allariaefolia* Vahl. (*macrophylla* MB.), lauchkrautblättriger,  $\mathcal{A}$ . f. Cappadocien, Iberien.
- capensis* Thbg., capischer,  $\mathcal{A}$ . k. Cap der guten Hoffn.
- Cardamines* MB., kressenblättriger,  $\mathcal{A}$ . f. Caucasus.
- celtica* L., celtischer,  $\mathcal{A}$ . f. Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Salzburg.
- dioica* L., zweihäusiger,  $\mathcal{A}$ . f. Europa.
- elongata* Jacq., verlängerter,  $\mathcal{A}$ . f. Oesterreich, Tyrol, Kärnthen, Krain.

## Valeriana

*globulariaefolia* Ramond (*heterophylla* Lois., *glauca* Lapeyr., *rupicola* Lag.), kugelblumenblättriger, 4. f. b. Südfrankreich, Spanien.

*italica* Lam., italienischer, 4. Kn. f. Italien.

*montana* L., Berg-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

*officinalis* L., gebräuchlicher, 4. f. Europa.

α) *altissima* Mik., β) *media* K., γ) *angustifolia* Vahl.

*Phu* L., großer (Garten-B.), 4. f. Süd- und Westdeutschland, Italien.

*pyrenaica* L., pyrenäischer, 4. f. Schottland, Pyrenäen.

*Saliunca* All., fettblättriger, 4. f. Wallis, oberital. Alpen.

*sambucifolia* Mik., hollunderblättriger, 4. f. Böhmen, Schlesien, Oesterreich, Steyermark.

β) *exaltata* Mik. (*repens* Host, *altissima* Hornem.)

*saxatilis* L., Gesteins-B., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

*sisymbriifolia* Vahl., rankenblättriger, ♂. f. Kleinasien.

*supina* L., niedriger, 4. f. Kärnten, Tyrol.

*Tripteris* L., dreiflügeliger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

β) *intermedia* Vahl.

*tuberosa* L., knolliger, 4. Kn. f. Südeuropa.

*angustifolia* Cav. etc. *rubra* L. vid. *Centhranthus angustifolius* etc., *ruthenica* W, (*sibirica* L.) vid.

*Patrinia sibirica*.

## Valerianella T., Rapunzel, III. 1., Valerianeae.

*Auricula* DC., katzenöhrige, ☉. f. Europa.

β) *laxiflora* Dufr., γ) *dasycarpa* Rehb.

*brachystephana* Tenor., kurzchronige, ☉. f. Neapel.

*carinata* Lois., kielförmige, ☉. f. Deutschland, Frankreich, Taurien.

*congesta* Lindl., gedrängte, ☉. f. Columbia.

*coronata* DC. (*campanulata* Biv.), gekrönte, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*costata* DC., gerippte, ☉. f. Caucasus.

*cymbaearpa* C. A. Mey., cymbelfrüchtige, ☉. f. Südrussland.

*dentata* DC. (*rimosa* Bast., *tridentata* Rehb.), gezahnte, ☉. f. Europa.

*discoidea* Lois., scheibenförmige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

*echinata* DC., stachelige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.

*eriocarpa* Dsv. (*Fedia campanulata* Presl., *rugulosa* Stev. *muricata* R. et S.), wollfrüchtige, ☉. f. Süd-, West- und Osteuropa.

*exscapa* (Stev.), schaftlose, ☉. f. Caucasus.

*gibbosa* Guss., höckerige, ☉. f. Sicilien.

*gracilis* Haberl., schlanke, ☉. f. Taurien.

*hamata* Bast., hakige, ☉. f. Mittel-, Süd- u. Westeur.

*Morisonii* DC., Morison's, ☉. f. Europa, Taurien.

α) *leiocarpa* K. (*dentata* Auct.), β) *lasiocarpa* K. (*dasycarpa* Stev., *mixta* Dufr., *microcarpa* Lois.)

*olitoria* Mch. (*Fedia striata* Stev.), gemeine, ☉. f. Europa,

*oxyrhyncha* Fisch. et Mey., spitzschnabelige, ☉. f. Südrussland.

## Valerianella

- plagiostephana Fisch. et Mey., schiefkronige, ☉. f. Nordpersien.  
 platyloba DC. (*discoidea* Rchb.), breitlappige, ☉. f. Südeuropa.  
 pteroloba Stev., flügelappige, ☉. f. Taurien.  
 puberula DC. (*F. microcarpa* Rchb.), feinhaarige, ☉. f. Sicilien, Calabrien.  
 pumila DC. (*tridentata* Stev., *membranacea* Lois.), kleine, ☉. f. Süd-, West- und Osteuropa.  
 punctata H. Patav., punctirte, ☉. f. ?  
 radiata DC., strahlige, ☉. f. Pensylvanien.  
 sclerocarpa Fisch. et Mey., knorpelfrüchtige, ☉. f. Nordpersien.  
 sphaerocarpa Guss., kugelfrüchtige, ☉. f. Sicilien.  
 Szovitsiana Fisch. et Mey., Szovits's, ☉. f. Persien.  
 trichocarpa DC., haarfrüchtige, ☉. f. Konstantinopel.  
 truncata DC. Rchb., abgestutzte, ☉. f. Creta.  
 turgida DC., aufgeschwollene, ☉. f. Taurien.  
 uncinata DC. (MB.), hakenförmige, ☉. f. Taurien.  
 vesicaria Mch., aufgeblasene, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.  
**Vallaris** RB., Schanzenstrauch, V. 1., Contortae Apocynaeae.  
 Pergulanus Burm., zeylonischer, ♀. Sch. w. Ostindien.  
**Vallesia** R. et P. (F. Vallesio, Arzt Philipp's II. von Spanien), V. 1., Contortae-Apocynaeae.  
 cymbaefolia Orteg., cymbelblättrige, ♀. w. Neuspanien.  
 dichotoma R. et P., zweizinkige, ♀. w. Peru.  
**Vallisneria** L. (A. Vallisneri, ital. Botaniker), XXII. 11., Hydrocharideae.  
 Jacquiniiana Spgl. (*spiralis* L. Poll., *americana* Mchx.), Jacquin's, ☉. Wa. k. Oberitalien, Südfrankr., Nordamerika, Neuholland.  
 Micheliiana Spgl. (*spiralis* L.), Micheli's, 4. Wa. k. Mittelitalien.  
**Vallota** Herb. Salisb. (P. Vallot, französ. Botaniker), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.  
 purpurea Herb., purpurfarbige, 4. Zw. t. w. C. d. g. H. β) minor Herb.  
**Vanda** RB. (ostindischer Name), XX. 1., Orchideae.  
 cruenta Lindl., blutfarbige, 4. w. China.  
 lamellata Lindl., plättchenförmige, 4. w. Manila.  
 multiflora Lindl., vielblumige, 4. w. China.  
 Roxburghii RB., Roxburgh's, 4. w. Ostindien.  
 α) tessellata Hook., β) unicolor Hook.  
 teres Lindl., rundliche, 4. w. Silhet.  
 trichorhiza Hook., haarwurzelige, 4. w. Ostindien.  
 recurva Hook. vid. *Sarcanthus rostratus*.  
**Vandellia** P. Br. (L. Vandelli, Professor der Botanik zu Coimbra in Portugal), XIV. 11., Personatae-An-tirrhoneae.  
 diffusa L., weitschweifige, ☉. w. m. f. Caribäen, Brasil.  
**Vangueria** Juss. (Voa-Vanguier, madagascarischer Name), V. 1., Rubiaceae.  
 edulis Vahl., genießbare, ♀. w. China, Ostindien.  
 spinosa Roxb., dornige, ♀. w. Ostindien.  
 velutina Hook., sammtthaarige, ♀. w. Madagascar.  
**Vanilla** Sw., Vanille, XX. 1., Orchideae.  
 aromatica Sw., gewürzhafte, ♀. Sch. w. Südamerika.  
 bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Guiana.



## Vanilla

planifolia Andr. (*Myrobroma fragrans* Salisb.) plattblät-  
terige, ♀. Sch. w. Westindien.

## Varronia L. (Varro, alter römischer Schriftsteller über Landwirthschaft), V. I., Asperifoliaceae.

alba Jacq., weisse, ♀. w. Westindien.

alnifolia Hornem., erlenblättrige, ♀. w. ? Mexico.

angustifolia Desv. (*curassavica* Lam.), schmalblättrige,  
♀. w. Caribäen.

bullata L., bauschige, ♀. w. Westindien.

dichotoma R. et P. (*Cordia bifurcata* R. et S.), zwei-  
zinkige, ♀. w. Peru.

globosa L. kugelblumige, ♀. w. Westindien.

lineata L., (*humilis* Jacq.), linirte, ♀. w. Jamaika.

martinicensis Jacq., martiniquische, ♀. w. Martinique.

mirabiloides Jacq., wunderblumenähnliche, ♀. w. Hispaniola.

mollis Desv., weiche, ♀. w. Westindien.

monosperma Jacq. (*corymbosa* Desv., *ulmifolia* Spgl.),  
einsamige, ♀. w. Antillen.

## Vascoa DC. (Vasco de Gama, berühmter portugiesischer Seefahrer), XVI. VI., Leguminosae-Papilionaceae.

amplexicaulis DC., stengelumfassende, ♀. t. C. d. g. H.

perfoliata DC., durchwachsenblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

*Vauanthes chloraeflora* Haw. v. *Grammanthes dichotoma*.

## Velezia L. (C. Velez, Arzt und Botaniker zu Madrid), V. II., Caryophyllaceae.

rigida W., starre, ♂. f. Spanien.

## Vella L., Felsenkresse, XV. II., Cruciferae.

Pseudo-Cytisus L., strauchige, ♀. k. Spanien.

*annua* L. v. *Carrichtera Vellae*, *aspera* P. v. *Bo-  
leum asperum*, *tenuissima* Pall. v. *Euclidium ta-  
taricum*.

## Velleya Sm. (Major Velley, englischer Botaniker), V. I., Campanulaceae - Goodenovieae.

lyrata RB., leyerblättrige, 4. k. t. Neuholland.

paradoxa RB., wunderbare, 4. k. t. Neuholland.

β) *humilis* A. DC. (*paradoxa* Lindl.).

spathulata RB., spatelblättrige, 4. k. t. Neuholland.

*Vellosia squamata* H. Angl. v. *Xerophyllum Sabadilla*.

## Veltheimia Gled. (v. Veltheim zu Harbke im Herzog- thume Braunschweig, Besitzer eines berühmt gewor- denen Gartens), VI. I., Coronariae-Hemerocallideae.

glauca Jacq., blaugrüne, 4. Zw. t. Cap der guten H.

intermedia Hort. Angl., mittlere, 4. Zw. t. C. d. g. H.

viridifolia Jacq., grünblättrige, Zw. t. Cap der gut. H.

*pumila* W., *sarmentosa* W. etc. vid. *Tritomanthe*

*pumila*, *media* etc.

## Venidium Less., Venidie, XIX. IV., Compositae-Co- rymbiferae.

angustifolium Less., schmalblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.

*Ventenatia major* Sm. et *minor* Sm. v. *Stylidium grami-  
nifolium* et *lineare*.

## Veratrum T., Germer (Wedewurz), VI. III. (XXIII. I.), Coronariae Colchicaceae.

album L., weisser, 4. f. Mittel- u. Osteuropa, Voralpen.

angustifolium Pursh., schmalblättriger, 4. f. b. Vir-  
ginien, Carolina.

caricifolium Schldl., riedgrasblättriger, 4. k. f. b. Mexico.

*Lobelianum* Bernh., *Lobel's*, 4. f. Mittel- und ost-  
europäische Voralpen.

## Veratrum

nigrum L., schwarzer, 4. f. Oesterreich, Steyermark, Krain, Ungarn, Sibirien etc.

parviflorum Mchx., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

viride Ait., grünblumiger, 4. f. Nordamerika.

luteum L. v. Chamaelirium carolinianum, *Sabadilla*

Retz. v. Xerophyllum *Sabadilla*, *virginicum* Ait. v.

*Leimanthium virginicum*.

**Verbascum** T., Königskerze, V. 1., Personatae-Verbasceae.

adulterinum K. (*thapsiformi nigrum* Schied.), falsche, ♂. f. Europa.

angustifolium, Tenor., schmalblättrige, ♂. f. Calabrien.

banaticum Schrad., banatische, ♂. f. Banat.

Bastardii R. et S., Bastard's, ♂. f. Frankreich.

betonicaefolium Dsf., betonienblättrige, ♂. 4. f. Armenien.

Blattaria L., veränderliche (Mottenkraut), ♂. f. Europa.

b) album (*glabrum* Mill.)

Boerhaavii L., Boerhaave's, ☉. f. Südeuropa.

candidissimum DC., reinweiß, ♂. f. Südfrankreich.

ceratophyllum Schrad., hornkrautblättrige, ♂. f. Kleinas.

collinum Schrad. (*Thapso-nigrum* Schied., *ambiguum*

Lej.), Hügel-K., ♂. f. Nord-, West- und Mitteldeutschland, Schweden.

β) seminigrum Fr.

compactum MB. (*ovalifolium* Sins., *formosum* Bess.,

*strictum* Clark), dichtblumige, ♂. Taurien, Caucasus, Podolien.

ferrugineum Ait., rostfarbige, 4. f. Südeuropa.

β) triste Sibth.

floccosum W. K. (*pulverulentum* Sm., *mixtum* DC., *laxiflorum* Presl.), flockige, ♂. f. Süd-, Ost- u. Westeur.

glabrum W., kahle, ♂. k. ?

gnaphalodes MB., ruhrkrautähnliche, ♂. f. Taurien.

gossypinum MB., baumwollenähnliche, ♂. Iberien.

grandiflorum Schrad., großblumige, ♂. f. ?

haemorrhoidale Ait., canarische, ♂. k. Madeira.

Hohenackeri Fisch. et Mey., Hohenacker's, ♂. f. Nordpersien.

Hornemanni Bess., Hornemann's ♂. f. ? Podolien.

Lagurus Fisch. et Mey., wollährlige, ♂. f. Byzans.

lanatum Schrad., wollige, ♂. f. Krain, Kärnthen, Italien.

leptostachyum DC., schlankährlige, ♂. f. Südfrankreich.

longifolium Tenor., langblättrige, ♂. f. Neapel.

Lychnitis L., lychnisartige, ♂. f. Europa.

b) album Mch.

lyratum Lam., leyerförmige, ♂. f. Spanien.

macranthum Lk., großkronige, ♂. f. Portugal.

majale DC., maiblumige, ♂. f. Südfrankreich.

monspessulanum P., französische, ♂. f. Südfrankreich.

montanum Schrad. (*crassifolium* Schlchr.), Berg-K., ♂. Wallis.

mucronatum Lam., stachelspitzige, ♂. f. Griechenland.

nigrum L., schwärzliche, ♂. f. Europa.

β) thyrsiodeum Host (*alopecurus* Thuill., *parisiense* Thuill.), γ) ovatum K. (*nigro-Lychnitis* Schiede.)

niveum Tenor., schneeweiße, ♂. f. Italien.

nothum K. (? *nigro pulverulentum* Sm.), unächte, ♂. f. Deutschland, ? England.

**Verbascum**

orientale MB. (*austriacum* Schrad.), morgenländische, ♂. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

β) *Chaixii* Vill. (*gallicum* W.)

Osbekii L., Osbek's, ♂. f. b. k. Spanien, Türkei.

ovatum Schrad., eiförmige, ♂. f. Spanien.

phlomoides L. (*rugulosum* W.), phlomisähnliche, ♂. f. Europa, Taurien.

β) album, γ) australe Schrad., δ) nemorosum Schrad., ε) condensatum Schrad.

phoeniceum L., violettrothe, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.

pinnatifidum Vahl. (*bipinnatifidum* Sims.), fiederspaltige, ♂. f. Taurien, Griechenland.

pulverulentum Vill., bestäubte, ♂. f. Westdeutschland, Frankreich.

puniceum Schrad., hochrothe, ♂. f. Südeuropa.

pyramidatum MB., pyramidale, ♂. f. Taurien, Caucasus.

ramigerum Schrad. (? *ramosissimum* DC., *thapsiformi-Lychnitis* Schied.), ästige, ♂. f. Europa.

repandum W., ausgeschweifte, ♂. k. ?

rotundifolium Tenor., rundblättrige, ♂. f. Neapel.

rubiginosum W. Kit. (*blattarioides* Gaud., *Pseudo-Blattaria* Schlchr.), rostfarbige, ♂. f. Ungarn, Baiern, Schweiz.

Schottianum Schrad., Schott's, ♂. f. Ost- u. Westdeutschl.

Schraderi Mey. (*Thapsus* Schrad., ? *thapsoides* L.), Schrader's, ♂. f. Europa.

β) pallidum N. E., γ) elongatum W.

sinuatum L. (*undulatum* MB.), buchtige, ♂. f. k. Süd- und Osteuropa.

speciosum Schrad. (*longifolium* DC.), prächtige, ♂. f. Oesterreich, Frankreich.

spectabile MB., ansehnliche, ♂. f. Taurien.

spurium K. (*Thapso-Lychnitis* M. et K.), Bastard-K., ♂. f. Westdeutschland.

spinosum L., dornige, ♂. k. Creta.

Steveni Fisch., Steven's, ♂. f. Sibirien.

*Thapsus* L. (*thapsiforme* Schrad.), ? gemeine, ♂. f. Europa.

β) cuspidatum Schrad.

undulatum Lam. (*plicatum* Sm.), wellenförmige, ♂. f. Griechenland, Kleinasien.

versiflorum Schrad., wechselblumige, ♂. f. Böhmen.

virgatum Wither. (*blattarioides* Lam.), ruthenförmige, ♂. f. England, Taurien.

Wiedemannianum Fisch. et Mey., Wiedemann's, ♂. f. Natolien.

*Myconi* L. v. *Ramondia pyrenaica*.

**Verbena** T. L., Eisenkraut, XIV. II., Verbenaceae.

alata Lk. et Otto, geflügeltes, 4. t. Montevideo.

angustifolia Mchx., schmalblättriges, 4. f. Nordamerika.

Aubletia Jacq., Aublet's, ♂. m. f. k. Carolina, Georgien.

barbata Grah., bärtiges, 4. k. t. Mexico.

bonariensis L., bonarisches, ♂. 4. k. Buenos-Ayres.

bracteosa Mchx., deckblättriges, ♂. 4. f. Nordamerika.

canescens H. B. K., weißgraues, ♂. m. f. Mexico.

caroliniana L., carolinisches, 4. f. Carolina.

chamaedryfolia Juss. (*Melindres* Gill.), gamanderblättriges, 4. k. t. Buenos-Ayres.

b) latifolia, c) major.

diffusa Desf., weitschweifiges, 4. ♂. k. Nordamerika.



## Verbena

- Drummondii* Lindl., Drummond's, 4. k. t. Texas.  
*elegans* H. B. K., zierliches, ☉. ♂. m. f. k. Mexico.  
*erinoides* W. (*multifida* R. et P.), erinusähnliches, ☉.  
 m. f. Peru.

β) Sabini D. Don (*contracta* Lindl.).

- glandulosa* Morr., drüsiges, 4. k. t. ?  
*hastata* L., spontonförmiges, 4. f. Nordamerika.  
*hispida* R. et P., steifhaariges, ☉. m. f. Peru.  
*incisa* Hook., schlitzblättriges, 4. k. t. Panama.  
*Lamberti* Ker (? *prostrata* RB.), Lambert's, 4. f. b. k.  
 Carolina, westl. Nordamerika.

## b) rosea D. Don.

- lasiostachys* Lk., wollähriges, ♂. f. Californien.  
*litoralis* H. B. K., Ufer-E. ♂. k. t. Peru.  
*officinalis* L., gemeines, ☉. f. Europa, Asien etc.  
*paniculata* Lam., rispiges, 4. f. Nordamerika.  
*pinnatifida* Pursh., fiederspaltiges, 4. f. Nordamerika.  
*polystachya* H. B. K., vielähriges, 4. k. Mexico, Westind.  
*prostrata* RB., gestrecktes, 4. f. b. k. Nordamerika.  
*pulchella* Swt., schönes, ☉. ♂. m. f. k. Buenos-Ayres.

## b) flore albo.

- radicans* Hook., starkwurzelndes, 4. k. t. Chili.  
*rugosa* D. Don, runzeliges, 4. k. Buenos-Ayres.  
*scabra* Vahl., scharfes, 4. k. Mexico.  
*sororia* D. Don, verschwistertes, 4. f. b. k. Nepal.  
*spuria* L., unächt, ♂. f. Nordamerika.  
*stricta* Vent. (*rigens* Mchx.), steifes, 4. f. Nordamerika.  
*sulphurea* D. Don, schwefelgelbes, 4. k. t. Chili.  
*supina* L., niedriges, ☉. f. Südeuropa, Kleinas., Aegypt.  
*teucroides* Gill. et Hook. (*Nivenii* Hort.), teucriumähn-  
 liches, 4. k. t. Südamerika.  
*trifida* H. B. K., dreispaltiges, ☉. m. f. Mexico.  
*Tweediana* Hook., Tweedie's, 4. t. Brasilien.  
*urticaefolia* L., nesselblättriges, 4. f. Nordamerika.  
*venosa* Gill et Hook., aderiges, 4. k. Buenos-Ayres.  
*veronicaefolia* H. B. K., ehrenpreisblättriges, ☉. m. f.  
 Mexico.

- xutha* Lehm., ergossenes, 4. f. Nordamerika.

Hybriden: *Arraniana* H. Angl. 4. k. t. *intermedia*  
*Penny*, ♂. k. t. — *Fergusonii*, *Hylandsii*, *Neillii*,  
*speciosa* etc.

*lappulacea* L. Jacq. et *mexicana* L. v. *Priva lappu-*  
*lacea* et *mexicana*, *nodiflora* L. v. *Zapania nodi-*  
*flora*, *triphylla* L'Her. v. *Aloysia citriodora*.

## Verbesina L., Verbesine, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- alata* L., geflügelte, 4. t. w. Surinam, Cuba.  
*atriplicifolia* P. (*Clerodendron phlomoides*, *Hortul. ital.*),  
 meldenblättrige, ♂. t. ? Südamerika.  
*aurea* DC., goldfarbige, 4. Kn. k. t. Mexico.  
*buphthalmoides* Lk., buphthalmumähnliche, ♂. t. Mondevideo.  
*dichotoma* Murr., zweizinkige, ☉. w. m. f. Ostindien.  
*fruticosa* W. (*tridentata* Spgl.), strauchige, ♂. w. Süd-  
 amerika, Westindien.  
*gigantea* Jacq., riesenhafte, ♂. w. Westindien.  
*laciniata* Nutt., schlitzblättrige, 4. k. Carolina.  
*pinnatifida* Cav., fiederspaltige, 4. k. t. Mexico.  
*salicifolia* H. B. K., weidenblättrige, 4. k. t. Mexico.  
*sativa* Sims., gebaute, ☉. m. f. Ostindien.

**Verbesina**

*serrata* Cav., sägezähnige, 4. k. t. Mexico.  
*Siegesbeckia* Mchx., Siegesbeck's, 4. f. Virginien, Carolina.  
*virginica* L. (*paniculata* Poir.) virginische, 4. f. Nordam.  
*biflora* L. v. *Wollastonia biflora*, *calendulacea* L. v.  
*Wedelia* c., *Coreopsis* Mchx. (et *helianthoides* Mchx.)  
v. *Actinomeris squarrosa* (*alternifolia*) etc., *fruticosa*  
H. Par. v. *Zexmenia monocephala*, *mutica* L. v.  
*Chrysanthellum procumbens*, *nodiflora* L. v. *Synedrella nodiflora*.

*Verea acutiflora* Andr. etc. v. *Kalanchoe acutiflora* etc.,  
*pinnata* Spgl. v. *Bryophyllum calycinum*.

**Vernonia** Schreb. (William Vernon, botanischer Reisender in Nordamerika) XIX. 1., Compositae Cynarcephalae.

*acutifolia* Hook., spitzblättrige, 4. w. Brasilien.  
*angustifolia* Mchx., schmalblättrige, 4. f. b. Carolina.  
*anthelmintica* W., wurmabtreibende, ☉. w. m. f. Ostindien.  
*arborescens* Sw. (*Lepidaploa arboresc. phyllostachya* Cass.), baumartige, 5. w. Westindien.  
*axilliflora* Mart., achselblumige, 5. w. Brasilien.  
*cinerea* Less. (*Chrysocoma purpurea* Forst.), aschfarbige, ☉. m. f. Ostindien.  
*flexuosa* Sims., gebogene, 4. Kn. w. Brasilien.  
b) flore albo.

*fruticosa* Sw., strauchige, 5. w. Westindien.  
*linearis* Spgl., gleichbreitblättrige, ☉. w. m. f. Südamer.  
*noveboracensis* W. (*praealta* W.), neuyorkische, 4. f. Nordamerika.

β) *glauca* W. (*tomentosa* Ell.)

*odoratissima* H. B. K., wohlriechendste, 5. w. Caracas.  
*pandurata* Lk., geigenförmige, 4. w. Congo.  
*pauciflora* Less. (*senegalensis* Dsf., *galamensis* Less., *coelestina* Schrad.), wenigblumige, ☉. w. m. Senegal.  
*pedunculata* DC., langstielige, 4. w. Brasilien.  
*persicifolia* Dsf., pfirsichblättrige, 5. w. Westindien.  
*praealta* Ell. DC. (*altissima* Nutt.), hohe, 4. f. Nordam.  
*scaberrima* Nutt. (*pilosa* Bosc.), scharfe, 4. f. b. Carolina, Florida.

*scorpioides* P. (*Tournefortioides* Less., *centriflora* Lk. et Otto), scorpionartige, 5. w. Brasilien, Guiana.

*sericea* Rich., seidenhaarige, 4. w. Cayenne.

*triplinerva* Spgl., dreinervige, ☉. w. m. f. Brasilien.  
*senegalensis* Less. v. *Decaneuron senegalense*.

**Veronica** T., Ehrenpreis, II. 1., Personatae-Veroniceae.

*acinifolia* L. (? *romana* All.), feldthymianblättriger, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

*abrotanifolia* Lk., stabwurzblättriger, 4. f. Sibirien.

*acutiflora* Lapeir., spitzblumiger, 4. f. Pyrenäen.

*agrestis* L. (*pulchella* Bast., *versicolor* Fr.), Acker-E., ☉. f. Europa.

*alpina* L., Alpen-E., 4. f. b. Europäische Alpen.

β) *integrifolia* Schrk. (*Gebhardiana* Vest.), γ) *rotundifolia* Schrk., δ) *pumila* All., ε) *obtusifolia* R. et S., ζ) *heterophylla* R. et S.

*amoena* Stev., lieblicher, ☉. f. Iberien.

*anagalloides* Guss., gauchheilähnlicher, 4. Wa. f. Sicilien.

*Angallis* L., Wasser-E., 4. Wa. f. Europa.

β) *tenella* Schm., γ) *rosea* K. (*aquatica* Bernh.)



## Veronica

*angustifolia* Fisch. (*linariaefolia* Pall.), schmalblättriger, 4. f. Sibirien.

*aphylla* L., blattloser, 4. f. Europäische Alpen.

β) *depauperata* W. K.

*arguta* Schrad., spitzzahniger, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

*arvensis* L., Feld-E., ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *polyanthos* Thuill., γ) *nana* Lam. (*romana* Schm.)

*australis* Schrad. (*hybrida* L., *paludosa* Lej.), südlicher, 4. f. Süd- und Westeuropa.

*austriaca* L. (*polymorpha* W., *Jacquini* Schott), österreichischer, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Taurien, Kleinasien, Sibirien.

β) *multifida* L., b) *pilocarpa* Lk. (*trichocarpa* R. et S.), γ) *tenuifolia* Stev. MB.

*azurea* H. Vindob., azurblauer, 4. f. ?

*Bachhoffenii* Häuff., Bachhoff's, 4. f. Banat.

*Baumgartenii* R. et S. (*petraea* Baumg.), Baumgarten's, 4. f. b. Dinarische Alpen.

*Beccabunga* L., Bachbungen-E., 4. Wa. f. Europa.

β) *limosa* Lej.

*bellidioides* L., maßliebenblättriger, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

*biloba* L., zweilappiger, ☉. f. Kleinasien, Caucasus.

*Buxbaumii* Tenor. (*hospita* M. et K., *persica* Poir., *Tournefortii* Gmel., *filiformis* DC.), Buxbaum's, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

*callistachya* Ledeb., schönähriger, 4. f. Podolien.

*canescens* Schrad. (*neglecta* Vahl.), weißgraulicher, 4. f. Ungarn, Sibirien.

*caroliniana* Poir., carolinischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

*cartilaginea* Ledeb., knorpeliger, 4. f. Dahurien.

*caucasica* MB. (*ossetica* Stev.), caucasischer, 4. f. Caucasus, Iberien.

b) *latifolia*.

*Chaixii* Lapeyr., Chaix's, 4. f. Frankreich.

*Chamaedrys* L. (*lamiifolia* Heyne, *melissaeifolia* Poir.), Wiesen-E., 4. f. Europa.

b) *variegata*, β) *pilosa* Schm. (*plicata* Pohl.)

? *corymbosa* Loud., traubendoldiger 4. f. ?

*crenulata* Hoffm. (*villosa* Schrad.), gekerbter, 4. f. ?

*cretica* Pall., cretischer, 4. k. Creta.

*crispa* Lodd., krauser, 4. f. ?

*Cymbalaria* Bertol. (*cymbalariaefolia* Vahl., *panormitana* Guss.), Cymbelkraut-E., ☉. f. Süd- und Osteuropa.

*decussata* Ait. (*elliptica* Forst.), kreuzblättriger, ⚥. k. Neuzeeland, Patagonien.

*dianthifolia* Cunn. (*pulchra* G. Don), nelkenblättriger, 4. k. Neuholland.

*didyma* Tenor. (*polita* Fr.), zwillingsartiger, ☉. f. Europa.

*digitata* Vahl, fingerförmiger, ☉. f. Südfrankr., Spanien.

*distans* RB., entferntblumiger, 4. k. Neusüdwallis.

*elegans* DC. (? *incarnata* G. Don), zierlicher, 4. f. Belgien.

*formosa* RB., schöner, ⚥. k. Neuholland.

*fruticulosa* L. (*frutescens* Scop.), strauchiger, 4 ⚥. f. Europäische Alpen.

β) *Arbustulosa* Hoffm.

*gentianoides* Vahl. (*gentianaefolia* Swt.), enzianblättriger, 4. f. Taurien, Caucasus, Kleinasien.

β) *pallida* Hornem.



# Veronica

- glabra Ehrh., kahler, 4. f. Südeuropa.  
 b) flore albo.  
 gracilis RB., schlanker, 4. k. Neusüdwallis.  
 grandis Fisch., grofszähniger, 4. f. Sibirien.  
 hederæfolia L. (*Lappago* Schrk.), epheublätteriger, ☉. f. Europa.  
 incana L., greisgrauer, 4. f. Podolien.  
 incisa Ait., schlitzblätteriger, 4. f. Sibirien.  
 labiata RB. (*Derwentia* Andr.), langtraubiger, 4. k. Neuholland.  
 laciniata Ait., geschlitzter, 4. f. Sibirien.  
 latifolia L. (*Pseudochamaedrys* Jacq.), breitblätteriger, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 β) minor Schrad. (*Teucrium* Vahl., ? L., γ) crinita Kit.  
 leucantha Fisch., weifsblumiger, 4. f. Sibirien.  
 longebracteata Lk., langdeckblätteriger, 4. f. ?  
 a) angustifolia Lk. (*media* W.), β) latifolia Lk., (*hybrida* W.), γ) brevifolia Lk. (*brachyphylla* R. et S.)  
 longifolia L., langblätteriger, 4. f. Mitteleuropa.  
 b) alba, c) incarnata, β) acuta Mart., γ) complicata Hoffm., δ) elatior Ehrh. (et *exaltata* Hort.), ε) Hostii R. et S. (*elatior* Host), ζ) ambigua Mart., η) persicifolia Schott., θ) rigens Mart., ι) praealta H. C.  
 luxurians Ledeb., üppiger, 4. f. Sibirien.  
 maritima L. (*oxyphylla* Stev.), Meerstrands-E., 4. f. Nordeuropa.  
 β) grossa Mart.  
 maxima Stev., grofser, ☉. f. Iberien.  
 media Schrad. (*alternifolia* Lej.), mittlerer, 4. f. Westdeutschland, Belgien.  
 melancolica Dsf., dunkelfarbiger, 4. f. ?  
 Michauxii Lam., Michaux's, 4. f. Kleinasien.  
 microphylla Kit., kleinblätteriger, 4. t. Ungarn.  
 mollis Zea (*micrantha* Lk.), weicher, 4. k. f. b. Spanien Portugal.  
 montana L., Berg-E., 4. f. Mitteleuropa.  
 Mülleriana R. et S., Müller's, 4. f. Syrien.  
 nitida Lk. (*arguta* W.), glänzender, 4. f. ? Südeuropa.  
 β) falcata Mart. (*mesotypa* Lk.)  
 Nummularia Gouan (*irregularis* Lapeyr.), kreisblätteriger, 4. h. k. b. f. Pyrenäen.  
 officinalis L., gebräuchlicher, 4. f. Europa, Nordamer.  
 β) Tournefortii Vill., γ) spadana Lej.  
 opaca Fr., dunkler, ☉. f. Europa.  
 orchidea Crtz. (*cristata* Bernh., *hybrida* MB., *crassifolia* Kit.), orchisblumiger, 4. f. Osteuropa.  
 β) longiflora R. et S.  
 orientalis Ait. (*heterophylla* Salish.), morgenländischer, 4. f. Kleinasien.  
 paniculata L., rispiger, 4. f. Böhmen, Tatarei.  
 parviflora Vahl., kleinblumiger, h. k. Neuzeeland.  
 pectinata L., kamnblätteriger, 4. h. f. b. Konstantinopel.  
 peduncularis MB., haarstielliger, 4. f. Caucasus.  
 peregrina L. (? *romana* L., *carnosula* Lam.), fremder, ☉. f. Südeuropa, Nordamerika.  
 perfoliata RB., durchwachsenblätteriger, 4. h. k. Neuholl.  
 petraea Stev., Felsen-E., 4. f. Caucasus.

## Veronica

- pinnata L., gefiederter, 4. f. Sibirien.  
 plebeja RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neusüdwallis.  
 polystachya Lk., vielähriger, 4. f. ?  
 Ponae Gouan (*pumila* All. *sempervirens* Lam.), Pona's,  
 4. f. k. Oberitalien, Südfrankreich.  
 praecox All. (*romana* Scop., *ocymifolia* Thuill.), früher,  
 ☉. f. Mittel-, Süd-, Ost- und Westeuropa.  
 prostrata L., gestreckter, 4. f. Europa.  
      $\beta$ ) *saturejaefolia* Poit. et Turp.  
 pyrenaica All. (*Allionii* Vill.), pyrenäischer, 4. f. Ober-  
 italien, Pyrenäen.  
 repens All., kriechender, 4. f. Italien.  
 rubicunda Ledeb., röthlicher, 4. f. Dahurien.  
 ruthenica Jacq., russischer, 4. f. Rußland.  
 saxatilis Jacq. (*suffruticosa* Lodd.), Gesteins-E., 4. f. f.  
 Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.  
 scutellata L., schildförmiger, 4. Wa. f. Europa.  
      $\beta$ ) *pubescens* K. (*parvularia* Poit. et Turp.)  
 serpyllifolia L., quendelblättriger, 4. f. Europa, Amerika.  
      $\beta$ ) *tenella* All.,  $\gamma$ ) *neglecta* Schm.,  $\delta$ ) *quader-*  
*nata* Loud.,  $\epsilon$ ) *nummularifolia* Loud.,  $\zeta$ ) *humifusa* Dicks.  
 setigera D. Don. (*hirsuta* Hopk.), borstiger, 4. f.  
 Schottland.  
 sibirica L., sibirischer, 4. f. Sibirien.  
 speciosa Cunn., prächtiger, f. k. t. Van-Diemensland.  
 spicata L. (*confusa* R. et S., *Waldsteiniana* Schott.,  
*menthaefolia* Schott.), ährenblumiger, 4. f. Europa.  
      $\alpha$ ) *Clusii* Schott.,  $\beta$ ) *spumosa* Presl.,  $\gamma$ ) *arguta*  
 Morett.,  $\delta$ ) *Barrelieri* Schott.,  $\epsilon$ ) *nitens* Host  
 (*Sternbergiana* Bernh.)  
 spuria L., unächter, 4. f. Mittel-, West- und Ost-  
 deutschland, Ungarn, Siebenbürgen.  
      $\alpha$ ) *amethystina* W. (*Schraderi* K.),  $\beta$ ) *laxiflora*  
 Lej.,  $\gamma$ ) *foliosa* WK. (*nitida* Ehrh.),  $\delta$ ) *brevi-*  
*folia* MB.  
 Stephaniana R. et S. (*mollis* Lk.), Stephan's, 4. f.  
 Persien.  
 stolonifera Lehm., wurzelrankiger, 4. f. Nordamerika.  
 tenuis Ledeb., dünner, ☉. f. Nordpersien.  
 Teucrium L. (*dentata* Schm. Schrad., *Schmidtii* R. et  
 S.), Gamander, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
 triphyllus L., dreiblättriger, ☉. f. Europa.  
      $\beta$ ) *romana* All.  
 tubiflora Fisch. et Mey., röhrenblumiger, 4. f. Dahurien.  
 urticaefolia L. (*latifolia* Scop.), nesselblättriger, 4. f.  
 Mittel- und Osteuropäische Voralpen.  
      $\beta$ ) *circaeoides* G. Don.  
 verna L. (*pinnatifida* Lam., *Dillenii* Crtz., *succulenta*  
 All.), Frühlings-E., ☉. f. Europa.  
      $\beta$ ) *Bellardi* All. Wulf.  
 virginica L., virginischer, 4. f. Virginien.  
      $\beta$ ) *incarnata*.  
 Wormskioldii R. et S., Wormskiold's, 4. f. Aleutische Ins.  
     *Crista Galli* Stev. v. *Diplophyllum veronicaeforme*.  
 Vesicaria Lam., Blasenschötchen, XV. II., Cruciferae.  
 arctica Richards., nördlichstes, 4. k. Nördlichst. Amer.  
 arenosa Richards., Sand-B., 4. k. Nördliches Amerika.  
 cretica Poir. (*fruticulosa* Desv.), cretisches, f. k. Creta.

## Vesicaria

*gracilis* Hook., schlankes, ☉. f. Texas.

*grandiflora* Hook., großblumiges, ☉. f. Texas.

*reticulata* Lam., netzförmiges, 4. k. f. b. Armenien, Syrien.

*sinuata* Poir., buchtiges, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Italien, Spanien.

*utriculata* Lam., schlauchförmiges, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Ungarn.

*deltoidea* Poir. v. *Aubrietia deltoidea*, *edentula* Poir.

(*microcarpa* Vis.) etc. v. Koniga *edentula* etc.

**Vestia** W. (Vest, Prof. der Botanik zu Grätz), V. I., Solanaceae.

*lycioides* W., bocksdornähnliche, 5. k. Chili.

**Vetiveria** A. P. Th., Vetiverie, III. II., Gramineae.

*Iwarancusa* A. P. Th., officinelle, 4. w. Ostindien.

**Viborgia** *obcordata* Thbg. et *sericea* Thbg. v. *Löthainia obcordata* et *sericea*, Nachtr.

**Viburnum** T. (et *Opulus* T. et *Tinus* T.), Schneeball, V. III., Dipsaceae Viburneae.

*acerifolium* L., ahornblättriger, 5. f. Nordamerika.

*cassinoides* L. (*punctatum* Rafn., *obovatum* Walt.), dickblättriger, 5. 5. k. f. b. Carolina.

*cotinifolium* D. Don, cotinusblättriger, 5. k. f. b. Nepal.

*dahuricum* Pall., dahurischer, 5. f. Sibirien.

*dentatum* L., gezahnter, 5. f. Nordamerika.

b) *pubescens* Lodd., c) *fol. variegatis* Lodd.,

d) *acuminatum* Lodd., e) *longifolium* Lodd.,

f) *montanum* Lodd.

*edule* Pursh., genießbarer, 5. f. Nordamerika.

*laevigatum* Ait. (*lanceolatum* Hill), glatter, 5. k. f. b. Carolina.

**Lantana** L., wolliger (Schlingbaum, 5. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

b) *foliis variegatis* Lodd.

*lantanoides* Mchx. (*Lantana grandifolium* Ait. L. *canadense* P.), schlingbaumähnlicher, 5. f. Nordamerika.

**Lentago** L., canadischer (baumartiger), 5. f. Nordamer.

*molle* Mchx., (*alnifolium* Marsh.), weicher, 5. f. Nordam.

*monogynum* Blum. einweibiger, 5. w. Ostindien.

*nitidum* Ait., glänzender, 5. k. f. b. Nordamerika.

*nudum* L., nackter, 5. f. Nordamerika.

*odoratissimum* Ker, wohlriechender, 5. k. China.

**Opulus** L., gemeiner (Wasserholder), 5. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

b) *sterile* Dsf. (*roseum* Bauh.), c) *foliis variegatis* Lodd.

*orientale* Pall., morgenländischer, 5. f. Armenien, Caucas.

**Oxycoccus** Pursh. (*opuloides* Mühlbg., *trilobum* Marsh., *americanum* Mill.), amerikanischer, 5. f. Nordamerika.

β) *subintegrifolium* Hook.

*prunifolium* L. (*Lentago du Roi*), pflaumenblättriger, 5. f. Nordamerika.

*pubescens* Pursh. (*tomentosum* et *villosum* Rafn., *Rafinesquianum* Schult., *dentatum* β. *pubescens* Ait., *dentatum semitomentosum* Mchx.), weichhaariger, 5. f. Nordamerika.

*pyrifolium* Lam., birnblättriger, 5. f. Nordamerika.

*rugosum* P. (*rigidum* Vent.), runzeliger, 5. 5. k. Canarische Inseln.

*squamatum* Mühlbg., schuppiger, 5. f. Nordamerika.



## Viburnum

tinoides Mutis. (*ayavacense* H. B. K.), lorbeerblättriger,  $\frac{1}{2}$ . w. Südamerika.

Tinus L., Lorbeer-S. (*Laurus-Tinus*),  $\frac{1}{2}$ . k. f. b. Südeuropa Nordafrika.

$\beta$ ) hirtum Ait. (*lucidum* Mill.),  $\gamma$ ) lucidum Ait.,

$\delta$ ) virgatum Ait.,  $\epsilon$ ) strictum Hort.

tomentosum Thbg., filziger,  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . k. Japan.

villosum Sw., zottiger,  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . w. Jamaika.

Vicia T., Wicke, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

altissima Dsf., höchste, 4. Sch. f. Nordafrika.

americana Mühlbg., amerikanische, 4. Sch. f. Nordamer.

amoena Fisch., liebliche, 4. Sch. f. Sibirien.

amphicarpa Dorthes, verschiedenhülsige,  $\odot$ . Sch. f. Südfrankreich.

angustifolia Roth (*Bobartii* Forst., *lughanensis* Schlchr.), schmalblättrige,  $\odot$ . f. Deutschl., Schweiz, England.

atropurpurea Dsf., dunkelpurpurrothe,  $\odot$ . Sch. f. Nordafrika, Südfrankreich.

bacla Mch., olivenfarbige,  $\odot$ . f. ?

baetica Fisch., spanische,  $\odot$ . Sch. f. Spanien.

benghalensis L., bengalische,  $\odot$ . Sch. f. Griechenland, Ostindien.

bicolor Bernh., zweifarbig,  $\odot$ .  $\sigma$ . Sch. f. Armenien.

$\alpha$ ) annua,  $\beta$ ) armenia,  $\gamma$ ) biennis.

Biebersteinii Bess. (*sordida* MB.), Bieberstein's,  $\odot$ . Sch. f. Podolien, Taurien, Caucasus, österr. Litorale.

biennis L., zweijährige,  $\sigma$ . Sch. f. Sibirien.

biflora Dsf., zweiblumige,  $\odot$ . Sch. f. Nordafrika.

bipartita Mch., zweitheilige,  $\odot$ . f. ?

calcarata Dsf. (*monantha* Retz.), gespornte,  $\odot$ . Sch. f. Spanien, Nordafrika.

canescens La Bill., grauliche,  $\odot$ . Sch. f. Griechenland, Syrien.

capensis Berg. Thbg. (*Orobus c.* Spgl.), capische, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

caroliniana W. (*parviflora* Mchx.), carolinische, 4. Sch. f. Carolina.

cassubica L. (*multiflora* Poll., *Gerardi* Jacq., *milicans* Crtz.), cassubische, 4. f. Sch. Deutschland.

cordifolia Wulf, herzblättrige,  $\odot$ . f. Krain.

Cracca L., Vogel-W., 4. Sch. f. Europa.

b) alba, c) rubra,  $\beta$ ) Kitaibeliana Rchb.,  $\gamma$ ) Gerardi Gaud.

dasycarpa Tenör., wollschotige,  $\odot$ . Sch. f. Neapel.

dentata Fisch., gezahnte,  $\sigma$ . Sch. f. Sibirien.

disperma DC. (*parviflora* Lois.), zweisamige,  $\odot$ . Sch. f. Frankreich.

dubia Schultz, zweifelhafte,  $\odot$ . Sch. f. ?

dumetorum L., Hecken-W., 4. Sch. f. Deutschl., Frankr.

ferruginea Bess., rostfarbige,  $\odot$ . Sch. f. ?

galloprovincialis Poir., südfranzösische, 4. Sch. f. Südfrankr.

glabra Schlr., kahle,  $\odot$ . Sch. f. Schweiz.

globosa Retz, kugelfrüchtige,  $\odot$ . Sch. f. ?

graminea Sm., grasartige,  $\odot$ . Sch. f. Buenos Ayres.

grandiflora Scop., großblumige,  $\odot$ . f. Krain, Oberitalien.

hirsuta Fisch., rauhaarige,  $\odot$ . Sch. f. Sibirien.

hirsutissima Cyril., vielhaarige,  $\odot$ . Sch. f. Neapel.

hirta Balb., rauhhülsige,  $\odot$ . Sch. f. Südfrankr., Italien.

## Vicia

- hybrida L., Bastard-W., ☉. Sch. f. England, Süd- und Osteuropa.
- hyrcanica Fisch. et Mey. (*Biebersteinii* C. A. Mey.), hyrcanische, ☉. Sch. f. Persien.
- incisa MB., schlitzbblätterige, ☉. Sch. f. Taurien.
- intermedia Viv., mittlere, ☉. Sch. f. Nordafrika.
- laevigata Sm., glatte, 4. Sch. f. England.
- lathyroides L., platterbsenähnliche, ☉. f. Europa.
- longifolia Poir., langblättrige, ☉. Sch. f. Syrien.
- lutea L., gelbe, ☉. Sch. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa, Engl.
- megalosperma MB., grofssamige, ☉. Sch. f. Taurien, Cauc.
- β) Michauxii Spgl.
- monadelpha Roth, einbrüderige, ☉. f. Nordamerika.
- multicaulis Ledeb., vielstengelige, 4. Sch. f. Sibirien.
- Musquinez Bosc., Musquinez's, ☉. Sch. f. ?
- narbonensis L., narbonische, ☉. Sch. f. Südfrankreich, Mittelasien.
- Nissoliana L. (*atropurpurea* Lindl.), Nissolle's, ☉. Sch. f. Kleinasien.
- nodosa Fisch., knotige, ☉. Sch. f. ?
- ochroleuca Tenor., gelblichweisse, 4. Sch. f. Süditalien.
- onobrychioides L., esparcettenähnliche, ♂. Sch. f. Südeuropa.
- Orob. DC., Walderven. W., 4. Sch. f. Süddeutschland, Frankreich, Dänemark.
- pannonica Jacq., ungarische, ☉. Sch. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen.
- pellucida Jacq. (*Orob. p.* Spgl.), durchschimmernde, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.
- peregrina L., fremde, ☉. Sch. f. Süd- u. Westeuropa, Kleinasien.
- perennis DC. (*atropurpurea* Tenor.), 4. Sch. f. Südfrankreich, Calabrien.
- pectinata Fisch. et Mey., bemalte, ☉. Sch. f. Armenien.
- pilosa MB., haarige, ☉. Sch. f. Taurien.
- pimpinelloides Mauri, bibernellähnliche, ☉. f. Mittelital.
- pisiformis L., erbsenförmige, 4. Sch. f. Europa.
- platycarpa Roth., breithülsige, ☉. f. ?
- polyphylla Dsf., vielblättrige, 4. Sch. f. Südeuropa.
- polysperma Tenor., vielsamige, 4. Sch. f. Neapel.
- Pseudo-Cracca Bertol., unächte Vogel-W., 4. Sch. f. Ital.
- Pseudo-Orob. Fisch. et Mey., waldervenähnliche, 4. Sch. f. Dahurien.
- pyrenaica Pourr. (*Fagonii* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- rosea Müll., rosafarbige, ☉. Sch. f. ?
- sativa L., gebaute, ☉. Sch. f. Europa, Nordamerika.
- b) intermedia Hort. c) leucosperma Mch. d) alba Mch. e) macrosperma Hort. f) semine pallido Hort. g) semine punctato Hort. β) nemoralis P.
- segetalis Thuill., Saat-W., ☉. Sch. f. Mittel- u. Südeuropa.
- sepium L., Zaun-W., 4. Sch. f. Europa.
- β) montana Froel.
- serratifolia Jacq., sägeblättrige, ☉. Sch. f. Ungarn, Italien, Griechenland.
- sordida WK., schmuziggelbe, ☉. Sch. f. Süd- u. Osteuropa.
- striata MB. (*purpurascens* DC., *uncinata* Rchb.), gestreifte, ☉. Sch. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.



## Vicia

- sylvatica* L., Wald-W., 4. Sch. f. Europa, Nordamer.  
*syriaca* Weinm., syrische, ☉. Sch. f. Syrien.  
*tenuifolia* Roth, dünnblättrige, 4. Sch. f. Deutschland, Taurien, Dahurien.  
*tenuissima* H. Berol., zarte, ☉. Sch. f. ?  
*Thouini* Mart., Thouin's, ☉. Sch. f.  
*torulosa* Dsf., aufgeschwollene, ☉. Sch. f.  
*tricolor* Sebast. (*triflora* Tenor. Sbr.), dreifarbige, ☉. Sch. f. Mittel- und Unteritalien.  
*truncata* MB., abgestutzte, ☉. Sch. f. Caucasus.  
*variegata* Dsf. W. (*consentina* Spgl., *argentea* Lapeyr.), bunte, 4. Sch. f. Süd-, West- u. Osteuropa.  
*villosa* Roth (*polyphylla* W. K.), zottige, ♂. Sch. f. Deutschland, Ungarn.  
*abbreviata* Fisch. (et *oroboides* Wulf.) vid. *Orob. caucasicus* et *Clusii*, *bithynica* L., v. *Lathyrus bithynicus*, *Faba* L., v. *Faba vulgaris*, *gracilis* Loisel. (et *hirsuta* K. et *monantha* K., (*articulata* W., *multifida* Wallr.) etc., vid. *Ervum gracile*, *hirsutum*, *monanthos* etc.

*Vicioides lutea* Mch. etc. v. *Vicia lutea* etc.

*Vieusseuxia* la Roche (*Vieusseux*, Arzt zu Genf), III. I., Irideae.

- Bellendeni* Swt. (*Moraea tricuspis* γ *lutea* Bot. mag.), Bellenden's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
*fugax* La Roche, flüchtige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*glaucois* DC., blaugrünliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.  
*iridioides* Red. (*Moraea Candolleana* Spgl., *Iris curt-petala* DC.), schwertelähnliche, 4. k. ?  
*lurida* Swt., braungraue, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.  
*pavonia* DC., Pfauen-V., 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.  
*spiralis* La Roche (*unguicularis* R. et S.), spiralförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
*tenuis* R. et S., dünne, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.  
*tricuspis* Fisch. (*aristata* (Hort.)), dreispitzige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.  
*villosa* Spgl., zottige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.  
*edulis* Lk., v. *Moraea edulis*, *martinicensis* DC., v. *Cipura martinicensis*.

*Vigna* Savi (Dominicus Vigna, ein Commentator des Theophrastus Eresios, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*glabra* Savi, kahle, ☉. Sch. f. Nordamerika.

*Viguiera* H. B. K. (L. G. A. Viguier, Botaniker zu Montpellier), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

*dentata* Spgl., gezahnte, 4. w. t. Mexico.

*helianthoides* H. B. K., sonnenrosenähnliche, 4. w. Cuba.

*Villarsia* Vent. (Villars, berühmter franz. Botaniker), V. I., Contortae Gentianeae.

*chilensis* Lodd., chilesische, 4. Wa. t. k. Chili.

*geminata* RB., paarblumige, 4. Wa. t. Neuholland.

*Humboldtiana* Kunth. (*cordata* Ell.), Humboldt's, 4. Wa. t. k. Neugranada, Westindien, Südcarolina.

*indica* Vent., indische, 4. Wa. w. Ostind., Mascarenas.

*lacunosa* Vent. (*Menyanthes brachysperma* Mchx.), sumpfliebende, 4. Wa. k. Nordamerika.

*nymphoides* Vent., seerosenähnliche, 4. Wa. f. Europa.

*ovata* Vent., eiförmige, 4. Wa. t. Cap d. gut. Hoffn.

*parnassifolia* RB., parnassienblättrige, 4. t. Neusüdwall.



**Villarsia**

- reniformis RB., nierenförmige, 4. t. Neuholland.  
sarmentosa Bot. mag., starkwurzelnende, 4. t. Neuholl.

**Vilmorinia** DC. (M. Vilmorin, franz. Agronom), XVII.  
iv., Leguminosae-Papilionaceae.

- multiflora DC. vielblumige, 5. w. Westindien.

**Viminaria** Sm., Gertenstrauch, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

- denudata Sm., entblößter, 5. Neuholl., Van-Diemensld.  
*lateriflora* Lk. v. *Daviesia alata*.

**Vinca** L., Sinngrün, V. i., Contortae Apocynae.

- herbacea W. K. (*pumila* Clarke), krautartiges, 4. f.  
Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Thracien.

- major L., großes, 4. 5. k. f. b. England, Südeuropa.  
b) variegata., c) flore pleno., β) intermedia Delil.  
(*media* Hort.).

- minor L., kleines, 4. 5. f. Europa.

- b) alba, c) argenteo-variegata, d) aureo-variegata,  
e) flore pleno, f) flore puniceo.

- pusilla L. (*parviflora* Retz.), zwergiges, 6. w. Ostindien.

- rosea L., rosafarbiges, 5. w. Ostindien.

- b) alba, c) ocellata, d) fol. variegatis.

**Viola** T., Veilchen, V. i., Violaceae.

- allegghanensis R. et S., alleghanisches, 4. f. Nordamer.

- alpina Jacq., Alpen-V., 4. f., Karpathen, österreich. u.  
franz. Alpen.

- altaica Pall. (*grandiflora* L.), altaisches, 4. f. Ostrußs-  
land, Sibirien.

- b) purpurea.

- ambigua W. K., zweifelhaftes, 4. f. Südeuropa, Ungarn.

- amoena Symons (*oreudes* MB.), angenehmes, 4. f. Schott-  
land, Taurien.

- arborescens L. (*suberosa* Dsf.), baumartiges, 5. k. Süd-  
europa, Nordafrika.

- arenaria DC. (*Allionii* Pio, *aprica* Spgl., *glauca* MB.),  
Sand-V., 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

- β) livida Kit. (*Krockeri* R. et S.), γ) rupestris  
Schm. Rchb. (*purpurascens* Schm.).

- asarifolia Pursh., haselwurzblätteriges, 4. f. Nordamer.

- aspera Wall., rauhes, 4. k. Nepal.

- attenuata Swt. (*lanceolata* Pursh. et Nutt.), verdünntes,  
4. f. Nordamerika.

- betonicaefolia Sm., betonienblätteriges, 4. k. Neuholl.

- bicolor Pursh., zweifarbiges, 4. f. Nordamerika.

- biflora L., zweiblumiges, 4. f. Europäische Alpen, Vor-  
alpen, Asien.

- blanda W., liebliches, 4. f. Nordamerika.

- Broussonetiana R. et S. (*cordata* W.), Broussonet's, 4.  
k. Teneriffa.

- caespitosa D. Don. (*Patrinii* γ. DC.), rasenförmiges, 4.  
k. f. b. Nepal.

- calcarata L., gesporntes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
β) Zoysii Wulf. γ) Villarsiana R. et S.

- campestris MB., Feld-V., 4. f. Taurien, Caucasus.

- canadensis L. (*albiflora* Lk.), canadisches, 4. f. Nordamer.  
β) discolor Swt.

- canina L., Hunde-V., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.  
b) alba A. P. c) rubra A. P. β) ericetorum

- Schrad. (*pumila ericetorum* DC.), γ) lucorum Rchb.

## Viola

cenisia L., cenisiches, 4. f. Tyrol, Schweiz, oberitalienische Alpen, Dauphiné.

β) Valderia All.

collina Bess. (*umbrosa* Hoppe), Hügel-V., 4. f. Podolien, Ungarn, Deutschland.

chrysantha Schrad., goldblumiges, 4. f. Schweiz.

conspersa Rchb. (*uliginosa* Mühlbg.), punctirtblättriges, 4. f. Nordamerika.

cornuta L., gehörntes, 4. f. Pyrenäen.

cucullata Ait., kappenförmiges, 4. f. Nordamerika.

dactylotes R. et S. (*digitata* W.), fingerförmiges, 4. f. Sibir.

declinata W. K., niedergebogenes, ♂. 4. f. Ungarn, Schweiz, Italien.

decumbens L., niederliegendes, 4. f. f. Cap d. g. H. epipsila Ledeb., livländisches, 4. f. Livland.

elator Fr. (*persicifolia* M. et K., *montana* Roth.), hohes, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa.

eriocarpa Lewis, wollfrüchtiges, 4. f. Carolina.

flavicornis Sm., gelbsporniges, 4. f. f. England.

Gmeliniana R. et S. (*sibirica* Gmel.), Gmelin's, 4. f. Sibir.

gracilis Sm. (*heterophylla* Bertol., *Bertolinii* Pio), schlankes, ♂. 4. f. Italien, Sicilien, Kleinasien.

hastata Mchx., spontanblättriges, 4. f. Nordamerika.

hirta L. (? *hirsuta* R. et S.), rauhhaariges, 4. f. Europa.

humilis H. B. K., niedriges, 4. k. Mexico.

japonica Langsd., japanisches, 4. k. Japan.

lactea Sm. (*stagnina* Kit., *montana* Auct.), milchweißes, 4. f. England, Mittel-, West- und Osteuropa.

lanceolata L., lanzettliches, 4. f. Sibirien, Nordamerika.

lancifolia Bess., lanzettblättriges, 4. f. Podolien, Galicien.

Langsdorffii Fisch., Langsdorff's, 4. f. Aleutische Inseln.

lutea Huds. Sm., gelbes, 4. f. England, mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

β) grandiflora Vill. γ) sudetica W. δ) angustifolia Schlecht.

mirabilis L., wunderbares, 4. f. Europa, Caucasus.

montana L., Berg-V., 4. f. Nordeuropa.

multifida W. (*pinnata* Gmel.), vieltheiliges, 4. f. Sibir.

nummularifolia All., pfennigkrautblättriges, 4. f. Oberitalien, Corsica.

Nuttallii Pursh., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

obliqua Ait., schiefes, 4. f. Nordamerika.

ochroleuca Lewis (*striata* Pursh.), gelblichweißes, 4. f. Nordamerika.

occulta Lehm. (*appendiculata* DC.), verborgenblumiges, ♂. f. Nordpersien.

odorata L., wohlriechendes, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.

a) lilacina (*purpurea*), b) alba Bess.. c) coerulea,

d) lilacina (*purpurea*) plena, e) alba plena, f)

coerulea plena, g) pallida plena, h) semper-

florens Hort. (*italica* Hort.).

ovata Nutt. (*primulaefolia* Pursh.), eiförmiges, 4. f. Nordamerika.

Pallasii Fisch., Pallas's, 4. f. Sibirien.

palmensis P. B. Webb., palma'sches, f. k. Balearen.

palmaris Hamilt., handhohes, 4. k. Nepal.

palmata L., handförmiges, 4. f. Nordamerika.

b) variegata.

## Viola

palustris L., Sumpf-V., 4. f. Europa, Sibir., Nordamer.

β) uliginosa Fr., γ) pensylvanica Loud.

papilionacea Pursh., schmetterlingsblumiges, 4. f. Pensylv.

pedata L., fußförmiges, 4. f. Nordamerika.

β) digitata Pursh. (*flabellata* D. Don *ranunculifolia* Poir.).

pedatifida G. Don, fußspaltiges, 4. f. Nordamerika.

persicifolia Roth. (*pratensis* Mert. et K. *lactea* K. et Ziz.

*Ruppii* Presl.), pfirsichblättriges, 4. f. Mitteleuropa.

pinnata L., gefiedertes, 4. f. b. k. Kärnthen, Krain, Tyrol, penninische, cottsche Alpen.

praemorsa Dougl., stumpfwurzeliges, 4. f. Columbia.

primulaefolia L., primelblättriges, 4. f. Nordamerika.

prionantha Bunge, kerblumiges, 4. f. Asiat. Rußland.

prunellaefolia Fisch. (*Patrinii* DC.), braunheilblättriges, 4. f. Sibirien.

pubescens Ait. (*pensylvanica* Mchx.), weichhaariges, 4. f. Nordamerika.

pumila Vill. (*lancifolia* Thore), kleines, 4. f. Frankreich, Belgien.

pygmaea Juss., zwergiges, 4. t. Peru.

pyrenaica Ram., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

radicans DC., starkwurzelndes, 4. f. k. Carolina.

Riviniana Rchb. (*neglecta* M. B.), Rivin's, 4. f. Europa.

rothomagensis Dsf., normandisches. ♂. 4. f. Frankreich, Belgien, Westdeutschland.

rotundifolia Mchx. (*calthaefolia* Poir. *clandestina* Pursh), rundblättriges. 4. f. Nordamerika.

Ruppii All. (*nemoralis* Kützing, *stricta* Hornem., *Hornemanniana* R. et S.), Rupp's, 4. f. Nord-, Mittel- und Südeuropa.

sagittata Ait. (*dentata* Pursh.), pfeilblättriges, 4. f. Nordamerika.

sarmentosa MB., wurzelrankiges, 4. f. Caucasus.

saxicola R. et S. (*saxatilis* Hffg., Gesteins-V., 4. f. Portug.

Selkirkii Gold., Selkirk's, 4. f. Nordamerika.

striata Ait. (*debilis* Mchx.), gestreiftes, 4. f. Nordamer.

suavis M. B., feinriechendes (Königs-V.), 4. f. Oesterreich, Ungarn, Taurien.

b) flore pleno.

sylvestris Lam. (*canina* DC., *canina* β. *sylvatica* Fr.), *neglecta* Auct. *flexuosa* Morett.), Wald-V., 4. f. Europa.

tricolor L., dreifarbiges (Stiefmütterchen), ☉. 4. f.

a) vulgaris, β) arvensis Murray., γ) saxatilis

Schm., δ) banatica Kit. (*Kitaibeliana* R. et S.),

*syrtica* Flörke), ε) hybrida (*elegans*), b) episcopa-

lis Hffg., c) maxima Hffg., d) multicolor Hffg. etc.

tripartita Ell. (*trifida* Spgl.), dreitheiliges, 4. f. b. k. Nordamerika.

uliginosa Schrad. (*nitens* Host., *scaturiginosa* Wallr.),

Quellen-V., 4. f. Deutschland, Krain, Galicien.

uniflora L., einblumiges, 4. f. Sibirien.

variegata Fisch., buntblumiges, 4. f. Dahurien.

Unbestimmtere: *litoralis* Spgl., 4. f. Nordeuropa

*Schmidtiana* Schult., 4. f. Böhmen.

*capensis* Thbg., v. *Jonidium capense*, *concolor* Forst

v. *Solea concolor*, *hederacea* La Bill, vid. *Erpetion*



## Viola

hederaceum, *Hybanthus* Aubl., vid. *Corynostyles Hybanthus*, *longifolia* Poir., vid. *Noisettia longifolia*.

**Virgilia** Lam. (Publius Virgilius Maro, berühmter römischer Dichter), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

aurea Lam., goldfarbige, f. t. Abyssinien.

capensis Lam., capische, f. k. Cap d. guten Hoffn.

lutea Mchx., gelbblumige, f. k. f. b. Nordamerika.

robinoides DC., robinienähnliche, f. k. Cap d. g. H.

secundiflora Cav., einseitigblumige, f. t. Neuspanien.

sylvatica DC., Wald-V., f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

? *intrusa* RB., v. *Hypocalyptus obcordatus*.

*Viscago* Hall. vid. *Silene*.

*Viscaria vulgaris* Röhl., vid. *Lychnis Viscaria*.

**Viscum** T., Mistel, XXII. IV. 1., Caprifoliaceae-Loranthaeae.

album L., weißer, f. f. Europa, Nordamerika, Japan.

β) *polycoccon* Gaud.

*Oxycedri* DC. (*Arceuthobium Oxycedri* MB., *Razumowskia caucasica* Hoffm.), Wachholder-M., f. f. Südfrankreich, Dalmatien, Caucasus, Taurien.

*Visenia umbellata* Houtt. etc. v. *Riedlea velutina* etc.

**Vismea** Vandell. (M. de Visme, ein Kaufmann zu Lisabon), XVIII. 11., Guttiferae-Hypericineae.

brasiliensis Choix., brasilianische, f. f. w. Brasilien.

glabra R. et P., kahle, f. f. w. Peru.

guianensis P., guianische, f. f. w. Guiana, Brasil, Peru.

*Visnea Mocanera* L. fil. vid. *Mocanera canariensis* Nachtr.

**Vitex** T., Keuschbaum (Müllen), XIV. 11., Verbenaceae.

Agnus Castus L., gemeiner, f. k. f. b. Südeuropa.

alata Roth., geflügelter, f. w. Ostindien.

altissima L., höchster, f. w. Ceylon.

arborea Roxb., baumartiger, f. w. Ostindien.

bicolor W., zweifarbiger, f. w. Ostindien.

incisa Lam., schlitzblättriger, f. f. k. China.

Negundo L. (*paniculata* Lam.), rispiger, f. w. Ostind.

ovata Thbg. (*rotundifolia* L. suppl.), eiförmiger, f. k.

Japan, China, Neuholland.

triflora Vahl., dreiblumiger, f. w. Cayenne.

trifolia L., dreiblättriger, f. w. Ostindien.

umbrosa Sw., schattenliebender, f. w. Westindien.

*Leucoxylon* L., vid. *Wallrothia Leucoxylon*.

**Vitis** T., Weinstock, V. 1., Viniferae (Ampelideae).

aestivalis Mchx. (*vulpina* W.), Sommer-W., f. Sch. f. Nordamerika.

caribaea DC. (*indica* Sw.), caribäischer, f. Sch. w. Caribäen.

dentata Lk., gezahnter, f. Sch. t. ?

glabrata Roth. (*latifolia* Roxb. D. Don), glatter, f. Sch. w. Ostindien.

indica L., indischer, f. Sch. w. Ostindien.

Labrusca L., filziger, f. Sch. f. Nordamerika.

b) *baccis albis*.

laciniosa L. (*apiifolia* Bauh.), schlitzblättriger, f. Sch. f. ?

palmata Vahl, handförmiger, f. Sch. f. Nordamerika.

Purani Hamilt., Puran's, f. Sch. f. b. k. Nepal.

riparia Mchx. (*incisa* Jacq., *odoratissima* Donn), uferliebender, f. Sch. f. Nordamerika.

rotundifolia Mchx., rundblättriger, f. Sch. f. Nordamer.

## Vitis

*sinuata* G. Don. (*aestivalis sinuata* Pursh, ? *labruscoides* Mühlbg.), buchtiger, ♀. Sch. f. Nordamerika.

*vinifera* L., ächter, ♀. Sch. f. Armenien, Taurien, Caucasus.

b) *foliis incanis*, c) *foliis rubescentibus* etc.

*vulpina* L. (*cordifolia* Mchx.), Fuchs-W., ♀. Sch. f. Nordamerika.

*arborea* Mill. et *indivisa* W. v. *Ampelopsis bipinnata* et *cordata*, *quinquefolia* Lam. v. *Ampelopsis hederacea*.

**Vitmannia** Vahl. (F. Vitmann, Professor zu Mailand) (*Samadera* G.), VIII. 1., Tricoccae Simarubeae.

*elliptica* Vahl., elliptische, ♀. w. Ceylon.

**Vittaria** Sm., Bandfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

*graminifolia* Kaulf., grasblättriger, 4. w. Brasilien.

*lineata* Sw. (*angustifolia* Mchx.), schmalblättriger, 4. w. Florida, Westindien.

**Voandzeja** A. P. Th. (madagascarischer Name), XVII. 1. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

*subterranea* A. P. Th., unterirdische, ♂. w. m. Südafrika.

**Vochysia** Juss. (caribäischer Name) (*Cucullaria* Schrbr.), I. 1., Lythraeae Vochysieae.

*excelsa* Lam., hohe, ♀. w. Trinidad, Guiana.

**Vohiria** Lam. (*Voyra* Aubl., guianischer Name), V. 1., Contortae Gentianeae.

*rosea* Aubl. (*Lita rosea* rosafarbige, 4. w. Guiana.

**Volckameria** L. (J. G. Volckamer, Kaufmann u. Botaniker zu Nürnberg), XIV. 11., Verbenaceae.

*aculeata* L., stachelige, ♀. w. Westindien.

*japonica* Thbg., japanische, ♀. t. k. Japan.

*angustifolia* Andr. et *buxifolia* W. et *fragrans* Vent. (*japonica* Hort.), etc. v. *Clerodendron heterophyllum buxifolium* et *fragrans* etc.

**Volkmannia japonica** Jacq. v. *Clerodendron fragrans*.

**Vouapa** Aubl. (caribäischer Name), III. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

*bifolia* Aubl. (*Macrolobium hymenaeoides* Vahl.), zweiblättrige, ♀. w. Guiana.

**Vulpia** C. C. Gmel. (Vulpus, Apotheker zu Carlsruhe), III. 11., Gramineae.

I. *Mygalurus* Lk.

*Alopecurus* Lk. (*Festuca* A. Schousb.), fuchsschwanzähnliche, ♂. f. Südspanien, Nordafrika.

*bromoides* Rchb., trespenähnliche, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

*delicatula* Lk. (*Festuca d. Lagas.*), feine ♂. f. Spanien.

*geniculata* Lk. (*Bromus g. L. et stipoides* L. *Festuca g. W.*, *F. stipoides* DC.), gekniete, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

*ligustica* Lk. (*Bromus l. All.*), ligurische, ♂. f. Oberitalien.

*Myuros* Rchb. (*ciliata* Lk., *Festuca ciliata* Danth. DC., *Myuros* L.), gefranzte, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

*Pseudo Myuros* Rchb. (*Mygalurus caudatus* Lk., *Vulpia Myuros* Gmel., *Festuca Myuros* Auct.), gemeine, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Südamerika.

β) *sciuroides* Rchb. (*bromoides* Lk., *Festuca s. Roth.*)

*uniglumis* Rchb. (*membranacea* Lk., *Festuca uniglumis* Soland.), einspelzige, ♂. f. England, Südeuropa.

II. *Nardurus* Rchb.

*Lachenalii* \* (*Brachypodium Poa* et *Halleri* R. et S.,

## Vulpia

*Festuca Poa* Kunth.), Lachenal's, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

β) *ramosa* \* γ) *festucoides* \*.

*tenella* \* (*Brachypod. festucoides* Lk., *Festuca tenella* W., *F. bromoides* Mchx., *Diarrhena setacea* R. et S.), zarte, ☉. f. Nordamerika.

*tenuiflora* \* (*Festuca t.* Schrad.), dünnblumige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

β) *biuncialis* \* γ) *tenuicula* \* (*Brachypodium tenellum et tenuiflorum* R. et S., *Nardus* Lk., *F. tenuiflora* γ. *aristata* K.).

### Wachendorfia L. (E. J. Wachendorf, holländischer Botaniker), III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

*brevifolia* Soland., kurzblättrige, 4. k. C. der gut. H.  
*Breyniana* R. et S., Breyn's, 4. k. Cap der guten H.  
*graminea* Thbg., grasartige, 4. k. Cap der guten H.  
*Hibberti* Swt. (*paniculata* β. Bot. mag.), Hibbert's, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

*hirsuta* Thbg., rauhhaarige, 4. k. Cap der guten H.  
*paniculata* Thbg., rispige, 4. k. Cap der guten Hoffn.  
*tenella* Thbg., zarte, 4. k. Cap der guten Hoffnung.  
*thyrsiflora* L., strauchblumige, 4. k. Cap der guten H.

*umbellata* L. v. *Dilatris corymbosa*.

### Wahlenbergia Schrad. (G. Wahlenberg, berühmter schwedischer Botaniker), V. 1., Campanulaceae.

*capensis* A. DC. (*elongata* Schrad.), capische, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

*cernua* A. DC. (*gracilis* E. Mey.), übergebogene, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

*divergens* A. DC., divergirende, ☉. f. Cap der gut. H.  
*gracilis* A. DC., schlanke, ☉. ♂. f. k. Neuholl., Van-Diemensland.

β) *litoralis* La Bill.

*hederacea* Rchb., epheuähnliche, 4. f. Dänemark, England, Westeuropa.

*lobelioides* A. DC. (*pendula* Schrad.), lobelienähnliche, ☉. f. Canarische Inseln.

*repens* Schrad., kriechende, ♂. 4. k. Cap. d. g. Hoffn.  
*Erinus* Lk. vid. *Campanula Erinus*, *grandiflora* Schrad. vid. *Platycodon grandiflorus*.

### Waldtschmidtia nymphoides Wigg. v. Villarsia nymphoides.

### Waitzia Rchb. (Waitz, Kammerrath und Gartendirector zu Altenburg), III. 1. Irideae.

*aequimaculata* Rchb., gleichfleckige, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*anigozanthaeiflora* (Swt.), anigozanthusblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*concolor* (Swt.), einfarbige, 4. Zw. k. Cap der g. H.  
*crispa* Rchb., krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
*crocata* Rchb., safranfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*deusta* Rchb., brandfarbige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.  
*fenestrata* Rchb., durchsichtige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) *purpurea*.

*flava* Rchb., hellgelbe, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
*fucata* (Lindl.), geschminkte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*lineata* Rchb., schmalblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*longiflora* Rchb., langblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*miniata* Rchb., mennigrothe, 4. Zw. k. Cap der g. H.  
*odorata* (Lodd.), wohlriechende, 4. Zw. k. C. d. g. H.



**Waitzia**

*pallida* Rchb., bleichblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*pectinata* Rchb., kammförmige, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*refracta* Rchb., zurückgeknickte, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*Rochensis* Rchb., la Roche's, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
*rosea* Rchb. (*Tritonia capensis* Ker), rosafarbige, 4. Zw.

k. Cap der guten Hoffnung,

*squalida* Rchb., schmuzigrothe, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*striata* Rchb., gestreifte, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffg.  
*tenuiflora* (Loud.), dünnblumige, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*viridis* Rchb., grüne, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
*xanthospila* Rchb., gelbährige, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
*securigera* Hort. v. *Montbretia securigera*.

**Waldsteinia** W. (Graf von Waldstein, Mitherausgeber der Flora Ungarns), XII. II., Rosaceae.

*geoides* W., nelkenwurzähnliche, 4. f. Ungarn, Siebenbürg.  
*trifolia* Roch., dreiblättrige, 4. f. Siebenbürgen.

*Doniana* Tratt. v. *Comaropsis Doniana*.

**Walkeria** Schrb. (R. Walker, Gründer des botanischen Gartens zu Cambridge), V. I., Tricoccae-Ochnaceae.

*integrifolia* DC., ganzblättrige, 5. w. Guiana.

*serrata* W., sägeblättrige, 5. w. Ostindien.

**Wallichia** Roxb. (N. Wallich, Vorsteher des botanisch. Gartens zu Calcutta), XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

*caryotoides* Roxb., brennpalmenähnliche, 5. w. Ostindien.

*spectabilis*, H. C. ansehnliche, 5. w. Ostindien.

**Wallrothia** Roth. (Dr. Wallroth, berühmter deutscher Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.

*Leucoxylon* Roth., weißholzige, 5. w. Ostindien.

*Wallrothia tuberosa* et *splendens* Spgl. v. *Ligusticum alpinum* et *splendens*.

**Wallsura** Roxb. (ostindischer Name), X. I., Hesperideae-Meliaceae.

*robusta* Roxb., ansehnliche, 5. w. Ostindien.

**Waltheria** L. (A. F. Walther, Prof. der Medicin zu Leipzig), XVI. II., Malvaceae-Hermannaceae.

*americana* L. (*indica* Jacq., *arborescens* Cav.), amerikanische, ♂. 5. w. Westindien, Südamerika.

*elliptica* Cav., elliptische, 5. 5. w. Ost- und Westindien.

*glabra* Poir. (*laevis* Schrk., *cordata* Sm.), kahle, 5. 5. w. Westindien.

*indica* L., indische, 5. 5. w. Ostindien.

*microphylla* Cav., kleinblättrige, 5. 5. w. Ostindien.

**Wangenheimia** Mch. (F. A. J. v. Wangenheim, preussischer Oberforstmeister, der in Nordamerika botanisirte), III. II., Gramineae.

*Lima* Trin. (*disticha* Mch.), spanische, ♂. f. Südspanien.

**Watsonia** Ker (W. Watson, Apotheker zu London), III. I., Irideae.

*aletroides* Ker, alettrisähnliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.  
 b) variegata.

*angusta* Ker, schmale, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

*brevifolia* Ker, kurzblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

*compacta* Lodd., dichtblumige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

*fulgida* Salisb., feuerfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

*humilis* Ker, niedrige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

*iridifolia* Ker, schwertelblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

*marginata* Ker, berandete, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

b) minor.

*Meriana* Ker, Merian's, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.

**Watsonia**

plantaginea Ker, wegrittähnliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
 punctata RB., punctirte, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.  
 rosea Ker, rosafarbige, 4. Zw. k. Cap. d. gut. Hoffn.  
 roseo-alba Ker, rosaweißliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) variegata.

rubens Ker (*amoena* Hort.), röthliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.  
 spicata Ker, ährige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.  
 strictiflora Ker, steifblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

**Webera** Schreb. (G. H. Weber et F. Weber, Vater u. Sohn, Professoren zu Kiel), V. 1., Rubiaceae.

coriacea Wall., lederblättrige, f. w. Ostindien.  
 corymbosa W., traubendoldige, f. w. Ostindien.  
 cymosa W., afterdoldige, f. w. Ostindien.

**Wedelia** Jacq. (G. W. Wedel, Professor zu Jena), XIX. 1v., Compositae-Corymbiferae.

acapulcensis H. B. K., Acapulco-W., 4. f. w. Mexico.  
 calendulacea Less. (*benghalensis* Rich.), ringelrosenähnliche, ☉. m. f. Ostindien.

carnosa Rich., fleischige, 4. w. Westindien.

β) triloba Rich., γ) aspera Rich.

helianthoides H. B. K., sonnenrosenähnliche, ♂. 4. w. Südamerika.

hispida H. B. K. (*calendulacea* Rich., *Buphthalmum asperum* Hornem.), steifhaarige, 4. k. Mexico.

paludosa DC., sumpfliebende, ☉. m. f. Brasilien.

radiosa Ker, strahlige, f. w. Brasilien.

aurea D. Don Hook., vid. *Verbesina aurea*, minor Sogl. (*ovatifolia* W.) et *perfoliata* W., vid. *Melampodium divaricatum* et *perfoliatum*.

**Weinmannia** L. (J. W. Weinmann, Apotheker zu Regensburg), J. A. Weinmann, Garteninspector zu Pawlowsk, ausgezeichneter Botaniker), VIII. 11., Saxifrageae-Cunoniaceae.

australis Loud., neuholländische, f. f. k. t. Neuholl.

elliptica H. B. K., elliptische, f. f. w. Südamerika.

glabra L. fil. (*pinnata* L.), kable, f. f. w. Westindien.

hirta Sw., kurzhaarige, f. f. w. Jamaika.

ovata Cav., eiförmige, f. f. w. Peru.

trifoliata L. fil., dreiblättrige, f. f. k. Cap d. g. H.

venosa K. et W. (*Acrophyllum venosum* Benth.), aderige, f. k. t. Neuholland.

**Welwitschia** Rchb. (Dr. Welwitsch, österreichischer Botaniker, welcher jetzt Portugal bereist), V. 1., Polemoniaceae.

densifolia Rchb. (Benth.), dichtblättrige, ☉. f. Californien.

elongata Rchb. (Benth.), verlängerte, ☉. f. Californien.

lutea Rchb. (Benth.), gelbe, ☉. f. Californien.

virgata Rchb. (Benth.), ruthenförmige, ☉. f. Californien.

**Wendlandia populifolia** W. v. *Cocculus carolinus*.

**Werneria** H. B. K. (A. G. Werner zu Freiberg, berühmter Mineralog), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

rigida H. B. K., starre, 4. t. Quito.

**Westringia** Sm. (F. P. Westring, Leibarzt des Königs von Schweden), XIV. 1., Labiatae.

angustifolia RB., schmalblättrige, f. k. t. Van-Diemensland, Neuholland.

cinerea RB., aschfarbige, f. k. t. Neuholland.

Dampieri RB., Dampier's, f. k. t. Neuholland.

**Westringia**

eremicola Cunn. (*longifolia* Lindl.), Einöden-W., f. k. t.

Neusüdwallis.

glabra RB., kahle, f. k. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, f. k. t. Neuholland.

rigida RB., starre, f. k. t. Neuholland.

rosmariniformis Sm., rosmarinähnliche, f. k. t. Neuholl.

rubiaefolia RB., rötheblättrige, f. k. t. Van-Diemensl.

triphylla Ait., dreiblättrige, f. k. t. Neuholland.

*Whitleya stramonifolia* Swt. v. *Anisodus stramonifolius*.

*Wibelia apargioides* Röhl. v. *Willemetia apargioides*, *chondrilloides* Hoppe, Hornsch. v. *Crepis chondrilloides*, *taraxacifolia* Röhl. v. *Barkhausia taraxacifolia*.

**Wiborgia** Roth (Wiborg, Professor zu Kopenhagen), XIX. II., Compositae Corymbiferae.

*Acmella* Roth (*parviflora* H. B. K.), kleinblumige, ☉. f. Peru, Deutschland.

**Wiedemannia** Fisch. et Mey. (Wiedemann, russischer Botaniker), XIV. I., Labiatae.

*orientalis* F. et Mey., morgenländische, ☉. f. Natolien.

**Wigandia** H. B. K. (J. Wigand, Bischof in Ostpreußen im 16. Jahrhunderte), V. II., Convolvulaceae Hydroleae.

*caracasana* H. B. K., caracasanische, 4. f. w. Caracas.

*urens* H. B. K. (*Hydrolea urens* R. et P.), brennende, f. w. Mexico, Peru.

*Wiggersia lutea* G. M. S. etc. v. *Vicia lutea* etc.

**Willdenowia** Thbg. (C. L. Willdenow, Professor zu Berlin, einer der ausgezeichnetsten Botaniker), XXII. III. (III. I.), Restiaceae.

*striata* Thbg., gestreifte, 4. f. k. Cap der guten Hoffn.

*teres* Thbg., rundliche, 4. f. k. Cap der guten Hoffn.

**Willemetia** Neck. (*Peltidium* Zollik.), R. Willemet et P. R. Willemet, Vater und Sohn, französische Botaniker), XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

*apargioides* Cass. (*hieracioides* Monn.), apargienähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Voralpen.

*Willemetia africana* Brong. v. *Hollia africana* Nachtrag.

**Willughbeia** Scop. (F. Willughby, alter englischer Naturforscher), V. I., Contortae Apocynae.

*edulis* Roxb., genießbare, f. w. Ostindien.

*zeylanica* Spgl. v. *Fagraea zeylanica*.

**Wintera aromatica** Murr. v. *Drimys Winteri*.

**Wistaria** Nutt. (Caspar Wistar, Professor in Pennsylvania), XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae. *chinensis* DC. (*sinensis* Ker, *Consequana* Loud.), chinesische, f. Sch. k. f. b. China.

*floribunda* DC., blüthenreiche, f. k. China.

*frutescens* DC. (*speciosa* Nutt.), strauchige, f. Sch. k. f. b. Carolina.

**Witheringia** L'Her. (D. Withering, englischer Botaniker), V. I. (IV. I.), Solanaceae.

*crassifolia* Dun., dickblättrige, f. k. Cap der gut. H. *montana* Dun., Berg-W., 4. t. k. Peru.

*phyllantha* Dun., blattblumige, ☉. m. f. Peru.

*pinnatifida* Dun., fiederspaltige, 4. t. k. Peru.

*purpurea* Lodd., purpurfarbige 4. Kn. k. t. Chili.

*solanacea* L'Her., nachtschattenähnliche, 4. f. w. Südamer.

*stramonifolia* Bonpl., stechapfelblättrige, f. f. w. t. Mexico.



**Witsenia** L. (Dr. Witsen, ein Holländer, Gönner der Botanik), III. I., Irideae.

*corymbosa* Sm., traubendoldige, f. t. k. Cap d. g. H.  
*maura* L., maurische, f. k. t. Cap der guten Hoffn.  
*partita* Ker (*Sophronia caespitosa* Schlecht.), getheilte,  
 f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

*ramosa* Vahl, ästige, f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

**Wollastonia** DC. (Wollaston, berühmter englischer Chemiker), XIX. II., Compositae Corymbiferae.

*biflora* DC., zweiblumige, ☉. w. m. f. Ostindien.

**Woodfordia** *floribunda* Salish. v. *Grislea tomentosa*.

**Woodsia** RB. (Joseph Woods, englischer Botaniker), XXIV. I., Pterioideae.

*hyperborea* RB., nördliche, 4. f. k. Mittel- und nord-europäische Alpen, Nordamerika.

*ilvensis* RB. (*vestita* Spgl., *rupicola* Hffg.), Felsen-W., 4. f. Europa, Nordamerika.

*Perriniana* Torrey, Perrin's, 4. f. k. Nordamerika.

*pubescens* Spgl. v. *Physomatium pubescens*.

**Woodwardia** Sm. (T. J. Woodward, englischer Botaniker), XXIV. I., Pterioideae.

*angustifolia* Sm. (*onocleoides* W., *floridana* Schk.), schmal-blättrige, 4. k. Nordamerika.

*radicans* Sw., wurzelnde, 4. k. Süd- und Westeuropa, Nepal, Canarische Inseln etc.

*virginica* Sw., virginische, 4. k. Virginien, Carolina.

*caudata* Cav. v. *Doodia caudata*.

**Wormia** Rotth. (Olaus Worm, dänischer Arzt und Naturforscher), XIII. v., Dilleniaceae.

*dentata* DC., gezahnte, f. w. Ceylon.

**Wrightia** RB. (D. W. Wright, schottischer Arzt), V. I., Contortae Apocynae.

*antidysenterica* RB., ruhrstillende, f. w. Ostindien.

*coccinea* Bot. mag., scharlachfarbige, f. f. w. Ostindien.

*pubescens* Lodd., weichhaarige, f. f. t. Neuholland.

*tinctoria* RB., färbende, f. w. Ostindien.

*zeylanica* RB., zeylonische, f. w. Zeylon.

*dubia* Spgl. v. *Cameraria dubia*.

**Wulfenia** Jacq. (F. X. v. Wulfen, Abt zu Klagenfurt in Kärnthen, ein ausgezeichnete Botaniker), II. I., Personatae Veroniceae.

*carinthiaca* Jacq., kärnthensche, 4. f. Kärnthen.

*Ageria* Sm. etc. v. *Paederota Ageria* etc.

**Wurmbea** Thbg. (F. van Wurmbe, Kaufmann in Batavia, der Thunberg unterstützte), VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

*campanulata* W., glockenblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

*longiflora* W., langblumige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

*pumila* W., kleine, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

*purpurea* Dryand., purpurfarbige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

**Wyllia** *australis* Hoffm., *radians* Hoffm. etc. v. *Scandix australis*, *falcata* etc.

**Xanthium** T., Spitzklette, XXI. v., Compositae-Ambrosiaceae.

*canadense* Mill. (*americanum* Walt.), canadische, ☉. f. Nordamerika.

*catharticum* H. B. K., purgirende, ☉. m. f. Quito, Chili.

*humile* N. E., niedrige, ☉. m. f. ? Südamerika.

**Xanthium**

- macrocarpum DC. (*echinatum* Murr., *italicum* Morett., *maculatum* Rafin., *brasilicum* Arrab.), großfrüchtige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nord- und Südamerika.  
 orientale L. fil. (*indicum* Roxb., *chinense* Mill.), morgenländische, ☉. f. Aegypten, Ostindien.  
 spinosum L., stachelige, ☉. f. Süd-, West- u. Osteuropa.  
 strumarium L. (*vulgare* Lam.), gemeine, ☉. f. Europa, Sibirien, Nordafrika.  
*fruticosum* L. v. *Franseria artemisioides*.

**Xanthochymus** Roxb., Farbenbaum, XVIII. II., Gut-tiferae.

- dulcis Roxb., süßler, ♀. w. Ostindien.  
 guineensis G. Don, guineischer, ♀. w. Guinea.  
 luteus Lodd., gelber, ♀. w. ? Ostindien.  
 macrophyllus Lodd., großblättriger, ♀. w. ? Ostindien.  
 ovalifolius Roxb., eiblättriger, ♀. w. Ostindien.  
 pictorius Roxb., Maler-G., ♀. w. Ostindien.  
 purpureus Lodd., purpurfarbiger, ♀. w. ? Ostindien.  
 tinctorius Roxb., ächter, ♀. w. Ostindien.

**Xanthorrhiza** L'Her., Gelbwurzel, V. VI., Ranunculaceae.  
*apiifolia* L'Her., sellerieblättrige, ♀. f. Virginien.**Xanthorrhoea** Sm.; Harzaffodile, VI. I., Coronariae Asphodeleae.

- australis RB., baumartige, ♀. t. Neuholland.  
 bracteata RB., deckblättrige, 4. t. k. Neuholland.  
 hastilis RB., spontonförmige, ♀. t. Neuholland.  
 media RB., mittlere, ♀. t. Neuholland.  
 minor RB., kleine, 4. t. k. Neuholland.  
 Pumilio RB. (*humilis* RB.), niedrige, 4. k. Neuholland.

**Xanthosia** Rudg., Gelbfilzdolde, V. II., Umbelliferae.  
*rotundifolia* DC., rundblättrige, ♀. t. k. Neuholland.**Xanthoxylon** Sm. (*Zanthoxylum* L.), Zahnwehholz, XXII. v. (V. III.), Tricoccae Xanthoxyleae.

- acuminatum Sw., zugespitztes, ♀. w. Jamaika.  
 argenteum Lodd., silberfarbiges, ♀. w. ?  
 armatum Roxb., bewaffnetes, ♀. w. Ostindien.  
 australe G. Don, neuholländisches, ♀. t. Neuholland.  
 Avicennae DC., Avicenna's, ♀. w. Ostafrika, China.  
 Budrunga DC., Budrunga-Z., ♀. w. Ostindien.  
 Clava Herculis L., Keulen-Z., ♀. w. Caribäen.  
 emarginatum Sw., ausgerandetes, ♀. w. Jamaika.  
 fraxineum W. (*ramiflorum* Mchx., *Clava Herculis* var. L., *americanum* Mill.), eschenblättriges, ♀. f. Nordam.

b) *virginicum* Lodd.

- mite W., unbewehrtes, ♀. f. Nordamerika.  
 nitidum DC., schimmerndes, ♀. w. China.  
 piperitum DC., pfefferiges, ♀. k. t. Japan.  
 Pterota H. B. K., flügelstieliges, ♀. w. Antillen.  
 sapindoides DC., seifenbaumähnliches, ♀. w. Jamaika.  
 tragodes DC., gliederstieliges, ♀. w. Hispaniola.  
 tricarpum Mchx., dreifrüchtiges, ♀. f. b. Carolina.

**Xenopoma** W., Theethymian, XIV. II., Labiatae.

- obovatum W. (*Thea imperialis* Hort., *Micromeria obovata* Benth., ? *Satureja incana* Spgl.), verkehrteiförmiger, ♀. k. ? China, Jamaika.

**Xeranthemum** L., Papierblume (Strohblume), XIX. II., Compositae Helichryseae.



**Xeranthemum**

*annuum* L. Jacq. (*radiatum* Lam.), jährige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

b) flore albo, c) flore pleno.

*cylindricum* Sibth. et Sm. (*inapertum* Auct.), cylinderförmige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

*erectum* Presl. (*incomptum* Cass.), aufrechte, ☉. f. Südeuropa.

*inapertum* W. (*annuum* β. L.), ungeöffnete, ☉. f. Südeur.

*longepapposum* Fisch. et Mey., langfederige, ☉. f. Persien.

*annuum* γ. L. (*orientale* W., *speciosum* L'Her.)

v. *Chardinia xeranthemoides*, *fasciculatum* Andr.

etc. v. *Helipterum fasciculatum*, *proliferum* L. v.

*Phoenocoma prolifera*, *vestitum* L. etc. v. *Helichrysum vestitum* etc.

**Xerophyllum** Mchx., Hartblatt, VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

*asphodeloides* Nutt. (*setifolium* Mchx.), affodilähnliches, 4. f. Nordamerika.

*gramineum* Nutt., grasblättriges, 4. f. Nordamerika.

*Sabadilla* D. Don, *Sabadilla-H.*, 4. w. Veracruz.

**Xerotes** RB., Hartzauke, XXIII. VI. (VI. I.), Samentaceae.

*arenaria* RB., Sand-H., 4. k. t. Neuholland.

*denticulata* RB., gezähnelte, 4. k. t. Neuholland.

*echinata* Mack. C., stachelige, 4. k. t. Neuholland.

*filiformis* RB., fadenförmige, 4. k. t. Neuholland.

*flexifolia* RB., gebogenblättrige, 4. k. t. Neuholland.

*gracilis* RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.

*Hystrix* RB., langdeckblättrige, 4. k. t. Neuholland.

*laxa* RB., lockere, 4. k. t. Neuholland.

*longifolia* RB., langblättrige, 4. k. t. Neuholl., Van-Diemensland.

*montana* RB., Berg-H., 4. k. t. Neuholland.

*mucronata* RB., stachelspitzige, 4. k. t. Neuholland.

*rigida* RB., starre, 4. k. t. Neuholland.

**Ximenesia** Cav. (Joseph Ximenes, ein spanischer Apotheker) XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*encelioides* Cav., geöhrt, ☉. f. Mexico.

*Cavanillesii* Spgl. v. *Echinacea heterophylla*, *cor-*

*data* H. B. K., *foetida* Spgl. et *heterophylla* H.

B. K. v. *Simsia cordata*, *ficifolia* et *heterophylla*

Nachtrag.

**Ximения** Plum. (F. Ximenes, ein spanischer Naturforscher, der über die Medicinalgewächse und Thiere Neuspaniens schrieb), VIII. I., Sapotaceae-Olacineae.

*americana* L. (*multiflora* Jacq.), amerikanische, 5. w. Westindien.

*inerinis* L. unbewehrte, 5. w. Westindien.

? *lanceolata* DC. v. *Cyminosma oblongifolia*.

**Xiphidium** Loeffl., Schwertelsimse, III. I., Commelinaceae.

*albidum* Lam. (*floribundum* Sw.), weifsliche, 4. w. Westindien.

*coeruleum* Aubl., blaue, 4. w. Südamerika.

**Xiphopteris** Kaulf., Schwertfarn, XXIV. I., Pteridoideae.

*heterophylla* Spgl., verschiedenblättriger, 4. w. Neuholl.

*serrulata* Kaulf., sägeblättriger, 4. w. Westind., Peru.



- Xylobium** Lindl., Holzorche, XX. 1., Orchideae.  
*longifolium* Lindl., langblättrige, 4. w. Neugranada.  
*squalens* Lindl., dunkelfarbige, 4. w. Brasilien.
- Xylomelum** Sm., Holzkapsel, IV. 1., Proteaceae.  
*pyriforme* Sm., birnförmige, 5. t. Neuholland.
- Xylophylla** *Arbuscula* W., *falcata* Ait. etc. v. *Phyllanthus*  
*speciosus*, *falcatus* etc., *ramiflora* Ait. v. *Geblera*  
*suffruticosa*.
- Xylopia** L., Bitterholz, XIII. VI., Anonaceae.  
*frutescens* Aubl., strauchiges, 5. w. Guiana, Brasilien.  
*glabra* L., kahles, 5. w. Jamaika.  
*muricata* L., weichstacheliges, 5. w. Jamaika.
- Xylosteum** T. v. *Lonicera*.
- Xyris** L., Schwertelgras, III. 1., Juncaceae Xyrideae.  
*altissima* Lodd., hohes, 4. t. k. Neuholland.  
*americana* Vahl., amerikanisches, 4. w. Guiana.  
*brevifolia* Mchx., kurzblättriges, 4. k. Carolina.  
*gracilis* RB., schlankes, 4. k. t. Neuholland, Van-  
 Diemensland.  
*junceae* RB., sinnsenförmiges, 4. k. t. Neuholland.  
*laevis* RB., glattes, 4. k. t. Neuholland.  
*operculata* La Bill., bedeckeltes, 4. k. t. Neuholland,  
 Van-Diemensland.
- Xysmalobium** RB., Glockenkrönchen, V. II., Ascle-  
 piadeae.  
*undulatum* RB., wellenblättriges, 5. t. k. Cap d. g. H.
- Youngia** Cass., Youngie, XIX. 1., Compositae - Ci-  
 choriaceae.  
*japonica* Cass., japanische, ? ①. f. Japan.  
*mauritanica* DC. (*Prenanthes japonica* Hort.), mascare-  
 nische, ①. m. f. Mascarenas.
- Yucca** L., Palmenlilie, VI. 1., Coronariae.  
*acuminata* Swt., zugespitztblättrige, 5. k. ?  
*aloifolia* L., aloebblätterige, 5. t. Neuspanien.  
 b) *variegata*, c) *pendula* H. Par.  
*aletriformis* Haw., aletrisähnliche, 4. t. Cap der g. H.  
*angustifolia* Nutt., schmalblättrige, 4. k. f. b. Nordamer.  
*arcuata* Haw., bogenblättrige, 5. k. t. ?  
*concava* Haw., concave, 4. k. f. b. ?  
*conspicua* Haw. Salisb., ansehnliche, 5. t. ?  
*crenulata* Haw., gekerbte, 5. k. ?  
*Draconis* L., drachenbaumähnliche, 5. k. Carolina.  
 b) *foliis variegatis*, c) *fol. tricoloribus*.  
*filamentosa* L., fadige, 4. k. f. b. Virginien.  
 b) *variegata*.  
*flaccida* Haw., schlaffe, 4. k. f. b. ?  
*glauca* Nois., blaugrüne, 5. k. Carolina.  
*glaucescens* Haw., grünbläuliche, 5. k. ?  
*gloriosa* L., stolze, 5. k. f. b. Carolina.  
 b) *fol. variegatis*.  
*gracilis* Lk., schlänke, 4. w. t. Mexico.  
*obliqua* Haw., schieflättrige, 5. 4. k. f. b. ?  
 b) *major*.  
*puberula* Haw., feinhaarige, 4. k. ?  
*recurva* Salisb., zurückgekrümmte, 5. k. f. b. Georgia.  
*rufocincta* Haw., röthlichrandige, 4. k. f. b. ?  
*serrulata* Haw., feingesägte, 5. k. Carolina.  
*stricta* Ker., steife, 4. 5. k. f. b. Carolina.

**Yucca**

*superba* Haw. (*gloriosa* Andr.), prächtige, f. k. ?

*tenuifolia* Haw., dünnblättrige, f. k. Malta.

*Boschii* Dsf. v. *Agave geminiflora*.

**Zacyntha** T., Warzensalat, XIX. 1., Compositae Cichoriaceae.

*verrucosa* G., zweizinkiger, ☉. f. Italien, Griechenl., Taurien.

**Zahlbruckneria** Rchb. (Zahlbruckner, österreichischer Botaniker), X. 11., Saxifrageae.

*paradoxa* Rchb., wunderbare, 4. f. Kärnthen, Steyermark.

**Zaluziania** P. (Zaluziansky v. Zaluzian, alter böhmischer Botaniker), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

*trilobata* P., dreilappige, 4. k. Mexico.

**Zamia** L., Keulpalme, XXII. 11., Cycadeae.

I. *Arthrozamia* Rchb. (*Encephalartus* Lehm.)

*Altensteinii* Lehm., Altenstein's, f. w. Südafrika.

*caffra* Thbg., caffer'sche, f. w. Südafrika.

β) *Cycadis* L. fil.

*cycadifolia* Jacq. (*villosa* G.), cycasblättrige, f. w. Südafrika.

*elongata* Miquel, verlängerte, f. w. Südafrika.

*Friderici* Guilhelmi Lehm., Friedrich Wilhelm's, f. w. Südafrika.

*horrida* Jacq., stachelige, f. w. Südafrika.

*lanuginosa* Jacq., wollige, f. w. Südafrika.

*latifolia* Lodd., breitblättrige, f. w. ?

*Lehmanniana* Eckl. et Zeyh., Lehmann's, f. w. Südafrika.

*longifolia* Jacq., langblättrige, f. w. Südafrika.

*prunifera* Lodd., pflaumentragende, f. w. ?

*repanda* Lodd., ausgeschweifte, f. w. ?

*pungens* Ait., stechende, f. w. Südafrika.

*spinulosa* Lehm. (? *spinosa* Lodd.), feinstachelige, f. w. Südafrika.

*spiralis* Salisb., spiralförmige, f. w. Neusüdwallis.

*tridentata* W., dreizählige, f. w. Südafrika.

II. *Genuina*.

*angustifolia* Jacq., schmalblättrige, f. w. Bahamische Inseln.

*debilis* Ait., schwache, f. w. Westindien.

*furfuracea* Ait., kleiige, f. w. Westindien.

*integrifolia* Ait., ganzblättrige, f. w. Hispaniola, Florida.

*media* Jacq., mittlere, f. w. Westindien.

*pumila* L., kleine, f. w. Bahamische Inseln.

*pygmaea* Sims., zwergige, f. w. Westindien.

*tenuis* W., dünne, f. w. Bahamische Inseln.

**Zannichellia** L. (G. J. Zannichelli, Apotheker zu Venedig, und dessen Sohn G. G. Zanichelli, beide Botaniker), XXI. 1., Alismaceae-Potomaphileae.

*palustris* L., Sumpf-Z., 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

α) *major* Bönningh., β) *repens* Bönningh.

*pedunculata* Rchb. (*maritima* Nolte), stielfrüchtige, 4. Wa. f. Europa.

β) *gibberosa* Rchb.

*polycarpa* Nolte, vielfrüchtige, 4. Wa. f. Norddeutschl.

**Zanthoxylum** L. v. *Xanthoxylum*.

*Zantedeschia aethiopica* Spgl. v. *Richardia aethiopica*.



- Zappania** Scop. Juss. (P. A. Zappa, italienischer Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.  
*nodiflora* Lam., knotenblumige, 4. k. Nordamerika, Ost- und Westindien, Chili, Neuholland etc.  
 b) *rosea* D. Don.  
*repens* Bertol., kriechende, 4. Wa. f. Italien.  
*stoechadifolia* Juss. P., stoechasblättrige, 5. w. Ostind.
- Zea** L., Mais, XXI. III. (III. I.), Gramineae.  
*Curagua* L. Mol., kleiner, 6. f. Chili.  
*Mays* L., gemeiner (türkischer Weizen), 6. f. Amerika.  
 b) *altissima*.
- Zenobia** D. Don, Zenobie, X. I., Ericaceae.  
*floribunda* DC., blüthenreiche, 5. k. f. b. Nordamerika.  
*racemosa* DC., traubige, 5. f. b. Nordamerika.  
 ? *spicata* (Wats.)  
*speciosa* D. Don, prächtige, 5. f. b. Nordamerika.  
 β) *nitida* (Pursh.), γ) *pulverulenta* (Bartr.).
- Zephyranthes** Herb., Zephyrblume, VI. I., Narcissee-Amaryllideae.  
*Atamasco* Herb., Atamaso-Z., 4. Zw. k. Carolina, Virgin.  
*candida* Ker, reinweißse, 4. Zw. k. Peru.  
*chloroleuca* Herb., grünlichweißse, 4. Zw. k. ?  
*grandiflora* Lindl., großblumige, 4. Zw. k. Mexico.  
*mesochloa* Herb., bonarische, 4. Zw. k. Buenos Ayres.  
*rosea* Lindl., rosafarbige, 4. Zw. t. w. Cuba.  
*Spofforthiana* Herb., Spofforth's, 4. Zw. k. t. Hybride.  
*striata* Herb., gestreifte, 4. Zw. k. Mexico.  
*tubispatha* Herb., röhrenscheidige, 4. Zw. w. Südamerika.  
*verecunda* Herb., schamhafte, 4. Zw. k. Mexico.  
*Drummondii* D. Don v. *Sceptranthes Drummondii*.
- Zerumbet speciosum** Jacq. Wendl. v. *Alpinia nutans*.
- Zexmenia** Lallav. (Anagramm von Ximenesia), XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.  
*monocephala* (DC.), einköpfige, 5. t. w. ? Caribäen.  
*tagetiflora* D. Don, tagetesblumige, 4. k. Mexico.
- Zichya** Hügel, vid. Kennedy.
- Zieria** Sm. (John Zier, englischer Botaniker), IV. I., Tricoccae-Rutaceae.  
*hirsuta* DC., rauhaarige, 5. k. t. Neuholland.  
*laevigata* Sm., glatte, 5. k. t. Neuholland.  
*lanceolata* RB. (*Smithii* Andr.), lanzettliche, 5. k. t. Neuh.  
*macrophylla* Bonpl., großblättrige, 5. k. t. Neuholland.  
*microphylla* Bonpl., kleinblättrige, 5. k. t. Neuholland.  
*obcordata* Cunn., verkehrtherzblättrige, 5. k. k. Neuh.  
*octandra* Swt., achtmännige, 5. k. t. Neuholland.  
*pilosa* Rudg., haarige, 5. k. t. Neuholland.  
*revoluta* Cunn., zurückgerollte, 5. k. t. Neuholland.
- Zietenia** Gled. (v. Zieten, berühmter preuß. General, dessen Garten Gleditsch vorstand), XIV. I., Labiatae.  
*orientalis* Gled., morgenländische, 4. f. b. k. Grusien.
- Zigadenus** Mchx., Jochblümchen, VI. III., Coronariae-Colchicaceae.  
*bracteatus* Swt., deckblättriges, 4. f. Nordamerika.  
*elegans* Pursh. (*glauca* Nutt.), zierliches, 4. f. Nordamer.  
*glaberrimus* Mchx., kahles, 4. f. b. Carolina.
- Zilla** Forsk. (ägyptischer Name), XV. I., Cruciferae.  
*myagroides* Forsk., dotterkrautähnliche, 5. 5. Aegypten.  
 b) *macrocarpa*.
- Zingiber** G., Ingwer, I. I., Scitamineae-Amomeae.  
*capitatum* Roxb., kopfförmiger, 4. w. Ostindien.



**Zingiber**

**Cassumunar** Roxb. (*Cliffordiae* Andr.), Cassumunar-I., 4. w. Ostindien.

*chrysanthum* Rosc., goldblumiger, 4. w. Nepal.

*elatum* Roxb., hoher, 4. w. Bengalen.

*ligulatum* Roxb., bandförmiger, 4. w. Ostindien.

*Mioga* Rosc., Mioga, 4. w. Südjapan.

*officinale* Rosc., officineller, 4. w. Ostindien.

*panduratum* Roxb., geigenförmiger, 4. w. Pegu.

*purpureum* Rosc., purpurfarbiger, 4. w. Ostindien.

*roseum* Rosc., rosafarbiger, 4. w. Coromandel.

*rubens* Roxb., röthlicher, 4. w. Ostindien.

*squarrosus* Roxb., sparriger, 4. w. Pegu.

Zerumbet Rosc., dichtblättriger, 4. w. Ostindien.

**Zinnia** L. (J. G. Zinn, Professor der Medicin zu Göttingen), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*angustifolia* H. B. K., schmalblättrige, ©. m. f. Mexico.

*discolor* H. Hal., verschiedenfarbige, ©. m. f. ?Hybride.

*elegans* Jacq. (*violacea* Cav.), zierliche, ©. m. f. Mexico.

a) *violacea*, b) *alba*, c) *purpurascens*, d) *coccinea*, e) *miniata*, f) *lutescens*, g) *striata* etc.  
β) *squarrosa* DC.

*hybrida* Sims. (*grandiflora* Hort.), Bastard-Z., ©. m. f. Südamerika.

*multiflora* L., vielblumige, ©. m. f. Mexico, Louisiana, Brasil.

b) *flava* H. B. K.

*pauciflora* L. (*lutea* G.), wenigblumige, ©. m. f. Peru.

*tenuiflora* Jacq. (*revoluta* Cav.), dünnblumige, ©. m. f. Mexico.

*verticillata* Andr., wirtelblättrige, ©. m. f. Mexico.

b) *flava*.

**Zizania** L., Wasserreis, XXI. VI. (VI. II.), Gramineae.

*aquatica* L. (*miliacca* Mchx.), fennichähnlicher, ©. Wa. w. Südcarolina, Jamaika.

*aquatica* Lamb. (*palustris* L. *clavulosa* Mchx. et *fluitans* Mchx. v. *Hydropyrum esculentum* et *fluitans*).

**Zizia** Koch (D. Ziz, deutscher Botaniker), V. II., Umbelliferae.

*aurea* K., goldfarbige, 4. f. Nordamerika.

**Ziziphora** L., Zizikraut, II. I., Labiatae.

*acynoides* W., acynusähnliches, ©. f. Sibirien.

*capitata* L., kopfförmiges, ©. f. Taurien, Cypern.

*clinopodioides* Lam. (*acynoides* L., *serpyllacea* Ait.), wirbelborstenähnliches, ©. f. Armenien, Sibirien.

*dasyantha* MB. (*Puschkini* Ait.), wollblumiges, 4. f. b. k. Caucasus.

*hispanica* L. (*spicata* Cav.), spanisches, ©. f. Spanien.

*media* Lk., mittleres, 4. f. b. k. ?Caucasus.

*serpyllacea* MB., quendelähnliches, 4. f. b. k. Iberien, Caucasus.

*taurica* MB., taurisches, ©. f. Taurien.

*tenuior* L., dünneres, ©. f. Syrien.

*Mariana* R. et S., vid. *Cunila Mariana*.

**Zizyphus** T., Judendorn, V. I., Rhamneae.

*albens* Roxb., weißfrüchtiger, f. k. t. China.

*Caracutta* Hamilt., Caracutta-J., f. w. Ostindien.

*chinensis* Lam., chinesischer, f. k. China.

*flexuosa* Wall., gebogener, f. f. b. k. Nepal.

*iguanea*, westindischer, f. w. Antillen.

*incurva* Roxb., einwärtsgekrümmter, f. w. Ostindien.

**Zizyphus**

Jujuba Lam., Jujuben-I.,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

Lotus Lam., genießbarer,  $\frac{1}{2}$  k. Nord- u. Mittelfrika, Südeuropa.

mauritiana Lam., mascarenischer,  $\frac{1}{2}$  w. Mascarenas.

melastomoides Cunn., schwarzschlundähnlicher,  $\frac{1}{2}$  k. t. Neuholland.

mucronata W. (*bubalina* Lichtstn.), stachelspitziger,  $\frac{1}{2}$  k.

Cap der guten Hoffnung.

Napeca Lam., Napeca-I.,  $\frac{1}{2}$  w. Ceylon, Molukken.

nitida Roxb., glänzender,  $\frac{1}{2}$  k. China.

Oenoplia Mill., Oenoplia-I.,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

rotundifolia Lam., rundblättriger,  $\frac{1}{2}$  w. Ceylon.

sororia R. et S. (*trinervis* Roth.), verschwisterter,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.

Spina Christi Lam., Christkronen-I.,  $\frac{1}{2}$  k. Aegypt., Paläst.  $\beta$ ) *inermis* DC.

vulgaris Lam., gemeiner,  $\frac{1}{2}$  k. f. b. Südeuropa, Nordafrika, Syrien.

*myrtoides* Orteg., vid. *Condalia microphylla*, *volubilis* W., vid. *Berchemia volubilis*.

**Zoegea** L. (J. Zoega, welcher Island in botanischer Hinsicht bereis'te), XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

Leptaura L. (*aleppica* Jacq.), gelbblumige,  $\odot$  m. f. Syrien.

**Zornia** J. F. Gmel. (J. Zorn, Apotheker u. Botaniker zu Kempten in Schwaben), XVII. IV. (VI.), (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angustifolia Sm. (*diphylla* P.), schmalblättrige,  $\odot$  w. m. Ostindien.

capensis P., capische,  $\odot$  4. k. Cap der gut. Hoffn.

ceylanica P., ceylonische,  $\odot$  w. m. Ceylon.

dictyocarpa DC., netzfrüchtige,  $\odot$  m. f. Neuholland.

glochidiata Rchb., widerhakige,  $\odot$  w. m., Guiana.

reticulata Sm. (*diphylla ciliata* P.), netzförmige,  $\odot$  w. m. f. Westindien.

tetraphylla Mchx., vierblättrige, 4. k. t. Südcarolina, Jamaika.

*elegans* P. etc. vid. *Dicerma elegans* etc.

**Zosimia** Hoffm. (A. N. et Z. Zosima, Herausgeber griechischer Classiker), V. II., Umbelliferae.

absinthifolia Hoffm. (*orientalis* MB.), wermuthblättrige,  $\sigma$ . 4. f. Iberien, Caucasus.

**Zostera** L., Seegras, I. II., Alismaceae - Potamo-  
phileae.

marina L., gemeines, 4. Wa. f. Europa.

nana Roth. (*Noltei* Hornem., *uninervis* Rchb.), kleines, 4. Wa. f. Nordeuropa.

**Zuccagnia viridis** Thbg., vid. *Uropetalum viride* etc.

**Zwingera amara** W., vid. *Simaba guianensis* etc.

**Zygoglossum umbellatum** Reinw., v. *Cirrhopetalum Thouarsii*.

**Zygopetalum** Hook., Jochstendel, XX. I., Orchideae.

cochleare Lindl., löffelförmiger, 4. w. Trinidad.

crinitum Lindl., mähniger, 4. w. Brasilien.

intermedium Hook., mittlerer, 4. w. Südamerika.

Mackai Hook, Mackay's, 4. w. Brasilien.

maxillare Paxt., kerfenähnlicher, 4. w. Südamerika.

Murrayanum Gard., Murray's, 4. w. Brasilien.

rostratum Hook., schnabelförmiger, 4. w. Demerara.

stenochilum Lodd., schmallippiger, 4. w. Brasilien.

**Zygophyllum** L., Doppelblatt, X. I., Zygophylleae.

**Zygophyllum**

**album** L. (*proliferum* Forsk.), weißes, 5. k. Nordafrika, canarische Inseln.

**atriplicoides** Fisch. et Mey., meldenähnliches, 5. k. Armen.

**coccineum** L., scharlachfarbiges, 5. k. Nordafrika.

**cordifolium** L. suppl., herzblättriges, 5. k. Cap d. g. H.

**foetidum** Wendl., stinkendes, 5. k. Cap d. gut. Hoffn.

b) insuave Bot. mag.

**maculatum** Ait., geflecktes, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

**microphyllum** Thbg. (*capense* Lam.), kleinblättriges, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

**Morgsana** L., kurzgestieltes, 5. k. Cap d. gut. Hoffn.

**prostratum** Thbg., gestrecktes, 4. 5. k. Cap d. gut. H.

**sessilifolium** L., stiellosblättriges, 5. k. Cap d. g. H.

**simplex** L. (*portulacoides* Forsk.), einfaches, 4. 5. w. Aegypten, Arabien.

**spinosum** L., dorniges, 5. k. Cap der guten Hoffn.

**Zygophyllum arboreum** Jacq., vid. *Guajacum arboreum*.

**Fabago** L. vid. *Fabago major*, *fruticulosum* DC., vid. *Roeperia ?aurantiaca*.



## N a c h t r a g.

---

**Acacia.** *alata* RB., geflügelte. Westl. Neuholl. — *adstringens* Ait., knappe. Neusüdwall. — *balsamea* Rchb., balsamische. Neuholl. — *brevipes* Cunn., kurzstielige, Neusüdwall. — *cultrata* Ait., messerblättrige. Neuholl. — *capensis* Burch., capische. C. d. g. H. — *Cunninghami* Ait., Cunningham's. Neuholl. — *decipiens*  $\beta$ . *praemorsa* Grah., abgeissene Neuholl. — *delibrata* Ait., ermessene. Neuholl. — *dependens* Ait., herabhängende. Neuholl. — *Dolabella* Rchb., hobelblättrige. Neuholl. — *holosericea* G. Don, Ait. (? *leucophylla* Swt.), sammetartige. Neuholl. — *humifusa* Ait., niedergestreckte. Neuholl. — *intermedia* Cunn., mittlere. Neuholl. — *Lawsonii* Ait., Lawson's. Neuholl. — *leptocarpa* Ait., schlankschotige. Neuholl. — *ligulata* Ait., bandförmige. Neusüdwall. — *neurocarpa* Ait., nervenhülsige. Neuholl. — *persoonioides* Ait., persoonienähnliche. Neuholl. — *plumosa* Lowe, federige, Sch. k. Madeira. — *prensans* Lowe, entferntstachelige, Sch. k. Madeira. — *sericata* Ait., seidenhaarige. Neuholl. — *Simsii* Ait., Sims's. Neuholl. — *stenophylla* Ait., schmale. Neuholl. — *tristis* Grah., dunkelgrüne. Neuholl. — *umbellata* Ait., doldige. Neuholl. — *viminalis* Ait., gertenartige. Neuholl. — *vomeriformis* Ait., pflugschaarförmige. Neuholl. Sämmtlich  $\frac{5}{4}$ .  $\frac{5}{4}$ . t.

*virgata* Lodd. = *verniciflua* Cunn.

**Acaena** *Berteriana* Bernh. (*argentea* Berter., *pinnatifida* Hort., *trifida* Steud.), Bertero's, 4. t. k. Chili.

*splendens* Hook. Arn., schimmernde, 4. k. t. Chili.

**Acanthophippium** Lindl., Stachelorche, XX. 1., Orchideae.

*bicolor* Lindl., zweifarbige, 4. w. Ceylon.

*striatum* Lindl., gestreifte, 4. w. Nepal.

*syhetense* Lindl., sylhetische, 4. w. Sylhet.

**Acanthophyllum** C. A. Mey., Stachelnelke, X. III., Caryophyllaceae - Sileneae.

*mucronatum* C. A. Mey., weichspitzige, 4.  $\frac{5}{4}$ . f. b. k. Caucas.

*spinosum* C. A. Mey. (*Dianthus spinosus* Dsf. p. 260).

*versicolor* Fisch. et Mey., buntfarbige, 4.  $\frac{5}{4}$ . k. Persien.

*verticillatum* C. A. Mey. (*Arenaria verticillata* W. p. 76).

**Acer** *barbatum* Mchx. (*carolinum* Bolt., *trilobatum* Hort.), *dasycarpum* Ehrh. (*eriocarpum* Mchx., *tomentosum* H. Par., *glaucum* Marsh., *virginianum* Duh.), *montanum* Ait. (*parviflorum* Ehrh., *pensylvanicum* du Roi), *rubrum* L.  $\gamma$ . *intermedium* Loud.

*hyrcanum* Fisch et Mey., hyrcanischer,  $\frac{5}{4}$ . f. Caucasus.

*Negundo* L. v. *Negundo fraxinifolium*.

**Achyrachaena** Schauer, Spreukern, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

*mollis* Schauer, weicher,  $\odot$ . f. Californien.

**Achyranthes** *uncinulata* Schrad. (*Paronychia capensis* Eckl.), kurzhakige, 4.  $\frac{5}{4}$ . k. Cap der guten Hoffn.

- Aconitum chinense* Sieboldt (*Sieboldti* Hort.) p. 14.  
*Acropera* Lindl., Spitzstendel, XX. 1., Orchideae.  
*Loddigesii* Lindl. (*Maxillaria galeata* Lodd. p. 500),  
 Loddiges's, 4. w. Mexico.  
*Acrophyllum venosum* Benth. v. *Weinmannia venosa*.  
*Actinospora* Turcz. Strahlenkraut XIII. 1., Ranunculaceae.  
*dahurica* Turcz. (*Actaea pterosperma* Turcz.), dahurisches, 4. f. Dahurien.  
*Adenandra uniflora* W. (*Eriostemon capense* P., *Diosma uniflora* Schrad. et Wendl.), einblumiges, 5. t. C. d. g. H.  
*Adenocarpus* DC., Leguminosae-Papilionaceae, p. 18.  
*cebennensis* DC., Cevennen-D., 5. k. Südfrankreich.  
*Adenotrichia senecioides* Fisch. et Mey. (*Senecio sinuatilobus* DC.), kreuzkrautähnliches, ♂. 4. f. k. Chili.  
*Adiantum aethiopicum* L., äthiopisches, 4. w. Cap der guten Hoffnung, Acunna.  
*Moritzianum* Loud., Moritz's, 4. t. w. ? Südamerika.  
*obliquum* W., schiefes, 4. w. Westindien.  
*Aegochloa* Benth., Stinkpolemonie, V. 1., Polemoniaceae.  
*atractyloides* Benth., atractylisähnliche, ☉. f. Californien.  
*cotulaefolia* Benth., cotulablätterige, ☉. f. Californien.  
*eryngioides* Benth. (*Gilia mucronata* Lehm.), mannstreu-ähnliche, ☉. f. Chili.  
*intertexta* Benth., verwebte, ☉. f. Californien.  
*pubescens* Benth., feinhaarige, ☉. f. Californien.  
*pungens* Benth. (Dougl.), stechende, ☉. f. Californien.  
*Aerides affine* Wall., ähnlicher, 4. w. Ostindien.  
*multiflorum* Roxb., vielblumiger, 4. w. Sylhet.  
 (Soll mit Vorigem = sein.)  
*Aeschynanthus* Jack. (*Aescynanthus* Wall.), Schammaske XIX. 11., Personatae-Bignoniaceae-Cyrtandreae.  
*grandiflorus* Spgl. G. Don, großblumige, 5. w. Bengalen.  
*Aetheria* Blum., Lufttorche, XX. 1., Orchideae.  
*occulta* Lindl. (*Goodyera occulta* A. P. Th., *Platylepis goodyeroides* Rich.), verborgene, 4. w. Mascarenas.  
*Agasyllis* Spgl., Kappendolde, V. 11., Umbelliferae.  
*caucasica* Spgl. (*Cachrys latifolia* MB.), caucas., ♂. f. Caucas.  
*Agathaea amelloides* DC. = *A. coelestis*.  
*Agrostemma Bungeana* D. Don, *pyrenaica* G. Don, *suecica* Maund v. *Lychnis Bungeana* etc.  
*Agrostis capensis* Lam., capisches, 4. k. C. d. g. H.  
*dulcis* Sibth. (*Sibthorpii* Hort.), süßes, ☉. f. Mexico.  
*Juressi* Lk., Juress's, 4. f. Spanien, Portugal.  
*debilis* Poir. (*retrofracta* W.), *Forsteri* Rich., *plebeja* RB. etc. v. *Lachnagrostis retrofracta* etc.,  
*laxiflora* Richards. = *A. laxa* p. 25.  
*Aiopsis agrostidea* DC. = *Aiopsis Candollei*.  
*Alfredia cernua* Cass. v. *Silybum cernuum*.  
*Amblirion album* Swt. etc. v. *Fritillaria alba* etc.  
*Amblyocarpum* Fisch. et Mey., Mückenkraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.  
*inuloides* Fisch. et Mey., alantähnliches, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.  
*Ameletia indica* DC. v. *Ammannia peploides* p. 47.  
*Ammodendron* Fisch., Sandstrauch, X. 1. (XVII. 1v.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*Sieversii* Fisch. DC. (*Podaliria argentea* W., *Hallia argentea* Spgl., *Rolinia argentea* Sievers, *Sophora argentea* et *bifolia* Pall.), Sievers's, 5. f. b. k. Songarei.



- Ammogeton* Schrad., Sandlattich, XIX. I., Compositae Cichoriaceae.  
*scorzoneraefolius* Schrad., haferwurzblättriger, 4. f. Nördliches Amerika.
- Ammysine buxifolia* Pursh. v. *Leiophyllum thymifol.* Pursh.
- Anagallis indica* Wight (*arvensis* Wall., *latifolia* Hamilt.), indischer, ①. f. Ostindien.
- Anchusa tenella* Hornem. = *Bothriospermum tenellum* p. 129.
- Anda* Pis. Mart., Andenwolfsmilch, XXI. VI. (XVI. v.), Tricoccae - Euphorbiaceae.
- Gomesii* Juss., Gomes's, 5. w. Brasilien.
- Anemiopsis* Hook., Aronvegerich, ? VII. III., ? Aroidae Saurureae.  
*californica* Hook., californischer, 4. f. k. Californien.
- Angelica Archangelica* etc. v. *Archangelica officinalis* etc., *Carvifolia* Spgl. v. *Selinum Carvifolia*, *Fischeri* R. et S. v. *Cnidium Fischeri*, *chaerophyllea* Lotterm. v. *Conioselinum* Gmelini, *pratensis* MB. v. *Ostericum palustre*, *verticillaris* L. v. *Peucedanum verticillare*.
- Angelonia* H. B. K. (westindischer Name), XIV. II., Personatae Antirrhineae.  
*minor* Fisch. et May., kleine, 4. 5. w. Brasilien.  
*salicariaefolia* H. B. K., weiderichblättrige, 5. w. Caracas, Hispaniola.
- Angianthus* Wendl., Gefäßblümchen, XIX. v., Compositae Eupatorineae.  
*tomentosus* Wendl., filziges, ①. f. m. Neuholland.
- Angophora* Cav., Gefäßmyrte(träger), XII. I., Myrtaceae.  
*cordifolia* Cav., herzblättrige, 5. 5. t. k. Neuholland.  
*intermedia* DC., mittlere, 5. 5. t. k. Neuholland.  
*lanceolata* Cav., lanzettblättrige, 5. 5. t. k. Neuholl.
- Angraecum* A. P. Thou. (malayischer Name), XX. I., Orchideae.  
*caudatum* Lindl., geschweiftes, 4. w. Sierra Leone.  
*distichum* Lindl., zweizeiliges, 4. w. Sierra Leone.  
*eburneum* A. P. Thou. (*Limodorum eburn.*), elfenbeinweißes, 4. w. Madagascar.  
*falcatum* Lindl., sichelförmiges, 4. w. China.  
*luridum* Lindl., schmuzigbraunes, 4. w. Sierra Leone.  
*maculatum* Lindl., geflecktes, 4. w. Brasilien.  
*micranthum* Lindl., kleinblumiges, 4. w. Sierra Leone.
- Anguillaria* RB., Aalgermer, VI. III., Colchicaceae.  
*biglandulosa* RB., zweidrüsiger, 4. k. Neuholland.  
*dioica* RB., zweihäusiger, 4. k. Neusüdwallis.  
*indica* RB., indischer, 4. w. t. Neuholland, Malabar.
- Anguloa lurida* Lk. = *Catasetum luridum*.
- Anisochilus glaber* Schrad., kahler, 4. 5. w. Ostindien.
- Anisolotus* Bernh., Hornklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.  
*anthylloides* Bernh. (*Anthyllis chilensis* DC., *Hosackia subpinnata* G. Don, *Lotus subpinnatus* Lag.), wollblumenähnlicher, ①. f. Chili.
- Wrangeliana* Bernh. (*Lotus Wrang.* Fisch. et Mey. p. 478).
- Anoda brachyantha* Rehb. = *A. triangularis* (non incarnata) p. 61.
- Anthemis chrysoleuca* Gay., weißgelbe, ①. f. ? Nordafrika.
- Anthriscus Cicutaria* Duby., schierlingblättriger, 4. f. Frankreich.
- Antirrhinum rytidospermum* Fisch. et Mey., grubig-samiges, ①. f. Caucasus.



- Anychia capillacea* DC., haarförmige, ☉. f. Nordamer.  
*Apalochlamys* DC., Zartdosten, XIX. v., Compositae  
 Eupatorineae.  
*Billardieri* DC., Billardiere's, 4. §. t. k. Van-Diemensl.  
*Kerii* DC., Ker's, 4. §. t. k. Neuholland.  
*Aplotaxis Frolovii* DC. v. *Frolovia lyrata*.  
*Aponogeton junceus* Lehm., simsenförmiges, 4. Wa.  
 w. Cap der guten Hoffnung.  
*Aposeris* Neck v. *Lapsana*.  
*Apuleja* G., *Apuleja*, XIX. i., Compositae Cynarocephalae.  
*fruticosa* Bartl., strauchige, §. k. Cap der guten Hffg.  
*Aquilegia juncunda*, Fisch. et Lall., liebliche 4. f. Sibir.  
*atropurpurea* β. *dahurica* Fisch. = *atropurpurea*  
 β. *Fischeriana* p. 69.  
*Arabis borealis* Andrzy., nördliches, ♂. 4. f. Kamtschatka.  
*stenopetala* W. p. 71 = *sagittata* a. *Gerardiana* DC.,  
*longisiliqua* Wallr., *Gerardi* K. (Bess.), *nemorensis*  
 Rchb., *glastifolia* Rchb.  
*lilacina* Schrad. p. 70 nördliches Amerika.  
*Hollboelliana* H. Hafn. = *Turritis* Grahmi.  
*Arachnospermum heterospermum* Berg. = *Hypochaeris* Salz-  
 manniana.  
*Aracium paludosum* Monni. v. *Crepis paludosa*.  
*Aspidium elongatum* Sw., verlängerter, 4. t. Canar. Ins.  
*obscurum* Fisch. et Mey., dunkler, 4. w. Rio Janeiro.  
 S. 100 Zeile 9 v. u. muß es heißen: Astilbe st. Astible.  
*Attalea hispida* Hffg., steifhaarige, §. w. Surinam.  
*Avena* Sect. IV. *longifolia* N. E., langblättriger, 4. k.  
 Cap der guten Hoffnung.  
*Avena bipartita* Lk. v. *Danthonia Linkii*.  
 S. 108 Zeile 3 v. u. lies: *Osmothamnus* statt *Osmanthus*.  
*Baccharis alata* Hort. = *sagittalis* DC. (*genistelloides* Poepp.  
*Pluchea sagittalis* Less.).  
*Bahia lanata* DC. etc. v. *Eriophyllum caespitosum*.  
*Baldingera colorata* Flor. Wett. v. *Phalaris arundinacea*.  
 S. 112 *Barbarea arcuata* Rchb. statt RB.  
*Barkhausia albida* Cass., weifslische, 4. f. b. k. Pie-  
 mont, Dauphiné.  
*alpina* ist ☉., nicht 4.  
*glandulosa* Presl. (Guss.), drüsige, ☉. f. Sicilien.  
*Marschallii* C. A. Mey. (*Crepis biennis* et *taurinensis*  
 MB.), *Marschall's*, ☉. f. Taurien, Iberien.  
*rubra* Mch. p. 113 ☉., nicht 4.  
*scariosa* Rchb., trockenhäutige, ☉. f. Italien.  
*taraxacoides* DC., löwenzahnähnliche, ♂. f. Ital., Nordafr.  
*Boursea nervosa* Hffmsg. v. *Philodendron crassinervium*,  
*ventricosum* Hffmsg. v. *Arum ventricosum*.  
*Begonia brasiliana* Schrk. DC., brasilianische, §. w. Bras.  
*Belemcanda punctata* Mch. = *Pardanthus chinensis*.  
*Bellardia Trixago* All. v. *Trixago rhinanthina*.  
*Betula oycoviensis* Bess. (*Soccolovii* Jacq. fil.), galizische,  
 §. f. Galizien.  
*Biasoletia* K. (*Biasoletto*, Apotheker und Botaniker  
 zu Triest), V. II., Umbelliferae.  
*tuberosa* K., knollige, 4. Kn. f. Istrien.  
*Biotia* DC. v. *Aster*.  
*Bletia Woodfordii* Hook. — *Phajus maculatus*.  
*Blumea amplexans* DC., umfassende, ☉. f. m. Ostindien.  
*aurita* DC., geöhrt, ☉. f. m. Ostindien.

**Bonjeania** Rchb. (Bonjean, Botaniker zu Chambéry), XVII. IV. (VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

*hirsuta* Rchb. rauhhaarige, ♀. f. Süd- und Westeuropa.

*microphylla* Rchb. v. *Lotus microphyllus* Hook. p. 478.

*recta* Rchb. v. *Dorycnium rectum* Sering. p. 272.

**Botrophis actaeoides** Rafin. = *Cimicifuga Serpentaria*.

**Brachyramphus intybaceus** DC. = *Lactuca intybacea*.

**Brachyrhynchus** Less., Kurzschnäbler, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

*albicaulis* DC., weisstengeliger, 4. k. Cap der g. H.

*cymbalarifolius* DC., cymbelblättriger, 4. k. C. d. g. H.

*elongatus* Less., verlängerter, 4. k. Cap der guten H.

**Brachyris** Nutt. (*Brachyachyris* Spgl.) *Brachyris*, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

*dracunculoides* DC., dragunähnliche, 4. f. Nordamerika.

*ramosissima* DC., ästige, ☉. f. Texas.

**Brachystelma spathulatum** RB. Lindl., spatelblättrige, 4. Kn. t. Cap der guten Hoffnung.

**Brachystemon lanceolatum** W. etc. v. *Pycnanthemum lanceolatum* etc.

**Bromus arvensis** L. (*versicolor* Poll.), Acker-T., ☉. f. Europa, Asien, Amerika.

*multiflorus* Mart., vielblumige, ☉. f. ?

*pilosus* Dietr. ? = *murorum* Bernh.

**Bruckenthalia** Rchb., Bruckenthalie, VIII. I., Ericaceae.

*spiculifolia* Rchb., fadenblättrige, ♀. f. b. k. Siebenbürgen, Griechenland.

**Bryanthus** S. G. Gmel. DC., Sprossenheide, VIII. I., Ericaceae.

Gmelini G. Don, Gmelin's, ♀. f. b. k. Sibir., Kamtsch.

**Bunias macroptera** Rchb., großflügelige, ☉. f. Istrien.

**Burrielia** DC. (J. M. Burriel, Herausgeber der californischen Reise des Venegas), XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

*gracilis* DC., schlanke, ☉. f. Neucalifornien.

*microglossa* DC., kleinzüngige, ☉. f. Neucalifornien.

*tenerrima* DC., zarte, ☉. f. Neucalifornien.

**Cacalia** p. 141.

I. *Genuina atriplicifolia* L., *cordifolia* H. B. K., *hastata* L., *radulaefolia* H. B. K., *reniformis* Mühlbg., *reticulata* Vahl. (*asarifolia* Steud.), *runcinata* H. B. K., *suaveolens* L., *tuberosa* Nutt.

II. *Adenostyles* Cass., *glabra* DC. (*C. alpina* Jacq. L., *A. viridis* Cass.), *leucophylla* Rchb. (*candidissima* Cass.), *Petasites* Bluff et Fing. (*albida* Cass., *albifrons* Rchb.).

III. *Emilia* Cass., *sagittata* DC. (Vahl.), (*E. flammea* Cass., *C. sonchifolia* Hort.), *β. coccinea* Swt. (Curt.), *sonchifolia* DC. (L.) (*E. purpurea* Cass., *Crassocephalum sonchifolium* Less.).

IV. *Kleinia* L. Haw., *Anteuphorbium* DC. (L.), *articulata* Haw. (L.), *breviscapsa* DC. (*C. carnosa* Ait.), *ficoides* Haw. (L.), *Haworthii* DC. (*tomentosa* Haw., *C. canescens* W., *C. Haworthii* Swt.), *neriifolia* Haw. (*C. Kleinia* L.), *papillaris* Haw. (L.), *pugioniformis* DC. (Salm.) (*C. longifolia* Haw.), *radicans* Haw. (L.), *repens* Haw. (L.).

V. *Psacalium* Cass., *peltatum* Cass. (*C. peltata* H. B. K.), *C. bicolor* Roxb. v. *Senecio* Sect. V., *cylindrica* Lam. v. *Othonna cylindrica* Nachtr., *macrophylla* MB.



v. *Senecio phatyphyllus* p. 745, *ovalis* Ker v. *Senecio-Gynura ovalis* Nachtr., *scandens* Thbg. v. *Senecio deltoideus* Nachtr., *tomentosa* Thbg. v. *Senecio oliganthus* Nachtr.

**Cacteae \*).**

I. *Melocactus Hystrix* Haag. jun. etc., die übrigen s. p. 508.

II. *Ariocarpus* Scheidw. (*Anhalonium prismaticum* Lehm.), *retusus* Scheidw.

III. *Mammillaria*. A) *Microthelae acanthophlegma* Lehm., *bicolor* Lehm., *crucigera* Mart., *elegans* DC., *Haageana* Pfr., *Humboldtii* Ehbg., *nivea* Wendl., *nobilis* Pfr., *Parkinsonii* Ehbg., *sulcata* Schelh., *super-texta* Mart., *tecta* Miq. B) *Tenues. densa* Lk. et Ott., *echinata* DC., *elongata* DC., *gracilis* Prfr., *intertexta* DC., *minima* H. Dresd., *sphacelata* Mart., *subcrocea* DC., *tenuis* DC. C) *Stylothelae. candida* Scheidw. (*sphaerotricha* Lem.), *crinita* DC., *decipiens* Scheidw. (*inunciata* Lem.), *glochidiata* Mart. b. *flore roseo*, *pusilla* DC. b. *pusilla minor*, *Scheidweileriana* Schelh., *Schelhasii* Pfr., *Schiedeana* Ehbg., *Wildiana* Otto b. *major* Haag. jun. D) *Conothelae. aciculata* Otto, *albida* Haag. jun., *ancistrata* Pfr., *ancistrina* Pfr., *ancistroides* Lem., *caracasana* Otto, *Celsiana* Lem., *chrysacantha* Otto, *citrina* Scheidw., *columnaris* Mart., *crassispina* Pfr., *deflexispina* Lem., *discolor* Haw. b. *prolifera* Haag. jun., *Ehrenbergii* Pfr., *eriacantha* Lk. et Otto, *Eugenia* Scheidw., *flavescens* DC., *formosa* Scheidw., *fulvispina* Haw., *fuscata* Lk. et Otto, *Galeotti* Scheidw., *hexacantha* Salm, *nivosa* Lk., *obconella* Scheidw. (*dolichocent.* Lem.), *obscura* Scheidw., *Parmentieri* Otto (*prolifera* Haw.), *parvimanma* Haw., *Pfeifferi* Booth (*auriceps* Lem.), *phaeacantha* Lem. (*radula* Scheidw.), *polythele* Mart., *pyramidalis* Otto, *quadrispina* Mart., *rhodantha* Lk. et Otto b. *Andreae* Pfr., c. *pyramidalis* Schelh., *rosea* Scheidw. (*rhodeocentra* Lem.), *ruficeps* Lem., *rutila* Zucc., *setosa* Pfr., *simplex* Haw., b. *affinis* Otto, *tentaculata* Lk. et Otto, b. *spinis rubris* Scheidw., *tetracentra* Otto, *vetula* Mart., *vivipara* Haw. E) *Polyedrae. aeruginosa* Scheidw., *Caput Medusae* Lk. et Otto, *carnea* Zucc., *centrispina* Pfr., *crocidata* Lem. b. *quadrispina*, *Fischeri* Pfr., *Hystrix* Mart., *Karwinskiana* Mart. b. *flavescens* Zucc., *leucocarpa* Scheidw., *leucotricha* Scheidw., *macracantha* DC., *Mystax* Mart., *polyedra* Mart. b. *Mystax* Hort., *Seitziana* Zucc. Mart., *subpolyedra* Salm, *tetracantha* Salm, *versicolor* Scheidw. (*centricirrha* Lem.), *villifera* Otto, *xanthotricha* Scheidw., *Zuccariniana* Mart. F) *Dolichothelae* s. *Longi-*

---

\*) Da die größere Zahl der Gärtner die Gattungen und Arten dieser Familie nicht alphabetisch, sondern in wissenschaftlicher Reihe auführen, und da während des Druckes dieses Buches einige neue Gattungen und Arten bekannt wurden, auch Manches anders abgetheilt worden ist, so folgt hier noch eine Uebersicht dieser in der neuern Zeit mit so viel Eifer und Liebe bearbeiteten und cultivirten Familie. Vaterland (verschiedene Provinzen Südamerikas), Dauer und Cultur konnte, der Raumparsnifs wegen, übergangen werden, da es bei allen gleichförmig und im Buche angegeben ist.



## Cacteae

mammae. longimamma DC., uberiformis Zucc. G) Aulacothelae. aulacothele Lem., biglandulosa Pfr., clava Pfr. b. var., clavata Scheidw. (*rhapidacantha* Lem.), deficiens Schelh., erecta Lem., Lehmanni Otto, macrothele Mart., Plaschnickii Otto, Schlechtendalii Ehrenb., stipitata Scheidw. (*ancistracantha* Lem.), sulcimamma Pfr. H) Brachythelae acanthostephes Lehm., angularis Otto, arietina Lem., bihamata Pfr., brevimamma Zucc. (*depressa* Scheidw.), cirrhifera Mart., conoidea DC. (*inconspicua* Scheidw., *diaphanacantha* Lem.), conopsea Scheidw., cornifera DC. (*daimonoceras* Lem.), coronaria Haw., echinocactoides Pfr., Echinops Scheidw. (*oothele* Lem.), exsudans Zucc., gladiata Mart., grandiflora Otto ?, loricata Mart., Ludwigii Ehrenb., magnimamma Mart., Ottonis Pfr., pentacantha Pfr., pycnacantha Mart., radicans DC. (*impexicoma* Lem.), recurva Lehm., retusa Scheidw. (*sulcolanata* Lem.), scepontocentra Lem., subangularis DC., triacantha DC., uncinata Zucc. (*adunca* Hort.), b. iunciata. Darnach zu berichtigen S. 492 seq.

IV. Discocactus Pfr., insignis Pfr. (*Melocactus placentiformis* Lehm. S. 508.)

V. Echinocactus (S. 278 Sect. II.) caespiticius Pfr. (*Mammill. caespitic.* DC. Ech., *horripilus* Lem.), campulacanthus Scheidw., concinnus Schelh., coptonogonus Lem. (*interruptus* Scheidw.), Courantii Lem., denudatus Lk. et Otto, dolichacanthus Lem., Ehrenbergii Pfr., equitans Scheidw., erinaceus Lem., gibbosus DC., grandicornis Lem., horizontalis Scheidw. ? Hystrix DC. (*oxypterus* Zucc., *electracanthus* Lem., *lancifer* Rchb.), Jenischianus Pfr., mamulosus Lem., (*hypocrateriformis* Otto), micracanthus Schelh., minax Lem., Monvillii Lem., ornatus DC. (*holopterus* Miq., *Mirbelii* Lem.), pectinatus Scheidw. (*pectiniferus* Lem.), pentacanthus Lem., phyllacanthoides Lem., pumilus Lem. Scopa Lk. et Otto (*Cereus* Scopa S. 184) b. candidus, c. cristatus, suberinaceus Lem., subporrectus Lem., stellatus Scheidw., tenuiflorus Lk. Otto, tenuispinus Lk. et Otto, tetracanthus Lem. (*sessiliflorus* Hort.), tetraxiphus Otto, theionacanthus Lem., turbiniformis Pfr., Vanderaeyi Lem. etc.

VI. Astrophytum Lem. myriostigma Lem. (*Cereus Callicoe* Gal.).

VII. Echinopsis Zucc. (*Echinonyctanthus* Lem.), *Cerei globosi* Auct.), Echinocactus Sect. I. S. 278. campylacantha Pfr. (*Cer. leucanthus* Pfr., *Echinoc. leucanth.* Gill.), Zuccarini Pfr. (*Cer. tubiflorus* Pfr., die übrigen s. S. 278) (*denudatus* Lk. et Otto et *gibbosus* DC. gehören zu Echinocactus).

VIII. Pilocereus Lem., senilis Lem. (*Cer. senilis* DC.) S. 184.

IX. Cereus. A) Cereastri. alacriportanus Mart., albispinus Salm, aureus Salm, azureus Parm., candicans Gill. b. tenuispinus Pfr., chalybeus Otto (*polychaetus* Rchb.), chilensis Colla, clavatus Otto, coerulescens Salm, conicus Otto, Coryne Lk., crenulatus Salm, Curtisii Otto, deficiens Otto, dichroacanthus Mart., divaricatus Lam., Dyckii Mart., eburneus Salm

## Cactaeae

b. griseus, erectus Karw., eriophorus Otto, flavescens Otto, floccosus Otto, Forbesii H. Angl., fulvibarbis Otto, gemmatus Zucc., geometrizaus Mart., Gladiator Otto, (*pugioniferus* Lem.), gladiatus Lem., Haworthii DC., horridus Otto, Hystrix Salm, Jamacaru Salm (*laetevirens*, *glaucus*, *caesi*us Hort.), lanuginosus Mill., lividus Pfr., lutescens Salm, marginatus DC., Moritzianus Otto, multangularis Haw., niger Salm, Olfersii Otto, peruvianus DC. b. monstrosus, Pfeifferi Parment., platygonus Otto, polychaëtus Rchb., polylophus DC., reductus Lk., repandus Haw., resupinatus Salm, Royeni Haw. b. armatus Otto, Russelianus Forb., Schomburgkii H. Berol., Seidelii Rchb., spinibarbis Otto, strictus Haw., strigosus Gill., subrepandus Haw., Terscheckii Parm., tenuis Pfr., tetragonus Haw., thalassinus Otto, tilophorus Pfr., undatus Lk. et Otto, virens DC., xanthochaetus Rchb. B) Polylophi. cinerascens DC. (*Deppei*), Ehrenbergii Pfr., leptacanthus DC., Maelenii Pfr., pentallophus DC., tuberosus Pfr. III. Opuntiacei. articulatus Pfr., ovatus Pfr., syringacanthus Pfr. IV. Protracti. acutangulus Otto, baxaniensis Karw., Bonplandii Parm., colubrinus Otto, laetus Salm, obtusus Haw., pellucidus Otto, pentagonus Haw., princeps H. Herbi-pol., ramosus Karw., serpentinus Lag., tenellus Salm, tortuosus Forb., variabilis Pfr. E) Repentes. coccineus Salm, extensus Salm, flagelliformis Mill., flagriformis Zucc., grandiflorus Mill., humilis DC., inermis Otto, inversus Lk., leptophis DC., Mallisoni Hort. (Hybrid.), Martianus Zucc., Napoleonis Grah., nycticalus Lk., prismaticus Salm, pterogonus Lem., radicans DC., rostratus Lem. (*hamatus* Scheidw.), Schrankii Zucc., setaceus Salm, Smithii (Hybrid.), speciosissimus DC. b. Guillardieri, c. ignescens, d. Jenkinsonii, e. lateritius, f. Lothii, g. Makoyi, k. Roydii, i. Vandesii, spinulosus DC., triangularis Haw. b. pictus, triqueter Haw. Darnach zu berichtigen und zu ergänzen S. 182 etc.

X. *Phyllocactus* Lk. (*Cerei alati*, *Epiphyllum* Hort.) S. 294. Ackermanni Otto, Hookeri Otto, latifrons Zucc., oxypetalus DC., phyllanthoides Lk. (*Cactus alatus* W., *C. elegans* Lk., *Epiphyllum speciosum* Haw.), Phyllanthus Lk.

XI. *Epiphyllum* Herm. Haw. Pfr. Altensteinii Pfr., Russelianum Gard., truncatum Haw. b. coccineum.

XII. *Rhipsalis* G. Pfr. A) *Alatae*. crispata Pfr., pachyptera Pfr. b. crassior Salm, platycarpa Pfr., ramulosa Pfr., rhombea Pfr., Swartziana Pfr. (*Cactus alatus* Sw., *Epiphyllum alatum* Haw.). B) *Ramosae*. Cassytha G. etc. s. S. 684.

XIII. *Lepismium* Pfr. commune Pfr. etc. S. 455.

XIV. *Hariota* DC., Hariote, XII. 1., Cactaeae, salicornioides DC., glasschmalzähnliche, f. w. Brasilien.

XV. *Opuntia leucosticta* Wendl. = megacantha, Parmentieri Pfr., phyllacantha Salm, pruinosa Mühlenpf., pulverulenta Pfr. Alle übrigen sind S. 563 aufgeführt.

XVI. *Pereskia* Plum. calandrinifolia Otto, lanceolata Otto. Die übrigen S. 607.



*Caesalpinia macrantha* H. Monspel., großblumige, ♀. w. Chili.

*Cajophora lateritia* Kl. = *Loasa lateritia*.

*Caladium Baursea* Rchb. v. *Philodendron crassinervium*.

*Calliglossa* Hook., Schönzügel, XIX. II., Compositae Corymbiferae.

*Douglasii* Hook. (*Oxyura chrysanthemoides* Hort., non DC.), Douglas's, ☉. f. Californien.

*Callipeltis Cucullaria* Stev. v. *Galium Cucullaria*.

*Calomeria amaranthoides* Vent. v. *Humea elegans*.

*Camelina laxa* C. A. Mey., lockerblumige, ☉. f. Caucas.

*Camellia japonica* Victoria o. Presley's Queen Victoria.

*Caperonia* Hilar., Caperonie, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

*castanaefolia* Hilar., kastanienblättrige, ☉. w. m. f. Java.

*palustris* Hilar., sumpfliebende, ☉. w. m. f. Westind. Mex.

*Caralluma crenulata* Wall. (*Bucelosia crenulata* Wighth. Arn.), gekerbte, ♀. 4. w. Ostindien.

*Cassia schinifolia* A. DC. = *Barclayana* Swt.

*Cassinia Cunninghami* DC. (*aculeata* et *patens* Cunn.), Cunningham's, ♀. t. Neuholland.

*Catapodium* Lk. v. *Sclerochloa*.

*Cenia discoidea* Less. = *Cotula nudicaulis* Thbg. S. 223.

*Chaixia Myconi* Lapeyr. v. *Ramonda pyrenaica*.

*Chasmanthium* Lk. v. *Uniola*.

*Chelone barbata* c. antwerpensis Hort.

*Chorizema Baueri* Benth., Bauer's, ♀. t. Neuholland.

*diversifolium* A. DC., verschiedenblättrige, ♀. t. Neuholl.

*Manglesii* Hügel, Mangles's, ♀. t. Neuholland.

*varium* H. Hügel, veränderliche, ♀. t. Neuholland.

*angustifolium* Benth. v. *Dillwynia glycinifolia*, *Baxteri* Grah. v. *Podolobium scandens*.

**Chrysanthemum.** I. Genuini.

*caespitosum* Weinm., rasenartige, 4. f. ?

*lacerum* Hort., schlitzbilättrige, ♀. k. Canarische Ins.

*mexicanum* H. B. K., mexicanische, 4. k. Mexico.

*pumilum* W. (*Matricaria pyrethrifolia* Poir.), kleine, ☉. f. ?

*umbrosum* W., schattenliebende, ☉. f. Griechenland.

Unbestimmt: *daucifolium* P.

II. *Leucanthemum* T.

*anomalum* Lagasc., ungewöhnliche, 4. ♀. k. Spanien.

*perpusillum* Loisel. v. *Nananthe perpusilla*, *tingitanum* Bernh. (*praecox* Hort.) v. *Phalacrodiscus arvensis*.

**Cineraria pulchella** Swt., schöne, ♀. k. Canarische Ins.

*pumila* Thbg. (*humifusa* L'Her.), kleine, 4. ♀. k. C. d. g. H.

*scapiflora* L'Her., schaftblumige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

*tussilaginoide* Webb., huflattigähnliche, 4. ♀. k. Teneriffa.

β) *Waterhousiana* Paxt.

*viscosa* L'Her. (? *pandurata* Thbg.), schmierige, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

Von vorstehenden existiren noch folgende Hybriden:

King, *Hendersonii*, *Hoffmannseggii* Rchb. etc.

**Cipura Tigridia** \* (*Marica Tigridia* Lehm.), tigerblumenähnliche, 4. Zw. k. ?

**Cirsium leucopsis** DC., weißliche, 4. f. Olymp.

*Wiedemannii* Fisch. et Mey., Wiedemann's, ♂. f. ? Natolien.

*Cladochaeta candidissima* DC. v. *Helichrysum candidissimum*.

**Clarkia** Pursh. S. 202 *Onagrariae*.

**Claytonia perfoliata**, β) *californica* Fisch. et Mey.

**Cleome fugax** Schrad., hinfällige, ☉. ♀. w. ?



- Cnidium Petroselinum** DC. (*Peucedanum Petroselinum* Dsf.), silgenähnliches, 4. f. ?
- Codiaeum** Rumpf. Blum., *Codiaeum*, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*chrysostictum* Sogl. (*pictum* Hook., *variegatum* Blum., *Croton pictum* Hort.), buntes, 5. w. Ostindien, China.
- Coelestina** *ageratoides* Cass., *ageratum*ähnl. 4. k. Mexico.  
*coerulea* Cass. (*corymbosa* DC., *Eupatorium coelestinum* L.), blaue, 4. f. Nordamerika.  
*micrantha* Sogl. (*Ageratum coelestinum* Bot. mag., *Eupat. micranth.* Lagasc.), kleinblumige, 5. k. Neuspan.
- Coenolophium** K., Epperlein, V. II., Umbelliferae.  
*Fischeri* K. (*Silaus longifolius* Fisch.), Fischer's, 5. 4. f. Sibirien.
- Colliguaja** Molin. (chilesischer Name), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.  
*integerrima* Gill. Hook., ganzblättrige, 5. k. t. Chili.  
*odorifera* Molin. (*Croton Colliguaja* Sogl.), wohlriechende, 5. k. t. Chili.
- Conioselinum** Fisch., Bergsilge, V. II., Umbelliferae.  
*coenolophioides* Turcz., epperleinähnliche, 5. f. Dahurien.  
*Czernaevia* Fisch. et Mey. (vel *Czerniajevica*, *Czernaevia laevigata* Turcz.), glatte, 5. f. Dahurien.  
*dubium* Turcz., zweifelhafte, 5. f. Dahurien.  
*Fischeri* Wimm. et Grab. (*tataricum* Fisch., *Gmelini* Steud.), Fischer's, 4. f. Sibirien, Tatarei, Schlesien.  
*univittatum* Turcz., einschleierige, 4. f. Dahurien.
- Conyza densiflora** Heyn. v. *Blumea longifolia*.
- Corethrostylis** Endl., Besengriffel, V. I., Malvaceae Büttneriaceae.  
*bracteata* Endl., deckblättriger, 5. t. Neuholland.
- Cotula microcephala** DC. (*Cenia microcephala* E. Mey.), kleinköpfige, 5. 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.  
*villosa* DC., zottige, 5. f. Cap der guten Hoffnung.
- Courtoisia daucifolia** Rchb. v. *Collomia heterophylla*.
- Corraea bicolor** Hort., Grewillei, Harrisii, Milleri, longiflora, speciosa b. major, Stockwelliana et turgida Hort., sämmtlich Hybriden.  
*ferruginea* Bot. mag., rostfarbige, 5. t. Neuholland.
- Cremocephalum** Cass. (*Crassocephalum* Mch.) v. *Senecio* Sect. III.
- Crepis rigens** Ait. v. *Microderis rigens*.
- Crotalaria Sieberi** Roem. v. Löth. (*C. spartioides* Tausch. non DC.), Sieber's, 5. k. t. Aegypten.  
*elegans* Hort. v. *purpurea*.
- Crinum Binsii** Hffg. (? *Crinum submersum* Herb.), 4. w. Brasilien.
- Cupressus triquetra** Lodd. = *Callitris triquetra*.
- Cyclamen aestivum** Rchb. (*Clusii* W. Sm.), Sommer-E., 4. Kn. k. Oberitalien.  
*aleppicum* Fisch., syrisches, 4. Kn. k. Syrien.  
*corniculatum* H. Hügel, gehörntes, 4. Kn. k. Nordafrika.  
*ficariaefolium* Rchb. (*hederaefolium* Hornem.), schöllkrautblättriges, 4. Kn. k. Schweiz, Dalmatien.  
*intermedium* Wender., mittleres, 4. Kn. k. ? Südeuropa.
- Cyclosia maculata** Kl. v. *Mormodes pardina*.
- Cynthia** Dandelion DC. = *Krigia Dandelion* S. 440.
- Cyrtopera Woodfordii** Lindl. = *Cyrtopodium Woodfordii*.
- Cystopteris** Bernh., Blasenfarn, XXIV. I., Pterioideae.  
*aemula* (Ait. Sw.), lieblicher, 4. t. w. Madeira.

- Cystopteris alpina** (Jacq. Sw.), Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.  
*bulbifera* Bernh., knollentragender, 4. f. Nordamerika.  
*dentata* (Sm. Dicks.), gezahnter, 4. f. Schottland.  
*fragilis* Bernh. (*Asp. regium, rhaeticum et dentatum* Hort.), gemeiner, 4. f. Europa, Nord- u. Südamer., Canar. Ins.  
 β) *atomarium* W.  
*montana* (Hänk. Sw.), Berg-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.  
*regia* (Sw.), königlicher, 4. f. England.
- Daboecia polifolia** D. Don, c) *nana*, d) *longifolia*, e) *latifolia*, f) *pallida*, g) *atropurpurea*.
- Dahlia acutiflora** Moc. et Sess. etc. s. *Georgina Cervantesii* etc., *Daucus pulcherrimus* Koch v. *Platyspermum pulcherrimum*.
- Deyeuxia aemula** Kunth v. *Agrostis aemula*.
- Dicrypta Baueri** Lindl. v. *Heterotaxis crassifolia*.
- Dimorphanthes aegyptiaca** Cass. etc. v. *Conyza aegyptiaca* etc.
- Dinema** Lindl., *Dinema*, XX. 1., Orchideae.  
*polybulbon* Lindl. (*Epidendron polybulbon* Sw., *Bulbophyllum occidentale* Sogl.), vielzwiebelige, 4. Kn. w. Westindien.
- Diodia dasycephala** Cham. Schldl. (*Boreria advena* H. Petrop.), wolköpfige, 4. w. Brasilien.
- Diphyes pendula** H. Hügel v. *Bulbophyllum pendulum*.
- Diplochita** DC., Doppelweiderich, X. 1., Lythraeae.  
*Melastomeae*.  
*albicans* \* (*Miconia albic.* Steud.), weißlicher, 5. w. Mexico.  
*Fothergilla* DC., Fothergill's, 5. w. Südamerika.  
*macrophylla* DC., großblättriger, 5. w. Mexico, Trinidad.  
*pyramidalis* \* (*Miconia pyram.* DC., *Chitonias pyram.* G. Don), pyramidal, 5. w. Westindien.  
*Swartziana* DC. (*Chitonias Tamonea* G. Don), Swartz's, 5. w. Westindien.
- Dipteracanthus** p. 269. Zu dieser Gattung gehören noch: *ciliatus* N. E. = *Ruellia ciliata* Hornem. p. 705, *patulus* N. E. = *Ruellia patula* Jacq. (*aromatica* Roxb.), *pilosus* N. E., haariger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Diptera** Borkh. v. *Saxifraga*.
- Discopleura** DC., capillacea DC. = *Sison capillaceus* Sogl., S. 761, *costata* Steud. (*Ammi costatum* Ell., *D. capill.* DC.), ☉. f. Nordamerika.
- Draba lasiopoda** Turcz., wollfüßiges, ♂. f. Baical.  
*rivularis* Bernh. = *D. Liljebladii* S. 273.  
*B. Erophiola minima* C. A. Mey., kleinstes, ☉. f. Caucas.
- Dracopis** Cass. v. *Rudbeckia*.
- Drymaria ciliata** H. Berol., gefranzter, 4. w. Südamer.  
*gracilis* Lk., ☉. S. 270.  
*villosa* Cham. Schldl., zottiger, 4. w. k. Mexico.
- Dysosmia foetida** DC. v. *Passiflora foet.*
- Ecballion** Rich., Spritzgurke, XXI. x., Cucurbitaceae.  
*Elaterium* Rich. (*Ecbalium agreste* Rehb.), gemeine, S. ☉. et 4. f. Griechenland, Taurien, Südeuropa.
- Echinacea intermedia** Penny, Hybride von *E. purpurea* et *serotina*.
- Eclopes** G. DC. v. *Relbania*.
- Emilia coccinea** Swt., *flammea* Cass. (*sagittata* DC.), etc. v. *Cacalia sagittata* etc.



- Epacris diosmaefolia** H. Angl., göttergeruchblättriger,  $\S$ . t. Neuholland.  
*incarnata* Hffg., fleischfarbiger,  $\S$ . t. Neuholland.  
**Epidendron uniflorum** Lindl. v. *Hormidium uniflorum*.  
**Eragrostis elegans** N. E., (*brasiliensis* N. E.), zierliches,  $\odot$ . f. Brasilien.  
*purpurascens* Lk. (*chinensis* Hort., *megapotamica* Schult.),  $\odot$ . f. Brasilien. S. 292.  
*spectabilis* Steud. (Pursh.), ansehnliches,  $\odot$ . f. Nordamer.  
**Eremogone** Fenzl., Wüstenmiere, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.  
*cucubaloides* (Sm.), taubenkropfäbnl., 4. f. b. k. Armenien.  
*dahurica* Fenzl., dahurische, 4. f. Dahurien.  
*dianthoides* (Sm.), nelkenähnliche, 4. f. b. k. Armenien.  
*formosa* Fenzl., schöne, 4. f. Ostsibirien.  
*holostea* (MB.), spurrenähnliche, 4. f. Caucasus.  
*graminifolia* Fenzl., grasblättrige, 4. f. Sibirien, Ungarn, Siebenbürgen.  
*gypsophiloides* Fenzl., gypskrautähnliche, 4. f. b. k. Kleinasien.  
*juncea* Fenzl., simsenförmige, 4. f. Sibirien.  
*longifolia* Fenzl., langblättrige, 4. f. Sibirien.  
*nardifolia* Fenzl., borstengrasblättrige, 4. f. Altai.  
*otitoides* Fenzl., kleinblumige, 4. f. Sibirien.  
*rigida* Fenzl., starre, 4. f. Podolien, Ukraine.  
*subulata* Fenzl. (*Arenaria pungens* Steph., *subulata* Sering., *A. viscosa* Fisch.), pfriemenförmige, 4. f. Sibirien.  
**Erica** Sect. IV. *gracilis* Wendl. (*neglecta* Don, *tenuissima* Wendl.), schlanke,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffn.  
 b) *autumnalis*.  
*imbecilla* Swt. (*gracilis* Salisb. non Wendl.), schwächliche,  $\S$ . t. Cap der guten Hoffnung.  
**Erigeron maximus** Otto = *Leptostelma maximum*.  
**Erucastrum heterophyllum** \*, verschiedenblättrige,  $\S$ . f. Spanien.  
**Euryops linifolius** DC. = *Agathaea linifolia*.  
**Eugenia disticha** DC. v. *Olynthia disticha*.  
**Euphorbia macrorrhiza** C. A. Mey., grofswurzelige, 4. f. Altai.  
*trapezoidalis* Viv. (*cyrenaica* Auct.), trapezenförmige, ?  $\odot$ . f. Nordafrika.  
*trigonocarpa* Fisch. et Mey., 4. (nicht  $\odot$ ).  
*splendens* Boj. = *Breonii* Hort, *Milii* H. Par.  
**Faba porphyrea** H. Dresd., porphyrfarbige,  $\odot$ . f. ?  
**Gaya** Gaud. (J. Gay, französischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.  
*simplex* Gaud., einfache, 4. f. Schweizer, französische und italienische Alpen.  
**Geracium** Rchb. v. *Crepis*.  
**Gnaphalium Candelabrum** Hornem., armleuchterförmiges,  $\odot$ . f. ?  
*paniculatum* Colla, rispiges, 4. k. Chili.  
*resedaefolium* Trevir., resedenblättriges,  $\odot$ . f. Chili.  
*spicatum*  $\beta$ . *Cruickshanksii* H. Petrop.  
*Vira-Vira* Molin. (? *chilense* Spgl., *Piravira* Less., *Sprengelii* H. Arn.), chilesisches,  $\odot$ . f. Chili.  
**Gnaphalium cynoglossoides** Trevir. v. *Antenaria triplinervia*.  
**Gomeza densiflora** Hffg., dichtblumige, 4. w. Brasilien.  
**Gomphrena aggregata** W. et *brasiliensis* Jacq., v. *Philoxeras aggregatus* et *brasiliensis*.



- Gymnandra** Pall, Kletschblume, XIV. II., Personatae Rhinanthaeae.  
 Gmelini Cham. (*borealis* Pall., *ovata* W., *reniformis* W., *Bartsia Gymnandra* Pursh, *Lagotis glauca* G.), Gmelin's, 4. f. Nördliches Amerika, Kamtschatka.  
*integrifolia* W. (*altaica* W., *borealis* Pall., *Pallasii* Cham. Schldl.), ganzblättrige, 4. f. Dahurien.
- Guadua** Kunth (südamerikanischer Name), VI. I. Gramineae.  
*latifolia* Kunth, breitblättrige, 5. w. Südamerika.
- Gwillimia** Rottl. v. Talauma.
- Gymnocline leucocephala** Cass. (*macrophylla* Bl. et Fingerh.) v. *Pyrethrum macrophyllum*.
- Gymnosperma glutinosum** Less. v. *Selloa glutinosa*.
- Gypsophila effusa** Tausch. (*paniculata* Jacq.), haarstielige, 4. f. Ungarn, Mähren.
- Hacquetia** Neck. (B. Hacquet, der die krainerischen Alpen bereiste), V. II., Umbelliferae.  
*Epipactis* DC., grünblumige, 4. f. Kärnthen, Krain, Oberitalien, Mähren, Schlesien.
- Hariota** DC. v. Cacteeae des Nachtrags.
- Hedypnois persica** MB., persisches, ☉. f. Pers., Caucas.
- Hedysarum neglectum** Ledeb. v. *H. lasiocarpum* S. 379.
- Heleocharis Lereschii** Schuttleworth, Leresch's, ☉. f. Südliche Schweiz.
- Helianthemum lasiocarpum** H. Par. = *ledifolium*.
- Helichrysum viscosum** Sieb., schmierige, ☉. f. m. Neuholland.
- Helosciadium lateriflorum** K. (*leptophyllum* DC., *Pimpinella capillacea* Poit., *lateriflora* Lk. S. 624), ☉. f. Südamerika.  
*laciniatum* DC., schlitzblättrige, ☉. f. Peru.
- Hemistephia** S. 389 satt *Hemistepia* = *Aplotaxis Bungei* DC.
- Heracleum barbatum** Ledeb. (? *Panaces* Ls.), bärtiges, ♂. f. Altai.  
*chorodanum* DC. (*longifolium* MB., *austriacum* var. Stev.), caucasischer, ♂. f. Caucasus.  
*dissectum* Ledeb. var. *camtschaticum*.  
*persicum* H. Par., persisches, 4t f. Nordpersien.  
*Wilhelmsii* Fisch. Lallem., Wilhelms's, 4. f. Iberien.
- Hermannia arabica** Steud. et Hochst., arabische, ☉. f. m. Arabien.
- Hernandia leucomphala** Hffg. (*Guettarda speciosa* van Eeden), weißliche, 5. w. ?
- Hertia crassifolia** Less. v. *Othonna crassifolia*.
- Heterothalamus** Less., Verschiedenbödler, XIX. II., Compositae Corymbiferae.  
*brunioides* Less. (*Marshallia aliena* Spgl.), brunienähnlicher, 5. w. Brasilien.
- Hexacentris coccinea** N. E. v. *Thunbergia coccinea*.
- Hibiscus** Trionum, δ) *hispidus* H. Petrop., ε) *cordifolius* H. Petrop.
- Hieracium** S. II., Gronovii L., Gronov's, 4. f. Nordamerika.  
*marianum* W. (*foliosum* Mchx.), maryländisches, 4. f. Nordamerika.  
*venosum* L., aderiges, 4. f. Nordamerika.
- Himantoglossum** Spgl., Riemenzunge, XX. I., Orchideae.

- Himantoglossum hircinum** Spgl., Bocks-R., 4. Kn.  
f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.  
*antropophorum* Spgl. v. *Aceras antropophora*, *cucullatum* Rchb. etc. v. *Gymnadenia cucullata* etc.
- Hippomarathrum crispum** K. (*Cachrys crispa* P., *longiloba* DC., *microcarpa* Stev. MB.?), krauser, 4. f. Caucasus, Palästina.
- Hladnikia** K. (Hladnik, Professor zu Laybach), V. II., Umbelliferae.  
*golacensis* K. (*Athamanta Golaka* Hacq.), krainerische, 4. f. Krain.  
*pastinacifolia* Rchb. v. *Falcaria latifolia*.
- Hollia** \* (D. F. Holl, Lehrer der Pharmacie zu Dresden, welcher Portugal und Madeira in botanischer Hinsicht bereiste), V. I., Rhamneae.  
*africana* \*, afrikanische, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- Holophyllum** Less., Ganzblatt, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.  
*capitatum* Less., kopfförmiges, ♀. k. Cap der guten H. β) *punctatum* Less.  
*lanuginosum* DC., wolliges, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.  
*scabrum* DC., scharfes, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- Holosteum glutinosum** Fisch. et Mey., klebrige, ♂. f. Rußland.
- Homogyne** Cass. v. *Tussilago*.
- Hormidium** Lindl., Hormidie, XX. I., Orchideae.  
*uniflorum* Lindl., einblumige, 4. w. Mexico.
- Hovea** Celsii β. *latifolia* H. Huegel.  
*trifoliata* H. Hügel., dreiblättrige, ♀. t. Neuholland.  
*trisperma* Benth. Hueg., dreisamige, ♀. t. Neuholland.
- Hyacinthus paradoxus** Fisch. et Mey., wunderbare, 4. Zw. f. Südrußland.
- Hyoscyamus varians** Vis., veränderlicher, ♂. f. Dalmatien.
- Hypochaeris Salzmanniana**, DC. (*dimorpha* Salzm.), Salzmann's, ♂. f. Nordafrika.
- Iberis neglecta** Tenor., übersehene, ♂. f. Neapel.  
*taurica* DC. (*ciliata* W., *simplex* DC.), taurische, ♂. ♂. f. Taurien.  
*umbellata* var., *speciosa* H. Petrop.
- Indigofera macrostachya** Vent., großblättriger, ♀. t. China.
- Isatis intermedia** Turcz., mittlerer, ♂. f. Südrußland.  
*microcarpa* Gay, kleinfrüchtiger, ♂. f. Arabien.
- Ismelia frutescens** Less. v. *Chrysanthemum carnosulum*,  
*I. maderensis* D. Don v. *Chrysanthemum pinnatifidum*,  
*I. versicolor* Cass. v. *Chrysanthemum carinatum*.
- Isolepis hamulosa** Kunth (*Dichelostylis hamulosa* N. E.), feinhakiges, ♂. f. Südrußland.  
*Hystrix* Kunth, sparrigspeliges, ♂. f. Cap der gut. H.
- Isotoma Brownii** G. Don, Brown's, ♂. ♂. f. k. Neuholl.  
*senecioides* A. DC. = *axillaris*.
- Jasonia dichotoma** DC., zweizinkige, ♀. k. Canarische Inseln.
- Juncus pallidus** RB., bleiche, 4. k. Neuholland.
- Jurinea** Cass. *depressa* C. A. Mey., niedergedrückte, 4. f. Caucasus.  
*moschata* DC., moschusduftende, 4. f. Neapel.  
*stoechadifolia* DC., stoechasblättrige, 4. f. Taurien.



- Jussieuia longifolia** DC., langblättrige, ☉. f. f. m. w. Brasilien.
- Justitia speciosa** Roxb. S. 435 ist unter IX. Peristrophe zu stellen.
- Kalbfuscia** Schultz (Kalbfuß, Freund des Herrn Schultz), XIX. 1., Compositae - Cichoriaceae.
- Mülleri** Schultz, Müller's, ☉. f. Sardinien.
- Salzmanni** Schultz, Salzmann's, ☉. f. Nordafrika.
- Kennedyia Comptoniana** Lk. muß unter *Hardenbergia* gestellt werden, S. 436.
- cordata** Lindl. (*Hardenbergia cordata* Benth.), herzblättrige, f. Sch. t. Neuholland.
- dilatata** Cunn. muß unter *Zichya* gestellt werden.
- inophylla** Cunn. desgl.
- heterophylla** Mack. et parviflora Mack. unter I. Genuinae.
- ? inconspicua** Hort., unansehnliche, f. t. Neuholland.
- lucida** Hügel, schimmernde, f. Sch. t. Neuholland.
- tomentosa** Hügel, filzige, f. Sch. t. Neuholland.
- trilobata** Hügel, dreilappige, f. Sch. t. Neuholland.
- Sieberiana** Hort. vid. *Leptolobium microphyllum*,
- Stirlingii** Lindl. v. *Physolobium Stirlingii*.
- Kentrophyllum leucocaulon** DC. (*album* Cass.), weifstengeliger, ☉. f. Griechenland.
- Knautia collina** Coult. (Req.) (*Scabiosa collina* Req., S. *hirsuta* Lapeyr.), Hügel-K., ♂. f. Südfrankreich.
- Kirschlegeria lycioides** Hffg. v. *Fuchsia lycioides*.
- Kotschya** Endl. (Kotschy, österreichischer Botaniker u. Reisender), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
- africana** Endl., afrikanische, f. k. Nordafrika.
- Kreysigia multiflora** Rchb. = *Schelhammeria undulata* RB. (non S. multiflora RB.).
- Kruberia leptophylla** Hoffm. v. *Ulospermum dichotomum*.
- Krynitzkia** Fisch. et Mey. (Krynitzki, ehemaliger Professor an der Universität zu Charkow), V. 1., Asperifoliaceae.
- leiocarpa** Fisch. et Mey. (*Echinosperrum leiocarpum* Fisch. et Mey. S. 280) glattfrüchtige, ☉. f. Neucaliforn.
- Ktenospermum** Lehm., Kammsame, V. 1., Asperifoliaceae.
- linifolium** Lehm. (*Cynoglossum lateriflorum* Hort.), gleichbreitblättriger, ☉. f. ?
- Kunzea** Rchb. v. *Stenospermum*.
- Kunzia tridentata** Spgl. v. *Purshia tridentata*.
- Lachnagrostis** Trin., Straufsrohr, III. II., Gramineae.
- aemula** Trin. = *Agrostis aemula* S. 25.
- Billardieri** Trin., Billardiere's, 4. k. Neuholland.
- Forsteri** Trin. (*Ag. novae hollandiae* RB.), Forster's, 4. k. Neuzeeland.
- plebeja** Trin. (*retrofracta* Trin.), zurückgeknicktes, 4. k. Neuholland.
- Lactuca undulata** Ledeb., wellenblättriger, ☉. f. Altai.
- Lasiagrostis** Lk. v. *Stipa*.
- Lasiandra argentea** DC., *coerulea* Rchb. v. *Pleroma holosericea* et *heteromalla*.
- Lallemantia** Fisch. et Mey. (J. L. E. Avé Lallemant, Mitdirector am kaiserlichen botanischen Garten zu Petersburg), XIV. 1., Labiatae.
- canescens** Fisch. et Mey., *iberica* Fisch. et Mey., *peltata* Fisch. et Mey. = *Dracocephalum canescens* L. etc. S. 274.



- Lasiochloa** Kunth., Wollspelze, III. II., Gramineae.  
*adscendens* Kunth, aufsteigende, ☉. f. Cap der g. H.  
*ciliaris* Kunth, gefranzte, ☉. f. Cap der guten Hoffn.  
*hirta* Kunth, rauhe, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.  
*hispida* Kunth, steifhaarige, ☉. 4. f. k. Cap d. g. H.  
*villosa* Kunth, zottige, ☉. ? 4. f. k. Cap der gut. H.  
**Lasiopetalum** *corylifolium* H. Kew., haselnufsblät-  
 terige, ♀. t. Neuholland.  
*leucanthum* Hügel, weifsblumige, ♀. t. Neuholland.  
**Lasiospermum** *crithmifolium* G. Don, meerfenchel-  
 blätteriger, 4. k. Macedonien.  
*eriospermum* G. Don, wollsamiger, Italien.  
*alpinum* Rchb. = *L. pedunculare*.  
**Lavandula** *pubescens* Decaisn. Fresen., weichhaariger,  
 ♀. k. Sinai.  
**Leontopodium** *sibiricum* Cass. DC., sibirisches, 4.  
 f. b. Dahurien, Mongolei.  
**Lepidium** *Bonannianum* Tenor., Bonanni's, ☉. f. Neapel.  
*decumbens* Desv. = ? *micranthum* Ledeb.  
*Ecklonii* Schrad., Ecklon's, 4. ♀. k. Cap d. gut. Hoff.  
**Lepidium** *vesicarium* L. (*angulosum* Urvill.), blasige,  
 ☉. f. Mittelasien.  
*sibiricum* Schweig. v. affine.  
**Lepigonum** *canadense* Fisch. et Mey. etc. v. *Alsine* ca-  
 nadensis etc.  
**Leptochloa** *arabica* Kunth v. *Dineba aegyptiaca*.  
**Leptolobium** Benth. (*Kennedynella* Steud.), Schlank-  
 bohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.  
*microphyllum* Benth., kleinblätterige, ♀. Sch. t. Neuholl.  
*tomentosum* Benth., filzige, ♀. Sch. t. Neuholland.  
**Lepyrodia** *elongata* Spgl. v. *Restio lateriflorus*.  
**Leucopsidium** DC., Weiskräutel, XIX. II., Compo-  
 sitae Corymbiferae.  
*arkansanum* DC., arkansanisches, ☉. f. Nordamerika.  
*Leucostemma* *vestitum* Benth. v. *Helichrysum vestitum*.  
**Libanotis** *buchtormensis* DC. = *Seseli buchtormense*  
 S. 749.  
*daucifolia* Rchb. (*vulgaris* γ. DC.), möhrenblätterige,  
 4. f. Krain.  
**Ligularia** *geifolia* DC. (*reniformis* DC.), nelkenwurz-  
 blätterige, 4. f. Caucasus, Nepal.  
*Reichenbachii* Steud. (*Hoppea speciosa* Rchb.), Reichen-  
 bach's, 4. f. ?  
*speciosa* Fisch. et Mey. (*L. sibirica* δ. *speciosa* DC.,  
*Cineraria Fischeri* Ledeb., *C. speciosa* Fisch. Schrad.),  
 prächtige, 4. f. Sibirien.  
*thyrsoidea* DC. (Ledeb.), straufsblumige, 4. f. Altai.  
**Lilium** *Szovitsianum* Fisch. et Lallemand, Szovits's, 4. Zw.  
 f. Colchis.  
**Linaria** *albifrons* Spgl., weifsblätteriger, ☉. f. Rhodus.  
*aparinoides* Chaub., aparinenähnlicher, ☉. f. Orient.  
*armeniaca* Chaub., armenischer, ? ☉. ♂. f. Armenien.  
*corifolia* Dsf., corisblätterige, 4. f. Orient.  
*Perezii* Gay., Perez's, ☉. f. ?  
**Lindenbergia** Lehm. (*Brachycoria* Schrad.) (J. B.  
 W. Lindenberg, Amtsverwalter zu Bergedorf, Bearbei-  
 ter der europäischen Lebermoose), XIV. II., Perso-  
 natae Antirrhineae.  
*urticaefolia* Lehm., nesselblätterige, ☉. f. Nepal.

**Lithosciadium** Turcz., Steinepperlein, V. II., Umbelliferae.

multicaule Turcz., vielstengeliges, ♂. f. Sibirien.

**Lobelia** I. **Centropogon** Doniana \* (*Siphocampylus bicolor* D et G. Don), Don's, 4. h. w. Georgia.

Sect. VI. *L. ignea* Hort. = Schiedeana.

**Loethainia** \* (R. B. von Römer auf Löthain und Neumark in Sachsen, Mitglied der königl. sächsischen Ständekammer, einer unserer ausgezeichnetsten Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae Papilionaceae.

obcordata \* verkehrtherzblättrige, h. k. t. Cap der guten Hoffnung.

sericea \* seidenhaarige, h. k. t. Cap der guten Hoffn.

**Lomatocarpum** Fisch. et Mey., Saumdoide, V. II., Umbelliferae.

alpinum Fisch. et Mey. (*Seseli alpinum* MB.), Alpen-S., ♂. f. Caucasus.

**Lomatogonium** v. Braune, Saumnarbe, V. I., Contortae-Gentianeae.

carinthiacum v. Braune, kärnthnische, ☉. f. Kärnthen, Tyrol, Schweiz etc.

**Lophanthus chinensis** Benth. = obtusifolius S. 477.

**Lotus** glinoides Delil., glinusähnlicher, ☉. f. Aegypten.

**Lowea** berberifolia, a) glabra Sering., b) velutina Sering., c) Redoutéana Sering. (*Rosa simplicifolia* Salish.)

**Lychnanthus volubilis** Gmel. v. Cucubalus baccifer.

**Lychnis** I. Genuina, decumbens Steud. (*Agrostemma decumbens* Dens.), niederliegende, 4. f. ?

Densoni Steud. (*Agrostemma perennans* Dens.), Denson's, 4. f. ?

Sect. III.

divaricata Rehb., ausgespreizte, ♂. f. Sicilien.

nemoralis Heuff., Hain-L., 4. Ungarn, Banat.

**Lyonetia rigida** DC., starre, ☉. f. Griechenland.

**Malachium** Fr. Weichmeier, X. v., Caryophyllaceae Alsineae.

aquaticum Fr., wasserliebender, 4. f. Europa.

manticum Rehb., mantischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

**Matricaria** disciformis DC., scheibige, 4. f. Caucasus. nigellaefolia DC., schwarzkümmelblättrige, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

**Medicusia** Mch. (C. Medicus, churpfälz. Rath, Botanicus u. Gartendir.), XIX. I., Compositae Cichoriaceae.

aspera Mch. = *M. Sprengeriana* Rehb. = *Picris altissima* Ledeb. *Picris Sprengeriana* Lam. *M. lap-pacea* Rehb. = *Picris pauciflora* W. (*strigosa* Hort. *Crepis Sprengeriana* All.)

**Melaleuca foliosa** Hort. = diosmaefolia.

**Melanoselinum** Hoffm., Schwarzsilge, V. II., Umbelliferae.

decipiens Hoffm. (*Bubon Galbanum* Hort.), täuschende, 4. k. Madeira.

*Seguieri* Swt. vid. *Ligusticum Seguieri*.

**Melhania ovata** Spgl. vid. *Pentapetes ovata*.

**Melinis** P. B., Drüsengras, III. II., Gramineae.

minutiflora P. B. (*Agrostis glutinosa* Fisch.), kleinblüthiges, 4. w. Brasilien.

**Microglossa** DC., Kleinzunge, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- Microglossa volubilis* DC. (*Microglossum proliferum* DC. Vol. v. p. 396), §. Sch. w. Java.
- Miegia maritima* W., vid. *Remirea maritima*.
- Mimulus moschatus* Dougl., moschusduftende, 4. k. f. b. Columbia.
- zonatus Rchb., umgürtete, 4. k. ?Hybride.
- Mocanera* Juss., *Mocanera* XI. iv., Sopotaceae - Ebenaceae.
- canariensis, \* canarische, §, k. Canarische Inseln.
- Mogiphanes brasiliensis* Mart. = *Philoxeros brasiliensis*.
- Monochilus* Fisch. et Mey., statt *Menochilus* S. 510.
- Moraea chinensis* Thbg. vid. *Pardanthus chinensis*.
- Mulgedium multiflorum* DC., vielblumiges, ?⊙. 4. f. Nordamerika.
- Myogalum* Lk. vid. *Ornithogalum*.
- Nananthea* DC., Zwergmaßliebe, XIX. ii., Compositae Corymbiferae.
- perpusilla DC. (*Chrysanthem. perpusillum* Lois.), kleinste, ⊙. f. Corsica, Sardinien.
- Nardurus* Rchb. vid. *Vulpia*.
- Nemaconia graminifolia* Knowl. et Westc. vid. *Ponera graminifolia*, s. *juncifolia* Lindl.
- Nepeta madagascariensis* Lam. v. *Plectranthus rotundifolius*.
- Nycterinia gracilis* (Lehm.), schlanke, §, k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Ornithogalum* S. I. arcuatum Stev., bogenförmige, 4. Zw. Caucasus.
- Ecklonii Fisch. et Mey, Ecklon's, 4. Zw. k. Cap d. g. H. spirale Hffg., spiralförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoff.
- Othonna cylindrica* DC., cylinderförmige, §. k. Cap der guten Hoffnung.
- Pachypleurum simplex* Rchb. v. *Gaya simplex*.
- Palicourea apicata* H. B. K., spitze, §. W. Caracas.
- Palimbia Chabraei* DC., *salsa* Bess. vid. *Peucedanum Chabraei* S. 610. et *salsum* Nacht.
- Papaver aculeatum* Thbg. = *P. garepinum*.
- Pentameris* P. B. Pentamerie III. ii., Gramineae.
- airoides N. E., schmielenähnliche, ⊙. f. Cap d. g. Hoff.
- curvifolia N. E., krummblättrige, 4. k. Cap. d. g. Hoff.
- glandulosa N. E., drüsige, 4. k. Cap. der gut. Hoff.
- macrantha N. E., großblumige, 4. k. Cap. d. g. Hoff.
- micrantha N. E., kleinblumige, 4. k. Cap d. g. Hoff.
- papillosa N. E., warzige, 4. k. Cap der guten Hoff.
- stricta N. E., steife, 4. k. Cap der guten Hoff.
- Thouarsi P. B., Thouar's, 4. k. Cap der guten Hoff.
- Peristylus albidus* Lindl. etc. v. *Gymnadenia albida*.
- Pentapera* Kl., Pentapere, VIII. i., Ericaceae.
- sicula Kl., sicilische, §. k. Sicilien.
- Peucedanum salsum* Steud., Salinen - H. 4. f. Süd- und Ostrufsland.
- Phalerocarpus serpyllifolius* G. Don. statt *hispidulus* S. 612.
- Phleum ambiguum* Tenor. = *Phleum Michelii*.
- Phoenixopus* Cass. (*Phaenopus* DC. *Lygodesmia* Don.), Ruthensalat, XIX. i., Cichoriaceae.
- Phoenixopus vimineus* Rchb. (*decurrens* Cass.), kleberiger, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.
- β) *ramosissimus* Rchb.



- Sogalgina balbisioides* Cass. et *triloba* Cass. v. *Galinsogea balbisioides* et *trilobata*.
- Physalobium** Benth., Blasenbohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*Stirlingii* Benth., Stirling's-B., Sch. t. Neuholland.
- Pinardia anisocephala* Cass. etc. v. *Chrysanthemum viscosum* etc.
- Pluchea** Cass., *Pluchea*, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*balsamifera* Lef. (*Blumea balsam.* DC.), balsamische, 4.  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.  
*bifrons* DC., zweiflügelige, 4. k. Carolina.  
*camphorata* DC., campherduftende,  $\odot$  f. Nordamerik.  
*sagittalis* Less, pfeilförmige,  $\frac{1}{2}$  t. Monte Video.  
*subdecurrens* Cass. = *Baccharis adnata* S. 109.
- Pterocaulon** Ell., Flügelstengel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*virgatum* DC., ruthenförmiger,  $\frac{1}{2}$  w. Caribaen.
- Pyrethrum** Clusii Fisch., Clusius's P., 4. f. Ungarn, Oesterreich.
- Pyrhopappus** carolinianus DC. = *Barkhausia caroliniana*.
- Rhododendron** arboreum hybridum: *Emma belgica*, triumphans *Gandavensis* nov. *bicolor*, resplendens, rubescens *grandiflorum*, *atrorubens* *superbum*, *rubrum elegans*, *flammeolum* Hort. belg., *Reichenbachianum* Hort. bot. Dresd.
- Sabulina* Rchb. v. *Arenaria*.
- Sarothamnus** Wimm. et Grab., Besenstrauch (ginster), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.  
*scoparius* Wimm. et Grab., *vulgaris* Wimm. (*Genista scoparia* Lam., *Sp. scoparium* L.), gemeiner,  $\frac{1}{2}$  f. Europa.
- Schizogyne** Cass., Spaltstiel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.  
*glaberrima* Cass., kahler,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Inseln.  
*sericea* DC. (*obtusifolia* Cass.), seidenhaariger,  $\frac{1}{2}$  k. Canarische Inseln.
- Scilla** Sect. II. *patula* Redout. (*campanulata*  $\beta$ . minor Ker.), ausgebreitete, 4. Zw. f. Süd- u. Westeuropa.
- Secale** creticum L. (*Triticum* c. R. et S., *Hordeum Sieberianum* Bess.), cretischer,  $\odot$   $\frac{1}{2}$  f. Creta, Corsica.
- Senecio** Sect. I. *auratus* DC. (*Cineraria aurea* L.), goldfarbiges, 4. f. Sibirien.  
*lampsanoides* DC. (*Cinerar. parviflora* MB.), rainkohlähnliches, 4. f. Caucasus.  
 Sect. II.  
*deltoideus* DC., deltaförmiges, 4. Sch. k. Cap. d. g. Hoff.  
*oliganthus*, wenigblumiges,  $\frac{1}{2}$  k. Cap der guten Hoff.  
 Sect. V. *Gynura*.  
*ovalis* DC., eiförmiges,  $\frac{1}{2}$  w. Ostindien.
- Serratula pulchella** Sims. v. *Saussurea pulchella*.
- Simocheilus** Benth. Genst., VIII. I. (IV. I.) Ericaceae.  
*bicolor* Benth., zweifarbiges,  $\frac{1}{2}$  t. Cap der gut. Hoff.  
*depressus* Benth. = *Blairia depressa* S. 124.  
*glabellus* Benth. = *B. glabella* S. 124.
- Simisia** cordata Cass., herzblättrige, 4. k. Mexico.  
*ficifolia* P., feigenblättrige,  $\odot$  t. Mexico.  
*heterophylla* DC., verschiedenblättrige, 4. w. Mexico.  
*heterophylla* P. v. *Echinacea heterophylla*.

**Succisa** L. *Cephalaria*.

*procera* (Fisch. Lallemand.), hohe, 4. f. Natolien.

**Talauma** Rumphii Blume (*Magnolia Rumphii* Speg.  
*Sampacca montana* Rumph. *Liriodendron liliifera* L.  
*Gwillimia* Rottb.), Rumph's T., 5. w. Molucken.

**Tetrapoma** Krusianum Fisch. et Mey., Kruse's, 3. ♂.  
f. Ostsibirien.

**Verbena** biserrata H. B. K., doppelsägiges, 4. f. k.  
Mexico.

**Vernonia** montevidensis Hort., montevideische, 5. k.  
t. Montevideo.

*rigida* Sw., starre, 5. w. Jamaika.

*tournefortioides* H. B. K., tournefortiaähnliche, 3. w.  
m. Südamerika.

**Veronica** ceratocarpa C. A. Mey, hornfrüchtige, 3. f.  
Südrußland.

## Nachschrift.

Indem ich dem verehrten Publicum den Schluss dieses Werkes in der Hoffnung übergebe, daß dasselbe einem längst gefühlten Bedürfnis im praktischen Gartenleben theils seiner Einrichtung, theils seines Preises wegen genügen möge, sei es mir erlaubt, noch Einiges über die Einrichtung des Buches zu bemerken. Da während der Arbeit der Stoff (wie es bei den jetzigen Bestrebungen der Zeit nicht anders möglich sein kann) sich mehrte, so konnte mit Aufführung der Synonyme in angefangener Weise nicht fortgefahren werden; es wurde daher der Raumersparnis wegen gewöhnlich nur eine Art (z. B. *Marrubium acetabulosum* etc.) als Synonym aufgeführt und durch etc. darauf hingewiesen, daß die übrigen, zu derselben anderen Gattung gebrachten Arten denselben Trivialnamen wie bei der alten Gattung fortführten; Ausnahmen sind jedesmal angegeben, zuweilen jedoch bei den wenig in Gärten circulirenden Synonymen ist nur auf die Gattung selbst verwiesen. Der Autor, in Parenthese beigefügt, gilt gewöhnlich für Bestimmung der Art, nicht der Gattung; da aber stets Arten zu anderen Gattungen gebracht werden, je nach Ansichten oder wissenschaftlichen Untersuchungen, so sucht man durch diese Einrichtung das Andenken des Entdeckers oder Bestimmers der Species zu bewahren. Da so manche neue Gattungen im praktischen Gartenverkehr noch nicht recht Eingang finden wollen, so habe ich es vorgezogen, sie als Untergattungen oder Sectionen aufzuführen, wo der Name des alten Autors unbeschadet bei der Art stehen bleiben und man sich den anderen, sowie er bei der neuen Gattung genannt ist, bei jeder Art noch hinzudenken kann, man vergl. z. B. *Lobelia*, *Erica* und dergl.; ich wünschte, ich hätte das noch bei mehreren Gattungen, wie z. B. *Andromeda* und dergl., gethan. Einiges hin und wieder zu ändern habe ich mir erlauben müssen, und dieß mit einem \* bezeichnet, denn bei der Menge der vorkommenden, sich täglich mehrenden Gegenstände, bei den öfteren Verwechslungen, ja bei dem regen Schaffen in dieser Wissenschaft überhaupt, wird jeder Botaniker und gebildete Gärtner in die unausbleibliche Nothwendigkeit versetzt werden (d. h. einem nothwendigen Uebel nicht entgehen können), hier und da einen anderen Namen geben oder wählen zu müssen, eine Art oder Gattung anders zu stellen u. s. w. *Willemetia* und *Wiborgia* waren als Gattungen in den beiden klassischen Floren Koch's



und Reichenbach's schon vergeben und sind gleichsam eingebürgert, *Cyanopsis* DC. kann zu leicht mit *Cyamopsis* verwechselt werden, *Visnea* konnte nicht bleiben, es ist ein verhunzter Name, wir haben dafür schon *Vismea* (nach Herrn von Visme, nicht Visne in Lissabon); ich wählte daher den Namen Jussieu's *Mocanera*, und durch die vorher genannten, dann von mir veränderten Namen habe ich gesucht das Andenken einiger würdigen sächsischen Botaniker zu verewigen. Ich hoffe, daßs man dieß entschuldigen wird. Da das Buch die anfänglich bestimmte Bogenzahl ohnedieß schon weit überschritten hat, und die vierte Lieferung bei Weitem stärker als die übrigen geworden ist, so konnte im Nachtrage doch nicht alles Neue, was in diesem Jahre oder während des Druckes mir bekannt geworden, mit aufgenommen werden, doch werde ich das Fehlende in einem zweiten Nachtrage baldigst nachliefern. Schließlich sage ich noch allen denjenigen Herren, die mich mit literarischen Hilfsmitteln oder sonstigen Nachweisen unterstützt haben, meinen innigsten, herzlichsten Dank und bitte, diese Arbeit nachsichtsvoll aufzunehmen und zu beurtheilen.

Dresden, den 6. Juli 1841.

**Gustav Heynhold.**







